

발 간 등 록 번 호

11-1352477-000174-10

ISSN 2092-2876
통계승인번호 제 11775호

2012

지역사회 건강통계

울산광역시 울주군



발간사



반갑습니다.

우리군은 전국에서 가장 먼저 해가 뜨는 간절곶과 천혜의 산악관광지 영남알프스 21만 울주군민을 품고 있는 아름답고 살기좋은 축복의 명품도시입니다.

모든 군민이 보다 건강하고 행복하게 삶을 영위 할 수 있도록 군민의 작은 아픔의 소리에도 귀를 기울여 사전 예방적 건강정책을 강화하고 공공보건의료 서비스 제공에 혼신의 노력을 해 나가겠습니다.

지역사회 건강조사는 근거 중심의 보건사업 수행의 기반을 마련하고자 보건사업 통합평가지표를 생산하는데 그 목적이 있습니다.

이를 위하여 계명대학교에 협력을 받아 지역사회 건강조사를 실시하게 되어 성실하게 조사에 참여해 주신 관계자들에 심심한 감사를 드립니다.

앞으로 본 조사자료를 활용하여 군민의 건강문제를 보다 적극적으로 대응하고 효과적이고 알찬 공공 보건의료사업을 펼쳐 나갈 것입니다.

건강문제는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.

건강이 있어야 성공도 행복도 있는 것입니다. 건강은 작은 건강생활의 실천이 시작입니다.

군민건강을 여는 작은 시작의 길을 우리 보건소 전 직원들의 사랑과 열정으로 희망의 불빛으로 환하게 밝혀 나갈 것 임을 약속드립니다.

모든 군민의 앞날에 항상 건강과 행복이 깃드시길 기원드립니다.

감사합니다.

2013. 3.

울산광역시 울주군보건소장 김홍식



발간에 즈음하여

2012년도 지역사회 건강조사가 마무리 되었습니다. 2008년을 시작으로 5년간의 지역사회 건강조사 자료는 울산 시민들의 건강과 관련한 소중한 지표들이며, 지금까지 어느 조사도 제시하지 못하였던 다양한 울산광역시 울주군 주민들의 건강행태, 건강수준과 삶의 질의 수준에 대한 축적된 정보를 산출할 수 있게 되었습니다.

이 소중한 정보를 활용하여 전국 혹은 타 시, 군 과 결과를 비교하여 지역보건사업의 우선순위를 결정하는 데에도 활용 할 수 있을 것이며, 또한 우리 보건소가 5년간의 변화를 바탕으로 보건사업을 새로이 시작할지, 확대할지, 축소하여도 좋을지? 등의 판단도 가능 할 것으로 생각합니다.



최근 실패한 혹은 잘못된 국가 정책 결과의 책임 문제에 대해 매스컴에서 자주 오르내립니다. 우리나라에서도 점차로 정책의 윤리성 및 책임을 강조하는 분위기가 정착되어 가고 있는 것 같습니다.

이는 지역주민의 세금으로 운영되는 모든 지역사업의 계획과 평가는 사실과 근거를 바탕으로 하여 수행하여야 한다는 의미이며, 주민의 건강행태와 질병의 이환상태와 삶의 질에 대한 사실에 근거한 계획과 보건사업의 평가만이 지역주민의 세금을 올바르게 배분 할 수 있도록 한다는 의미입니다.

이러한 근거에 바탕을 둔 보건소의 사업만이 지역 주민의 요구와 필요를 충족시킬 수 있고, 주민의 건강문제를 해결 할 수 있는 높은 수준의 보건사업으로 평가 받을 수 있을 것입니다.

소중한 자료의 수집을 위하여 수고를 아끼지 않으신 김홍식 소장님, 김재숙 과장님, 김혁관 계장님, 강영란 선생님 및 현장에서 직접 발로 뛰며 조사에 임하신 조사원과 무엇보다도 이 조사에 성실히 참여해 주신 지역사회 주민 여러분께 깊은 감사를 드립니다.

2013. 3.

계명대학교 의과대학 책임교수 이중정

이용자를 위하여

- ❖ 이 보고서는 2012. 8. 16. - 2012. 10. 31. 울산광역시 울주군에서 실시된 지역사회건강조사 결과를 수록한 자료입니다.
- ❖ 이 보고서에 제시된 통계치는 가중치를 적용한 결과(조율)이며, 가중치는 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율, 개인응답률, 당해 연도 모집단 성·연령별 인구 구성비를 반영하여 산출하였습니다.
- ❖ 2부 주요통계결과에서 2008-2012년 비교 가능한 지표에 대해서는 당해 연도의 전체·성·연령별 그래프와 함께 시·군·구 및 시·도의 연도별 추이 그래프를 제시하였으며, 지표비교 시, 오차막대가 서로 겹치지 않는 경우에 한해 증감 현황을 기술하였습니다. 2차년도 이하의 조사지표의 경우에는 당해 연도의 전체·성·연령별 그래프를 제시하였습니다. 지표정의가 변경된 경우 변경내용을 각주로 표시하였으며, 해당 연도 통계치는 연도별 추이 그래프에서 제외하였습니다. 조사문항 변경내용은 제4부 부록 <연도별 문항비교표>에서 확인하실 수 있습니다.
- ❖ 2부 주요통계결과에서 제시된 지표 중, 정상음주율, 문제음주율, 알코올의존율 I·II, 건강검진 수진율, 암 검진율은 2년 주기, 심폐소생술 인지율 및 교육 경험률은 4년 주기 산출지표에 해당 합니다. 순환지표에 대한 상세정보는 제4부 부록 <순환지표 현황표>에서 확인하실 수 있습니다.
- ❖ 본 자료 중 2008-2010년 수치는 응답의 이상치와 논리적 오류를 수정하여 산출된 결과로 기 발간된 보고서의 수치와 일부 다를 수 있습니다.
- ❖ 분석대상자 수(N)가 20 미만인 경우 2부 주요통계결과 및 3부 통계표에서 통계치를 제시하지 않았으며(통계표에서 하이픈(-) 처리), 변동계수(coefficient of variation; CV)가 30 이상인 경우 통계치의 신뢰도가 낮으므로 이용 시 유의하시기 바랍니다.
- ❖ 통계표에 수록된 숫자는 소수점 두 번째 자리에서 반올림되었으며, 반올림된 수치의 총계가 일치하지 않을 수 있으나 이는 통계표의 오류가 아닙니다.
- ❖ 지역사회건강조사 조사표, 건강통계집, 원시자료('08-'10년)는 지역사회건강조사 홈페이지 (<http://chs.cdc.go.kr>)에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
- ❖ 이 보고서에 수록된 통계치 및 지역사회건강조사에 관한 문의는 울주군보건소(☎052-229-8042), 계명대학교(☎053-580-3896)로 해주시기 바랍니다.

용어정의

1 통계

Community Health Survey

① 모집단 (Population)

조사대상이 되는 집단 전체

② 표본 (Sample)

모집단 중 조사를 위해 추출된 일부 집단

③ 표본오차 (Sampling Error)

모집단 중 일부를 표본으로 선정하여 조사함에 따라 발생하는 오차로서 표본조사의 정확성을 나타내는 척도

④ 비표본오차 (Non-Sampling Error)

표본추출을 제외한 조사 설계, 조사 수행, 자료 집계 및 분석 과정에서 발생하는 오차로서 불명확한 조사개념, 조사문항의 객관성 결여, 조사지 구성의 논리적 오류, 면접방법, 조사원의 자질, 조사원을 감독하는 관리자의 태도, 조사대상자의 무응답, 자료 코딩 등이 비표본오차의 주요 발생 원인에 해당

⑤ 조율 (Crude Rate)

총 발생건수를 전체 모집단으로 나눈 값으로, 모집단의 성·연령별 등의 인구 집단 특성을 보정하지 않은 통계치

⑥ 표준화율 (Standardized Rate)

비교하고자 하는 집단 간 인구 구조 차이를 보정한 통계치



⑦ 표준오차 (Standard Error)

각 표본들의 평균이 모집단의 평균과 얼마만큼의 차이가 있는지 나타내는 값

⑧ 변동계수 (Coefficient of Variation, CV)

표준오차를 평균으로 나눈 값으로, 통계치의 신뢰도를 나타내는 척도이며, 변동계수와 통계치의 신뢰도는 반비례 관계

2 조사

Community Health Survey

① CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

컴퓨터를 이용하여 조사 자료를 수집하는 방식으로, 조사원이 전자조사표가 설치된 노트북으로 면접조사를 수행할 때 조사현장에서 직접 자료입력, 수정, 저장 및 전송이 가능

② 순환조사체계

2010년부터 지역사회건강조사에 도입된 조사체계로서, 산출지표의 활용도 및 사회적 관심 등을 고려하여 각 조사문항 및 산출지표의 주기를 1년, 2년, 4년으로 구분하고, 각 문항 및 지표 당 구성 비율은 70%:20%:10%로 순환주기는 총 4년으로 구성(1기 순환조사 : 2010-2013년)

③ 지역보건지표뱅크

지역사회에서 보건사업 추진 시, 활용 가능한 조사문항 및 산출지표를 수집·정리한 것으로 지표별 조사문항 및 응답보기, 지표정의, 산출식, 조사주기 등 상세정보 포함

CONTENTS

발간사	
발간에 즈음하여	
이용자를 위하여	
용어정의	
요약	2
우리 지역사회의 주요 건강이슈	4

제1부 조사체계

I. 조사개요	7
1. 추진배경 및 목적	8
2. 조사체계	8
3. 표본설계	10
4. 조사방법	11
5. 자료관리	12
6. 조사현황	13
II. 통계 추정방법	17
1. 가중치의 사용	18
2. 자료처리	19
3. 분산추정	20

제2부 주요통계결과

I. 건강행태	23
1. 흡연	24
2. 음주	30
3. 안전의식	34
4. 운동 및 신체활동	36
5. 식생활 및 영양	40
6. 비만 및 체중조절	44
7. 구강건강	46
8. 정신건강	52
II. 건강검진 및 예방접종	55
1. 건강검진 수진율	56
2. 암 검진율	56
3. 연간 인플루엔자 예방접종률	56
III. 이환 및 의료이용	59
1. 만성·급성질환 및 사고중독 경험률	60
2. 연간 평균 혈압 측정횟수	60
3. 연간 평균 혈당 측정횟수	60
4. 주요 질환별 평생 의사진단 경험률 및 관리행태	62
5. 질환별 인지율	70
6. 의료이용	70
IV. 사고 및 중독	73
1. 연간 사고중독 경험률	74
2. 연간 사고중독 건수율	74

V. 활동제한 및 삶의 질	77
1. 양호한 주관적 건강수준 인지율	78
2. 침상외병 경험률	78
3. 결근결석 경험률	78
4. 오늘의 건강상태	80
VI. 보건기관 이용	83
1. 보건기관 이용	84
2. 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염) 홍보 및 교육 경험률	86
VII. 심정지	89
1. 심폐소생술 인지율	90
2. 심폐소생술 교육 경험률	90

제3부 통 계 표

I. 통계표	95
--------------	----

제4부 부 록

I. 개인조사표	189
II. 가구조사표	227
III. 순환지표 현황표	231
IV. 연도별 문항비교표	243
참고문헌	264
참여연구진	265

CONTENTS

〈표목차〉

〈표 1〉 2012년 지역사회건강조사 주요지표 결과표	2
〈표 2〉 기관별 역할	9
〈표 3〉 등 별 표본지점 분포	11
〈표 4〉 2012년 지역사회건강조사 조사영역 및 항목	12
〈표 5〉 조사현황	13
〈표 6〉 가구당 조사인원 수	13
〈표 7〉 2012년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성	15
〈표 8〉 2012년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성	16
〈표 9〉 가구가중치 산출 예	18
〈표 10〉 개인가중치 산출 예	19
〈표 11〉 보정가중치 산출 예	19
〈표 12〉 교육수준분류	20
〈표 13〉 직업분류	20

〈그림목차〉

〈그림 1〉 추진체계	8	〈그림 28〉 걷기 실천율	39
〈그림 2〉 수행체계	9	〈그림 29〉 저염선택율(2012)	41
〈그림 3〉 수행과정	10	〈그림 30〉 저염선택율(연도비교)	41
〈그림 4〉 표본선정과정	10	〈그림 31〉 가공식품 선택 시 영양표시 이용률	43
〈그림 5〉 1기(2010~2013년) 순환조사체계	11	〈그림 32〉 영양교육 및 상담수혜율	43
〈그림 6〉 권역콜센터 운영체계	12	〈그림 33〉 식품 안정성 확보율	43
〈그림 7〉 전화점검 절차	13	〈그림 34〉 비만율	45
〈그림 8〉 가중치 산출 과정	18	〈그림 35〉 주관적 비만인지율	45
〈그림 9〉 현재흡연율	25	〈그림 36〉 체중조절 시도율	45
〈그림 10〉 흡연시작연령	25	〈그림 37〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	47
〈그림 11〉 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량	25	〈그림 38〉 저작불편호소율(65세 이상)	47
〈그림 12〉 흡연자의 금연시도율	27	〈그림 39〉 틀니 이용 행태(65세 이상) (2012)	49
〈그림 13〉 흡연자의 1개월 내 금연계획률	27	〈그림 40〉 틀니 이용 행태(65세 이상) (연도비교)	49
〈그림 14〉 금연캠페인 경험률	29	〈그림 41〉 점심식사 후 칫솔질 실천율	51
〈그림 15〉 금연교육 경험률	29	〈그림 42〉 구강검진 수진율	51
〈그림 16〉 현재 흡연자의 금연교육 경험률	29	〈그림 43〉 연간 스케일링 경험률	51
〈그림 17〉 월간음주율	31	〈그림 44〉 스트레스 인지율	53
〈그림 18〉 음주시작연령	31	〈그림 45〉 우울감 경험률	53
〈그림 19〉 고위험음주율	31	〈그림 46〉 건강검진 수진율	57
〈그림 20〉 정상음주율, 문제음주율, 알코올의존율 I, 알코올의존율 II (2012)	33	〈그림 47〉 암 검진율	57
〈그림 21〉 정상음주율, 문제음주율, 알코올의존율 I, 알코올의존율 II (연도비교)	33	〈그림 48〉 연간 인플루엔자 예방접종률	57
〈그림 22〉 운전 시 안전벨트 착용률	35	〈그림 49〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률	61
〈그림 23〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	35	〈그림 50〉 연간 평균 혈압 측정횟수	61
〈그림 24〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)	35	〈그림 51〉 연간 평균 혈당 측정횟수	61
〈그림 25〉 격렬한 신체활동 실천율	37	〈그림 52〉 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)	63
〈그림 26〉 중등도 신체활동 실천율	37	〈그림 53〉 고혈압 약물치료율(≥30)	63
〈그림 27〉 중등도 이상 신체활동 실천율	37	〈그림 54〉 고혈압 관리교육 이수율(≥30)	63
		〈그림 55〉 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)	65

CONTENTS

〈그림목차〉

〈그림 56〉 당뇨병 치료율(≥ 30)	65
〈그림 57〉 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)	65
〈그림 58〉 당뇨병 안정한 합병증검사 수진율(≥ 30)	67
〈그림 59〉 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥ 30)	67
〈그림 60〉 관절염 평생 의사진단 경험률(≥ 50)	69
〈그림 61〉 관절염 관리교육 이수율(≥ 50)	69
〈그림 62〉 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥ 30)	69
〈그림 63〉 대사증후군 인지율	71
〈그림 64〉 에이즈 인지율	71
〈그림 65〉 필요의료서비스 미치료율	71
〈그림 66〉 연간 사고중독 경험률	75
〈그림 67〉 연간 사고중독 건수율	75
〈그림 68〉 양호한 주관적 건강수준 인지율	79
〈그림 69〉 침상외병 경험률	79
〈그림 70〉 결근결석 경험률	79
〈그림 71〉 오늘의 건강상태	81
〈그림 72〉 보건기관 이용률	85
〈그림 73〉 보건기관 이용 서비스 종류	85
〈그림 74〉 보건기관 서비스 만족도	85
〈그림 75〉 보건기관 고혈압 홍보 및 교육 경험률	87
〈그림 76〉 보건기관 당뇨병 홍보 및 교육 경험률	87
〈그림 77〉 보건기관 관절염 홍보 및 교육 경험률	87
〈그림 78〉 심폐소생술 인지율	91
〈그림 79〉 심폐소생술 교육 경험률	91

〈통계표목차〉

〈표 14〉 현재흡연을	96	〈표 41〉 아침식사 섭취빈도 및	
〈표 15〉 흡연시작연령	97	아침결식예방 인구비율	123
〈표 16〉 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량	98	〈표 42〉 저염선택율	124
〈표 17〉 흡연자의 금연시도를	99	〈표 43〉 가공식품 선택 시 영양표시 이용률	125
〈표 18〉 흡연자의 금연방법	100	〈표 44〉 영양교육 및 상담수혜율	126
〈표 19〉 흡연자의 1개월 내 금연계획률	101	〈표 45〉 식품 안정성 확보율	127
〈표 20〉 흡연자의 금연이유	102	〈표 46〉 식생활 지침 인지율	128
〈표 21〉 금연캠페인 경험률	103	〈표 47〉 비만도 분포 및 비만율	129
〈표 22〉 금연교육 경험률	104	〈표 48〉 주관적 비만인지율	130
〈표 23〉 현재 흡연자의 금연교육 경험률	105	〈표 49〉 체중조절 시도율	131
〈표 24〉 평생음주율	106	〈표 50〉 체중조절 시도방법	132
〈표 25〉 연간음주율	107	〈표 51〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 비율	133
〈표 26〉 월간음주율	108	〈표 52〉 저작불편호소율 : 65세 이상	134
〈표 27〉 음주시작연령	109	〈표 53〉 발음불편호소율 : 65세 이상	134
〈표 28〉 고위험음주율	110	〈표 54〉 틀니 이용 행태 : 65세 이상	135
〈표 29〉 알코올 의존정도(AUDIT) :		〈표 55〉 점심식사 후 칫솔질 실천율	136
정상음주율, 문제음주율,		〈표 56〉 구강검진 수진율	137
알코올의존율 I, 알코올의존율 II	111	〈표 57〉 연간 스케일링 경험률	138
〈표 30〉 음주문제로 인한 상담경험률	112	〈표 58〉 치과진료 미치료를	139
〈표 31〉 운전 시 안전벨트 착용률	113	〈표 59〉 치과진료 미치료자의 미치료 이유	140
〈표 32〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	114	〈표 60〉 스트레스 인지율	141
〈표 33〉 연간 자동차 음주운전차량 동승률	115	〈표 61〉 우울감 경험률	142
〈표 34〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는		〈표 62〉 스트레스 및 우울증상으로 인한	
오토바이) 및 연간 자동차		정신상담률	143
음주운전 경험횟수	116	〈표 63〉 하루 평균 수면시간	144
〈표 35〉 격렬한 신체활동 실천율	117	〈표 64〉 연간 인플루엔자 예방접종률	145
〈표 36〉 중등도 신체활동 실천율	118	〈표 65〉 건강검진 수진율	146
〈표 37〉 중등도 이상 신체활동 실천율	119	〈표 66〉 건강검진 미수진 이유	147
〈표 38〉 걷기 실천율	120	〈표 67〉 암 검진율	148
〈표 39〉 지역사회 내 운동시설 접근율	121	〈표 68〉 최근 2년간 수검 암 검진 종류	149
〈표 40〉 지역사회 내 운동프로그램 참여율	122	〈표 69〉 건강검진 및 암 검진 사후 관리	
		상담률	150

CONTENTS

〈통계표목차〉

〈표 70〉 암 검진 미수진 이유	151	〈표 98〉 과민성방광 평생 의사진단 경험률 ..	163
〈표 71〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률	152	〈표 99〉 요실금 평생 의사진단 경험률	163
〈표 72〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험일수	152	〈표 100〉 고혈압 약물치료를	164
〈표 73〉 연간 평균 혈압 및 혈당 측정횟수 ..	153	〈표 101〉 고혈압 관리교육 장소 및 고혈압 관리교육 이수율	164
〈표 74〉 고혈압 평생 의사진단 경험률 및 현재치료를	154	〈표 102〉 고혈압 의료기관 방문횟수	164
〈표 75〉 본인 인지 혈압조절을	154	〈표 103〉 당뇨병 치료를	165
〈표 76〉 당뇨병 평생 의사진단 경험률 및 현재치료를	155	〈표 104〉 당뇨병 관리교육 장소 및 당뇨병 관리교육 이수율	165
〈표 77〉 본인 인지 혈당조절을	155	〈표 105〉 당뇨병 의료기관 방문횟수	165
〈표 78〉 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률	156	〈표 106〉 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 및 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율	166
〈표 79〉 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률	156	〈표 107〉 당화혈색소 인지율	166
〈표 80〉 심근경색증 평생 의사진단 경험률 ..	156	〈표 108〉 관절염 관리교육 장소 및 관절염 관리교육 이수율	167
〈표 81〉 협심증 평생 의사진단 경험률	157	〈표 109〉 천식증상경험률 및 운동성 천식이환율	167
〈표 82〉 관절염 평생 의사진단 경험률 및 현재치료를	157	〈표 110〉 과민성방광 증상 점수	168
〈표 83〉 골다공증 평생 의사진단 경험률	158	〈표 111〉 대사증후군 인지율	169
〈표 84〉 폐결핵 평생 의사진단 경험률	158	〈표 112〉 에이즈 인지율	169
〈표 85〉 천식 평생 의사진단 경험률	158	〈표 113〉 필요의료서비스 미치료를 및 필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료를	170
〈표 86〉 알레르기비염 평생 의사진단 경험률	159	〈표 114〉 필요의료서비스 미치료 이유	171
〈표 87〉 아토피피부염 평생 의사진단 경험률	159	〈표 115〉 연간 사고중독 경험률	172
〈표 88〉 백내장 평생 의사진단 경험률	159	〈표 116〉 연간 사고중독 건수율	173
〈표 89〉 B형 간염 평생 의사진단 경험률 ..	160	〈표 117〉 양호한 주관적 건강수준 인지율 ..	174
〈표 90〉 C형 간염 평생 의사진단 경험률 ..	160	〈표 118〉 침상외병 경험률	175
〈표 91〉 빈혈 평생 의사진단 경험률	160	〈표 119〉 침상외병일수	175
〈표 92〉 중이염 평생 의사진단 경험률	161	〈표 120〉 결근결석 경험률	176
〈표 93〉 위십이지장궤양 평생 의사진단 경험률	161	〈표 121〉 결근결석일수	176
〈표 94〉 치질 평생 의사진단 경험률	161		
〈표 95〉 암 평생 의사진단 경험률	162		
〈표 96〉 갑상선장애 평생 의사진단 경험률 ..	162		
〈표 97〉 우울증 평생 의사진단 경험률	162		

〈통계표목차〉

〈표 122〉 삶의 질 지수(EQ-5D Index)	177
〈표 123〉 오늘의 건강상태(EQ-VAS)	178
〈표 124〉 보건기관 이용률	179
〈표 125〉 최근 1년(365일) 동안 주로 이용한 보건기관	180
〈표 126〉 보건기관 이용 서비스 종류	181
〈표 127〉 보건기관 서비스 만족도	182
〈표 128〉 보건기관을 이용하게 되는 주된 이유	183
〈표 129〉 보건기관을 이용하지 않는 이유 ...	184
〈표 130〉 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매) 홍보 및 교육 경험률	185
〈표 131〉 심폐소생술 인지율	186
〈표 132〉 심폐소생술 교육 경험률 및 심폐소생술 마네킹 실습 경험률 ..	186
〈표 133〉 심폐소생술 시행능력률	186

:: 요약



요약

‘2012년 울산광역시 울주군 지역사회건강조사’와 ‘국민건강영양조사’를 비교한 주요지표 결과는 <표 1>과 같다.

<표 1> 2012년 지역사회건강조사 주요지표 결과표

(단위 : %, 조율(표준오차))

분류	영역	산출지표	지역사회건강조사					국민건강영양조사	
			2008	2009	2010	2011	2012	2010	2011
I. 건강 행태	흡연	현재흡연율	25.5(2.0)	29.0(1.8)	25.3(1.4)	24.3(1.4)	24.3(1.3)	26.9(0.7)	26.3(0.8)
		남자 현재흡연율	47.8(3.1)	53.5(3)	47.6(2.6)	46.6(2.7)	45.4(2.5)	48.1(1.2)	46.8(1.3)
		흡연자의 1개월 내 금연계획률	-*	-*	4.2(1.2)	3.9(1.2)	4.6(1.3)	-*	-*
		흡연자의 금연시도율	-*	-*	22.7(3.3)	27.8(3.2)	18.1(2.8)	-*	-*
		금연캠페인 경험률	70.8(2.5)	85.3(1.2)	84.3(1.3)	88.4(1.2)	66.4(1.8)	-**	-**
	음주	월간음주율	59.6(2.5)	52.7(1.9)	56.4(2.0)	54.3(1.9)	50.2(1.6)	59.3(1.0)	59.2(0.9)
		고위험음주율	17.0(3.3)	18.0(1.7)	13.6(1.7)	16.4(1.5)	15.0(1.8)	17.6(0.8) ¹⁾	17.6(0.8)
	안전 의식	운전 시 안전벨트 착용률	95.4(1.1)	80.5(2.1)	84.6(2.0)	88.3(1.5)	77.4(2.1)	72.8(1.2) ²⁾	68.5(1.3)
		동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	83.1(2.2)	75.2(2.2)	80.3(2.1)	85.1(1.7)	76.7(1.6)	62.4(1.0)	61.2(1.0)
	신체 활동	중등도 이상 신체활동 실천율	-***	27.4(1.6)	21(1.5)	22.2(1.6)	21.8(1.6)	22.4(0.8)	19.2(0.8)
		걷기 실천율	46.5(2.0)	47.4(2.0)	43.5(1.8)	41.7(2.1)	41.3(1.7)	40.9(0.9)	37.6(0.8)
	비만 체중 조절	비만율	23.5(1.6)	24.3(1.7)	22.2(1.1)	20.6(1.7)	23.7(1.4)	-****	-****
		주관적 비만인식율	32.2(2.8)	34.8(1.7)	33.9(1.3)	32.1(1.8)	31.8(1.7)	-**	-**
		체중조절 시도율	34.0(3.8)	47.0(1.9)	40.0(1.6)	51.9(2.0)	35.1(1.8)	-**	-**
	구강 건강	저작불편호소율(65세 이상)	52.3(4.7)	55.6(4.7)	55.6(3.0)	58.7(4.6)	48.6(5.4)	44.3(1.6)	47.5(1.5)
		점심식사 후 칫솔질 실천율	-***	-***	55.6(1.9)	50.1(1.7)	57.7(1.8)	-***	-***
	정신 건강	스트레스 인지율	26.4(2.8)	24.9(1.6)	26.0(1.9)	21.4(1.4)	33.9(1.7)	28.2(0.8)	27.9(0.8)
		우울감 경험률	5.9(0.6)	7.6(1.0)	7.0(1.1)	5.4(0.7)	3.8(0.8)	12.8(0.5) ³⁾	13.4(0.6)
II. 건강검진 및 예방접종	건강검진 수진율		-*	-*	63.7(2.3)	-*****	66.6(1.6)	54.1(0.9)	53.7(0.9)
	암 검진율		-*	-*	51.9(1.9)	-*****	36.0(1.7)	46.6(0.9) ⁴⁾	46.5(1.0)
	연간 인플루엔자 예방접종률		31.4(2.8)	32.9(1.8)	28.8(1.8)	30.2(1.9)	41.0(1.9)	29.6(0.9)	32.7(1.0)
III. 이환 및 의료이용	고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)		17.0(1.5)	19.7(1.3)	15.5(1.1)	19.2(1.5)	17.4(1.1)	-****	-****
	고혈압 약물치료율(≥30)		90.9(6.5)	88.6(2.2)	81.1(3.9)	86.7(2.7)	89.5(3.8)	-****	-****
	고혈압 관리교육 이수율(≥30)		-*****	-*****	-*****	16.0(2.8)	24.3(2.6)	-*****	-*****
	당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)		6.3(0.9)	8.3(0.8)	5.8(0.8)	6.8(1.0)	8.0(0.8)	-****	-****
	당뇨병 치료율(≥30)		89.4(3.7)	80.3(4.4)	72.8(5.8)	81.3(6.2)	81.2(5.3)	-****	-****
	당뇨병 관리교육 이수율(≥30)		-*****	-*****	-*****	24.4(3.9)	30.2(4.8)	-*****	-*****
	당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)		37.5(6.1)	35.1(5.9)	60.7(6.7)	26.4(5.5)	39.6(5.8)	-****	-****
	당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)		-*	-*	-*	29.5(5.0)	51.0(5.7)	-****	-****
	관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)		19.0(2.5)	24.8(2.3)	16.3(1.6)	19.5(2.0)	11.7(1.5)	-****	-****

분류	영역	산출지표	지역사회건강조사					국민건강영양조사	
			2008	2009	2010	2011	2012	2010	2011
		관절염 관리교육 이수율(≥50)	-****	-*****	-*****	21.5(3.9)	34.4(4.8)	-****	-****
		필요의료서비스 미치료율	8.3(1.3)	15.2(1.6)	-*	16.6(1.5)	8.7(1.1)	20.3(0.7) ⁵⁾	18.7(0.7)
IV. 사고 및 중독(손상)	연간 사고중독 경험률		4.1(0.7)	5.2(0.8)	3.8(0.8)	7.0(0.9)	7.6(0.9)	7.5(0.5) ⁶⁾	7.0(0.4)
V. 삶의 질	양호한 주관적 건강수준 인지율		44.1(3.2)	44.6(1.7)	46.2(1.7)	48.0(2.0)	49.8(2.1)	36.0(0.8) ⁷⁾	35.3(0.9)

-* : 문항 다름, -** : 산출 안함, -*** : 문항 및 산출식 다름, -**** : 조사방법 다름, -***** : 지침 다름, -***** : 조사 안함

- 1) 연간음주자의 고위험음주율(국민건강영양조사)
- 2) 운전자의 안전벨트착용률(국민건강영양조사)
- 3) 우울증상경험률(국민건강영양조사)
- 4) 암검진수진율(국민건강영양조사)
- 5) 연간미치료율(병의원)(국민건강영양조사)
- 6) 연간손상경험률(국민건강영양조사)
- 7) 주관적건강인지율(국민건강영양조사)

우리 지역사회의 주요 건강이슈

※건강행태

- 흡연자의 금연 시도율, 금연캠페인 경험률이 전년대비 감소한 것으로 나타났으나, 현재흡연율, 남자현재흡연율이 2009년부터 감소하는 것으로 나타났고 흡연자의 1개월 내 금연 계획률이 증가한 것으로 나타나 여러 방면의 흡연 관련 보건사업이 필요한 것으로 나타났다.
- 걷기 실천율이 2009년부터 지속적으로 감소하므로 지역주민을 대상으로 건강한 생활을 하기위한 걷기 및 운동과 관련된 보건 사업이 필요할 것으로 보이며, 주관적 비만인지율은 2009년부터 지속적으로 감소하였으나, 비만율은 전년대비 증가하였고, 체중조절 시도율도 전년대비 감소한 것으로 나타나 이러한 결과에 따라, 이와 관련된 지역주민의 건강한 생활을 위한 지속적 보건사업이 필요할 것으로 보인다.
- 스트레스 인지율이 전년대비 증가하는 것으로 나타났으며 우울감 경험률이 2009년부터 지속적으로 감소하는 것으로 나타나 스트레스에 대한 보건사업의 확장과 꾸준한 관리가 필요한 것으로 나타났다.

※건강검진 및 예방접종

- 건강검진 수진율이 2010년 63.7% 대비 2.9%p 증가하였고 암검진율이 2010년 51.9% 대비 15.9%p 감소한 것으로 나타났으며 연간 인플루엔자 접종률이 2010년부터 지속적으로 증

가한 것으로 나타나, 암검진의 필요성에 대한 지역주민 홍보와 보건사업의 강화가 관리가 필요한 것으로 나타났다.

※이환 및 의료이용

- 고혈압 관리교육 이수율, 당뇨병 관리교육 이수율, 관절염 관리교육 이수율이 전년도 대비 감소하는 것으로 나타나, 지역주민을 위한 지속적인 고혈압, 당뇨병, 관절염 관리교육 및 홍보가 필요한 것으로 나타났다.

※삶의 질

- 양호한 주관적 건강수준 인지율이 지난 5년간 지속적으로 증가하는 것으로 나타나 보건사업이 잘 이루어지는 것으로 나타났다.

※심정지

- 심폐소생술 인지율은 82.9%로 심폐소생술에 대하여 비교적 많이 알고 있으나, 심폐소생술 교육 경험률은 22.3%로 낮고, 특히 연령이 높아질수록 낮다. 따라서 지역주민을 대상으로 지속적인 심폐소생술 관련 교육을 강화 할 필요가 있다.

:: 제1부 조사체계

I. 조사개요

II. 통계 추정방법



제 1 부 조사체계

I. 조사개요

1. 추진배경 및 목적
2. 조사체계
3. 표본설계
4. 조사방법
5. 자료관리
6. 조사현황

I. 조사개요

1. 추진배경 및 목적

가. 추진배경

지방정부의 보건사업의 성공적인 수행을 위해서는 지역주민의 건강상태를 객관적으로 보여주는 통계자료에 근거하여 정확한 정책 방향을 설계하는 것이 중요하다. 1995년 지역보건법이 제정되면서 지방자치단체의 보건사업계획 수립이 의무화되었으나, 이를 뒷받침할 수 있는 지역 통계자료가 부재한 실정이었다. 일부 지방자치단체에서 자체적으로 지역주민을 대상으로 한 건강조사를 수행하였으나, 조사지표 및 수행체계의 표준화가 이루어지지 않아 지역 간 비교가 불가능했다. 이러한 상황에서 지역사회건강조사는 증가하는 지역단위 보건통계에 대한 수요를 충족시키는 동시에 검증된 통계자료 생산하기 위해 추진되었다.

나. 추진목적

지역사회건강조사는 「지역보건법」 제4조(지역보건의료계획의 내용) 및 동법시행령 제4조(지역보건의료계획의 수립방법 등), 제5조(지역보건의료계획 수립시기 등)에 의거하여 지역보건의료계획 수립 및 평가를 위한 지역 건강통계를 생산하는 것이 목적이다. 나아가 이를 바탕으로 근거 중심의 보건사업 수행의 기반을 마련하고 지역 간 비교 가능하도록 조사지표 및 수행체계를 표준화하여 지방자치단체 보건사업 통합평가지표를 생산하는데 목적을 두고 있다.


2. 조사체계

가. 추진체계


안정적이고 전문적인 사업추진 및 지원체계 확보를 위해 운영위원회를 구성, 산하에 전문분과위원회(교육 및 홍보, 표본설계, 질 관리 및 평가, 지표표준화, 자료 활용)를 두어 세부 분야에 대한 자문을 제공하였다.

35개 책임대학교로 구성된 책임대학교위원회에서는 총괄대표대학교(1개)를 지정하여, 교육·홍보 등 공통적인 사업내용을 수행하였으며, 각 책임대학교는 조사계획 수립, 조사수행, 자료 분석, 건강통계집 작성 등을 담당하였다.

질병관리본부는 조사기획 총괄을 담당하는 관리사무국으로서 지표개발, 시·군·구 보건소 및 책임대학교의 조사수행 및 자료 분석 지원, 조사수행 기관 및 조사원 질관리를 담당하였다.



〈그림 1〉 추진체계



〈그림 3〉 수행과정

3. 표본설계

가. 모집단

(1) 목표 모집단은 2012년 7월 기준으로 시·군·구에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.

(2) 조사 모집단은 시·군·구의 동/읍·면 내 통·반/리의 표본지점을 1차 추출단위로 하며, 선정된 통·반/리의 표본지점 내 주거용 주택(아파트, 일반주택)에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.

나. 표본추출

(1) 1차 추출(표본지점)

통·반/리 내 주택유형별 가구 수를 기준으로 주민등록인구자료와 주택자료를 연계하여 작성된 표본추출틀에서 각 동/읍·면 별로 할당된 표본지점을 추출하는데, 이때 통·반/리를 명칭기준으로 정렬한 후 가구 수 크기를 고려하여 추출확률이 비례하도록 추출하였다.

(2) 2차 추출(표본가구)

표본가구는 표본지점으로 선정된 통·반/리의 가구 수를 파악하여 계통추출법으로 선정하였다. 이때 통·반/리의 규모가 커서 2개 이상의 표본지점이 할당된 경우 표본오차를 최소화하기 위해 표본가구가 가능한 고르게 분포하도록 하였다. 최종적으로 표본지점별로 평균 5개 가구를 표본가구로 선정하였다.

모집단 정의

주민등록기준 만 19세 이상 성인(1993. 7. 31.)

분석 및 층화

동/읍·면, 주택유형별 층화

표본 배분

표본크기 결정

보건소별 평균 900명, 목표오차 $\pm 3\%$

동/읍·면 할당

동/읍·면 최소 1개 이상 표본지점 할당

표본 추출

표본지점 추출

통·반/리 확률비례계통추출(1차 추출)

표본가구 추출

계통추출(2차 추출)

〈그림 4〉 표본선정과정

〈표 3〉 읍·면별 표본지점 분포

읍·면	전체 가구 수			표본지점 수		
	아파트	일반	합계	아파트	일반	합계
읍·면지역	35355	29997	65352	35	43	78
두동면	1	1220	1221	0	2	2
두서면	0	1382	1382	0	2	2
범서읍	16192	2433	18625	14	3	17
삼남면	3086	2577	5663	3	4	7
삼동면	0	737	737	0	1	1
상북면	1099	2131	3230	2	3	5
서생면	227	2655	2882	0	4	4
언양읍	4053	4419	8472	5	6	11
온산읍	2515	4999	7514	3	7	10
온양읍	4587	2776	7363	6	4	10
웅촌면	1174	2051	3225	1	3	4
청량면	2421	2617	5038	1	4	5
합계	35355	29997	65352	35	43	78

조사항목을 1년, 2년, 4년 주기로 구분하여 조사한다.

1기 순환조사에서는 모든 시·군·구에서 동일한 조사문항으로 조사를 실시하여 전국공통지표를 생산하며, 연도주기별 조사항목의 비율은 순서대로 70%, 20%, 10%순이다.

2012년 지역사회건강조사에서는 2010년에 이어 건강검진 및 암 검진 영역이 2년 주기 문항으로 조사되었고, 심폐소생술 관련 심정지 영역이 4년 주기 문항으로 새롭게 추가되어 조사되었다.

구분	주기	1기(2010-2013년) 순환조사			
		N1	N2	N3	N4
전국 공통 지표	1년				
	2년				
	4년				
	4년				

〈그림 5〉 1기(2010-2013년) 순환조사체계

4. 조사방법

가. 조사대상

조사시점에 표본가구에 거주하는 만 19세 이상의 성인(1993년 7월 31일 이전 출생자)이며, 조사단위는 가구(가구조사) 및 가구원(개인조사)이다.

나. 조사기간

조사는 2012년 8월 16일부터 10월 31일까지 이루어졌다.

다. 조사내용

(1) 순환조사

지역사회건강조사에서는 2010년부터 2013년까지 4년을 하나의 조사주기 설정하고 지표의 중요도와 활용성, 표본의 크기 등을 고려하여 각각의

(2) 조사내용

지역사회건강조사의 구성단위는 가구조사와 개인조사이다. 가구조사에서는 표본가구 당 만 19세 이상 성인 1인에게 세대유형, 주택유형, 연간 총 가구소득 등을 조사하고, 개인조사는 가구원 모두에게 건강행태(흡연, 음주, 안전의식, 운동 및 신체활동 등), 예방접종, 이환, 의료이용, 손상, 활동제한 및 삶의 질, 보건기관 이용, 심정지, 교육 및 경제활동을 조사하였다.

2012년 지역사회건강조사 조사표는 17개 영역, 총 253개 문항으로 구성되었으며 이 문항으로부터 197개의 지표를 산출하였다.

2012년 지역사회건강조사 조사영역 및 항목은 다음과 같다.

〈표 4〉 2012년 지역사회건강조사 조사영역 및 항목

영역	조사항목
가구조사	세대 유형, 기초생활수급자 여부, 주택유형, 가구 연간소득, 치매환자 동거여부
건강행태	건강수준, 흡연, 음주, 안전의식, 운동 및 신체활동, 식생활 및 영양, 비만 및 체중조절, 구강건강, 정신건강
건강검진 및 예방접종	인플루엔자 접종여부, 건강검진 수진여부, 건강검진 후 상담여부, 건강검진 미수진 이유, 암 검진 수진여부, 남·녀 암 검진 수진 종류, 암 검진 후 상담 여부, 암 검진 미수진 이유
이환	만성·급성질환 및 사고중독 여부/일수, 평생의 사진단여부, 현재치료여부, 연간 평균 혈압/혈당 측정 측정횟수, 해당질환(고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증) 치료방법 및 약물 복용여부/횟수, 해당질환(고혈압, 당뇨병, 관절염) 증상관리방법 교육장소, 해당질환(고혈압, 당뇨병)으로 인한 의료기관 방문횟수, 당화혈색소 인지 및 검사여부, 뇌졸중 후유증 및 증상별 분포, 골다공증 골절부위, 천식(평상시/운동성) 천식 여부 및 악화여부, 과민성방광 증상, 대사증후군 및 에이즈 인지여부
의료이용	필요의료서비스 미수진 여부 및 사유
사고 및 중독	최근 1년간 손상 발생 여부 및 건수
활동제한 및 삶의 질	와병여부 및 일수, 결근·결석여부 및 일수, EQ-5D, EQ-VAS
보건기관 이용	이용한 보건기관 및 서비스의 종류, 보건기관을 이용한 이유/이용하지 않는 이유, 보건기관의 서비스에 대한 만족도, 고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매에 대한 보건기관 홍보 경험 여부
심정지	심폐소생술 인지여부, 심폐소생술 교육경험, 심폐소생술 마네킹 실습경험, 심폐소생술 시행 능력
교육 및 경제활동	경제활동 여부, 일의 종류, 직업분류, 종사상 지위, 최종학력, 졸업 여부, 민간의료보험 가입여부, 결혼 여부, 현재 혼인상태, 광역 시·도 거주기간, 시·군·구 거주기간

라. 조사방법


지역사회건강조사는 조사원이 표본가구를 방문하여 가구원과 1:1 면접 조사하는 방식으로 진행하였다. 이때 조사원은 시·군·구 보건소 및 책임대학교에서 주관하는 시험전형을 거쳐 선발(보건소당 평균 6명)되어 조사수행전반 및 문항지침에 관한 일련의 교육과정을 통해 훈련된 조사요원이다. 특히, 2010년 이후 전국적으로 노트북에 전자조사표를 탑재하여 조사하는 방식(Computer Assisted Personal Interviewing)을 도입하여 수행 중에 있다.

5. 자료관리

가. 자료입력

2012년 지역사회건강조사에서는 조사원에게 표준화된 조사수행 및 조사문항지침을 전달하고자 전국 18개 지역에서 권역콜센터를 설치하여 운영하였다.

권역콜센터에서는 표본가구 및 가구원 선정, 가구대체, 조사문항, 기타 노트북 관련 질의사항을 처리하고, 담당자는 질의사항 및 조치내역을 웹지원시스템에 일일단위로 등록하여 질병관리본부, CAPI 시스템 및 전산장비대업체 담당자들이 실시간으로 점검하였다.




〈그림 6〉 권역콜센터 운영체제

나. 자료검증

조사가원이 완료한 조사 자료는 질병관리본부 중앙서버로 전송되고, 기본적으로 각 책임대학교 담당자에 의해 웹지원시스템을 통해 실시간으로 점검되었다.

2012년 지역사회건강조사에서는 조사자료 검증 및 조사원 질 관리를 위해 조사완료자 중 10%를 무작위로 추출하여 제3기관을 통한 전화점검을 실시하였다. 전화점검은 조사완료 후 3-4일 이내 실시되고, 그 결과는 웹지원시스템을 통해 제공되어 책임대학교에서는 전화점검 결과에 대한 재확인 절차를 거쳐 최종적으로 조사자료 사용여부를 결정하였다.



〈그림 7〉 전화점검 절차

6. 조사현황

가. 조사현황

조사현황은 <표 5>와 같다. 총 조사가구 수는 464가구였고, 조사완료자 수는 921명이었다. 가구당 평균 1.8명이 조사되었다.

〈표 5〉 조사현황

읍·면	조사가구 수			조사완료자 수(명)		
	아파트	일반	합계	아파트	일반	합계
읍·면지역	248	216	464	503	418	921
두동면	0	10	10	0	17	17
두서면	0	10	10	0	19	19
범서읍	115	15	130	236	27	263
삼남면	20	20	40	42	37	79
삼동면	0	5	5	0	11	11
상북면	10	15	25	15	32	47
서생면	0	20	20	0	40	40
언양읍	30	30	60	66	54	120
온산읍	19	36	55	36	76	112
온양읍	34	20	54	66	38	104
웅촌면	5	15	20	11	27	38
청량면	15	20	35	31	40	71
합계	248	216	464	503	418	921

〈표 6〉 가구당 조사인원 수

	아파트	일반	계
읍·면지역	1.8	1.8	1.8
계	1.8	1.8	1.8

나. 조사가구 및 인구 특성

2012년 지역사회건강조사 대상자의 가구원수는 2명인 경우가 가장 많았고 36.2%, 평균은 2.6명이었다. 조사자의 주거유형은 아파트가 51.7%, 단독주택이 34.5%의 순이었으며, 월 가구소득은 100만원 이하 28.9%로 가장 많았고, 다음이 401만원 이상 22.6%의 순이었다.

성별분포는 남자가 46.4%, 여자가 53.6%이었다. 연령은 40대가 26.4%로 가장 높았고, 다음이 50대 21.5%의 순이었다. 생애주기별 연령은 19-44세가 차지하는 비중이 42.6%, 45-64세가 40.2%이었다. 조사자의 평균연령은 49.1세였다. 결혼은 유배우가 74.6%이고, 교육수준은 고등학교 졸업이 42.8%로 가장 많았고, 다음이 대학교 이상 25.4% 순이었다.

〈표 7〉 2012년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성

(단위 : 명, %)

조사대상 가구특성 (N=464)		
	N	(%)
가구원 수		
1명	82	17.7
2명	168	36.2
3명	92	19.8
4명	90	19.4
5명	28	6.0
6명	4	0.9
7명 이상		
평균(명)	2.6	.
세대유형		
1세대	220	47.4
2세대	220	47.4
3세대	24	5.2
기초생활수급자 여부		
현재 수급자	10	2.2
과거 수급자	2	0.4
미수급자	452	97.4
주거형태		
단독주택	160	34.5
아파트	240	51.7
연립주택	16	3.4
다세대주택	29	6.3
영업용 건물 내 주택	14	3.0
기타	5	1.1
월 가구소득		
100만원 이하	115	28.9
101~200만원	69	17.3
201~300만원	85	21.4
301~400만원	39	9.8
401만원 이상	90	22.6
치매환자 동거가구	1	0.2
거주유형		
읍·면	464	100.0

〈표 8〉 2012년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성

(단위 : 명, %)

조사대상 인구특성(N=921)		
	N	(%)
성별		
남자	427	46.4
여자	494	53.6
연령(10세 간격)		
19-29세	97	10.5
30-39세	159	17.3
40-49세	243	26.4
50-59세	198	21.5
60-69세	103	11.2
70세 이상	121	13.1
평균(세)	49.1	.
연령(생애주기)		
19-44세	392	42.6
45-64세	370	40.2
65-74세	84	9.1
75세 이상	75	8.1
결혼상태		
미혼	114	12.4
유배우	683	74.6
사별, 이혼, 별거	119	13.0
교육수준 ¹⁾		
무학	84	9.1
초등학교	108	11.7
중학교	100	10.9
고등학교	394	42.8
대학교 이상	234	25.4
직업		
전문행정관리직	145	15.8
사무직	92	10.1
판매·서비스직	80	8.7
농림어업	39	4.3
기능단순노무직	200	21.9
기타 ²⁾	359	39.2

1) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

2) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

제 1 부 조사체계

Ⅱ. 통계 추정방법

1. 가중치의 사용
2. 자료처리
3. 분산추정

II. 통계 추정방법

1. 가중치의 사용

가. 소개

2012년 지역사회건강조사는 표본설계를 통하여 추출한 표본을 조사하여 설계 구조를 바탕으로 가중치를 부여함으로써 모집단의 건강수준 등을 추정하였다.

나. 가중치 산출 과정

가중치는 가구별 분석을 위한 가구가중치와 개인별 분석을 위한 개인가중치로 분류된다. 가구가중치는 가구추출률과 조사적격 가구율을 반영하였고, 개인가중치는 가구가중치에 개인 응답률을 반영하였다. 추정에 쓰이는 보정가중치는 개인가중치를 성별, 연령별 인구구조(2012년 7월 주민등록 인구)와 같도록 보정하여 산출하였다.

설계가중치	벤치마킹 가중치
가구가중치 → 개인가중치 → 보정가중치 · 가구추출률 · 조사적격가구율 · 주택유형별 가구 비율	· 성별·연령별 인구보정 - 성별 : 남, 여 - 연령별 : 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+ · 주민등록인구 기준 (2012.07)

〈그림 8〉 가중치 산출 과정

(1) 가구가중치

- 표본설계의 표본추출과정을 고려한 가구추출

률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율을 반영한 가중치

$$W_{hi} = \frac{M_{hi}}{n_{hi}} = \frac{e_{hi} \cdot N_{hi}}{n_{hi}}$$

- N_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 가구 수
- M_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 적격가구 수
- n_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사가구 수
- e_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사적격 가구율

〈표 9〉 가구가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①②의 가구 수(③)	(2,620)
①②의 조사된 가구 수(④)	(7)
①②의 조사접촉 가구 수(⑤)	(9)
①②의 조사적격 가구 수(⑥)	(8)
가구가중치(⑦) = ③ ÷ ④ × ⑥ ÷ ⑤	(332,698 = 2620/7 × 8/9)
전체 가구가중치 합(⑧)	(8569,456)
전체 ②의 가구 수 합(⑨)	(10,356)
가구가중치 보정(⑩) = ⑦ × (⑨/⑧)	(402,0583 = 332,698 × 10,356 / 8569,456)

(2) 개인가중치

- 가구가중치에 개인 응답률을 반영한 가중치

$$W_{hjk} = W_{hjk} \times \frac{P_{hjk}}{p_{hjk}}$$

- h : 읍·면/동, j : 표본지점
- k : 가구, l : 가구원
- P_{hjk} : 가구내 만 19세 이상 가구원수
- p_{hjk} : 가구내 만 19세 이상 조사 가구원수

〈표 10〉 개인가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①②의 가구가중치(③)	(402.0583)
만 19세 이상 가구원수(④)	(4)
만 19세 이상 조사 가구원수(⑤)	(3)
개인가중치(⑥=③×④/⑤)	(536.0777=402.0583×4/3)

(3) 보정가중치

- 2012년 7월 주민등록인구 기준으로 성별, 연령별 인구구조를 보정한 가중치

$$- W'_{ijkl} = BF_d \cdot W_{ijkl}$$

$$- BF_d = \frac{d(\text{성별} \cdot \text{연령대별}) \text{ 주민등록인구수}}{\sum_i \sum_j \sum_k W_{ijkl} I_{d \in \text{성별} \cdot \text{연령대별}}}$$

〈표 11〉 보정가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①②의 개인가중치(③)	(536.0777)
주민등록인구(④)	(14,693)
성·연령별 개인가중치 합(⑤)	(12,157.23)
성·연령별 보정비(⑥=④/⑤)	(1.208=14,693/12,157.23)
보정가중치(⑦=③×⑥)	(647.89=536.0777×1.208)

(4) 가중치의 이상치 제거

특정 조사대상자의 개인가중치가 다른 조사대상자의 개인가중치보다 월등히 클 경우, 해당 조사대상자의 응답값에 의해 조사결과에 바이어스(bias, 편향성)가 생길 수 있으므로 보정가중치의 이상치를 Raking Ratio 방법으로 제거하여 재보정하였다.

$Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 보다 큰 가중치는 이상치로 정의하였으며, $Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 로 변경하였다.

$$- IQR: Q_3(W') - Q_1(W')$$

$$- Q_1(W') : \text{가중치 중 1사분위수}$$

$$- Q_3(W') : \text{가중치 중 3사분위수}$$

2. 자료처리

가. 무응답처리

무응답은 대체하지 않았으며 지표 산출 시 제외하였다. 무응답은 개체 무응답과 항목 무응답으로 구분한다.

개체 무응답은 조사에 참여하지 않음으로써 모든 문항에 대해 발생한 결측치를 의미하고, 항목 무응답은 조사에 참여한 대상자가 일부항목에 응답하지 않아 발생한 결측치이다.

나. 사회경제적 특성분류

(1) 연령

연령은 2012년 8월 1일 기준으로 만 연령을 정의하였다. 연령분류는 10세 단위로 “19-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60-69세, 70세 이상”으로 분류하였고, 생애주기별로는 “19-44세, 45-64세, 65-74세, 75세 이상”으로 분류하였다.

(2) 교육수준

교육수준은 <교육 및 경제활동> 영역에서 교육 정도와 졸업여부 2개 문항으로 조사하고 있으며 최종 교육수준은 두 문항을 조합하여 “무학, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 이상”으로 구분하였다. 졸업여부가 ‘졸업’인 경우만 해당 교육수준을 의미하며 졸업여부가 ‘수료, 중퇴, 재학/휴학’인 경우에는 이전 정도의 교육수준으로 분류하였다.

〈표 12〉 교육수준분류

교육수준	졸업여부	분류
무학	-	무학
서당/한학	-	
초등학교	졸업	초등학교
중학교	졸업	중학교
고등학교	졸업	고등학교
2년/3년제 대학	졸업	대학교 이상
4년제 대학	졸업	
대학원 이상	전체	

(3) 직업

직업분류는 통계청 한국표준직업분류(KSCO, 제6차 개정)의 대분류 직업군에서 유사한 직업분류를 묶어서 6개 직업군으로 분류하였다.

〈표 13〉 직업분류

제6차 한국표준직업분류	직업분류 재구분
관리자	전문행정관리
전문가 및 관련 종사자	
사무 종사자	사무직
서비스 종사자	판매·서비스직
판매 종사자	
농업, 임업 및 어업숙련 종사자	농림어업
기능원 및 관련 기능 종사자	기능단순노무직
장치, 기계조작 및 조립 종사자	
단순노무 종사자	
군인	기타
학생	
주부	
무직	

(4) 월가구소득

소득수준은 〈가구조사〉 영역에서 기준기간(연/월)과 소득액으로 조사하였다. 기준기간이 ‘연’인 경우 월단위로 환산 후 “100만원 이하, 101-200만원, 201-300만원, 301-400만원, 401만원 이상”의 5개 그룹으로 분류하였다.

(5) 거주유형

거주유형은 “동과 읍·면”으로 구분하였다.

3. 분산추정

지역사회건강조사에서는 모집단의 특성을 추정하기 위해 가중치를 적용한 표본가중평균을 제시하였다.

표본조사로 모집단의 특성을 추정할 때 일반적으로 표본오차(sampling error) 및 비표본오차(non-sampling error)가 수반된다. 표본오차는 표본이 모집단의 특성과 어긋나는 정도를 나타내며, 비표본오차는 표본추출과정을 제외한 자료수집 과정이나 분석 과정에서 발생하는 오류를 말한다. 표준오차(standard error)로 표현되는 표본오차는 추정치의 신뢰도에 대한 척도가 되며 분산추정에 의해 측정할 수 있다. 울산광역시 울주군 지역사회건강조사는 SAS 9.1을 활용하여 분산을 추정하였다.

• 표본가중평균

$$\hat{Y} = \frac{\left(\sum_h \sum_j \sum_k \sum_l W_{h j k l} y_{h j k l} \right)}{W_{....}}$$

- h : 동/읍·면, j : 표본지점
- k : 가구, l : 가구원
- $W_{....} = \sum_{h=1} \sum_{j=1} \sum_{k=1} \sum_{l=1} W_{h j k l}$: 가중치 계
- $y_{h j k l}$: 해당 문항의 응답값

• 표본오차

$$SE(\hat{Y}) = \sqrt{\sum_{h=1} \sum_{j=1} \frac{n_{hj}(1-f_{hj})}{n_{hj}-1} \sum_{k=1}^{n_{hj}} (e_{hjk} - \bar{e}_{hj.})^2}$$

$$\text{여기서 } e_{hjk} = \frac{\left(\sum_{l=1} W_{h j k l} (y_{h j k l} - \hat{Y}) \right)}{W_{....}} \text{이고,}$$


$$\bar{e}_{hj.} = \left(\sum_{k=1} e_{hjk} \right) / n_{hj} \text{이다.}$$

• 변동계수

$$cv(\hat{Y}) = \frac{SE(\hat{Y})}{\hat{Y}}$$

:: 제2부 주요통계결과

- I. 건강행태
- II. 건강검진 및 예방접종
- III. 이환 및 의료이용
- IV. 사고 및 중독
- V. 활동제한 및 삶의 질
- VI. 보건기관 이용
- VII. 심정지



제 2 부 주요통계결과

I. 건강행태

1. 흡연
2. 음주
3. 안전의식
4. 운동 및 신체활동
5. 식생활 및 영양
6. 비만 및 체중조절
7. 구강건강
8. 정신건강

I. 건강행태

1. 흡연

년 21.0세, 2010년 20.2세, 2011년 20.2세로 증감을 반복하였으나 차이가 없었다.

가. 현재흡연율

- 평생 5갑(100개비)이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자 (“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--

- 현재흡연율은 2012년 전체 24.3%로, 전년 24.3% 같았으며, 울산광역시 24.0%에 비해 0.3%p 높았다. 2008년 25.5%, 2009년 29.0%, 2010년 25.3%, 2011년 24.3%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 45.4%, 여자 2.3%로 남자에서 높았다. 연령별로는 30대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.

다. 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량

- 평생 담배 5갑(100개비)이상 흡연한 사람으로서 매일 흡연하는 사람의 하루 평균 흡연량으로 정의한다.

$\frac{\text{평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 매일 흡연자의 하루 평균 흡연개비 수의 총 합}}{\text{평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일 흡연자 수}}$


- 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량은 2012년 전체 17.2개비이고, 남자 17.4개비이다. 연령별로는 50대에서 가장 높았고, 6,70대에서 가장 낮았다.

나. 흡연시작연령


- 처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이로 정의한다.

$\frac{\text{처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이의 총 합}}{\text{평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자 수}}$
--


- 흡연시작연령은 2012년 20.4세로, 전년 20.2세 대비 0.2세 증가하였으며, 울산광역시 20.3세에 비해 0.1세 높았다. 2008년 21.1세, 2009



〈그림 9〉 현재흡연율



〈그림 10〉 흡연시작연령



〈그림 11〉 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량

라. 금연

(1) 흡연자의 금연시도율

- 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)중 최근 1년(365일) 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 1년(365일) 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수} \times 100}{\text{현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수}}$
--


- 흡연자의 금연시도율은 2012년 전체 18.1%로, 전년 27.8% 대비 9.7%p 감소하였으며, 울산광역시 30.9%에 비해 12.8%p 낮았다. 2010년 22.7%, 2011년 27.8%로 지난 3년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 17.4%였다. 연령별로는 30대에서 가장 높았고, 20대, 6, 70대 이상에서 낮았다.

(2) 흡연자의 1개월 내 금연계획률


- 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)중 1개월(30일) 내 금연계획이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 중 1개월(30일) 내 금연계획이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수}}$
--

- 흡연자의 1개월 내 금연계획률은 2012년 전체 4.6%로, 전년 3.9% 대비 0.7%p 증가하였으며, 울산광역시 5.8%에 비해 1.2%p 낮았다. 2010년 4.2%, 2011년 3.9%로 지난 3년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 4.5%였다. 연령별로는 40대에서 가장 높았고, 연령이 증가 할수록 감소하는 추세이다.



〈그림 12〉 흡연자의 금연시도율



〈그림 13〉 흡연자의 1개월 내 금연계획률

(3) 금연캠페인 경험률

- 최근 1년(365일) 동안 금연에 대한 공익 광고(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 금연에 대한 공익 광고(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적이 있다고 응답한 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 금연캠페인 경험률은 2012년 전체 66.4%로, 전년 88.4% 대비 22.0%p 감소하였으며, 울산광역시 83.2%에 비해 16.8%p 낮았다. 2008년 70.8%, 2009년 85.3%, 2010년 84.3%, 2011년 88.4%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 68.4%, 여자 64.3%로 남자에서 높았다. 연령별로는 30대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.

(4) 금연교육 경험률

- 최근 1년(365일) 동안 흡연예방 및 금연교육을 받은 경험이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 × 100


조사대상 응답자 수

- 금연교육 경험률은 2012년 전체 3.3%로, 전년 6.4% 대비 3.1%p 감소하였으며, 울산광역시 6.0%에 비해 2.7%p 낮았다. 2008년 1.8%, 2009년 5.3%, 2010년 5.2%, 2011년 6.4%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 4.5%, 여자 2.0%로 남자에서 높았다. 연령별로는 40대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.


최근 1년(365일) 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 × 100

현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수


- 현재 흡연자의 금연교육 경험률은 2012년 전체 3.0%로, 전년 8.6% 대비 5.6%p 감소하였으며, 울산광역시 11.8%에 비해 8.8%p 낮았다. 2008년 4.8%, 2009년 7.3%, 2010년 9.6%, 2011년 8.6%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 3.1%였다.



〈그림 14〉 금연캠페인 경험률



〈그림 15〉 금연교육 경험률



〈그림 16〉 현재 흡연자의 금연교육 경험률

2. 음주

가. 월간음주율

- 최근 1년(365일) 동안 한 달(30일)에 1회 이상 음주한 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 한 달(30일)에 1회 이상 술을 마신 적이 있다고 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 월간음주율은 2012년 전체 50.2%로, 전년 54.3% 대비 4.1%p 감소하였으며, 울산광역시 61.2%에 비해 11.0%p 낮았다. 2008년 59.6%, 2009년 52.7%, 2010년 56.4%, 2011년 54.3%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 66.0%, 여자 33.7%로 남자에서 높았다. 연령별로는 30대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.

나. 음주시작연령

- 처음으로 술 1잔을 모두 마신 적이 있는 사람의 만 나이로 정의한다.

처음으로 술 1잔을 모두 마신 만 나이의 총 합
1잔 이상의 술을 마신 음주자 수

- 음주시작연령은 2012년 21.9세로, 전년 20.9세 대비 1.0세 증가하였으며, 울산광역시 21.3세에 비해 0.6세 높았다. 2008년 22.1세, 2009년 21.6세, 2010년 21.6세, 2011년 20.9세로 지난 5년간 크게 변동이 없는 추세이다. 성별로는 남자 19.4세, 여자 25.3세로 여자에서 높았다.


다. 고위험음주율¹⁾

- 최근 1년(365일) 동안 음주한 사람 중에서 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상, 여자는 5잔 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.


최근 1년(365일) 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 × 100
최근 1년(365일) 동안 음주한 사람의 수

- 고위험음주율은 2012년 전체 15.0%로, 전년 16.4% 대비 1.4%p 감소하였으며, 울산광역시 17.3%에 비해 2.3%p 낮았다. 2008년 17.0%, 2009년 18.0%, 2010년 13.6%, 2011년 16.4%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 20.7%, 여자 7.1%로 남자에서 높았다. 연령별로는 60대에서 가장 높았고, 20대에서 낮았다.


1) 2008년 지표정의 : 한 번의 술좌석에서 남자는 7잔 또는 맥주 5캔(여자의 경우 5잔 또는 맥주 3캔 정도) 이상을 한 달(30일) 동안 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 사람의 수*100 / 조사대상자 중 최근 1년간 음주한 사람의 수



〈그림 17〉 월간음주율



〈그림 18〉 음주시작연령



〈그림 19〉 고위험음주율

라. 정상음주, 문제음주, 알코올의존 I 및 알코올의존 II²⁾

(1) 정상음주율

- AUDIT 10문항에서 총점 0-7점에 해당하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

AUDIT 점수 총합이 0-7점에 해당하는 사람의 수 × 100
지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 사람의 수

- 정상음주율은 2012년 전체 69.7%로, 2010년 69.9% 대비 0.2%p 감소하였으며, 울산광역시 64.4%에 비해 5.2%p 높았다. 2008년 69.2%, 2009년 70.9%, 2010년 69.9%로 지난 4년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 55.3%, 여자 88.8%로 여자에서 높았다.

(2) 문제음주율

- AUDIT 10문항에서 총점 8-15점에 해당하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

AUDIT 점수 총합이 8-15점에 해당하는 사람의 수 × 100
지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 사람의 수

- 문제음주율은 2012년 전체 21.4%로, 2010년 21.1% 대비 0.3%p 증가하였으며, 울산광역시 26.3%에 비해 4.9%p 낮았다. 2008년 23.7%, 2009년 20.8%, 2010년 21.1%로 지난 4년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자

29.8%, 여자 10.1%로 남자에서 높았다.

(3) 알코올의존율 I

- AUDIT 10문항에서 총점 16-19점에 해당하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

AUDIT 점수 총합이 16-19점에 해당하는 사람의 수 × 100
지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 사람의 수

- 알코올의존율 I 은 2012년 전체 4.8%로, 2010년 5.3% 대비 0.5%p 감소하였으며, 울산광역시 5.6%에 비해 0.8%p 낮았다. 2008년 4.1%, 2009년 4.0%, 2010년 5.3%로 지난 4년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 8.1%, 여자 0.3%로 남자에서 높았다.


(4) 알코올의존율 II

- AUDIT 10문항에서 총점 20점 이상인 사람의 분율(%)로 정의한다.


AUDIT 점수 총합이 20점 이상에 해당하는 사람의 수 × 100
지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 사람의 수

- 알코올의존율 II는 2012년 전체 4.1%로, 2010년 3.6% 대비 0.5%p 증가하였으며, 울산광역시 3.7%에 비해 0.4%p 높았다. 2008년 2.9%, 2009년 4.3%, 2010년 3.6%로 지난 4년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 6.7%, 여자 0.7%로 남자에서 높았다.

1. 술을 얼마나 자주 마십니까?
2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까? (소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다.)
3. [남자]한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?
3. [여자]한 번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?
4. 최근 1년 동안 일단 술을 마시기 시작하면 자제가 안 된 적이 있습니까?
5. 최근 1년 동안 음주 때문에 일상생활에 지장을 받은 적이 있습니까?
6. 최근 1년 동안 과음 후 다음 날 정신을 차리기 위해 해장술을 마신 적이 있습니까?
7. 최근 1년 동안 술을 마신 후 다음 날 술을 마신 것에 대해 후회한 적이 있습니까?
8. 최근 1년 동안 술이 깬 후에 술 취했을 때의 일을 기억할 수 없었던 적이 있습니까?
9. 본인의 음주로 인해 자신이 다치거나, 가족이나 다른 사람을 다치게 한 적이 있습니까?
10. 본인이 술을 마시는 것에 대하여 가족이나 의사가 걱정을 하거나, 술을 끊거나 줄이라는 권고를 한 적이 있습니까?



〈그림 20〉 정상음주율, 문제음주율, 알코올의존율 I, 알코올의존율 II (2012)



〈그림 21〉 정상음주율, 문제음주율, 알코올의존율 I, 알코올의존율 II (연도비교)

3. 안전의식

가. 운전 시 안전벨트 착용률

- 자동차 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 비율(%)로 정의한다.

자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 × 100
자동차 운전자 수

- 자동차 운전 시 안전벨트 착용률은 2012년 전체 77.4%로, 전년 88.3% 대비 10.9%p 감소하였으며, 울산광역시 83.0%에 비해 5.6%p 낮았다. 2008년 95.4%, 2009년 80.5%, 2010년 84.6%, 2011년 88.3%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 72.8%, 여자 86.1%로 여자에서 높았다. 연령별로는 60대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.

나. 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률

- 다른 사람이 운전하는 자동차의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 비율(%)로 정의한다.

다른 사람이 운전하는 자동차의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 × 100
동승차량 앞좌석 탑승자 수


- 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률은 2012년 전체 76.7%로, 전년 85.1% 대비 8.4%p 감소하였으며, 울산광역시 77.5%에 비해 0.8%p 낮았다. 2008년 83.1%, 2009년 75.2%, 2010년 80.3%, 2011년 85.1%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 71.8%, 여자 83.0%로 여자에서 높았다. 연령별로는 60대에서 가장 높았고, 20대에서 낮았다.

다. 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)


- 최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 수 × 100
자동차 또는 오토바이 운전자 수


- 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)은 2012년 전체 11.9%로, 전년 12.7% 대비 0.8%p 감소하였으며, 울산광역시 9.6%에 비해 2.3%p 높았다. 2009년 15.2%, 2010년 12.5%, 2011년 12.7%로 지난 4년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 15.0%, 여자 5.9%로 남자에서 높았다. 연령별로는 60대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.



〈그림 22〉 운전 시 안전벨트 착용률



〈그림 23〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률



〈그림 24〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)

4. 운동 및 신체활동

가. 신체활동 실천율

(1) 격렬한 신체활동 실천율

- 최근 1주일(7일) 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 격렬한 신체활동 실천율은 2012년 전체 14.4%로, 전년 11.2% 대비 3.2%p 증가하였으며, 울산광역시 11.5%에 비해 2.9%p 높았다. 2009년 11.9%, 2010년 9.1%, 2011년 11.2%로 지난 4년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 17.8%, 여자 10.9%로 남자에서 높았다. 연령별로는 50대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.

(2) 중등도 신체활동 실천율

- 최근 1주일(7일) 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 중등도 신체활동 실천율은 2012년 전체 13.1%로, 전년 13.6% 대비 0.5%p 감소하였으며, 울산광역시 10.1%에 비해 3.0%p 높았다. 2009년 18.6%, 2010년 13.1%, 2011년 13.6%로 지난 4년간 증감을 반복하는 추세

다. 성별로는 남자 17.6%, 여자 8.3%로 남자에서 높았다. 연령별로는 40대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.


(3) 중등도 이상 신체활동 실천율³⁾

- 최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람 또는 최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 비율(%)로 정의한다.


최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 중등도 이상 신체활동 실천율은 2012년 전체 21.8%로, 전년 22.2% 대비 0.4%p 감소하였으며, 울산광역시 19.2%에 비해 2.6%p 높았다. 2009년 27.4%, 2010년 21.0%, 2011년 22.2%로 지난 4년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 28.2%, 여자 15.2%로 남자에서 높았다. 연령별로는 50대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.


3) 2008년 지표정의 : 최근 1주일 동안 신체활동을 1회 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람 수×100 / 조사대상 인구 수



〈그림 25〉 격렬한 신체활동 실천율



〈그림 26〉 중등도 신체활동 실천율




〈그림 27〉 중등도 이상 신체활동 실천율

나. 걷기 실천율

- 최근 1주일(7일) 동안 걷기를 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1주일(7일) 동안 걷기를 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 걷기 실천율은 전체 41.3%로, 전년 41.7% 대비 0.4%p 감소하였으며, 울산광역시 42.6%에 비해 1.3%p 낮았다. 2008년 46.5%, 2009년 47.4%, 2010년 43.5%, 2011년 41.7%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 42.6%, 여자 39.9%로 남자에서 높았다. 연령별로는 60대에서 가장 높았고, 30대에서 낮았다.



〈그림 28〉 걷기 실천율

5. 식생활 및 영양


가. 저염선풀율

- 평소 식습관, 조리음식 등에서 저염식을 선호하는 사람의 분율(%)로 정의한다. 저염선풀율은 제시된 3가지의 문항 중 한 가지만 선택한 경우를 Type I, 두 가지를 선택한 경우를 Type II, 그리고 세 가지 모두를 선택한 경우를 Type III로 구분한다.


- ① 평소 음식을 먹을 때 “약간 싱겁게 먹는다” 또는 “아주 싱겁게 먹는다”에 응답한 사람의 수 또는,
- ② 조리된 음식을 먹을 때 소금이나 간장을 “전혀 더 넣지 않는다”에 응답한 사람의 수 또는,
- ③ 전, 부침, 튀김 등을 먹을 때 간장에 “찍어 먹지 않는다”에 응답한 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 저염선풀율 Type I 은 2012년 전체 34.5%로, 전년 41.6% 대비 7.1%p 감소하였으며, 울산광역시 45.6%에 비해 11.1%p 낮았다. 2008년 37.9%, 2009년 42.9%, 2010년 47.5%, 2011년 41.6%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 36.1%, 여자 32.7%로 남자에서 높았다.
- 저염선풀율 Type II 는 2012년 전체 30.7%로, 전년 21.0% 대비 9.7%p 증가하였으며, 울산광역시 28.1%에 비해 2.6%p 높았다. 2008년 24.6%, 2009년 26.1%, 2010년 24.9%, 2011년 21.0%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 27.2%, 여자 34.4%로 여자에서 높았다.
- 저염선풀율 Type III 는 2012년 전체 14.0%로, 전년 9.5% 대비 4.5%p 증가하였으며, 울산광역시 10.8%에 비해 3.2%p 높았다. 2008년 11.6%, 2009년 7.1%, 2010년 9.2%, 2011년 9.5%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 13.0%, 여자 15.0%로 여자에서 높았다.



〈그림 29〉 저염선호율(2012)



〈그림 30〉 저염선호율(연도비교)

나. 가공식품 선택 시 영양표시 이용률

- 가공식품 선택 시 영양표시를 읽는 사람의 비율(%)로 정의한다.

영양표시를 “항상 읽는다” 또는 “가끔 읽는다”라고 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 가공식품 선택 시 영양표시 이용률은 2012년 전체 30.6%로, 전년 34.5% 대비 3.9%p 감소하였으며, 울산광역시 32.3%에 비해 1.7%p 낮았다. 2009년 34.8%, 2010년 33.5%, 2011년 34.5%로 지난 4년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 18.6%, 여자 43.2%로 여자에서 높았다. 연령별로는 30대에서 가장 높았고, 60대에서 낮았다.

다. 영양교육 및 상담수혜율

- 최근 1년(365일) 동안 영양교육이나 상담을 받아 본 경험이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 영양교육 및 상담을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 영양교육 및 상담수혜율은 2012년 전체 3.9%로, 전년 2.6% 대비 1.3%p 증가하였으며, 울산광역시 2.5%에 비해 1.4%p 높았다. 2009년 4.6%, 2010년 2.3%, 2011년 2.6%로 지난 4년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 1.9%, 여자 5.9%로 여자에서 높았다. 연령별로는 30대에서 가장 높았고, 60대에서 낮았다.

라. 식품 안정성 확보율


- 최근 1년(365일) 동안 가구 식생활 형편을 물었을 때 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었거나 혹은 충분한 양이지만 다양하지 못한 음식을 먹은 사람의 비율(%)로 정의한다.

“우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다” 혹은 “우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다”라고 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 식품 안정성 확보율은 2012년 전체 92.6%로, 전년 97.9% 대비 5.3%p 감소하였으며, 울산광역시 97.0%에 비해 4.4%p 낮았다. 2008년 93.4%, 2009년 96.9%, 2010년 97.8%, 2011년 97.9%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 93.0%, 여자 92.2%로 남자에서 높았다.



〈그림 31〉 가공식품 선택 시 영양표시 이용률



〈그림 32〉 영양교육 및 상담수혜율



〈그림 33〉 식품 안정성 확보율

6. 비만 및 체중조절

가. 비만을

- 체질량지수(체중(kg)/신장²(m²)) 25 이상인 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\text{체질량지수(kg/m}^2\text{)} \geq 25 \text{ 인 사람의 수} \times 100$
조사대상 응답자 수

- 비만율은 2012년 전체 23.7%로, 전년 20.6% 대비 3.1%p 증가하였으며, 울산광역시 23.6%에 비해 0.1%p 높았다. 2008년 23.5%, 2009년 24.3%, 2010년 22.2%, 2011년 20.6%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 27.2%, 여자 19.8%로 남자에서 높았다. 연령별로는 40대에서 가장 높았고, 20대에서 낮았다.

나. 주관적 비만인지를

- 주관적으로 “약간 비만” 또는 “매우 비만”이라고 생각하는 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\text{“약간 비만” 또는 “매우 비만”이라고 응답한 사람의 수} \times 100$
조사대상 응답자 수


- 주관적 비만인지는 2012년 전체 31.8%로, 전년 32.1% 대비 0.3%p 감소하였으며, 울산광역시 37.4%에 비해 5.6%p 낮았다. 2008년 32.2%, 2009년 34.8%, 2010년 33.9%, 2011년 32.1%로 지난 5년간 증감을 반복하였다. 성별로는 남자 26.2%, 여자 37.6%로 여자에서 높았다. 연령별로는 40대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.

다. 체중조절 시도율


- 최근 1년(365일) 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 1년(365일) 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$


- 체중조절 시도율은 2012년 전체 35.1%로, 전년 51.9% 대비 16.8%p 감소하였으며, 울산광역시 53.5%에 비해 18.4%p 낮았다. 2008년 34.0%, 2009년 47.0%, 2010년 40.0%, 2011년 51.9%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 26.8%, 여자 43.7%로 여자에서 높았다. 연령별로는 40대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.



〈그림 34〉 비만율



〈그림 35〉 주관적 비만인지를



〈그림 36〉 체중조절 시도율

7. 구강건강

가. 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

- 주관적으로 구강건강이 나쁘다고 인식하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--


- 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 2012년 전체 36.9%로, 전년 35.4% 대비 1.5%p 증가하였으며, 울산광역시 31.4%에 비해 5.5%p 높았다. 2008년 41.2%, 2009년 42.2%, 2010년 40.5%, 2011년 35.4%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 35.6%, 여자 38.3%로 여자에서 높았다. 연령별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 연령이 증가 할수록 높아지는 추세이다.

나. 저작불편호소율(65세 이상)


- 65세 이상 노인의 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{“매우 불편” 또는 “불편”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{65세 이상 조사대상 응답자 수}}$

- 65세 이상 노인의 저작불편호소율은 2012년 전체 48.6%로, 전년 58.7% 대비 10.1%p 감소하였으며, 울산광역시 44.6%에 비해 4.0%p 높았다. 2008년 52.3%, 2009년 55.6%, 2010년 55.6%, 2011년 58.7%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 52.1%, 여자 46.3%로 남자에서 높았다.



〈그림 37〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율




〈그림 38〉 저작불편호소율(65세 이상)

다. 틀니 이용 행태(65세 이상)


- 65세 이상 노인의 틀니 이용 행태별 분율(%)로 정의한다.

틀니 이용 행태별 사람의 수 × 100
65세 이상 조사대상 응답자 수

- 65세 이상 노인의 틀니 이용 행태에서 위아래 둘다 있음은 2012년 전체 45.4%로, 전년 56.5% 대비 11.1%p 증가하였으며, 울산광역시 34.7%에 비해 10.7%p 높았다. 2008년 42.0%, 2009년 47.3%, 2010년 45.8%, 2011년 56.5%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 46.3%, 여자 44.8%로 남자에서 높았다.
- 65세 이상 노인의 틀니 이용 행태에서 위쪽만 있음은 2012년 전체 3.3%로, 전년 2.5% 대비 0.8%p 증가하였으며, 울산광역시 8.3%에 비해 5.0%p 낮았다. 2008년 5.7%, 2009년 7.9%, 2010년 8.4%, 2011년 2.5%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 1.4%, 여자 4.5%로 여자에서 높았다.
- 65세 이상 노인의 틀니 이용 행태에서 아래쪽만 있음은 2012년 전체 1.2%로, 전년 1.9% 대비 0.7%p 감소하였으며, 울산광역시 5.7%에 비해 4.5%p 낮았다. 2008년 2.4%, 2009년 4.1%, 2010년 6.5%, 2011년 1.9%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 1.4%, 여자 1.0%로 남자에서 높았다.



〈그림 39〉 틀니 이용 행태(65세 이상) (2012)



〈그림 40〉 틀니 이용 행태(65세 이상) (연도비교)

라. 점심식사 후 칫솔질 실천율

- 점심식사 후 칫솔질 한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\text{점심식사 후 칫솔질 한 사람의 수} \times 100$
점심식사 한 사람의 수

- 점심식사 후 칫솔질 실천율은 2012년 전체 57.7%로, 전년 50.1% 대비 7.6%p 증가하였으며, 울산광역시 62.7%에 비해 5.0%p 낮았다. 2010년 55.6%, 2011년 50.1%로 지난 3년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 50.1%, 여자 65.7%로 여자에서 높았다. 연령별로는 30대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.

바. 연간 스케일링 경험률

- 최근 1년(365일) 동안 스케일링을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\text{최근 1년(365일) 동안 스케일링을 받은 사람의 수} \times 100$
조사대상 응답자 수


- 연간 스케일링 경험률은 2012년 전체 22.4%로, 전년 26.4% 대비 4.0%p 감소하였으며, 울산광역시 28.1%에 비해 5.7%p 낮았다. 2008년 11.7%, 2009년 28.0%, 2010년 26.9%, 2011년 26.4%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 23.0%, 여자 21.7%로 남자에서 높았다. 연령별로는 40대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.

마. 구강검진 수진율


- 최근 1년(365일) 동안 치료목적이 아닌 순수 검진 목적으로 구강검진을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\text{최근 1년(365일) 동안 구강검진을 받은 사람의 수} \times 100$
조사대상 응답자 수


- 구강검진 수진율은 2012년 전체 35.9%로, 전년 34.8% 대비 1.1%p 증가하였으며, 울산광역시 43.6%에 비해 7.7%p 낮았다. 2008년 8.4%, 2009년 18.8%, 2010년 32.1%, 2011년 34.8%로 지난 5년간 증가하는 추세이다. 성별로는 남자 37.8%, 여자 33.9%로 남자에서 높았다. 연령별로는 40대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.



〈그림 41〉 점심식사 후 첫술질 실천율



〈그림 42〉 구강검진 수진율



〈그림 43〉 연간 스케일링 경험율

8. 정신건강

자에서 높았다. 연령별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 20대 에서 낮았다.

가. 스트레스 인지율

- 평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이” 또는 “많이” 느끼는 사람의 비율(%)로 정의한다.

평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다”
또는 “많이 느낀다”에 응답한 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 스트레스 인지율은 2012년 전체 33.9%로, 전년 21.4% 대비 12.5%p 증가하였으며, 울산광역시 24.5%에 비해 8.6%p 높았다. 2008년 26.4%, 2009년 24.9%, 2010년 26.0%, 2011년 21.4%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 37.3%, 여자 30.3%로 남자에서 높았다. 연령별로는 30대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.


나. 우울감 경험률

- 최근 1년(365일) 동안 연속적으로 2주(14일) 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 비율(%)로 정의한다.


최근 1년(365일) 동안 연속적으로 2주(14일) 이상
일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을
경험한 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 우울감 경험률은 2012년 전체 3.8%로, 전년 5.4% 대비 1.6%p 감소하였으며, 울산광역시 3.0%에 비해 0.8%p 높았다. 2008년 5.9%, 2009년 7.6%, 2010년 7.0%, 2011년 5.4%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 2.6%, 여자 5.1%로 여



〈그림 44〉 스트레스 인지율



〈그림 45〉 우울감 경험률

제 2 부 주요통계결과

Ⅱ. 건강검진 및 예방접종

1. 건강검진 수진율
2. 암 검진율
3. 연간 인플루엔자 예방접종률

Ⅱ. 건강검진 및 예방접종

1. 건강검진 수진율⁴⁾

- 최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 2년 동안 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 건강검진 수진율은 2012년 전체 66.6%이며, 성별로는 남자 71.6%, 여자 61.4%로 남자에서 높았다. 연령별로는 50대에서 가장 높았고, 20대에서 가장 낮았다.

2. 암 검진율

- 최근 2년간 암 검진을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 2년간 암 검진을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 암 검진율은 2012년 전체 36.0%이며, 성별로는 남자 31.1%, 여자 41.1%로 여자에서 높았다. 연령별로는 50대에서 가장 높았고, 20대에서 가장 낮았다.


3. 연간 인플루엔자 예방접종률

- 최근 1년(365일) 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.


최근 1년(365일) 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 연간 인플루엔자 예방접종률은 2012년 전체 41.0%로, 전년 32.9% 대비 8.1%p 증가하였으며, 울산광역시 36.2%에 비해 4.8%p 높았다. 2008년 30.0%, 2009년 29.2%, 2010년 28.1%, 2011년 32.9%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 36.0%, 여자 46.3%로 남자에서 높았다. 연령별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 20대에서 낮았다.


4) 2008, 2009년 지표정의 : 최근 2년 동안 건강검진을 받은 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수



〈그림 46〉 건강검진 수진율



〈그림 47〉 암 검진율



〈그림 48〉 연간 인플루엔자 예방접종률

제 2 부 주요통계결과

Ⅲ. 이환 및 의료이용

1. 만성·급성질환 및 사고중독 경험률
2. 연간 평균 혈압 측정횟수
3. 연간 평균 혈당 측정횟수
4. 주요 질환별 평생 의사진단 경험률 및 관리행태
5. 질환별 인지율
6. 의료이용

Ⅲ. 이환 및 의료이용

1. 만성·급성질환 및 사고중독 경험률

- 최근 2주(14일) 동안 만성·급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 2주(14일) 동안 만성·급성질환 및
사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을
느꼈던 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 만성·급성질환 및 사고중독 경험률은 2012년 전체 14.6%로, 전년 18.9% 대비 4.3%p 감소하였으며, 울산광역시 5.6%에 비해 8.8%p 높았다. 2008년 9.7%, 2009년 18.8%, 2010년 14.2%, 2011년 18.9%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 10.1%, 여자 19.2%로 여자에서 높았다. 연령별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 20대에서 낮았다.

2. 연간 평균 혈압 측정횟수

- 최근 1년(365일) 동안 혈압을 측정한 횟수로 정의한다.

(하루 측정횟수×365일) + (일주일 측정횟수×52주)
+ (한 달 측정횟수×12개월) + (일 년 측정횟수)

조사대상 응답자 수

- 연간 평균 혈압 측정횟수는 2012년 전체 10.4회이며, 성별로는 남자 9.9회, 여자 10.8회로 여자에서 높았다. 연령별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 30대에서 가장 낮았다.


3. 연간 평균 혈당 측정횟수

- 최근 1년(365일) 동안 혈당을 측정한 횟수로 정의한다.


(하루 측정횟수×365일) + (일주일 측정횟수×52주) +
(한 달 측정횟수×12개월) + (일 년 측정횟수)

조사대상 응답자 수


- 연간 평균 혈당 측정횟수는 2012년 전체 2.9회이며, 성별로는 남자 2.2회, 여자 3.7회로 여자에서 높았다. 연령별로는 60대에서 가장 높았고, 20대에서 가장 낮았다.



〈그림 49〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률



〈그림 50〉 연간 평균 혈압 측정횟수



〈그림 51〉 연간 평균 혈당 측정횟수

4. 주요 질환별 평생 의사진단 경험률 및 관리행태

가. 고혈압

(1) 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)

- 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수} \times 100}{\text{30세 이상 조사대상 응답자 수}}$

- 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)은 2012년 전체 17.4%로, 전년 19.2% 대비 1.8%p 감소하였으며, 울산광역시 17.2%에 비해 0.2%p 낮았다. 2008년 17.0%, 2009년 19.7%, 2010년 15.5%, 2011년 19.2%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 15.4%, 여자 19.4%로 여자에서 높았다. 연령별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 연령이 증가 할수록 높아지는 추세이다.

(2) 고혈압 약물치료율(≥30)

- 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람 중 현재 혈압조절약을 “한 달(30일)에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{현재 혈압조절약을 “한 달(30일)에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}}$

- 고혈압 약물치료율(≥30)은 2012년 전체 89.5%로, 전년 86.7% 대비 2.8%p 증가하였으며, 울산광역시 86.2%에 비해 3.3%p 높았다. 2008년 90.9%, 2009년 88.6%, 2010년 81.1%, 2011년 86.7%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 81.5%, 여자


96.0%로 여자에서 높았다. 연령별로는 50대에서 가장 높았고, 3, 40대에서 낮았다.

(3) 고혈압 관리교육 이수율(≥30)


- 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람 중 고혈압 관리에 관한 교육을 받은 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}}$
--


- 고혈압 관리교육 이수율(≥30)은 2012년 전체 24.3%이며, 성별로는 남자 28.2%, 여자 21.2%로 여자에서 높았다. 연령별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 3, 40대에서 낮았다.



〈그림 52〉 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)



〈그림 53〉 고혈압 약물치료율(≥30)



〈그림 54〉 고혈압 관리교육 이수율(≥30)

나. 당뇨병

(1) 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥ 30)

- 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수} \times 100}{\text{30세 이상 조사대상 응답자 수}}$

- 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥ 30)은 2012년 전체 8.0%로, 전년 6.8% 대비 1.2%p 증가하였으며, 울산광역시 6.4%에 비해 1.6%p 높았다. 2008년 6.3%, 2009년 8.3%, 2010년 5.8%, 2011년 6.8%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 8.2%, 여자 7.9%로 남자에서 높았다. 연령별로는 60대에서 가장 높았고, 30대에서 낮았다.

(2) 당뇨병 치료율(≥ 30)

- 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)으로 치료를 받고 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{현재 당뇨병치료를 위한 혈당조절 방법으로 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 사용한다고 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}}$


- 당뇨병 치료율(≥ 30)은 2012년 전체 81.2%로, 전년 81.3% 대비 0.1%p 감소하였으며, 울산광역시 82.4%에 비해 1.2%p 낮았다. 2008년 89.4%, 2009년 80.3%, 2010년 72.8%, 2011년 81.3%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 78.8%, 여자 83.8%로 여자에서 높았다.

(3) 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)


- 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 당뇨병 관리에 관한 교육을 받은 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}}$
--


- 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)은 2012년 전체 30.2%이며, 성별로는 남자 27.8%, 여자 32.8%로 여자에서 높았다.



〈그림 55〉 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)



〈그림 56〉 당뇨병 치료율(≥30)



〈그림 57〉 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)

(4) 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥ 30)

- 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년(365일) 동안 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은
적이 있는 사람의 수 $\times 100$

의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수

- 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥ 30)은 2012년 전체 39.6%로, 전년 26.4% 대비 13.2%p 증가하였으며, 울산광역시 46.5%에 비해 6.9%p 낮았다. 2008년 37.5%, 2009년 35.1%, 2010년 60.7%, 2011년 26.4%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 34.6%, 여자 44.8%로 여자에서 높았다.

(5) 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥ 30)⁵⁾


- 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년(365일) 동안 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한
정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는
사람의 수 $\times 100$


의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수

- 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥ 30)은 2012년 전체 51.0%이며, 성별로는 남자 51.1%, 여자 51.0%로 비슷하였다.

5) 2009년 지표정의 : 최근 1년 동안 미세단백뇨검사를 받은 적이 있는 사람의 수 $\times 100$ / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
2010년 지표정의 : 최근 1년 동안 소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 $\times 100$ / 의사진단을 받은 30세 이상인 사람의 수



〈그림 58〉 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)



〈그림 59〉 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)

다. 관절염

(1) 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)

- 의사에게 관절염을 진단받은 50세 이상 사람의 분율(%)로 정의한다.

의사에게 관절염을 진단받은 사람의 수 × 100
50세 이상 조사대상 응답자 수

- 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)은 2012년 전체 11.7%로, 전년 19.5% 대비 7.8%p 감소하였으며, 울산광역시 11.9%에 비해 0.2%p 낮았다. 2008년 19.0%, 2009년 24.8%, 2010년 16.3%, 2011년 19.5%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 4.1%, 여자 18.8%로 여자에서 높았다. 연령별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 연령이 증가할수록 높아지는 추세이다.

(2) 관절염 관리교육 이수율(≥50)

- 의사에게 관절염을 진단받은 50세 이상 사람 중 관절염 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

관절염 관리 교육을 받은 사람의 수 × 100
의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수

- 관절염 관리교육 이수율(≥50)은 2012년 전체 34.4%이며, 여자 32.6%였다.


라. 이상지질혈증(고지혈증 포함)

(1) 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30)


- 의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 30세 이상 사람의 분율(%)로 정의한다.

의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수 × 100
30세 이상 조사대상 응답자 수


- 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30)은 2012년 전체 6.7%이며, 성별로는 남자 5.6%, 여자 7.9%로 여자에서 높았다. 연령별로는 60대에서 가장 높았고, 20대에서 가장 낮았다.



〈그림 60〉 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)



〈그림 61〉 관절염 관리교육 이수율(≥50)



〈그림 62〉 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30)

5. 질환별 인지율

가. 대사증후군 인지율

- 대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 분율(%)로 정의한다.

대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 대사증후군 인지율은 2012년 전체 33.3%로, 전년 13.6% 대비 19.7%p 증가하였으며, 울산광역시 31.3%에 비해 2.0%p 높았다. 2010년 20.4%, 2011년 13.6%로 지난 3년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 32.0%, 여자 34.7%로 여자에서 높았다. 연령별로는 50대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.

나. 에이즈 인지율

- 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 분율(%)로 정의한다.

에이즈에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 에이즈 인지율은 2012년 전체 80.5%로, 전년 86.8% 대비 6.3%p 감소하였으며, 울산광역시 89.3%에 비해 8.8%p 낮았다. 2010년 87.6%, 2011년 86.8%로 지난 3년간 감소하는 추세이다. 성별로는 남자 83.2%, 여자 77.5%로 남자에서 높았다. 연령별로는 40대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.

6. 의료이용

가. 필요의료서비스 미치료율⁶⁾

- 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 분율(%)로 정의한다.


최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 필요의료서비스 미치료율은 2012년 전체 8.7%로, 전년 16.6% 대비 7.9%p 감소하였으며, 울산광역시 10.1%에 비해 1.4%p 낮았다. 2008년 8.3%, 2009년 15.2%, 2011년 16.6%로 지난 4년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 6.9%, 여자 10.7%로 여자에서 높았다. 연령별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 20대에서 낮았다.


6) 2008년 지표정의 : 최근 1년간 필요한 의료서비스를 받지 못한 사람 수×100 / 조사대상 인구 수

2009년 지표정의 : 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수


2010년 지표정의 : 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 포함)를 받지 못한 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수



〈그림 63〉 대사증후군 인지도



〈그림 64〉 에이즈 인지도



〈그림 65〉 필요의료서비스 미치료를

제 2 부 주요통계결과

Ⅳ. 사고 및 중독

1. 연간 사고중독 경험률
2. 연간 사고중독 건수율

IV. 사고 및 중독

1. 연간 사고중독 경험률

- 최근 1년(365일) 동안 병의원이나 응급실 등의 의료기관을 방문한 사고중독을 경험한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\text{연간 사고중독 경험자 수} \times 100$
조사대상 응답자 수


- 연간 사고중독 경험률은 2012년 전체 7.6%로, 전년 7.0% 대비 0.6%p 증가하였으며, 울산광역시 6.5%에 비해 1.1%p 높았다. 2008년 4.1%, 2009년 5.2%, 2010년 3.8%, 2011년 7.0%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 8.3%, 여자 6.9%로 남자에서 높았다. 연령별로는 60대에서 가장 높았고, 20대에서 낮았다.

2. 연간 사고중독 건수율


- 최근 1년(365일) 동안 사고중독으로 병의원이나 응급실에서 치료를 받아야 했던 평균 사고중독 횟수로 정의한다.

$\text{연간 사고중독 건수} \times 1,000$
조사대상 응답자 수

- 연간 사고중독 건수율은 2012년 전체 93.8건이며, 성별로는 남자 112.5건, 여자 74.2건으로 남자에서 높았다. 연령별로는 30대에서 가장 높았고, 20대에서 가장 낮았다.



〈그림 66〉 연간 사고중독 경험률



〈그림 67〉 연간 사고중독 건수

제 2 부 주요통계결과

V. 활동제한 및 삶의 질

1. 양호한 주관적 건강수준 인지율
2. 침상와병 경험률
3. 결근결석 경험률
4. 오늘의 건강상태

V. 활동제한 및 삶의 질

1. 양호한 주관적 건강수준 인지율

- 주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”이라고 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”이라고
응답한 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 양호한 주관적 건강수준 인지율은 2012년 전체 49.8%로, 전년 48.0% 대비 1.8%p 증가하였으며, 울산광역시 46.2%에 비해 3.6%p 높았다. 2008년 44.1%, 2009년 44.6%, 2010년 46.2%, 2011년 48.0%로 지난 5년간 증가하는 추세이다. 성별로는 남자 53.5%, 여자 45.9%로 남자에서 높았다. 연령별로는 20대에서 가장 높았고, 연령이 증가 할수록 낮아지는 추세이다.

2. 침상와병 경험률

- 최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 한나절 이상 누워 보내야 했던 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 한나절 이상
누워 보내야 했던 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 침상와병 경험률은 2012년 전체 6.8%로, 전년 4.9% 대비 1.9%p 감소하였으며, 울산광역시

역시 4.0%에 비해 2.8%p 높았다. 2008년 3.7%, 2009년 5.5%, 2010년 3.6%, 2011년 4.9%로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 6.9%, 여자 6.6%로 남자에서 높았다. 연령별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 30대에서 낮았다.

3. 결근결석 경험률


- 최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 학교나 직장 가지 못한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 학교나 직장
가지 못한 사람의 수 × 100


조사대상 응답자 수⁷⁾

- 결근결석 경험률은 2012년 전체 5.2% 남자 6.6%, 여자 2.7%로 남자에서 높았다. 연령별로는 50대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.


7) 학교 또는 직장을 다니고 있지 않은 대상자(주부, 무직) 제외



〈그림 68〉 양호한 주관적 건강수준 인지도



〈그림 69〉 침상와병 경험률




〈그림 70〉 결근결석 경험률

4. 오늘의 건강상태

- 시각적 척도로 나타낸 주관적인 오늘의 건강상태로 정의한다.

건강상태 점수의 총 합
조사대상 응답자 수

- 오늘의 건강상태는 2012년 전체 71.7점으로, 전년 72.7점 대비 1.0점 감소하였으며, 울산광역시 74.7점에 비해 3.0점 낮았다. 2008년 73.1점, 2009년 74.0점, 2010년 74.1점, 2011년 72.7점으로 지난 5년간 증감을 반복하는 추세이다. 성별로는 남자 72.2점, 여자 71.3점으로 남자에서 높았다. 연령별로는 40대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 낮았다.



〈그림 71〉오늘의 건강상태

제 2 부 주요통계결과

Ⅵ. 보건기관 이용

1. 보건기관 이용
2. 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염)
홍보 및 교육 경험률

VI. 보건기관 이용

1. 보건기관 이용

가. 보건기관 이용률

- 최근 1년(365일) 동안 보건기관을 이용한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년(365일) 동안 보건기관('보건소(보건의료원)', '보건지소', '보건진료소')을 이용한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 보건기관 이용률은 2012년 전체 34.0%로, 전년 28.4% 대비 5.6%p 증가하였으며, 울산광역시 24.0%에 비해 10.0%p 높았다. 2009년 23.7%, 2010년 24.8%, 2011년 28.4%로 지난 4년간 증가하는 추세이다. 성별로는 남자 23.9%, 여자 44.4%로 여자에서 높았다. 연령별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 40대에서 낮았다.

모자보건의 6.1%, 건강교실이 5.2%, 영양보충이 2.5%, 구강보건의 2.0%, 정신보건 0.8%순이었다.

다. 보건기관 서비스 만족도

- 보건기관 서비스에 대해 “대단히 만족한다” 또는 “만족한 편이다”에 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{“대단히 만족한다” 또는 “만족한 편이다”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{최근 1년(365일) 동안 보건기관('보건소(보건의료원)', '보건지소', '보건진료소')을 이용한 사람의 수}}$$


- 보건기관 서비스 만족도는 2012년 전체 77.0%이며, 성별로는 남자 81.1%, 여자 74.7%로 남자에서 높았다. 연령별로는 50대에서 가장 높았고, 30대에서 가장 낮았다.

나. 보건기관 이용 서비스 종류


- 보건기관 이용 서비스 종류별 분포(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{보건기관 이용 서비스 종류별 응답자 수} \times 100}{\text{최근 1년(365일) 동안 보건기관('보건소(보건의료원)', '보건지소', '보건진료소')을 이용한 사람의 수}}$$


- 보건기관 이용 서비스 종류는 예방접종이 74.0%로 가장 높았고, 다음이 진료서비스로 19.1%, 민원 서비스가 15.6%, 방문보건의 10.6%, 건강검진이 9.0%, 기타가 8.2%,



〈그림 72〉 보건기관 이용률



〈그림 73〉 보건기관 이용 서비스 종류



〈그림 74〉 보건기관 서비스 만족도

2. 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염) 홍보 및 교육 경험률

- 보건기관에서 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염)의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

보건기관에서 고혈압의 예방 및 관리를 위한 홍보를
보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 보건기관 고혈압 홍보 및 교육 경험률은 2012년 전체 6.4%이며, 성별로는 남자 4.9%, 여자 7.8%로 여자에서 높았다. 연령별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 30대에서 가장 낮았다.

보건기관에서 당뇨병의 예방 및 관리를 위한 홍보를
보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 × 100


조사대상 응답자 수

- 보건기관 당뇨병 홍보 및 교육 경험률은 2012년 전체 5.6%이며, 성별로는 남자 4.8%, 여자 6.4%로 여자에서 높았다. 연령별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 2, 30대에서 가장 낮았다.


보건기관에서 관절염의 예방 및 관리를 위한 홍보를
보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수


- 보건기관 관절염 홍보 및 교육 경험률은 2012년 전체 3.5%이며, 성별로는 남자 2.5%, 여자 4.5%로 여자에서 높았다. 연령별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 30대에서 가장 낮았다.



〈그림 75〉보건기관 고혈압 홍보 및 교육 경험률



〈그림 76〉보건기관 당뇨병 홍보 및 교육 경험률



〈그림 77〉보건기관 관절염 홍보 및 교육 경험률

제 2 부 주요통계결과

Ⅶ. 심정지

1. 심폐소생술 인지율
2. 심폐소생술 교육 경험률

VII. 심정지

1. 심폐소생술 인지율

- 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$$


- 심폐소생술 인지율은 2012년 전체 82.9%이며, 성별로는 남자 89.5%, 여자 75.8%로 남자에서 높았다. 연령별로는 30대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 가장 낮았다.

2. 심폐소생술 교육 경험률


- 최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 사람의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$$

- 심폐소생술 교육 경험률은 2012년 전체 22.3%이며, 성별로는 남자 30.1%, 여자 12.3%로 남자에서 높았다. 연령별로는 20대에서 가장 높았고, 연령이 증가 할수록 낮아지는 추세이다.



〈그림 78〉 심폐소생술 인지도



〈그림 79〉 심폐소생술 교육 경험률

:: 제3부 통계표



제 3 부 통계표

I . 통계표

〈표 14〉 현재흡연율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	921	24.3(1.3)	5.3	427	45.4(2.5)	5.4	494	2.3(0.6)	26.6
연령									
19-29	97	24.4(4.4)	18.0	43	44.4(6.5)	14.6	54	0.0(0.0)	.
30-39	159	30.2(3.2)	10.7	71	57.0(5.8)	10.1	88	2.1(1.5)	68.2
40-49	243	26.2(2.2)	8.5	121	47.8(4.2)	8.9	122	1.5(1.1)	73.0
50-59	198	24.9(3.5)	13.9	89	43.9(5.8)	13.2	109	3.4(1.7)	49.5
60-69	103	16.1(3.6)	22.4	53	31.4(6.8)	21.7	50	1.8(1.8)	100.0
70 이상	121	13.0(3.0)	23.0	50	25.7(6.1)	23.7	71	5.2(3.1)	60.1
생애주기별									
19-44	392	27.6(2.1)	7.4	180	51.4(3.6)	7.1	212	1.3(0.7)	57.4
45-64	370	23.9(2.2)	9.4	179	42.3(3.9)	9.3	191	2.9(1.0)	33.6
65-74	84	13.3(3.3)	24.8	34	33.6(7.7)	23.0	50	1.7(1.7)	98.6
75 이상	75	11.6(3.9)	33.6	34	18.0(6.6)	36.9	41	6.9(4.9)	71.1
교육수준 ²⁾									
무학	84	12.8(3.7)	28.6	20	31.7(9.2)	29.1	64	7.1(3.6)	50.8
초등학교	108	16.3(2.7)	16.5	40	42.6(6.5)	15.2	68	1.3(1.2)	95.7
중학교	100	21.7(3.8)	17.7	45	41.2(7.2)	17.5	55	3.8(2.7)	70.6
고등학교	394	27.6(2.3)	8.2	199	48.5(3.8)	7.9	195	1.8(0.9)	51.0
대학교 이상	234	25.0(2.4)	9.6	122	43.2(4.2)	9.8	112	0.7(0.7)	98.9
직업									
전문행정관리	145	23.1(2.9)	12.7	73	42.0(4.9)	11.6	72	0.0(0.0)	.
사무직	92	30.4(5.5)	18.0	57	45.2(7.6)	16.9	35	2.1(2.2)	100.5
판매·서비스직	80	27.8(4.8)	17.2	28	60.1(9.9)	16.5	52	3.7(2.5)	66.9
농림어업	39	20.1(7.5)	37.4	25	30.8(10.4)	33.8	14	-(-)	-
기능단순노무직	200	44.1(3.9)	8.8	154	53.9(4.4)	8.1	46	3.7(2.6)	71.4
기타 ³⁾	359	8.5(1.3)	15.3	86	26.1(4.4)	17.0	273	2.5(1.0)	37.8
월 가구소득									
100만원 이하	204	16.4(2.4)	14.6	81	34.1(5.4)	16.0	123	4.5(1.5)	34.1
101-200만원	137	25.8(3.5)	13.4	65	47.6(5.7)	11.9	72	2.0(1.4)	70.5
201-300만원	179	30.2(4.1)	13.7	84	55.6(6.8)	12.2	95	2.1(1.5)	71.7
301-400만원	87	24.9(4.6)	18.4	44	42.5(7.3)	17.1	43	2.0(2.0)	101.1
401만원 이상	193	21.3(2.3)	11.0	94	38.9(4.7)	12.1	99	0.0(0.0)	.
거주유형									
읍·면	921	24.3(1.3)	5.3	427	45.4(2.5)	5.4	494	2.3(0.6)	26.6

주 : 1) 현재흡연율 : (평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수 / 조사대상 응답자 수 × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 15〉 흡연시작연령¹⁾

(단위 : 세)

구분	전체			남자			여자		
	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수
전체	313	20.4(0.2)	1.0	298	20.1(0.2)	0.9	15	—(—)	—
연령									
19-29	21	19.2(0.6)	2.9	20	19.1(0.5)	2.8	1	—(—)	—
30-39	53	19.3(0.4)	1.9	51	19.3(0.4)	1.9	2	—(—)	—
40-49	85	20.3(0.3)	1.7	81	20.0(0.3)	1.5	4	—(—)	—
50-59	70	20.9(0.5)	2.5	67	20.5(0.5)	2.2	3	—(—)	—
60-69	43	22.1(1.1)	4.8	41	21.2(0.6)	2.9	2	—(—)	—
70 이상	41	22.8(1.1)	4.9	38	21.4(0.7)	3.3	3	—(—)	—
생애주기별									
19-44	118	19.6(0.3)	1.3	113	19.5(0.2)	1.2	5	—(—)	—
45-64	141	20.8(0.3)	1.2	135	20.3(0.3)	1.3	6	—(—)	—
65-74	27	23.6(1.0)	4.1	25	23.0(0.9)	3.7	2	—(—)	—
75 이상	27	22.2(1.5)	6.8	25	20.3(0.7)	3.6	2	—(—)	—
교육수준 ²⁾									
무학	20	24.5(1.9)	7.7	16	—(—)	—	4	—(—)	—
초등학교	35	21.4(0.9)	4.2	33	20.5(0.7)	3.6	2	—(—)	—
중학교	34	20.8(0.7)	3.3	32	20.7(0.7)	3.4	2	—(—)	—
고등학교	144	20.1(0.2)	1.2	138	19.9(0.2)	1.2	6	—(—)	—
대학교 이상	79	20.0(0.4)	1.9	78	19.9(0.4)	1.9	1	—(—)	—
직업									
전문행정관리	48	20.8(0.6)	2.9	48	20.8(0.6)	2.9	0	—(—)	—
사무직	40	20.2(0.3)	1.7	38	20.2(0.4)	1.8	2	—(—)	—
판매·서비스직	22	19.4(0.5)	2.8	21	19.4(0.6)	2.9	1	—(—)	—
농림어업	22	20.9(1.0)	4.7	22	20.9(1.0)	4.7	0	—(—)	—
기능단순노무직	115	19.9(0.3)	1.6	111	19.4(0.2)	1.1	4	—(—)	—
기타 ³⁾	62	22.1(0.8)	3.6	54	20.8(0.6)	3.1	8	—(—)	—
월 가구소득									
100만원 이하	64	21.8(0.5)	2.1	57	20.8(0.5)	2.3	7	—(—)	—
101-200만원	48	20.1(0.5)	2.7	46	19.8(0.5)	2.7	2	—(—)	—
201-300만원	69	20.2(0.4)	1.8	66	20.0(0.3)	1.6	3	—(—)	—
301-400만원	31	20.5(0.8)	3.7	29	19.8(0.3)	1.7	2	—(—)	—
401만원 이상	66	19.2(0.3)	1.5	66	19.2(0.3)	1.5	0	—(—)	—
거주유형									
읍·면	313	20.4(0.2)	1.0	298	20.1(0.2)	0.9	15	—(—)	—

주 : 1) 흡연시작연령 : 처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 16〉 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량¹⁾

(단위 : %, 개비)

구분	N	10개비 미만		10-19개비		20-39개비		40개비 이상		평균	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	개비 (표준오차)	변동계수
전체	189	7.9(1.7)	20.9	39.4(3.8)	9.8	47.3(4.1)	8.6	5.4(1.9)	35.0	17.2(0.7)	4.0
성											
남자	178	7.9(1.6)	20.0	38.7(3.9)	10.0	47.8(4.0)	8.4	5.6(1.9)	34.8	17.4(0.7)	4.1
여자	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
연령											
19-29	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	39	11.1(4.3)	38.3	41.8(6.5)	15.7	38.2(7.1)	18.6	8.9(4.9)	55.6	16.8(1.4)	8.6
40-49	56	11.2(3.5)	31.1	28.8(6.3)	21.8	58.2(6.4)	11.1	1.7(1.7)	97.8	17.3(0.9)	5.5
50-59	42	4.2(3.0)	72.5	33.4(8.6)	25.9	50.6(9.1)	17.9	11.8(5.1)	43.7	20.7(1.9)	9.3
60-69	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
70 이상	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
생애주기별											
19-44	90	7.6(2.4)	32.0	44.7(5.9)	13.1	42.9(5.6)	13.0	4.7(2.4)	49.5	16.5(0.8)	5.0
45-64	78	9.1(3.5)	37.9	29.0(6.1)	21.0	54.5(7.0)	12.9	7.4(3.4)	45.8	18.8(1.2)	6.6
65-74	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
75 이상	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
교육수준 ²⁾											
무학	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	18	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	96	6.1(1.9)	32.1	39.5(4.8)	12.2	49.9(5.4)	10.8	4.5(2.2)	49.6	17.6(0.8)	4.3
대학교 이상	48	12.1(3.6)	30.0	46.4(6.6)	14.3	37.6(6.8)	18.2	3.9(2.7)	70.0	14.9(1.0)	7.0
직업											
전문행정관리	28	8.3(1.2)	14.7	42.3(8.1)	19.3	39.2(8.0)	20.4	10.3(5.7)	55.1	18.3(1.9)	10.5
사무직	26	12.9(6.3)	48.6	43.1(8.8)	20.5	44.0(9.9)	22.5	0.0(0.0)	.	15.0(1.2)	8.3
판매·서비스직	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
농림어업	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	77	8.5(3.5)	41.1	34.8(4.9)	14.0	48.4(5.5)	11.4	8.3(3.3)	40.4	18.4(1.2)	6.3
기타 ³⁾	30	5.3(3.6)	69.1	50.7(10.3)	20.2	44.0(10.5)	23.8	0.0(0.0)	.	14.6(1.1)	7.6
월 가구소득											
100만원 이하	32	5.1(3.5)	69.5	25.4(7.4)	29.3	56.7(10.0)	17.7	12.8(7.4)	57.8	20.0(1.9)	9.6
101-200만원	31	14.5(4.3)	29.8	39.4(9.0)	22.9	43.3(9.6)	22.2	2.8(2.8)	98.6	16.2(1.7)	10.6
201-300만원	42	8.0(4.3)	54.2	33.5(8.9)	26.7	56.7(9.4)	16.6	1.9(1.9)	99.9	17.5(1.2)	7.1
301-400만원	18	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
401만원 이상	33	7.3(3.9)	53.6	42.8(8.2)	19.1	37.7(7.4)	19.7	12.2(6.8)	55.8	18.2(2.0)	11.2
거주유형											
읍·면	189	7.9(1.7)	20.9	39.4(3.8)	9.8	47.3(4.1)	8.6	5.4(1.9)	35.0	17.2(0.7)	4.0

주 : 1) 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량 : 평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 매일 흡연자의 하루 평균 흡연개비 수의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일 흡연자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 17〉 흡연자의 금연시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	199	18.1(2.8)	15.4	186	17.4(2.8)	16.3	13	-(-)	-
연령									
19-29	19	-(-)	-	19	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	42	24.0(7.1)	29.4	40	23.1(7.2)	31.3	2	-(-)	-
40-49	60	22.9(5.2)	22.5	58	22.1(5.1)	23.0	2	-(-)	-
50-59	44	6.2(3.4)	53.9	40	5.0(3.2)	63.5	4	-(-)	-
60-69	17	-(-)	-	16	-(-)	-	1	-(-)	-
70 이상	17	-(-)	-	13	-(-)	-	4	-(-)	-
생애주기별									
19-44	96	23.6(4.2)	17.8	93	22.6(4.2)	18.4	3	-(-)	-
45-64	81	10.8(3.3)	30.4	75	9.5(3.2)	33.3	6	-(-)	-
65-74	13	-(-)	-	12	-(-)	-	1	-(-)	-
75 이상	9	-(-)	-	6	-(-)	-	3	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	11	-(-)	-	6	-(-)	-	5	-(-)	-
초등학교	16	-(-)	-	15	-(-)	-	1	-(-)	-
중학교	21	18.3(7.7)	42.3	19	-(-)	-	2	-(-)	-
고등학교	98	12.5(3.5)	27.8	94	12.1(3.3)	27.2	4	-(-)	-
대학교 이상	52	29.4(5.5)	18.6	51	29.8(5.5)	18.6	1	-(-)	-
직업									
전문행정관리	29	17.9(7.7)	42.9	29	17.9(7.7)	42.9	0	-(-)	-
사무직	27	31.1(9.8)	31.6	26	31.9(9.9)	31.0	1	-(-)	-
판매·서비스직	18	-(-)	-	16	-(-)	-	2	-(-)	-
농림어업	7	-(-)	-	7	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	83	19.5(4.2)	21.4	81	18.9(4.0)	21.3	2	-(-)	-
기타 ³⁾	31	12.5(6.0)	47.9	23	9.5(6.7)	69.9	8	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 이하	33	8.7(5.0)	57.4	27	7.3(5.1)	69.8	6	-(-)	-
101-200만원	32	3.7(2.5)	66.8	30	2.0(2.0)	99.9	2	-(-)	-
201-300만원	46	25.9(6.2)	23.7	44	23.4(5.9)	25.3	2	-(-)	-
301-400만원	19	-(-)	-	18	-(-)	-	1	-(-)	-
401만원 이상	36	40.3(7.7)	19.1	36	40.3(7.7)	19.1	0	-(-)	-
거주유형									
읍·면	199	18.1(2.8)	15.4	186	17.4(2.8)	16.3	13	-(-)	-

주 : 1) 흡연자의 금연시도율 : (최근 1년(365일) 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수 / 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 18〉 흡연자의 금연방법¹⁾

(단위 : %)

구분	자신의 의지		자가 처방에 의한 금연보조제 (금연패치, 금연껌, 금연사탕, 금연초, 금연침)이용		의사 처방에 의한 금연치료		보건소 금연클리닉 (금연교육 또는 금연상담, 금연 콜센터)	
	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	89.2(3.1)	3.5	23.7(3.9)	16.5	1.4(1.0)	73.0	8.8(2.9)	33.5
성								
남자	88.8(3.2)	3.6	23.4(4.0)	17.1	1.5(1.1)	73.1	8.6(3.0)	35.4
여자	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
연령								
19-29	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
30-39	85.8(7.1)	8.3	25.4(8.2)	32.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
40-49	95.3(3.2)	3.4	14.4(5.2)	35.9	2.4(2.5)	101.0	7.1(3.9)	55.0
50-59	93.0(4.5)	4.8	20.3(8.2)	40.3	3.4(3.4)	98.1	9.5(5.2)	54.9
60-69	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
70 이상	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
생애주기별								
19-44	84.1(4.6)	5.4	32.5(5.5)	16.9	1.2(1.3)	103.2	9.7(4.1)	42.3
45-64	96.0(2.7)	2.8	12.6(4.7)	37.2	1.9(1.9)	100.3	8.3(3.7)	44.0
65-74	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
75 이상	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
교육수준 ²⁾								
무학	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
초등학교	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
중학교	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
고등학교	86.9(4.6)	5.4	25.5(6.8)	26.7	0.0(0.0)	.	5.9(3.5)	58.9
대학교 이상	88.6(6.5)	7.3	23.0(8.5)	37.0	2.2(2.2)	102.4	11.0(6.3)	57.3
직업								
전문행정관리	86.9(9.2)	10.5	28.1(10.9)	38.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
사무직	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
판매·서비스직	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
농림어업	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
기능단순노무직	92.2(4.3)	4.6	26.9(7.8)	28.9	3.5(2.5)	72.8	9.2(4.3)	46.9
기타 ³⁾	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
월 가구소득								
100만원 이하	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
101-200만원	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
201-300만원	90.8(4.9)	5.4	22.0(6.6)	29.7	2.4(2.4)	100.0	11.9(6.4)	53.7
301-400만원	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
401만원 이상	85.0(7.8)	9.2	34.8(8.8)	25.2	2.6(2.7)	102.7	13.3(7.6)	57.0
거주유형								
읍·면	89.2(3.1)	3.5	23.7(3.9)	16.5	1.4(1.0)	73.0	8.8(2.9)	33.5

주 : 1) 흡연자의 금연방법 : (각 금연 시도 경험 방법 / 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 중 금연 시도자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 19〉 흡연자의 1개월 내 금연계획률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	199	4.6(1.3)	28.5	186	4.5(1.4)	30.0	13	-()	-
연령									
19-29	19	-()	-	19	-()	-	0	-()	-
30-39	42	2.3(2.4)	100.4	40	2.4(2.4)	100.4	2	-()	-
40-49	60	4.9(2.8)	56.2	58	5.1(2.8)	56.3	2	-()	-
50-59	44	1.5(1.5)	101.8	40	0.0(0.0)	.	4	-()	-
60-69	17	-()	-	16	-()	-	1	-()	-
70 이상	17	-()	-	13	-()	-	4	-()	-
생애주기별									
19-44	96	5.7(2.1)	37.2	93	5.8(2.1)	37.1	3	-()	-
45-64	81	2.9(1.7)	59.2	75	2.2(1.6)	72.5	6	-()	-
65-74	13	-()	-	12	-()	-	1	-()	-
75 이상	9	-()	-	6	-()	-	3	-()	-
교육수준 ²⁾									
무학	11	-()	-	6	-()	-	5	-()	-
초등학교	16	-()	-	15	-()	-	1	-()	-
중학교	21	3.5(3.5)	99.0	19	-()	-	2	-()	-
고등학교	98	3.1(1.8)	56.7	94	3.2(1.8)	56.5	4	-()	-
대학교 이상	52	8.3(4.2)	50.2	51	8.4(4.2)	50.3	1	-()	-
직업									
전문행정관리	29	9.1(6.3)	68.5	29	9.1(6.3)	68.5	0	-()	-
사무직	27	6.0(3.9)	64.5	26	6.2(4.0)	64.2	1	-()	-
판매·서비스직	18	-()	-	16	-()	-	2	-()	-
농림어업	7	-()	-	7	-()	-	0	-()	-
기능단순노무직	83	2.9(1.7)	58.6	81	2.9(1.7)	58.5	2	-()	-
기타 ³⁾	31	2.3(2.2)	95.7	23	0.0(0.0)	.	8	-()	-
월 가구소득									
100만원 이하	33	2.4(2.4)	99.6	27	2.8(2.8)	99.6	6	-()	-
101-200만원	32	3.6(2.5)	67.9	30	1.9(1.9)	101.6	2	-()	-
201-300만원	46	5.7(3.8)	65.4	44	5.9(3.9)	65.2	2	-()	-
301-400만원	19	-()	-	18	-()	-	1	-()	-
401만원 이상	36	11.6(5.6)	47.9	36	11.6(5.6)	47.9	0	-()	-
거주유형									
읍·면	199	4.6(1.3)	28.5	186	4.5(1.4)	30.0	13	-()	-

주 : 1) 흡연자의 1개월 내 금연계획률 : (현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 중 1개월(30일) 내 금연계획이 있는 사람의 수 / 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 20〉 흡연자의 금연이유¹⁾

(단위 : %)

구분	N	건강이 나빠져서		현재 건강이상은 없지만 향후 건강염려로		가족건강을 위해		주위 사람들에게 피해를 주지 않기 위해		주위사람의 권유		담뱃값의 부담		공익광고 (TV, 라디오), 담뱃값의 경계문구를 보고		사회생활이 불편해서 (흡연 장소가 없어서)		기타	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
전체	145	13.6(3.0)	21.6	46.5(4.2)	9.1	12.9(2.6)	20.3	8.3(1.9)	23.0	2.6(1.4)	55.4	5.7(1.7)	29.4	1.2(1.2)	99.7	1.5(0.7)	43.2	7.7(2.5)	32.1
성																			
남자	138	12.6(2.8)	22.6	46.0(4.2)	9.1	13.3(2.7)	20.3	8.7(2.0)	23.1	2.7(1.5)	55.8	5.9(1.8)	29.5	1.2(1.2)	99.6	1.6(0.7)	43.1	7.9(2.5)	32.0
여자	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
연령																			
19-29	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	29	5.9(3.8)	65.2	49.1(7.9)	16.1	17.6(6.4)	36.4	6.7(4.0)	59.6	3.4(3.5)	100.8	6.7(3.4)	50.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	10.6(4.8)	45.4
40-49	50	11.6(4.9)	42.5	45.9(5.4)	11.8	13.2(4.3)	32.3	15.4(4.2)	27.1	0.0(0.0)	.	6.2(2.7)	44.3	0.0(0.0)	.	3.8(2.1)	55.8	3.8(2.7)	70.0
50-59	35	28.8(7.4)	25.7	48.3(8.2)	17.0	2.8(2.7)	95.6	5.6(3.8)	67.2	2.9(2.9)	99.5	2.9(2.9)	99.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	8.6(4.9)	57.0
60-69	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
70 이상	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
생애주기별																			
19-44	72	5.6(2.3)	41.8	49.0(5.6)	11.5	16.7(4.2)	24.9	7.9(3.2)	40.4	3.4(2.4)	70.4	6.9(2.6)	37.3	2.0(2.0)	100.0	0.0(0.0)	.	8.5(3.4)	40.3
45-64	64	25.2(5.5)	21.9	45.1(5.9)	13.2	8.2(3.5)	42.7	7.7(3.1)	40.6	1.6(1.6)	99.9	3.4(1.6)	47.6	0.0(0.0)	.	4.0(1.7)	43.4	4.8(2.8)	57.6
65-74	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
75 이상	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
교육수준 ²⁾																			
무학	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	71	12.6(4.1)	32.7	48.3(5.4)	11.2	13.7(3.9)	28.6	7.2(2.7)	38.0	3.6(2.4)	66.9	4.8(2.7)	55.8	2.4(2.3)	98.6	2.3(1.3)	56.8	5.2(2.8)	54.3
대학교 이상	41	6.4(3.6)	56.9	46.1(8.0)	17.2	16.5(6.6)	39.7	12.6(3.7)	29.7	2.7(2.7)	101.5	6.7(3.2)	47.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	9.0(3.6)	40.1
직업																			
전문행정관리	23	11.2(7.8)	69.7	42.8(9.8)	22.8	23.5(8.5)	36.4	6.1(4.3)	70.8	3.7(3.6)	98.4	4.1(0.7)	18.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	8.6(5.9)	68.9
사무직	23	3.4(3.5)	102.1	58.2(9.8)	16.8	5.1(4.4)	87.3	18.7(6.1)	32.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.7(3.7)	99.9	10.8(5.3)	48.8
판매·서비스직	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
농림어업	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	62	15.5(4.6)	29.8	47.2(6.5)	13.7	18.0(4.8)	26.5	6.6(2.9)	44.3	2.1(2.0)	98.8	6.9(2.7)	39.7	0.0(0.0)	.	0.9(0.1)	12.6	2.9(2.1)	73.1
기타 ³⁾	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
월 가구소득																			
100만원 이하	22	31.2(9.6)	30.6	36.1(10.5)	29.2	12.8(8.4)	65.8	3.5(3.5)	98.8	0.0(0.0)	.	5.1(5.0)	97.5	0.0(0.0)	.	3.0(0.5)	17.7	8.2(5.9)	72.0
101-200만원	25	9.2(5.2)	57.1	38.9(11.5)	29.7	23.3(10.0)	42.9	11.3(6.0)	53.1	6.4(6.1)	95.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	10.8(6.3)	58.0
201-300만원	38	10.9(5.4)	49.5	46.5(7.6)	16.4	11.0(4.4)	40.5	7.0(4.1)	57.8	5.2(3.7)	70.9	6.1(4.1)	67.3	0.0(0.0)	.	2.2(2.2)	101.0	11.2(5.2)	46.8
301-400만원	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
401만원 이상	32	10.8(5.2)	48.6	60.2(8.3)	13.8	11.1(6.5)	58.3	9.1(4.0)	44.3	0.0(0.0)	.	8.8(3.8)	42.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
거주유형																			
읍·면	145	13.6(3.0)	21.6	46.5(4.2)	9.1	12.9(2.6)	20.3	8.3(1.9)	23.0	2.6(1.4)	55.4	5.7(1.7)	29.4	1.2(1.2)	99.7	1.5(0.7)	43.2	7.7(2.5)	32.1

주 : 1) 흡연자의 금연이유 : (응답보기별 응답자 수 / 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 중 금연시도자 또는 금연계획자) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 21〉 금연캠페인 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	917	66.4(1.8)	2.7	427	68.4(2.3)	3.4	490	64.3(2.3)	3.5
연령									
19-29	97	74.4(5.5)	7.4	43	76.7(8.7)	11.4	54	71.7(6.5)	9.0
30-39	158	79.6(2.9)	3.6	71	79.6(4.6)	5.8	87	79.5(3.8)	4.7
40-49	243	67.2(2.8)	4.2	121	64.5(4.5)	7.0	122	70.2(3.5)	4.9
50-59	198	67.2(3.4)	5.1	89	67.3(4.5)	6.7	109	67.2(4.6)	6.8
60-69	101	50.8(4.9)	9.6	53	59.2(7.1)	11.9	48	42.7(6.2)	14.6
70 이상	120	35.2(5.0)	14.1	50	43.3(7.1)	16.5	70	30.2(4.8)	16.0
생애주기별									
19-44	391	75.3(2.1)	2.8	180	74.2(3.4)	4.5	211	76.6(2.5)	3.3
45-64	369	64.6(2.7)	4.2	179	67.4(3.8)	5.7	190	61.4(3.2)	5.2
65-74	82	41.8(6.6)	15.8	34	41.3(8.5)	20.4	48	42.1(8.1)	19.3
75 이상	75	31.0(5.7)	18.3	34	43.4(9.0)	20.8	41	21.8(5.7)	26.1
교육수준 ²⁾									
무학	82	28.8(5.9)	20.3	20	44.9(10.8)	24.0	62	23.8(5.5)	23.0
초등학교	108	42.2(5.2)	12.4	40	40.5(7.3)	18.0	68	43.1(5.6)	12.9
중학교	100	62.0(5.3)	8.6	45	63.6(6.7)	10.5	55	60.4(6.2)	10.2
고등학교	393	72.2(2.2)	3.1	199	70.4(2.9)	4.1	194	74.4(2.8)	3.7
대학교 이상	233	76.9(2.8)	3.7	122	75.8(4.5)	5.9	111	78.6(3.8)	4.8
직업									
전문행정관리	145	77.9(3.0)	3.9	73	77.1(5.0)	6.5	72	78.9(4.6)	5.8
사무직	92	73.2(4.6)	6.3	57	67.7(6.4)	9.5	35	83.6(5.2)	6.2
판매·서비스직	79	63.9(5.6)	8.8	28	69.7(8.2)	11.7	51	59.5(7.1)	11.9
농림어업	39	47.8(7.0)	14.6	25	59.9(8.9)	14.9	14	—(—)	—
기능단순노무직	199	66.3(3.2)	4.9	154	65.8(3.3)	5.0	45	68.0(8.7)	12.8
기타 ³⁾	357	61.9(3.2)	5.1	86	69.1(5.1)	7.4	271	59.4(3.4)	5.7
월 가구소득									
100만원 이하	202	49.9(4.4)	8.9	81	54.7(5.5)	10.1	121	46.6(5.2)	11.1
101-200만원	137	63.0(4.8)	7.7	65	63.6(6.7)	10.5	72	62.3(6.3)	10.1
201-300만원	178	63.7(4.5)	7.1	84	63.7(5.5)	8.6	94	63.7(5.0)	7.9
301-400만원	87	67.8(4.9)	7.2	44	73.3(6.6)	8.9	43	60.5(8.4)	13.8
401만원 이상	193	77.2(3.4)	4.4	94	77.0(5.1)	6.7	99	77.5(4.3)	5.6
거주유형									
읍·면	917	66.4(1.8)	2.7	427	68.4(2.3)	3.4	490	64.3(2.3)	3.5

주 : 1) 금연캠페인 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 금연에 대한 공익광고(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 22〉 금연교육 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	920	3.3(0.6)	17.3	427	4.5(1.0)	22.1	493	2.0(0.5)	23.1
연령									
19-29	97	3.6(1.7)	47.6	43	2.2(2.2)	96.5	54	5.3(2.8)	52.5
30-39	159	4.2(1.4)	34.1	71	7.0(2.6)	36.9	88	1.2(1.2)	98.8
40-49	243	4.7(1.2)	25.3	121	6.1(2.0)	32.9	122	3.2(1.4)	44.3
50-59	198	2.2(1.0)	42.9	89	3.5(1.6)	46.3	109	0.9(0.9)	99.8
60-69	103	2.2(1.6)	72.6	53	4.5(3.2)	71.7	50	0.0(0.0)	.
70 이상	120	0.0(0.0)	.	50	0.0(0.0)	.	70	0.0(0.0)	.
생애주기별									
19-44	392	3.5(0.9)	26.4	180	4.0(1.5)	37.5	212	2.9(0.8)	28.1
45-64	370	4.2(1.1)	25.8	179	6.5(1.8)	27.9	191	1.6(0.7)	46.0
65-74	83	0.0(0.0)	.	34	0.0(0.0)	.	49	0.0(0.0)	.
75 이상	75	0.0(0.0)	.	34	0.0(0.0)	.	41	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	84	0.0(0.0)	.	20	0.0(0.0)	.	64	0.0(0.0)	.
초등학교	108	2.2(1.5)	69.9	40	6.0(4.1)	67.5	68	0.0(0.0)	.
중학교	99	3.0(1.9)	65.3	45	2.4(2.3)	99.3	54	3.5(1.6)	44.8
고등학교	394	3.4(0.9)	27.3	199	4.7(1.6)	33.7	195	1.7(1.0)	57.8
대학교 이상	234	4.4(1.0)	22.5	122	5.0(1.7)	33.4	112	3.7(0.8)	22.5
직업									
전문행정관리	145	6.3(1.8)	29.5	73	7.7(2.5)	32.5	72	4.5(2.2)	48.0
사무직	92	5.9(2.5)	42.6	57	8.9(3.7)	41.3	35	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	80	2.4(1.7)	73.4	28	0.0(0.0)	.	52	4.2(3.0)	72.9
농림어업	39	0.0(0.0)	.	25	0.0(0.0)	.	14	-(-)	-
기능단순노무직	200	2.8(1.0)	34.6	154	3.5(1.2)	34.4	46	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	358	2.0(0.8)	38.6	86	3.3(2.4)	71.8	272	1.6(0.7)	44.6
월 가구소득									
100만원 이하	204	1.7(0.8)	46.1	81	1.3(1.2)	99.2	123	1.9(1.0)	50.3
101-200만원	137	4.4(1.9)	43.7	65	2.4(1.7)	71.5	72	6.6(3.1)	47.8
201-300만원	179	2.2(1.2)	54.8	84	4.2(2.3)	54.9	95	0.0(0.0)	.
301-400만원	87	7.7(3.4)	44.2	44	12.2(5.4)	43.9	43	1.8(1.8)	101.8
401만원 이상	193	4.2(1.3)	31.8	94	6.2(2.3)	37.4	99	1.8(0.9)	49.9
거주유형									
읍·면	920	3.3(0.6)	17.3	427	4.5(1.0)	22.1	493	2.0(0.5)	23.1

주 : 1) 금연교육 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 23〉 현재 흡연자의 금연교육 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	199	3.0(0.7)	23.7	186	3.1(0.7)	23.8	13	-(-)	-
연령									
19-29	19	-(-)	-	19	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	42	2.7(0.4)	14.6	40	2.8(0.4)	15.2	2	-(-)	-
40-49	60	6.6(2.5)	38.1	58	6.8(2.6)	37.9	2	-(-)	-
50-59	44	2.7(0.4)	15.1	40	2.9(0.5)	15.8	4	-(-)	-
60-69	17	-(-)	-	16	-(-)	-	1	-(-)	-
70 이상	17	-(-)	-	13	-(-)	-	4	-(-)	-
생애주기별									
19-44	96	1.2(0.1)	10.3	93	1.3(0.1)	10.4	3	-(-)	-
45-64	81	6.5(2.0)	30.0	75	6.9(2.1)	30.3	6	-(-)	-
65-74	13	-(-)	-	12	-(-)	-	1	-(-)	-
75 이상	9	-(-)	-	6	-(-)	-	3	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	11	-(-)	-	6	-(-)	-	5	-(-)	-
초등학교	16	-(-)	-	15	-(-)	-	1	-(-)	-
중학교	21	0.0(0.0)	.	19	-(-)	-	2	-(-)	-
고등학교	98	3.3(0.9)	26.8	94	3.4(0.9)	26.7	4	-(-)	-
대학교 이상	52	3.1(1.4)	44.2	51	3.1(1.4)	44.2	1	-(-)	-
직업									
전문행정관리	29	8.0(1.1)	14.3	29	8.0(1.1)	14.3	0	-(-)	-
사무직	27	2.9(2.8)	97.8	26	3.0(2.9)	97.7	1	-(-)	-
판매·서비스직	18	-(-)	-	16	-(-)	-	2	-(-)	-
농림어업	7	-(-)	-	7	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	83	2.2(1.0)	45.4	81	2.3(1.0)	45.3	2	-(-)	-
기타 ³⁾	31	3.2(3.0)	95.7	23	4.1(4.0)	97.6	8	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 이하	33	3.1(3.1)	99.8	27	3.7(3.7)	99.9	6	-(-)	-
101-200만원	32	0.0(0.0)	.	30	0.0(0.0)	.	2	-(-)	-
201-300만원	46	0.0(0.0)	.	44	0.0(0.0)	.	2	-(-)	-
301-400만원	19	-(-)	-	18	-(-)	-	1	-(-)	-
401만원 이상	36	10.7(2.8)	26.6	36	10.7(2.8)	26.6	0	-(-)	-
거주유형									
읍·면	199	3.0(0.7)	23.7	186	3.1(0.7)	23.8	13	-(-)	-

주 : 1) 현재 흡연자의 금연교육 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 24〉 평생음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	921	76.4(1.6)	2.1	427	84.6(2.1)	2.5	494	67.9(2.3)	3.4
연령									
19-29	97	74.7(4.4)	5.9	43	74.8(6.8)	9.0	54	74.7(5.5)	7.4
30-39	159	86.5(2.2)	2.5	71	92.6(2.9)	3.1	88	80.0(3.5)	4.3
40-49	243	81.3(2.5)	3.1	121	86.6(3.2)	3.7	122	75.2(3.0)	4.0
50-59	198	75.1(2.9)	3.8	89	85.4(3.5)	4.1	109	63.5(4.2)	6.7
60-69	103	63.9(4.5)	7.1	53	84.5(4.3)	5.1	50	44.7(7.1)	16.0
70 이상	121	59.5(4.0)	6.7	50	75.8(6.0)	8.0	71	49.5(5.1)	10.2
생애주기별									
19-44	392	81.1(2.1)	2.6	180	85.1(3.1)	3.6	212	76.6(2.9)	3.8
45-64	370	75.6(2.3)	3.1	179	86.0(2.5)	2.9	191	63.6(3.5)	5.5
65-74	84	63.4(5.6)	8.9	34	78.8(6.4)	8.2	50	54.7(7.2)	13.2
75 이상	75	58.5(6.0)	10.2	34	75.1(8.0)	10.7	41	46.1(7.5)	16.4
교육수준 ²⁾									
무학	84	56.1(5.3)	9.4	20	87.5(6.0)	6.9	64	46.6(6.2)	13.3
초등학교	108	59.9(5.0)	8.4	40	75.0(6.8)	9.0	68	51.2(5.9)	11.6
중학교	100	71.2(5.1)	7.1	45	73.9(7.7)	10.4	55	68.7(5.7)	8.3
고등학교	394	78.4(2.3)	2.9	199	83.1(2.9)	3.5	195	72.6(3.1)	4.3
대학교 이상	234	86.5(2.1)	2.4	122	92.5(2.6)	2.8	112	78.4(3.5)	4.4
직업									
전문행정관리	145	80.2(2.8)	3.5	73	89.5(3.2)	3.6	72	68.8(4.9)	7.1
사무직	92	84.2(4.7)	5.6	57	84.3(6.3)	7.5	35	84.2(5.1)	6.0
판매·서비스직	80	85.2(3.2)	3.8	28	94.3(4.1)	4.3	52	78.4(4.4)	5.6
농림어업	39	71.1(6.4)	9.0	25	84.2(5.3)	6.3	14	-(-)	-
기능단순노무직	200	85.5(2.5)	2.9	154	87.6(2.6)	3.0	46	76.8(5.8)	7.6
기타 ³⁾	359	64.9(2.6)	4.0	86	71.5(5.6)	7.9	273	62.6(3.1)	4.9
월 가구소득									
100만원 이하	204	66.8(3.4)	5.1	81	78.2(4.9)	6.2	123	59.0(4.3)	7.2
101-200만원	137	84.1(3.5)	4.2	65	92.4(3.4)	3.7	72	74.9(6.1)	8.2
201-300만원	179	80.6(3.2)	4.0	84	89.1(4.0)	4.5	95	71.2(5.2)	7.3
301-400만원	87	84.1(4.7)	5.6	44	87.2(5.3)	6.1	43	80.1(5.4)	6.8
401만원 이상	193	84.1(2.6)	3.1	94	87.8(3.8)	4.3	99	79.6(4.0)	5.1
거주유형									
읍·면	921	76.4(1.6)	2.1	427	84.6(2.1)	2.5	494	67.9(2.3)	3.4

주 : 1) 평생음주율 : (지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 25〉 연간음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	920	66.2(1.9)	2.9	427	75.2(2.3)	3.1	493	56.7(2.5)	4.4
연령									
19-29	97	70.2(4.4)	6.3	43	72.5(7.1)	9.8	54	67.5(5.1)	7.6
30-39	159	77.6(3.5)	4.5	71	85.7(4.2)	4.9	88	69.2(4.2)	6.1
40-49	243	74.8(3.0)	4.0	121	82.7(3.3)	4.0	122	65.7(3.9)	6.0
50-59	198	65.6(3.1)	4.7	89	76.0(3.9)	5.2	109	53.9(4.3)	7.9
60-69	102	42.0(4.3)	10.3	53	57.8(6.6)	11.4	49	26.6(5.8)	21.9
70 이상	121	36.2(4.3)	11.8	50	43.5(7.2)	16.5	71	31.7(4.9)	15.6
생애주기별									
19-44	392	74.4(2.5)	3.3	180	80.7(3.3)	4.1	212	67.4(2.9)	4.4
45-64	370	65.2(2.5)	3.8	179	75.8(3.1)	4.1	191	53.2(3.5)	6.7
65-74	83	36.8(5.4)	14.6	34	49.5(7.6)	15.4	49	29.3(6.2)	21.1
75 이상	75	37.1(6.0)	16.3	34	40.8(9.0)	21.9	41	34.3(6.8)	19.9
교육수준 ²⁾									
무학	83	31.4(5.4)	17.1	20	50.1(12.2)	24.4	63	25.6(6.1)	23.9
초등학교	108	51.2(5.2)	10.2	40	59.9(7.0)	11.7	68	46.2(6.4)	13.8
중학교	100	51.8(5.6)	10.8	45	55.9(8.5)	15.3	55	47.9(5.8)	12.1
고등학교	394	69.7(2.6)	3.8	199	75.5(3.4)	4.6	195	62.5(3.3)	5.3
대학교 이상	234	79.8(2.8)	3.5	122	86.9(3.1)	3.6	112	70.2(4.1)	5.9
직업									
전문행정관리	145	73.5(3.2)	4.4	73	80.4(4.5)	5.6	72	65.0(4.7)	7.3
사무직	92	78.5(5.0)	6.3	57	78.8(6.4)	8.2	35	77.8(6.3)	8.1
판매·서비스직	80	74.6(4.3)	5.7	28	90.3(5.0)	5.6	52	62.9(5.7)	9.1
농림어업	39	53.2(9.8)	18.4	25	63.6(11.7)	18.4	14	-(-)	-
기능단순노무직	200	79.0(2.5)	3.2	154	81.4(2.7)	3.3	46	68.8(6.5)	9.4
기타 ³⁾	358	50.3(2.8)	5.6	86	53.4(5.5)	10.4	272	49.3(3.4)	6.9
월 가구소득									
100만원 이하	204	51.6(4.2)	8.1	81	60.0(6.3)	10.5	123	45.9(4.6)	10.1
101-200만원	137	73.1(3.8)	5.2	65	78.1(3.9)	5.0	72	67.7(6.5)	9.5
201-300만원	179	68.9(4.2)	6.1	84	82.8(4.7)	5.6	95	53.5(6.2)	11.6
301-400만원	87	75.9(5.1)	6.7	44	82.6(5.0)	6.1	43	67.3(6.3)	9.4
401만원 이상	193	76.7(3.1)	4.1	94	81.6(4.0)	4.9	99	70.7(4.6)	6.6
거주유형									
읍·면	920	66.2(1.9)	2.9	427	75.2(2.3)	3.1	493	56.7(2.5)	4.4

주 : 1) 연간음주율 : (최근 1년(365일) 동안 1회 이상 술을 마신 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 26〉 월간음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	920	50.2(1.6)	3.3	427	66.0(2.3)	3.5	493	33.7(1.9)	5.7
연령									
19-29	97	51.6(5.1)	9.9	43	60.7(7.7)	12.6	54	40.5(6.7)	16.6
30-39	159	61.3(3.7)	6.1	71	76.9(5.3)	6.8	88	45.0(4.5)	10.0
40-49	243	59.2(2.7)	4.6	121	72.8(3.4)	4.6	122	43.7(3.8)	8.8
50-59	198	50.3(3.1)	6.1	89	68.3(4.2)	6.1	109	30.1(3.9)	12.8
60-69	102	30.8(4.3)	14.1	53	51.1(6.7)	13.0	49	11.0(4.3)	39.4
70 이상	121	18.8(3.3)	17.5	50	34.2(7.0)	20.6	71	9.4(3.4)	36.5
생애주기별									
19-44	392	58.0(2.5)	4.3	180	70.9(3.7)	5.2	212	43.6(2.8)	6.4
45-64	370	50.4(2.2)	4.4	179	67.1(2.9)	4.4	191	31.2(3.1)	9.9
65-74	83	20.1(3.4)	17.0	34	40.7(7.4)	18.3	49	7.9(3.6)	45.6
75 이상	75	19.4(4.9)	25.4	34	32.9(9.0)	27.5	41	9.5(4.5)	47.2
교육수준 ²⁾									
무학	83	17.6(4.4)	25.3	20	50.1(12.2)	24.4	63	7.4(3.3)	45.3
초등학교	108	23.7(4.4)	18.6	40	38.4(6.8)	17.8	68	15.3(5.0)	32.7
중학교	100	39.0(5.8)	15.0	45	48.9(8.8)	18.0	55	30.0(5.8)	19.4
고등학교	394	56.4(2.9)	5.1	199	69.1(3.6)	5.2	195	40.8(3.7)	9.0
대학교 이상	234	61.6(2.8)	4.5	122	74.3(3.7)	5.0	112	44.5(4.0)	9.0
직업									
전문행정관리	145	54.5(3.1)	5.6	73	68.5(5.0)	7.3	72	37.4(5.9)	15.8
사무직	92	64.0(5.3)	8.2	57	75.8(6.5)	8.5	35	41.5(8.2)	19.8
판매·서비스직	80	61.2(5.3)	8.7	28	80.2(9.0)	11.3	52	47.1(5.9)	12.6
농림어업	39	35.4(8.6)	24.2	25	50.7(10.2)	20.0	14	-(-)	-
기능단순노무직	200	66.5(3.5)	5.2	154	73.0(3.6)	4.9	46	39.8(7.9)	20.0
기타 ³⁾	358	32.1(2.2)	6.8	86	40.6(4.8)	11.7	272	29.1(2.8)	9.4
월 가구소득									
100만원 이하	204	30.0(2.9)	9.8	81	46.5(6.0)	12.9	123	18.8(3.8)	20.0
101-200만원	137	56.0(3.1)	5.6	65	75.5(4.3)	5.6	72	34.6(5.4)	15.6
201-300만원	179	52.0(4.6)	8.8	84	71.7(5.3)	7.4	95	30.2(4.9)	16.3
301-400만원	87	56.3(5.0)	8.9	44	66.5(6.7)	10.2	43	43.0(7.6)	17.6
401만원 이상	193	62.0(3.7)	6.0	94	71.8(5.1)	7.1	99	50.2(5.2)	10.4
거주유형									
읍·면	920	50.2(1.6)	3.3	427	66.0(2.3)	3.5	493	33.7(1.9)	5.7

주 : 1) 월간음주율 : (최근 1년(365일) 동안 한 달(30일)에 1회 이상 술을 마신 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 27〉 음주시작연령¹⁾

(단위 : 세)

구분	전체			남자			여자		
	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수
전체	656	21.9(0.3)	1.5	350	19.4(0.2)	1.2	306	25.3(0.6)	2.5
연령									
19-29	72	18.8(0.3)	1.8	32	18.4(0.5)	3.0	40	19.4(0.3)	1.4
30-39	132	19.3(0.2)	1.2	64	18.6(0.3)	1.4	68	20.2(0.4)	2.1
40-49	190	21.5(0.5)	2.3	103	19.3(0.4)	2.1	87	24.4(0.8)	3.4
50-59	136	24.1(0.8)	3.3	74	20.4(0.6)	2.9	62	30.1(1.5)	5.0
60-69	62	25.6(1.7)	6.5	42	20.3(1.0)	4.9	20	35.2(3.9)	11.0
70 이상	64	30.1(1.5)	5.0	35	21.4(0.7)	3.1	29	39.0(1.8)	4.5
생애주기별									
19-44	309	19.5(0.2)	1.0	152	18.8(0.2)	1.3	157	20.4(0.3)	1.3
45-64	260	23.7(0.6)	2.5	149	19.9(0.4)	2.0	111	29.8(1.1)	3.6
65-74	48	29.3(1.7)	5.7	26	21.4(1.0)	4.9	22	37.1(2.9)	7.7
75 이상	39	28.9(2.0)	6.8	23	21.2(0.8)	3.8	16	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	42	30.9(2.0)	6.5	16	-(-)	-	26	36.6(2.7)	7.4
초등학교	55	27.8(1.3)	4.7	27	20.4(0.7)	3.2	28	34.9(2.0)	5.8
중학교	69	27.8(1.4)	5.2	33	21.3(1.3)	5.9	36	34.0(2.1)	6.0
고등학교	297	20.6(0.3)	1.4	165	19.3(0.3)	1.7	132	22.5(0.5)	2.3
대학교 이상	193	19.7(0.2)	1.1	109	18.9(0.3)	1.3	84	20.8(0.4)	1.8
직업									
전문행정관리	107	21.0(0.5)	2.3	62	19.5(0.5)	2.5	45	23.4(0.9)	3.9
사무직	77	19.6(0.3)	1.4	49	19.3(0.4)	1.8	28	20.4(0.6)	2.8
판매·서비스직	65	21.6(0.9)	4.2	26	18.6(1.0)	5.3	39	24.2(1.1)	4.7
농림어업	24	22.5(2.0)	8.7	19	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	162	20.1(0.5)	2.3	129	19.2(0.3)	1.7	33	24.3(1.9)	7.9
기타 ³⁾	216	25.0(0.8)	3.0	62	20.2(0.5)	2.3	154	26.9(1.0)	3.7
월 가구소득									
100만원 이하	124	25.6(1.0)	3.9	61	20.7(0.5)	2.6	63	30.2(1.6)	5.2
101-200만원	112	22.7(0.6)	2.7	59	19.4(0.3)	1.5	53	27.0(1.2)	4.6
201-300만원	137	20.9(0.5)	2.3	74	18.8(0.4)	2.4	63	23.9(1.1)	4.5
301-400만원	71	20.1(1.0)	5.0	38	18.5(0.8)	4.3	33	22.3(1.7)	7.7
401만원 이상	159	20.5(0.5)	2.4	84	18.7(0.4)	2.4	75	22.9(0.7)	3.2
거주유형									
읍·면	656	21.9(0.3)	1.5	350	19.4(0.2)	1.2	306	25.3(0.6)	2.5

주 : 1) 음주시작연령 : 처음으로 술 1잔을 모두 마신 만 나이의 총 합 / 1잔 이상의 술을 마신 음주자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 28〉 고위험음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	587	15.0(1.8)	12.3	315	20.7(2.9)	14.0	272	7.1(1.5)	20.6
연령									
19-29	69	2.2(1.5)	67.7	31	0.0(0.0)	.	38	5.1(3.5)	68.4
30-39	121	20.7(3.7)	17.7	61	25.7(5.1)	20.0	60	14.1(4.2)	29.7
40-49	181	15.9(2.9)	18.2	101	23.7(4.5)	19.0	80	4.7(2.9)	60.9
50-59	126	17.9(3.1)	17.2	68	26.0(4.8)	18.4	58	5.0(2.1)	42.3
60-69	45	25.5(6.1)	23.9	32	33.6(7.4)	21.9	13	-(-)	-
70 이상	45	5.1(3.6)	69.6	22	11.2(7.5)	66.6	23	0.0(0.0)	.
생애주기별									
19-44	291	12.9(2.0)	15.3	148	16.3(3.0)	18.1	143	8.3(2.1)	25.9
45-64	236	19.3(2.8)	14.5	136	27.5(4.0)	14.4	100	5.8(2.4)	41.8
65-74	32	14.9(6.9)	46.3	17	-(-)	-	15	-(-)	-
75 이상	28	8.2(5.3)	65.2	14	-(-)	-	14	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	26	8.1(5.8)	72.3	10	-(-)	-	16	-(-)	-
초등학교	54	14.3(3.8)	26.6	22	25.1(8.4)	33.7	32	6.3(4.3)	68.1
중학교	54	19.1(4.5)	23.5	27	33.8(8.1)	23.8	27	3.4(3.2)	94.8
고등학교	270	16.6(2.8)	16.8	150	19.8(3.8)	19.1	120	11.9(2.9)	24.3
대학교 이상	183	12.9(2.7)	21.3	106	19.0(4.0)	21.0	77	2.6(1.8)	68.8
직업									
전문행정관리	104	16.3(3.5)	21.4	58	23.8(5.2)	21.8	46	4.9(3.1)	63.1
사무직	73	12.9(3.4)	26.6	46	19.6(5.0)	25.6	27	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	57	14.9(3.8)	25.7	25	20.3(6.9)	34.2	32	9.0(4.2)	46.0
농림어업	19	-(-)	-	14	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	155	19.1(3.7)	19.2	125	19.6(3.6)	18.5	30	16.2(8.2)	50.7
기타 ³⁾	176	9.9(1.9)	19.5	45	17.1(5.8)	34.2	131	7.2(2.0)	28.4
월 가구소득									
100만원 이하	103	16.1(3.4)	21.2	48	27.6(7.4)	26.6	55	5.8(2.9)	49.6
101-200만원	97	12.0(3.1)	25.6	49	17.5(5.1)	29.4	48	5.2(2.7)	51.7
201-300만원	119	19.1(4.3)	22.5	70	23.3(5.6)	23.9	49	12.0(5.0)	41.5
301-400만원	66	11.2(4.7)	42.2	37	10.1(5.1)	50.0	29	13.1(7.3)	55.6
401만원 이상	145	15.5(3.7)	24.1	77	23.7(5.7)	23.9	68	4.0(2.1)	54.0
거주유형									
읍·면	587	15.0(1.8)	12.3	315	20.7(2.9)	14.0	272	7.1(1.5)	20.6

주 : 1) 고위험음주율 : (최근 1년(365일) 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔)이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 29〉 알코올 의존정도(AUDIT)¹⁾ : 정상음주율, 문제음주율, 알코올의존율Ⅰ, 알코올의존율Ⅱ

(단위 : %)

구분	N	정상음주율 (7점 이하)		문제음주율 (8-15점)		알코올의존율Ⅰ (16-19점)		알코올의존율Ⅱ (20점 이상)	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	684	69.7(1.8)	2.6	21.4(1.8)	8.4	4.8(0.8)	17.1	4.1(0.8)	18.5
성									
남자	362	55.3(2.8)	5.0	29.8(2.8)	9.2	8.1(1.5)	17.9	6.7(1.3)	19.7
여자	322	88.8(1.7)	1.9	10.1(1.5)	15.2	0.3(0.3)	100.6	0.7(0.5)	70.2
연령									
19-29	73	77.8(4.6)	6.0	17.5(4.6)	26.2	3.6(2.5)	68.3	1.1(1.0)	94.5
30-39	135	63.8(3.8)	6.0	29.8(3.6)	12.2	3.1(1.4)	45.8	3.4(1.6)	47.7
40-49	195	67.9(2.7)	3.9	18.9(2.6)	13.6	9.5(2.0)	21.6	3.7(1.3)	34.5
50-59	143	65.0(4.0)	6.2	25.3(4.1)	16.0	3.1(1.4)	43.8	6.6(2.2)	33.3
60-69	65	74.7(5.5)	7.4	11.0(3.8)	34.8	5.5(2.7)	49.1	8.7(3.2)	36.7
70 이상	73	84.1(4.5)	5.3	11.6(4.0)	34.9	0.0(0.0)	.	4.4(2.4)	54.6
생애주기별									
19-44	316	69.4(2.5)	3.6	23.3(2.3)	9.9	5.0(1.2)	24.6	2.3(0.8)	33.6
45-64	271	66.9(2.9)	4.4	21.2(2.8)	13.3	5.8(1.2)	20.5	6.1(1.4)	23.3
65-74	52	81.8(4.5)	5.4	11.1(3.9)	35.5	0.0(0.0)	.	7.1(3.4)	48.2
75 이상	45	79.9(6.3)	7.9	12.9(5.6)	43.4	0.0(0.0)	.	7.3(3.8)	52.4
교육수준 ²⁾									
무학	45	84.6(6.3)	7.4	10.8(5.9)	54.5	0.0(0.0)	.	4.6(3.1)	67.9
초등학교	64	78.7(4.7)	6.0	12.3(4.4)	35.5	1.3(1.3)	99.7	7.7(2.9)	38.1
중학교	72	75.2(6.1)	8.2	13.7(4.6)	34.0	4.0(2.1)	51.9	7.1(2.9)	40.5
고등학교	304	66.6(2.9)	4.3	24.2(2.7)	11.1	5.8(1.3)	22.6	3.4(1.0)	29.6
대학교 이상	199	68.1(3.1)	4.6	23.2(2.8)	12.1	5.2(1.7)	32.4	3.5(1.2)	34.4
직업									
전문행정관리	113	69.4(4.9)	7.1	25.3(4.2)	16.5	1.6(1.1)	69.5	3.7(2.1)	55.5
사무직	78	58.9(5.4)	9.1	29.7(4.7)	15.9	11.5(3.6)	30.9	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	65	71.3(5.3)	7.4	21.5(6.2)	28.8	2.8(1.8)	63.5	4.4(2.4)	55.2
농림어업	27	61.5(11.5)	18.6	16.1(8.1)	50.2	11.3(8.2)	72.5	11.1(6.6)	59.5
기능단순노무직	168	58.8(4.2)	7.2	27.1(4.0)	15.0	7.7(2.4)	31.6	6.4(1.8)	28.3
기타 ³⁾	228	84.9(2.6)	3.0	11.0(1.9)	17.0	1.2(0.7)	57.8	3.0(1.2)	41.5
월 가구소득									
100만원 이하	134	76.2(3.7)	4.9	14.8(3.3)	22.0	2.1(1.1)	55.5	6.9(2.1)	30.7
101-200만원	113	75.4(4.4)	5.9	18.5(3.8)	20.4	4.0(1.7)	42.2	2.0(0.9)	44.9
201-300만원	140	65.2(3.7)	5.7	28.1(3.6)	12.7	3.5(2.6)	75.2	3.2(1.9)	59.6
301-400만원	72	78.1(6.7)	8.6	16.2(5.3)	32.5	4.5(2.2)	50.4	1.2(1.3)	103.2
401만원 이상	160	63.0(3.5)	5.5	22.0(3.4)	15.4	8.5(2.0)	23.7	6.5(1.9)	30.1
거주유형									
읍·면	684	69.7(1.8)	2.6	21.4(1.8)	8.4	4.8(0.8)	17.1	4.1(0.8)	18.5

주 : 1) 알코올 의존정도(AUDIT) : 정상음주율(7점 이하), 문제음주율(8-15점), 알코올의존율Ⅰ(16-19점), 알코올의존율Ⅱ(20점 이상)

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 30〉 음주문제로 인한 상담경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	587	0.4(0.2)	59.6	315	0.5(0.4)	73.0	272	0.3(0.3)	99.1
연령									
19-29	69	0.0(0.0)	.	31	0.0(0.0)	.	38	0.0(0.0)	.
30-39	121	0.0(0.0)	.	61	0.0(0.0)	.	60	0.0(0.0)	.
40-49	181	0.6(0.6)	101.6	101	1.0(1.0)	101.1	80	0.0(0.0)	.
50-59	126	0.6(0.6)	99.6	68	0.0(0.0)	.	58	1.6(1.6)	97.6
60-69	45	0.0(0.0)	.	32	0.0(0.0)	.	13	-(-)	-
70 이상	45	2.1(2.0)	94.5	22	4.7(4.4)	93.5	23	0.0(0.0)	.
생애주기별									
19-44	291	0.3(0.3)	101.8	148	0.5(0.5)	101.4	143	0.0(0.0)	.
45-64	236	0.3(0.3)	100.1	136	0.0(0.0)	.	100	0.9(0.9)	99.0
65-74	32	0.0(0.0)	.	17	-(-)	-	15	-(-)	-
75 이상	28	3.4(3.1)	90.6	14	-(-)	-	14	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	26	3.4(3.1)	92.4	10	-(-)	-	16	-(-)	-
초등학교	54	0.0(0.0)	.	22	0.0(0.0)	.	32	0.0(0.0)	.
중학교	54	0.0(0.0)	.	27	0.0(0.0)	.	27	0.0(0.0)	.
고등학교	270	0.2(0.2)	99.9	150	0.0(0.0)	.	120	0.6(0.6)	100.0
대학교 이상	183	0.5(0.5)	100.9	106	0.8(0.8)	100.8	77	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	104	0.9(0.9)	100.4	58	1.5(1.5)	98.2	46	0.0(0.0)	.
사무직	73	0.0(0.0)	.	46	0.0(0.0)	.	27	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	57	1.2(1.1)	98.3	25	0.0(0.0)	.	32	2.4(2.4)	100.5
농림어업	19	-(-)	-	14	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	155	0.0(0.0)	.	125	0.0(0.0)	.	30	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	176	0.4(0.4)	101.1	45	1.6(1.6)	99.3	131	0.0(0.0)	.
월 가구소득									
100만원 이하	103	0.8(0.8)	97.0	48	1.7(1.7)	99.3	55	0.0(0.0)	.
101-200만원	97	0.7(0.7)	100.0	49	0.0(0.0)	.	48	1.6(1.5)	98.4
201-300만원	119	0.0(0.0)	.	70	0.0(0.0)	.	49	0.0(0.0)	.
301-400만원	66	0.0(0.0)	.	37	0.0(0.0)	.	29	0.0(0.0)	.
401만원 이상	145	0.6(0.6)	101.6	77	1.1(1.1)	101.7	68	0.0(0.0)	.
거주유형									
읍·면	587	0.4(0.2)	59.6	315	0.5(0.4)	73.0	272	0.3(0.3)	99.1

주 : 1) 음주문제로 인한 상담경험률 : (최근 1년(365일) 동안 음주문제로 상담을 받아본 적이 있는 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 31〉 운전 시 안전벨트 착용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	560	77.4(2.1)	2.7	342	72.8(2.6)	3.6	218	86.1(2.3)	2.7
연령									
19-29	40	72.1(6.9)	9.6	27	73.1(9.2)	12.5	13	-(-)	-
30-39	127	73.9(3.4)	4.5	68	64.5(4.8)	7.4	59	87.6(3.4)	3.9
40-49	193	78.9(3.0)	3.8	114	75.9(3.6)	4.8	79	84.2(4.3)	5.1
50-59	138	81.9(3.5)	4.2	83	76.9(4.5)	5.9	55	92.1(3.7)	4.0
60-69	49	82.6(5.5)	6.7	38	80.0(6.1)	7.6	11	-(-)	-
70 이상	13	-(-)	-	12	-(-)	-	1	-(-)	-
생애주기별									
19-44	275	74.8(2.7)	3.6	158	69.4(3.7)	5.3	117	84.3(3.1)	3.7
45-64	259	82.0(2.6)	3.1	162	78.3(3.5)	4.4	97	89.5(3.2)	3.6
65-74	21	67.0(10.7)	16.0	17	-(-)	-	4	-(-)	-
75 이상	5	-(-)	-	5	-(-)	-	0	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	5	-(-)	-	4	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	26	75.6(7.4)	9.8	17	-(-)	-	9	-(-)	-
중학교	55	75.4(6.4)	8.5	34	68.2(9.3)	13.6	21	89.6(7.2)	8.0
고등학교	269	75.1(2.6)	3.4	168	71.4(3.4)	4.7	101	82.4(3.6)	4.4
대학교 이상	204	80.4(3.7)	4.6	118	74.8(4.6)	6.2	86	90.2(3.5)	3.9
직업									
전문행정관리	120	80.4(4.3)	5.4	70	78.6(5.2)	6.6	50	83.7(6.1)	7.3
사무직	84	74.9(5.1)	6.8	57	66.1(6.2)	9.3	27	97.1(2.8)	2.9
판매·서비스직	49	59.9(6.8)	11.4	23	47.2(8.9)	18.8	26	74.8(8.4)	11.2
농림어업	22	62.8(16.2)	25.8	20	64.0(15.5)	24.2	2	-(-)	-
기능단순노무직	159	79.4(2.8)	3.6	136	77.0(3.2)	4.1	23	96.0(3.8)	4.0
기타 ³⁾	123	83.7(3.4)	4.1	33	80.1(5.9)	7.4	90	85.1(3.6)	4.2
월 가구소득									
100만원 이하	62	78.4(5.5)	7.0	39	74.5(7.8)	10.5	23	85.7(7.1)	8.3
101-200만원	84	78.3(5.4)	6.9	55	77.0(6.3)	8.1	29	81.3(7.4)	9.0
201-300만원	129	76.3(4.6)	6.0	78	68.8(6.0)	8.7	51	90.7(3.9)	4.3
301-400만원	65	77.8(5.7)	7.4	42	77.7(6.9)	8.9	23	78.3(8.0)	10.3
401만원 이상	153	74.0(4.2)	5.6	84	68.1(4.6)	6.7	69	82.9(4.8)	5.8
거주유형									
읍·면	560	77.4(2.1)	2.7	342	72.8(2.6)	3.6	218	86.1(2.3)	2.7

주 : 1) 운전 시 안전벨트 착용률 : (자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 / 자동차 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 32〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	667	76.7(1.6)	2.1	342	71.8(2.4)	3.3	325	83.0(1.9)	2.3
연령									
19-29	74	67.1(5.6)	8.4	40	64.1(8.5)	13.2	34	72.5(8.6)	11.9
30-39	130	74.0(3.9)	5.3	63	68.7(5.4)	7.9	67	80.5(3.9)	4.8
40-49	199	77.1(3.1)	4.0	97	72.0(4.3)	6.0	102	82.8(3.9)	4.7
50-59	151	80.9(3.6)	4.5	75	75.4(5.3)	7.0	76	88.5(4.0)	4.5
60-69	63	93.2(2.8)	3.0	39	88.5(4.8)	5.4	24	100.0(0.0)	0.0
70 이상	50	80.0(5.6)	7.0	28	77.4(7.9)	10.2	22	82.9(7.3)	8.8
생애주기별									
19-44	317	72.7(2.2)	3.0	155	66.9(3.6)	5.3	162	80.3(3.0)	3.7
45-64	281	81.4(2.5)	3.1	149	77.9(3.5)	4.4	132	86.2(3.4)	3.9
65-74	45	84.0(6.6)	7.8	21	78.4(9.8)	12.5	24	88.3(5.7)	6.4
75 이상	24	82.2(7.7)	9.3	17	-(-)	-	7	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	30	90.4(4.7)	5.3	11	-(-)	-	19	-(-)	-
초등학교	49	86.3(5.3)	6.2	20	81.5(9.5)	11.7	29	89.8(5.1)	5.7
중학교	72	76.1(4.9)	6.5	38	73.4(7.9)	10.8	34	79.6(6.7)	8.4
고등학교	317	72.9(2.4)	3.3	164	68.2(3.7)	5.4	153	79.1(3.1)	4.0
대학교 이상	198	79.1(3.4)	4.4	108	74.2(5.1)	6.8	90	86.5(3.3)	3.8
직업									
전문행정관리	118	77.1(3.7)	4.8	64	75.3(5.7)	7.6	54	79.5(5.3)	6.7
사무직	78	73.0(5.7)	7.8	50	67.2(6.9)	10.3	28	85.2(7.0)	8.2
판매·서비스직	59	64.2(7.1)	11.0	21	43.9(10.9)	24.7	38	79.6(6.0)	7.5
농림어업	23	75.7(13.1)	17.3	19	-(-)	-	4	-(-)	-
기능단순노무직	163	76.8(3.0)	3.9	131	74.5(3.3)	4.4	32	88.4(6.7)	7.6
기타 ³⁾	221	81.6(2.3)	2.8	53	75.5(5.5)	7.3	168	84.1(2.8)	3.3
월 가구소득									
100만원 이하	117	78.4(3.1)	3.9	55	73.4(6.1)	8.3	62	83.2(4.8)	5.8
101-200만원	97	84.0(3.8)	4.6	56	80.9(5.7)	7.1	41	89.5(4.0)	4.5
201-300만원	132	73.5(5.3)	7.2	66	66.4(7.3)	10.9	66	82.3(5.2)	6.3
301-400만원	60	76.1(6.8)	9.0	32	80.5(8.1)	10.1	28	69.7(8.6)	12.3
401만원 이상	162	72.1(2.8)	3.9	83	64.6(4.2)	6.6	79	82.2(4.4)	5.4
거주유형									
읍·면	667	76.7(1.6)	2.1	342	71.8(2.4)	3.3	325	83.0(1.9)	2.3

주 : 1) 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 : (다른 사람이 운전하는 자동차의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 동승차량 앞좌석 탑승자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 33〉 연간 자동차 음주운전차량 동승률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	904	8.0(1.2)	14.7	413	9.9(1.7)	16.7	491	6.1(1.2)	19.4
연령									
19-29	96	9.8(2.9)	29.6	42	12.3(4.7)	38.4	54	6.9(3.1)	44.3
30-39	156	6.8(3.0)	43.7	68	9.2(4.2)	45.1	88	4.4(2.6)	59.5
40-49	241	10.4(2.6)	25.2	119	10.0(2.8)	28.3	122	10.8(3.1)	28.2
50-59	196	9.3(2.5)	27.2	87	10.9(3.7)	34.1	109	7.6(2.5)	32.2
60-69	99	5.3(2.1)	38.4	50	11.3(4.2)	37.1	49	0.0(0.0)	.
70 이상	116	1.6(1.6)	98.2	47	2.0(2.0)	96.9	69	1.4(1.4)	99.5
생애주기별									
19-44	387	9.4(1.5)	15.5	175	11.5(2.3)	20.4	212	7.2(1.7)	23.9
45-64	364	8.5(1.9)	22.7	174	10.0(2.5)	25.3	190	6.9(1.9)	28.2
65-74	80	1.2(1.2)	99.5	32	0.0(0.0)	.	48	1.9(1.9)	99.1
75 이상	73	1.2(1.2)	98.7	32	2.9(2.8)	95.7	41	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	82	2.2(1.5)	67.1	19	-(-)	-	63	1.5(1.4)	96.7
초등학교	105	4.9(1.9)	39.2	38	4.5(0.8)	16.8	67	5.1(3.0)	57.9
중학교	99	6.6(2.6)	39.9	44	8.0(3.6)	45.1	55	5.3(2.2)	41.1
고등학교	389	8.9(1.8)	20.1	195	11.0(2.5)	23.0	194	6.3(1.7)	26.7
대학교 이상	228	9.8(2.7)	27.7	116	10.6(3.6)	33.6	112	8.7(2.8)	32.3
직업									
전문행정관리	143	9.3(2.5)	27.4	71	12.1(4.5)	37.1	72	5.8(3.3)	56.5
사무직	89	9.8(3.1)	32.2	54	11.1(4.0)	35.7	35	7.4(4.3)	57.7
판매·서비스직	80	10.5(3.3)	31.7	28	11.2(5.8)	51.4	52	10.0(4.0)	40.7
농림어업	38	9.9(4.7)	47.5	24	11.9(6.3)	53.4	14	-(-)	-
기능단순노무직	197	9.2(2.3)	24.7	151	10.5(2.6)	24.4	46	3.8(2.6)	68.6
기타 ³⁾	351	5.5(1.2)	22.0	81	5.0(2.6)	51.7	270	5.7(1.5)	26.4
월 가구소득									
100만원 이하	199	4.0(1.0)	24.1	78	6.8(2.3)	33.2	121	2.1(0.6)	30.1
101-200만원	135	8.2(2.4)	29.7	63	12.4(4.2)	34.3	72	3.8(2.1)	54.4
201-300만원	178	6.9(3.1)	45.3	83	8.2(3.5)	43.1	95	5.4(3.1)	56.8
301-400만원	85	3.9(3.0)	76.6	42	3.8(3.6)	95.6	43	3.9(2.7)	67.4
401만원 이상	189	18.4(2.4)	12.9	91	19.1(3.3)	17.5	98	17.6(3.7)	21.2
거주유형									
읍·면	904	8.0(1.2)	14.7	413	9.9(1.7)	16.7	491	6.1(1.2)	19.4

주 : 1) 연간 자동차 음주운전차량 동승률 : (최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 탄 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 34〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이) 및 연간 자동차 음주운전 경험횟수

(단위 : %, 회)

구분	연간 음주운전 경험률 ¹⁾ (자동차 또는 오토바이)									연간 자동차 음주운전 경험횟수 ²⁾		
	전체			남자			여자			N	회(표준오차)	변동계수
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수			
전체	564	11.9(2.2)	18.4	346	15.0(2.8)	18.6	218	5.9(1.6)	26.6	3	-()	-
연령												
19-29	41	8.8(4.6)	52.1	28	11.4(5.9)	52.2	13	-()	-	3	-()	-
30-39	126	11.0(3.4)	30.6	67	13.0(4.1)	31.8	59	8.1(4.1)	50.5	0	-()	-
40-49	195	11.4(2.8)	24.7	116	13.8(3.1)	22.8	79	7.4(2.9)	39.4			
50-59	136	12.1(3.7)	30.4	81	16.5(5.6)	33.7	55	3.5(1.8)	50.5	0	-()	-
60-69	49	24.4(5.8)	23.9	38	32.5(7.3)	22.3	11	-()	-	0	-()	-
70 이상	17	-()	-	16	-()	-	1	-()	-	2	-()	-
생애주기별										1	-()	-
19-44	276	10.3(2.5)	24.6	159	12.0(3.2)	26.7	117	7.2(2.4)	33.5	0	-()	-
45-64	259	13.8(2.8)	20.4	162	18.7(3.8)	20.1	97	4.0(1.4)	35.2	0	-()	-
65-74	21	20.3(8.6)	42.0	17	-()	-	4	-()	-			
75 이상	8	-()	-	8	-()	-	0	-()	-	1	-()	-
교육수준 ³⁾										2	-()	-
무학	5	-()	-	4	-()	-	1	-()	-	0	-()	-
초등학교	28	2.9(2.9)	99.4	19	-()	-	9	-()	-	0	-()	-
중학교	57	15.9(4.4)	28.0	36	21.1(6.7)	31.7	21	5.3(1.0)	18.3			
고등학교	271	9.9(2.0)	20.6	170	11.6(2.4)	20.6	101	6.6(2.5)	37.5	0	-()	-
대학교 이상	202	14.4(4.1)	28.7	116	19.4(5.8)	29.8	86	5.8(2.4)	41.2	0	-()	-
직업										0	-()	-
전문행정관리	120	10.7(3.1)	29.1	70	13.2(4.0)	30.1	50	6.1(3.3)	54.3	2	-()	-
사무직	84	11.3(5.0)	44.1	57	14.0(6.5)	46.3	27	4.4(4.3)	98.6	1	-()	-
판매·서비스직	50	15.8(4.0)	25.3	24	26.0(7.0)	26.8	26	3.2(0.7)	20.8			
농림어업	22	25.8(10.4)	40.5	20	27.9(12.1)	43.3	2	-()	-	0	-()	-
기능단순노무직	159	13.6(3.4)	25.1	136	14.9(3.8)	25.3	23	4.0(3.8)	94.6	0	-()	-
기타 ⁴⁾	125	7.2(2.2)	30.8	35	6.3(3.5)	55.9	90	7.6(2.5)	32.9	2	-()	-
월 가구소득										0	-()	-
100만원 이하	65	11.6(3.8)	32.9	42	13.1(5.6)	42.4	23	8.6(4.9)	56.9	1	-()	-
101-200만원	84	9.0(3.6)	40.0	55	12.8(5.1)	39.6	29	0.0(0.0)	.	0	-()	-
201-300만원	129	9.7(3.0)	31.2	78	11.3(4.0)	35.2	51	6.7(3.5)	52.2			
301-400만원	65	6.5(2.6)	39.9	42	7.8(3.6)	46.9	23	3.8(3.8)	100.3	0	-()	-
401만원 이상	153	22.8(5.0)	22.0	84	31.7(6.9)	21.6	69	9.3(3.2)	33.9	1	-()	-
거주유형										1	-()	-
읍·면	564	11.9(2.2)	18.4	346	15.0(2.8)	18.6	218	5.9(1.6)	26.6	1	-()	-

주 : 1) 연간 음주운전 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 수/ 자동차 또는 오토바이 운전자 수) × 100

2) 연간 자동차 음주운전 경험횟수 : 자동차 음주운전 횟수의 총 합 / 자동차 음주운전자 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 35〉 격렬한 신체활동 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	921	14.4(1.4)	9.7	427	17.8(1.9)	10.9	494	10.9(1.5)	13.8
연령									
19-29	97	14.1(3.3)	23.4	43	18.5(4.7)	25.2	54	8.8(4.2)	48.0
30-39	159	12.7(3.0)	23.6	71	13.7(4.1)	29.5	88	11.7(3.6)	31.2
40-49	243	16.6(2.4)	14.6	121	20.1(3.6)	17.8	122	12.5(2.9)	23.3
50-59	198	18.0(3.2)	17.8	89	20.0(4.3)	21.6	109	15.6(2.9)	18.8
60-69	103	15.4(3.9)	25.6	53	22.7(5.8)	25.5	50	8.6(4.3)	50.0
70 이상	121	5.8(2.5)	42.6	50	8.8(4.4)	50.1	71	4.0(2.0)	50.3
생애주기별									
19-44	392	12.6(1.9)	15.3	180	15.2(2.9)	18.8	212	9.8(2.0)	20.8
45-64	370	20.4(2.2)	11.0	179	24.4(3.2)	13.0	191	15.7(2.3)	14.8
65-74	84	6.2(2.7)	44.1	34	7.3(4.0)	55.3	50	5.5(3.0)	54.7
75 이상	75	4.7(2.3)	48.0	34	7.8(4.5)	57.8	41	2.5(2.4)	96.0
교육수준 ²⁾									
무학	84	6.4(2.2)	34.1	20	8.0(5.5)	68.9	64	6.0(2.5)	41.4
초등학교	108	16.4(4.6)	28.2	40	23.0(6.7)	29.2	68	12.7(4.9)	39.0
중학교	100	15.9(3.5)	22.4	45	21.0(6.0)	28.6	55	11.1(3.7)	33.1
고등학교	394	17.7(2.2)	12.4	199	23.3(3.1)	13.1	195	10.8(2.0)	18.3
대학교 이상	234	10.2(1.8)	17.7	122	8.8(2.2)	25.2	112	12.2(3.5)	28.3
직업									
전문행정관리	145	12.5(2.8)	22.2	73	12.3(4.0)	32.2	72	12.8(3.5)	27.6
사무직	92	12.1(3.3)	27.7	57	14.6(4.6)	31.5	35	7.2(3.8)	52.9
판매·서비스직	80	15.0(4.7)	31.6	28	23.6(7.9)	33.7	52	8.5(4.3)	50.2
농림어업	39	24.1(9.6)	39.9	25	20.9(11.2)	53.6	14	-()	-
기능단순노무직	200	19.9(2.9)	14.8	154	20.0(3.5)	17.4	46	19.4(5.8)	30.0
기타 ³⁾	359	11.6(1.9)	16.8	86	19.1(4.5)	23.8	273	9.0(2.0)	22.6
월 가구소득									
100만원 이하	204	10.5(2.2)	21.4	81	11.0(3.2)	29.1	123	10.1(3.1)	30.2
101-200만원	137	18.8(3.4)	18.4	65	29.1(5.7)	19.7	72	7.6(2.7)	36.2
201-300만원	179	16.0(3.7)	23.1	84	19.7(5.0)	25.3	95	11.8(4.4)	37.6
301-400만원	87	19.6(5.2)	26.5	44	25.6(6.2)	24.2	43	11.9(5.2)	44.1
401만원 이상	193	16.0(2.7)	16.7	94	14.3(3.4)	24.0	99	18.1(3.6)	20.0
거주유형									
읍·면	921	14.4(1.4)	9.7	427	17.8(1.9)	10.9	494	10.9(1.5)	13.8

주 : 1) 격렬한 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 36〉 중등도 신체활동 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	919	13.1(1.2)	8.8	425	17.6(1.9)	10.6	494	8.3(1.2)	13.9
연령									
19-29	97	11.9(4.1)	34.7	43	18.8(6.4)	34.0	54	3.5(3.4)	97.0
30-39	159	10.6(2.9)	27.0	71	17.9(4.9)	27.4	88	3.0(1.8)	59.1
40-49	242	15.9(2.1)	13.5	120	18.8(3.3)	17.6	122	12.6(3.1)	24.7
50-59	198	15.1(2.6)	17.2	89	16.2(3.4)	20.9	109	13.8(3.4)	24.7
60-69	103	13.6(3.4)	25.0	53	18.6(5.1)	27.4	50	9.0(4.0)	44.9
70 이상	120	9.1(2.3)	25.2	49	13.0(4.4)	34.1	71	6.8(2.7)	39.1
생애주기별									
19-44	391	12.1(1.7)	14.2	179	18.1(3.0)	16.8	212	5.5(1.4)	25.9
45-64	370	15.8(1.7)	10.9	179	18.2(2.5)	13.9	191	13.0(2.3)	17.4
65-74	84	13.6(3.6)	26.6	34	18.6(5.7)	30.8	50	10.8(4.2)	38.6
75 이상	74	4.9(2.3)	48.1	33	8.2(4.6)	57.0	41	2.5(2.4)	96.0
교육수준 ²⁾									
무학	84	16.1(2.9)	18.2	20	30.0(7.6)	25.2	64	11.8(3.5)	29.5
초등학교	107	12.9(3.2)	24.7	39	13.4(4.6)	34.1	68	12.6(4.3)	34.5
중학교	100	10.8(3.8)	35.4	45	17.2(6.6)	38.2	55	5.0(2.7)	55.1
고등학교	393	13.7(1.9)	13.5	198	18.1(2.8)	15.3	195	8.4(2.0)	23.6
대학교 이상	234	12.1(1.9)	15.5	122	16.9(2.9)	17.3	112	5.7(2.3)	40.6
직업									
전문행정관리	145	11.9(2.7)	23.1	73	14.2(4.0)	28.5	72	9.0(3.2)	36.0
사무직	92	8.8(2.8)	31.5	57	12.3(4.1)	33.2	35	2.2(2.2)	97.9
판매·서비스직	80	12.1(3.7)	31.0	28	8.9(6.1)	68.8	52	14.5(5.2)	35.6
농림어업	38	37.3(8.0)	21.5	24	40.9(10.1)	24.7	14	-(-)	-
기능단순노무직	200	25.2(3.2)	12.7	154	24.5(3.7)	15.0	46	27.9(7.0)	25.0
기타 ³⁾	358	5.0(1.1)	21.8	85	9.8(3.2)	33.0	273	3.4(1.1)	30.8
월 가구소득									
100만원 이하	203	12.7(2.7)	20.9	80	15.3(4.4)	28.8	123	11.0(3.0)	27.3
101-200만원	137	11.2(2.9)	25.9	65	19.0(5.1)	27.1	72	2.6(1.8)	69.5
201-300만원	179	13.0(2.9)	22.5	84	18.6(4.8)	25.7	95	6.8(2.6)	38.2
301-400만원	87	20.8(5.2)	25.0	44	27.7(7.3)	26.3	43	11.9(5.2)	43.6
401만원 이상	193	15.7(2.9)	18.7	94	18.1(4.3)	23.7	99	12.7(3.1)	24.3
거주유형									
읍·면	919	13.1(1.2)	8.8	425	17.6(1.9)	10.6	494	8.3(1.2)	13.9

주 : 1) 중등도 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 37〉 중등도 이상 신체활동 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	919	21.8(1.6)	7.1	425	28.2(2.1)	7.3	494	15.2(1.6)	10.8
연령									
19-29	97	22.1(4.4)	20.0	43	30.2(6.4)	21.1	54	12.3(5.1)	41.7
30-39	159	20.0(4.2)	21.2	71	25.9(5.6)	21.8	88	13.8(4.0)	28.8
40-49	242	24.4(2.6)	10.7	120	28.9(4.1)	14.3	122	19.3(3.4)	17.5
50-59	198	26.2(3.5)	13.3	89	31.7(4.3)	13.6	109	20.0(3.6)	18.1
60-69	103	21.4(4.5)	20.9	53	29.5(6.4)	21.8	50	13.9(5.1)	37.1
70 이상	120	11.2(3.0)	27.1	49	16.6(5.4)	32.4	71	7.9(2.9)	36.8
생애주기별									
19-44	391	21.1(2.3)	11.0	179	27.5(3.4)	12.5	212	13.9(2.1)	15.2
45-64	370	26.7(2.3)	8.4	179	32.5(3.2)	9.9	191	20.1(2.6)	12.7
65-74	84	16.8(3.5)	20.8	34	21.0(6.0)	28.7	50	14.4(4.1)	28.3
75 이상	74	6.0(2.5)	42.5	33	10.9(5.3)	49.2	41	2.5(2.4)	96.0
교육수준 ²⁾									
무학	84	17.1(2.9)	17.0	20	34.3(8.0)	23.2	64	11.8(3.5)	29.5
초등학교	107	20.6(4.4)	21.5	39	25.6(6.7)	26.0	68	17.8(4.8)	27.3
중학교	100	24.6(4.7)	18.9	45	33.9(7.6)	22.5	55	16.1(4.5)	28.0
고등학교	393	24.2(2.4)	10.1	198	31.5(3.3)	10.5	195	15.2(2.3)	15.2
대학교 이상	234	19.1(2.2)	11.6	122	21.8(3.2)	14.6	112	15.3(3.6)	23.7
직업									
전문행정관리	145	21.1(3.3)	15.8	73	25.4(4.8)	19.1	72	15.8(4.1)	25.9
사무직	92	16.5(3.5)	21.4	57	20.3(4.8)	23.7	35	9.5(4.3)	45.4
판매·서비스직	80	21.8(4.2)	19.2	28	26.4(8.1)	30.6	52	18.3(5.3)	29.0
농림어업	38	47.0(9.3)	19.7	24	53.0(11.2)	21.2	14	—(—)	—
기능단순노무직	200	32.6(3.2)	9.9	154	32.7(3.8)	11.5	46	32.1(7.1)	22.1
기타 ³⁾	358	14.7(2.1)	14.5	85	23.9(4.6)	19.1	273	11.5(2.2)	19.2
월 가구소득									
100만원 이하	203	17.9(3.1)	17.3	80	22.5(4.7)	20.8	123	14.9(3.2)	21.7
101-200만원	137	22.6(3.4)	15.2	65	36.4(5.5)	15.0	72	7.6(2.7)	36.2
201-300만원	179	21.3(4.1)	19.1	84	27.0(5.5)	20.3	95	15.1(4.7)	31.2
301-400만원	87	31.4(5.8)	18.4	44	42.0(6.8)	16.2	43	17.6(5.8)	32.8
401만원 이상	193	27.4(3.4)	12.6	94	27.8(4.6)	16.5	99	26.8(4.3)	16.1
거주유형									
읍·면	919	21.8(1.6)	7.1	425	28.2(2.1)	7.3	494	15.2(1.6)	10.8

주 : 1) 중등도 이상 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 38〉 걷기 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	919	41.3(1.7)	4.0	425	42.6(2.2)	5.1	494	39.9(2.0)	5.1
연령									
19-29	96	41.3(5.1)	12.4	42	40.2(7.9)	19.7	54	42.6(6.2)	14.7
30-39	158	32.8(4.6)	14.2	70	36.5(7.4)	20.3	88	29.1(4.1)	14.2
40-49	243	43.5(2.7)	6.3	121	46.3(3.7)	8.0	122	40.2(4.4)	11.0
50-59	198	38.4(3.3)	8.6	89	36.2(4.4)	12.1	109	40.9(4.4)	10.8
60-69	103	55.2(5.4)	9.8	53	56.3(7.9)	14.1	50	54.2(6.9)	12.7
70 이상	121	47.0(4.8)	10.3	50	53.9(6.2)	11.5	71	42.8(6.2)	14.6
생애주기별									
19-44	390	38.3(2.6)	6.9	178	40.3(4.0)	10.0	212	36.2(2.6)	7.1
45-64	370	43.4(2.8)	6.4	179	44.1(3.3)	7.5	191	42.6(3.5)	8.3
65-74	84	53.0(5.9)	11.1	34	46.5(8.6)	18.4	50	56.8(7.3)	12.8
75 이상	75	39.9(5.6)	14.1	34	51.3(7.6)	14.7	41	31.4(7.0)	22.3
교육수준 ²⁾									
무학	84	41.2(4.6)	11.2	20	43.3(9.0)	20.8	64	40.6(4.9)	12.2
초등학교	108	39.9(4.8)	11.9	40	33.3(7.6)	22.8	68	43.6(6.6)	15.1
중학교	100	45.4(5.3)	11.6	45	43.5(7.4)	16.9	55	47.1(6.6)	14.0
고등학교	394	44.0(2.5)	5.6	199	44.3(3.2)	7.2	195	43.6(3.2)	7.3
대학교 이상	232	36.4(3.2)	8.9	120	42.1(4.5)	10.8	112	29.0(3.8)	13.1
직업									
전문행정관리	145	42.1(4.8)	11.5	73	37.9(5.7)	15.0	72	47.1(6.3)	13.3
사무직	91	33.4(4.8)	14.4	56	40.2(6.5)	16.1	35	20.8(6.4)	30.9
판매·서비스직	80	45.9(7.2)	15.7	28	58.1(9.6)	16.5	52	36.8(8.3)	22.7
농림어업	39	58.6(9.8)	16.7	25	47.1(10.4)	22.1	14	-(-)	-
기능단순노무직	200	41.8(3.8)	9.1	154	42.9(4.3)	10.0	46	37.3(7.0)	18.9
기타 ³⁾	358	40.1(2.3)	5.8	85	41.9(4.8)	11.4	273	39.5(2.7)	7.0
월 가구소득									
100만원 이하	203	48.4(3.6)	7.5	80	48.2(6.0)	12.4	123	48.6(4.5)	9.3
101-200만원	136	42.0(4.8)	11.4	64	42.9(7.5)	17.5	72	41.0(5.3)	12.9
201-300만원	179	36.7(4.4)	11.9	84	42.3(5.8)	13.8	95	30.5(4.5)	14.6
301-400만원	87	41.8(5.9)	14.1	44	46.4(7.7)	16.6	43	35.9(7.4)	20.5
401만원 이상	193	36.7(2.9)	7.8	94	35.8(4.0)	11.2	99	37.9(4.3)	11.4
거주유형									
읍·면	919	41.3(1.7)	4.0	425	42.6(2.2)	5.1	494	39.9(2.0)	5.1

주 : 1) 걷기 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 걷기를 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 39〉 지역사회 내 운동시설 접근율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	868	77.0(2.0)	2.5	403	76.8(2.2)	2.9	465	77.2(2.3)	3.0
연령									
19-29	94	69.2(4.7)	6.7	42	70.9(6.5)	9.1	52	67.1(6.8)	10.1
30-39	151	87.8(2.6)	2.9	66	83.4(4.7)	5.6	85	92.3(2.9)	3.1
40-49	237	85.7(2.5)	2.9	117	83.8(3.3)	3.9	120	87.8(3.4)	3.9
50-59	189	71.6(3.7)	5.1	85	72.9(4.0)	5.5	104	70.2(4.7)	6.7
60-69	94	71.8(5.6)	7.9	49	67.8(6.2)	9.2	45	75.5(6.7)	8.8
70 이상	103	57.4(5.4)	9.5	44	67.5(7.8)	11.6	59	50.9(5.3)	10.5
생애주기별									
19-44	376	81.5(2.5)	3.1	171	78.4(3.4)	4.3	205	84.8(2.7)	3.2
45-64	356	76.5(2.8)	3.6	173	78.3(2.9)	3.7	183	74.5(3.6)	4.8
65-74	72	62.7(6.0)	9.6	30	62.5(8.5)	13.6	42	62.8(7.3)	11.6
75 이상	64	54.5(8.2)	15.1	29	60.8(11.0)	18.0	35	50.0(8.1)	16.3
교육수준 ²⁾									
무학	76	53.2(5.7)	10.7	18	—(—)	—	58	48.4(5.0)	10.3
초등학교	96	67.1(5.4)	8.1	37	62.5(6.7)	10.7	59	69.9(5.9)	8.5
중학교	94	62.7(6.4)	10.2	43	54.5(9.5)	17.5	51	70.2(6.2)	8.8
고등학교	376	83.3(2.3)	2.7	188	82.6(3.1)	3.7	188	84.0(2.8)	3.3
대학교 이상	225	81.1(3.1)	3.8	116	78.7(4.0)	5.0	109	84.3(3.5)	4.1
직업									
전문행정관리	139	77.0(3.4)	4.4	69	70.3(5.0)	7.1	70	85.1(4.7)	5.5
사무직	86	75.2(4.7)	6.3	52	80.7(5.8)	7.2	34	65.5(8.6)	13.1
판매·서비스직	78	79.0(5.0)	6.4	28	77.3(8.2)	10.6	50	80.4(4.9)	6.1
농림어업	37	62.1(10.4)	16.8	23	63.5(12.4)	19.5	14	—(—)	—
기능단순노무직	195	81.5(3.1)	3.8	149	82.4(3.2)	3.8	46	78.0(7.6)	9.7
기타 ³⁾	327	76.2(2.4)	3.1	78	73.7(5.0)	6.8	249	77.1(2.5)	3.3
월 가구소득									
100만원 이하	184	62.4(5.5)	8.8	74	66.1(6.0)	9.0	110	59.9(5.9)	9.8
101-200만원	132	67.6(5.5)	8.1	63	62.2(7.4)	11.8	69	73.6(5.3)	7.2
201-300만원	169	81.0(3.9)	4.8	79	78.5(4.9)	6.2	90	83.7(4.3)	5.1
301-400만원	86	85.6(5.3)	6.2	43	91.1(4.5)	4.9	43	78.6(7.3)	9.3
401만원 이상	187	86.8(3.2)	3.7	91	83.9(4.1)	4.9	96	90.4(3.1)	3.5
거주유형									
읍·면	868	77.0(2.0)	2.5	403	76.8(2.2)	2.9	465	77.2(2.3)	3.0

주 : 1) 지역사회 내 운동시설 접근율 : (최근 1년(365일) 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 찾기 "매우 쉬웠다" 또는 "쉬웠다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 40〉 지역사회 내 운동프로그램 참여율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	881	4.7(0.9)	19.6	404	2.8(0.9)	33.4	477	6.7(1.5)	22.3
연령									
19-29	92	1.7(1.2)	69.3	40	0.0(0.0)	.	52	3.7(2.6)	71.1
30-39	151	6.9(2.3)	32.9	66	3.0(3.0)	100.1	85	10.9(3.9)	35.9
40-49	237	5.7(2.0)	35.1	116	3.2(1.9)	59.7	121	8.5(3.1)	35.8
50-59	185	3.1(1.1)	35.5	84	1.1(1.0)	96.2	101	5.4(1.8)	33.6
60-69	99	4.9(4.0)	81.4	51	4.8(4.6)	96.2	48	5.1(3.7)	73.9
70 이상	117	5.5(2.2)	40.2	47	10.4(4.7)	45.3	70	2.7(1.9)	70.4
생애주기별									
19-44	375	5.1(1.4)	27.9	168	2.8(1.5)	53.0	207	7.6(2.3)	30.0
45-64	352	4.2(1.4)	32.5	172	1.6(1.2)	72.7	180	7.2(2.1)	29.4
65-74	81	4.6(1.9)	41.9	32	6.3(2.8)	43.5	49	3.7(2.5)	67.7
75 이상	73	5.0(3.0)	60.5	32	8.8(6.2)	70.5	41	2.3(2.4)	101.6
교육수준 ²⁾									
무학	83	2.2(1.5)	66.6	20	0.0(0.0)	.	63	2.9(1.9)	66.1
초등학교	103	5.6(2.9)	51.7	37	6.8(4.9)	72.6	66	5.0(2.8)	55.9
중학교	96	1.4(1.3)	98.1	43	2.9(2.8)	98.5	53	0.0(0.0)	.
고등학교	374	6.3(1.4)	22.6	188	2.6(0.8)	31.8	186	10.8(2.8)	25.6
대학교 이상	224	3.8(1.6)	42.7	115	2.7(2.0)	74.7	109	5.3(2.4)	45.7
직업									
전문행정관리	139	3.4(1.7)	49.5	71	2.8(2.1)	75.0	68	4.3(2.5)	57.7
사무직	86	5.8(2.4)	40.7	51	2.3(2.1)	95.0	35	11.9(6.3)	53.1
판매·서비스직	79	7.1(2.4)	34.1	28	0.0(0.0)	.	51	12.5(3.9)	30.8
농림어업	39	8.1(3.3)	40.8	25	9.0(6.4)	70.6	14	-(-)	-
기능단순노무직	192	3.5(2.1)	59.4	146	2.2(1.4)	62.7	46	8.5(5.9)	69.2
기타 ³⁾	340	5.0(1.4)	27.3	79	4.4(2.1)	48.4	261	5.1(1.6)	31.1
월 가구소득									
100만원 이하	197	4.3(1.7)	39.3	77	6.8(3.5)	51.1	120	2.7(0.9)	32.4
101-200만원	131	6.5(2.6)	39.8	60	6.6(4.2)	64.4	71	6.4(3.4)	52.8
201-300만원	174	1.7(1.7)	100.7	81	1.0(1.0)	100.9	93	2.4(2.4)	100.7
301-400만원	85	7.3(3.3)	45.1	43	1.9(1.9)	100.6	42	14.3(6.1)	42.4
401만원 이상	190	6.9(1.8)	25.8	92	0.7(0.7)	101.5	98	14.3(3.6)	25.5
거주유형									
읍·면	881	4.7(0.9)	19.6	404	2.8(0.9)	33.4	477	6.7(1.5)	22.3

주 : 1) 지역사회 내 운동프로그램 참여율 : (최근 1년(365일) 동안 본인이 거주하고 있는 지역의 동사무소, 보건소, 구청, 시청 등의 지방자치단체 운동프로그램에 참여한 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 41〉 아침식사 섭취빈도 및 아침결식예방 인구비율¹⁾

(단위 : %)

구분	N	0일		1~2일		3~4일		5~7일	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	921	13.2(1.3)	9.6	4.1(0.8)	20.3	6.6(1.0)	14.7	76.1(1.8)	2.3
성									
남자	427	13.0(1.7)	13.2	4.6(1.3)	27.5	6.4(1.4)	21.9	76.0(2.3)	3.1
여자	494	13.4(1.5)	11.3	3.6(0.9)	24.7	6.9(1.5)	21.3	76.1(1.9)	2.5
연령									
19~29	97	26.5(5.0)	18.7	10.1(3.5)	34.3	9.9(3.3)	33.6	53.5(5.4)	10.1
30~39	159	18.2(3.3)	18.2	6.6(2.1)	31.6	13.4(2.9)	22.0	61.8(4.3)	7.0
40~49	243	10.5(2.0)	19.1	2.3(0.9)	41.0	5.5(1.2)	21.9	81.7(2.5)	3.1
50~59	198	10.4(2.1)	20.6	2.5(1.1)	45.8	2.1(0.8)	37.7	85.1(2.3)	2.7
60~69	103	1.9(1.4)	70.8	0.0(0.0)	.	2.5(1.9)	75.5	95.6(2.3)	2.4
70 이상	121	2.7(1.2)	44.5	0.0(0.0)	.	2.2(1.3)	57.4	95.1(1.7)	1.8
생애주기별									
19~44	392	19.2(2.1)	11.0	6.5(1.4)	22.1	10.4(1.7)	16.2	63.9(2.7)	4.2
45~64	370	8.4(1.3)	15.8	2.1(0.7)	34.4	3.1(0.8)	25.9	86.4(1.6)	1.9
65~74	84	2.5(1.8)	70.7	0.0(0.0)	.	2.1(1.4)	70.3	95.4(2.3)	2.4
75 이상	75	3.0(1.4)	46.1	0.0(0.0)	.	1.2(1.2)	99.0	95.8(1.8)	1.9
교육수준 ²⁾									
무학	84	2.4(1.1)	44.0	0.0(0.0)	.	3.7(2.1)	57.6	93.9(2.3)	2.4
초등학교	108	5.0(2.6)	51.8	0.0(0.0)	.	0.8(0.8)	98.9	94.2(2.7)	2.8
중학교	100	8.3(3.0)	35.7	0.0(0.0)	.	1.4(0.2)	11.2	90.3(2.9)	3.2
고등학교	394	14.9(2.2)	14.7	4.0(1.0)	25.4	6.5(1.2)	19.1	74.7(2.6)	3.5
대학교 이상	234	17.8(3.0)	16.8	8.1(2.2)	27.7	11.4(2.1)	18.8	62.7(3.4)	5.4
직업									
전문행정관리	145	12.5(2.6)	20.6	3.4(1.8)	54.7	8.2(2.4)	29.5	76.0(3.8)	5.0
사무직	92	20.8(3.3)	16.1	9.5(3.1)	32.5	14.4(4.0)	27.6	55.3(4.6)	8.4
판매·서비스직	80	19.5(4.1)	21.1	6.9(3.4)	49.0	4.8(2.5)	52.3	68.9(4.8)	7.0
농림어업	39	2.9(2.9)	99.5	0.0(0.0)	.	6.0(4.4)	73.4	91.1(4.8)	5.2
기능단순노무직	200	11.9(2.6)	21.5	3.9(1.5)	38.8	4.1(1.4)	34.6	80.1(3.2)	4.0
기타 ³⁾	359	11.4(1.5)	13.5	2.6(0.9)	34.6	5.8(1.5)	25.2	80.2(2.2)	2.7
월 가구소득									
100만원 이하	204	11.4(2.7)	23.8	2.7(2.2)	81.8	5.3(1.8)	33.3	80.5(3.9)	4.9
101~200만원	137	12.9(3.2)	25.1	3.7(1.7)	46.3	7.2(2.6)	36.2	76.1(4.6)	6.1
201~300만원	179	12.7(3.2)	25.0	7.9(2.5)	31.6	6.6(2.2)	32.9	72.7(4.3)	5.9
301~400만원	87	12.2(4.2)	34.8	4.3(2.3)	54.0	7.0(2.7)	37.9	76.4(4.3)	5.6
401만원 이상	193	13.8(2.8)	20.3	4.3(1.4)	32.4	8.3(2.2)	26.6	73.6(3.9)	5.3
거주유형									
읍·면	921	13.2(1.3)	9.6	4.1(0.8)	20.3	6.6(1.0)	14.7	76.1(1.8)	2.3

주 : 1) 아침결식예방 인구비율 : (최근 1주일(7일)동안 5회 이상 아침식사를 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 42〉 저염선택율¹⁾

(단위 : %)

구분	N	Type I		Type II		Type III	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	920	34.5(1.6)	4.6	30.7(1.7)	5.4	14.0(1.1)	7.9
성							
남자	426	36.1(2.3)	6.3	27.2(2.2)	8.3	13.0(1.4)	10.8
여자	494	32.7(2.3)	6.9	34.4(2.2)	6.3	15.0(1.4)	9.1
연령							
19-29	97	37.1(4.2)	11.2	29.9(3.8)	12.7	11.0(2.7)	24.7
30-39	159	40.0(3.0)	7.5	31.8(3.7)	11.6	12.2(2.5)	20.8
40-49	243	37.2(3.2)	8.5	26.4(3.4)	12.9	14.7(2.3)	16.0
50-59	197	31.4(3.1)	10.0	30.9(3.5)	11.3	15.1(2.5)	16.4
60-69	103	30.1(4.8)	16.0	34.1(4.6)	13.5	18.0(5.0)	27.8
70 이상	121	21.6(3.4)	15.6	37.4(3.6)	9.6	15.7(4.0)	25.2
생애주기별							
19-44	392	40.3(2.0)	5.0	28.0(2.5)	8.8	11.9(1.6)	13.8
45-64	369	30.0(2.5)	8.4	32.7(2.6)	7.9	15.9(1.8)	11.5
65-74	84	28.0(4.5)	15.9	37.6(4.1)	10.9	18.0(4.4)	24.4
75 이상	75	19.5(4.4)	22.3	33.9(5.5)	16.2	16.2(5.4)	33.6
교육수준 ²⁾							
무학	84	28.2(5.0)	17.9	29.8(4.6)	15.3	16.6(4.7)	28.3
초등학교	108	23.7(4.4)	18.4	48.9(4.5)	9.2	16.3(3.2)	19.7
중학교	100	29.3(4.3)	14.6	28.7(5.1)	17.7	18.1(4.0)	22.3
고등학교	394	34.9(2.4)	6.8	30.7(2.6)	8.5	12.7(1.4)	11.3
대학교 이상	233	41.1(2.9)	7.0	25.9(2.6)	10.1	13.4(2.2)	16.2
직업							
전문행정관리	145	29.7(3.7)	12.6	23.2(4.1)	17.6	23.8(3.8)	15.8
사무직	92	32.7(6.6)	20.1	40.3(6.2)	15.5	7.5(2.5)	32.5
판매·서비스직	80	40.0(5.8)	14.4	26.5(5.8)	21.9	12.1(3.0)	24.7
농림어업	39	36.8(8.2)	22.2	26.3(7.8)	29.8	15.2(5.6)	37.0
기능단순노무직	200	38.2(3.6)	9.3	29.1(3.8)	13.0	11.6(2.2)	18.7
기타 ³⁾	358	33.5(2.8)	8.2	33.7(2.4)	7.2	13.3(1.7)	12.8
월 가구소득							
100만원 이하	204	25.4(3.0)	11.7	44.2(3.8)	8.5	15.6(3.1)	19.6
101-200만원	137	33.3(4.1)	12.2	32.4(4.3)	13.1	17.0(3.6)	20.9
201-300만원	179	38.4(3.7)	9.7	28.9(4.1)	14.3	13.1(2.3)	17.2
301-400만원	87	42.2(6.1)	14.5	31.4(6.0)	19.3	15.6(4.2)	27.1
401만원 이상	193	35.8(3.9)	10.9	23.5(3.2)	13.7	10.7(3.0)	27.7
거주유형							
읍·면	920	34.5(1.6)	4.6	30.7(1.7)	5.4	14.0(1.1)	7.9

주 : 1) 저염선택율 : 3문항 중 「한 가지만 선택한 경우 Type I, 두 가지를 선택한 경우 Type II, 세 가지 모두 선택 시 Type III」

- ① 평소 음식을 먹을 때 “약간 싱겁게 먹는다” 또는 “아주 싱겁게 먹는다”에 응답한 사람의 수 또는,
 ② 조리된 음식을 먹을 때 소금이나 간장을 “전혀 더 넣지 않는다”에 응답한 사람의 수 또는,
 ③ 전, 부침, 튀김 등을 먹을 때 간장에 “찍어 먹지 않는다”에 응답한 사람의 수

/ 조사대상 응답자 수 × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 43〉 가공식품 선택 시 영양표시 이용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	919	30.6(1.5)	5.0	427	18.6(1.8)	9.9	492	43.2(2.2)	5.0
연령									
19-29	96	39.0(5.0)	12.7	43	23.4(5.3)	22.8	53	58.4(6.9)	11.7
30-39	159	43.9(3.2)	7.2	71	25.1(4.3)	17.2	88	63.6(5.0)	7.8
40-49	243	38.9(3.2)	8.3	121	24.2(4.8)	19.9	122	55.8(4.3)	7.8
50-59	198	22.2(3.4)	15.2	89	10.5(3.2)	30.2	109	35.4(5.3)	14.9
60-69	103	4.9(1.6)	32.5	53	3.7(2.7)	72.1	50	6.0(1.9)	32.4
70 이상	120	6.7(2.8)	41.4	50	7.7(3.7)	47.4	70	6.1(2.8)	46.2
생애주기별									
19-44	391	41.7(2.3)	5.5	180	25.1(2.7)	10.8	211	60.3(3.4)	5.7
45-64	370	23.7(2.4)	10.1	179	13.0(2.6)	19.8	191	35.9(3.4)	9.4
65-74	84	10.9(3.5)	32.3	34	8.6(4.6)	53.2	50	12.2(3.8)	31.4
75 이상	74	1.2(1.2)	99.9	34	2.7(2.7)	98.8	40	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	83	3.8(2.2)	58.3	20	0.0(0.0)	.	63	5.0(2.9)	58.4
초등학교	107	6.4(2.5)	38.6	40	5.0(2.8)	56.9	67	7.3(3.1)	42.1
중학교	100	15.7(3.2)	20.5	45	1.7(1.6)	95.3	55	28.6(5.6)	19.5
고등학교	394	35.2(2.4)	6.9	199	17.1(2.8)	16.3	195	57.6(3.1)	5.5
대학교 이상	234	43.3(2.9)	6.7	122	30.6(3.8)	12.3	112	60.3(4.0)	6.6
직업									
전문행정관리	145	39.3(3.9)	9.8	73	30.6(4.4)	14.3	72	49.9(5.5)	11.0
사무직	92	27.2(4.6)	16.9	57	12.4(4.1)	33.2	35	55.3(8.2)	14.9
판매·서비스직	80	38.1(5.3)	13.8	28	27.5(6.1)	22.0	52	46.0(7.0)	15.2
농림어업	39	2.6(2.5)	97.2	25	4.0(3.8)	95.7	14	-(-)	-
기능단순노무직	200	23.4(3.2)	13.8	154	20.3(3.5)	17.0	46	36.2(7.2)	19.9
기타 ³⁾	357	34.3(2.7)	7.8	86	9.9(3.0)	30.0	271	42.7(3.1)	7.3
월 가구소득									
100만원 이하	203	19.9(4.5)	22.7	81	17.0(5.7)	33.3	122	21.8(4.8)	21.9
101-200만원	137	29.4(3.7)	12.7	65	18.3(4.0)	21.7	72	41.5(6.4)	15.5
201-300만원	178	32.4(3.4)	10.3	84	17.0(3.8)	22.4	94	49.8(5.4)	10.9
301-400만원	87	36.3(7.2)	20.0	44	19.2(7.3)	38.1	43	58.4(8.8)	15.1
401만원 이상	193	34.7(3.9)	11.1	94	19.6(4.4)	22.7	99	52.8(4.3)	8.2
거주유형									
읍·면	919	30.6(1.5)	5.0	427	18.6(1.8)	9.9	492	43.2(2.2)	5.0

주 : 1) 가공식품 선택 시 영양표시 이용률 : (영양표시를 “항상 읽는다” 또는 “가끔 읽는다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 44〉 영양교육 및 상담수혜율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	905	3.9(0.6)	15.9	418	1.9(0.7)	35.3	487	5.9(1.0)	16.3
연령									
19-29	96	6.7(2.5)	37.2	42	0.0(0.0)	.	54	14.7(5.3)	36.0
30-39	156	7.2(1.8)	24.8	70	5.8(2.4)	42.3	86	8.7(2.4)	27.8
40-49	241	2.2(1.2)	53.0	120	2.1(1.5)	72.6	121	2.4(1.4)	57.1
50-59	196	3.3(1.1)	32.1	89	0.0(0.0)	.	107	7.1(2.3)	32.4
60-69	101	0.0(0.0)	.	52	0.0(0.0)	.	49	0.0(0.0)	.
70 이상	115	0.7(0.7)	101.8	45	2.0(2.0)	99.7	70	0.0(0.0)	.
생애주기별									
19-44	386	5.7(1.1)	19.3	177	2.3(1.0)	43.5	209	9.4(1.8)	19.5
45-64	367	2.5(0.9)	34.3	179	1.4(1.0)	72.4	188	3.8(1.2)	31.5
65-74	80	1.0(1.0)	99.8	31	2.8(2.7)	97.0	49	0.0(0.0)	.
75 이상	72	0.0(0.0)	.	31	0.0(0.0)	.	41	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	81	0.0(0.0)	.	18	-(-)	-	63	0.0(0.0)	.
초등학교	106	0.0(0.0)	.	38	0.0(0.0)	.	68	0.0(0.0)	.
중학교	98	1.8(1.3)	72.4	44	0.0(0.0)	.	54	3.4(2.5)	72.6
고등학교	386	3.2(0.9)	26.8	196	0.6(0.4)	71.4	190	6.4(1.7)	26.8
대학교 이상	233	8.0(1.6)	19.6	121	5.0(1.8)	36.9	112	12.0(2.7)	22.9
직업									
전문행정관리	143	9.1(2.3)	25.4	71	5.5(2.5)	45.7	72	13.4(3.4)	25.6
사무직	90	0.9(0.9)	99.7	55	1.4(1.4)	100.9	35	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	80	3.1(1.9)	60.9	28	0.0(0.0)	.	52	5.4(3.3)	61.0
농림어업	39	0.0(0.0)	.	25	0.0(0.0)	.	14	-(-)	-
기능단순노무직	197	2.9(1.5)	51.3	151	1.7(1.2)	71.1	46	7.7(4.1)	53.2
기타 ³⁾	350	3.9(1.0)	26.1	84	0.8(0.8)	98.6	266	4.9(1.3)	26.4
월 가구소득									
100만원 이하	199	3.3(1.7)	50.5	78	3.0(2.2)	74.4	121	3.5(1.6)	45.7
101-200만원	136	3.5(1.4)	38.6	64	4.1(1.8)	43.2	72	2.9(2.1)	73.9
201-300만원	175	2.1(1.0)	47.6	83	0.0(0.0)	.	92	4.5(2.2)	48.0
301-400만원	86	3.3(2.7)	79.8	44	1.5(1.5)	102.1	42	5.8(5.6)	97.1
401만원 이상	192	5.9(1.9)	31.6	94	2.7(1.6)	59.5	98	9.7(2.7)	27.8
거주유형									
읍·면	905	3.9(0.6)	15.9	418	1.9(0.7)	35.3	487	5.9(1.0)	16.3

주 : 1) 영양교육 및 상담수혜율 : (최근 1년(365일) 동안 영양교육 및 상담을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 45〉 식품 안정성 확보율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	920	92.6(1.3)	1.4	426	93.0(1.4)	1.5	494	92.2(1.4)	1.5
연령									
19-29	97	93.5(2.4)	2.6	43	95.1(3.3)	3.4	54	91.5(3.6)	3.9
30-39	159	97.0(1.4)	1.4	71	97.3(1.9)	1.9	88	96.6(1.9)	2.0
40-49	242	96.4(1.0)	1.1	120	96.6(1.6)	1.7	122	96.2(1.7)	1.8
50-59	198	97.2(1.5)	1.5	89	95.4(2.7)	2.8	109	99.2(0.8)	0.8
60-69	103	86.3(4.0)	4.6	53	87.1(5.6)	6.4	50	85.5(4.5)	5.2
70 이상	121	69.6(5.2)	7.5	50	63.6(7.2)	11.3	71	73.3(5.4)	7.4
생애주기별									
19-44	392	95.9(1.1)	1.1	180	96.4(1.4)	1.4	212	95.3(1.6)	1.6
45-64	369	95.4(1.4)	1.4	178	95.9(1.8)	1.8	191	95.0(1.6)	1.7
65-74	84	70.6(4.9)	7.0	34	67.0(8.5)	12.7	50	72.7(5.6)	7.6
75 이상	75	74.9(5.8)	7.8	34	63.2(9.3)	14.6	41	83.6(5.7)	6.8
교육수준 ²⁾									
무학	84	72.7(5.4)	7.4	20	61.7(9.0)	14.6	64	76.1(6.3)	8.3
초등학교	108	85.8(4.1)	4.7	40	83.4(6.2)	7.5	68	87.1(3.8)	4.3
중학교	100	88.3(4.4)	5.0	45	84.2(6.2)	7.4	55	92.0(4.0)	4.4
고등학교	393	95.1(1.3)	1.4	198	95.3(1.8)	1.9	195	94.9(1.4)	1.4
대학교 이상	234	97.5(1.1)	1.2	122	97.2(1.6)	1.7	112	97.9(1.5)	1.5
직업									
전문행정관리	145	98.1(1.1)	1.1	73	98.8(1.2)	1.2	72	97.3(2.0)	2.0
사무직	91	97.1(2.1)	2.1	56	97.2(2.7)	2.8	35	96.8(3.1)	3.2
판매·서비스직	80	98.8(1.2)	1.2	28	97.1(2.9)	3.0	52	100.0(0.0)	0.0
농림어업	39	89.8(5.0)	5.6	25	87.7(7.5)	8.5	14	—(—)	—
기능단순노무직	200	95.5(1.4)	1.4	154	95.3(1.6)	1.7	46	96.2(2.5)	2.6
기타 ³⁾	359	85.8(2.4)	2.7	86	78.6(4.8)	6.1	273	88.2(2.2)	2.5
월 가구소득									
100만원 이하	204	81.0(3.7)	4.5	81	78.2(4.8)	6.1	123	83.0(3.7)	4.4
101-200만원	137	89.5(3.5)	3.9	65	90.0(4.1)	4.5	72	88.8(4.3)	4.8
201-300만원	179	99.6(0.4)	0.4	84	100.0(0.0)	0.0	95	99.2(0.9)	0.9
301-400만원	87	97.7(1.6)	1.6	44	98.1(1.8)	1.9	43	97.2(2.8)	2.9
401만원 이상	192	97.0(2.2)	2.3	93	95.3(3.3)	3.4	99	99.0(1.0)	1.0
거주유형									
읍·면	920	92.6(1.3)	1.4	426	93.0(1.4)	1.5	494	92.2(1.4)	1.5

주 : 1) 식품 안정성 확보율 : (“우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다” 또는 “우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 46〉 식생활 지침 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	857	12.7(1.1)	8.5	389	8.7(1.4)	15.9	468	16.7(1.6)	9.7
연령									
19-29	91	8.8(2.7)	30.8	42	4.6(3.1)	67.6	49	14.5(4.6)	32.0
30-39	158	13.4(2.5)	18.9	70	10.1(3.2)	31.5	88	16.8(3.9)	23.2
40-49	231	18.8(2.9)	15.2	113	11.6(3.0)	26.2	118	26.7(4.5)	16.7
50-59	180	15.7(2.1)	13.4	76	11.3(3.0)	26.2	104	20.1(3.6)	17.8
60-69	92	3.9(1.7)	42.8	47	5.5(2.4)	44.0	45	2.3(2.3)	98.4
70 이상	105	3.1(1.4)	46.4	41	0.0(0.0)	.	64	4.8(2.3)	47.2
생애주기별									
19-44	379	12.9(1.5)	11.9	175	8.5(2.0)	23.3	204	17.9(2.1)	11.7
45-64	341	15.6(1.9)	12.1	157	11.2(2.3)	20.4	184	20.1(3.1)	15.6
65-74	73	4.3(3.2)	74.0	31	0.0(0.0)	.	42	7.1(5.3)	74.1
75 이상	64	1.8(1.8)	99.3	26	0.0(0.0)	.	38	2.9(2.8)	98.5
교육수준 ²⁾									
무학	73	0.0(0.0)	.	17	-(-)	-	56	0.0(0.0)	.
초등학교	90	3.7(2.2)	59.5	32	6.9(4.9)	71.9	58	1.9(1.9)	99.9
중학교	97	14.0(3.5)	24.9	43	5.2(3.3)	63.6	54	22.0(6.2)	28.4
고등학교	371	15.3(1.4)	9.2	180	9.2(1.9)	20.8	191	22.4(2.6)	11.8
대학교 이상	226	13.6(2.7)	19.8	117	9.9(2.7)	26.8	109	18.5(4.2)	22.7
직업									
전문행정관리	136	16.9(2.6)	15.6	66	10.9(3.4)	30.9	70	23.9(4.0)	16.9
사무직	91	11.1(3.2)	28.7	56	6.6(3.1)	46.9	35	19.4(6.2)	31.8
판매·서비스직	77	16.5(6.2)	37.6	26	16.9(8.0)	47.1	51	16.2(7.2)	44.6
농림어업	33	0.0(0.0)	.	23	0.0(0.0)	.	10	-(-)	-
기능단순노무직	184	12.3(2.4)	19.3	144	10.4(2.5)	24.2	40	21.1(7.2)	34.1
기타 ³⁾	332	11.8(1.9)	15.7	72	3.3(2.5)	77.4	260	14.5(2.2)	15.5
월 가구소득									
100만원 이하	178	6.3(2.4)	38.4	68	4.1(2.9)	71.5	110	7.8(2.9)	37.4
101-200만원	124	9.3(2.3)	24.3	56	5.1(2.8)	53.8	68	13.5(4.0)	29.4
201-300만원	164	12.3(2.9)	23.6	75	6.8(2.9)	41.9	89	18.2(4.4)	24.4
301-400만원	85	15.7(4.2)	27.1	42	12.5(4.9)	39.1	43	19.7(7.0)	35.6
401만원 이상	188	16.6(2.5)	15.1	92	13.6(3.0)	21.7	96	20.3(4.0)	19.9
거주유형									
읍·면	857	12.7(1.1)	8.5	389	8.7(1.4)	15.9	468	16.7(1.6)	9.7

주 : 1) 식생활 지침 인지율 : ('한국인을 위한 식생활지침'에 대한 내용을 한 번이라도 들어본 적이 있으며 내용을 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 47〉 비만도 분포 및 비만율

(단위 : %, 평균)

구분	N	비만도 분포 ¹⁾						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율) ²⁾		평균(표준오차)	변동계수
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수		
전체	843	5.2(0.8)	15.0	71.0(1.6)	2.3	23.7(1.4)	6.1	23.0(0.1)	0.4
성									
남자	406	2.0(0.7)	34.8	70.8(2.5)	3.6	27.2(2.4)	8.7	23.4(0.1)	0.5
여자	437	8.9(1.3)	15.2	71.3(1.8)	2.5	19.8(1.8)	9.0	22.5(0.1)	0.6
연령									
19-29	90	11.6(3.0)	25.7	76.3(4.7)	6.2	12.0(3.6)	29.9	21.5(0.3)	1.2
30-39	148	5.4(1.6)	29.9	66.4(3.8)	5.7	28.3(3.6)	12.7	23.3(0.2)	1.0
40-49	235	1.1(0.8)	73.1	68.8(2.8)	4.0	30.1(2.9)	9.8	23.4(0.2)	0.7
50-59	190	1.2(0.9)	71.2	73.8(2.8)	3.9	25.0(2.7)	10.9	23.6(0.2)	0.8
60-69	92	6.8(2.9)	42.4	70.1(5.4)	7.7	23.2(4.5)	19.4	23.0(0.3)	1.2
70 이상	88	13.3(4.3)	32.1	74.0(5.4)	7.4	12.7(3.3)	25.9	21.9(0.4)	1.6
생애주기별									
19-44	370	6.1(1.2)	19.9	69.1(2.4)	3.5	24.9(2.2)	8.8	22.8(0.1)	0.6
45-64	353	1.8(0.7)	36.6	74.1(1.9)	2.5	24.0(1.9)	7.9	23.4(0.1)	0.5
65-74	64	7.0(3.0)	43.1	65.8(6.4)	9.8	27.3(6.0)	21.8	23.0(0.3)	1.4
75 이상	56	19.4(6.0)	31.1	75.2(7.3)	9.6	5.4(2.8)	52.7	21.0(0.4)	1.8
교육수준 ³⁾									
무학	59	13.7(4.4)	32.4	68.6(6.2)	9.1	17.7(4.9)	27.9	22.2(0.5)	2.1
초등학교	97	6.6(2.7)	40.0	65.2(4.8)	7.4	28.1(4.3)	15.2	23.4(0.3)	1.1
중학교	90	5.6(2.8)	50.2	66.8(5.1)	7.6	27.7(4.5)	16.3	23.2(0.3)	1.2
고등학교	372	4.2(1.1)	25.8	73.1(2.6)	3.6	22.7(2.5)	10.8	22.9(0.1)	0.6
대학교 이상	224	4.7(1.5)	31.5	71.9(3.1)	4.3	23.4(2.9)	12.2	22.9(0.2)	0.9
직업									
전문행정관리	140	4.1(1.8)	42.8	74.2(3.8)	5.1	21.7(3.3)	15.0	23.1(0.3)	1.2
사무직	88	4.1(1.9)	46.2	71.6(4.3)	6.0	24.3(4.0)	16.7	23.0(0.2)	1.0
판매·서비스직	76	3.5(2.4)	67.4	71.8(5.0)	7.0	24.7(5.2)	21.1	22.7(0.4)	1.8
농림어업	34	5.0(3.6)	72.1	77.7(6.5)	8.4	17.3(6.4)	36.8	22.4(0.4)	2.0
기능단순노무직	193	1.6(0.8)	50.1	67.6(3.2)	4.7	30.8(3.2)	10.3	23.6(0.2)	0.8
기타 ⁴⁾	306	9.5(1.7)	18.1	70.9(2.4)	3.3	19.6(2.2)	11.5	22.6(0.2)	0.8
월 가구소득									
100만원 이하	175	7.4(2.2)	29.6	76.9(3.8)	4.9	15.7(2.9)	18.3	22.4(0.2)	0.9
101-200만원	127	7.7(2.2)	29.3	69.5(4.3)	6.2	22.9(4.3)	19.0	22.6(0.3)	1.2
201-300만원	174	5.9(1.6)	27.7	65.7(4.0)	6.1	28.4(3.7)	13.1	23.4(0.2)	1.1
301-400만원	85	4.4(2.3)	52.5	66.5(5.3)	7.9	29.1(4.8)	16.6	23.3(0.3)	1.5
401만원 이상	187	3.2(1.5)	47.8	71.9(3.0)	4.1	24.9(2.9)	11.8	23.1(0.2)	0.9
거주유형									
읍·면	843	5.2(0.8)	15.0	71.0(1.6)	2.3	23.7(1.4)	6.1	23.0(0.1)	0.4

주 : 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만율 : (체질량지수(kg/m²) 25 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 48〉 주관적 비만인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	919	31.8(1.7)	5.4	426	26.2(2.4)	9.1	493	37.6(2.0)	5.4
연령									
19-29	97	21.7(3.9)	18.2	43	21.3(5.7)	26.7	54	22.3(5.7)	25.7
30-39	159	37.1(3.8)	10.4	71	30.9(5.9)	19.1	88	43.5(4.2)	9.7
40-49	243	38.7(2.9)	7.5	121	30.1(4.1)	13.6	122	48.5(3.8)	7.8
50-59	198	36.8(3.1)	8.5	89	31.7(4.9)	15.5	109	42.5(3.7)	8.8
60-69	103	22.2(3.8)	17.0	53	8.5(3.6)	42.8	50	35.0(6.0)	17.1
70 이상	119	19.0(4.4)	23.1	49	16.2(5.4)	33.6	70	20.7(4.9)	23.6
생애주기별									
19-44	392	33.1(2.5)	7.4	180	29.5(3.5)	11.9	212	37.1(3.0)	8.0
45-64	370	34.1(2.4)	7.1	179	25.2(3.5)	14.0	191	44.4(3.1)	7.0
65-74	83	25.3(4.9)	19.3	34	10.5(3.9)	36.7	49	34.0(6.9)	20.4
75 이상	74	15.1(4.8)	31.6	33	15.8(7.4)	46.8	41	14.6(4.9)	33.8
교육수준 ²⁾									
무학	82	21.0(4.1)	19.5	19	-(-)	-	63	22.2(4.8)	21.5
초등학교	108	37.7(4.1)	10.9	40	31.3(7.3)	23.3	68	41.3(5.3)	12.8
중학교	100	34.4(4.3)	12.4	45	19.8(7.0)	35.3	55	47.8(5.9)	12.2
고등학교	394	30.4(2.4)	7.9	199	24.7(3.0)	12.3	195	37.4(3.5)	9.3
대학교 이상	234	33.4(3.3)	10.0	122	29.2(4.4)	15.2	112	39.1(4.7)	12.0
직업									
전문행정관리	145	29.6(3.9)	13.3	73	23.6(6.3)	26.8	72	37.0(5.8)	15.6
사무직	92	31.9(3.9)	12.3	57	28.3(5.3)	18.6	35	38.6(7.8)	20.2
판매·서비스직	80	27.1(4.7)	17.2	28	27.8(9.5)	34.2	52	26.5(6.1)	23.0
농림어업	39	9.0(5.1)	56.2	25	10.2(7.0)	68.3	14	-(-)	-
기능단순노무직	200	31.4(3.1)	9.7	154	28.5(3.7)	12.8	46	43.5(7.1)	16.2
기타 ³⁾	357	36.2(2.7)	7.4	85	24.3(5.4)	22.4	272	40.2(3.1)	7.8
월 가구소득									
100만원 이하	203	24.5(3.9)	15.9	81	17.4(4.5)	25.9	122	29.3(4.6)	15.6
101-200만원	137	27.9(4.2)	15.0	65	23.1(5.4)	23.5	72	33.2(5.8)	17.6
201-300만원	179	36.7(3.8)	10.4	84	31.8(5.5)	17.2	95	42.1(5.0)	12.0
301-400만원	87	36.1(4.9)	13.6	44	27.6(5.1)	18.5	43	47.1(7.8)	16.6
401만원 이상	193	34.5(3.9)	11.3	94	32.5(6.0)	18.5	99	36.9(5.1)	13.8
거주유형									
읍·면	919	31.8(1.7)	5.4	426	26.2(2.4)	9.1	493	37.6(2.0)	5.4

주 : 1) 주관적 비만인지율 : (“약간 비만” 또는 “매우 비만”이라고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 49〉 체중조절 시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	918	35.1(1.8)	5.2	426	26.8(2.4)	8.8	492	43.7(2.5)	5.7
연령									
19-29	95	32.9(5.7)	17.4	42	28.6(7.8)	27.1	53	38.1(7.5)	19.6
30-39	159	42.4(3.9)	9.1	71	28.8(5.7)	20.0	88	56.7(5.2)	9.2
40-49	242	43.9(3.0)	6.8	121	30.0(3.7)	12.5	121	60.0(4.4)	7.4
50-59	198	32.0(3.4)	10.7	89	23.5(4.2)	18.0	109	41.6(4.7)	11.2
60-69	103	30.1(5.3)	17.6	53	34.8(7.2)	20.7	50	25.8(5.7)	22.3
70 이상	121	11.7(2.9)	24.6	50	6.0(3.3)	56.2	71	15.3(4.0)	26.2
생애주기별									
19-44	389	40.1(2.8)	7.1	179	28.3(4.1)	14.5	210	53.2(4.0)	7.5
45-64	370	35.6(2.5)	6.9	179	30.0(3.2)	10.5	191	42.1(3.3)	7.9
65-74	84	25.2(4.9)	19.3	34	9.9(4.8)	48.9	50	34.0(7.3)	21.4
75 이상	75	2.6(1.8)	68.9	34	6.1(4.1)	67.8	41	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	84	8.0(3.1)	38.6	20	0.0(0.0)	.	64	10.4(3.9)	37.0
초등학교	108	25.1(4.0)	15.9	40	15.9(6.2)	39.3	68	30.4(4.6)	15.1
중학교	100	34.5(5.1)	14.8	45	22.2(7.2)	32.4	55	45.8(6.9)	15.0
고등학교	391	37.5(2.5)	6.6	198	28.0(3.1)	11.2	193	49.3(3.4)	6.9
대학교 이상	234	42.2(3.2)	7.5	122	31.8(4.4)	13.9	112	56.2(4.7)	8.3
직업									
전문행정관리	145	40.7(4.8)	11.7	73	33.4(6.8)	20.2	72	49.7(5.8)	11.7
사무직	92	39.1(4.5)	11.5	57	30.4(5.0)	16.6	35	55.7(7.9)	14.2
판매·서비스직	80	36.5(4.5)	12.2	28	23.4(8.4)	35.9	52	46.2(6.7)	14.5
농림어업	39	6.3(4.4)	70.0	25	9.6(6.6)	69.1	14	-(-)	-
기능단순노무직	200	32.0(3.6)	11.2	154	27.5(3.8)	14.0	46	50.8(8.5)	16.7
기타 ³⁾	356	36.4(2.9)	7.9	85	23.4(6.4)	27.1	271	40.8(2.9)	7.1
월 가구소득									
100만원 이하	204	21.4(3.5)	16.3	81	8.2(3.4)	41.5	123	30.3(5.0)	16.5
101-200만원	137	29.0(4.4)	15.2	65	24.4(5.1)	20.9	72	34.0(6.3)	18.5
201-300만원	179	46.0(4.1)	8.9	84	40.4(6.0)	14.9	95	52.1(5.8)	11.2
301-400만원	87	37.6(6.5)	17.3	44	23.6(7.5)	31.7	43	55.8(7.8)	14.0
401만원 이상	193	48.3(4.0)	8.4	94	36.5(5.4)	14.8	99	62.6(4.4)	7.1
거주유형									
읍·면	918	35.1(1.8)	5.2	426	26.8(2.4)	8.8	492	43.7(2.5)	5.7

주 : 1) 체중조절 시도율 : (최근 1년(365일) 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 50〉 체중조절 시도방법¹⁾

(단위 : %)

구분	운동		단식 (24시간 이상)		식사량 감소 혹은 식단조절		임의로 살 빼는 약 복용		의사 처방으로 살 빼는 약 복용		한약 복용		건강기능 식품		원푸드 다이어트 (포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만 먹는 다이어트 방법)	
	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
전체	84.2(1.9)	2.3	4.6(1.3)	27.8	79.9(2.8)	3.5	1.3(0.7)	49.6	1.9(0.7)	36.3	3.1(1.1)	35.5	4.0(1.1)	28.9	2.1(0.7)	35.1
성																
남자	88.6(3.0)	3.4	1.1(1.1)	98.1	72.1(4.6)	6.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.8(0.8)	101.4	1.1(1.1)	98.1
여자	81.4(2.7)	3.3	6.9(2.1)	30.0	84.9(2.8)	3.3	2.2(1.1)	51.1	3.1(1.1)	36.4	5.0(1.8)	35.3	6.0(1.9)	31.2	2.7(1.1)	39.9
연령																
19~29	92.0(4.7)	5.1	7.2(3.7)	51.0	91.1(5.0)	5.4	0.0(0.0)	.	4.9(3.0)	61.6	0.0(0.0)	.	2.4(2.3)	97.1	4.8(3.1)	63.7
30~39	74.2(5.4)	7.2	8.0(3.4)	42.6	77.0(4.8)	6.2	1.3(1.2)	97.1	1.3(1.2)	95.3	7.0(3.1)	43.5	7.0(2.9)	41.0	4.1(2.3)	56.5
40~49	85.6(3.8)	4.4	4.1(2.1)	52.2	79.9(4.2)	5.3	3.2(1.9)	59.0	2.7(1.5)	55.5	4.1(2.1)	51.6	2.5(1.8)	72.3	0.8(0.8)	98.1
50~59	90.7(3.1)	3.4	1.2(1.2)	99.8	74.9(6.4)	8.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	4.2(2.2)	52.6	0.0(0.0)	.
60~69	88.2(6.9)	7.8	0.0(0.0)	.	75.6(7.9)	10.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	4.1(4.0)	98.0	0.0(0.0)	.
70 이상	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
생애주기별																
19~44	81.5(2.8)	3.4	7.1(2.1)	29.1	84.3(3.1)	3.6	1.8(0.9)	48.0	3.2(1.1)	33.5	4.8(1.9)	39.9	5.0(1.6)	32.1	3.5(1.2)	34.7
45~64	88.8(2.5)	2.8	1.3(0.9)	71.4	71.5(4.6)	6.4	0.7(0.7)	99.5	0.0(0.0)	.	0.7(0.7)	98.3	2.9(1.4)	48.9	0.0(0.0)	.
65~74	86.1(6.9)	8.0	0.0(0.0)	.	87.3(7.1)	8.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
75 이상	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
교육수준 ²⁾																
무학	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	78.8(7.1)	9.0	0.0(0.0)	.	79.8(9.4)	11.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	4.4(4.4)	99.7	0.0(0.0)	.
중학교	84.8(5.2)	6.1	0.0(0.0)	.	72.5(7.5)	10.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.8(2.7)	97.9	2.4(2.3)	95.2	0.0(0.0)	.
고등학교	87.9(2.8)	3.2	6.0(1.8)	30.2	79.6(4.0)	5.0	2.2(1.0)	47.1	2.0(1.1)	55.6	2.9(1.4)	49.5	4.9(1.7)	34.3	3.1(1.4)	44.9
대학교 이상	79.9(3.8)	4.7	5.0(2.5)	48.8	82.0(3.8)	4.7	0.7(0.7)	100.9	2.7(1.4)	53.0	4.2(2.2)	51.8	3.2(2.0)	61.1	1.7(1.2)	69.9
직업																
전문행정관리	88.1(5.2)	5.9	5.6(3.2)	57.7	78.2(5.8)	7.4	4.4(2.4)	55.5	1.8(1.7)	97.3	6.2(3.4)	54.9	6.2(3.5)	56.1	1.8(1.8)	100.2
사무직	85.2(5.2)	6.1	8.5(4.7)	55.7	86.0(5.6)	6.5	0.0(0.0)	.	2.9(2.8)	97.7	0.0(0.0)	.	2.8(2.8)	98.4	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	77.7(7.1)	9.1	6.6(4.7)	70.9	82.8(6.3)	7.7	2.7(2.6)	99.5	3.9(3.9)	98.9	8.4(5.6)	67.0	5.7(5.3)	92.7	3.9(3.9)	98.9
농림어업	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	84.7(4.9)	5.7	2.0(1.9)	97.1	72.9(6.1)	8.4	1.2(1.1)	92.6	2.8(1.8)	67.2	1.2(1.1)	92.6	4.1(2.1)	50.5	3.2(2.1)	66.6
기타 ³⁾	84.2(3.2)	3.8	3.9(2.0)	51.6	82.7(3.6)	4.4	0.0(0.0)	.	0.7(0.7)	101.1	2.4(1.2)	51.9	2.8(1.4)	48.6	1.9(1.3)	70.1
월 가구소득																
100만원 이하	79.3(5.8)	7.3	0.0(0.0)	.	83.0(7.0)	8.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	9.3(5.0)	53.5	7.2(5.0)	69.4	3.1(3.0)	99.3
101~200만원	86.2(5.2)	6.0	3.9(2.7)	70.1	72.5(8.3)	11.4	2.0(2.0)	100.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.5(2.4)	96.0	0.0(0.0)	.
201~300만원	81.7(4.6)	5.6	6.5(3.2)	49.9	79.4(4.6)	5.9	0.9(0.9)	96.2	0.9(0.9)	100.4	3.3(1.9)	57.3	1.2(1.2)	102.0	2.8(2.0)	72.4
301~400만원	83.6(5.8)	6.9	3.4(3.1)	91.6	73.2(7.5)	10.2	2.4(2.4)	100.2	8.8(4.2)	47.3	2.4(2.4)	100.2	7.4(4.3)	57.2	2.4(2.4)	100.2
401만원 이상	84.8(4.2)	4.9	5.9(2.5)	42.1	84.1(3.8)	4.6	1.1(1.1)	99.3	2.3(1.6)	68.8	2.7(1.9)	70.8	3.7(2.8)	76.0	2.3(1.5)	66.7
거주유형																
읍·면	84.2(1.9)	2.3	4.6(1.3)	27.8	79.9(2.8)	3.5	1.3(0.7)	49.6	1.9(0.7)	36.3	3.1(1.1)	35.5	4.0(1.1)	28.9	2.1(0.7)	35.1

주 : 1) 체중조절 시도방법: (각 체중조절 시도방법 / 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 51〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	921	36.9(1.9)	5.3	427	35.6(2.0)	5.7	494	38.3(2.6)	6.8
연령									
19-29	97	19.9(4.0)	20.3	43	16.8(5.7)	33.8	54	23.6(5.5)	23.5
30-39	159	29.1(3.7)	12.7	71	32.4(5.2)	16.0	88	25.7(4.7)	18.2
40-49	243	29.5(3.3)	11.1	121	32.9(4.6)	14.0	122	25.8(4.2)	16.4
50-59	198	38.8(3.2)	8.3	89	33.6(5.2)	15.4	109	44.7(3.6)	8.0
60-69	103	59.3(4.6)	7.8	53	60.2(6.5)	10.7	50	58.5(6.7)	11.5
70 이상	121	75.7(4.5)	5.9	50	75.7(6.4)	8.4	71	75.8(5.6)	7.4
생애주기별									
19-44	392	25.0(2.4)	9.5	180	26.9(3.2)	11.7	212	22.8(3.0)	13.1
45-64	370	39.9(2.5)	6.2	179	36.4(3.3)	9.0	191	43.9(3.3)	7.4
65-74	84	68.0(5.8)	8.5	34	73.3(6.6)	9.0	50	64.9(7.6)	11.7
75 이상	75	82.4(5.2)	6.3	34	81.1(7.1)	8.7	41	83.5(6.6)	7.9
교육수준 ²⁾									
무학	84	80.4(4.7)	5.9	20	83.3(8.1)	9.7	64	79.5(5.4)	6.8
초등학교	108	61.2(6.1)	9.9	40	60.4(8.8)	14.6	68	61.6(5.9)	9.6
중학교	100	44.2(4.9)	11.0	45	52.5(7.3)	13.9	55	36.5(5.8)	15.9
고등학교	394	28.1(2.2)	8.0	199	29.3(3.4)	11.7	195	26.6(2.6)	9.9
대학교 이상	234	29.1(3.4)	11.6	122	30.5(4.2)	13.9	112	27.3(5.3)	19.6
직업									
전문행정관리	145	30.8(4.4)	14.2	73	29.7(5.5)	18.6	72	32.0(6.6)	20.6
사무직	92	27.4(4.5)	16.5	57	24.8(4.4)	17.7	35	32.6(8.5)	26.0
판매·서비스직	80	32.3(4.3)	13.3	28	27.5(9.0)	32.7	52	35.9(6.5)	18.0
농림어업	39	63.6(9.1)	14.3	25	53.6(12.7)	23.7	14	—(—)	—
기능단순노무직	200	36.8(3.7)	10.2	154	36.2(3.6)	9.9	46	39.4(8.6)	21.8
기타 ³⁾	359	41.4(2.9)	6.9	86	49.3(5.9)	12.1	273	38.7(3.1)	8.1
월 가구소득									
100만원 이하	204	56.8(4.4)	7.7	81	51.0(5.9)	11.5	123	60.8(5.3)	8.8
101-200만원	137	33.9(4.2)	12.3	65	35.6(6.4)	18.1	72	32.1(5.1)	15.8
201-300만원	179	31.1(3.5)	11.3	84	30.5(5.3)	17.4	95	31.7(4.9)	15.6
301-400만원	87	30.2(5.9)	19.5	44	26.6(7.1)	26.7	43	35.0(9.4)	26.8
401만원 이상	193	32.1(3.8)	11.8	94	36.6(4.5)	12.2	99	26.7(5.1)	19.1
거주유형									
읍·면	921	36.9(1.9)	5.3	427	35.6(2.0)	5.7	494	38.3(2.6)	6.8

주 : 1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 : (“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 52〉 저작불편호소율¹⁾ : 65세 이상

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	159	48.6(5.4)	11.1	68	52.1(7.3)	14.0	91	46.3(6.1)	13.1
교육수준 ²⁾									
무학	69	59.3(6.7)	11.3	16	-(-)	-	53	56.6(7.6)	13.5
초등학교	49	40.4(8.2)	20.4	22	39.7(11.0)	27.7	27	40.8(10.3)	25.2
중학교	17	-(-)	-	12	-(-)	-	5	-(-)	-
고등학교	17	-(-)	-	12	-(-)	-	5	-(-)	-
대학교 이상	7	-(-)	-	6	-(-)	-	1	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 이하	98	53.9(6.5)	12.0	39	61.9(8.7)	14.0	59	49.3(7.5)	15.2
101-200만원	11	-(-)	-	7	-(-)	-	4	-(-)	-
201-300만원	17	-(-)	-	7	-(-)	-	10	-(-)	-
301-400만원	3	-(-)	-	1	-(-)	-	2	-(-)	-
401만원 이상	8	-(-)	-	4	-(-)	-	4	-(-)	-
거주유형									
읍·면	159	48.6(5.4)	11.1	68	52.1(7.3)	14.0	91	46.3(6.1)	13.1

주 : 1) 저작불편호소율 : (“매우 불편” 또는 “불편”에 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

〈표 53〉 발음불편호소율¹⁾ : 65세 이상

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	159	20.4(3.3)	16.2	68	23.3(4.5)	19.4	91	18.5(4.5)	24.1
교육수준 ²⁾									
무학	69	25.8(5.4)	21.0	16	-(-)	-	53	26.2(5.7)	21.9
초등학교	49	13.3(5.0)	37.8	22	22.3(8.2)	36.7	27	7.1(6.7)	94.0
중학교	17	-(-)	-	12	-(-)	-	5	-(-)	-
고등학교	17	-(-)	-	12	-(-)	-	5	-(-)	-
대학교 이상	7	-(-)	-	6	-(-)	-	1	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 이하	98	20.8(3.9)	18.9	39	28.8(5.4)	18.8	59	16.2(5.0)	30.7
101-200만원	11	-(-)	-	7	-(-)	-	4	-(-)	-
201-300만원	17	-(-)	-	7	-(-)	-	10	-(-)	-
301-400만원	3	-(-)	-	1	-(-)	-	2	-(-)	-
401만원 이상	8	-(-)	-	4	-(-)	-	4	-(-)	-
거주유형									
읍·면	159	20.4(3.3)	16.2	68	23.3(4.5)	19.4	91	18.5(4.5)	24.1

주 : 1) 발음불편호소율 : (“매우 불편” 또는 “불편”에 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

〈표 54〉 틀니 이용 행태¹⁾ : 65세 이상

(단위 : %)

구분	N	위아래 둘 다 있음		위쪽만 있음		아래쪽만 있음		아니오	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	159	45.4(3.6)	7.9	3.3(1.8)	53.0	1.2(1.2)	97.0	50.1(4.1)	8.1
성									
남자	68	46.3(6.0)	12.9	1.4(1.4)	100.8	1.4(1.4)	97.5	50.9(5.7)	11.1
여자	91	44.8(4.8)	10.6	4.5(2.7)	60.9	1.0(1.0)	97.2	49.7(5.4)	10.8
교육수준 ²⁾									
무학	69	52.9(5.7)	10.7	5.9(3.4)	58.0	2.6(2.6)	99.1	38.6(6.4)	16.5
초등학교	49	42.0(6.2)	14.7	2.1(2.1)	100.3	0.0(0.0)	.	55.9(6.2)	11.2
중학교	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
대학교 이상	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 이하	98	51.4(4.8)	9.3	3.1(1.7)	54.9	1.9(1.9)	97.3	43.6(4.8)	10.9
101-200만원	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
201-300만원	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
301-400만원	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
401만원 이상	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
거주유형									
읍·면	159	45.4(3.6)	7.9	3.3(1.8)	53.0	1.2(1.2)	97.0	50.1(4.1)	8.1

주 : 1) 틀니 이용 행태 : (틀니 이용 행태별 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

〈표 55〉 점심식사 후 치솔질 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	915	57.7(1.8)	3.0	426	50.1(2.2)	4.4	489	65.7(2.4)	3.6
연령									
19-29	97	65.2(5.7)	8.8	43	58.3(8.6)	14.8	54	73.6(5.6)	7.6
30-39	159	66.1(3.3)	4.9	71	51.5(5.8)	11.3	88	81.4(3.9)	4.8
40-49	239	61.2(2.9)	4.7	120	53.3(3.8)	7.2	119	70.3(4.7)	6.6
50-59	196	58.7(3.9)	6.6	89	51.9(5.0)	9.6	107	66.6(4.8)	7.3
60-69	103	49.7(6.1)	12.2	53	46.4(7.1)	15.4	50	52.7(8.0)	15.1
70 이상	121	24.8(3.9)	15.9	50	16.1(4.8)	30.1	71	30.1(5.1)	16.9
생애주기별									
19-44	389	65.2(2.4)	3.7	179	54.2(3.5)	6.5	210	77.4(2.6)	3.4
45-64	367	57.8(2.7)	4.7	179	52.3(3.6)	7.0	188	64.2(3.6)	5.7
65-74	84	31.1(4.5)	14.5	34	23.1(6.1)	26.3	50	35.6(7.0)	19.6
75 이상	75	27.0(5.9)	21.9	34	20.8(6.0)	29.0	41	31.6(8.4)	26.6
교육수준 ²⁾									
무학	84	27.3(6.1)	22.3	20	20.5(6.5)	31.7	64	29.3(6.4)	21.7
초등학교	108	34.2(5.2)	15.0	40	21.1(6.7)	31.6	68	41.7(6.0)	14.4
중학교	99	51.9(5.7)	11.0	45	27.8(6.1)	21.9	54	74.3(6.7)	9.0
고등학교	390	63.7(2.4)	3.8	198	56.9(3.4)	6.0	192	72.2(3.8)	5.2
대학교 이상	233	66.5(2.9)	4.4	122	55.9(4.1)	7.3	111	80.9(3.8)	4.7
직업									
전문행정관리	144	77.0(2.9)	3.8	73	70.9(4.5)	6.3	71	84.6(3.8)	4.5
사무직	91	67.7(4.7)	6.9	57	58.6(6.0)	10.3	34	85.6(5.4)	6.4
판매·서비스직	80	62.7(6.0)	9.5	28	51.2(9.8)	19.2	52	71.3(6.2)	8.7
농림어업	39	29.4(8.9)	30.1	25	28.4(10.3)	36.3	14	-(-)	-
기능단순노무직	198	46.5(3.5)	7.5	153	43.2(3.6)	8.3	45	60.3(7.9)	13.0
기타 ³⁾	357	55.9(2.8)	5.1	86	45.7(5.5)	12.1	271	59.4(3.3)	5.6
월 가구소득									
100만원 이하	203	37.8(4.0)	10.7	80	24.7(5.3)	21.5	123	46.5(5.1)	10.9
101-200만원	135	57.5(5.1)	8.9	65	47.4(7.3)	15.3	70	68.7(5.5)	8.0
201-300만원	177	65.7(3.8)	5.8	84	58.3(5.0)	8.6	93	74.1(4.5)	6.0
301-400만원	87	52.3(4.7)	9.0	44	45.7(6.7)	14.7	43	60.8(8.4)	13.7
401만원 이상	192	71.6(3.0)	4.2	94	67.1(4.2)	6.3	98	77.0(4.3)	5.6
거주유형									
읍·면	915	57.7(1.8)	3.0	426	50.1(2.2)	4.4	489	65.7(2.4)	3.6

주 : 1) 점심식사 후 치솔질 실천율 : (점심식사 후 치솔질 한 사람의 수 / 점심식사 한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 56〉 구강검진 수진율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	921	35.9(2.2)	6.0	427	37.8(2.6)	6.9	494	33.9(2.5)	7.5
연령									
19-29	97	29.0(3.7)	12.8	43	30.4(5.9)	19.5	54	27.3(5.2)	18.9
30-39	159	38.1(4.3)	11.4	71	38.1(5.2)	13.6	88	38.1(6.2)	16.2
40-49	243	51.0(4.0)	7.8	121	54.1(5.1)	9.5	122	47.5(4.5)	9.6
50-59	198	38.0(3.9)	10.4	89	36.0(5.3)	14.6	109	40.2(4.8)	11.9
60-69	103	27.2(5.3)	19.5	53	28.4(6.2)	22.0	50	26.0(6.9)	26.7
70 이상	121	9.2(2.8)	30.1	50	13.4(4.8)	35.8	71	6.7(2.9)	43.3
생애주기별									
19-44	392	38.1(2.8)	7.3	180	37.4(3.0)	8.0	212	39.0(4.0)	10.2
45-64	370	42.1(3.2)	7.7	179	44.7(4.4)	9.9	191	39.1(3.7)	9.5
65-74	84	14.9(4.1)	27.5	34	21.1(7.7)	36.6	50	11.3(4.3)	37.9
75 이상	75	6.2(2.6)	42.9	34	8.7(4.7)	54.4	41	4.3(2.9)	68.5
교육수준 ²⁾									
무학	84	5.2(1.8)	34.5	20	0.0(0.0)	.	64	6.8(2.3)	34.2
초등학교	108	20.7(4.2)	20.3	40	17.6(7.0)	39.9	68	22.5(4.8)	21.3
중학교	100	24.9(4.4)	17.5	45	25.2(6.1)	24.3	55	24.7(5.7)	23.0
고등학교	394	38.1(3.0)	7.8	199	36.5(3.3)	8.9	195	40.1(4.1)	10.3
대학교 이상	234	49.3(3.8)	7.6	122	51.9(4.8)	9.3	112	45.8(5.0)	10.9
직업									
전문행정관리	145	45.5(4.4)	9.8	73	46.3(6.4)	13.9	72	44.6(5.0)	11.1
사무직	92	53.6(5.8)	10.8	57	54.8(6.9)	12.7	35	51.3(8.5)	16.6
판매·서비스직	80	23.8(5.7)	24.1	28	1.9(2.0)	101.8	52	40.1(8.3)	20.6
농림어업	39	31.9(8.0)	25.1	25	38.7(10.5)	27.1	14	-()	-
기능단순노무직	200	41.5(4.0)	9.7	154	41.8(4.3)	10.2	46	40.5(7.4)	18.3
기타 ³⁾	359	25.8(2.6)	10.1	86	22.9(4.7)	20.7	273	26.8(3.0)	11.3
월 가구소득									
100만원 이하	204	20.7(3.6)	17.2	81	15.1(5.2)	34.2	123	24.5(4.1)	17.0
101-200만원	137	33.3(4.4)	13.2	65	29.1(5.6)	19.4	72	37.8(5.8)	15.4
201-300만원	179	32.1(3.9)	12.2	84	38.0(5.8)	15.2	95	25.5(4.6)	18.0
301-400만원	87	40.9(5.2)	12.6	44	38.4(6.4)	16.8	43	44.2(7.6)	17.2
401만원 이상	193	55.2(4.6)	8.4	94	61.5(4.2)	6.9	99	47.5(6.0)	12.7
거주유형									
읍·면	921	35.9(2.2)	6.0	427	37.8(2.6)	6.9	494	33.9(2.5)	7.5

주 : 1) 구강검진 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 구강검진을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 57〉 연간 스케일링 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	921	22.4(1.4)	6.4	427	23.0(2.1)	9.1	494	21.7(1.7)	8.1
연령									
19-29	97	23.8(3.7)	15.6	43	23.8(6.4)	26.7	54	23.8(4.6)	19.3
30-39	159	26.2(4.1)	15.6	71	20.3(5.2)	25.6	88	32.4(5.4)	16.7
40-49	243	28.1(2.9)	10.2	121	30.8(4.1)	13.2	122	25.1(3.7)	14.9
50-59	198	24.1(3.0)	12.6	89	24.2(4.4)	18.3	109	24.0(3.7)	15.3
60-69	103	12.5(3.1)	25.2	53	18.6(4.9)	26.2	50	6.7(3.9)	58.0
70 이상	121	3.2(1.5)	47.2	50	3.7(2.6)	69.9	71	2.9(1.9)	66.5
생애주기별									
19-44	392	25.5(2.1)	8.4	180	24.1(3.1)	13.0	212	27.1(3.0)	11.2
45-64	370	24.7(2.3)	9.4	179	26.3(3.2)	12.1	191	22.8(2.7)	11.8
65-74	84	8.0(2.0)	24.7	34	11.4(5.7)	50.4	50	6.1(2.6)	42.5
75 이상	75	0.0(0.0)	.	34	0.0(0.0)	.	41	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	84	1.3(1.2)	96.1	20	0.0(0.0)	.	64	1.7(1.6)	94.3
초등학교	108	9.5(2.9)	30.2	40	5.2(3.8)	73.5	68	12.0(3.6)	29.6
중학교	100	23.7(4.6)	19.4	45	33.4(7.0)	21.1	55	14.8(4.7)	31.9
고등학교	394	24.2(1.8)	7.5	199	20.6(2.5)	12.1	195	28.5(2.9)	10.1
대학교 이상	234	29.0(3.4)	11.6	122	30.2(4.7)	15.7	112	27.5(4.4)	16.1
직업									
전문행정관리	145	27.0(3.8)	14.2	73	32.6(5.8)	17.8	72	20.2(4.3)	21.3
사무직	92	27.5(5.0)	18.0	57	21.7(5.6)	25.8	35	38.6(8.7)	22.4
판매·서비스직	80	25.3(6.6)	26.1	28	20.8(9.8)	46.9	52	28.7(6.5)	22.6
농림어업	39	26.1(11.0)	41.9	25	33.5(12.4)	37.0	14	-(-)	-
기능단순노무직	200	22.8(3.0)	13.2	154	24.3(3.2)	13.3	46	16.7(6.0)	36.0
기타 ³⁾	359	17.4(1.9)	10.8	86	11.5(3.6)	31.4	273	19.4(2.2)	11.1
월 가구소득									
100만원 이하	204	8.0(2.4)	29.9	81	6.8(3.6)	53.2	123	8.9(2.7)	30.6
101-200만원	137	24.5(4.0)	16.2	65	20.8(4.4)	21.2	72	28.6(5.6)	19.4
201-300만원	179	18.8(3.4)	18.2	84	17.9(4.6)	25.5	95	19.7(4.2)	21.5
301-400만원	87	19.1(3.9)	20.7	44	13.2(4.4)	33.6	43	26.7(6.8)	25.3
401만원 이상	193	32.1(2.6)	8.2	94	37.6(3.4)	9.0	99	25.5(4.1)	16.0
거주유형									
읍·면	921	22.4(1.4)	6.4	427	23.0(2.1)	9.1	494	21.7(1.7)	8.1

주 : 1) 연간 스케일링 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 스케일링을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 58〉 치과진료 미치료율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	921	18.2(1.4)	7.9	427	15.3(1.8)	12.0	494	21.2(2.0)	9.4
연령									
19-29	97	20.3(4.4)	21.5	43	19.1(5.4)	28.3	54	21.8(5.8)	26.5
30-39	159	17.3(3.1)	18.1	71	16.4(5.3)	32.4	88	18.3(4.0)	21.8
40-49	243	16.7(2.2)	13.1	121	12.4(2.4)	19.3	122	21.6(3.5)	16.2
50-59	198	15.2(2.1)	14.0	89	12.4(2.8)	22.3	109	18.4(4.0)	22.0
60-69	103	15.1(3.8)	25.3	53	6.1(3.5)	58.0	50	23.5(6.3)	26.9
70 이상	121	28.3(4.8)	16.9	50	30.3(6.1)	20.2	71	27.0(5.9)	21.8
생애주기별									
19-44	392	18.2(2.3)	12.9	180	15.4(2.9)	19.2	212	21.3(3.1)	14.7
45-64	370	15.1(1.8)	11.8	179	12.8(2.6)	20.5	191	17.7(2.9)	16.2
65-74	84	22.8(4.2)	18.6	34	16.1(4.9)	30.5	50	26.7(6.4)	24.1
75 이상	75	30.1(7.1)	23.6	34	31.1(8.0)	25.8	41	29.4(8.7)	29.7
교육수준 ²⁾									
무학	84	32.5(5.8)	17.8	20	24.6(7.8)	31.6	64	34.9(7.0)	20.0
초등학교	108	18.8(3.5)	18.8	40	17.0(6.1)	35.7	68	19.9(4.8)	24.3
중학교	100	13.6(3.3)	24.0	45	5.8(3.1)	53.0	55	20.8(5.6)	26.7
고등학교	394	13.6(2.2)	16.6	199	12.8(2.8)	21.6	195	14.5(3.2)	21.7
대학교 이상	234	23.0(2.9)	12.7	122	20.4(3.5)	17.4	112	26.6(4.4)	16.5
직업									
전문행정관리	145	21.4(4.6)	21.5	73	15.9(4.4)	27.9	72	28.3(6.4)	22.5
사무직	92	17.3(3.5)	19.9	57	13.6(3.9)	28.5	35	24.5(7.6)	31.0
판매·서비스직	80	27.8(4.5)	16.2	28	30.1(7.9)	26.3	52	26.2(5.0)	19.0
농림어업	39	4.5(3.3)	73.2	25	3.0(3.0)	99.6	14	—(—)	—
기능단순노무직	200	12.6(2.2)	17.1	154	12.7(2.6)	20.7	46	12.2(5.1)	42.2
기타 ³⁾	359	19.7(2.4)	12.0	86	19.2(4.0)	20.7	273	19.9(2.7)	13.8
월 가구소득									
100만원 이하	204	21.2(3.4)	16.0	81	13.0(3.8)	29.4	123	26.7(4.3)	16.0
101-200만원	137	14.9(4.9)	32.7	65	8.8(3.9)	43.8	72	21.6(6.6)	30.5
201-300만원	179	16.0(3.1)	19.1	84	13.8(3.9)	28.1	95	18.5(4.4)	23.6
301-400만원	87	18.4(4.9)	26.6	44	23.1(6.3)	27.3	43	12.2(5.3)	43.3
401만원 이상	193	23.1(3.2)	13.8	94	20.4(4.3)	21.2	99	26.4(4.4)	16.8
거주유형									
읍·면	921	18.2(1.4)	7.9	427	15.3(1.8)	12.0	494	21.2(2.0)	9.4

주 : 1) 치과진료 미치료율 : (최근 1년(365일) 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 59〉 치과진료 미치료자의 미치료 이유¹⁾

(단위 : %)

구분	N	경제적인 이유로		치과 병의원이 너무 멀어서		직장이나 학교를 비울 수 없어서		거동이 불편해서 혹은 건강문제 때문에		아이를 봐줄 사람이 없어서		다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서		치과진료를 받기가 무서워서		기 타	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
전체	165	31.4(4.2)	13.4	1.9(0.5)	28.3	27.0(4.1)	15.1	2.7(1.0)	37.7	2.4(0.9)	39.2	20.9(2.8)	13.5	6.7(2.2)	32.4	7.1(1.9)	27.0
성																	
남자	64	26.9(5.5)	20.5	0.9(0.9)	98.9	34.7(6.7)	19.4	0.9(1.0)	100.7	0.0(0.0)	.	24.9(3.6)	14.6	2.9(2.8)	98.4	8.7(3.0)	34.5
여자	101	34.8(5.0)	14.3	2.6(1.3)	47.5	21.1(4.4)	20.8	3.9(1.6)	40.3	4.2(1.6)	39.3	17.8(3.6)	20.0	9.5(3.3)	34.3	6.0(2.7)	46.1
연령																	
19-29	20	7.7(5.0)	65.1	0.0(0.0)	.	63.3(10.5)	16.5	0.0(0.0)	.	3.9(3.8)	99.3	10.1(7.3)	72.8	10.8(7.3)	67.9	4.2(4.4)	104.7
30-39	29	30.1(7.6)	25.2	0.0(0.0)	.	29.2(8.2)	28.2	0.0(0.0)	.	6.2(3.8)	61.3	18.3(6.0)	32.7	12.3(5.4)	43.6	3.9(3.9)	98.7
40-49	40	28.5(6.1)	21.5	0.0(0.0)	.	31.7(5.8)	18.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	33.2(6.7)	20.3	4.1(2.9)	69.5	2.6(2.7)	101.8
50-59	29	30.6(8.6)	28.1	3.3(3.2)	97.8	12.0(5.6)	46.7	0.0(0.0)	.	2.7(2.6)	96.3	37.1(9.0)	24.2	8.1(5.9)	72.6	6.1(4.4)	71.6
60-69	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
70 이상	34	64.3(7.2)	11.2	5.4(2.7)	49.2	0.0(0.0)	.	14.0(5.4)	38.9	0.0(0.0)	.	9.4(4.7)	50.4	0.0(0.0)	.	6.9(2.9)	42.0
생애주기별																	
19-44	71	20.4(4.1)	20.0	0.0(0.0)	.	43.0(6.7)	15.5	0.0(0.0)	.	3.8(1.7)	43.7	21.0(4.5)	21.6	8.7(3.3)	38.0	3.1(2.2)	71.3
45-64	54	34.3(7.0)	20.5	3.6(2.4)	66.5	16.5(4.4)	26.8	0.0(0.0)	.	1.5(1.4)	95.3	27.8(6.2)	22.2	7.6(4.0)	52.7	8.8(3.9)	44.1
65-74	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
75 이상	23	65.3(9.1)	14.0	3.9(3.5)	91.0	0.0(0.0)	.	17.0(7.7)	45.6	0.0(0.0)	.	9.9(5.9)	59.0	0.0(0.0)	.	3.9(4.1)	104.0
교육수준 ²⁾																	
무학	27	62.0(9.5)	15.3	3.4(3.2)	96.0	0.0(0.0)	.	16.8(6.4)	37.9	0.0(0.0)	.	10.8(5.4)	49.5	0.0(0.0)	.	7.0(6.8)	96.7
초등학교	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	50	30.7(5.6)	18.4	1.6(1.5)	96.2	29.9(6.1)	20.4	0.0(0.0)	.	1.9(1.7)	89.6	23.5(5.3)	22.4	5.5(2.9)	53.0	7.0(2.8)	40.6
대학교 이상	55	17.9(5.6)	31.1	0.0(0.0)	.	38.6(7.6)	19.6	1.1(1.1)	99.3	3.7(2.3)	63.0	20.6(5.6)	27.2	12.2(4.9)	40.0	6.0(3.5)	58.5
직업																	
전문행정관리	29	31.3(10.2)	32.5	0.0(0.0)	.	44.8(8.5)	19.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	12.4(6.6)	53.0	6.6(6.1)	92.0	4.9(3.7)	75.4
사무직	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	20	23.0(10.6)	46.1	0.0(0.0)	.	45.5(10.7)	23.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	18.5(7.2)	39.1	9.9(7.2)	72.5	3.1(3.1)	100.0
농림어업	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	27	26.9(9.0)	33.6	2.5(2.4)	99.0	38.5(9.8)	25.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	24.5(8.9)	36.4	0.0(0.0)	.	7.6(5.1)	67.3
기타 ³⁾	70	42.0(7.1)	17.0	3.9(1.9)	48.8	3.4(3.4)	97.5	6.8(2.5)	36.6	6.2(2.4)	39.4	19.4(5.8)	29.8	10.6(3.5)	33.1	7.6(3.2)	41.8
월 가구소득																	
100만원 이하	44	67.7(7.1)	10.5	3.8(1.9)	50.2	3.2(2.9)	91.8	3.9(2.9)	74.8	0.0(0.0)	.	8.5(4.1)	47.6	2.0(2.0)	99.5	11.0(5.2)	47.5
101-200만원	20	35.3(12.3)	34.8	4.2(4.3)	102.8	9.6(5.9)	61.7	0.0(0.0)	.	5.6(4.8)	84.3	27.9(7.7)	27.5	9.9(8.6)	86.1	7.5(5.1)	68.9
201-300만원	28	22.4(7.9)	35.1	2.9(2.6)	89.1	33.0(6.5)	19.7	2.5(2.5)	99.8	6.9(4.3)	62.7	9.3(7.0)	75.5	15.1(6.9)	45.6	7.9(5.4)	68.8
301-400만원	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
401만원 이상	42	16.8(6.5)	38.4	0.0(0.0)	.	32.8(6.7)	20.4	1.7(1.6)	95.8	0.0(0.0)	.	38.1(7.1)	18.6	5.8(3.3)	57.1	4.8(3.2)	66.2
거주유형																	
읍·면	165	31.4(4.2)	13.4	1.9(0.5)	28.3	27.0(4.1)	15.1	2.7(1.0)	37.7	2.4(0.9)	39.2	20.9(2.8)	13.5	6.7(2.2)	32.4	7.1(1.9)	27.0

주 : 1) 치과진료 미치료자의 미치료 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 치과진료를 받지 못한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 60〉 스트레스 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	917	33.9(1.7)	5.1	425	37.3(2.7)	7.2	492	30.3(1.9)	6.4
연령									
19-29	97	38.3(4.4)	11.4	43	44.4(7.6)	17.2	54	30.8(4.9)	15.7
30-39	159	39.4(3.4)	8.7	71	50.3(5.1)	10.1	88	28.1(4.2)	14.9
40-49	243	28.5(2.8)	9.8	121	29.1(3.8)	13.2	122	27.8(4.4)	15.8
50-59	197	32.6(3.9)	11.9	89	37.0(5.2)	13.9	108	27.6(4.5)	16.3
60-69	102	38.1(4.6)	12.2	52	30.2(6.6)	21.7	50	45.4(6.5)	14.3
70 이상	119	26.8(4.9)	18.2	49	19.9(7.2)	36.2	70	31.0(5.4)	17.3
생애주기별									
19-44	392	36.5(2.2)	6.1	180	43.0(4.1)	9.5	212	29.2(3.2)	10.8
45-64	369	31.6(2.8)	8.8	179	33.4(3.8)	11.4	190	29.5(3.5)	11.9
65-74	83	38.2(5.5)	14.4	33	24.6(9.0)	36.8	50	45.9(6.5)	14.1
75 이상	73	19.9(4.3)	21.7	33	18.6(8.6)	46.1	40	20.9(5.5)	26.2
교육수준 ²⁾									
무학	83	37.2(5.2)	14.0	20	34.4(10.3)	29.9	63	38.0(5.3)	14.0
초등학교	106	38.9(4.9)	12.5	38	38.3(7.7)	20.2	68	39.3(6.5)	16.5
중학교	100	24.0(4.1)	17.2	45	24.3(6.4)	26.2	55	23.8(5.4)	22.8
고등학교	394	33.4(2.5)	7.3	199	37.2(3.8)	10.2	195	28.7(2.9)	10.3
대학교 이상	233	35.6(3.2)	8.9	122	41.6(4.3)	10.4	111	27.5(4.2)	15.4
직업									
전문행정관리	145	39.7(4.6)	11.5	73	37.0(6.4)	17.2	72	43.0(6.3)	14.7
사무직	92	38.9(4.5)	11.7	57	39.0(5.3)	13.7	35	38.6(7.8)	20.2
판매·서비스직	80	33.5(5.1)	15.2	28	29.7(8.6)	29.0	52	36.4(6.6)	18.2
농림어업	39	26.5(8.3)	31.4	25	33.9(11.8)	34.8	14	-()	-
기능단순노무직	200	40.6(4.1)	10.1	154	43.3(4.5)	10.5	46	29.7(8.3)	27.8
기타 ³⁾	355	26.4(2.3)	8.7	84	28.7(5.1)	17.9	271	25.7(2.4)	9.2
월 가구소득									
100만원 이하	203	34.9(4.5)	12.9	80	28.8(5.4)	18.9	123	39.0(5.1)	13.0
101-200만원	136	27.1(4.5)	16.7	65	30.9(7.6)	24.7	71	22.8(3.8)	16.7
201-300만원	178	34.6(4.1)	11.8	83	45.7(6.3)	13.8	95	22.5(4.2)	18.8
301-400만원	87	35.1(5.8)	16.4	44	42.7(8.7)	20.4	43	25.2(6.1)	24.1
401만원 이상	193	33.3(3.0)	9.0	94	30.9(4.2)	13.5	99	36.2(4.8)	13.3
거주유형									
읍·면	917	33.9(1.7)	5.1	425	37.3(2.7)	7.2	492	30.3(1.9)	6.4

주 : 1) 스트레스 인지율 : (평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느낀다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 61〉 우울감 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	919	3.8(0.8)	21.8	427	2.6(0.7)	27.5	492	5.1(1.3)	26.1
연령									
19-29	96	1.4(1.4)	100.1	43	2.6(2.6)	101.1	53	0.0(0.0)	.
30-39	159	2.8(1.2)	43.0	71	1.4(1.4)	101.5	88	4.3(2.0)	47.1
40-49	243	3.4(1.3)	38.4	121	0.8(0.8)	96.7	122	6.3(2.7)	42.5
50-59	198	2.8(1.2)	43.7	89	1.1(1.1)	100.5	109	4.7(2.2)	46.6
60-69	103	7.3(2.8)	37.5	53	8.2(4.0)	48.7	50	6.6(4.0)	61.1
70 이상	120	9.8(3.8)	38.3	50	9.8(3.9)	40.0	70	9.8(4.3)	44.0
생애주기별									
19-44	391	2.4(0.7)	31.0	180	1.4(1.0)	70.9	211	3.5(1.3)	38.1
45-64	370	3.4(1.1)	33.2	179	1.1(0.8)	70.6	191	5.9(1.9)	32.1
65-74	84	9.4(3.4)	36.3	34	13.1(6.3)	48.5	50	7.2(4.2)	58.2
75 이상	74	11.9(4.2)	35.7	34	14.3(5.4)	38.1	40	10.0(4.8)	47.4
교육수준 ²⁾									
무학	83	10.2(3.4)	33.3	20	9.1(5.8)	62.9	63	10.5(4.2)	39.5
초등학교	108	9.2(3.8)	41.1	40	9.9(4.2)	42.3	68	8.8(4.4)	50.4
중학교	100	6.6(2.6)	40.1	45	3.2(3.2)	98.9	55	9.7(4.0)	41.5
고등학교	393	1.4(0.5)	39.2	199	0.4(0.4)	99.8	194	2.5(1.1)	42.9
대학교 이상	234	3.3(1.4)	41.3	122	3.4(1.7)	50.8	112	3.2(1.5)	47.7
직업									
전문행정관리	145	5.3(2.1)	40.9	73	6.8(3.1)	46.1	72	3.4(1.5)	45.9
사무직	92	1.0(0.9)	99.3	57	0.0(0.0)	.	35	2.8(2.7)	99.1
판매·서비스직	80	2.8(2.7)	96.2	28	0.0(0.0)	.	52	4.9(4.5)	92.7
농림어업	39	3.9(2.7)	69.5	25	5.9(4.4)	73.6	14	-(-)	-
기능단순노무직	200	2.0(1.4)	72.4	154	0.3(0.3)	100.4	46	8.9(6.9)	77.5
기타 ³⁾	357	5.3(1.3)	24.2	86	5.7(2.3)	40.5	271	5.2(1.4)	26.8
월 가구소득									
100만원 이하	203	9.6(2.7)	28.3	81	7.0(2.5)	35.0	122	11.3(3.7)	32.5
101-200만원	136	4.0(2.0)	50.5	65	3.2(2.2)	70.8	71	4.9(2.9)	58.9
201-300만원	179	3.1(1.3)	41.8	84	2.0(1.6)	77.7	95	4.3(2.2)	50.3
301-400만원	87	0.0(0.0)	.	44	0.0(0.0)	.	43	0.0(0.0)	.
401만원 이상	193	3.0(1.3)	43.4	94	1.9(1.9)	101.5	99	4.3(2.0)	47.3
거주유형									
읍·면	919	3.8(0.8)	21.8	427	2.6(0.7)	27.5	492	5.1(1.3)	26.1

주 : 1) 우울감 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 연속적으로 2주(14일) 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 경험한 사람의 수 / 조사 대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 62〉 스트레스 및 우울증상으로 인한 정신상담률

(단위 : %)

구분	스트레스로 인한 정신상담률 ¹⁾			우울증상으로 인한 정신상담률 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	299	3.6(1.2)	32.1	37	2.2(0.4)	15.9
성						
남자	148	3.3(1.7)	53.2	13	—(—)	—
여자	151	4.0(1.5)	36.4	24	3.4(0.7)	21.6
연령						
19-29	36	3.7(3.6)	97.8	1	—(—)	—
30-39	62	4.4(2.5)	56.4	5	—(—)	—
40-49	69	6.2(3.1)	49.5	7	—(—)	—
50-59	64	1.7(1.6)	96.8	5	—(—)	—
60-69	37	0.0(0.0)	.	7	—(—)	—
70 이상	31	2.8(2.7)	96.6	12	—(—)	—
생애주기별						
19-44	139	4.2(1.7)	41.1	10	—(—)	—
45-64	115	3.2(1.9)	59.5	10	—(—)	—
65-74	31	0.0(0.0)	.	8	—(—)	—
75 이상	14	—(—)	—	9	—(—)	—
교육수준 ³⁾						
무학	30	2.7(2.6)	96.5	9	—(—)	—
초등학교	37	2.9(2.8)	99.3	9	—(—)	—
중학교	25	0.0(0.0)	.	5	—(—)	—
고등학교	127	4.6(1.9)	40.8	6	—(—)	—
대학교 이상	80	3.4(2.5)	72.6	8	—(—)	—
직업						
전문행정관리	54	0.0(0.0)	.	7	—(—)	—
사무직	34	7.1(5.0)	69.6	1	—(—)	—
판매·서비스직	28	0.0(0.0)	.	2	—(—)	—
농림어업	12	—(—)	—	2	—(—)	—
기능단순노무직	78	4.3(2.8)	64.0	4	—(—)	—
기타 ⁴⁾	92	4.4(1.9)	44.0	20	4.5(0.8)	17.7
월 가구소득						
100만원 이하	70	2.7(1.9)	70.6	20	0.0(0.0)	.
101-200만원	35	0.0(0.0)	.	5	—(—)	—
201-300만원	58	4.9(2.9)	58.4	6	—(—)	—
301-400만원	29	4.8(4.7)	99.4	0	—(—)	—
401만원 이상	63	5.9(3.4)	58.0	5	—(—)	—
거주유형						
읍·면	299	3.6(1.2)	32.1	37	2.2(0.4)	15.9

주 : 1) 스트레스로 인한 정신상담률 : (스트레스로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 스트레스를 인지하고 있다고 응답한 사람의 수) × 100

2) 우울증상으로 인한 정신상담률 : (우울증상으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 우울증상이 있다고 응답한 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 63〉 하루 평균 수면시간¹⁾

(단위 : %, 시간)

구분	N	6시간 이하		7~8시간		9시간 이상		평균 수면	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	시간(표준오차)	변동계수
전체	921	38.1(1.7)	4.3	56.6(1.8)	3.2	5.3(0.8)	14.6	6.9(0.0)	0.6
성									
남자	427	37.2(2.3)	6.2	58.6(2.3)	3.9	4.2(0.8)	19.7	6.9(0.1)	0.8
여자	494	39.1(2.5)	6.4	54.5(2.8)	5.1	6.4(1.2)	19.3	6.9(0.1)	0.9
연령									
19~29	97	25.8(4.3)	16.6	67.9(4.9)	7.3	6.3(2.0)	32.4	7.1(0.1)	1.3
30~39	159	30.7(3.6)	11.9	63.5(3.8)	6.1	5.9(2.1)	36.3	7.0(0.1)	1.2
40~49	243	44.6(3.5)	7.7	52.2(3.3)	6.3	3.2(1.1)	35.1	6.7(0.1)	1.1
50~59	198	47.4(3.3)	7.0	50.6(3.4)	6.7	2.0(0.9)	43.7	6.6(0.1)	1.0
60~69	103	37.9(5.8)	15.4	54.2(5.8)	10.8	7.9(3.2)	40.4	6.9(0.2)	2.5
70 이상	121	40.8(4.4)	10.8	48.0(5.0)	10.5	11.2(2.7)	23.9	7.1(0.1)	2.1
생애주기별									
19~44	392	32.4(2.5)	7.6	62.6(2.7)	4.3	5.0(1.2)	24.3	7.0(0.1)	0.9
45~64	370	45.1(2.4)	5.4	50.6(2.4)	4.8	4.3(1.1)	24.8	6.7(0.1)	0.9
65~74	84	40.5(5.6)	13.8	52.7(5.6)	10.5	6.8(2.2)	32.0	6.9(0.1)	1.9
75 이상	75	42.7(5.7)	13.3	45.9(6.1)	13.2	11.5(3.5)	30.4	7.1(0.2)	3.1
교육수준 ²⁾									
무학	84	42.8(5.1)	11.8	46.4(5.0)	10.8	10.8(3.4)	31.1	6.9(0.2)	3.0
초등학교	108	34.1(5.1)	14.8	56.0(5.1)	9.2	9.8(2.2)	22.1	7.0(0.1)	2.0
중학교	100	44.8(5.6)	12.6	49.5(5.1)	10.4	5.6(2.2)	39.5	6.8(0.1)	2.1
고등학교	394	34.2(2.4)	7.1	62.7(2.5)	4.0	3.1(0.8)	26.0	6.9(0.1)	0.8
대학교 이상	234	42.4(3.4)	8.1	51.9(3.7)	7.1	5.6(1.9)	34.6	6.8(0.1)	1.2
직업									
전문행정관리	145	42.1(4.5)	10.7	54.1(4.1)	7.6	3.8(1.5)	39.2	6.7(0.1)	1.7
사무직	92	45.5(5.2)	11.5	53.6(5.3)	9.8	0.9(0.9)	100.5	6.6(0.1)	1.4
판매·서비스직	80	38.8(5.5)	14.2	59.2(5.1)	8.7	2.1(2.0)	96.2	6.8(0.1)	2.0
농림어업	39	33.8(7.5)	22.2	53.4(8.6)	16.0	12.7(5.0)	39.0	7.1(0.2)	3.4
기능단순노무직	200	38.5(3.4)	9.0	58.9(3.8)	6.4	2.6(1.1)	44.3	6.7(0.1)	1.3
기타 ³⁾	359	33.9(2.3)	6.8	57.2(2.5)	4.4	8.9(1.5)	16.9	7.1(0.1)	1.0
월 가구소득									
100만원 이하	204	36.3(4.0)	11.1	53.4(3.8)	7.1	10.3(1.9)	18.2	7.0(0.1)	1.7
101~200만원	137	34.3(4.0)	11.8	61.6(4.6)	7.5	4.2(1.7)	40.0	6.9(0.1)	1.3
201~300만원	179	39.2(3.9)	10.0	57.6(4.1)	7.1	3.2(1.2)	37.7	6.8(0.1)	1.3
301~400만원	87	40.7(6.7)	16.5	58.5(6.4)	10.9	0.8(0.8)	90.4	6.7(0.1)	1.9
401만원 이상	193	39.8(4.0)	10.0	57.0(4.1)	7.2	3.2(1.4)	45.7	6.8(0.1)	1.3
거주유형									
읍·면	921	38.1(1.7)	4.3	56.6(1.8)	3.2	5.3(0.8)	14.6	6.9(0.0)	0.6

주 : 1) 하루 평균 수면시간 : 수면시간의 총 합 / 조사대상 응답자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 64〉 연간 인플루엔자 예방접종률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	917	41.0(1.9)	4.7	426	36.0(2.6)	7.2	491	46.3(2.3)	4.9
연령									
19-29	96	24.1(5.3)	22.1	43	18.9(5.5)	29.3	53	30.6(7.1)	23.3
30-39	159	39.9(4.1)	10.2	71	36.8(6.6)	18.0	88	43.1(5.2)	12.0
40-49	242	29.1(3.0)	10.3	121	28.2(4.3)	15.2	121	30.1(4.0)	13.3
50-59	197	44.2(3.8)	8.5	89	37.1(5.1)	13.8	108	52.3(4.3)	8.3
60-69	103	57.8(4.7)	8.2	53	54.4(6.0)	11.0	50	60.9(7.3)	11.9
70 이상	120	79.5(4.0)	5.0	49	78.6(6.4)	8.1	71	80.1(5.0)	6.2
생애주기별									
19-44	390	31.8(2.6)	8.1	180	28.9(3.4)	11.9	210	35.0(3.3)	9.4
45-64	369	40.6(2.9)	7.1	179	34.8(3.8)	11.0	190	47.4(3.1)	6.5
65-74	84	80.2(4.6)	5.8	34	75.1(5.7)	7.5	50	83.0(5.4)	6.5
75 이상	74	74.2(6.0)	8.0	33	79.9(8.7)	10.8	41	70.1(7.3)	10.5
교육수준 ²⁾									
무학	83	66.0(4.5)	6.9	20	60.7(8.8)	14.6	63	67.7(5.6)	8.3
초등학교	108	65.8(5.2)	8.0	40	63.6(9.2)	14.5	68	67.1(6.2)	9.2
중학교	99	56.9(5.8)	10.1	45	50.8(7.4)	14.6	54	62.7(6.7)	10.6
고등학교	392	32.3(2.5)	7.9	198	28.9(3.2)	11.1	194	36.5(3.3)	9.1
대학교 이상	234	35.3(3.6)	10.1	122	34.9(4.6)	13.3	112	35.8(4.2)	11.8
직업									
전문행정관리	145	41.6(5.3)	12.7	73	44.9(6.4)	14.3	72	37.6(6.1)	16.2
사무직	92	32.7(4.7)	14.4	57	30.5(6.4)	20.8	35	36.8(7.9)	21.4
판매·서비스직	80	23.3(4.8)	20.7	28	14.5(6.2)	43.0	52	29.9(6.6)	22.2
농림어업	39	53.5(7.4)	13.9	25	37.8(8.0)	21.1	14	-()	-
기능단순노무직	199	33.0(2.9)	8.9	154	32.4(3.6)	11.0	45	35.4(6.2)	17.6
기타 ³⁾	356	52.5(3.1)	5.9	85	50.3(6.2)	12.4	271	53.2(3.2)	6.1
월 가구소득									
100만원 이하	203	49.5(4.1)	8.4	81	41.6(5.7)	13.8	122	54.9(4.4)	8.0
101-200만원	135	45.8(4.9)	10.8	64	42.1(5.7)	13.6	71	49.8(6.4)	12.9
201-300만원	178	41.3(5.1)	12.3	84	37.0(6.2)	16.7	94	46.0(5.7)	12.5
301-400만원	87	31.6(5.4)	17.2	44	28.0(6.7)	23.9	43	36.2(7.9)	21.8
401만원 이상	193	30.9(3.2)	10.4	94	30.6(4.8)	15.5	99	31.3(4.6)	14.7
거주유형									
읍·면	917	41.0(1.9)	4.7	426	36.0(2.6)	7.2	491	46.3(2.3)	4.9

주 : 1) 연간 인플루엔자 예방접종률 : (최근 1년(365일) 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 65〉 건강검진 수진율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	920	66.6(1.6)	2.4	427	71.6(2.5)	3.6	493	61.4(2.1)	3.5
연령									
19-29	96	39.5(4.9)	12.5	43	46.0(7.2)	15.7	53	31.5(5.7)	18.0
30-39	159	58.6(3.8)	6.5	71	77.1(4.9)	6.4	88	39.3(5.5)	14.0
40-49	243	74.3(3.0)	4.1	121	77.0(4.4)	5.8	122	71.2(4.0)	5.7
50-59	198	80.7(2.7)	3.4	89	77.2(4.4)	5.7	109	84.6(2.9)	3.4
60-69	103	77.8(4.6)	5.9	53	76.9(6.7)	8.7	50	78.7(6.1)	7.7
70 이상	121	72.4(4.4)	6.1	50	77.0(6.4)	8.3	71	69.6(6.0)	8.7
생애주기별									
19-44	391	56.5(2.7)	4.7	180	65.8(3.6)	5.5	211	46.1(3.6)	7.7
45-64	370	79.4(2.3)	2.9	179	78.1(3.5)	4.5	191	80.9(2.7)	3.3
65-74	84	78.5(4.1)	5.3	34	89.8(4.4)	4.9	50	72.0(6.4)	8.9
75 이상	75	64.2(6.7)	10.4	34	66.5(8.8)	13.2	41	62.5(9.3)	14.8
교육수준 ²⁾									
무학	84	62.2(5.7)	9.1	20	60.3(8.8)	14.5	64	62.7(6.4)	10.1
초등학교	108	74.3(5.5)	7.3	40	75.5(8.2)	10.9	68	73.6(5.9)	8.0
중학교	100	75.9(5.3)	6.9	45	70.8(8.3)	11.7	55	80.5(5.8)	7.2
고등학교	393	64.3(2.4)	3.8	199	69.1(3.7)	5.4	194	58.3(3.2)	5.5
대학교 이상	234	66.4(3.2)	4.8	122	76.9(3.9)	5.1	112	52.2(5.1)	9.7
직업									
전문행정관리	145	73.2(3.5)	4.8	73	74.2(5.3)	7.1	72	71.9(5.2)	7.2
사무직	92	78.6(3.9)	5.0	57	83.4(4.2)	5.0	35	69.4(8.3)	12.0
판매·서비스직	80	59.6(6.0)	10.1	28	54.2(9.8)	18.1	52	63.7(6.5)	10.2
농림어업	39	64.2(7.1)	11.1	25	58.7(9.3)	15.8	14	-(-)	-
기능단순노무직	200	78.6(3.3)	4.2	154	82.5(3.4)	4.1	46	62.3(7.0)	11.2
기타 ³⁾	358	54.8(2.7)	4.9	86	50.5(5.8)	11.5	272	56.3(3.0)	5.4
월 가구소득									
100만원 이하	203	61.5(4.8)	7.8	81	62.7(7.2)	11.5	122	60.6(5.1)	8.5
101-200만원	137	66.7(4.1)	6.2	65	71.0(6.9)	9.7	72	62.0(5.2)	8.4
201-300만원	179	60.1(4.0)	6.6	84	73.8(5.5)	7.4	95	45.0(5.6)	12.4
301-400만원	87	69.0(5.9)	8.6	44	76.0(6.8)	9.0	43	59.9(7.7)	12.8
401만원 이상	193	73.3(3.3)	4.5	94	76.2(4.5)	5.9	99	69.8(4.8)	6.8
거주유형									
읍·면	920	66.6(1.6)	2.4	427	71.6(2.5)	3.6	493	61.4(2.1)	3.5

주 : 1) 건강검진 수진율 : (최근 2년 동안 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 66〉 건강검진 미수진 이유¹⁾

(단위 : %)

구분	N	검진비용이 비싸서		검진을 받을 시간이 없어서		검진기관 위치를 몰라서		필요성을 느끼지 못해서		기타	
		% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
전체	280	8.2(2.0)	24.3	25.6(3.1)	12.0	0.6(0.4)	71.5	53.1(3.0)	5.6	12.5(1.7)	13.7
성											
남자	107	1.9(1.3)	70.2	27.8(4.3)	15.5	0.0(0.0)	.	58.9(5.0)	8.5	11.5(2.8)	24.7
여자	173	13.1(3.3)	25.1	23.9(4.0)	16.6	1.1(0.8)	70.7	48.7(3.9)	8.0	13.3(2.1)	16.1
연령											
19-29	60	5.2(3.8)	73.4	9.7(3.7)	37.8	0.0(0.0)	.	76.8(5.1)	6.7	8.4(3.0)	36.1
30-39	69	12.0(4.0)	33.5	22.1(6.2)	28.3	1.3(1.3)	99.1	51.9(4.9)	9.5	12.6(3.7)	29.2
40-49	62	5.1(3.9)	77.0	48.4(6.8)	14.1	0.0(0.0)	.	35.8(6.9)	19.2	10.8(3.6)	33.4
50-59	37	5.1(3.4)	66.3	49.1(7.4)	15.0	0.0(0.0)	.	35.7(6.7)	18.7	10.2(4.6)	45.7
60-69	21	12.6(9.0)	71.9	32.2(11.6)	36.0	0.0(0.0)	.	40.9(9.4)	23.0	14.3(7.7)	53.6
70 이상	31	14.9(7.9)	53.3	6.0(4.2)	69.5	3.2(3.2)	98.7	43.3(11.9)	27.4	32.5(8.7)	26.9
생애주기별											
19-44	165	7.5(2.5)	33.5	21.3(3.9)	18.3	0.5(0.5)	100.0	59.8(3.8)	6.4	10.9(2.1)	19.5
45-64	73	5.7(3.5)	61.1	47.5(5.0)	10.6	0.0(0.0)	.	36.7(4.7)	12.8	10.1(3.5)	34.3
65-74	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
75 이상	25	11.7(7.1)	61.3	3.8(3.7)	96.0	4.1(4.0)	98.7	46.8(12.8)	27.3	33.6(10.2)	30.3
교육수준 ²⁾											
무학	31	16.9(8.0)	47.1	16.1(6.8)	42.4	3.1(3.1)	99.1	41.8(10.9)	25.9	22.0(6.9)	31.5
초등학교	23	27.9(9.8)	35.3	9.2(4.7)	51.4	0.0(0.0)	.	42.4(9.4)	22.1	20.6(9.6)	46.8
중학교	21	5.0(4.9)	98.1	62.4(10.5)	16.8	0.0(0.0)	.	22.6(10.2)	45.3	10.1(9.6)	95.0
고등학교	126	5.4(2.2)	40.5	23.1(4.2)	18.2	0.7(0.7)	101.7	60.5(4.3)	7.1	10.3(2.3)	22.5
대학교 이상	78	6.4(2.6)	40.8	28.4(6.1)	21.3	0.0(0.0)	.	53.0(5.9)	11.1	12.2(3.7)	30.7
직업											
전문행정관리	36	3.7(3.4)	92.7	32.0(7.2)	22.7	0.0(0.0)	.	56.7(9.1)	16.0	7.7(4.2)	54.7
사무직	18	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	29	5.5(3.8)	68.5	40.0(8.9)	22.2	0.0(0.0)	.	54.5(8.2)	15.1	0.0(0.0)	.
농림어업	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	42	11.3(6.0)	53.3	46.0(8.8)	19.2	0.0(0.0)	.	37.7(8.4)	22.2	5.0(3.5)	70.3
기타 ³⁾	140	9.6(3.2)	32.8	11.7(2.8)	23.7	1.3(0.9)	71.1	56.0(3.5)	6.3	21.4(2.8)	13.2
월 가구소득											
100만원 이하	71	13.6(4.5)	33.4	19.6(5.2)	26.7	1.2(1.2)	97.7	50.7(5.6)	11.1	15.0(4.3)	28.5
101-200만원	40	1.6(1.6)	99.8	28.1(7.9)	28.2	0.0(0.0)	.	60.0(8.1)	13.5	10.3(4.7)	46.2
201-300만원	66	15.4(5.3)	34.5	22.5(6.2)	27.6	1.4(1.4)	100.7	54.4(6.3)	11.6	6.2(2.6)	41.5
301-400만원	26	0.0(0.0)	.	47.8(11.2)	23.3	0.0(0.0)	.	41.8(10.6)	25.2	10.3(5.5)	53.6
401만원 이상	48	6.9(5.1)	74.7	28.8(7.4)	25.6	0.0(0.0)	.	53.3(7.8)	14.6	11.1(3.9)	34.8
거주유형											
읍·면	280	8.2(2.0)	24.3	25.6(3.1)	12.0	0.6(0.4)	71.5	53.1(3.0)	5.6	12.5(1.7)	13.7

주 : 1) 건강검진 미수진 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 2년 동안 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 없다고 응답한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 67〉 암 검진율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	918	36.0(1.7)	4.6	426	31.1(2.3)	7.4	492	41.1(1.9)	4.6
연령									
19-29	96	4.0(2.1)	52.0	43	0.0(0.0)	.	53	9.0(4.6)	50.7
30-39	159	29.9(3.2)	10.7	71	24.3(5.2)	21.5	88	35.7(4.8)	13.3
40-49	241	50.8(3.8)	7.6	120	44.4(4.9)	10.9	121	58.1(4.6)	7.9
50-59	198	52.1(3.1)	6.0	89	46.4(4.5)	9.6	109	58.5(4.1)	7.0
60-69	103	38.3(5.3)	13.8	53	40.1(6.2)	15.6	50	36.6(7.1)	19.4
70 이상	121	32.4(5.2)	16.1	50	28.6(6.5)	22.6	71	34.8(7.2)	20.7
생애주기별									
19-44	389	27.3(2.5)	9.1	179	20.2(3.2)	15.9	210	35.2(2.9)	8.3
45-64	370	49.7(2.6)	5.2	179	47.0(3.4)	7.2	191	52.9(3.6)	6.8
65-74	84	31.6(4.9)	15.5	34	37.2(8.0)	21.5	50	28.4(6.5)	22.8
75 이상	75	34.7(6.9)	20.0	34	22.8(7.1)	30.9	41	43.4(10.1)	23.3
교육수준 ²⁾									
무학	83	31.3(7.7)	24.5	20	25.7(9.7)	37.6	63	33.1(8.3)	25.2
초등학교	108	40.9(4.6)	11.3	40	40.9(8.4)	20.5	68	40.9(6.1)	14.8
중학교	100	41.9(5.0)	12.0	45	27.6(6.2)	22.6	55	55.1(7.2)	13.1
고등학교	392	35.9(2.5)	7.1	198	32.0(3.1)	9.6	194	40.7(3.5)	8.6
대학교 이상	234	34.1(3.6)	10.5	122	29.6(4.8)	16.4	112	40.0(4.5)	11.4
직업									
전문행정관리	145	43.1(4.7)	10.8	73	37.1(5.8)	15.6	72	50.5(5.5)	10.9
사무직	92	37.8(5.3)	13.9	57	33.4(6.9)	20.7	35	46.2(8.5)	18.4
판매·서비스직	80	39.9(6.5)	16.3	28	31.8(9.6)	30.2	52	45.9(7.1)	15.5
농림어업	39	40.8(7.6)	18.6	25	35.6(7.9)	22.2	14	-(-)	-
기능단순노무직	199	33.8(3.8)	11.1	154	30.4(3.9)	12.9	45	48.3(7.7)	15.9
기타 ³⁾	357	32.9(2.7)	8.1	85	25.1(4.3)	17.1	272	35.5(2.8)	8.0
월 가구소득									
100만원 이하	202	31.3(5.0)	16.0	80	28.6(6.5)	22.7	122	33.0(5.5)	16.6
101-200만원	137	36.2(3.3)	9.2	65	26.3(4.7)	18.0	72	47.0(5.5)	11.7
201-300만원	178	36.9(3.5)	9.6	84	33.3(5.4)	16.3	94	40.8(4.4)	10.7
301-400만원	87	39.9(7.1)	17.7	44	35.3(7.9)	22.5	43	45.9(8.0)	17.4
401만원 이상	193	48.7(3.8)	7.8	94	42.9(4.6)	10.8	99	55.8(4.9)	8.8
거주유형									
읍·면	918	36.0(1.7)	4.6	426	31.1(2.3)	7.4	492	41.1(1.9)	4.6

주 : 1) 암 검진율 : (최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 68〉 최근 2년간 수검 암 검진 종류¹⁾

(단위 : %)

구분	위암		간암		대장암		갑상선암		전립선암 ²⁾		유방암 ³⁾		자궁경부암 ³⁾		그 외 암	
	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
전체	72.8(2.8)	3.9	50.3(2.5)	5.0	46.1(2.3)	5.0	37.1(3.0)	8.2	27.6(4.2)	15.1	76.6(3.1)	4.1	88.8(2.0)	2.3	23.7(3.6)	15.2
성																
남자	86.0(3.2)	3.7	68.4(4.0)	5.8	62.7(3.4)	5.5	33.8(4.6)	13.7	27.6(4.2)	15.1	-(-)	-	-(-)	-	28.7(5.1)	17.6
여자	62.3(3.6)	5.7	35.9(3.2)	8.9	32.9(2.9)	8.9	39.8(3.0)	7.5	-(-)	-	76.6(3.1)	4.1	88.8(2.0)	2.3	19.7(3.8)	19.1
연령																
19-29	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	43.1(9.5)	21.9	32.1(5.7)	17.7	25.7(7.0)	27.1	36.1(5.7)	15.7	-(-)	-	33.3(9.6)	28.7	97.0(2.9)	3.0	24.4(7.7)	31.6
40-49	78.8(3.2)	4.0	51.7(4.5)	8.7	43.4(4.7)	10.9	36.6(4.7)	12.9	24.7(5.8)	23.3	89.0(2.7)	3.1	94.7(2.6)	2.8	25.3(4.9)	19.3
50-59	82.8(4.0)	4.8	60.9(5.8)	9.6	58.4(4.7)	8.1	40.7(5.4)	13.2	31.7(6.8)	21.4	92.6(2.3)	2.5	77.7(5.6)	7.2	22.7(5.0)	22.0
60-69	86.5(5.4)	6.3	53.2(6.9)	13.0	62.3(5.7)	9.2	34.2(7.4)	21.7	17.6(9.5)	54.2	-(-)	-	-(-)	-	31.2(9.3)	29.9
70 이상	78.9(7.1)	9.0	56.4(7.0)	12.5	51.4(7.1)	13.8	36.7(5.6)	15.2	-(-)	-	76.1(8.1)	10.6	73.9(8.2)	11.1	16.4(6.5)	39.8
생애주기별																
19-44	59.2(6.2)	10.5	37.1(5.0)	13.6	32.6(3.9)	12.0	37.3(3.8)	10.3	26.3(6.5)	24.6	60.5(7.0)	11.6	97.6(1.7)	1.7	25.3(5.2)	20.6
45-64	82.0(3.1)	3.7	61.3(3.8)	6.3	55.3(3.4)	6.2	38.1(4.5)	11.8	29.3(5.6)	19.1	92.5(2.0)	2.1	83.7(4.0)	4.8	23.1(3.9)	16.8
65-74	82.9(8.5)	10.2	45.3(9.2)	20.4	57.6(8.5)	14.8	31.1(9.4)	30.1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	27.1(9.5)	35.1
75 이상	75.9(10.4)	13.7	52.5(9.0)	17.1	45.6(9.8)	21.5	34.2(7.9)	23.1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	15.3(8.1)	53.0
교육수준 ⁴⁾																
무학	88.9(6.2)	7.0	60.6(8.3)	13.7	49.8(10.0)	20.0	45.1(7.9)	17.5	-(-)	-	81.4(6.6)	8.1	76.2(8.8)	11.6	34.0(13.4)	39.3
초등학교	77.0(6.1)	7.9	55.0(7.3)	13.3	56.2(6.8)	12.0	33.8(6.0)	17.7	-(-)	-	87.2(6.3)	7.2	88.9(5.3)	5.9	21.2(7.1)	33.6
중학교	72.4(6.6)	9.1	37.5(7.0)	18.8	42.2(7.8)	18.4	12.8(5.0)	39.1	-(-)	-	86.4(4.2)	4.9	84.1(8.1)	9.6	12.6(5.2)	41.4
고등학교	74.0(3.5)	4.7	55.2(4.2)	7.7	52.9(3.1)	5.8	43.2(4.6)	10.7	29.5(5.9)	20.0	82.9(3.7)	4.4	88.5(2.9)	3.3	28.5(4.8)	16.8
대학교 이상	65.5(5.8)	8.9	43.1(5.0)	11.6	31.3(4.8)	15.2	36.0(5.8)	16.2	30.5(6.4)	21.0	53.5(8.4)	15.7	96.4(2.5)	2.6	18.9(4.6)	24.3
직업																
전문행정관리	74.4(5.8)	7.8	53.0(6.2)	11.8	47.3(6.2)	13.1	46.9(6.5)	13.9	41.5(9.6)	23.1	79.4(6.8)	8.5	93.0(3.7)	4.0	22.6(6.0)	26.7
사무직	71.6(6.8)	9.5	54.1(9.0)	16.6	48.8(9.4)	19.2	54.3(7.8)	14.4	45.0(11.4)	25.3	-(-)	-	-(-)	-	39.6(8.3)	21.1
판매·서비스직	76.7(5.7)	7.4	35.1(8.4)	23.8	50.0(8.4)	16.7	22.9(7.3)	31.6	-(-)	-	92.4(5.4)	5.8	89.5(5.2)	5.8	14.4(5.4)	37.5
농림어업	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	80.6(4.8)	5.9	60.6(5.3)	8.7	51.7(5.1)	9.8	26.0(5.4)	20.9	18.2(5.7)	31.2	91.4(4.2)	4.6	92.4(4.3)	4.6	17.9(6.3)	35.2
기타 ⁵⁾	64.2(4.9)	7.7	42.7(3.8)	8.8	36.0(3.5)	9.8	35.1(3.4)	9.8	26.9(9.5)	35.3	71.5(4.9)	6.9	85.7(3.3)	3.8	24.5(5.3)	21.8
월 가구소득																
100만원 이하	82.5(4.0)	4.9	50.7(5.1)	10.0	39.9(5.8)	14.5	22.2(3.9)	17.5	13.6(7.5)	55.4	88.3(4.3)	4.9	82.8(5.8)	7.0	15.4(6.1)	39.6
101-200만원	56.5(6.9)	12.2	38.0(6.3)	16.5	40.2(5.6)	14.0	22.2(6.2)	27.8	21.1(9.5)	44.9	74.5(6.1)	8.2	77.7(6.8)	8.7	14.0(5.6)	39.9
201-300만원	66.0(6.2)	9.3	45.8(5.0)	11.0	45.4(5.9)	13.0	28.0(5.5)	19.6	18.3(7.5)	40.8	60.9(8.0)	13.2	97.7(2.1)	2.2	25.7(6.9)	26.7
301-400만원	80.4(5.6)	7.0	44.6(9.8)	22.0	50.5(7.5)	14.8	24.1(8.1)	33.7	-(-)	-	73.9(9.0)	12.1	80.0(7.5)	9.3	20.2(8.9)	44.0
401만원 이상	75.0(5.1)	6.8	59.4(5.9)	9.9	48.3(5.0)	10.3	59.4(5.1)	8.6	43.0(5.9)	13.7	78.5(5.8)	7.4	93.6(2.8)	3.0	28.1(6.6)	23.4
거주유형																
읍·면	72.8(2.8)	3.9	50.3(2.5)	5.0	46.1(2.3)	5.0	37.1(3.0)	8.2	27.6(4.2)	15.1	76.6(3.1)	4.1	88.8(2.0)	2.3	23.7(3.6)	15.2

주 : 1) 최근 2년간 수검 암 검진 종류 : (암종별 검진 수검자 수 / 최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수) × 100

2) 남자만 해당

3) 여자만 해당

4) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

5) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 69〉 건강검진 및 암 검진 사후 관리 상담률

(단위 : %)

구분	건강검진 사후 관리 상담률 ¹⁾			암 검진 사후 관리 상담률 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	638	35.6(2.1)	5.8	360	40.0(3.4)	8.5
성						
남자	318	34.2(2.7)	7.7	149	39.8(5.8)	14.5
여자	320	37.4(2.5)	6.7	211	40.1(3.2)	8.0
연령						
19-29	36	18.0(7.3)	40.5	5	-(-)	-
30-39	90	26.6(6.2)	23.4	49	46.3(7.3)	15.8
40-49	180	42.2(3.7)	8.7	122	40.1(5.2)	12.9
50-59	161	38.1(4.7)	12.3	105	37.7(4.6)	12.3
60-69	82	34.7(4.9)	14.1	39	41.2(7.7)	18.7
70 이상	89	45.9(4.8)	10.5	40	28.3(8.1)	28.7
생애주기별						
19-44	225	31.3(3.6)	11.4	122	48.2(5.5)	11.5
45-64	297	36.8(3.3)	8.8	185	35.8(3.6)	9.9
65-74	67	48.0(6.1)	12.8	27	25.2(8.2)	32.7
75 이상	49	40.9(7.5)	18.3	26	36.5(10.5)	28.6
교육수준 ³⁾						
무학	53	40.5(5.5)	13.6	27	33.8(10.1)	29.8
초등학교	84	41.4(4.5)	10.9	45	37.6(7.1)	18.8
중학교	79	31.1(5.8)	18.5	44	30.1(6.4)	21.4
고등학교	266	34.2(3.1)	9.1	154	39.2(4.4)	11.3
대학교 이상	156	36.2(3.9)	10.9	90	47.6(6.3)	13.1
직업						
전문행정관리	109	35.1(4.3)	12.3	68	32.7(5.8)	17.7
사무직	74	33.2(6.0)	18.0	39	38.6(6.8)	17.8
판매·서비스직	51	38.5(7.4)	19.2	34	47.1(9.1)	19.4
농림어업	28	36.2(10.0)	27.6	17	-(-)	-
기능단순노무직	158	30.5(3.8)	12.4	75	39.3(8.0)	20.5
기타 ⁴⁾	216	41.4(3.2)	7.8	127	45.3(4.5)	9.8
월 가구소득						
100만원 이하	131	30.6(3.9)	12.8	66	20.6(6.3)	30.6
101-200만원	97	34.7(4.5)	12.9	58	41.6(7.3)	17.5
201-300만원	112	30.9(5.0)	16.2	73	37.9(5.2)	13.8
301-400만원	61	27.1(6.5)	23.9	39	34.3(9.4)	27.3
401만원 이상	145	56.3(5.0)	8.9	101	55.7(5.5)	9.9
거주유형						
읍·면	638	35.6(2.1)	5.8	360	40.0(3.4)	8.5

주 : 1) 건강검진 사후 관리상담률 : (건강검진 후 검진결과에 대해 병의원, 보건소 등에서 상담을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 최근 2년 동안 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수) × 100

2) 암 검진 사후 관리상담률 : (암 검진 후 검진결과에 대해 병의원, 보건소 등에서 상담을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 70〉 암 검진 미수진 이유¹⁾

(단위 : %)

구분	N	검진비용이 비싸서		검진을 받을 시간이 없어서		검진기관 위치를 몰라서		필요성을 느끼지 못해서		기타	
		% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
전체	557	10.9(1.4)	13.0	13.3(2.0)	14.8	0.8(0.5)	57.4	68.8(2.1)	3.1	6.2(0.9)	14.6
성											
남자	276	5.1(1.3)	24.9	12.5(2.2)	17.2	0.2(0.2)	100.8	78.2(2.6)	3.4	4.0(1.2)	29.3
여자	281	17.9(2.6)	14.7	14.3(2.5)	17.6	1.6(1.0)	63.7	57.3(3.0)	5.3	8.9(1.4)	16.0
연령											
19-29	91	5.6(2.9)	52.5	4.5(2.2)	48.7	0.0(0.0)	.	86.0(3.5)	4.1	3.9(1.8)	46.3
30-39	110	8.3(2.2)	26.4	12.4(3.5)	28.3	0.8(0.7)	98.1	73.7(4.5)	6.1	4.8(2.2)	46.3
40-49	119	7.2(2.5)	35.1	25.1(4.9)	19.6	0.0(0.0)	.	63.9(5.1)	7.9	3.8(1.6)	43.1
50-59	93	10.4(2.6)	24.5	23.6(4.5)	18.9	0.0(0.0)	.	58.1(4.6)	7.9	7.9(2.2)	28.1
60-69	64	21.5(5.8)	26.9	13.3(5.2)	38.7	1.5(1.5)	100.6	54.9(7.0)	12.8	8.7(3.9)	44.5
70 이상	80	27.3(6.2)	22.6	1.1(1.1)	100.4	4.7(3.0)	62.3	52.3(6.0)	11.5	14.5(3.3)	22.5
생애주기별											
19-44	267	6.2(1.6)	25.4	11.1(2.6)	23.0	0.3(0.3)	99.4	78.1(2.8)	3.6	4.3(1.2)	27.0
45-64	185	12.0(2.4)	20.1	23.8(3.4)	14.1	0.0(0.0)	.	57.7(3.9)	6.7	6.5(1.5)	23.9
65-74	57	33.7(8.1)	24.0	3.0(2.9)	98.3	5.0(4.8)	96.7	47.2(6.3)	13.3	11.1(4.6)	41.5
75 이상	48	21.5(5.9)	27.5	0.0(0.0)	.	4.0(2.8)	69.9	58.0(7.8)	13.4	16.6(5.2)	31.3
교육수준 ²⁾											
무학	56	30.8(8.1)	26.4	4.9(2.7)	55.5	5.0(3.5)	71.0	49.2(8.0)	16.2	10.1(3.9)	38.3
초등학교	62	27.4(5.8)	21.3	7.4(3.9)	53.0	2.7(2.0)	72.0	52.4(5.6)	10.8	10.0(3.2)	32.4
중학교	56	16.6(3.6)	21.5	23.2(5.2)	22.4	0.0(0.0)	.	46.6(6.0)	12.9	13.6(5.3)	38.6
고등학교	238	7.6(1.5)	20.1	13.5(2.9)	21.4	0.4(0.4)	101.1	74.5(3.3)	4.4	4.1(1.1)	27.9
대학교 이상	144	4.1(1.8)	43.6	14.4(3.6)	24.9	0.0(0.0)	.	76.2(4.2)	5.5	5.2(1.9)	36.0
직업											
전문행정관리	77	8.3(3.2)	38.5	19.7(4.4)	22.5	0.0(0.0)	.	68.4(5.3)	7.7	3.7(1.6)	44.2
사무직	53	6.9(3.3)	48.1	11.4(6.5)	56.9	0.0(0.0)	.	77.7(7.7)	9.9	4.0(2.7)	68.5
판매·서비스직	46	5.8(3.0)	51.3	33.6(6.4)	19.1	0.0(0.0)	.	60.6(6.9)	11.3	0.0(0.0)	.
농림어업	22	6.9(6.7)	97.0	24.1(11.8)	48.9	0.0(0.0)	.	64.2(13.2)	20.6	4.8(4.7)	99.2
기능단순노무직	124	7.7(2.5)	32.8	12.5(3.1)	24.7	0.0(0.0)	.	76.7(3.4)	4.5	3.1(1.4)	43.3
기타 ³⁾	229	17.0(3.0)	17.5	5.9(1.8)	30.9	2.2(1.3)	57.5	63.4(3.2)	5.0	11.5(1.8)	15.7
월 가구소득											
100만원 이하	136	22.6(4.6)	20.3	9.3(2.7)	29.2	2.5(1.5)	62.7	58.5(5.2)	8.8	7.1(2.0)	28.2
101-200만원	79	5.5(1.9)	35.1	14.6(4.1)	28.3	0.0(0.0)	.	73.0(5.1)	7.0	6.9(2.5)	36.7
201-300만원	104	10.9(3.8)	34.4	14.9(3.5)	23.7	0.9(0.9)	98.7	68.6(5.4)	7.8	4.7(2.3)	49.1
301-400만원	48	5.7(2.8)	49.2	26.5(8.0)	30.3	0.0(0.0)	.	64.3(7.5)	11.6	3.5(2.0)	58.7
401만원 이상	92	8.7(3.3)	37.9	14.1(3.6)	25.6	0.0(0.0)	.	71.8(4.9)	6.8	5.4(2.0)	36.9
거주유형											
읍·면	557	10.9(1.4)	13.0	13.3(2.0)	14.8	0.8(0.5)	57.4	68.8(2.1)	3.1	6.2(0.9)	14.6

주 : 1) 암 검진 미수진 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 없다고 응답한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 71〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	921	14.6(1.4)	10.0	427	10.1(1.6)	15.8	494	19.2(2.0)	10.6
연령									
19-29	97	10.3(2.9)	28.3	43	9.7(4.2)	43.7	54	11.1(4.3)	39.0
30-39	159	14.2(3.1)	21.7	71	10.9(3.7)	33.6	88	17.6(4.0)	22.5
40-49	243	11.3(2.3)	20.3	121	7.2(2.5)	34.9	122	16.0(3.5)	21.7
50-59	198	11.5(2.2)	18.7	89	6.7(2.4)	35.3	109	16.9(3.3)	19.3
60-69	103	22.0(5.0)	22.7	53	20.2(6.1)	30.4	50	23.7(6.3)	26.4
70 이상	121	29.2(4.0)	13.8	50	16.7(4.4)	26.5	71	36.8(5.5)	15.0
생애주기별									
19-44	392	11.8(1.9)	16.1	180	9.3(2.4)	25.6	212	14.6(2.3)	15.9
45-64	370	12.9(1.9)	14.7	179	8.9(2.1)	23.1	191	17.4(2.8)	16.2
65-74	84	33.1(5.6)	17.0	34	13.6(6.2)	45.7	50	44.2(7.2)	16.2
75 이상	75	25.4(4.6)	18.1	34	24.4(6.7)	27.4	41	26.2(6.1)	23.2
교육수준 ²⁾									
무학	84	34.0(4.0)	11.9	20	24.7(8.1)	32.8	64	36.8(5.4)	14.8
초등학교	108	23.1(5.9)	25.5	40	19.5(7.7)	39.3	68	25.2(6.4)	25.2
중학교	100	15.8(3.6)	22.6	45	17.8(5.1)	28.8	55	14.1(4.3)	30.8
고등학교	394	9.9(1.9)	19.7	199	6.0(1.9)	31.6	195	14.7(3.0)	20.5
대학교 이상	234	13.6(2.7)	20.0	122	10.9(3.0)	27.1	112	17.3(3.7)	21.1
직업									
전문행정관리	145	9.3(2.0)	21.6	73	6.3(2.8)	44.8	72	12.9(3.6)	27.9
사무직	92	9.5(2.9)	30.8	57	0.0(0.0)	.	35	27.6(7.8)	28.2
판매·서비스직	80	18.1(4.0)	22.0	28	16.2(5.6)	34.9	52	19.5(5.4)	27.4
농림어업	39	15.6(7.7)	49.6	25	9.4(8.6)	91.9	14	-(-)	-
기능단순노무직	200	12.1(2.9)	23.7	154	10.5(2.5)	23.2	46	18.5(8.2)	44.3
기타 ³⁾	359	19.4(2.2)	11.4	86	19.6(4.7)	23.9	273	19.4(2.3)	11.7
월 가구소득									
100만원 이하	204	23.6(3.6)	15.1	81	19.3(4.4)	22.7	123	26.5(4.9)	18.5
101-200만원	137	12.7(2.6)	20.6	65	11.7(3.4)	28.5	72	13.8(3.6)	26.0
201-300만원	179	15.9(3.0)	18.5	84	11.6(3.7)	31.8	95	20.7(4.7)	22.7
301-400만원	87	6.4(2.6)	41.0	44	6.5(3.4)	52.6	43	6.2(3.3)	53.4
401만원 이상	193	13.8(2.6)	18.9	94	8.7(3.3)	37.3	99	19.9(3.7)	18.5
거주유형									
읍·면	921	14.6(1.4)	10.0	427	10.1(1.6)	15.8	494	19.2(2.0)	10.6

주 : 1) 만성·급성질환 및 사고중독 경험률 : (최근 2주(14일) 동안 만성·급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 72〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험일수¹⁾

(단위 : 일)

구분	전체			남자			여자		
	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수
전체	141	7.6(0.4)	5.9	45	7.0(0.8)	12.1	96	8.0(0.5)	5.9
연령									
19-29	10	-(-)	-	4	-(-)	-	6	-(-)	-
30-39	24	7.4(1.3)	18.0	8	-(-)	-	16	-(-)	-
40-49	27	7.7(0.8)	10.3	9	-(-)	-	18	-(-)	-
50-59	25	7.6(0.8)	10.1	6	-(-)	-	19	-(-)	-
60-69	21	8.0(1.0)	12.5	10	-(-)	-	11	-(-)	-
70 이상	34	8.8(0.8)	9.4	8	-(-)	-	26	9.0(0.8)	9.1

주 : 1) 만성·급성질환 및 사고중독 경험일수 : 최근 2주(14일) 동안 이환일 수의 총 합 / 만성·급성질환 및 사고중독 경험자 수

〈표 73〉 연간 평균 혈압 및 혈당 측정횟수

(단위 : 회)

구분	연간 평균 혈압 측정횟수 ¹⁾			연간 평균 혈당 측정횟수 ²⁾		
	N	회(표준오차)	변동계수	N	회(표준오차)	변동계수
전체	920	10.4(0.9)	8.6	919	2.9(0.3)	9.5
성						
남자	427	9.9(1.6)	15.7	427	2.2(0.2)	11.1
여자	493	10.8(1.1)	10.4	492	3.7(0.5)	13.3
연령						
19-29	97	10.5(1.2)	11.2	97	1.0(0.3)	25.9
30-39	159	2.9(0.3)	10.0	159	1.2(0.2)	13.0
40-49	243	6.1(1.2)	19.1	243	2.2(0.6)	28.5
50-59	198	20.9(3.9)	18.5	198	5.1(0.9)	18.5
60-69	103	11.5(3.6)	31.4	103	5.6(1.1)	18.9
70 이상	120	15.8(4.5)	28.5	119	5.4(0.8)	15.5
생애주기별						
19-44	392	6.0(0.4)	7.3	392	1.2(0.2)	13.1
45-64	370	15.1(2.2)	14.6	370	4.4(0.6)	14.6
65-74	84	12.4(3.4)	27.3	84	6.7(0.8)	12.3
75 이상	74	17.4(6.5)	37.5	73	4.3(1.0)	23.3
교육수준 ³⁾						
무학	84	11.5(4.2)	36.8	83	5.9(1.4)	24.0
초등학교	107	14.3(5.1)	35.9	107	5.8(1.1)	19.8
중학교	100	16.0(4.9)	30.4	100	6.4(1.8)	28.9
고등학교	394	11.2(1.4)	12.3	394	1.8(0.2)	11.7
대학교 이상	234	5.7(1.2)	21.4	234	1.9(0.4)	19.4
직업						
전문행정관리	145	16.5(3.1)	19.1	145	3.0(1.0)	33.4
사무직	92	3.8(0.7)	17.5	92	2.0(0.5)	26.8
판매·서비스직	80	8.7(1.0)	11.6	80	2.8(0.8)	29.0
농림어업	39	10.1(4.2)	41.3	39	4.6(2.4)	51.7
기능단순노무직	200	9.3(2.3)	25.0	200	1.7(0.2)	9.8
기타 ⁴⁾	358	11.1(1.7)	14.9	357	3.9(0.5)	12.7
월 가구소득						
100만원 이하	203	10.8(2.2)	20.5	203	4.0(0.7)	16.5
101-200만원	137	7.1(1.8)	24.9	137	4.1(1.1)	28.2
201-300만원	179	8.2(2.7)	32.6	178	3.0(0.7)	23.7
301-400만원	87	4.3(1.3)	30.3	87	2.0(0.6)	30.7
401만원 이상	193	9.4(2.1)	21.9	193	1.7(0.4)	23.1
거주유형						
읍·면	920	10.4(0.9)	8.6	919	2.9(0.3)	9.5

주 : 1) 연간 평균 혈압 측정횟수 : ((하루 측정횟수×365일)+(일주일 측정횟수×52주)+(한 달 측정횟수×12개월)+(일 년 측정횟수)) / 조사대상 응답자 수

2) 연간 평균 혈당 측정횟수 : ((하루 측정횟수×365일)+(일주일 측정횟수×52주)+(한 달 측정횟수×12개월)+(일 년 측정횟수)) / 조사대상 응답자 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 74〉 고혈압 평생 의사진단 경험률 및 현재치료를

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
고혈압 평생 의사진단 경험률 ¹⁾									
전체	918	14.7(1.0)	6.7	427	13.1(1.5)	11.8	491	16.5(1.6)	9.8
30세 이상 ²⁾	821	17.4(1.1)	6.5	384	15.4(1.9)	12.1	437	19.4(1.9)	9.7
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	159	3.0(1.5)	50.1	71	2.8(2.6)	93.9	88	3.2(1.7)	53.0
40-49	242	6.4(1.6)	24.4	121	9.8(2.9)	29.5	121	2.4(1.4)	57.5
50-59	198	26.4(2.5)	9.6	89	26.3(4.8)	18.3	109	26.5(4.1)	15.4
60-69	103	27.7(4.8)	17.3	53	15.6(4.9)	31.6	50	39.1(7.0)	17.8
70 이상	119	49.5(5.1)	10.3	50	41.6(6.6)	15.9	69	54.5(6.2)	11.3
고혈압 현재치료율 ³⁾									
전체	159	89.7(3.7)	4.2	68	82.1(7.6)	9.3	91	96.0(1.9)	2.0
30세 이상 ⁴⁾	158	89.5(3.8)	4.2	67	81.5(7.8)	9.5	91	96.0(1.9)	2.0
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	2	-(-)	-	3	-(-)	-
40-49	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	52	95.6(3.1)	3.2	23	91.7(5.8)	6.3	29	100.0(0.0)	0.0
60-69	28	96.8(3.0)	3.1	9	-(-)	-	19	-(-)	-
70 이상	58	92.0(3.5)	3.8	21	90.7(6.4)	7.0	37	92.6(4.1)	4.4

주 : 1) 고혈압 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 고혈압 현재치료율 : (현재 고혈압을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

4) 고혈압 현재치료율(≥30) : (현재 고혈압을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 75〉 본인 인지 혈압조절률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	157	96.0(1.6)	1.7	66	94.9(2.2)	2.3	91	96.9(1.7)	1.8
30세 이상 ²⁾	156	96.0(1.7)	1.7	65	94.8(2.3)	2.4	91	96.9(1.7)	1.8
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	2	-(-)	-	3	-(-)	-
40-49	14	-(-)	-	11	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	52	97.8(2.1)	2.2	23	95.9(4.0)	4.2	29	100.0(0.0)	0.0
60-69	28	100.0(0.0)	0.0	9	-(-)	-	19	-(-)	-
70 이상	57	92.3(3.0)	3.2	20	91.9(1.4)	1.5	37	92.6(4.3)	4.6

주 : 1) 본인 인지 혈압 조절률 : (혈압이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 본인 인지 혈압 조절률(≥30) : (혈압이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 76〉 당뇨병 평생 의사진단 경험률 및 현재치료를

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
당뇨병 평생 의사진단 경험률 ¹⁾									
전체	920	6.7(0.7)	10.4	427	6.7(1.1)	16.0	493	6.7(1.1)	16.3
30세 이상 ²⁾	823	8.0(0.8)	10.3	384	8.2(1.2)	15.2	439	7.9(1.3)	16.7
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	159	1.9(1.0)	54.3	71	2.7(1.9)	69.2	88	1.0(1.0)	99.9
40-49	242	4.6(1.3)	29.3	121	5.7(2.0)	34.5	121	3.3(1.6)	49.6
50-59	198	12.2(2.4)	20.0	89	13.7(4.0)	29.3	109	10.6(3.2)	30.2
60-69	103	16.9(3.3)	19.6	53	12.2(4.5)	36.9	50	21.3(5.5)	25.7
70 이상	121	13.8(2.7)	19.3	50	13.5(4.7)	34.5	71	14.0(4.3)	30.5
당뇨병 현재치료를 ³⁾									
전체	71	81.2(5.3)	6.5	35	78.8(7.2)	9.2	36	83.8(6.5)	7.8
30세 이상 ⁴⁾	71	81.2(5.3)	6.5	35	78.8(7.2)	9.2	36	83.8(6.5)	7.8
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	11	-(-)	-	7	-(-)	-	4	-(-)	-
50-59	23	77.5(10.7)	13.8	12	-(-)	-	11	-(-)	-
60-69	17	-(-)	-	7	-(-)	-	10	-(-)	-
70 이상	17	-(-)	-	7	-(-)	-	10	-(-)	-

주 : 1) 당뇨병 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 당뇨병 현재치료를 : (현재 당뇨병을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

4) 당뇨병 현재치료를(≥30) : (현재 당뇨병을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 77〉 본인 인지 혈당조절률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	69	88.7(4.7)	5.2	33	91.0(5.1)	5.6	36	86.4(7.2)	8.3
30세 이상 ²⁾	69	88.7(4.7)	5.2	33	91.0(5.1)	5.6	36	86.4(7.2)	8.3
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	11	-(-)	-	7	-(-)	-	4	-(-)	-
50-59	23	95.3(4.6)	4.8	12	-(-)	-	11	-(-)	-
60-69	17	-(-)	-	7	-(-)	-	10	-(-)	-
70 이상	16	-(-)	-	6	-(-)	-	10	-(-)	-

주 : 1) 본인 인지 혈당조절률 : (혈당이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 본인 인지 혈당조절률(≥30) : (혈당이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 78〉 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	918	5.6(0.7)	13.0	426	4.6(0.9)	20.5	492	6.7(1.2)	17.7
30세 이상 ²⁾	821	6.7(0.9)	12.7	383	5.6(1.2)	20.9	438	7.9(1.3)	17.0
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	159	2.0(1.1)	54.4	71	2.8(1.9)	69.1	88	1.1(1.1)	100.5
40-49	242	6.4(1.6)	24.9	121	8.2(2.4)	29.0	121	4.3(2.5)	56.8
50-59	197	9.5(2.2)	22.7	88	6.1(3.0)	50.2	109	13.3(2.8)	21.3
60-69	103	11.0(4.0)	36.2	53	3.5(2.4)	68.5	50	18.1(6.6)	36.3
70 이상	120	8.8(2.5)	28.7	50	5.8(3.0)	51.3	70	10.7(3.3)	30.9

주 : 1) 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 79〉 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	919	1.8(0.4)	22.0	427	3.1(0.7)	23.2	492	0.4(0.3)	71.2
50세 이상 ²⁾	421	4.4(1.0)	22.4	192	8.1(1.9)	22.9	229	0.9(0.6)	71.1
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
50-59	198	1.8(1.0)	58.1	89	2.4(1.7)	68.7	109	1.0(1.0)	102.0
60-69	103	4.2(1.9)	45.6	53	8.6(3.9)	45.0	50	0.0(0.0)	.
70 이상	120	9.4(2.4)	25.5	50	22.2(5.1)	22.8	70	1.4(1.4)	100.1

주 : 1) 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 뇌졸중(중풍)을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률(≥50) : (의사에게 뇌졸중(중풍)을 진단받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 80〉 심근경색증 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	918	0.8(0.3)	43.8	426	1.4(0.7)	48.4	492	0.2(0.2)	99.8
40세 이상 ²⁾	662	1.3(0.5)	43.0	312	2.2(1.0)	47.1	350	0.3(0.3)	100.1
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	242	0.7(0.7)	100.7	121	1.3(1.3)	99.4	121	0.0(0.0)	.
50-59	198	1.0(0.7)	69.9	89	1.1(1.1)	100.9	109	1.0(1.0)	95.9
60-69	103	4.8(2.9)	60.3	53	9.8(5.7)	57.6	50	0.0(0.0)	.
70 이상	119	0.0(0.0)	.	49	0.0(0.0)	.	70	0.0(0.0)	.

주 : 1) 심근경색증 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 심근경색증을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 심근경색증 평생 의사진단 경험률(≥40) : (의사에게 심근경색증을 진단받은 사람의 수 / 40세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 81〉 협심증 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	917	0.6(0.2)	40.9	426	0.4(0.3)	71.5	491	0.7(0.3)	50.3
40세 이상 ²⁾	661	0.9(0.4)	40.5	312	0.7(0.5)	70.9	349	1.1(0.5)	49.9
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	242	0.0(0.0)	.	121	0.0(0.0)	.	121	0.0(0.0)	.
50-59	198	1.6(0.9)	55.2	89	2.2(1.5)	69.7	109	1.0(1.0)	95.9
60-69	103	1.8(1.3)	72.9	53	0.0(0.0)	.	50	3.5(2.5)	71.2
70 이상	118	0.9(0.9)	99.6	49	0.0(0.0)	.	69	1.4(1.4)	99.9

주 : 1) 협심증 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 협심증을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 협심증 평생 의사진단 경험률(≥40) : (의사에게 협심증을 진단받은 사람의 수 / 40세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 82〉 관절염 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
관절염 평생 의사진단 경험률 ¹⁾									
전체	919	5.4(0.8)	15.5	427	2.1(0.7)	32.2	492	8.8(1.3)	14.7
50세 이상 ²⁾	421	11.7(1.5)	13.0	192	4.1(1.4)	32.9	229	18.8(2.5)	13.2
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
50-59	198	5.1(1.5)	29.0	89	2.3(1.5)	68.1	109	8.3(2.3)	27.2
60-69	103	10.8(3.7)	34.1	53	1.6(1.6)	98.2	50	19.4(6.7)	34.7
70 이상	120	25.1(3.9)	15.4	50	11.7(5.0)	42.8	70	33.5(4.8)	14.4
관절염 현재치료율 ³⁾									
전체	58	44.4(7.3)	16.5	11	-(-)	-	47	43.4(8.3)	19.0
50세 이상 ⁴⁾	51	38.9(7.4)	19.1	9	-(-)	-	42	38.6(8.2)	21.4
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
50-59	11	-(-)	-	2	-(-)	-	9	-(-)	-
60-69	10	-(-)	-	1	-(-)	-	9	-(-)	-
70 이상	30	43.6(7.6)	17.4	6	-(-)	-	24	38.6(9.0)	23.3

주 : 1) 관절염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 관절염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50) : (의사에게 관절염을 진단받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 관절염 현재치료율 : (현재 관절염을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

4) 관절염 현재치료율(≥50) : (현재 관절염을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

〈표 83〉 골다공증 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	918	4.4(0.7)	15.6	426	0.3(0.2)	72.2	492	8.6(1.3)	15.1
50세 이상 ²⁾	420	11.6(1.7)	15.0	191	0.9(0.6)	71.6	229	21.5(3.1)	14.3
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
50-59	198	5.5(1.7)	30.8	89	0.0(0.0)	.	109	11.7(3.5)	29.7
60-69	103	16.2(3.9)	24.0	53	0.0(0.0)	.	50	31.3(6.6)	21.0
70 이상	119	19.2(3.4)	17.9	49	4.0(2.7)	67.1	70	28.5(5.0)	17.4

주 : 1) 골다공증 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 골다공증을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 골다공증 평생 의사진단 경험률(≥50) : (의사에게 골다공증을 진단받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 84〉 폐결핵 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	918	1.4(0.4)	28.6	426	1.6(0.6)	39.1	492	1.2(0.5)	40.7
연령									
19-29	97	2.7(1.8)	68.2	43	4.9(3.3)	68.3	54	0.0(0.0)	.
30-39	159	0.0(0.0)	.	71	0.0(0.0)	.	88	0.0(0.0)	.
40-49	242	1.5(0.7)	46.5	121	0.8(0.8)	101.1	121	2.3(1.3)	56.1
50-59	198	1.5(0.8)	56.0	89	1.1(1.1)	99.9	109	1.9(1.3)	68.4
60-69	103	1.8(1.2)	66.5	53	1.8(1.7)	94.4	50	1.9(1.9)	99.8
70 이상	119	1.6(1.5)	98.3	49	1.9(1.9)	97.1	70	1.4(1.3)	99.4

주 : 1) 폐결핵 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 폐결핵을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 85〉 천식 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	919	2.8(0.5)	17.9	426	2.5(0.7)	28.9	493	3.1(0.7)	24.3
연령									
19-29	97	1.2(1.2)	98.3	43	2.2(2.2)	99.5	54	0.0(0.0)	.
30-39	159	1.8(1.0)	56.6	71	1.4(1.4)	100.1	88	2.3(1.6)	70.2
40-49	242	2.7(1.0)	36.9	121	2.3(1.3)	55.8	121	3.1(1.7)	53.5
50-59	198	1.4(0.7)	52.9	89	1.1(1.1)	97.5	109	1.7(1.2)	67.2
60-69	103	4.8(2.2)	45.1	53	2.0(2.0)	98.9	50	7.4(3.7)	50.1
70 이상	120	8.3(2.4)	28.4	49	11.1(4.5)	40.4	71	6.7(2.8)	42.3

주 : 1) 천식 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 천식을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 86〉 알레르기비염 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	919	9.2(1.3)	14.4	426	8.2(2.0)	24.2	493	10.3(1.5)	14.1
연령									
19-29	97	12.5(3.5)	28.2	43	9.1(4.8)	52.9	54	16.5(5.1)	31.0
30-39	159	12.9(2.9)	22.5	71	10.9(4.3)	39.8	88	15.1(3.9)	25.8
40-49	242	11.8(2.1)	18.1	121	10.8(3.5)	32.4	121	13.0(3.8)	29.1
50-59	198	4.1(1.9)	45.7	89	4.4(2.4)	53.8	109	3.8(1.8)	46.7
60-69	103	3.6(1.7)	48.4	53	3.5(2.4)	68.3	50	3.7(2.5)	68.8
70 이상	120	4.0(1.6)	39.8	49	4.0(2.7)	67.6	71	4.1(2.2)	54.6

주 : 1) 알레르기비염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 알레르기비염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 87〉 아토피피부염 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	919	1.7(0.5)	32.1	426	1.3(0.6)	46.4	493	2.0(0.8)	38.9
연령									
19-29	97	4.7(2.2)	47.0	43	2.2(2.2)	99.5	54	7.6(4.2)	55.7
30-39	159	1.2(0.9)	72.0	71	1.3(1.3)	101.0	88	1.1(1.1)	100.5
40-49	242	1.8(0.8)	43.8	121	2.6(1.4)	54.9	121	0.8(0.1)	9.3
50-59	198	0.7(0.1)	8.7	89	0.0(0.0)	.	109	1.5(0.1)	10.0
60-69	103	1.0(0.1)	9.2	53	0.0(0.0)	.	50	2.0(0.2)	10.7
70 이상	120	0.0(0.0)	.	49	0.0(0.0)	.	71	0.0(0.0)	.

주 : 1) 아토피피부염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 아토피피부염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 88〉 백내장 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	920	3.0(0.7)	21.9	427	2.2(0.5)	25.3	493	3.9(1.0)	26.3
50세 이상 ²⁾	422	7.5(1.7)	22.2	192	5.3(1.4)	26.9	230	9.6(2.5)	26.5
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
50-59	198	1.2(0.8)	68.8	89	2.2(1.5)	68.7	109	0.0(0.0)	.
60-69	103	6.2(2.7)	43.6	53	2.9(2.8)	96.2	50	9.4(5.3)	56.3
70 이상	121	20.5(4.6)	22.4	50	16.0(5.4)	33.8	71	23.3(5.9)	25.2

주 : 1) 백내장 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 백내장을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 백내장 평생 의사진단 경험률(≥50) : (의사에게 백내장을 진단받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 89〉 B형 간염 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	918	1.3(0.3)	20.9	426	1.4(0.5)	32.4	492	1.2(0.4)	36.5
연령									
19-29	97	0.0(0.0)	.	43	0.0(0.0)	.	54	0.0(0.0)	.
30-39	159	0.7(0.7)	94.0	71	1.4(1.3)	93.9	88	0.0(0.0)	.
40-49	242	2.8(0.9)	32.6	121	2.4(1.3)	52.9	121	3.2(1.5)	46.3
50-59	198	1.3(0.8)	58.1	89	1.1(1.1)	97.5	109	1.5(1.1)	71.6
60-69	103	2.7(1.6)	58.4	53	3.6(2.5)	69.7	50	1.8(1.8)	100.3
70 이상	119	0.0(0.0)	.	49	0.0(0.0)	.	70	0.0(0.0)	.

주 : 1) B형 간염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 B형 간염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 90〉 C형 간염 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	918	0.0(0.0)	.	426	0.0(0.0)	.	492	0.0(0.0)	.
연령									
19-29	97	0.0(0.0)	.	43	0.0(0.0)	.	54	0.0(0.0)	.
30-39	159	0.0(0.0)	.	71	0.0(0.0)	.	88	0.0(0.0)	.
40-49	242	0.0(0.0)	.	121	0.0(0.0)	.	121	0.0(0.0)	.
50-59	198	0.0(0.0)	.	89	0.0(0.0)	.	109	0.0(0.0)	.
60-69	103	0.0(0.0)	.	53	0.0(0.0)	.	50	0.0(0.0)	.
70 이상	119	0.0(0.0)	.	49	0.0(0.0)	.	70	0.0(0.0)	.

주 : 1) C형 간염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 C형 간염을 진단 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 91〉 빈혈 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	918	4.1(0.7)	16.7	426	0.9(0.6)	63.8	492	7.4(1.2)	16.7
연령									
19-29	97	4.6(2.3)	50.2	43	2.6(2.6)	101.8	54	7.1(4.2)	58.3
30-39	159	4.5(1.5)	34.0	71	1.4(1.4)	101.5	88	7.7(3.0)	38.4
40-49	242	3.3(1.3)	38.4	121	0.0(0.0)	.	121	7.1(2.6)	37.0
50-59	198	2.9(0.9)	31.3	89	0.0(0.0)	.	109	6.1(1.9)	31.2
60-69	103	4.9(2.8)	58.1	53	0.0(0.0)	.	50	9.4(5.2)	55.1
70 이상	119	5.8(2.0)	34.8	49	1.7(1.7)	97.6	70	8.4(3.5)	42.3

주 : 1) 빈혈 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 빈혈을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 92〉 중이염 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	918	1.8(0.4)	25.6	426	1.6(0.6)	37.6	492	1.9(0.7)	38.3
연령									
19-29	97	2.3(1.6)	68.8	43	2.3(2.3)	101.4	54	2.3(2.3)	100.1
30-39	159	1.2(0.9)	70.0	71	1.4(1.4)	101.5	88	1.1(1.1)	100.5
40-49	242	1.7(1.0)	60.1	121	2.4(1.4)	57.2	121	0.9(0.8)	97.4
50-59	198	0.9(0.6)	69.2	89	0.0(0.0)	.	109	1.8(1.3)	70.3
60-69	103	2.8(1.7)	60.0	53	1.8(1.8)	98.2	50	3.8(3.6)	96.8
70 이상	119	2.9(1.6)	56.3	49	2.0(2.0)	99.8	70	3.4(2.4)	70.3

주 : 1) 중이염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 중이염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 93〉 위십이지장궤양 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	918	2.9(0.6)	19.8	426	4.1(0.9)	22.1	492	1.7(0.6)	33.5
연령									
19-29	97	2.3(1.6)	68.4	43	2.3(2.3)	99.0	54	2.3(2.3)	100.1
30-39	159	1.9(1.1)	57.1	71	1.5(1.5)	99.2	88	2.3(1.6)	68.9
40-49	242	3.4(1.2)	35.0	121	4.9(1.9)	37.6	121	1.6(1.1)	69.0
50-59	198	3.2(1.0)	30.8	89	4.5(1.7)	38.9	109	1.8(1.2)	67.0
60-69	103	2.7(1.5)	56.1	53	5.6(3.0)	54.4	50	0.0(0.0)	.
70 이상	119	4.6(1.7)	36.6	49	9.9(4.1)	41.7	70	1.4(1.3)	96.9

주 : 1) 위십이지장궤양 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 위십이지장궤양을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 94〉 치질 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	918	4.4(0.6)	13.4	426	4.4(1.0)	23.1	492	4.5(0.8)	18.9
연령									
19-29	97	1.2(1.2)	100.4	43	2.2(2.3)	101.8	54	0.0(0.0)	.
30-39	159	2.3(1.1)	47.7	71	1.4(1.4)	100.1	88	3.2(1.8)	56.9
40-49	242	9.6(1.6)	16.9	121	9.1(2.3)	25.5	121	10.2(3.0)	29.8
50-59	198	4.4(1.6)	36.4	89	5.0(2.3)	46.6	109	3.7(1.8)	47.9
60-69	103	5.3(2.4)	45.0	53	4.7(3.3)	69.7	50	5.8(3.4)	58.1
70 이상	119	0.9(0.9)	95.8	49	0.0(0.0)	.	70	1.4(1.4)	96.7

주 : 1) 치질 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 치질을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 95〉 암 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	918	2.6(0.5)	17.9	426	2.5(0.7)	26.9	492	2.7(0.7)	26.2
연령									
19-29	97	0.8(0.8)	100.2	43	0.0(0.0)	.	54	1.7(1.7)	97.0
30-39	159	0.6(0.6)	98.8	71	0.0(0.0)	.	88	1.2(1.2)	98.8
40-49	242	1.5(0.7)	50.1	121	1.5(1.1)	72.4	121	1.5(1.1)	70.7
50-59	198	5.7(1.3)	23.3	89	5.6(2.2)	38.5	109	5.7(2.1)	36.3
60-69	103	4.7(2.1)	43.8	53	5.2(3.0)	57.0	50	4.2(2.9)	68.9
70 이상	119	4.8(1.9)	40.4	49	7.7(3.8)	49.3	70	3.0(2.0)	68.5

주 : 1) 암 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 암을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 96〉 갑상선장애 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	918	2.1(0.4)	21.2	426	0.2(0.2)	98.7	492	4.1(0.9)	21.4
연령									
19-29	97	0.8(0.8)	98.3	43	0.0(0.0)	.	54	1.7(1.7)	98.2
30-39	159	2.6(1.1)	40.6	71	0.0(0.0)	.	88	5.4(2.2)	40.1
40-49	242	2.8(1.2)	43.7	121	0.0(0.0)	.	121	6.0(2.6)	42.6
50-59	198	2.7(1.1)	41.5	89	1.1(1.1)	96.9	109	4.4(2.1)	48.1
60-69	103	2.4(1.7)	71.5	53	0.0(0.0)	.	50	4.7(3.3)	71.6
70 이상	119	0.0(0.0)	.	49	0.0(0.0)	.	70	0.0(0.0)	.

주 : 1) 갑상선장애 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 갑상선장애를 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 97〉 우울증 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	918	0.8(0.3)	40.6	426	0.3(0.2)	71.7	492	1.4(0.5)	40.4
연령									
19-29	97	0.0(0.0)	.	43	0.0(0.0)	.	54	0.0(0.0)	.
30-39	159	1.0(0.7)	70.5	71	0.0(0.0)	.	88	2.1(1.5)	69.8
40-49	242	0.7(0.7)	100.0	121	0.0(0.0)	.	121	1.6(1.6)	99.9
50-59	198	0.9(0.7)	68.6	89	0.0(0.0)	.	109	2.0(1.4)	69.0
60-69	103	0.9(1.0)	101.5	53	1.9(2.0)	100.9	50	0.0(0.0)	.
70 이상	119	1.6(1.1)	69.0	49	2.0(1.9)	97.6	70	1.4(1.4)	101.0

주 : 1) 우울증 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 우울증을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 98〉 과민성방광 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	920	1.0(0.4)	36.3	427	0.4(0.3)	72.9	493	1.7(0.7)	42.6
연령									
19-29	97	0.0(0.0)	.	43	0.0(0.0)	.	54	0.0(0.0)	.
30-39	159	0.6(0.6)	100.9	71	0.0(0.0)	.	88	1.2(1.2)	100.6
40-49	242	1.3(0.9)	75.2	121	0.0(0.0)	.	121	2.7(2.1)	75.9
50-59	198	2.3(1.0)	43.3	89	1.1(1.1)	97.5	109	3.6(1.8)	50.2
60-69	103	0.0(0.0)	.	53	0.0(0.0)	.	50	0.0(0.0)	.
70 이상	121	1.5(1.0)	67.4	50	1.8(1.7)	96.7	71	1.4(1.3)	97.0

주 : 1) 과민성방광 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 과민성방광을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 99〉 요실금 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	920	0.5(0.2)	38.5	427	0.0(0.0)	.	493	1.1(0.4)	38.8
연령									
19-29	97	0.0(0.0)	.	43	0.0(0.0)	.	54	0.0(0.0)	.
30-39	159	0.5(0.5)	99.8	71	0.0(0.0)	.	88	1.1(1.1)	98.1
40-49	242	0.4(0.4)	97.4	121	0.0(0.0)	.	121	0.9(0.8)	97.4
50-59	198	0.4(0.4)	96.6	89	0.0(0.0)	.	109	0.9(0.9)	96.6
60-69	103	1.8(1.2)	70.1	53	0.0(0.0)	.	50	3.4(2.4)	69.3
70 이상	121	0.8(0.8)	97.0	50	0.0(0.0)	.	71	1.4(1.3)	97.0

주 : 1) 요실금 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 요실금을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 100〉 고혈압 약물치료율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	159	89.7(3.7)	4.2	68	82.1(7.6)	9.3	91	96.0(1.9)	2.0
30세 이상 ²⁾	158	89.5(3.8)	4.2	67	81.5(7.8)	9.5	91	96.0(1.9)	2.0
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	2	-(-)	-	3	-(-)	-
40-49	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	52	95.6(3.1)	3.2	23	91.7(5.8)	6.3	29	100.0(0.0)	0.0
60-69	28	96.8(3.0)	3.1	9	-(-)	-	19	-(-)	-
70 이상	58	92.0(3.5)	3.8	21	90.7(6.4)	7.0	37	92.6(4.1)	4.4

주 : 1) 고혈압 약물치료율 : (현재 혈압조절약을 한 달(30일)에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 약물치료율(≥30) : (현재 혈압조절약을 한 달(30일)에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 101〉 고혈압 관리교육 장소 및 고혈압 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	고혈압 관리교육 장소 ¹⁾						고혈압 관리교육 이수율 ²⁾	
	병의원		한방병원		보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)			
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	23.0(2.5)	10.9	2.6(1.3)	50.4	2.8(1.3)	45.5	24.0(2.5)	10.6
성								
남자	26.3(5.4)	20.7	4.3(2.6)	59.6	3.9(2.4)	60.6	27.3(5.4)	19.6
여자	20.2(4.1)	20.2	1.2(1.2)	100.3	1.9(1.4)	70.6	21.2(4.2)	20.0
30세 이상 ^{3), 4)}	23.3(2.5)	10.9	2.6(1.3)	50.4	2.9(1.3)	45.6	24.3(2.6)	10.6
연령								
19-29	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
30-39	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
40-49	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
50-59	21.1(4.6)	21.6	2.2(2.1)	96.5	3.7(2.6)	69.7	22.6(4.8)	21.3
60-69	24.2(8.4)	34.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	24.2(8.4)	34.6
70 이상	26.9(5.7)	21.1	3.6(2.6)	70.6	4.9(2.7)	56.0	28.5(5.9)	20.6

주 : 1) 고혈압 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 관리교육 이수율 : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 고혈압 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 고혈압 관리교육 이수율(≥30) : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 102〉 고혈압 의료기관 방문횟수¹⁾

(단위 : 회)

구분	전체			남자			여자		
	N	회(표준오차)	변동계수	N	회(표준오차)	변동계수	N	회(표준오차)	변동계수
전체	159	9.9(0.5)	4.8	68	8.7(0.8)	9.5	91	10.9(0.5)	4.4
30세 이상 ²⁾	158	9.9(0.5)	4.8	67	8.6(0.8)	9.6	91	10.9(0.5)	4.4
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	2	-(-)	-	3	-(-)	-
40-49	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	52	10.3(0.5)	5.4	23	9.5(0.9)	9.7	29	11.1(0.4)	3.6
60-69	28	11.5(0.9)	7.8	9	-(-)	-	19	-(-)	-
70 이상	58	10.8(0.7)	6.7	21	10.5(0.9)	8.1	37	11.0(1.0)	9.0

주 : 1) 고혈압 의료기관 방문횟수 : (최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 의료기관을 방문한 횟수의 총 합 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 의료기관 방문횟수(≥30) : (최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 의료기관을 방문한 횟수의 총 합 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 103〉 당뇨병 치료율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	71	81.2(5.3)	6.5	35	78.8(7.2)	9.2	36	83.8(6.5)	7.8
30세 이상 ²⁾	71	81.2(5.3)	6.5	35	78.8(7.2)	9.2	36	83.8(6.5)	7.8
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	11	-(-)	-	7	-(-)	-	4	-(-)	-
50-59	23	77.5(10.7)	13.8	12	-(-)	-	11	-(-)	-
60-69	17	-(-)	-	7	-(-)	-	10	-(-)	-
70 이상	17	-(-)	-	7	-(-)	-	10	-(-)	-

주 : 1) 당뇨병 치료율 : (현재 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사 진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 치료율(≥30) : (현재 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 104〉 당뇨병 관리교육 장소 및 당뇨병 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	당뇨병 관리교육 장소 ¹⁾						당뇨병 관리교육 이수율 ²⁾	
	병의원		한방병원		보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)			
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	30.2(4.8)	15.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	30.2(4.8)	15.8
성								
남자	27.8(6.2)	22.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	27.8(6.2)	22.5
여자	32.8(8.7)	26.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	32.8(8.7)	26.7
30세 이상 ^{3), 4)}	30.2(4.8)	15.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	30.2(4.8)	15.8
연령								
19-29	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
30-39	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
40-49	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
50-59	24.3(10.8)	44.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	24.3(10.8)	44.4
60-69	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
70 이상	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-

주 : 1) 당뇨병 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 관리교육 이수율 : (당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 당뇨병 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 당뇨병 관리교육 이수율(≥30) : (당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 105〉 당뇨병 의료기관 방문횟수¹⁾

(단위 : 회)

구분	전체			남자			여자		
	N	회(표준오차)	변동계수	N	회(표준오차)	변동계수	N	회(표준오차)	변동계수
전체	71	9.2(0.7)	7.8	35	9.1(1.0)	10.7	36	9.3(1.2)	12.5
30세 이상 ²⁾	71	9.2(0.7)	7.8	35	9.1(1.0)	10.7	36	9.3(1.2)	12.5
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	11	-(-)	-	7	-(-)	-	4	-(-)	-
50-59	23	8.9(1.1)	12.5	12	-(-)	-	11	-(-)	-
60-69	17	-(-)	-	7	-(-)	-	10	-(-)	-
70 이상	17	-(-)	-	7	-(-)	-	10	-(-)	-

주 : 1) 당뇨병 의료기관 방문횟수 : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 의료기관을 방문한 횟수의 총 합 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 의료기관 방문횟수(≥30) : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 의료기관을 방문한 횟수의 총 합 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 106〉 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 및 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율

(단위 : %)

구분	당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 ¹⁾			당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	71	39.6(5.8)	14.7	70	51.0(5.7)	11.1
성						
남자	35	34.6(7.7)	22.3	34	51.1(7.9)	15.5
여자	36	44.8(8.1)	18.0	36	51.0(8.3)	16.4
30세 이상 ^{3), 4)}	71	39.6(5.8)	14.7	70	51.0(5.7)	11.1
연령						
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	3	-(-)	-	3	-(-)	-
40-49	11	-(-)	-	11	-(-)	-
50-59	23	39.7(11.5)	29.0	23	58.5(8.5)	14.6
60-69	17	-(-)	-	17	-(-)	-
70 이상	17	-(-)	-	16	-(-)	-

주 : 1) 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30) : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30) : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 107〉 당화혈색소 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	66	17.8(4.5)	25.4	34	25.2(7.3)	29.1	32	9.2(3.6)	39.2
30세 이상 ²⁾	66	17.8(4.5)	25.4	34	25.2(7.3)	29.1	32	9.2(3.6)	39.2
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	11	-(-)	-	7	-(-)	-	4	-(-)	-
50-59	20	19.7(8.7)	44.1	12	-(-)	-	8	-(-)	-
60-69	16	-(-)	-	7	-(-)	-	9	-(-)	-
70 이상	16	-(-)	-	6	-(-)	-	10	-(-)	-

주 : 1) 당화혈색소 인지율 : (당화혈색소에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당화혈색소 인지율(≥30) : (당화혈색소에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 108〉관절염 관리교육 장소 및 관절염 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	관절염 관리교육 장소 ¹⁾						관절염 관리교육 이수율 ²⁾	
	병의원		한방병원		보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)			
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	40.7(4.5)	11.1	7.4(2.7)	36.7	4.2(2.9)	70.1	42.1(5.1)	12.1
성								
남자	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
여자	35.6(4.4)	12.5	5.1(1.5)	29.9	5.2(3.6)	69.8	37.3(5.2)	14.0
50세 이상 ^{3), 4)}	32.8(3.5)	10.6	6.5(2.1)	31.6	5.1(3.5)	68.9	34.4(4.8)	13.9
연령								
19-29	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
60-69	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
70 이상	32.2(6.1)	19.0	8.8(2.9)	32.8	8.9(6.2)	69.8	35.1(7.2)	20.4

주 : 1) 관절염 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 관절염 관리교육 이수율 : (관절염 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 관절염 관리교육 장소(≥50) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

4) 관절염 관리교육 이수율(≥50) : (관절염 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

〈표 109〉천식증상경험률 및 운동성 천식이환율

(단위 : %)

구분	천식증상경험률 ¹⁾			운동성 천식이환율 ²⁾		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	918	3.2(0.6)	19.7	917	3.3(0.5)	15.9
성						
남자	425	2.5(0.8)	33.4	425	2.7(0.5)	20.5
여자	493	3.9(0.7)	19.1	492	4.0(0.8)	19.0
연령						
19-29	97	1.4(1.4)	100.1	97	0.0(0.0)	.
30-39	159	0.7(0.7)	100.1	159	0.5(0.5)	99.0
40-49	242	0.7(0.5)	70.4	242	1.1(0.6)	55.5
50-59	198	3.7(1.4)	38.7	198	3.5(1.3)	38.5
60-69	103	7.3(3.2)	43.3	103	7.5(2.7)	35.5
70 이상	119	13.1(2.6)	19.7	118	16.2(2.9)	18.0

주 : 1) 천식증상경험률 : (최근 1년(365일) 동안 가슴에서 쉼쉼하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 운동성 천식이환율 : (최근 1년(365일) 동안 운동중이나 운동 후에 숨 쉴 때, 가슴에서 쉼쉼하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 110〉 과민성방광 증상 점수¹⁾

(단위 : %)

구분	경증 과민성방광 증상 (0-5점)			중등도 과민성방광 증상 (6-11점)			중증 과민성방광 증상 (12-15점)		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	900	97.2(0.6)	0.6	900	2.7(0.5)	18.9	900	0.1(0.1)	99.9
성									
남자	416	98.0(0.5)	0.5	416	2.0(0.5)	23.6	416	0.0(0.0)	.
여자	484	96.3(0.9)	1.0	484	3.5(0.9)	24.1	484	0.2(0.2)	99.4
연령									
19-29	95	100.0(0.0)	0.0	95	0.0(0.0)	.	95	0.0(0.0)	.
30-39	157	100.0(0.0)	0.0	157	0.0(0.0)	.	157	0.0(0.0)	.
40-49	240	98.5(0.8)	0.9	240	1.5(0.8)	57.8	240	0.0(0.0)	.
50-59	193	98.8(0.8)	0.8	193	1.2(0.8)	68.9	193	0.0(0.0)	.
60-69	97	92.7(2.8)	3.1	97	7.3(2.8)	38.6	97	0.0(0.0)	.
70 이상	118	83.8(3.6)	4.3	118	15.3(3.5)	23.0	118	0.9(0.8)	96.9
생애주기별									
19-44	385	99.7(0.2)	0.2	385	0.3(0.2)	68.3	385	0.0(0.0)	.
45-64	363	98.4(0.5)	0.5	363	1.6(0.5)	30.9	363	0.0(0.0)	.
65-74	80	89.4(3.5)	3.9	80	9.4(3.5)	37.1	80	1.2(1.2)	95.5
75 이상	72	77.8(4.9)	6.3	72	22.2(4.9)	21.9	72	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	80	80.0(4.8)	6.0	80	20.0(4.8)	23.9	80	0.0(0.0)	.
초등학교	103	95.8(2.2)	2.3	103	3.3(1.6)	48.3	103	0.9(0.9)	98.8
중학교	99	97.2(1.5)	1.6	99	2.8(1.5)	55.0	99	0.0(0.0)	.
고등학교	386	98.6(0.5)	0.6	386	1.4(0.5)	38.1	386	0.0(0.0)	.
대학교 이상	231	99.7(0.3)	0.3	231	0.3(0.3)	101.3	231	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	144	99.3(0.7)	0.7	144	0.7(0.7)	99.6	144	0.0(0.0)	.
사무직	91	100.0(0.0)	0.0	91	0.0(0.0)	.	91	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	80	98.1(1.4)	1.4	80	1.9(1.4)	71.8	80	0.0(0.0)	.
농림어업	37	93.4(4.1)	4.4	37	6.6(4.1)	61.7	37	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	191	98.8(0.7)	0.7	191	1.2(0.7)	57.2	191	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	351	94.3(1.4)	1.5	351	5.4(1.4)	25.0	351	0.2(0.2)	99.6
월 가구소득									
100만원 이하	200	90.7(2.1)	2.3	200	8.8(1.9)	22.0	200	0.5(0.4)	97.0
101-200만원	135	98.1(1.4)	1.4	135	1.9(1.4)	73.1	135	0.0(0.0)	.
201-300만원	176	99.1(0.7)	0.7	176	0.9(0.7)	72.6	176	0.0(0.0)	.
301-400만원	87	98.0(1.4)	1.4	87	2.0(1.4)	68.0	87	0.0(0.0)	.
401만원 이상	192	99.6(0.4)	0.4	192	0.4(0.4)	98.6	192	0.0(0.0)	.
거주유형									
읍·면	900	97.2(0.6)	0.6	900	2.7(0.5)	18.9	900	0.1(0.1)	99.9

주 : 1) 과민성방광 증상 점수 : 경증 과민성방광 증상(0-5점), 중등도 과민성방광 증상(6-11점), 중증 과민성방광 증상(12-15점)

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 111〉 대사증후군 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	879	33.3(2.2)	6.5	407	32.0(2.6)	8.3	472	34.7(2.4)	6.9
연령									
19-29	92	28.2(4.5)	15.9	43	18.1(4.9)	27.0	49	42.0(7.2)	17.2
30-39	158	35.6(5.1)	14.3	70	35.0(5.5)	15.6	88	36.3(5.9)	16.2
40-49	237	39.6(4.3)	10.8	118	36.1(5.3)	14.7	119	43.7(4.3)	9.8
50-59	192	44.7(3.5)	7.9	84	44.6(5.2)	11.7	108	44.8(4.9)	10.9
60-69	92	17.5(3.7)	21.0	47	24.7(6.2)	25.0	45	10.6(3.9)	37.1
70 이상	108	10.1(2.4)	23.9	45	17.0(5.2)	30.2	63	5.6(2.1)	38.3

주 : 1) 대사증후군 인지율 : (대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 112〉 에이즈 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	885	80.5(1.6)	1.9	413	83.2(2.0)	2.4	472	77.5(2.1)	2.8
연령									
19-29	93	83.9(4.7)	5.6	43	83.9(6.5)	7.8	50	83.9(5.0)	6.0
30-39	157	87.5(2.2)	2.5	70	84.8(3.5)	4.1	87	90.3(2.6)	2.9
40-49	240	91.7(1.7)	1.8	120	92.5(2.3)	2.5	120	90.8(2.8)	3.1
50-59	194	85.0(2.6)	3.1	87	86.7(3.1)	3.6	107	83.1(4.3)	5.1
60-69	92	61.5(5.1)	8.3	48	68.9(6.1)	8.9	44	54.3(7.1)	13.2
70 이상	109	34.7(4.7)	13.5	45	48.4(6.5)	13.3	64	26.1(5.3)	20.1

주 : 1) 에이즈 인지율 : (에이즈에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 113〉 필요의료서비스 미치료를 및 필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료를

(단위 : %)

구분	필요의료서비스 미치료를 ¹⁾			필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료를 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	921	8.7(1.1)	12.4	87	24.6(4.5)	18.3
성						
남자	427	6.9(1.3)	18.7	35	21.1(7.7)	36.7
여자	494	10.7(1.3)	12.5	52	26.9(4.3)	15.9
연령						
19-29	97	3.9(1.8)	45.1	5	-()	-
30-39	159	9.4(2.4)	25.7	15	-()	-
40-49	243	7.7(1.8)	22.9	18	-()	-
50-59	198	6.6(1.8)	27.5	14	-()	-
60-69	103	11.2(3.8)	33.6	12	-()	-
70 이상	121	19.4(3.0)	15.5	23	36.7(12.0)	32.6
생애주기별						
19-44	392	7.0(1.5)	21.8	29	3.2(2.8)	89.1
45-64	370	7.2(1.4)	19.9	27	43.4(9.1)	21.0
65-74	84	18.5(4.4)	23.7	15	-()	-
75 이상	75	20.8(3.6)	17.2	16	-()	-
교육수준 ³⁾						
무학	84	17.5(2.9)	16.8	15	-()	-
초등학교	108	15.2(4.2)	27.6	16	-()	-
중학교	100	5.9(2.3)	38.1	6	-()	-
고등학교	394	5.5(1.2)	22.5	23	23.0(8.8)	38.3
대학교 이상	234	10.3(2.1)	20.2	27	10.8(5.8)	53.8
직업						
전문행정관리	145	8.7(2.4)	27.3	14	-()	-
사무직	92	6.6(2.4)	36.3	6	-()	-
판매·서비스직	80	5.5(2.4)	44.4	5	-()	-
농림어업	39	4.8(3.4)	71.4	2	-()	-
기능단순노무직	200	7.7(2.0)	25.4	16	-()	-
기타 ⁴⁾	359	11.6(1.6)	14.1	44	27.7(6.8)	24.4
월가구소득						
100만원 이하	204	16.3(3.2)	19.6	33	45.0(7.7)	17.2
101-200만원	137	6.8(2.4)	34.9	10	-()	-
201-300만원	179	6.5(1.6)	24.6	12	-()	-
301-400만원	87	8.1(3.1)	38.0	9	-()	-
401만원 이상	193	5.5(1.7)	30.3	11	-()	-
거주유형						
읍·면	921	8.7(1.1)	12.4	87	24.6(4.5)	18.3

주 : 1) 필요의료서비스 미치료를 : (최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료를 : (경제적 이유로 치료를 받지 못한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 114〉 필요의료서비스 미치료 이유¹⁾

(단위 : %)

구분	N	경제적인 이유로		병의원 등에 예약을 하기 힘들어서		교통편이 불편해서		내가 갈 수 있는 시간에 병의원 등이 문을 열지 않아서		병의원 등에서 오래 기다리기 싫어서		증상이 가벼워서		기타	
		% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
전체	921	2.2(0.5)	24.3	0.0(0.0)	.	1.0(0.3)	30.8	2.6(0.5)	21.1	0.2(0.1)	58.4	0.4(0.2)	38.7	2.3(0.5)	20.3
성															
남자	427	1.4(0.6)	41.1	0.0(0.0)	.	0.4(0.2)	57.8	2.1(0.7)	35.3	0.2(0.2)	100.8	0.0(0.0)	.	2.8(0.8)	27.9
여자	494	2.9(0.7)	24.5	0.0(0.0)	.	1.6(0.6)	38.1	3.1(0.7)	22.1	0.3(0.2)	70.9	0.9(0.3)	37.9	1.9(0.4)	23.8
연령															
19-29	97	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.3(1.3)	57.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.6(1.2)	72.0
30-39	159	0.5(0.5)	100.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	4.8(1.5)	30.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	4.1(1.5)	35.6
40-49	243	1.3(1.0)	78.8	0.0(0.0)	.	1.4(0.9)	61.7	3.6(1.0)	26.4	0.0(0.0)	.	0.4(0.4)	98.4	1.1(0.6)	57.6
50-59	198	2.9(1.4)	47.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.2(0.6)	51.7	0.4(0.4)	99.8	0.9(0.5)	49.7	1.1(0.8)	71.2
60-69	103	5.3(3.2)	60.3	0.0(0.0)	.	2.6(1.5)	58.1	0.9(0.9)	100.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.5(1.8)	73.0
70 이상	121	7.1(2.5)	35.7	0.0(0.0)	.	4.2(1.4)	33.3	0.0(0.0)	.	1.6(1.1)	67.5	1.7(1.1)	65.6	4.8(2.1)	44.2
생애주기별															
19-44	392	0.2(0.2)	99.6	0.0(0.0)	.	0.7(0.4)	61.5	3.5(0.9)	26.3	0.0(0.0)	.	0.2(0.2)	96.9	2.4(0.8)	31.2
45-64	370	3.1(1.1)	34.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.2(0.7)	32.1	0.2(0.2)	99.7	0.5(0.3)	49.9	1.1(0.6)	50.1
65-74	84	6.3(2.5)	39.7	0.0(0.0)	.	4.2(2.5)	59.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.2(1.1)	95.7	6.7(2.4)	36.3
75 이상	75	7.7(3.7)	47.7	0.0(0.0)	.	5.5(2.2)	39.5	0.0(0.0)	.	2.6(1.7)	65.6	1.4(1.3)	94.3	3.5(2.0)	56.3
교육수준 ²⁾															
무학	84	6.6(1.9)	29.5	0.0(0.0)	.	5.8(2.6)	45.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.5(1.8)	51.8	1.7(1.6)	98.1
초등학교	108	5.7(3.1)	53.3	0.0(0.0)	.	2.3(1.3)	57.1	2.5(1.3)	52.6	1.7(1.2)	69.3	0.0(0.0)	.	3.0(1.0)	33.8
중학교	100	2.4(1.3)	55.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.5(1.9)	54.7
고등학교	394	1.3(0.6)	49.8	0.0(0.0)	.	0.6(0.4)	75.2	2.4(0.5)	22.3	0.0(0.0)	.	0.2(0.2)	98.2	1.1(0.5)	46.4
대학교 이상	234	1.1(0.7)	59.1	0.0(0.0)	.	0.3(0.3)	99.8	4.5(1.5)	32.4	0.3(0.3)	99.9	0.3(0.3)	98.2	3.9(1.1)	29.4
직업															
전문행정관리	145	1.8(1.1)	58.9	0.0(0.0)	.	0.5(0.5)	99.2	4.6(1.8)	38.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.8(0.9)	52.0
사무직	92	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.0(1.7)	56.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.6(2.0)	54.1
판매·서비스직	80	0.9(0.9)	98.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.0(1.4)	68.6	2.6(1.9)	72.8
농림어업	39	4.8(3.4)	71.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	200	2.0(1.1)	57.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.3(1.2)	35.2	0.0(0.0)	.	0.4(0.4)	100.4	2.0(1.0)	51.1
기타 ³⁾	359	3.2(0.9)	27.5	0.0(0.0)	.	2.5(0.8)	31.5	2.1(0.8)	36.6	0.7(0.4)	58.6	0.5(0.3)	67.2	2.6(0.8)	30.4
월 가구소득															
100만원 이하	204	7.3(2.3)	30.9	0.0(0.0)	.	2.4(1.0)	39.4	1.5(1.0)	67.5	0.8(0.6)	68.0	1.4(0.7)	54.1	2.9(1.1)	37.6
101-200만원	137	2.3(1.3)	56.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.3(1.0)	74.5	0.0(0.0)	.	0.6(0.6)	98.8	2.7(1.5)	55.3
201-300만원	179	0.4(0.4)	97.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	4.8(1.4)	28.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.2(0.9)	72.4
301-400만원	87	0.8(0.7)	90.4	0.0(0.0)	.	0.8(0.9)	103.6	3.7(2.1)	56.7	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	99.5	1.9(1.4)	72.0
401만원 이상	193	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.8(0.8)	102.7	3.4(1.3)	38.0	0.4(0.3)	98.6	0.0(0.0)	.	1.0(0.7)	72.2
거주유형															
읍·면	921	2.2(0.5)	24.3	0.0(0.0)	.	1.0(0.3)	30.8	2.6(0.5)	21.1	0.2(0.1)	58.4	0.4(0.2)	38.7	2.3(0.5)	20.3

주 : 1) 필요의료서비스 미치료 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 115〉 연간 사고중독 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	921	7.6(0.9)	12.3	427	8.3(1.3)	15.4	494	6.9(0.9)	13.7
연령									
19-29	97	4.4(2.1)	47.5	43	5.1(3.3)	63.4	54	3.4(2.3)	67.6
30-39	159	9.3(2.5)	27.0	71	11.9(3.6)	30.5	88	6.6(2.3)	34.5
40-49	243	5.6(1.3)	23.0	121	5.6(2.1)	38.3	122	5.6(1.9)	33.3
50-59	198	9.5(2.3)	23.7	89	9.4(2.6)	27.5	109	9.6(3.0)	31.1
60-69	103	9.9(2.9)	29.7	53	8.9(3.2)	36.5	50	10.9(5.1)	47.2
70 이상	121	8.7(3.1)	35.3	50	10.9(3.9)	36.3	71	7.4(3.0)	40.1
생애주기별									
19-44	392	6.5(1.3)	20.3	180	7.3(1.9)	26.1	212	5.6(1.4)	24.7
45-64	370	9.0(1.4)	16.2	179	9.4(1.6)	17.3	191	8.5(2.1)	24.8
65-74	84	6.2(2.9)	46.4	34	5.9(2.5)	42.1	50	6.4(4.4)	68.2
75 이상	75	10.8(3.9)	36.1	34	12.6(5.7)	45.4	41	9.5(4.0)	42.0
교육수준 ²⁾									
무학	84	6.4(3.5)	54.1	20	10.6(7.5)	70.0	64	5.2(2.8)	54.8
초등학교	108	15.2(4.3)	28.5	40	18.1(7.0)	38.5	68	13.5(4.6)	33.8
중학교	100	8.1(2.4)	30.0	45	5.0(3.5)	68.8	55	11.0(3.7)	33.4
고등학교	394	6.5(1.0)	15.5	199	6.2(1.5)	24.0	195	6.9(1.4)	20.9
대학교 이상	234	7.1(1.4)	19.4	122	10.1(2.4)	23.8	112	2.9(1.7)	58.6
직업									
전문행정관리	145	5.8(1.6)	27.0	73	6.9(2.3)	34.0	72	4.6(2.1)	45.2
사무직	92	11.5(3.5)	30.5	57	11.6(4.5)	38.8	35	11.4(4.6)	40.1
판매·서비스직	80	12.6(4.2)	33.7	28	15.8(6.9)	43.9	52	10.2(4.9)	47.7
농림어업	39	8.4(4.8)	57.6	25	2.9(2.8)	96.8	14	-(-)	-
기능단순노무직	200	6.8(1.8)	26.2	154	8.1(2.2)	27.1	46	1.7(1.7)	99.6
기타 ³⁾	359	6.5(1.4)	21.3	86	6.1(2.4)	38.5	273	6.7(1.5)	22.1
월 가구소득									
100만원 이하	204	10.6(2.4)	23.1	81	12.3(3.2)	26.2	123	9.4(2.7)	28.4
101-200만원	137	5.2(1.7)	33.2	65	5.1(2.0)	38.5	72	5.2(2.6)	50.7
201-300만원	179	6.3(2.0)	31.7	84	6.9(3.2)	46.5	95	5.7(2.3)	40.7
301-400만원	87	5.3(2.5)	46.9	44	5.7(3.8)	67.2	43	4.7(3.3)	70.3
401만원 이상	193	9.6(2.0)	21.1	94	11.1(3.4)	30.6	99	7.9(2.2)	27.9
거주유형									
읍·면	921	7.6(0.9)	12.3	427	8.3(1.3)	15.4	494	6.9(0.9)	13.7

주 : 1) 연간 사고중독 경험률 : (연간 사고중독 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 116〉 연간 사고중독 건수율¹⁾

(단위 : 건 / 인구 1,000명)

구분	전체			남자			여자		
	N	건(표준오차)	변동계수	N	건(표준오차)	변동계수	N	건(표준오차)	변동계수
전체	921	93.8(13.8)	14.7	427	112.5(22.2)	19.7	494	74.2(11.6)	15.7
연령									
19-29	97	57.7(31.3)	54.2	43	77.2(53.3)	69.0	54	33.8(22.9)	67.6
30-39	159	127.7(45.3)	35.5	71	186.3(79.8)	42.9	88	66.4(22.9)	34.5
40-49	243	64.9(17.0)	26.1	121	72.3(30.4)	42.0	122	56.4(18.8)	33.3
50-59	198	113.7(34.0)	29.9	89	105.9(32.4)	30.6	109	122.5(51.0)	41.6
60-69	103	123.9(42.1)	34.0	53	140.0(69.2)	49.4	50	108.8(51.3)	47.2
70 이상	121	87.1(30.7)	35.3	50	108.7(39.4)	36.3	71	73.9(29.6)	40.1
생애주기별									
19-44	392	88.2(22.0)	24.9	180	117.1(38.9)	33.3	212	56.1(13.9)	24.7
45-64	370	105.8(21.5)	20.3	179	111.4(23.3)	20.9	191	99.3(31.2)	31.4
65-74	84	62.4(28.9)	46.4	34	59.1(24.9)	42.1	50	64.3(43.8)	68.2
75 이상	75	108.2(39.0)	36.1	34	126.2(57.3)	45.4	41	94.9(39.9)	42.0
교육수준 ²⁾									
무학	84	64.3(34.8)	54.1	20	106.5(74.5)	70.0	64	51.6(28.3)	54.8
초등학교	108	152.0(43.3)	28.5	40	180.8(69.7)	38.5	68	135.4(45.7)	33.8
중학교	100	106.7(35.8)	33.5	45	50.3(34.6)	68.8	55	158.6(66.6)	42.0
고등학교	394	72.9(13.9)	19.1	199	75.9(22.7)	29.9	195	69.2(14.5)	20.9
대학교 이상	234	111.3(31.6)	28.4	122	172.4(56.1)	32.5	112	29.3(17.1)	58.6
직업									
전문행정관리	145	94.9(45.5)	48.0	73	135.1(82.2)	60.8	72	45.6(20.6)	45.2
사무직	92	115.3(35.1)	30.5	57	116.1(45.0)	38.8	35	113.6(45.5)	40.1
판매·서비스직	80	168.7(64.0)	37.9	28	258.0(124.6)	48.3	52	101.9(48.6)	47.7
농림어업	39	83.6(48.1)	57.6	25	29.3(28.4)	96.8	14	-()	-
기능단순노무직	200	82.3(23.7)	28.8	154	98.2(28.9)	29.4	46	16.8(16.7)	99.6
기타 ³⁾	359	78.1(18.6)	23.9	86	85.1(38.2)	44.9	273	75.6(17.3)	22.8
월 가구소득									
100만원 이하	204	129.5(32.5)	25.1	81	151.1(48.0)	31.8	123	114.9(31.2)	27.2
101-200만원	137	51.5(17.1)	33.2	65	51.1(19.7)	38.5	72	52.0(26.4)	50.7
201-300만원	179	80.2(28.6)	35.7	84	101.1(51.3)	50.7	95	57.2(23.3)	40.7
301-400만원	87	67.8(34.3)	50.6	44	83.4(57.9)	69.4	43	47.5(33.4)	70.3
401만원 이상	193	132.4(37.1)	28.0	94	176.5(67.9)	38.5	99	78.9(22.1)	27.9
거주유형									
읍·면	921	93.8(13.8)	14.7	427	112.5(22.2)	19.7	494	74.2(11.6)	15.7

주 : 1) 연간 사고중독 건수율 : (연간 사고중독 건수 / 조사대상 응답자 수) × 1,000

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 117〉 양호한 주관적 건강수준 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	921	49.8(2.1)	4.3	427	53.5(2.6)	4.9	494	45.9(2.4)	5.3
연령									
19-29	97	72.6(4.7)	6.5	43	73.9(7.1)	9.6	54	70.9(5.8)	8.2
30-39	159	64.6(4.2)	6.5	71	62.7(5.3)	8.4	88	66.5(5.1)	7.7
40-49	243	47.6(3.0)	6.3	121	53.1(4.1)	7.8	122	41.2(4.4)	10.8
50-59	198	44.1(3.7)	8.5	89	46.2(5.7)	12.4	109	41.7(4.9)	11.7
60-69	103	26.7(4.4)	16.5	53	34.3(6.9)	20.1	50	19.6(5.5)	28.2
70 이상	121	18.2(4.0)	22.2	50	21.6(5.8)	27.1	71	16.0(4.9)	30.7
생애주기별									
19-44	392	63.8(2.5)	3.8	180	64.6(3.2)	4.9	212	63.0(3.2)	5.1
45-64	370	41.4(2.7)	6.6	179	46.8(3.7)	8.0	191	35.1(3.7)	10.6
65-74	84	16.5(3.9)	23.7	34	16.2(6.9)	42.8	50	16.6(5.0)	30.1
75 이상	75	20.7(5.5)	26.7	34	26.0(8.1)	31.0	41	16.8(6.4)	37.9
교육수준 ²⁾									
무학	84	18.2(4.1)	22.4	20	31.0(9.7)	31.2	64	14.4(4.7)	32.9
초등학교	108	27.2(5.4)	19.7	40	29.8(7.5)	25.2	68	25.8(6.3)	24.6
중학교	100	41.0(5.8)	14.2	45	47.4(9.0)	18.9	55	35.2(5.5)	15.6
고등학교	394	56.6(2.6)	4.5	199	57.6(3.3)	5.8	195	55.5(3.6)	6.5
대학교 이상	234	57.4(3.2)	5.5	122	56.0(3.5)	6.3	112	59.3(4.5)	7.6
직업									
전문행정관리	145	55.7(4.3)	7.7	73	56.7(5.6)	9.9	72	54.5(5.7)	10.5
사무직	92	61.9(4.7)	7.6	57	63.5(5.3)	8.3	35	58.7(8.3)	14.2
판매·서비스직	80	44.0(6.5)	14.7	28	45.7(12.5)	27.2	52	42.8(6.4)	15.0
농림어업	39	32.3(7.2)	22.4	25	23.5(7.8)	33.3	14	-(-)	-
기능단순노무직	200	52.5(3.6)	6.8	154	56.3(3.8)	6.8	46	36.7(8.1)	22.1
기타 ³⁾	359	45.3(2.9)	6.5	86	48.7(6.6)	13.6	273	44.1(2.8)	6.3
월 가구소득									
100만원 이하	204	35.1(4.4)	12.6	81	45.0(6.5)	14.4	123	28.4(5.5)	19.3
101-200만원	137	52.1(4.8)	9.1	65	58.8(6.9)	11.7	72	44.8(5.6)	12.6
201-300만원	179	56.3(4.5)	7.9	84	56.8(6.0)	10.5	95	55.8(5.2)	9.3
301-400만원	87	61.4(5.5)	9.0	44	58.8(9.3)	15.8	43	64.7(6.4)	9.9
401만원 이상	193	46.7(3.6)	7.7	94	46.6(4.8)	10.3	99	46.8(4.4)	9.3
거주유형									
읍·면	921	49.8(2.1)	4.3	427	53.5(2.6)	4.9	494	45.9(2.4)	5.3

주 : 1) 양호한 주관적 건강수준 인지율 : (주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 118〉 침상와병 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	921	6.8(0.9)	13.1	427	6.9(1.2)	17.5	494	6.6(1.2)	18.2
연령									
19-29	97	6.3(2.4)	38.8	43	7.1(4.1)	57.4	54	5.2(2.8)	53.7
30-39	159	5.1(1.8)	36.3	71	7.8(2.8)	35.5	88	2.2(1.5)	71.2
40-49	243	5.5(1.5)	27.5	121	2.5(1.4)	56.6	122	8.9(2.9)	32.4
50-59	198	7.2(1.7)	23.2	89	8.5(2.5)	29.1	109	5.8(2.4)	41.0
60-69	103	8.0(2.7)	33.3	53	8.6(2.9)	34.0	50	7.5(4.3)	58.1
70 이상	121	12.2(3.0)	24.2	50	12.2(3.7)	30.1	71	12.2(3.9)	31.7
생애주기별									
19-44	392	5.3(1.3)	24.5	180	5.5(1.8)	31.9	212	5.0(1.8)	35.3
45-64	370	7.1(1.2)	16.5	179	7.5(1.8)	24.6	191	6.6(1.7)	26.2
65-74	84	8.9(3.3)	37.2	34	8.5(3.6)	42.3	50	9.1(5.0)	54.4
75 이상	75	14.5(3.6)	24.9	34	14.6(5.3)	36.3	41	14.5(5.4)	37.0
교육수준 ²⁾									
무학	84	12.1(4.0)	33.1	20	9.9(4.4)	44.8	64	12.7(5.2)	40.9
초등학교	108	15.3(4.1)	26.7	40	25.0(7.9)	31.7	68	9.8(3.1)	32.2
중학교	100	7.8(2.4)	30.9	45	7.8(3.4)	44.3	55	7.9(3.6)	46.1
고등학교	394	4.4(1.1)	25.0	199	4.6(1.4)	30.1	195	4.2(1.7)	40.5
대학교 이상	234	5.9(1.6)	26.5	122	6.1(2.0)	33.0	112	5.6(2.1)	38.0
직업									
전문행정관리	145	4.6(1.6)	33.7	73	5.4(2.6)	48.6	72	3.7(1.8)	47.1
사무직	92	9.1(2.6)	28.9	57	9.3(3.4)	36.3	35	8.7(4.9)	56.8
판매·서비스직	80	3.2(1.9)	57.7	28	0.0(0.0)	.	52	5.6(3.1)	55.9
농림어업	39	5.1(3.3)	65.2	25	4.2(4.2)	98.4	14	-(-)	-
기능단순노무직	200	6.3(1.6)	25.8	154	7.2(1.9)	26.1	46	2.8(2.7)	94.3
기타 ³⁾	359	8.4(1.4)	17.2	86	9.7(3.1)	31.6	273	8.0(1.6)	19.9
월 가구소득									
100만원 이하	204	10.8(2.5)	23.2	81	15.6(3.4)	21.9	123	7.5(3.0)	40.2
101-200만원	137	5.1(1.6)	31.0	65	4.6(1.4)	30.3	72	5.6(2.7)	48.3
201-300만원	179	6.0(1.8)	30.7	84	5.6(3.0)	53.0	95	6.4(2.4)	38.2
301-400만원	87	0.9(0.9)	102.1	44	0.0(0.0)	.	43	2.0(2.1)	101.8
401만원 이상	193	8.1(2.1)	25.3	94	7.5(3.0)	40.5	99	9.0(3.0)	33.0
거주유형									
읍·면	921	6.8(0.9)	13.1	427	6.9(1.2)	17.5	494	6.6(1.2)	18.2

주 : 1) 침상와병 경험률 : (최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 한나절 이상 누워 보내야 했던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 119〉 침상와병일수¹⁾

(단위 : 일)

구분	전체			남자			여자		
	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수
전체	61	8.0(0.9)	11.8	29	8.6(1.5)	17.3	32	7.4(1.4)	18.3
연령									
19-29	6	-(-)	-	3	-(-)	-	3	-(-)	-
30-39	7	-(-)	-	5	-(-)	-	2	-(-)	-
40-49	13	-(-)	-	3	-(-)	-	10	-(-)	-
50-59	13	-(-)	-	7	-(-)	-	6	-(-)	-
60-69	8	-(-)	-	5	-(-)	-	3	-(-)	-
70 이상	14	-(-)	-	6	-(-)	-	8	-(-)	-

주 : 1) 침상와병일수 : 최근 1달(30일) 동안 침상와병일 수 / 와병 경험자 수

〈표 120〉결근결석 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	566	5.2(1.0)	18.6	343	6.6(1.4)	20.6	223	2.7(1.0)	37.6
연령									
19-29	73	5.5(2.8)	49.8	35	6.0(4.1)	69.3	38	4.9(3.4)	68.7
30-39	104	6.5(2.5)	38.3	67	8.3(2.9)	35.5	37	2.5(2.5)	99.9
40-49	193	2.1(1.0)	49.0	115	2.7(1.5)	56.8	78	1.2(1.2)	102.3
50-59	133	8.5(2.1)	24.3	82	10.4(3.0)	28.4	51	4.2(1.9)	46.4
60-69	46	5.9(2.7)	45.4	35	8.1(3.7)	45.3	11	-(-)	-
70 이상	17	-(-)	-	9	-(-)	-	8	-(-)	-
생애주기별									
19-44	286	4.8(1.5)	30.8	166	5.7(2.0)	35.2	120	3.3(1.6)	49.6
45-64	250	6.4(1.4)	22.5	158	8.4(2.0)	24.2	92	2.2(1.1)	48.2
65-74	23	0.0(0.0)	.	16	-(-)	-	7	-(-)	-
75 이상	7	-(-)	-	3	-(-)	-	4	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	19	-(-)	-	8	-(-)	-	11	-(-)	-
초등학교	38	19.7(7.3)	36.9	19	-(-)	-	19	-(-)	-
중학교	55	6.7(3.0)	45.3	36	9.7(4.2)	43.6	19	-(-)	-
고등학교	275	2.9(0.9)	30.5	170	3.8(1.2)	31.4	105	1.0(1.0)	100.9
대학교 이상	179	5.9(1.9)	31.7	110	6.8(2.6)	38.4	69	4.1(2.0)	49.6
직업									
전문행정관리	143	4.1(1.5)	36.2	72	5.4(2.6)	48.5	71	2.5(1.3)	50.5
사무직	92	6.3(2.4)	38.0	57	8.0(3.2)	39.8	35	3.2(3.1)	98.7
판매·서비스직	77	2.5(1.8)	70.0	28	2.8(2.8)	99.9	49	2.3(2.3)	98.6
농림어업	33	8.1(4.1)	50.0	24	7.4(5.1)	68.7	9	-(-)	-
기능단순노무직	200	6.8(1.7)	25.3	154	7.8(2.0)	25.7	46	2.8(2.7)	94.3
기타 ³⁾	21	0.0(0.0)	.	8	-(-)	-	13	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 이하	79	8.9(3.1)	34.8	41	13.9(4.7)	33.5	38	3.3(3.3)	100.9
101-200만원	85	3.7(1.1)	29.3	48	5.9(1.7)	29.7	37	0.0(0.0)	.
201-300만원	118	3.7(2.0)	53.9	76	4.1(2.6)	62.4	42	2.8(2.7)	97.8
301-400만원	65	2.9(2.0)	68.8	39	4.5(3.1)	69.1	26	0.0(0.0)	.
401만원 이상	147	6.2(2.3)	37.8	90	6.9(3.0)	43.7	57	4.8(2.7)	56.9
거주유형									
읍·면	566	5.2(1.0)	18.6	343	6.6(1.4)	20.6	223	2.7(1.0)	37.6

주 : 1) 결근결석 경험률 : (최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 학교나 직장에 가지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수⁸⁾) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 121〉결근결석일수¹⁾

(단위 : 일)

구분	전체			남자			여자		
	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수
전체	27	9.6(1.8)	19.2	21	10.1(2.4)	23.3	6	-(-)	-
연령									
19-29	4	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-
30-39	6	-(-)	-	5	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	4	-(-)	-	3	-(-)	-	1	-(-)	-
50-59	10	-(-)	-	8	-(-)	-	2	-(-)	-
60-69	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
70 이상	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-

주 : 1) 결근결석일수 : 최근 1달(30일) 동안 결근결석일 수 / 결근결석 경험자 수

8) 조사대상 응답자 수 : 학교 또는 직장을 다니고 있지 않은(주부, 무직)대상자 제외

〈표 122〉 삶의 질 지수(EQ-5D Index)^{1), 2)}

(단위 : 평균)

구분	전체			남자			여자		
	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수
전체	919	0.943(0.006)	0.6	426	0.960(0.006)	0.6	493	0.926(0.008)	0.9
연령									
19-29	97	0.979(0.005)	0.5	43	0.980(0.005)	0.5	54	0.977(0.008)	0.9
30-39	159	0.971(0.008)	0.8	71	0.975(0.013)	1.4	88	0.967(0.007)	0.7
40-49	241	0.969(0.007)	0.7	120	0.984(0.005)	0.6	121	0.953(0.013)	1.3
50-59	198	0.956(0.007)	0.7	89	0.966(0.010)	1.0	109	0.945(0.009)	0.9
60-69	103	0.897(0.020)	2.2	53	0.933(0.022)	2.3	50	0.864(0.030)	3.5
70 이상	121	0.779(0.032)	4.1	50	0.801(0.033)	4.2	71	0.766(0.041)	5.3
생애주기별									
19-44	390	0.974(0.004)	0.4	179	0.979(0.007)	0.7	211	0.969(0.004)	0.4
45-64	370	0.957(0.006)	0.6	179	0.973(0.006)	0.6	191	0.939(0.010)	1.1
65-74	84	0.842(0.025)	3.0	34	0.867(0.034)	4.0	50	0.827(0.034)	4.1
75 이상	75	0.722(0.041)	5.7	34	0.754(0.045)	6.0	41	0.699(0.057)	8.2
교육수준 ³⁾									
무학	83	0.762(0.035)	4.6	20	0.771(0.041)	5.3	63	0.760(0.042)	5.5
초등학교	108	0.849(0.029)	3.4	40	0.863(0.045)	5.2	68	0.841(0.029)	3.5
중학교	100	0.942(0.013)	1.3	45	0.933(0.022)	2.4	55	0.950(0.013)	1.4
고등학교	393	0.972(0.003)	0.3	198	0.980(0.004)	0.4	195	0.963(0.005)	0.6
대학교 이상	234	0.975(0.004)	0.4	122	0.977(0.005)	0.5	112	0.973(0.006)	0.7
직업									
전문행정관리	145	0.977(0.005)	0.5	73	0.983(0.004)	0.4	72	0.970(0.008)	0.8
사무직	92	0.983(0.005)	0.5	57	0.986(0.005)	0.5	35	0.977(0.010)	1.0
판매·서비스직	80	0.960(0.009)	0.9	28	0.976(0.010)	1.0	52	0.948(0.013)	1.4
농림어업	39	0.950(0.016)	1.7	25	0.967(0.014)	1.5	14	-(-)	-
기능단순노무직	199	0.967(0.009)	0.9	154	0.973(0.009)	0.9	45	0.940(0.030)	3.2
기타 ⁴⁾	358	0.894(0.012)	1.3	85	0.877(0.020)	2.2	273	0.899(0.013)	1.4
월 가구소득									
100만원 이하	203	0.857(0.019)	2.2	80	0.888(0.018)	2.0	123	0.837(0.023)	2.7
101-200만원	137	0.942(0.015)	1.5	65	0.957(0.014)	1.5	72	0.926(0.023)	2.5
201-300만원	178	0.961(0.009)	0.9	84	0.966(0.014)	1.5	94	0.955(0.009)	0.9
301-400만원	87	0.980(0.006)	0.7	44	0.982(0.009)	1.0	43	0.978(0.007)	0.8
401만원 이상	193	0.967(0.005)	0.5	94	0.980(0.004)	0.4	99	0.951(0.008)	0.8
거주유형									
읍·면	919	0.943(0.006)	0.6	426	0.960(0.006)	0.6	493	0.926(0.008)	0.9

주 : 1) 삶의 질 지수 : 건강관련 삶의 질의 5가지 차원(운동능력, 자기관리, 일상 활동, 통증/불편, 불안/우울)의 기술체계를 종합한 지표

2) 삶의 질 조사도구(EQ-5D Index)의 질 가중치 추정연구(남해성, 2007)

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 123〉 오늘의 건강상태(EQ-VAS)¹⁾

(단위 : 평균)

구분	전체			남자			여자		
	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수
전체	907	71.7(0.8)	1.2	421	72.2(1.2)	1.6	486	71.3(0.9)	1.3
연령									
19-29	97	74.1(2.4)	3.3	43	70.2(4.2)	6.0	54	78.9(2.0)	2.6
30-39	158	72.5(1.4)	2.0	70	72.3(2.1)	2.9	88	72.7(1.5)	2.1
40-49	242	74.6(1.1)	1.5	121	75.3(1.2)	1.6	121	73.7(1.7)	2.3
50-59	193	73.4(1.3)	1.8	87	73.0(2.0)	2.7	106	73.9(1.3)	1.7
60-69	101	70.5(1.4)	2.0	52	74.3(2.6)	3.5	49	66.9(1.9)	2.8
70 이상	116	56.9(3.0)	5.2	48	61.0(4.1)	6.7	68	54.4(3.6)	6.6
생애주기별									
19-44	390	73.1(1.2)	1.7	179	71.3(1.8)	2.5	211	75.0(1.1)	1.5
45-64	365	74.7(0.9)	1.2	177	76.5(1.3)	1.6	188	72.5(1.0)	1.4
65-74	81	64.6(2.2)	3.5	33	62.9(2.7)	4.3	48	65.5(2.6)	4.0
75 이상	71	51.6(4.4)	8.5	32	58.6(6.0)	10.3	39	46.4(5.1)	11.0
교육수준 ²⁾									
무학	80	58.0(3.0)	5.2	19	—(—)	—	61	55.7(3.6)	6.5
초등학교	104	65.5(2.5)	3.8	38	65.8(4.5)	6.8	66	65.3(2.3)	3.5
중학교	97	74.1(1.4)	1.9	43	72.5(1.9)	2.6	54	75.5(1.7)	2.2
고등학교	391	74.5(0.8)	1.1	198	74.5(1.3)	1.7	193	74.6(0.9)	1.2
대학교 이상	234	72.0(1.8)	2.6	122	70.5(2.5)	3.6	112	74.1(1.5)	2.0
직업									
전문행정관리	144	76.7(1.3)	1.7	72	77.1(1.4)	1.8	72	76.2(2.1)	2.8
사무직	91	70.7(2.7)	3.8	56	70.0(3.9)	5.5	35	72.1(2.5)	3.4
판매·서비스직	79	71.4(2.0)	2.8	28	70.6(3.4)	4.7	51	72.0(2.4)	3.3
농림어업	39	63.9(6.4)	10.0	25	62.9(8.4)	13.3	14	—(—)	—
기능단순노무직	198	73.1(1.1)	1.5	152	73.4(1.2)	1.6	46	71.9(2.8)	3.8
기타 ³⁾	350	69.8(1.2)	1.8	84	69.5(3.2)	4.6	266	69.9(1.0)	1.5
월 가구소득									
100만원 이하	201	65.6(2.6)	3.9	80	65.7(3.4)	5.1	121	65.4(2.8)	4.2
101-200만원	136	72.3(1.9)	2.6	65	73.5(2.7)	3.7	71	70.9(2.3)	3.3
201-300만원	177	72.7(1.6)	2.2	83	72.4(2.1)	3.0	94	73.0(1.7)	2.3
301-400만원	87	76.2(1.6)	2.0	44	75.9(1.9)	2.5	43	76.5(2.5)	3.2
401만원 이상	189	72.5(1.5)	2.0	91	71.5(2.6)	3.6	98	73.7(1.6)	2.2
거주유형									
읍·면	907	71.7(0.8)	1.2	421	72.2(1.2)	1.6	486	71.3(0.9)	1.3

주 : 1) 오늘의 건강상태 : 건강상태 점수의 총 합 / 조사대상 응답자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 124〉 보건기관 이용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	920	34.0(1.9)	5.5	426	23.9(2.1)	8.8	494	44.4(2.4)	5.3
연령									
19-29	97	28.0(4.2)	15.0	43	13.9(5.6)	40.1	54	45.1(7.1)	15.6
30-39	159	29.9(3.7)	12.4	71	16.3(3.9)	23.7	88	44.2(5.5)	12.4
40-49	242	25.0(2.2)	8.7	120	21.2(3.3)	15.6	122	29.3(4.3)	14.5
50-59	198	25.2(3.4)	13.3	89	17.7(3.8)	21.2	109	33.5(4.3)	12.8
60-69	103	48.1(5.9)	12.3	53	40.4(6.8)	16.8	50	55.3(7.7)	14.0
70 이상	121	78.1(3.7)	4.7	50	76.2(6.5)	8.5	71	79.2(4.1)	5.1
생애주기별									
19-44	392	29.6(2.1)	7.2	180	19.1(2.8)	14.6	212	41.1(3.6)	8.7
45-64	369	25.9(2.5)	9.7	178	17.6(2.7)	15.4	191	35.4(3.4)	9.6
65-74	84	64.0(5.8)	9.0	34	61.2(8.2)	13.4	50	65.5(6.8)	10.4
75 이상	75	81.1(5.6)	6.9	34	80.6(8.6)	10.7	41	81.5(5.7)	7.0
교육수준 ²⁾									
무학	84	64.1(5.0)	7.9	20	58.5(9.3)	15.9	64	65.7(5.6)	8.5
초등학교	108	60.3(5.0)	8.4	40	60.0(8.1)	13.4	68	60.5(6.0)	9.9
중학교	100	38.2(5.0)	13.2	45	28.5(7.1)	24.8	55	47.2(5.2)	10.9
고등학교	393	25.0(1.9)	7.6	198	16.7(2.2)	13.0	195	35.3(3.5)	9.8
대학교 이상	234	30.1(3.6)	11.8	122	22.6(4.0)	17.8	112	40.3(4.9)	12.3
직업									
전문행정관리	145	24.7(3.2)	12.8	73	18.5(4.2)	22.5	72	32.4(5.5)	17.1
사무직	92	15.7(3.6)	22.9	57	10.5(3.7)	35.0	35	25.5(7.6)	29.9
판매·서비스직	80	33.3(7.1)	21.2	28	29.8(9.0)	30.2	52	36.0(7.9)	22.0
농림어업	39	52.4(9.6)	18.3	25	30.4(9.1)	29.9	14	-(-)	-
기능단순노무직	199	20.3(2.4)	12.0	153	18.3(3.0)	16.2	46	28.1(5.3)	18.8
기타 ³⁾	359	51.7(3.0)	5.8	86	48.8(5.1)	10.5	273	52.7(3.1)	5.9
월 가구소득									
100만원 이하	204	49.8(4.1)	8.2	81	43.8(5.9)	13.5	123	54.0(4.6)	8.5
101-200만원	137	37.7(4.4)	11.6	65	27.9(5.2)	18.5	72	48.5(6.1)	12.5
201-300만원	179	31.1(3.3)	10.7	84	18.2(4.0)	21.9	95	45.4(4.9)	10.9
301-400만원	87	24.4(6.3)	26.0	44	12.5(6.0)	47.8	43	39.7(8.0)	20.1
401만원 이상	192	23.3(3.1)	13.5	93	16.9(3.4)	20.1	99	30.9(4.4)	14.3
거주유형									
읍·면	920	34.0(1.9)	5.5	426	23.9(2.1)	8.8	494	44.4(2.4)	5.3

주 : 1) 보건기관 이용률 : (최근 1년(365일) 동안 보건기관(‘보건소(보건의료원)’, ‘보건지소’, ‘보건진료소’)을 이용한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 125〉 최근 1년(365일) 동안 주로 이용한 보건기관¹⁾

(단위 : %)

구분	N	이용한 적 없다		보건소(보건의료원)		보건지소		보건진료소	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	920	66.0(1.9)	2.8	13.4(1.5)	10.9	19.6(1.6)	7.9	0.9(0.4)	40.9
성									
남자	426	76.1(2.1)	2.8	9.5(1.3)	13.6	14.0(1.8)	13.0	0.3(0.3)	99.9
여자	494	55.6(2.4)	4.3	17.5(2.0)	11.5	25.4(1.9)	7.6	1.5(0.6)	37.3
연령									
19-29	97	72.0(4.2)	5.8	16.9(3.3)	19.3	11.0(3.1)	28.4	0.0(0.0)	.
30-39	159	70.1(3.7)	5.3	7.0(2.5)	35.0	22.9(3.2)	13.9	0.0(0.0)	.
40-49	242	75.0(2.2)	2.9	13.1(2.3)	17.8	11.5(1.8)	15.3	0.3(0.3)	98.6
50-59	198	74.8(3.4)	4.5	13.7(2.8)	20.4	11.1(2.4)	21.3	0.4(0.4)	100.9
60-69	103	51.9(5.9)	11.3	17.0(3.8)	22.2	31.1(5.0)	16.2	0.0(0.0)	.
70 이상	121	21.9(3.7)	16.8	18.7(5.2)	27.7	52.0(5.1)	9.7	7.4(3.5)	46.8
생애주기별									
19-44	392	70.4(2.1)	3.0	11.5(1.9)	16.2	17.9(1.8)	9.9	0.2(0.2)	100.4
45-64	369	74.1(2.5)	3.4	15.1(2.0)	13.4	10.5(1.8)	16.7	0.2(0.2)	100.1
65-74	84	36.0(5.8)	16.0	13.4(3.8)	28.3	48.2(6.1)	12.7	2.3(1.4)	62.6
75 이상	75	18.9(5.6)	29.4	19.8(6.4)	32.6	52.0(7.5)	14.4	9.4(5.1)	54.4
교육수준 ²⁾									
무학	84	35.9(5.0)	14.0	15.4(5.5)	35.6	42.0(5.1)	12.1	6.6(3.4)	51.8
초등학교	108	39.7(5.0)	12.7	23.5(4.1)	17.4	35.1(6.2)	17.8	1.8(1.7)	99.6
중학교	100	61.8(5.0)	8.1	21.2(4.3)	20.5	16.2(3.5)	21.7	0.8(0.8)	98.6
고등학교	393	75.0(1.9)	2.5	10.7(1.5)	13.9	14.1(1.7)	12.2	0.2(0.2)	100.7
대학교 이상	234	69.9(3.6)	5.1	11.4(2.6)	22.7	18.4(2.8)	15.0	0.3(0.3)	100.8
직업									
전문행정관리	145	75.3(3.2)	4.2	14.0(2.7)	19.0	10.7(2.4)	22.8	0.0(0.0)	.
사무직	92	84.3(3.6)	4.3	4.4(2.2)	50.0	11.3(3.3)	29.0	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	80	66.7(7.1)	10.6	24.7(6.6)	26.7	8.6(3.5)	40.3	0.0(0.0)	.
농림어업	39	47.6(9.6)	20.2	16.9(6.2)	36.7	33.4(8.0)	24.1	2.2(2.2)	98.5
기능단순노무직	199	79.7(2.4)	3.0	9.1(1.7)	18.5	11.1(2.2)	19.5	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	359	48.3(3.0)	6.2	15.9(2.4)	15.0	33.5(2.8)	8.3	2.3(1.0)	43.3
월 가구소득									
100만원 이하	204	50.2(4.1)	8.1	21.0(3.9)	18.5	26.2(3.5)	13.3	2.6(1.4)	53.3
101-200만원	137	62.3(4.4)	7.0	16.6(3.3)	19.7	20.5(4.7)	22.9	0.6(0.6)	99.4
201-300만원	179	68.9(3.3)	4.9	12.2(3.5)	28.9	18.6(2.7)	14.5	0.4(0.4)	98.8
301-400만원	87	75.6(6.3)	8.4	14.3(4.8)	33.7	9.3(3.2)	34.6	0.8(0.8)	103.0
401만원 이상	192	76.7(3.1)	4.1	12.8(3.2)	24.7	9.8(1.9)	19.2	0.8(0.5)	69.2
거주유형									
읍·면	920	66.0(1.9)	2.8	13.4(1.5)	10.9	19.6(1.6)	7.9	0.9(0.4)	40.9

주 : 1) 최근 1년(365일) 동안 주로 이용한 보건기관 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 126〉 보건기관 이용 서비스 종류¹⁾

(단위 : %)

구분	예방접종		건강교실 (금연, 절주, 운동, 영양)		건강검진		방문보건 서비스		영양보충 서비스		정신보건 서비스		모자보건 서비스		구강보건 서비스		진료 서비스		민원서비스 (서류·증명서 발급)		기타	
	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
전체	74.0(3.2)	4.3	5.2(1.2)	23.1	9.0(1.7)	18.6	10.6(1.8)	16.8	2.5(1.1)	44.4	0.8(0.6)	72.0	6.1(1.7)	28.6	2.0(0.9)	45.4	19.1(2.7)	14.1	15.6(2.6)	16.9	8.2(1.7)	20.3
성																						
남자	72.8(5.0)	6.8	6.6(2.6)	38.9	11.1(2.9)	26.0	10.1(3.1)	30.3	1.3(1.3)	101.2	2.2(1.6)	72.4	2.5(1.8)	70.8	1.9(1.4)	75.9	18.9(3.7)	19.8	16.0(4.1)	25.3	9.0(2.8)	31.2
여자	74.7(3.4)	4.5	4.5(1.3)	28.2	7.8(1.8)	23.4	10.8(2.0)	18.9	3.3(1.6)	48.5	0.0(0.0)	.	8.1(2.1)	25.5	2.1(0.9)	43.9	19.2(3.0)	15.8	15.4(3.0)	19.3	7.7(2.2)	28.5
연령																						
19-29	44.0(9.5)	21.5	4.5(4.1)	90.8	9.6(5.6)	57.9	2.8(2.7)	99.3	6.2(6.1)	99.5	0.0(0.0)	.	18.6(6.9)	37.4	0.0(0.0)	.	9.3(5.0)	53.9	36.1(8.2)	22.8	15.5(4.9)	31.6
30-39	84.3(5.1)	6.0	14.5(4.6)	31.4	4.1(2.9)	69.2	2.4(2.4)	99.3	7.6(3.5)	46.5	2.4(2.4)	99.3	17.2(6.4)	37.3	4.1(2.9)	68.9	5.2(2.9)	55.8	5.9(3.3)	55.9	7.5(3.9)	52.1
40-49	62.1(7.0)	11.2	1.7(1.6)	98.0	7.8(3.1)	39.4	3.3(1.6)	49.3	0.0(0.0)	.	1.9(1.9)	99.8	1.5(1.5)	99.9	1.5(1.5)	100.9	11.0(4.4)	40.3	24.7(6.7)	27.2	7.4(3.7)	49.8
50-59	62.0(6.9)	11.2	1.6(1.6)	99.6	8.5(4.0)	46.9	2.2(2.3)	100.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.6(1.6)	99.6	20.7(5.9)	28.5	24.3(6.0)	24.6	6.9(3.4)	48.6
60-69	84.6(5.0)	5.9	4.6(3.3)	71.7	15.4(5.6)	36.4	18.3(5.9)	32.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.0(2.0)	99.7	29.6(6.9)	23.2	7.2(3.5)	48.9	9.5(3.8)	40.2
70 이상	93.8(2.3)	2.4	3.5(2.0)	58.5	10.3(4.1)	39.9	28.2(4.3)	15.2	1.1(1.1)	103.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.1(1.4)	65.9	35.6(5.4)	15.1	3.1(1.4)	44.7	5.2(2.0)	37.8
생애주기별																						
19-44	69.6(4.7)	6.8	8.1(2.3)	27.9	7.1(2.0)	28.6	3.2(1.5)	46.7	5.1(2.5)	48.5	1.8(1.3)	72.8	13.7(3.9)	28.7	1.7(1.2)	71.9	7.8(2.2)	28.7	18.6(3.6)	19.3	7.8(2.5)	32.2
45-64	60.0(5.4)	8.9	2.9(1.7)	59.2	10.2(3.3)	32.1	4.6(2.0)	43.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.7(1.5)	56.6	22.3(4.5)	20.2	23.8(4.4)	18.6	11.9(3.3)	28.2
65-74	91.2(3.3)	3.6	4.3(3.3)	75.2	10.9(4.7)	43.7	30.3(6.7)	22.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.5(2.4)	68.7	27.3(6.9)	25.1	2.0(0.3)	16.0	7.3(3.0)	41.3
75 이상	96.8(2.2)	2.3	1.5(1.5)	98.5	10.6(4.6)	43.4	25.6(6.9)	27.0	1.7(1.8)	104.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	39.7(5.8)	14.5	3.1(2.2)	70.3	3.2(2.2)	69.7
교육수준 ²⁾																						
무학	93.0(3.1)	3.4	4.2(2.9)	69.7	15.5(7.1)	45.9	31.1(6.5)	21.0	1.8(1.9)	106.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.8(1.7)	93.5	39.9(6.5)	16.2	3.3(2.2)	66.3	6.5(3.4)	52.2
초등학교	90.1(3.2)	3.6	0.0(0.0)	.	7.8(4.3)	55.1	24.4(4.8)	19.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.4(3.4)	97.7	2.9(2.0)	68.8	30.2(6.7)	22.1	1.3(1.3)	98.6	5.4(2.6)	48.5
중학교	73.9(9.0)	12.2	2.2(2.1)	99.1	8.0(5.4)	67.9	4.2(4.0)	97.1	4.1(4.0)	98.2	0.0(0.0)	.	4.1(4.0)	98.2	2.5(2.5)	101.1	24.1(7.0)	28.9	18.8(6.4)	34.1	0.0(0.0)	.
고등학교	61.5(5.2)	8.5	6.9(2.3)	33.7	8.1(2.4)	29.7	4.2(1.9)	45.1	3.7(2.0)	55.8	2.4(1.7)	71.7	6.9(3.2)	46.4	2.0(1.5)	74.5	9.2(2.6)	28.2	25.6(5.6)	22.0	9.7(3.2)	33.0
대학교 이상	69.1(5.3)	7.6	8.4(3.3)	39.5	7.7(3.0)	38.6	0.9(0.9)	100.1	2.5(1.8)	71.8	0.0(0.0)	.	11.0(4.9)	45.0	1.3(1.2)	97.1	10.7(3.5)	33.0	17.1(4.9)	28.6	12.3(4.1)	33.2
직업																						
전문행정관리	72.5(6.9)	9.5	4.3(2.9)	67.5	11.4(4.9)	43.0	2.7(2.7)	99.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.3(3.2)	97.1	1.9(1.9)	100.1	9.5(4.8)	50.7	20.1(6.2)	30.9	5.2(3.1)	60.0
사무직	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	34.7(9.8)	28.2	0.0(0.0)	.	9.8(5.4)	55.5	3.0(3.1)	104.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.0(3.0)	100.2	7.8(4.8)	61.6	53.2(11.6)	21.9	6.2(4.5)	73.6
농림어업	92.9(4.3)	4.6	3.7(3.3)	90.3	7.7(5.1)	65.6	7.7(5.1)	66.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	44.3(10.1)	22.8	7.4(4.3)	58.8	3.5(3.6)	102.9
기능단순노무직	70.0(7.7)	11.1	8.8(5.1)	58.1	6.7(3.6)	54.0	5.1(2.9)	56.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.7(2.7)	100.1	1.9(1.9)	99.6	16.8(5.4)	32.3	12.3(4.9)	39.6	6.5(3.8)	58.1
기타 ³⁾	79.7(3.0)	3.8	6.1(1.7)	28.2	8.9(2.5)	27.7	16.3(2.6)	15.7	4.7(2.0)	42.9	1.5(1.1)	70.7	9.1(2.4)	26.6	2.3(1.5)	63.2	20.4(3.2)	15.8	10.6(2.6)	24.8	9.9(2.6)	26.9
월 가구소득																						
100만원 이하	84.8(4.5)	5.3	4.5(2.3)	51.3	12.3(4.3)	35.0	23.3(3.6)	15.6	3.2(2.2)	67.9	2.9(2.0)	69.0	4.6(2.5)	54.3	5.2(2.8)	54.4	32.6(4.9)	14.9	10.0(3.1)	31.1	9.1(2.8)	30.8
101-200만원	77.0(6.5)	8.5	3.3(2.4)	72.8	13.8(4.3)	31.2	5.4(3.2)	58.7	3.9(2.9)	73.8	0.0(0.0)	.	4.7(3.3)	68.6	0.0(0.0)	.	21.4(6.4)	29.7	16.5(5.5)	33.3	4.8(3.7)	77.0
201-300만원	76.1(4.7)	6.2	5.0(2.7)	54.9	7.3(3.1)	42.5	3.6(2.6)	72.7	3.4(2.5)	72.3	0.0(0.0)	.	15.9(6.5)	40.8	1.2(1.1)	92.3	8.8(3.3)	37.1	3.9(2.4)	61.1	10.7(4.4)	41.6
301-400만원	30.3(10.4)	34.2	7.7(5.8)	76.1	0.0(0.0)	.	5.2(5.2)	101.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	7.0(5.2)	73.8	54.1(11.2)	20.7	10.7(7.7)	71.6
401만원 이상	59.8(8.0)	13.4	5.7(4.0)	69.5	8.9(3.5)	39.8	5.4(3.0)	55.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.7(1.7)	95.3	0.0(0.0)	.	19.0(5.7)	30.2	20.9(6.2)	29.9	3.6(2.1)	58.0
거주유형																						
읍·면	74.0(3.2)	4.3	5.2(1.2)	23.1	9.0(1.7)	18.6	10.6(1.8)	16.8	2.5(1.1)	44.4	0.8(0.6)	72.0	6.1(1.7)	28.6	2.0(0.9)	45.4	19.1(2.7)	14.1	15.6(2.6)	16.9	8.2(1.7)	20.3

주 : 1) 보건기관 이용 서비스 종류 : (보건기관 이용 서비스 종류별 응답자 수 / 최근 1년(365일) 동안 보건기관(‘보건소(보건의료원)’, ‘보건지소’, ‘보건진료소’)을 이용한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 127〉 보건기관 서비스 만족도¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	343	77.0(2.3)	3.0	119	81.1(3.2)	3.9	224	74.7(2.7)	3.6
연령									
19-29	30	75.7(8.5)	11.3	6	-(-)	-	24	72.7(9.6)	13.2
30-39	50	68.5(4.8)	7.0	11	-(-)	-	39	68.1(5.6)	8.2
40-49	63	75.5(5.0)	6.6	26	84.8(7.1)	8.3	37	68.0(8.0)	11.7
50-59	54	86.6(4.8)	5.5	16	-(-)	-	38	78.7(7.2)	9.1
60-69	51	76.0(6.0)	7.9	22	70.0(9.0)	12.8	29	80.0(6.8)	8.5
70 이상	95	80.6(4.1)	5.1	38	78.5(5.7)	7.3	57	81.8(5.5)	6.8
생애주기별									
19-44	123	73.8(3.4)	4.6	37	79.4(4.8)	6.1	86	70.9(4.2)	5.9
45-64	104	82.4(3.4)	4.1	34	94.5(3.2)	3.4	70	75.5(4.7)	6.2
65-74	55	71.1(6.1)	8.6	21	58.5(10.6)	18.1	34	77.8(6.3)	8.1
75 이상	61	82.4(4.6)	5.6	27	81.4(6.5)	8.0	34	83.1(6.6)	8.0
교육수준 ²⁾									
무학	56	78.0(5.8)	7.4	13	-(-)	-	43	82.6(5.6)	6.8
초등학교	68	84.6(4.8)	5.7	25	96.7(3.1)	3.2	43	77.8(6.8)	8.7
중학교	40	70.7(7.6)	10.8	14	-(-)	-	26	76.8(7.2)	9.4
고등학교	106	72.5(4.0)	5.5	38	77.8(5.9)	7.6	68	69.4(5.2)	7.6
대학교 이상	73	79.9(3.7)	4.6	29	88.8(3.1)	3.4	44	73.2(6.1)	8.3
직업									
전문행정관리	39	74.8(6.4)	8.5	16	-(-)	-	23	77.6(8.2)	10.5
사무직	14	-(-)	-	6	-(-)	-	8	-(-)	-
판매·서비스직	29	68.1(9.2)	13.5	9	-(-)	-	20	65.2(12.7)	19.5
농림어업	23	91.8(5.2)	5.7	10	-(-)	-	13	-(-)	-
기능단순노무직	44	76.3(6.2)	8.1	30	80.1(5.8)	7.2	14	-(-)	-
기타 ³⁾	194	78.4(2.9)	3.7	48	82.8(5.0)	6.0	146	77.1(3.0)	3.9
월 가구소득									
100만원 이하	108	78.8(5.2)	6.6	39	84.1(4.8)	5.7	69	75.9(6.6)	8.7
101-200만원	53	76.5(7.2)	9.3	20	83.9(10.9)	13.0	33	71.9(7.5)	10.5
201-300만원	65	85.3(3.9)	4.6	19	-(-)	-	46	82.7(4.4)	5.3
301-400만원	22	76.2(8.7)	11.4	6	-(-)	-	16	-(-)	-
401만원 이상	51	72.6(4.8)	6.7	19	-(-)	-	32	71.9(6.9)	9.6
거주유형									
읍·면	343	77.0(2.3)	3.0	119	81.1(3.2)	3.9	224	74.7(2.7)	3.6

주 : 1) 보건기관 서비스 만족도 : (“대단히 만족 한다” 또는 “만족한 편이다”에 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 보건기관(‘보건소(보건의료원)’, ‘보건지소’, ‘보건진료소’)을 이용한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 128〉 보건기관을 이용하게 되는 주된 이유¹⁾

(단위 : %)

구분	N	거리가 가까워서		비용이 저렴해서		신뢰할 수 있어서		시설이 좋아서		직원이 친절해서		다른 곳에서 제공하지 않는 서비스를 제공하기 때문에		기타	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
전체	343	26.3(2.9)	11.0	35.6(2.9)	8.2	4.3(1.1)	25.0	1.4(0.7)	49.2	0.8(0.5)	58.3	14.8(2.3)	15.4	16.8(2.0)	11.8
성															
남자	119	34.2(5.2)	15.1	27.3(4.2)	15.5	6.3(2.1)	32.8	1.2(1.2)	98.6	0.0(0.0)	.	11.7(3.1)	26.7	19.3(3.3)	17.0
여자	224	21.9(2.5)	11.5	40.2(3.5)	8.6	3.2(1.1)	33.5	1.4(0.8)	57.7	1.3(0.8)	58.5	16.6(2.8)	16.6	15.4(2.2)	14.5
연령															
19-29	30	40.3(9.7)	24.0	16.1(7.1)	44.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	29.7(8.7)	29.3	13.9(5.6)	40.2
30-39	50	15.2(4.9)	32.3	45.0(5.8)	13.0	1.7(1.7)	100.8	5.8(3.4)	58.3	0.0(0.0)	.	14.1(4.4)	31.4	18.2(3.8)	20.7
40-49	63	15.7(5.1)	32.6	35.1(6.0)	17.0	7.3(3.1)	43.3	1.4(1.4)	96.7	1.8(1.8)	99.9	19.7(5.9)	30.0	19.0(4.4)	22.9
50-59	54	23.5(6.7)	28.4	38.5(6.2)	16.0	10.1(4.2)	41.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	20.4(6.0)	29.5	7.6(3.6)	48.2
60-69	51	32.4(6.4)	19.8	43.5(6.3)	14.5	2.6(2.6)	100.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.8(2.6)	68.8	17.7(5.7)	32.1
70 이상	95	33.8(5.2)	15.2	33.4(5.6)	16.8	3.9(2.0)	51.8	0.0(0.0)	.	2.2(1.5)	68.7	5.7(3.0)	53.3	20.9(4.3)	20.4
생애주기별															
19-44	123	24.2(3.7)	15.2	33.1(3.9)	11.9	2.5(1.1)	43.1	3.0(1.5)	48.7	0.0(0.0)	.	19.2(3.7)	19.1	17.9(2.7)	15.1
45-64	104	24.8(4.9)	19.9	39.3(5.4)	13.7	8.3(2.9)	34.6	0.0(0.0)	.	1.2(1.2)	99.0	17.4(4.4)	25.4	9.0(3.0)	32.8
65-74	55	19.8(5.1)	25.9	43.0(6.6)	15.3	5.1(3.1)	60.5	0.0(0.0)	.	1.9(1.9)	97.8	6.4(2.7)	42.7	23.8(6.4)	27.0
75 이상	61	41.4(6.6)	16.0	29.3(6.4)	22.0	1.5(1.5)	100.8	0.0(0.0)	.	1.7(1.7)	99.8	4.8(3.3)	68.6	21.3(5.3)	25.0
교육수준 ²⁾															
무학	56	41.0(6.7)	16.4	26.0(5.1)	19.7	1.7(1.8)	102.9	0.0(0.0)	.	1.8(1.8)	99.6	6.2(2.9)	47.3	23.2(5.9)	25.5
초등학교	68	25.4(5.4)	21.3	46.5(6.6)	14.2	4.8(3.5)	74.0	0.0(0.0)	.	1.5(1.5)	99.1	5.2(2.5)	48.3	16.6(5.6)	33.6
중학교	40	18.3(5.8)	31.8	47.2(8.2)	17.4	2.1(2.1)	100.2	0.0(0.0)	.	3.0(3.0)	100.4	12.1(5.7)	47.4	17.3(6.4)	37.1
고등학교	106	19.7(3.8)	19.4	34.7(4.8)	13.8	6.3(2.4)	37.6	1.8(1.2)	69.0	0.0(0.0)	.	22.5(5.2)	23.1	15.1(3.3)	21.7
대학교 이상	73	30.7(5.8)	18.8	29.9(4.5)	15.0	3.6(2.1)	57.7	3.0(2.1)	70.1	0.0(0.0)	.	17.2(4.1)	23.8	15.5(3.1)	20.2
직업															
전문행정관리	39	41.0(8.0)	19.4	36.7(7.1)	19.4	6.5(3.8)	57.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	10.9(4.2)	38.7	4.9(3.4)	69.4
사무직	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	29	15.6(7.6)	49.0	17.8(8.2)	45.9	0.0(0.0)	.	3.0(2.7)	92.5	3.6(3.6)	99.5	57.0(11.2)	19.5	3.0(3.0)	101.1
농림어업	23	40.9(11.7)	28.6	41.2(11.6)	28.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	8.2(5.4)	66.5	9.7(6.4)	65.7
기능단순노무직	44	26.3(7.9)	30.2	31.4(6.1)	19.5	11.0(4.5)	41.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	8.3(4.0)	48.2	23.1(5.3)	23.1
기타 ³⁾	194	21.5(3.2)	15.0	39.1(3.8)	9.6	3.6(1.2)	32.8	1.2(0.9)	71.3	0.9(0.7)	69.8	12.8(2.2)	17.3	20.9(2.6)	12.6
월 가구소득															
100만원 이하	108	33.7(5.3)	15.7	33.5(5.0)	14.9	4.6(1.8)	38.5	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	96.8	12.1(3.2)	26.4	15.2(3.8)	25.0
101-200만원	53	27.7(9.5)	34.3	41.0(8.4)	20.4	1.9(1.9)	102.2	2.6(2.5)	96.0	0.0(0.0)	.	11.5(4.7)	40.8	15.2(5.0)	33.0
201-300만원	65	17.5(4.6)	26.4	51.3(5.6)	10.9	5.7(3.3)	57.8	1.7(1.7)	100.0	1.7(1.6)	98.9	15.7(4.2)	27.0	6.3(1.8)	28.4
301-400만원	22	11.5(9.2)	80.0	28.4(8.8)	30.9	3.6(3.7)	103.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	32.4(9.5)	29.4	24.1(10.9)	45.1
401만원 이상	51	38.2(5.3)	13.8	32.1(6.9)	21.6	4.6(3.4)	73.5	1.7(1.6)	91.8	1.7(1.6)	95.7	12.4(5.5)	44.3	9.3(4.1)	43.4
거주유형															
읍·면	343	26.3(2.9)	11.0	35.6(2.9)	8.2	4.3(1.1)	25.0	1.4(0.7)	49.2	0.8(0.5)	58.3	14.8(2.3)	15.4	16.8(2.0)	11.8

주 : 1) 보건기관을 이용하게 되는 주된 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 1년(365일) 동안 보건기관(‘보건소(보건의료원)’, ‘보건지소’, ‘보건진료소’)을 이용한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 129〉 보건기관을 이용하지 않는 이유¹⁾

(단위 : %)

구분	N	위치를 잘 몰라서		거리가 멀고 교통이 불편해서		원하는 서비스가 제공되지 않아서		제공되는 서비스의 질이 높지 않다고 생각하기 때문에		저소득층이나 특수계층만이 이용한다고 생각하기 때문에		제공되는 서비스가 어떤 것들이 있는지 몰라서		주로 이용하는 병원이 있어서		건강해서		기타	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
전체	575	1.4(0.4)	29.5	9.4(1.5)	15.6	1.9(0.7)	34.5	1.2(0.4)	36.3	0.5(0.3)	57.4	4.0(0.8)	18.9	26.1(2.0)	7.9	43.8(2.4)	5.4	11.7(1.4)	12.2
성																			
남자	305	0.7(0.5)	71.8	7.0(1.7)	24.5	0.7(0.5)	71.4	0.5(0.4)	71.7	0.4(0.4)	99.0	3.7(0.9)	23.5	23.8(2.7)	11.4	53.4(3.1)	5.8	9.8(2.0)	20.3
여자	270	2.3(0.9)	37.2	12.6(2.0)	15.8	3.8(1.4)	38.3	2.2(1.0)	44.7	0.6(0.4)	70.3	4.5(1.3)	29.6	29.5(2.4)	8.3	30.2(2.4)	7.9	14.3(1.9)	13.2
연령																			
19-29	67	1.1(1.1)	102.2	7.3(3.6)	49.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	4.6(2.5)	54.6	8.7(3.5)	39.6	67.2(5.7)	8.4	11.1(3.7)	33.2
30-39	109	1.7(1.1)	65.1	5.0(2.3)	46.7	3.2(1.9)	58.3	2.3(1.6)	72.2	1.0(0.9)	93.7	5.8(2.5)	43.7	23.5(4.3)	18.2	47.5(5.0)	10.4	10.0(3.6)	36.2
40-49	179	1.5(0.9)	59.8	7.2(2.2)	30.5	3.1(1.9)	60.7	0.9(0.6)	69.2	0.5(0.5)	99.3	2.3(1.0)	43.5	32.0(3.8)	11.9	44.5(3.7)	8.3	8.1(2.0)	24.7
50-59	144	0.5(0.5)	98.7	11.7(3.1)	26.6	1.1(0.8)	71.3	1.4(1.0)	70.8	0.6(0.6)	100.2	5.3(2.1)	38.8	34.9(4.4)	12.5	33.2(4.4)	13.3	11.2(2.6)	23.0
60-69	50	3.8(2.7)	71.3	25.2(7.1)	28.4	0.0(0.0)	.	1.9(1.9)	100.0	0.0(0.0)	.	1.7(1.7)	101.1	31.8(7.3)	22.9	16.1(4.8)	29.8	19.5(5.2)	26.8
70 이상	26	0.0(0.0)	.	20.6(6.0)	28.9	3.7(3.9)	104.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	20.3(7.6)	37.5	12.7(5.7)	45.2	42.7(8.4)	19.7
생애주기별																			
19-44	269	1.3(0.6)	43.8	6.5(1.7)	26.2	2.9(1.2)	40.4	1.2(0.7)	56.9	0.4(0.4)	96.3	4.8(1.2)	25.4	20.6(2.4)	11.6	52.5(3.0)	5.6	9.9(1.8)	17.8
45-64	264	1.7(0.9)	51.2	11.3(2.4)	20.8	0.6(0.4)	70.3	1.4(0.7)	50.1	0.6(0.4)	69.9	3.3(1.2)	36.0	33.2(3.2)	9.8	36.6(3.4)	9.2	11.2(2.3)	20.9
65-74	28	0.0(0.0)	.	23.0(8.4)	36.7	3.2(3.2)	100.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.0(3.0)	99.8	34.1(9.4)	27.6	5.7(3.7)	63.8	31.0(7.7)	24.7
75 이상	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
교육수준 ²⁾																			
무학	28	0.0(0.0)	.	19.6(7.8)	39.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.8(2.8)	98.9	25.1(7.4)	29.5	17.5(7.7)	43.9	34.9(7.7)	22.1
초등학교	39	2.2(2.2)	99.3	14.3(5.5)	38.9	0.0(0.0)	.	2.2(2.2)	99.3	0.0(0.0)	.	2.8(2.8)	99.1	50.2(9.3)	18.6	6.3(3.5)	55.5	22.0(6.8)	30.9
중학교	60	1.3(1.4)	101.7	17.3(5.9)	34.1	1.4(1.4)	101.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.9(2.9)	74.8	26.1(6.0)	23.1	37.4(6.9)	18.6	12.6(3.7)	29.7
고등학교	287	0.9(0.5)	53.8	7.0(1.9)	26.9	1.6(0.9)	52.1	0.6(0.4)	68.5	0.3(0.3)	99.7	3.7(1.1)	30.8	26.3(3.0)	11.4	48.5(2.9)	6.0	11.1(2.0)	18.4
대학교 이상	160	2.2(1.0)	48.8	8.9(2.5)	27.9	3.3(1.5)	46.5	2.6(1.3)	50.9	1.2(0.8)	70.1	5.1(1.6)	30.8	21.8(3.7)	16.9	47.7(4.8)	10.1	7.4(2.3)	31.0
직업																			
전문행정관리	106	1.3(0.9)	69.5	11.5(3.4)	29.3	2.2(1.5)	69.9	1.7(1.2)	69.4	0.0(0.0)	.	5.5(1.9)	33.8	29.6(5.5)	18.7	42.4(5.6)	13.3	5.8(1.7)	29.4
사무직	78	1.3(1.3)	100.3	5.2(2.7)	52.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	100.9	4.6(2.4)	52.0	26.2(5.0)	19.2	49.3(5.0)	10.2	12.4(3.2)	25.8
판매·서비스직	51	2.9(2.8)	96.9	5.9(3.1)	52.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.6(2.3)	90.4	9.9(5.1)	51.7	30.0(5.9)	19.6	42.4(6.6)	15.6	6.5(3.3)	50.4
농림어업	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	155	1.4(1.0)	71.5	6.8(2.5)	36.3	0.7(0.7)	100.4	0.5(0.5)	100.0	0.0(0.0)	.	3.0(1.6)	54.4	21.9(3.6)	16.3	52.0(4.5)	8.6	13.6(3.0)	22.0
기타 ³⁾	163	1.1(0.8)	72.0	15.5(2.9)	18.8	4.4(1.9)	42.2	3.0(1.5)	49.3	0.5(0.5)	101.1	2.4(1.4)	58.4	26.5(3.4)	12.7	32.6(3.9)	11.9	14.2(2.0)	14.4
월 가구소득																			
100만원 이하	95	2.1(1.5)	71.7	16.2(4.4)	26.9	3.2(1.9)	60.4	0.9(0.9)	101.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	30.7(4.9)	15.9	32.2(6.5)	20.2	14.9(3.5)	23.8
101-200만원	84	1.5(1.1)	70.6	8.6(3.5)	40.5	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	100.2	0.9(0.9)	98.6	3.9(1.8)	45.4	21.1(4.4)	21.1	50.0(5.5)	11.1	13.0(4.4)	33.8
201-300만원	114	1.7(1.1)	64.2	3.2(1.6)	48.9	1.4(1.0)	68.3	2.2(1.7)	75.9	1.1(1.0)	95.8	6.2(2.4)	38.5	27.8(4.7)	16.9	46.7(4.7)	10.0	9.7(2.6)	27.3
301-400만원	65	3.1(2.0)	65.1	14.4(4.7)	32.8	0.0(0.0)	.	2.6(2.0)	75.0	0.0(0.0)	.	4.2(3.0)	71.6	28.6(6.5)	22.6	36.9(6.3)	17.1	10.2(3.8)	37.6
401만원 이상	140	0.5(0.5)	99.5	10.2(2.9)	28.3	3.9(2.0)	51.6	0.7(0.6)	98.2	0.5(0.5)	98.2	6.4(2.1)	32.5	27.7(3.0)	11.0	46.0(3.9)	8.6	4.1(1.3)	30.6
거주유형																			
읍·면	575	1.4(0.4)	29.5	9.4(1.5)	15.6	1.9(0.7)	34.5	1.2(0.4)	36.3	0.5(0.3)	57.4	4.0(0.8)	18.9	26.1(2.0)	7.9	43.8(2.4)	5.4	11.7(1.4)	12.2

주 : 1) 보건기관을 이용하지 않는 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 1년(365일) 동안 보건기관을 이용하지 않은 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 130〉 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매) 홍보 및 교육 경험률

(단위 : %)

구분	보건기관 고혈압		보건기관 당뇨병		보건기관 관절염		보건기관 아토피·천식		보건기관 치매	
	홍보 및 교육 경험률 ¹⁾		홍보 및 교육 경험률 ²⁾		홍보 및 교육 경험률 ³⁾		홍보 및 교육 경험률 ⁴⁾		홍보 및 교육 경험률 ⁵⁾	
	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	6.4(0.8)	12.5	5.6(0.8)	13.7	3.5(0.6)	17.4	2.8(0.6)	20.2	4.1(0.6)	14.9
성										
남자	4.9(1.0)	21.0	4.8(1.0)	21.5	2.5(0.8)	33.9	2.3(0.8)	35.6	2.4(0.8)	33.9
여자	7.8(1.1)	14.6	6.4(0.9)	14.9	4.5(0.9)	19.6	3.3(0.7)	20.9	5.9(1.0)	16.7
연령										
19-29	5.0(2.5)	51.3	3.6(2.2)	59.6	5.0(2.5)	51.3	3.6(2.2)	59.6	5.9(2.5)	43.2
30-39	3.6(1.2)	32.9	3.6(1.3)	36.9	1.7(1.0)	57.6	1.7(1.0)	57.6	3.6(1.2)	33.1
40-49	7.4(1.6)	22.3	7.0(1.7)	24.1	3.0(1.0)	32.9	3.0(1.0)	32.9	3.8(1.1)	29.1
50-59	5.2(1.5)	28.9	5.2(1.6)	29.8	3.1(1.3)	41.8	2.6(1.2)	47.3	2.6(1.2)	47.3
60-69	8.5(3.0)	34.8	7.4(2.5)	33.8	3.5(2.0)	59.0	1.0(1.0)	99.3	2.9(2.1)	73.6
70 이상	12.3(3.5)	28.4	8.3(2.4)	28.8	7.4(1.8)	23.7	4.7(1.5)	31.2	7.5(2.1)	28.4
생애주기별										
19-44	4.4(1.0)	22.9	4.0(0.9)	23.2	2.8(0.9)	32.5	2.4(0.8)	33.8	3.8(0.9)	23.2
45-64	7.3(1.6)	21.4	7.0(1.6)	22.8	3.6(1.0)	28.4	3.0(0.9)	31.7	3.8(1.0)	26.6
65-74	11.0(3.9)	35.6	8.2(3.2)	39.5	6.7(2.3)	34.4	2.7(1.9)	69.6	6.7(2.3)	34.4
75 이상	11.7(4.0)	33.8	7.1(2.6)	36.1	5.8(2.3)	40.6	4.5(2.1)	46.7	6.0(2.5)	41.4
교육수준 ⁶⁾										
무학	7.6(3.4)	44.8	3.7(1.8)	47.7	3.5(1.9)	53.9	2.4(1.6)	65.6	3.6(1.9)	51.6
초등학교	8.1(2.1)	25.5	7.0(2.0)	28.4	5.2(1.9)	35.7	2.3(1.5)	64.3	5.2(1.9)	35.7
중학교	3.9(2.0)	50.9	3.9(2.0)	50.9	3.9(2.0)	50.9	3.9(2.0)	50.9	4.7(2.1)	45.7
고등학교	5.6(1.2)	20.6	5.2(1.1)	21.6	3.8(1.1)	28.3	2.8(1.0)	34.3	4.4(1.2)	26.7
대학교 이상	7.5(1.7)	22.6	6.7(1.8)	27.0	2.5(1.2)	48.4	2.5(1.2)	48.4	3.4(1.2)	36.2
직업										
전문행정관리	9.7(2.6)	26.4	9.7(2.5)	26.1	6.8(2.3)	34.0	6.8(2.3)	34.0	8.4(2.4)	28.4
사무직	4.8(2.4)	49.3	4.8(2.4)	49.3	2.5(1.8)	73.0	2.5(1.8)	73.0	3.7(2.2)	58.9
판매·서비스직	8.5(3.7)	43.6	8.5(3.7)	43.6	2.8(2.7)	95.8	2.8(2.7)	95.8	2.8(2.7)	95.8
농림어업	5.1(2.9)	57.3	2.6(2.3)	91.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	3.0(1.1)	34.7	2.6(1.0)	38.1	1.3(0.8)	59.1	0.4(0.4)	99.9	1.5(0.9)	58.5
기타 ⁷⁾	7.2(1.4)	19.5	5.5(1.2)	21.1	4.4(1.1)	25.9	2.8(0.8)	28.6	4.9(1.2)	23.8
월 가구소득										
100만원 이하	7.6(2.3)	29.8	5.6(1.7)	31.1	4.2(1.2)	28.0	2.8(1.1)	37.4	4.2(1.2)	27.9
101-200만원	6.1(2.2)	35.8	4.1(1.5)	37.5	4.3(1.7)	39.1	2.2(1.2)	55.1	4.2(2.0)	48.0
201-300만원	5.0(1.9)	38.6	4.6(2.0)	42.6	2.2(1.3)	61.7	1.8(1.3)	72.4	2.2(1.3)	61.7
301-400만원	8.8(3.2)	36.2	7.5(3.1)	42.1	3.3(2.3)	70.6	3.3(2.3)	70.6	5.9(2.6)	44.5
401만원 이상	7.2(1.5)	21.2	7.4(1.5)	20.5	4.3(1.2)	27.9	4.3(1.2)	27.9	5.8(1.2)	21.1
거주유형										
읍·면	6.4(0.8)	12.5	5.6(0.8)	13.7	3.5(0.6)	17.4	2.8(0.6)	20.2	4.1(0.6)	14.9

주 : 1) 보건기관 고혈압 홍보 및 교육 경험률 : (보건기관에서 고혈압의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 보건기관 당뇨병 홍보 및 교육 경험률 : (보건기관에서 당뇨병의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 보건기관 관절염 홍보 및 교육 경험률 : (보건기관에서 관절염의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

4) 보건기관 아토피·천식 홍보 및 교육 경험률 : (보건기관에서 아토피·천식의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

5) 보건기관 치매 홍보 및 교육 경험률 : (보건기관에서 치매의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

6) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

7) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 131〉 심폐소생술 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	892	82.9(1.4)	1.7	419	89.5(1.4)	1.5	473	75.8(2.1)	2.8
연령									
19-29	93	95.5(2.2)	2.3	43	95.5(3.0)	3.2	50	95.6(3.0)	3.2
30-39	159	97.0(1.5)	1.6	71	97.2(1.9)	1.9	88	96.8(1.9)	1.9
40-49	241	91.3(1.6)	1.7	121	96.7(1.4)	1.4	120	84.9(3.0)	3.5
50-59	195	87.5(2.1)	2.4	88	94.2(2.2)	2.4	107	79.9(3.5)	4.4
60-69	97	53.5(4.2)	7.9	51	71.5(5.6)	7.8	46	36.0(6.7)	18.6
70 이상	107	22.3(4.0)	18.0	45	31.4(6.2)	19.7	62	16.4(5.2)	31.8

주 : 1) 심폐소생술 인지율 : (심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수/ 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 132〉 심폐소생술 교육 경험률 및 심폐소생술 마네킹 실습 경험률

(단위 : %)

구분	심폐소생술 교육 경험률 ¹⁾			심폐소생술 마네킹 실습 경험률 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	704	22.3(2.0)	8.8	137	81.8(3.6)	4.4
성						
남자	360	30.1(2.8)	9.3	95	83.5(3.6)	4.4
여자	344	12.3(1.7)	14.0	42	76.7(7.3)	9.5
연령						
19-29	89	40.4(5.7)	14.1	33	86.1(4.6)	5.4
30-39	154	24.0(2.6)	10.8	34	78.1(6.2)	8.0
40-49	220	20.7(2.4)	11.7	44	80.2(6.2)	7.7
50-59	168	11.5(2.4)	21.3	20	81.8(8.3)	10.2
60-69	50	10.3(4.0)	38.9	6	-(-)	-
70 이상	23	0.0(0.0)	.	0	-(-)	-

주 : 1) 심폐소생술 교육 경험률 : (최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 심폐소생술 마네킹 실습 경험률 : (마네킹을 이용한 심폐소생술 실습을 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 133〉 심폐소생술 시행능력률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	695	48.2(2.3)	4.7	357	64.9(3.1)	4.7	338	26.6(2.1)	7.7
연령									
19-29	88	53.0(5.6)	10.6	40	71.5(6.3)	8.8	48	29.0(6.2)	21.3
30-39	152	49.3(3.8)	7.8	69	70.6(5.2)	7.3	83	26.3(4.6)	17.6
40-49	217	52.9(3.1)	5.8	117	71.8(4.3)	6.0	100	27.4(4.2)	15.3
50-59	166	41.1(3.9)	9.6	83	52.1(5.6)	10.8	83	25.8(5.1)	19.8
60-69	50	46.7(6.4)	13.7	35	56.2(7.9)	14.1	15	-(-)	-
70 이상	22	7.7(5.4)	70.1	13	-(-)	-	9	-(-)	-

주 : 1) 심폐소생술 시행능력률 : (심폐소생술을 “정확하게” 또는 “대략” 시행할 수 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

:: 제4부 부록

I. 개인조사표

II. 가구조사표

III. 순환지표 현황표

IV. 연도별 문항비교표



제 4 부 부록

I . 개인조사표

CHS

Community Health Survey

다음은 2012년 지역사회건강조사 개인조사표입니다. →



지역사회건강조사 Community Health Survey

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

안녕하십니까?

2012년 『지역사회건강조사』에 참여해주셔서 감사합니다.


이 조사는 「지역보건법」 제4조(지역보건의료계획의 내용), 제5조(지역보건의료계획의 수립시기 등)에 의거하여 지역 건강통계를 생산하여 근거 중심의 보건사업 수행 기반을 마련하는데 목적이 있습니다. 전국 253개 기초자치단체(보건소)에서 8월부터 10월까지 실시하며, 만 19세 이상 성인을 대상으로 표준화된 조사지를 사용하여 자료를 수집합니다. 조사내용은 주민의 건강상태와 건강 관련 생활습관, 의료이용, 삶의 질, 사회 경제적 상태 등입니다.

시·군·구 보건소별로 약 900명의 주민을 조사하며, 조사대상은 주민등록상의 주소를 이용하여 가구 단위로 선정합니다. 응답자는 주민등록상의 등록 여부와 관계없이 조사 대상가구에 거주하는 실거주자입니다. 보건소에 등록된 조사원이 귀택을 직접 방문하여 조사를 수행합니다.

조사를 통해 얻은 개인정보는 통계용으로만 활용되며, 개인을 구별할 수 있는 정보가 발표되거나 공개되지 않습니다.

응답해주신 자료는 그 성과를 측정하는데 활용되며, 건강한 지역사회 만들기애 중요한 역할을 하게 될 것입니다.

보건소, 책임대학교, 질병관리본부 연락처를
여기에 붙여주세요



※ 시·도명, 보건소명, 책임대학교명 스티커를 여기에 붙여주세요



시·도

보건소

책임대학교

시도 보건소 표본지점 가구 가구원

관리번호 :

2012년 지역사회건강조사 참여 동의서

본인은 『지역사회건강조사』 내용을 충분히 이해하고 자의(自意)에 의해 건강면접조사에 참여합니다.

『지역사회건강조사』는 지역주민의 건강통계 생산을 목적으로 수행되고 있으며, 수집된 정보는 통계용으로만 활용됩니다. 또한, 개인을 구별할 수 있는 정보가 발표되거나 공개되지 않습니다. 설문에 대한 응답은 조사대상자의 동의하에 이루어지며, 조사문항에 따라 거부 할 수 있습니다.

- 수집 개인정보 범위 : 성명, 성별, 생년월일, 전화번호, 주소
- 개인정보 보유기간 : 조사수행일부터 2013년 2월 28일까지
※ 2013년 3월 1일, 수집된 개인정보 파기
- 개인정보 이용목적 : 조사의 진실성 검증을 위한 전화 확인 조사

※ 개인정보 이용에 대한 자세한 내용은 지역사회건강조사 홈페이지
(<http://chs.cdc.go.kr/>)에서 확인하실 수 있습니다.

2012년 월 일

참여자 성명 : _____(인) 또는 서명

설명자 성명 : _____(인) 또는 서명

 승인번호 제11775호	2012년 지역사회건강조사	이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.
--	----------------	---

※ 조사대상자 번호를 정확히 기입하십시오.

시도 번호	보건소번호			표본지점번호					가구번호				가구원번호	

조 사 대 상 자		
성명		주민등록 생년월일 가구명부의 주민등록상 생년월일과 동일한지 확인하십시오. 다른 경우 가구명부를 수정합니다.
성별	① 남자 ② 여자	

조사원명 _____ (서명)

국민 여러분이 주신 자료 소중히 쓰겠습니다

1. 평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

흡연

1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 7번 문항으로)

1-1. 처음으로 담배 한 대를 다 피운 시기는 언제입니까?

만 세 888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음)

세
888. 비해당

2. 현재 담배를 피웁니까?

8. 비해당

① 매일 피움 → 하루 평균 흡연량 개비 (→ 3번 문항으로)

888. 비해당(문항1/②, 문항2/①②)

개비
888. 비해당

② 가끔 피움 → 지난 1달간 흡연일 수 일

→ 흡연하는 날 하루 평균 흡연량 개비 (→ 3번 문항으로)

88 888. 비해당(문항1/②, 문항2/①②)

일
개비
88 888. 비해당

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음

→ 과거흡연 기간 년 개월

→ 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량 개비 (→ 6번 문항으로)

88 88 888. 비해당(문항1/②, 문항2/①②)

년 월
개비
88 88 888. 비해당

④ 비해당(문항 1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음)

3. 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

- ① 최근 1년간 금연한 적이 있다
② 과거에는 있었지만, 최근 1년간 없다
③ 금연한 적이 없다 (→ 5번 문항으로)
④ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항2/③: 과거흡연자)

8. 비해당

4. 담배를 끊기 위해 사용했던 방법들은 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

특별한 방법 없이 자신의 의지로 참았음	① 예 ② 아니오
자가 처방에 의한 금연보조제(금연패치, 금연껌, 금연사탕, 금연초, 금연 칩) 이용	① 예 ② 아니오
의사 처방에 의한 금연 치료	① 예 ② 아니오
보건소 금연클리닉(금연교육 또는 금연상담, 금연 콜센터)	① 예 ② 아니오

8888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항3/③: 금연미시도자)

 8. 비해당
 8. 비해당
 8. 비해당
 8. 비해당
8888. 비해당

지역사회건강조사, 우리 건강의 시작입니다

5. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까?

- ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
 ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
 ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
 ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다 (→ 7번 문항으로)
 ⑤ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항2/③: 과거흡연자)

☐

8. 비해당

6. 담배를 끊었거나 끊으려는 주된 이유는 무엇입니까? 한 가지만 응답해 주십시오.

- ① 건강이 나빠져서
 ② 현재 건강은 이상 없지만 향후 건강에 대한 염려로
 ③ 가족의 건강을 위해
 ④ 주위 사람들에게 피해를 주지 않기 위해(간접흡연)
 ⑤ 주위 사람들의 권유로
 ⑥ 담뱃값이 부담 돼서
 ⑦ 금연공익광고(TV, 라디오), 담뱃갑의 경계문구를 보고
 ⑧ 사회생활이 불편해서(흡연 장소가 없어서)
 ⑨ 기타()
 88. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항 3/③: 금연 미시도자 & 문항 5/④: 금연 미계획자)

☐기
타

88. 비해당

7. 최근 1년 동안 금연에 대한 공익광고(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

8. 최근 1년 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

국민 여러분이 주신 자료 소중히 쓰겠습니다

음주

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다.

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (▶ 「안전의식」 1번 문항으로)

☐

1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?

만 세 888. 비해당(문항1/②: 평생 술을 마셔본 적이 없음)세

8. 비해당

2. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (▶ 3번 문항으로)

⑧ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마셔본 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까?

- ① 한 달에 1번 미만
② 한 달에 1번 정도
③ 한 달에 2~4번 정도
④ 일주일에 2~3번 정도
⑤ 일주일에 4번 이상
⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?

(* 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다)

- ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상

⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-3-1. (남성분만 응답해 주십시오.) 한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다
② 한 달에 1번 미만
③ 한 달에 1번 정도
④ 일주일에 1번 정도
⑤ 거의 매일
⑧ 비해당(여자, 문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-3-2. (여성분만 응답해 주십시오.) 한 번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다
② 한 달에 1번 미만
③ 한 달에 1번 정도
④ 일주일에 1번 정도
⑤ 거의 매일
⑧ 비해당(남자, 문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음)

☐

8. 비해당

지역사회건강조사, 우리 건강의 시작입니다

2-4. 최근 1년 동안 일단 술을 마시기 시작하면 자제가 안 된 적이 있습니까?

- ① 전혀 없다
 ② 한 달에 1번 미만
 ③ 한 달에 1번 정도
 ④ 일주일에 1번 정도
 ⑤ 거의 매일
 ⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-5. 최근 1년 동안 음주 때문에 일상생활에 지장을 받은 적이 있습니까?

- ① 전혀 없다
 ② 한 달에 1번 미만
 ③ 한 달에 1번 정도
 ④ 일주일에 1번 정도
 ⑤ 거의 매일
 ⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-6. 최근 1년 동안 과음 후 다음날 아침 정신을 차리기 위해 해장술을 마신 적이 있습니까?

- ① 전혀 없다
 ② 한 달에 1번 미만
 ③ 한 달에 1번 정도
 ④ 일주일에 1번 정도
 ⑤ 거의 매일
 ⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-7. 최근 1년 동안 술을 마신 후 다음날 술을 마신 것에 대해 후회한 적이 있습니까?

- ① 전혀 없다
 ② 한 달에 1번 미만
 ③ 한 달에 1번 정도
 ④ 일주일에 1번 정도
 ⑤ 거의 매일
 ⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-8. 최근 1년 동안 술이 깬 후에 술 취했을 때의 일을 기억할 수 없었던 적이 있습니까?

- ① 전혀 없다
 ② 한 달에 1번 미만
 ③ 한 달에 1번 정도
 ④ 일주일에 1번 정도
 ⑤ 거의 매일
 ⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음)

☐

8. 비해당

국민 여러분이 주신 자료 소중히 쓰겠습니다

3. 본인의 음주로 인해 자신이 다치거나, 가족이나 다른 사람을 다치게 한 적이 있습니까?

- ① 없었다
② 과거에는 있었지만, 최근 1년 동안에는 없었다
③ 최근 1년 동안에 그런 적이 있었다
④ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마셔본 적이 없음)

☐

8. 비해당

4. 본인이 술을 마시는 것에 대하여 가족이나 의사가 걱정을 하거나, 술을 끊거나 줄이라는 권고를 한 적이 있습니까?

- ① 없었다
② 과거에는 있었지만, 최근 1년 동안에는 없었다
③ 최근 1년 동안에 그런 적이 있었다
④ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마셔본 적이 없음)

☐

8. 비해당

5. 최근 1년 동안 음주문제로 의료기관, 보건소, 알코올상담센터, 정신보건센터 등에서 상담을 받아본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
④ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마셔본 적이 없음)

☐

8. 비해당

안전의식

【자동차 운전】

1. 자동차 운전을 합니까?

① 예

② 아니오 (➡ 2번 문항으로)

☐

1-1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까?

① 전혀 매지 않는다

② 거의 매지 않는 편이다

③ 가끔 매는 편이다

④ 대체로 매는 편이다

⑤ 항상 맨다

⑧ 비해당(문항1/②: 자동차 운전을 하지 않음)

☐

8. 비해당

1-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차를 운전한 적이 있습니까?

① 예 ➡ ☐☐☐회

② 아니오

⑧ 비해당(문항1/②: 자동차 운전을 하지 않음)

☐

2 000. 아니오

8 888. 비해당

2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 앞좌석에 앉습니까?

① 예

② 아니오 (➡ 3번 문항으로)

☐

2-1. 앞좌석에 앉을 때 안전벨트를 맵니까?

① 전혀 매지 않는다

② 거의 매지 않는 편이다

③ 가끔 매는 편이다

④ 대체로 매는 편이다

⑤ 항상 맨다

⑧ 비해당(문항2/②: 앞좌석에 앉지 않음)

☐

8. 비해당

3. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 탄 적이 있습니까?

① 예 ➡ ☐☐☐회

② 아니오

☐

2 000. 아니오

【오토바이 운전】

4. 오토바이 운전을 합니까?

① 예

② 아니오 (➡ 「운동 및 신체활동」 1번 문항으로)

☐

4-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 오토바이를 운전한 적이 있습니까?

① 예 ➡ ☐☐☐회

② 아니오

⑧ 비해당(문항4/②: 오토바이 운전을 하지 않음)

☐

2 000. 아니오

8 888. 비해당

국민 여러분이 주신 자료 소중히 쓰겠습니다

운동 및 신체활동

1. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까? ☐ 일

※ 격렬한(고강도) 신체활동

달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

- 1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 시간 분 88 88. 비해당(문항1/0일: 격렬한 신체활동 없음)

시 분
88 88. 비해당

2. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다.) ☐ 일

※ 중등도(중강도) 신체활동

천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

- 2-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 시간 분 88 88. 비해당(문항2/0일: 중등도 신체활동 없음)

시 분
88 88. 비해당

3. 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까? ☐ 일

※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.

- 3-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까?

하루에 시간 분 88 88. 비해당(문항3/0일: 걷기운동 없음)

시 분
88 88. 비해당

4. 최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 쉽게 찾을 수 있었습니까?

- ① 매우 쉬웠다
② 쉬운 편이었다
③ 어려운 편이었다
④ 매우 어려웠다

☐

5. 최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역의 동사무소, 보건소, 구청, 시청 등의 지방자치단체에서 운영하는 운동프로그램에 참여해 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

영양

1. 최근 1주일 동안 아침식사를 한 날은 며칠입니까? □ 일 ☐
2. 평상시 음식을 먹을 때, 다음 중 본인은 어디에 해당합니까? ☐
 - ① 아주 짜게 먹는다
 - ② 약간 짜게 먹는다
 - ③ 보통으로 먹는다
 - ④ 약간 싱겁게 먹는다
 - ⑤ 아주 싱겁게 먹는다
3. 식탁이나 상에 차려진 음식을 먹을 때, 소금이나 간장을 더 넣어 먹습니까? ☐
 - ① 항상 더 넣는다
 - ② 자주 더 넣는다
 - ③ 거의 더 넣지 않는다
 - ④ 전혀 더 넣지 않는다
4. 전, 부침, 튀김을 먹을 때, 간장에 찍어 먹습니까? ☐
 - ① 항상 찍어 먹는다
 - ② 가끔 찍어 먹는다
 - ③ 찍어 먹지 않는다
5. 가공식품을 사거나 고를 때, '영양표시'를 읽습니까? ☐
 - ① 항상 읽는다
 - ② 가끔 읽는다
 - ③ 읽지 않는다
 - ④ 영양표시가 무엇인지 모른다
 - ⑤ 가공식품을 먹지 않는다
6. 최근 1년 동안 보건소, 구청, 동사무소, 복지시설, 학교, 병원 등에서 실시된 영양교육 및 상담을 받은 적이 있습니까? ☐
 - ① 예
 - ② 아니오
7. 다음 중 최근 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까? ☐
 - ① 우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다
 - ② 우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다
 - ③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다
 - ④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다
8. '한국인을 위한 식생활 지침'에 대해 알고 있습니까? ☐
 - ① 예
 - ② 아니오

국민 여러분이 주신 자료 소중히 쓰겠습니다

비만 및 체중조절

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까?

- ① 매우 마른 편임
- ② 약간 마른 편임
- ③ 보통임
- ④ 약간 비만임
- ⑤ 매우 비만임

☐

2. 최근 1년 동안 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다
- ② 몸무게를 유지하려고 노력했다
- ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다
- ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해 본 적 없다

☐
☐

2-1. 최근 1년 동안 몸무게를 줄이거나 유지하기 위해 사용한 방법은 무엇인지 모두 응답해 주십시오.

운동	① 예 ② 아니오
단식(24시간 이상)	① 예 ② 아니오
식량감소 또는 식단조절	① 예 ② 아니오
의사처방 없이 임의로 살 빼는 약 복용	① 예 ② 아니오
의사 처방을 받아서 살 빼는 약 복용	① 예 ② 아니오
한약 복용	① 예 ② 아니오
건강기능식품	① 예 ② 아니오
원푸드 다이어트(포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만을 먹는 다이어트 방법)	① 예 ② 아니오

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

88888888. 비해당

88888888. 비해당(문항3/③④: 몸무게를 늘리려고 노력했거나 조절하기 위해 노력해 본 적이 없음)

3. 현재 본인의 키는 얼마입니까?

 cm

 cm

4. 현재 본인의 몸무게는 얼마입니까?

 kg

 kg

구강건강

1. 스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

☐2. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느끼니까?
(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.)☐

- ① 매우 불편하다
② 불편하다
③ 그저 그렇다
④ 별로 불편하지 않다
⑤ 전혀 불편하지 않다

3. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 명확히 발음을 하는 데 어려움이나 불편함을 느끼니까?
(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.)☐

- ① 매우 불편하다
② 불편하다
③ 그저 그렇다
④ 별로 불편하지 않다
⑤ 전혀 불편하지 않다

4. 현재 끼었다 뺏다 할 수 있는 틀니를 하고 있습니까?

☐

- ① 위아래 둘 다 있음
② 위쪽만 있음
③ 아래쪽만 있음
④ 아니오

5. 어제 하루 동안 점심 식사 후 칫솔질(잇솔질)을 했습니까?

☐

- ① 예 ② 아니오 ③ 식사하지 않음

6. 최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?

☐

- ① 예
② 아니오(= 7번 문항으로)



6-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까? (한 가지만 선택)

☐

- ① 경제적인 이유로
② 치과병의원(또는 보건소, 보건지소 등)이 너무 멀어서
③ 직장이나 학교를 비울 수 없어서
④ 거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에
⑤ 아이를 봐줄 사람이 없어서
⑥ 다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서
⑦ 치과진료를 받기가 무서워서
⑧ 기타()
88. 비해당(문항6/②: 진료를 받지 못한 적이 없음)

88. 비해당

국민 여러분이 주신 자료 소중히 쓰겠습니다

7. 최근 1년 동안 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까?

※ 학교·사업장 구강검진, 국민건강보험공단 구강검진 포함

① 예 ② 아니오

☐

8. 최근 1년 동안 스케일링(치석제거)을 받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

☐

정신건강

1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까? 시간

시간

2. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

- ① 대단히 많이 느낀다
② 많이 느끼는 편이다
③ 조금 느끼는 편이다
④ 거의 느끼지 않는다
- (➡ 2-1번 문항으로)
(➡ 3번 문항으로)



2-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항2/③, ④: 평소 스트레스를 조금 느끼거나 거의 느끼지 않음)

8. 비해당

3. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (➡ 「건강검진 및 예방접종」 1번 문항으로)



3-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항3/②: 2주 이상 슬프거나 절망감을 느낀 적이 없음)

8. 비해당

국민 여러분이 주신 자료 소중히 쓰겠습니다

건강검진 및 예방접종

1. 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?

① 예

② 아니오

--	--

2. 최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으나 건강상태를 알아보기 위해 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 있습니까?

① 예

② 아니오 (→ 2-2번 문항으로)

--	--

- 2-1. 건강검진 후 검진결과에 대해 병의원, 보건소 등에서 상담을 받은 적이 있습니까?

① 예 (→ 3번 문항으로)

② 아니오 (→ 3번 문함으로)

⑧ 비해당(문항2/②: 건강검진을 받은 적이 없음)

--	--

8. 비혜당

2-2. 건강검진을 받지 않은 이유는 무엇입니까?

① 검진비용이 비싸서

② 검진을 받을 시간이 없어서

③ 검진기관 위치를 몰라서

④ 필요성을 느끼지 못해서

⑤ 기타()

⑧ 비해당(문항2/①: 건강검진을 받았음)

--	--

기 타	
--------	--

8. 비해당

3. 최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으나 건강상태를 알아보기 위해 암 검진을 받은 적이 있습니까?

① 예

② 아니오 (→ 3-4번 문항으로)

--	--

3-1. (남성분만 응답해 주십시오.) 다음 중 어떤 종류의 암 검진을 받았습니까? 모두 응답해 주십시오.

위암	① 예 ② 아니오
간암	① 예 ② 아니오
대장암	① 예 ② 아니오
갑상선암	① 예 ② 아니오
전립선암	① 예 ② 아니오
그 외 암	① 예 ② 아니오

888888. 비해당(여자, 문항3/②: 암검진을 받은 적이 없음)

3-2. (여성분만 응답해 주십시오.) 다음 중 어떤 종류의 암 검진을 받았습니까? 모두 응답해 주십시오.

위암	① 예 ② 아니오
간암	① 예 ② 아니오
대장암	① 예 ② 아니오
갑상선암	① 예 ② 아니오
유방암	① 예 ② 아니오
자궁경부암	① 예 ② 아니오
그 외 암	① 예 ② 아니오

8888888. 비해당(남자, 문항3/②: 암검진을 받은 적이 없음)

3-3. 암 검진 후 검진결과에 대해 의료기관, 보건소등에서 상담을 받은 적이 있습니까?

- ① 예] (→ 「이환」 1번 문항으로)
 ② 아니오]
 ⑧ 비해당(문항3/②: 암검진을 받은 적이 없음)

3-4. 암 검진을 받지 않은 이유는 무엇입니까?

- ① 검진비용이 비싸서
- ② 검진을 받을 시간이 없어서
- ③ 검진기관 위치를 몰라서
- ④ 필요성을 느끼지 못해서
- ⑤ 기타()
- ⑧ 비 해당(문항3/①: 암검진을 받았음)

☐ 8. 비혜당
☐ 8. 비혜당
☐ 8. 비혜당
☐ 8. 비혜당
☐ 8. 비혜당
☐ 8. 비혜당

[illegible]

8. 비해당

기
타

국민 여러분이 주신 자료 소중히 쓰겠습니다

이환

1. 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까?

- ① 예 ➡ 일 ② 아니오

일
2 00. 아니오

※ 지금부터 우리나라 국민들이 많이 걸리는 질병에 대해서 질문하도록 하겠습니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용을 응답해 주시기 바랍니다.

【고혈압】

1. 최근 1년 동안 혈압을 몇 번이나 잴습니까?

- ① 하루에
② 일주일에
③ 한 달에
④ 일 년에
⑤ 전혀 안함
- ➡ 회

회
5 00. 전혀 안함

2. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (➡ 2-1번 문항으로) ② 아니오 (➡ 당뇨병 1번 문항으로)

2-1. 본인의 혈압은 잘 조절되고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
8. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

2-2 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (➡ 2-3번 문항으로)
8. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

2-2-1. 혈압을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

혈압약 복용	① 예 ➡ 한 달에 일 ② 아니오
비약물요법(운동, 식요법)	① 예 ② 아니오

8 88 8. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음,
문항2-2/②: 현재 치료를 받지 않음)

한 달에 일
2 00. 비해당
8 88. 비해당
 8. 비해당

2-3. 최근 1년 동안 고혈압으로 의료기관을 몇 차례 방문하였습니까? 회

88. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

88. 비해당

지역사회건강조사, 우리 건강의 시작입니다

2-4. 고혈압을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오. (* 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외)

병의원	① 예 ② 아니오
한방병원	① 예 ② 아니오
보건소(보건지소, 진료소, 의료원)	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항2/②): 의사에게 진단받은 적이 없음

☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당

【당뇨병】

1. 최근 1년 동안 혈당을 몇 번이나 잴습니까?

- ① 하루에
 ② 일주일에
 ③ 한 달에
 ④ 일 년에
 ⑤ 전혀 안함
- 회

회
 5,000. 전혀 안함

2. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (→ 2-1번 문항으로) ② 아니오 (→ 이상지질혈증 1번 문항으로)

☐

2-1. 본인의 혈당은 잘 조절되고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 88. 비해당(문항2/②): 의사에게 진단받은 적이 없음

☐
 8. 비해당

2-2. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 2-3번 문항으로)
 88. 비해당(문항2/②): 의사에게 진단받은 적이 없음

☐
 8. 비해당

2-2-1. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

인슐린 주사	① 예 ② 아니오
당뇨병약(경구 혈당강하제)	① 예 ② 아니오
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항2/②): 의사에게 진단받은 적이 없음,
 문항2-2/②: 현재 치료를 받고 있지 않음

☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당

2-3. 최근 1년 동안 당뇨병으로 의료기관을 몇 차례 방문하였습니까? 회

88. 비해당(문항2/②): 의사에게 진단받은 적이 없음

☐
 88. 비해당

국민 여러분이 주신 자료 소중히 쓰겠습니다

2-4. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까?
모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외).

병의원	① 예 ② 아니오
한방병원	① 예 ② 아니오
보건소(보건지소, 진료소, 의료원)	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2-5. 당화혈색소에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 (→ 2-6번 문항으로)

⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)



2-5-1. 최근 1년 동안 당화혈색소 검사를 몇 번이나 했습니까?

- ① 4회 이상
② 3회
③ 2회
④ 1회
⑤ 측정 안함

⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항2-5/②: 당화혈색소에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음)

2-6. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈검사(안저검사)를 받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2-7. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 스탁검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

【이상지질혈증(고지혈증 포함)】

1. 의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 적이 있습니까?

① 예 (→ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (→ 뇌졸중 1번 문항으로)



1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예 ② 아니오 (→ 뇌졸중 1번 문항으로)

⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

지역사회건강조사, 우리 건강의 시작입니다

1-1-1. 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

이상지질혈증 약 복용	① 예 ➡ 한 달에 일 ② 아니오
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오

8 88 8. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음,
문항1-1/②: 현재 치료를 받고 있지 않음)

한 달에 일
2 00. 비해당
8 88. 비해당
 8. 비해당

【뇌졸중(중풍)】

1. 의사에게 뇌졸중(중풍)을 진단받은 적이 있습니까?

① 예 (➡ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (➡ 「심근경색증」 1번 문항으로)

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예 ② 아니오
8 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1-2. 뇌졸중(중풍)으로 인한 후유증을 앓고 있습니까?

① 후유증을 앓고 있다 (➡ 1-2-1번 문항으로)
② 후유증이 있었지만 지금은 회복되었다 (➡ 1-2-1번 문항으로)
③ 특별한 후유증이 없었다 (➡ 「심근경색증」 1번 문항으로)
8 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1-2-1. 과거 또는 현재에 어떤 후유증을 앓았거나, 앓고 있습니까?

한쪽 팔 또는 다리 마비	① 예 ② 아니오
안면 마비	① 예 ② 아니오
발음이 잘 안 되는 등 의사소통의 장애	① 예 ② 아니오
삼키거나 먹는 것의 장애	① 예 ② 아니오
눈이 잘 안보임	① 예 ② 아니오

8888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음,
문항1-2/③: 특별한 후유증이 없음)

8. 비해당

8. 비해당

8. 비해당

8. 비해당

8. 비해당

8. 비해당

8. 비해당

【심근경색증】

1. 의사에게 심근경색증을 진단받은 적이 있습니까?

① 예 (➡ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (➡ 「협심증」 1번 문항으로)

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예 ② 아니오
8 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

국민 여러분이 주신 자료 소중히 쓰겠습니다

【협심증】

1. 의사에게 협심증을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (➡ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (➡ 「관절염」 1번 문항으로)



1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

【관절염】

1. 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (➡ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (➡ 「골다공증」 1번 문항으로)



1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1-2. 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외).

병의원	① 예 ② 아니오
한방병원	① 예 ② 아니오
보건소(보건지소, 진료소, 의원)	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

【골다공증】

1. 의사에게 골다공증을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (➡ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (➡ 「폐결핵」 1번 문항으로)



1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1-2. 의사에게 다음의 부위가 골절되었다고 들어본 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오.

엉덩이뼈	① 예 ② 아니오
척추	① 예 ② 아니오
손목뼈	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

【폐결핵】

1. 의사에게 폐결핵을 진단받은 적이 있습니까?

① 예 (➡ 1-1번 문항으로)

② 아니오 (➡ 「천식」 1번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예

② 아니오

③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

【천식】

1. 최근 1년 동안 숨 쉴 때, 가슴에서 쌉쌉하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있습니까?

① 예

② 아니오

☐

2. 최근 1년 동안 운동 중이나 운동 후에 숨 쉴 때, 가슴에서 쌉쌉하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있습니까?

① 예

② 아니오

☐

3. 의사에게 천식을 진단받은 적이 있습니까?

① 예 (➡ 3-1번 문항으로)

② 아니오 (➡ 「알레르기비염」 1번 문항으로)

☐

3-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예

② 아니오

③ 비해당(문항3/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

3-2. 최근 1년 동안 천식의 증상이 악화되었습니까?

① 예

② 아니오

③ 비해당(문항3/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

3-3. 최근 1년 동안 천식증상으로 급작스럽게 응급실 또는 병원에 간 적이 있습니까?

① 예, 응급실에 간 적이 있다

② 예, 병원에 간 적이 있다

③ 아니오

④ 비해당(문항3/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

【알레르기비염】

1. 의사에게 알레르기비염을 진단받은 적이 있습니까?

① 예 (➡ 1-1번 문항으로)

② 아니오 (➡ 「아토피피부염」 1번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예

② 아니오

③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

국민 여러분이 주신 자료 소중히 쓰겠습니다

【아토피피부염】

1. 의사에게 아토피피부염을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (→ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (→ 「백내장」 1번 문항으로)

☐


1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

【백내장】

1. 의사에게 백내장을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (→ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (→ 「B형 간염」 1번 문항으로)

☐


1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

【B형 간염】

1. 의사에게 B형 간염을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (→ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (→ 「C형 간염」 1번 문항으로)

☐


1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

【C형 간염】

1. 의사에게 C형 간염을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (→ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (→ 「빈혈」 1번 문항으로)

☐


1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

【빈혈】

1. 의사에게 빈혈을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (→ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (→ 「중이염」 1번 문항으로)

☐


1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

【중이염】

1. 의사에게 중이염을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (➡ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (➡ 「위십이지장궤양」 1번 문항으로)

☐**1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?**

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

【위십이지장궤양】

1. 의사에게 위십이지장궤양을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (➡ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (➡ 「치질」 1번 문항으로)

☐**1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?**

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

【치질】

1. 의사에게 치질을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (➡ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (➡ 「암」 1번 문항으로)

☐**1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?**

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

【암】

1. 의사에게 암을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (➡ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (➡ 「갑상선 장애」 1번 문항으로)

☐**1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?**

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

【갑상선 장애】

1. 의사에게 갑상선 장애를 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (➡ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (➡ 「우울증」 1번 문항으로)

☐**1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?**

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

국민 여러분이 주신 자료 소중히 쓰겠습니다

【우울증】

1. 의사에게 우울증을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (→ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (→ 「과민성 방광 증상」 1번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

※ 다음은 최근 1주일 동안 소변(배뇨)증상에 관한 질문입니다. 최근 1주일간 당신의 상태에 가장 가까운 것을 하나만 선택해 주십시오.

【과민성 방광 증상】

1. 아침에 일어나서 밤에 자기 전까지 몇 회 정도 소변을 봤습니까?

- ① 7회 이하
② 8~14회
③ 15회 이상
⑧ 비해당

☐

8. 비해당

2. 밤에 잠든 후부터 아침에 일어날 때까지 소변을 보기 위해 몇 회나 일어났습니까?

- ① 0회
② 1회
③ 2회
④ 3회 이상
⑧ 비해당

☐

8. 비해당

3. 갑자기 소변이 마려워 참기 힘들었던 적이 있었습니까?

- ① 없음
② 일주일에 1회 보다는 적음
③ 일주일에 1회 또는 그 이상
④ 1일 1회 정도
⑤ 1일 2~4회
⑥ 1일 5회 또는 그 이상
⑧ 비해당

☐

8. 비해당

4. 갑자기 소변이 마려워서 참지 못하고 소변을 지린 적이 있었습니까?

- ① 없음
② 일주일에 1회 보다는 적음
③ 일주일에 1회 또는 그 이상
④ 1일 1회 정도
⑤ 1일 2~4회
⑥ 1일 5회 또는 그 이상
⑧ 비해당

☐

8. 비해당

【과민성 방광】

1. 의사에게 과민성 방광을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (➡ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (➡ 「요실금」 1번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

【요실금】

1. 의사에게 요실금을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 (➡ 1-1번 문항으로) ② 아니오 (➡ 「대사증후군」 1번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

【대사증후군】

1. 대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

【에이즈(AIDS)】

1. 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

국민 여러분이 주신 자료 소중히 쓰겠습니다

의료이용

1. 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 미포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까?

① 예

② 아니오 (▶ 「사고 및 중독」 1번 문항으로)

☐


1-1. 그런 적이 있다면, 다음 중 어떤 이유로 본인이 원하는 때 병의원에 가지 못했습니까?
(한 가지만 선택)

① 경제적인 이유로

② 병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서

③ 교통편이 불편해서

④ 내가 갈 수 있는 시간에 병의원 등이 문을 열지 않아서

⑤ 병의원 등에서 오래 기다리기 싫어서

⑥ 증상이 가벼워서

⑦ 기타

⑧ 비해당(문항1/②: 병의원에 가지 못한 적이 없음)

☐

8. 비해당

사고 및 중독

1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ※ 음식을 섭취로 인한 식중독은 제외

① 예 ▶ ☐ 회

② 아니오

☐
☐

회

2 0. 아니오

활동제한 및 삶의 질

※ 지금부터 질병이나 손상 등으로 인해 몸이 아팠거나, 결석이나 결근 등을 해야 했던 내용에 대해서 질문하겠습니다. 질문을 잘 듣고 응답해 주십시오.

1. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 적이 있습니까?

① 예 ➡ ☐ ☐ 일

② 아니오

☐ ☐ ☐ 일

2 00. 아니오

2. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 했던 적이 있습니까?

※ 농사/장사를 못나간 경우 결근에 해당

① 예 ➡ ☐ ☐ 일

② 아니오

③ 학교 또는 직장을 다니고 있지 않음

☐ ☐ ☐ 일

2 00. 아니오

3 88. 학교, 직장 안다
님

※ 아래의 각 문항에서 오늘 귀하의 건강상태를 가장 잘 설명해주는 하나의 항목에 표시해 주십시오.

3-1. 운동능력

- ① 나는 걷는데 지장이 없다
② 나는 걷는데 다소 지장이 있다
③ 나는 종일 누워 있어야 한다

☐

3-2. 자기관리

- ① 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다
② 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다
③ 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다

☐

3-3. 일상 활동(예: 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가활동)

- ① 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다
② 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다
③ 나는 일상 활동을 할 수가 없다

☐

3-4. 통증/불편

- ① 나는 통증이나 불편감이 없다
② 나는 다소 통증이나 불편감이 있다
③ 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다

☐

3-5. 불안/우울

- ① 나는 불안하거나 우울하지 않다
② 나는 다소 불안하거나 우울하다
③ 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다

☐


국민 여러분이 주신 자료 소중히 쓰겠습니다

건강상태가 얼마나 좋고 나쁜지를 표현하는 것을 돕고자, 당신이 상상할 수 있는 최고의 상태를 100으로, 당신이 상상할 수 있는 최저의 상태를 0으로 표시한 눈금자(온도계와 비슷함)를 그려 놓았습니다.

당신의 생각에 오늘 당신의 건강상태가 얼마나 좋고 나쁜지를, 아래의 상자로부터, 오늘 당신의 건강상태가 얼마나 좋고 나쁜지를 나타낸 눈금자위의 한곳으로 선을 그어서 표시해 주십시오.

오늘
당신의
건강상태

상상할 수 있는
최고의
건강상태



상상할 수 있는
최저의
건강상태

	백	십	일
점수			

보건기관 이용

1. 최근 1년 동안 주로 이용한 보건기관은 어디입니까?

- ① 이용한 적 없다 — (☞ 1-4번 문항으로)
 ② 보건소(보건의료원 포함) }
 ③ 보건지소 (☞ 1-1번 문항으로)
 ④ 보건진료소 }

☐

1-1. 보건기관을 이용한 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 거리가 가까워서
 ② 비용이 저렴해서
 ③ 신뢰할 수 있어서
 ④ 시설이 좋아서
 ⑤ 직원이 친절해서
 ⑥ 다른 곳에서 제공하지 않는 서비스를 제공하기 때문에(만성질환자등록관리, 보건증 발급 등)
 ⑦ 기타()
 ⑧ 비해당(문항1/①: 보건기관 이용한 적이 없음)

☐기
타

8. 비해당

1-2. 보건기관을 이용하였다면, 어떤 서비스에 참여했습니까? 모두 응답해 주십시오.

예방접종	① 예 ② 아니오
건강교실(금연, 절주, 운동, 영양)	① 예 ② 아니오
건강검진	① 예 ② 아니오
방문보건서비스	① 예 ② 아니오
영양보충서비스	① 예 ② 아니오
정신보건서비스	① 예 ② 아니오
모자보건서비스	① 예 ② 아니오
구강보건서비스	① 예 ② 아니오
진료서비스	① 예 ② 아니오
민원서비스(서류, 증명서발급)	① 예 ② 아니오
기타	① 예 ② 아니오

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

8888888888. 비해당(문항1/①: 보건기관 이용한 적이 없음)

1-3. 보건기관의 서비스 전반에 대해 어느 정도 만족했습니까?

- ① 대단히 만족한다
 ② 만족한 편이다
 ③ 보통이다 } (☞ 2번 문항으로)
 ④ 불만족한 편이다
 ⑤ 대단히 불만족한다
 ⑧ 비해당(문항1/①: 보건기관 이용한 적이 없음)

☐

8. 비해당

국민 여러분이 주신 자료 소중히 쓰겠습니다

1-4. 보건기관을 이용하지 않은 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 위치를 잘 몰라서
 - ② 거리가 멀고 교통이 불편해서
 - ③ 원하는 서비스가 제공되지 않아서
 - ④ 제공되는 서비스의 질이 높지 않다고 생각하기 때문에
 - ⑤ 저소득층이나 특수계층만이 이용한다고 생각하기 때문에
 - ⑥ 제공되는 서비스가 어떤 것들이 있는지 몰라서
 - ⑦ 주로 이용하는 병원이 있어서
 - ⑧ 건강해서
 - ⑨ 기타()
88. 비해당 (문항1/②③④: 보건기관 이용한 적이 있음)

☐

기
타

88. 비해당

2. 보건기관(보건소(보건의료원), 보건지소, 진료소)에서 다음 질병의 예방 및 관리를 위한 홍보(교육 포함)를 보거나 들어본 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오.

고혈압	① 예 ② 아니오
당뇨병	① 예 ② 아니오
관절염	① 예 ② 아니오
아토피·천식	① 예 ② 아니오
치매	① 예 ② 아니오

☐

☐

☐

☐

☐

심정지

1. 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「교육 및 경제활동」 1번 문항으로)

☐

1-1. 심폐소생술 교육을 받은 경험이 있습니까?

- ① 최근 2년간 교육을 받은 적이 있다 (⇒ 1-1-1번 문항으로)
 ② 과거에는 있었지만, 최근 2년간 없다 (⇒ 2번 문항으로)
 ③ 교육을 받은 적이 없다 (⇒ 2번 문항으로)
 ④ 비해당(문항1/②: 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음)

☐

8. 비해당



1-1-1. 최근 2년 동안 마네킹을 이용한 심폐소생술 실습을 한 경험이 있습니까?

- ① 예
 ② 아니오
 ③ 비해당(문항1/②: 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음, 문항1-1/②: 과거에는 있었지만, 최근 2년간 없음, 문항1-1/③: 교육을 받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

2. 심장마비(심정지) 환자를 목격한 경우 심폐소생술을 시행할 수 있습니까?

- ① 정확하게 시행할 수 있다
 ② 대략 시행할 수 있다
 ③ 시행할 수 없다
 ④ 비해당(문항 1/②: 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음)

☐

8. 비해당

국민 여러분이 주신 자료 소중히 쓰겠습니다

교육 및 경제활동

1. 귀하께서는 최근 1주일 동안 수입을 목적으로 1시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급 가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태로 일을 하신 경우에 포함 됩니다.

- ① 예 ② 아니오

2. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해주십시오.
(예를 들면, 은행에서 출납 일을 함, 건설현장에서 교통정리를 함, 벽지 도배, 내과질환진료 및 치료 등)

일의 종류

직 업 분 류	① 관리자	② 전문가 및 관련 종사자
	③ 사무 종사자	④ 서비스 종사자
	⑤ 판매 종사자	⑥ 농·림·어업 숙련 종사자
	⑦ 기능원 및 관련 기능 종사자	⑧ 장치, 기계조작 및 조립 종사자
	⑨ 단순노무 종사자	⑩ 군인(직업군인)
	⑪ 학생/재수생	⑫ 주부 ⑬ 무직

2-1. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?

(※ 문항 2번 보기문항 ①~⑩에 응답하신 분만 응답해 주십시오.)

- ① 고용주 및 자영업자(내 사업을 한다)
② 임금근로자(타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다)
③ 무급가족종사자(가족, 친척의 일을 돈을 받지 않고 돕는다)
④ 비해당(문항2/⑪, ⑫, ⑬: 학생/재수생, 주부, 무직)

3. 귀하는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

- ① 무학 (→ 4번 문항으로) ② 서당/한학 (→ 4번 문항으로) ③ 초등학교
④ 중학교 ⑤ 고등학교 ⑥ 2년/3년제 대학
⑦ 4년제 대학 ⑧ 대학원 이상

3-1. 귀하는 그 학교를 졸업하셨습니다? 졸업여부를 말씀해 주십시오.

- ① 졸업 ② 수료 ③ 중퇴 ④ 재학/휴학 중
⑤ 비해당(문항2/①, ②: 무학, 서당/한학)

4. 보험회사에서 판매하는 암보험, 심혈관질환보험, 사고·보장보험 등의 의료비를 보조해주는 민간 의료보험에 가입했습니까?

- ① 예 ② 아니오

5. 귀하께서는 결혼한 적(사실혼 포함)이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 6번 문항으로)

5-1. 현재의 혼인상태는 다음 중 무엇에 해당됩니까?

- ① 배우자가 있으며, 함께 살고 있음
② 배우자가 있으나, 함께 살고 있지 않음(출장 등의 일시적 상태 제외)

- ③ 배우자 사망으로 배우자가 없음
- ④ 이혼으로 배우자가 없음
- ⑧ 비해당(문항4/②: 결혼한 적이 없음)

6. 현재 살고 있는 광역 시·도에서 얼마나 오래 살았습니까?

- ① 5년 미만
- ② 5-10년 미만
- ③ 10-15년 미만
- ④ 15-20년 미만
- ⑤ 20년 이상

☐

7. 현재 살고 있는 시·군·구에서 얼마나 오래 살았습니까?

- ① 5년 미만
- ② 5-10년 미만
- ③ 10-15년 미만
- ④ 15-20년 미만
- ⑤ 20년 이상

☐

설문에 응해주셔서 감사합니다.

※ 개인설문조사는 마쳤습니다. 가구대표 1명이 가구조사에 참여하여 주십시오.

최 종 점 검 자			
입 력 완 료 일			
재 조 사 일			
재 조사 완료일			

제 4 부 부록

Ⅱ. 가구조사표

CHS

Community Health Survey

다음은 2012년 지역사회건강조사 가구조사표입니다. →

2012년 지역사회건강조사 가구명부

시도 보건소 표본지점 가구
 번호 :

가구현황

주소	(표본지점 주소)		총 방문횟수 () 회		
	(이하 상세주소)	집전화 ☎() -			
				방문 1차	2012. . .
				방문 2차	2012. . .
방문 3차	2012. . .				
가구구분	☐ 본표본가구 ☐ 예비표본가구(본표본가구 번호:) 가구대체 발생시 본표본 가구번호를 기입합니다.				
성인거주여부	☐ 성인거주 ☐ 성인미거주 ☐ 모름 성인기준 : 주민등록상 생일로 1993. 7. 31 이전 출생자				
조사적합여부	☐ 적합 ➔ 가구원정보 기입 ☐ 부적합 ➔ 조사종료 & 가구대체 (사유:)				

가구원현황

'가구조사' 기입란은 가구조사를 한 대표 가구원 1인만 ☑하십시오.

가구원 번호	가구원 성명	성별	주민등록상 생년월일	가구주와의 관계	휴대전화	조사수행 여부	미수행 사유	가구 조사
01		남 / 여			- -	Y / N		☐
02		남 / 여			- -	Y / N		☐
03		남 / 여			- -	Y / N		☐
04		남 / 여			- -	Y / N		☐
05		남 / 여			- -	Y / N		☐
06		남 / 여			- -	Y / N		☐
07		남 / 여			- -	Y / N		☐
08		남 / 여			- -	Y / N		☐
09		남 / 여			- -	Y / N		☐
10		남 / 여			- -	Y / N		☐
11		남 / 여			- -	Y / N		☐
12		남 / 여			- -	Y / N		☐

조사원 성명: _____

가구완료

조사인원 : 만 19세 이상 성인 ()명 중 ()명 조사

조사완료 : 만 19세 이상 성인을 모두 조사하였습니까?

☐ 예

☐ 아니오

가구조사 : 가구 대표1명만 가구조사를 실시하였습니까?

☐ 예

☐ 아니오

답례품전달 : 조사인원 수만큼 답례품을 제공하였습니까?

☐ 예

☐ 아니오

가구선정통지문 : 이 가구는 가구선정통지문을 받았습니까?

☐ 예

☐ 아니오

가구조사

※ 가구대표 1명만 가구조사에 참여해 주시기 바랍니다.

1. 세대 유형은 다음 중 무엇에 해당하니까?

1 세 대	☐ 1. 1인 가구	☐ 2. 응답자 + 미혼형제자매	☐ 7. 기타 : 상기를 제외한 모든 1세대 가구
	☐ 3. 부부(응답자 + 배우자)	☐ 4. 부부 + 기타 친인척	
	☐ 5. 부부 + 미혼형제자매	☐ 6. 응답자 + 기타 친인척	
2 세 대	☐ 8. 부부 + 미혼자녀	☐ 9. 부부 + 양친	☐ 10. 조부모 부부 + 미혼 손자녀
	☐ 11. 편부 + 미혼자녀	☐ 12. 부부 + 편부모	☐ 13. 편조부/편조모 + 미혼 손자녀
	☐ 14. 편모 + 미혼자녀	☐ 15. 부부 + 자녀 + 부부의 형제 또는 자매	☐ 16. 기타 : 상기를 제외한 모든 2세대 가구
3 세 대	☐ 17. 부부 + 미혼자녀 + 양친		
	☐ 18. 부부 + 미혼자녀 + 편부모		
	☐ 19. 기타 상기를 제외한 모든 3세대 이상 가구		

2. 귀 가구는 현재 기초생활 수급자(구, 생활보호대상자 혹은 영세민)입니까?

- ① 그렇다
② 지금은 아니지만, 과거에 수급자였던 적이 있다
③ 아니다

3. 지금 살고 있는 집은 다음 중 어떤 형태에 해당하십니까?

- ① 단독주택
- ② 아파트
- ③ 연립주택
- ④ 다세대 주택
- ⑤ 영업용 건물 내 주택
- ⑥ 기타()

4. 임금, 부동산 소득, 연금, 이자, 정부 보조금, 친척이나 자녀들의 용돈 등 모든 수입을 합쳐 최근 1년 동안 가구의 총 소득은 대략 얼마입니까? 만일 연간 소득을 대답하기 어려운 경우 월 평균 액수를 말씀해 주십시오.

(기준기간) (소득액)

- ① 연

--	--	--	--	--

 만원

5. 귀 가족은 현재 치매환자와 함께 거주하고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

제 4 부 부록

Ⅲ. 순환지표 현황표

조사영역	산출지표	연도			비고
		2010	2011	2012	
가구조사	세대유형	○	○	○	
	빈곤 가구	○	○	○	
	현 거주지 거주기간	○	-	-	
	주거형태	○	○	○	
	가구소득	○	○	○	
	치매환자 동거 가구율	-	○	○	
건강행태_흡연	평생 흡연율	○	○	○	
	흡연시작연령	○	○	○	08년 지표명: 처음 흡연경험연령
	비흡연율	○	○	○	
	현재흡연율	○	○	○	
	남자 현재흡연율	○	○	○	
	과거흡연율	○	○	○	
	매일 흡연자의 하루 평균 흡연량	○	○	○	
	흡연자의 1개월 내 금연 계획률	○	○	○	
	흡연자의 금연 시도율	○	○	○	
	흡연자의 금연이유	○	-	○	
	흡연자의 금연방법	○	-	○	
	가정실내 간접흡연 노출률	○	○	-	08년 지표명: 가정 내 간접흡연 노출률
	가정실내 간접흡연 노출시간	○	○	-	
	직장실내 간접흡연 노출률	○	○	-	
	직장실내 간접흡연 노출시간	○	○	-	
	금연캠페인 경험률	○	○	○	
	금연교육 경험률	○	○	○	
	현재흡연자의 금연교육 경험률	○	○	○	
	금연구역 내 흡연 경험률	-	○	-	

조사영역	산출지표	연도			비고
		2010	2011	2012	
	금연구역 인지율	-	○	-	
	공공장소 간접흡연 노출률	-	○	-	
건강행태_음주	평생 음주율	○	○	○	
	음주시작연령	○	○	○	08년 지표명: 처음 음주경험연령
	연간 음주율	○	○	○	
	월간 음주율	○	○	○	
	고위험 음주율	○	○	○	
	알코올 의존정도(AUDIT)	○	-	○	
	음주문제로 인한 상담 경험률	○	○	○	
건강행태_안전의식	운전 시 안전벨트 착용률	○	○	○	
	동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	○	○	○	
	연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)	○	○	○	08년 지표명: 연간 음주운전 경험률(자동차, 오토바이)
	연간 자동차 음주운전 경험률	○	○	○	
	연간 자동차 음주운전 경험횟수	○	○	○	
	연간 오토바이 음주운전 경험률	○	○	○	
	연간 오토바이 음주운전 경험횟수	○	○	○	
	연간 자동차 음주운전차량 동승률	○	○	○	
	오토바이 헬멧 착용률	○	○	-	09년 지표명: 오토바이 보호장구(헬멧 등)착용률
	자전거 헬멧 착용률	○	○	-	09년 지표명: 자전거 보호 장구(헬멧, 무릎보호대)착용률
	스쿨존 인지율	-	○	-	
	스쿨존 과속운전 경험률	-	○	-	
	‘1339’ 전화번호인지율	-	○	-	
건강행태_운동 및 신체활동	격렬한 신체활동 실천율	○	○	○	
	중등도 신체활동 실천율	○	○	○	
	중등도 이상 신체활동 실천율	○	○	○	

조사영역	산출지표	연도			비고
		2010	2011	2012	
	걷기 실천율	○	○	○	08년 지표명: 걷기운동 실천율
	지역사회 내 운동시설 접근율	○	-	○	08년 지표명: 지역사회 내 운동시설 접근성
	지역사회 내 운동프로그램 참여율	○	-	○	
	주중(월~금)에 여가시간에 앉아서 보내는 시간	-	○	-	
	주말 여가시간에 앉아서 보내는 시간	-	○	-	
	근력운동 실천율	-	○	-	
	유연성운동 실천 빈도	-	○	-	
건강행태_영양	아침식사 빈도	○	○	○	
	아침결식률	○	○	○	09년 지표명: 아침결식률
	저염선택율	○	○	○	
	가공식품 선택 시 영양표시 이용률	○	○	○	
	영양교육 및 상담수혜율	○	○	○	
	식품 안정성 확보율	○	○	○	
	식생활 지침 인지율	○	-	○	
	식생활 실천지침 점수	○	-	-	
	과일 섭취율	-	○	-	
	생채소 섭취율	-	○	-	
건강행태_비만 및 체중조절	비만율	○	○	○	08년 지표명: 비만인구율
	주관적 비만인지율	○	○	○	
	체중조절 시도율	○	○	○	
	체중조절 시도방법	○	-	○	
건강행태_구강건강	주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	○	○	○	
	저작불편호소율(65세 이상)	○	○	○	
	발음불편호소율(65세 이상)	○	○	○	
	틀니 이용 행태(65세 이상)	○	○	○	

조사영역	산출지표	연도			비고
		2010	2011	2012	
	점심식사 후 칫솔질 실천율	○	○	○	
	구강검진 수진율	○	○	○	
	연간 스케일링 경험률	○	○	○	
	치아 결손 형태(65세 이상)	-	○	-	08년 지표명: 치아결손형태
	치실 및 치간솔 이용률	-	○	-	
	무자격자 치과시술률	-	○	-	
	치과진료 미치료율	-	○	○	
	치과진료 미치료 이유	-	○	○	
	주관적 틀니 필요 인지율(65세 이상)	-	○	-	
	주관적 잇몸 건강인지율	-	○	-	
건강행태 정신건강	스트레스 인지율	○	○	○	08년 지표명: 주관적 스트레스 인지율
	스트레스로 인한 정신 상담률	○	○	○	
	우울감 경험률	○	○	○	
	우울증상으로 인한 정신상담률	○	○	○	
	하루 평균 수면시간	○	○	○	
건강검진 및 예방접종	연간 인플루엔자 예방접종률	○	○	○	
	건강검진 수진율	○	-	○	
	건강검진 사후 관리 상담률	○	-	○	
	건강검진 미수진 이유	○	-	○	
	암 검진율	○	-	○	
	최근 2년간 수검 암검진 종류(남/여)	○	-	○	
	암 검진 사후 관리 상담률	○	-	○	
	암 검진 미수진 이유	○	-	○	
	신종 인플루엔자 예방접종률	○	-	-	
이환	만성·급성질환 및 사고중독 경험률	○	○	○	08-10년 영역: 활동제한 삶의 질
	만성·급성질환 및 사고중독 경험일수	○	○	○	

조사영역	산출지표	연도			비고
		2010	2011	2012	
이환_고혈압	연간 평균 혈압 측정횟수	○	○	○	
	고혈압 평생 의사진단 경험률	○	○	○	08년 지표명: 고혈압 평생 의사진단 유병률
	본인인지 혈압조절률	○	○	○	
	고혈압 현재치료율	○	○	○	
	고혈압 약물치료율	○	○	○	08년 지표명: 혈압조절약의 정기적 복용률
	고혈압 관리교육 이수율	○	○	○	
	고혈압 관리교육 장소	○	○	○	
	고혈압 의료기관 방문횟수	-	-	○	
	혈압인지율	-	○	-	
	고혈압 신장질환 합병증검사 수진율	-	○	-	
	고혈압 심장질환 합병증검사 수진율	-	○	-	
	고혈압 뇌혈관질환 합병증검사 수진율	-	○	-	
이환_당뇨병	연간 평균 혈당 측정횟수	○	○	○	
	당뇨병 평생 의사진단 경험률	○	○	○	08년 지표명: 당뇨병 평생 의사진단 유병률
	본인인지 혈당조절율	○	○	○	
	당뇨병 현재치료율	○	○	○	
	당뇨병 치료율	○	○	○	08년 지표명: 당뇨병 관리형태(혈당관리방법)
	당뇨병관리 교육 이수율	○	○	○	
	당뇨병 관리교육 장소	○	○	○	
	당뇨병 의료기관 방문횟수	-	-	○	
	당화혈색소 인지율	-	-	○	
	당화혈색소 검사 횟수	-	-	○	
	당뇨병 안질환 합병증검사 수진율	○	○	○	08년 지표명: 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율
	당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율	○	○	○	08년 지표명: 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율
	혈당인지율	-	○	-	

조사영역	산출지표	연도			비고
		2010	2011	2012	
이환 이상지질혈증	이상지질혈증(고지혈증 포함) 평생 의사진단 경험률	○	○	○	08년 지표명: 고지혈증 평생 의사진단유병률 09-10년도 지표명: 고지혈증 평생의사진단경험률
	이상지질혈증(고지혈증 포함) 현재치료율 (≥30)	○	○	○	09-10년도 지표명: 고지혈증 현재치료율
	이상지질혈증(고지혈증 포함) 치료방법 (≥30)	○	○	○	09년 지표명: 고지혈증 치료방법
	이상지질혈증(고지혈증 포함) 약물 치료율 (≥30)	○	○	○	08년 지표명: 콜레스테롤 강하제 복용상태 및 정기적 복용률 09년 지표명: 고지혈증 약물치료율
	총 콜레스테롤 인지율	-	○	-	
이환_뇌졸중	뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률 (≥50)	○	○	○	08년 지표명: 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 유병률
	뇌졸중(중풍) 현재치료율(≥50)	○	○	○	
	뇌졸중(중풍) 후유증 이환율 (≥50)	○	-	○	
	뇌졸중(중풍) 후유증 증상별 분포 (≥50)	○	-	○	
이환 심근경색증	심근경색증 평생 의사진단 경험률 (≥40)	○	○	○	08년 지표명: 심근경색증 평생 의사진단 유병률
	심근경색증 현재치료율(≥40)	○	○	○	
이환_협심증	협심증 평생 의사진단 경험률 (≥40)	○	○	○	08년 지표명: 협심증 평생 의사진단 유병률
	협심증 현재치료율 (≥40)	○	○	○	
이환_관절염	관절염 평생 의사진단 경험률 (≥50)	○	○	○	08년 지표명: 관절염 평생 의사진단 유병률
	관절염 현재치료율 (≥50)	○	○	○	
	관절염 관리교육 이수율 (≥50)	○	○	○	
	관절염 관리교육 장소 (≥50)	○	○	○	
이환 골다공증	골다공증 평생 의사진단 경험률 (≥50)	○	○	○	08년 지표명: 골다공증 평생 의사진단 유병률
	골다공증 현재치료율 (≥50)	○	○	○	
	골다공증으로 인한 엉덩이뼈 골절 진단율 (≥50)	○	○	○	08년 지표명: 골다공증으로 인한 부위별 골절 진단 여부
	골다공증으로 인한 척추골절 진단율 (≥50)	○	○	○	
	골다공증으로 인한 손목뼈 골절진단율 (≥50)	○	○	○	

조사영역	산출지표	연도			비고
		2010	2011	2012	
이환_폐결핵	폐결핵 평생 의사진단 경험률	○	○	○	08년 지표명: 폐결핵 평생의사진단 유병률
	폐결핵의 현재치료율	○	○	○	
이환_천식	천식 증상 경험률	○	○	○	08년 지표명: 천식 평생 의사진단 유병률
	운동성 천식이환율	○	○	○	
	천식 평생 의사진단 경험률	○	○	○	
	천식 현재치료율	○	○	○	
	천식 악화율	○	○	○	
	천식 악화로 인한 의료기관 이용률	○	○	○	
이환_알레르기비염	알레르기비염 평생 의사진단 경험률	○	○	○	08년 지표명: 알레르기성 비염 평생 의사진단 유병률
	알레르기비염의 현재치료율	○	○	○	
이환_아토피 피부염	아토피피부염 평생 의사진단 경험률	○	○	○	08년 지표명: 아토피피부염 평생 의사진단 유병률
	아토피피부염의 현재치료율	○	○	○	
이환_백내장	백내장 평생 의사진단 경험률 (≥50)	○	○	○	08년 지표명: 백내장 평생 의사진단 유병률
	백내장의 현재치료율 (≥50)	○	○	○	
이환_녹내장	녹내장 평생 의사진단 경험률 (≥50)	-	○	-	08년 지표명: 녹내장 평생의사진단 유병률
	녹내장 현재치료율 (≥50)	-	○	-	
이환_B형간염	B형 간염 평생 의사진단 경험률	○	○	○	08년 지표명: B형 간염 평생 의사진단 유병률
	B형 간염 현재치료율	○	○	○	
이환_C형간염	C형 간염 평생 의사진단 경험률	-	-	○	
	C형간염현재치료율	-	-	○	
이환_빈혈	빈혈 평생 의사진단 경험률	-	-	○	
	빈혈 현재치료율	-	-	○	
이환_중이염	중이염 평생 의사진단 경험률	-	-	○	
	중이염 현재치료율	-	-	○	

조사영역	산출지표	연도			비고
		2010	2011	2012	
이환_위십이지장궤양	위십이지장궤양 평생 의사진단 경험률	-	-	○	
	위십이지장궤양 현재치료율	-	-	○	
이환_치질	치질 평생 의사진단 경험률	-	-	○	
	치질 현재치료율	-	-	○	
이환_암	암 평생 의사진단 경험률	-	-	○	
	암 현재치료율	-	-	○	
이환_요실금	요실금 평생 의사진단 경험률	-	○	○	08년 지표명: 요실금 평생 의사진단 유병률
	요실금 현재치료율	-	○	○	
이환_전립선	전립선 평생 의사진단 경험률	-	○	-	
	전립선 현재치료율	-	○	-	
	배뇨장애 선별검사 (남성용)	-	○	-	
이환_갑상선	갑상선 장애 평생 의사진단 경험률	-	-	○	
	갑상선 장애 현재치료율	-	-	○	
이환_우울증	우울증 평생 의사진단 경험률	○	○	○	
	우울증 현재치료율	○	○	○	
이환_대사증후군	대사증후군 인지율	○	○	○	
	대사증후군 매체경험률	○	-	-	
이환_에이즈	에이즈 인지율	○	○	○	
	에이즈 매체경험률	○	-	-	
	에이즈에 대한 지식 정답률	-	○	-	
	에이즈에 대한 긍정적 태도율	-	○	-	
이환_과민성방광	과민성방광 증상 점수 (Overactive Bladder Symptom Score)	-	-	○	
	과민성방광 평생 의사진단 경험률	-	-	○	
	과민성방광 현재치료율	-	-	○	
의료이용	필요의료서비스 미치료율	○	○	○	
	경제적 이유로 인한 미치료율	○	○	○	

조사영역	산출지표	연도			비고
		2010	2011	2012	
사고 및 중독	연간 사고중독 경험률	○	○	○	08년 지표명: 사고중독 발생률
	연간 사고중독 건수율	○	○	○	08년 지표명: 연간 사고중독 발생건수율
	계절별 사고중독 건수율	○	-	-	
	원인별 사고중독 건수율	○	-	-	
	의도성 및 비의도성 사고분포	○	-	-	
	주 치료처별 분포	○	-	-	08년 지표명: 연간 사고중독 치료 의료기관
	연간 낙상 경험률	-	○	-	
	연간 낙상 건수율	-	○	-	
	장소별 낙상 분포	-	○	-	
	원인별 낙상 분포	-	○	-	
	낙상에 대한 두려움	-	○	-	
활동제한 및 삶의 질	양호한 주관적 건강수준 인지율	○	○	○	09-11년 지표명: 주관적 건강수준 인지율
	침상와병 경험률	○	○	○	
	침상와병 일수	○	○	○	08년 지표명: 연간 침상와병일수
	결근결석 경험률	○	○	○	
	결근결석 일수	○	○	○	08년 지표명: 연간 결근결석일수
	삶의 질 지수(EQ-5D Index)	○	○	○	
	오늘의 건강상태(EQ-VAS)	○	○	○	
	행복감지수	-	○	-	
보건기관 이용	보건기관 이용률	○	○	○	
	주 이용보건기관	○	○	○	
	보건기관을 이용하게 되는 주된 이유	○	○	○	
	보건기관 이용서비스 종류	○	○	○	
	보건기관 서비스 만족도	○	○	○	
	보건기관을 이용하지 않는 이유	○	○	○	

조사영역	산출지표	연도			비고
		2010	2011	2012	
	보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염) 홍보 및 교육 경험률	○	○	○	
	보건기관 질병(아토피·천식, 치매) 홍보 및 교육 경험률	-	○	○	
사회 물리적 환경	지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율	-	○	-	
	사회적 연결망(친척, 이웃, 친구)	-	○	-	
	사회활동 참여율	-	○	-	
심정지	심폐소생술 인지율	-	-	○	
	심폐소생술 교육 경험률	-	-	○	
	심폐소생술 마네킹 실습 경험률	-	-	○	
	심폐소생술 시행능력률	-	-	○	
교육 및 경제활동	취업률	-	○	○	
	직업	○	○	○	
	근로종류	○	○	○	
	종사상 지위	○	○	○	
	교육수준	○	○	○	
	민간의료보험 가입률	○	○	○	
	성별	○	○	○	
	결혼여부	○	○	○	
	광역시도 거주기간	-	○	○	
	시·군·구 거주기간	-	○	○	

제 4 부 부록

IV. 연도별 문항비교표

1. 흡연

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
1. 지금까지 살아오는 동안 피운 담배의 양은 총 얼마나 됩니까? ① 5갑(100개비) 미만 (☞ 2번 문항으로) ② 5갑(100개비) 이상 (☞ 2번 문항으로) ③ 피운 적 없음 (☞ 6번 문항으로)	1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오 (☞ 7번 문항으로)	1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오 (☞ 7번 문항으로)	1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오 (☞ 7번 문항으로)	1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오 (☞ 7번 문항으로)
3. 현재 담배를 피우십니까? ① 피움 (☞ 3-1번 문항으로) ② 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 (☞ 3-4번 문항으로) ③ 비흡당(문항 1/③: 피운 적 없음) 3-1. 하루 평균 흡연량은 얼마나 됩니까? _____ 개비 888. 비흡당(문항 1/③: 피운 적 없음, 3/②: 과거흡연자) 3-4. 과거 흡연 기간은 얼마나 됩니까? _____ 년 _____ 개월 3-5. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 얼마나 됩니까? (☞ 4번 문항으로) _____ 개비	2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 ➡ 하루 평균 흡연량 개비 (☞ 3번 문항으로) 888. 비흡당(문항 1/②, 문항 2/②③) ② 가끔 피움 ➡ 지난 1달간 흡연일 수 일 ➡ 흡연하는 날 하루 평균 흡연량 개비 88 888. 비흡당(문항 1/②, 문항 2/①③) ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 ➡ 과거 흡연 기간 년 개월 ➡ 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량 개비 (☞ 5번 문항으로) 88 88 888. 비흡당(문항 1/②, 문항 2/①②) ④ 비흡당(문항 1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음)	2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 ➡ 하루 평균 흡연량 개비 (☞ 3번 문항으로) 888. 비흡당(문항 1/②, 문항 2/②③) ② 가끔 피움 ➡ 지난 1달간 흡연일 수 일 ➡ 흡연하는 날 하루 평균 흡연량 개비 (☞ 3번 문항으로) 88 888. 비흡당(문항 1/②, 문항 2/①③) ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 ➡ 과거 흡연 기간 년 개월 ➡ 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량 개비 (☞ 6번 문항으로) 88 88 888. 비흡당(문항 1/②, 문항 2/①②) ④ 비흡당(문항 1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음)	2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 ➡ 하루 평균 흡연량 개비 (☞ 3번 문항으로) 888. 비흡당(문항 1/②, 문항 2/②③) ② 가끔 피움 ➡ 지난 1달간 흡연일 수 일 ➡ 흡연하는 날 하루 평균 흡연량 개비 (☞ 3번 문항으로) 88 888. 비흡당(문항 1/②, 문항 2/①③) ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 ➡ 과거 흡연 기간 년 개월 ➡ 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량 개비 (☞ 6번 문항으로) 88 88 888. 비흡당(문항 1/②, 문항 2/①②) ④ 비흡당(문항 1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음)	2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 ➡ 하루 평균 흡연량 개비 (☞ 3번 문항으로) 888. 비흡당(문항 1/②, 문항 2/②③) ② 가끔 피움 ➡ 지난 1달간 흡연일 수 일 ➡ 흡연하는 날 하루 평균 흡연량 개비 (☞ 3번 문항으로) 88 888. 비흡당(문항 1/②, 문항 2/①③) ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 ➡ 과거 흡연 기간 년 개월 ➡ 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량 개비 (☞ 6번 문항으로) 88 88 888. 비흡당(문항 1/②, 문항 2/①②) ④ 비흡당(문항 1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음)
3-3. 앞으로 1개월 안에 담배를 끊을 계획이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ③ 비흡당(문항 1/③: 피운 적 없음, 3/②: 과거흡연자) (☞ 4번 문항으로)	3. 앞으로 1개월 안에 담배를 끊을 계획이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ③ 비흡당(문항 1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 2/③: 과거흡연자)	3. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까? ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다 ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다 ③ 6개월 이내는 아니지만 언제가는 금연할 생각이 있다 ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다 ⑤ 비흡당(문항 1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항 2/③: 과거흡연자)	3. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까? ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다 ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다 ③ 6개월 이내는 아니지만 언제가는 금연할 생각이 있다 ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다 ⑤ 비흡당(문항 1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항 2/③: 과거흡연자)	5. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까? ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다 ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다 ③ 6개월 이내는 아니지만 언제가는 금연할 생각이 있다 ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다 (☞ 7번 문항으로) ⑤ 비흡당(문항 1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항 2/③: 과거흡연자)

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
3-2. 최근 1년 동안 담배를 광고자 하루 (24시간) 이상 금연한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ③ 비해당(문항 1/③: 피운 적 없음, 3/②: 과거금연자)	4. 최근 1년 동안 담배를 광고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ③ 비해당(문항 1/③: 피운 적 없음, 3/②: 과거금연자)	4. 담배를 광고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까? ① 최근 1년간 금연한 적이 있다 ② 과거에는 있었지만, 최근 1년간 없다 ③ 금연한 적이 없다 ④ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개) 이상 피우지 않았음, 문항2/③: 과거금연자)	4. 담배를 광고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까? ① 최근 1년간 금연한 적이 있다 ② 과거에는 있었지만, 최근 1년간 없다 ③ 금연한 적이 없다 ④ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개) 이상 피우지 않았음, 문항2/③: 과거금연자)	3. 담배를 광고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까? ① 최근 1년간 금연한 적이 있다 ② 과거에는 있었지만, 최근 1년간 없다 ③ 금연한 적이 없다(→ 5번 문항으로) ④ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개) 이상 피우지 않았음, 문항2/③: 과거금연자)
4. 최근 1년 동안 TV 및 라디오의 공익광고, 포스터, 리플렛 등을 통해 금연캠페인을 보거나 들어본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	5. 최근 1년 동안 금연에 대한 공익광고(TV, 라디오, 포스터, 리플렛 등)를 보거나 들어본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	5. 최근 1년 동안 금연에 대한 공익광고(TV, 라디오, 포스터, 리플렛 등)를 보거나 들어본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	5. 최근 1년 동안 금연에 대한 공익광고(TV, 라디오, 포스터, 리플렛 등)를 보거나 들어본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	7. 최근 1년 동안 금연에 대한 공익광고(TV, 라디오, 포스터, 리플렛 등)를 보거나 들어본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오

2. 음주

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? ※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다 1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 (☞ 1~1번 문항으로) ② 아니오 (☞ 「양친의식」 1번 문항으로) 1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까? ※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다 만□□□세 888 비헤당(문항1/2) 술을 마셔본 적이 없음	※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다. 1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 (☞ 「운동 및 신체활동」 1번 문항으로) 1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까? 만□□□세 888 비헤당(문항1/2) 술을 마셔본 적이 없음	※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다. 1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 (☞ 「양친의식」 1번 문항으로) 1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까? 만□□□세 888 비헤당(문항1/2) 술을 마셔본 적이 없음	※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다. 1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 (☞ 「양친의식」 1번 문항으로) 1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까? 만□□□세 888 비헤당(문항1/2) 술을 마셔본 적이 없음	※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다. 1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 (☞ 「양친의식」 1번 문항으로) 1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까? 만□□□세 888 비헤당(문항1/2) 술을 마셔본 적이 없음
2. 다음은 최근 1년 동안의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다. 2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2~4번 정도 ④ 일주일에 2~3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상 ⑥ 비헤당(문항1/2, 문항2/2): 평생 또는 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 (☞ 2-9번 문항으로) ⑦ 한 달에 1번 미만 ⑧ 한 달에 1번 정도 ⑨ 한 달에 2~4번 정도 ⑩ 일주일에 2~3번 정도 ⑪ 일주일에 4번 이상 ⑫ 비헤당(문항1/2, 문항2/2): 평생 술을 마셔본 적이 없음	2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2~4번 정도 ④ 일주일에 2~3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상 ⑥ 비헤당(문항1/2, 문항2/2): 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음	2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2~4번 정도 ④ 일주일에 2~3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상 ⑥ 비헤당(문항1/2, 문항2/2): 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음	2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2~4번 정도 ④ 일주일에 2~3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상 ⑥ 비헤당(문항1/2, 문항2/2): 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음	2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2~4번 정도 ④ 일주일에 2~3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상 ⑥ 비헤당(문항1/2, 문항2/2): 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음

3. 안전의식

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까? ① 전혀 매지 않는다 ② 거의 매지 않는 편이다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 매다 ⑥ 운전할 하지 않는다	1. 자동차 운전할 때 안전벨트를 맵니까? ① 예 ② 아니오 (→ 2번 문항으로) 1-1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까? ① 전혀 매지 않는다 ② 거의 매지 않는 편이다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 매다 ⑥ 비헤당(문항2) 자동차 운전할 하지 않음	1. 자동차 운전할 때 안전벨트를 맵니까? ① 예 ② 아니오 (→ 2번 문항으로) 1-1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까? ① 전혀 매지 않는다 ② 거의 매지 않는 편이다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 매다 ⑥ 비헤당(문항2) 자동차 운전할 하지 않음	1. 자동차 운전할 때 안전벨트를 맵니까? ① 예 ② 아니오 (→ 2번 문항으로) 1-1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까? ① 전혀 매지 않는다 ② 거의 매지 않는 편이다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 매다 ⑥ 비헤당(문항2) 자동차 운전할 하지 않음	1. 자동차 운전할 때 안전벨트를 맵니까? ① 예 ② 아니오 (→ 2번 문항으로) 1-1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까? ① 전혀 매지 않는다 ② 거의 매지 않는 편이다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 매다 ⑥ 비헤당(문항2) 자동차 운전할 하지 않음
3. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 지전거나 오토바이, 자동차 등을 운전한 적이 있습니까? 해당하는 곳에 모두 응답해 주십시오. 3-3. 자동차 ① 예 → □□□회 ② 아니오 ③ 운전하지 않음	1-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차를 운전한 적이 있습니까? ① 예 → □□□회 ② 아니오	1-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차를 운전한 적이 있습니까? ① 예 → □□□회 ② 아니오	1-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차를 운전한 적이 있습니까? ① 예 → □□□회 ② 아니오	1-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차를 운전한 적이 있습니까? ① 예 → □□□회 ② 아니오
2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 앞좌석에 있을 때 안전벨트를 맵니까? ① 전혀 매지 않는다 ② 거의 매지 않는 편이다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 매다 ⑥ 자동차의 앞좌석에 앉은 적이 없다	2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 앞좌석에 있습니까? ① 예 ② 아니오 (→ 3번 문항으로) 2-1. 앞좌석에 있을 때 안전벨트를 맵니까? ① 전혀 매지 않는다 ② 거의 매지 않는 편이다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 매다 ⑥ 비헤당(문항2) 앞좌석에 앉지 않음	2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 앞좌석에 있습니까? ① 예 ② 아니오 (→ 3번 문항으로) 2-1. 앞좌석에 있을 때 안전벨트를 맵니까? ① 전혀 매지 않는다 ② 거의 매지 않는 편이다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 매다 ⑥ 비헤당(문항2) 앞좌석에 앉지 않음	2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 앞좌석에 있습니까? ① 예 ② 아니오 (→ 3번 문항으로) 2-1. 앞좌석에 있을 때 안전벨트를 맵니까? ① 전혀 매지 않는다 ② 거의 매지 않는 편이다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 매다 ⑥ 비헤당(문항2) 앞좌석에 앉지 않음	2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 앞좌석에 있습니까? ① 예 ② 아니오 (→ 3번 문항으로) 2-1. 앞좌석에 있을 때 안전벨트를 맵니까? ① 전혀 매지 않는다 ② 거의 매지 않는 편이다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 매다 ⑥ 비헤당(문항2) 앞좌석에 앉지 않음

4. 운동 및 신체활동

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
1. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 힘들거나 숨이 많이 차서 격렬한 신체활동을 10분 이상 한 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다) □일	1. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 차서 격렬한 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까? □일 ※ 격렬한(고강도) 신체활동 달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동	1. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 차서 격렬한 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까? □일 ※ 격렬한(고강도) 신체활동 달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동	1. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 차서 격렬한 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까? □일 ※ 격렬한(고강도) 신체활동 달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동	1. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 차서 격렬한 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까? □일 ※ 격렬한(고강도) 신체활동 달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동
1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분 동안 했습니까? 하루에 □□시간 □□분 8888 비해당(문항 10일) 중도 산책(등 없음)	1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분 동안 했습니까? 하루에 □□시간 □□분 8888 비해당(문항 10일) 중도 산책(등 없음)	1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분 동안 했습니까? 하루에 □□시간 □□분 8888 비해당(문항 10일) 중도 산책(등 없음)	1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분 동안 했습니까? 하루에 □□시간 □□분 8888 비해당(문항 10일) 중도 산책(등 없음)	1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분 동안 했습니까? 하루에 □□시간 □□분 8888 비해당(문항 10일) 중도 산책(등 없음)
-	2. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 차서 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다.) □일 ※ 중등도(중강도) 신체활동 천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동. 단, 걷기는 제외	2. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 차서 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다.) □일 ※ 중등도(중강도) 신체활동 천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동. 단, 걷기는 제외	2. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 차서 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다.) □일 ※ 중등도(중강도) 신체활동 천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동. 단, 걷기는 제외	2. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 차서 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다.) □일 ※ 중등도(중강도) 신체활동 천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동. 단, 걷기는 제외
-	2-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분 동안 했습니까? 하루에 □□시간 □□분 8888 비해당(문항 10일) 중도 산책(등 없음)	2-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분 동안 했습니까? 하루에 □□시간 □□분 8888 비해당(문항 10일) 중도 산책(등 없음)	2-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분 동안 했습니까? 하루에 □□시간 □□분 8888 비해당(문항 10일) 중도 산책(등 없음)	2-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분 동안 했습니까? 하루에 □□시간 □□분 8888 비해당(문항 10일) 중도 산책(등 없음)

5. 식생활 및 영양

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
4. 평상시 음식을 드실 때, 다음 중 본인은 어디에 해당합니까? ① 아주 짜게 먹는다 ② 약간 짜게 먹는다 ③ 보통으로 먹는다 ④ 약간 싱겁게 먹는다 ⑤ 아주 싱겁게 먹는다	2. 평상시 음식을 드실 때, 다음 중 본인은 어디에 해당합니까? ① 아주 짜게 먹는다 ② 약간 짜게 먹는다 ③ 보통으로 먹는다 ④ 약간 싱겁게 먹는다 ⑤ 아주 싱겁게 먹는다	2. 평상시 음식을 먹을 때, 다음 중 본인은 어디에 해당합니까? ① 아주 짜게 먹는다 ② 약간 짜게 먹는다 ③ 보통으로 먹는다 ④ 약간 싱겁게 먹는다 ⑤ 아주 싱겁게 먹는다	4. 평상시 음식을 먹을 때, 다음 중 본인은 어디에 해당합니까? ① 아주 짜게 먹는다 ② 약간 짜게 먹는다 ③ 보통으로 먹는다 ④ 약간 싱겁게 먹는다 ⑤ 아주 싱겁게 먹는다	2. 평상시 음식을 먹을 때, 다음 중 본인은 어디에 해당합니까? ① 아주 짜게 먹는다 ② 약간 짜게 먹는다 ③ 보통으로 먹는다 ④ 약간 싱겁게 먹는다 ⑤ 아주 싱겁게 먹는다
5. 식탁이나 상에 차려진 음식을 먹을 때, 소금이나 간장을 더 넣어 드십니까? ① 항상 더 넣는다 ② 자주 더 넣는다 ③ 거의 더 넣지 않는다 ④ 전혀 더 넣지 않는다	3. 식탁이나 상에 차려진 음식을 먹을 때, 소금이나 간장을 더 넣어 드십니까? ① 항상 더 넣는다 ② 자주 더 넣는다 ③ 거의 더 넣지 않는다 ④ 전혀 더 넣지 않는다	3. 식탁이나 상에 차려진 음식을 먹을 때, 소금이나 간장을 더 넣어 먹습니까? ① 항상 더 넣는다 ② 자주 더 넣는다 ③ 거의 더 넣지 않는다 ④ 전혀 더 넣지 않는다	5. 식탁이나 상에 차려진 음식을 먹을 때, 소금이나 간장을 더 넣어 먹습니까? ① 항상 더 넣는다 ② 자주 더 넣는다 ③ 거의 더 넣지 않는다 ④ 전혀 더 넣지 않는다	3. 식탁이나 상에 차려진 음식을 먹을 때, 소금이나 간장을 더 넣어 먹습니까? ① 항상 더 넣는다 ② 자주 더 넣는다 ③ 거의 더 넣지 않는다 ④ 전혀 더 넣지 않는다
6. 전, 부침, 튀김을 드실 때, 간장에 찍어 드십니까? ① 항상 찍어 먹는다 ② 가끔 찍어 먹는다 ③ 찍어 먹지 않는다	4. 전, 부침, 튀김을 드실 때, 간장에 찍어 드십니까? ① 항상 찍어 먹는다 ② 가끔 찍어 먹는다 ③ 찍어 먹지 않는다	4. 전, 부침, 튀김을 먹을 때, 간장에 찍어 먹습니까? ① 항상 찍어 먹는다 ② 가끔 찍어 먹는다 ③ 찍어 먹지 않는다	6. 전, 부침, 튀김을 먹을 때, 간장에 찍어 먹습니까? ① 항상 찍어 먹는다 ② 가끔 찍어 먹는다 ③ 찍어 먹지 않는다	4. 전, 부침, 튀김을 먹을 때, 간장에 찍어 먹습니까? ① 항상 찍어 먹는다 ② 가끔 찍어 먹는다 ③ 찍어 먹지 않는다
-	5. 가공식품을 사거나 고를 때 '영양표시'를 읽으십니까? ① 항상 읽는다 ② 가끔 읽는다 ③ 읽지 않는다 ④ 영양표시가 무엇인지 모른다 ⑤ 가공식품을 먹지 않는다	5. 가공식품을 사거나 고를 때 '영양표시'를 읽으십니까? ① 항상 읽는다 ② 가끔 읽는다 ③ 읽지 않는다 ④ 영양표시가 무엇인지 모른다 ⑤ 가공식품을 먹지 않는다	7. 가공식품을 사거나 고를 때 '영양표시'를 읽으십니까? ① 항상 읽는다 ② 가끔 읽는다 ③ 읽지 않는다 ④ 영양표시가 무엇인지 모른다 ⑤ 가공식품을 먹지 않는다	5. 가공식품을 사거나 고를 때 '영양표시'를 읽으십니까? ① 항상 읽는다 ② 가끔 읽는다 ③ 읽지 않는다 ④ 영양표시가 무엇인지 모른다 ⑤ 가공식품을 먹지 않는다
-	6. 최근 1년 동안 보건소, 구청, 동사무소, 복지시설, 학교, 병원 등에서 실시된 영양교육 및 상담을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	6. 최근 1년 동안 보건소, 구청, 동사무소, 복지시설, 학교, 병원 등에서 실시된 영양교육 및 상담을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	8. 최근 1년 동안 보건소, 구청, 동사무소, 복지시설, 학교, 병원 등에서 실시된 영양교육 및 상담을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	6. 최근 1년 동안 보건소, 구청, 동사무소, 복지시설, 학교, 병원 등에서 실시된 영양교육 및 상담을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오

6. 비만 및 체중조절

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까? ① 매우 마른 편임 ② 약간 마른 편임 ③ 보통임 ④ 약간 비만임 ⑤ 매우 비만임	1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까? ① 매우 마른 편임 ② 약간 마른 편임 ③ 보통임 ④ 약간 비만임 ⑤ 매우 비만임	1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까? ① 매우 마른 편임 ② 약간 마른 편임 ③ 보통임 ④ 약간 비만임 ⑤ 매우 비만임	1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까? ① 매우 마른 편임 ② 약간 마른 편임 ③ 보통임 ④ 약간 비만임 ⑤ 매우 비만임	1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까? ① 매우 마른 편임 ② 약간 마른 편임 ③ 보통임 ④ 약간 비만임 ⑤ 매우 비만임

7. 구강건강

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
1. 스스로 생각하실 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각하십니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨 2. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데에 어려움이나 불편함을 느끼십니까?(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 끼 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.) ① 매우 불편하다 ② 불편하다 ③ 그저 그렇다 ④ 별로 불편하지 않다 ⑤ 전혀 불편하지 않다 6. 아래 하루 동안 칫솔질(잇솔질) 한 시기에 모두 ☑표시에 주십시오. ① 아침식사 전에 ② 아침식사 후에 ③ 점심식사 전에 ④ 점심식사 후에 ⑤ 저녁식사 전에 ⑥ 저녁식사 후에 ⑦ 간식 후에 ⑧ 잠자기 전에 ⑨ 칫솔질(잇솔질) 하지 않음 10. 최근 1년 동안 순수검진을 목적으로 구강검진을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	1. 스스로 생각하실 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각하십니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨 2. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데에 어려움이나 불편함을 느끼십니까?(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 끼 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.) ① 매우 불편하다 ② 불편하다 ③ 그저 그렇다 ④ 별로 불편하지 않다 ⑤ 전혀 불편하지 않다 5. 아래 하루 동안 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 하십니까?모두 답해 주십시오. 아침식사 후에 ① 예 ② 아니오 점심식사 전에 ① 예 ② 아니오 저녁식사 후에 ① 예 ② 아니오 잠자기 전에 ① 예 ② 아니오 6. 최근 1년 동안 순수검진을 목적으로 구강검진을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 7. 최근 1년 동안 스케일링(치석제거)을 받으신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	1. 스스로 생각하실 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각하십니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨 2. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데에 어려움이나 불편함을 느끼십니까?(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 끼 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.) ① 매우 불편하다 ② 불편하다 ③ 그저 그렇다 ④ 별로 불편하지 않다 ⑤ 전혀 불편하지 않다 5. 아래 하루 동안 점심식사 후 칫솔질(잇솔질)을 하십니까? ① 예 ② 아니오 ③ 식사하지 않음 6. 최근 1년 동안 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ※ 학교 사업장 구강검진, 국민건강보험공단 구강검진 포함 7. 최근 1년 동안 스케일링(치석제거)을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	1. 스스로 생각하실 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각하십니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨 2. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데에 어려움이나 불편함을 느끼십니까?(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 끼 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.) ① 매우 불편하다 ② 불편하다 ③ 그저 그렇다 ④ 별로 불편하지 않다 ⑤ 전혀 불편하지 않다 6. 아래 하루 동안 점심식사 후 칫솔질(잇솔질)을 하십니까? ① 예 ② 아니오 ③ 식사하지 않음 10. 최근 1년 동안 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ※ 학교 사업장 구강검진, 국민건강보험공단 구강검진 포함 11. 최근 1년 동안 스케일링(치석제거)을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	1. 스스로 생각하실 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각하십니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨 2. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데에 어려움이나 불편함을 느끼십니까?(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 끼 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.) ① 매우 불편하다 ② 불편하다 ③ 그저 그렇다 ④ 별로 불편하지 않다 ⑤ 전혀 불편하지 않다 5. 아래 하루 동안 점심식사 후 칫솔질(잇솔질)을 하십니까? ① 예 ② 아니오 ③ 식사하지 않음 7. 최근 1년 동안 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ※ 학교 사업장 구강검진, 국민건강보험공단 구강검진 포함 8. 최근 1년 동안 스케일링(치석제거)을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오

8. 건강검진 및 예방접종

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
2. 최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 적이 있습니까? ① 예(☑2-1번 문항으로) ② 아니오(☑3번 문항으로)	2. 최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오(☑2-3번 문항으로)	3. 최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으 나 건강상태를 알아보기 위해 건강검진 (암 검진 제외)을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오(☑3-2번 문항으로)	-	2. 최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으 나 건강상태를 알아보기 위해 건강검진 (암 검진 제외)을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오(☑2-2번 문항으로)
3. 최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있습니까? ① 예(☑3-1번 문항으로) ② 아니오(☑3-2번 문항으로) 「활동제한 및 삶의 질」 1번 문항으로	8. 최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오(☑8-3번 문항으로)	4. 최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으 나 건강상태를 알아보기 위해 암 검진을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오(☑4-3번 문항으로)	-	3. 최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으 나 건강상태를 알아보기 위해 암 검진을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오(☑3-4번 문항으로)
-	8-3. 암 검진을 받지 않은 이유는 무엇입니까? ①검진비용이 비싸서 ②검진을 받을 시간이 없어서 ③검진기관 위치를 몰라서 ④필요성을 느끼지 못해서 ⑤기타() ⑥비해당(문항8/①: 암검진을 받았음)	4-4. 암 검진을 받지 않은 이유는 무엇입니까? ①검진비용이 비싸서 ②검진을 받을 시간이 없어서 ③검진기관 위치를 몰라서 ④필요성을 느끼지 못해서 ⑤기타() ⑥비해당(문항4/①: 암검진을 받았음)	-	3-4. 암 검진을 받지 않은 이유는 무엇입니까? ①검진비용이 비싸서 ②검진을 받을 시간이 없어서 ③검진기관 위치를 몰라서 ④필요성을 느끼지 못해서 ⑤기타() ⑥비해당(문항3/①: 암검진을 받았음)
-	8-2. 암 검진 후 검진결과에 대해 병의원, 보건소 등에서 상담을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 (☑8-2번 문항으로) ⑥비해당(문항8/②: 암검진을 받은 적이 없음)	4-3. 암 검진 후 검진결과에 대해 병의원, 보건소 등에서 상담을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 (☑4-3번 문항으로) ⑥비해당(문항4/②: 암검진을 받은 적이 없음)	-	3-3. 암 검진 후 검진결과에 대해 병의원, 보건소 등에서 상담을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 (☑3-3번 문항으로) ⑥비해당(문항3/②: 암검진을 받은 적이 없음)

9. 이환 및 의료이용

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년																
1. 최근 2주 동안 만성, 급성질환 및 사고, 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까? ① 예 →□□일(※ 1-1번 문항으로) ② 아니오(※2번 문항으로)	1. 최근 2주 동안 만성, 급성질환 및 사고, 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까? ① 예 →□□일 ② 아니오	1. 최근 2주 동안 만성, 급성질환 및 사고, 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까? ① 예 →□□일 ② 아니오	1. 최근 2주 동안 만성, 급성질환 및 사고, 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까? ① 예 →□□일 ② 아니오	1. 최근 2주 동안 만성, 급성질환 및 사고, 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까? ① 예 →□□일 ② 아니오																
1-1. 있었다면 며칠입니까? □□일 888. 비혜당(문항 1/2): 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 없음																				
-	1. 최근 1년 동안 혈압을 몇 번이나 재셨습니까? ① 하루에 ② 일주일에 ③ 한 달에 →□□□회 ④ 일년에 ⑤ 전혀 안 함	1. 최근 1년 동안 혈압을 몇 번이나 재셨습니까? ① 하루에 ② 일주일에 ③ 한 달에 →□□□회 ④ 일년에 ⑤ 전혀 안 함	1. 최근 1년 동안 혈압을 몇 번이나 재셨습니까? ① 하루에 ② 일주일에 ③ 한 달에 →□□□회 ④ 일년에 ⑤ 전혀 안 함	1. 최근 1년 동안 혈압을 몇 번이나 재셨습니까? ① 하루에 ② 일주일에 ③ 한 달에 →□□□회 ④ 일년에 ⑤ 전혀 안 함																
※ 순환기계 질환에 대한 질문입니다. <table><tr><td></td><td>D. 의사에게 진단을 받았음</td></tr><tr><td>6. 고혈압</td><td>○</td></tr></table>		D. 의사에게 진단을 받았음	6. 고혈압	○	3. 의사에게 고혈압을 진단받았습니까? ① 예(※3-1 문항으로) ② 아니오 (※ 「당뇨병」 1번 문항으로) ③비혜당(문항2/2): 고혈압을 평생 앓은 적이 없음	2. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예(※2-1 문항으로) ② 아니오 (※ 「당뇨병」 1번 문항으로)	2. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예(※2-1 문항으로) ② 아니오 (※3번 문항으로)	2. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예(※2-1 문항으로) ② 아니오 (※ 「당뇨병」 1번 문항으로)												
	D. 의사에게 진단을 받았음																			
6. 고혈압	○																			
6-9. 혈압 조절을 위해 현재 혈압약을 복용하십니까? ① 매일 복용함 ② 한달에 20일 이상 복용함 ③ 한달에 15일 이상 복용함 ④ 한달에 15일 미만 복용함 ⑤ 복용하지 않음 ⑥ 비혜당(문항6-C /○) : 고혈압을 현재 앓고 있지 않음	3-2-1. 혈압을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오. <table><tr><td>혈압약 복용</td><td>① 예→□□일/월 ② 아니오</td></tr><tr><td>비약물요법(운동, 식사요법)</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr></table> 8888. 비혜당(문항3/2): 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항3-2/2: 현재 치료를 받지 않음	혈압약 복용	① 예→□□일/월 ② 아니오	비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오	2-2-1. 혈압을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오. <table><tr><td>혈압약 복용</td><td>① 예 →한 달에 □□일 ② 아니오</td></tr><tr><td>비약물요법(운동, 식사요법)</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr></table> 8888. 비혜당(문항2/2): 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항2-2/2: 현재 치료를 받지 않음	혈압약 복용	① 예 →한 달에 □□일 ② 아니오	비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오	2-2-1. 혈압을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오. <table><tr><td>혈압약 복용</td><td>① 예 →한 달에 □□일 ② 아니오</td></tr><tr><td>비약물요법(운동, 식사요법)</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr></table> 8888. 비혜당(문항2/2): 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항2-2/2: 현재 치료를 받지 않음	혈압약 복용	① 예 →한 달에 □□일 ② 아니오	비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오	2-2-1. 혈압을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오. <table><tr><td>혈압약 복용</td><td>① 예 →한 달에 □□일 ② 아니오</td></tr><tr><td>비약물요법(운동, 식사요법)</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr></table> 8888. 비혜당(문항2/2): 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항2-2/2: 현재 치료를 받지 않음	혈압약 복용	① 예 →한 달에 □□일 ② 아니오	비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오
혈압약 복용	① 예→□□일/월 ② 아니오																			
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오																			
혈압약 복용	① 예 →한 달에 □□일 ② 아니오																			
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오																			
혈압약 복용	① 예 →한 달에 □□일 ② 아니오																			
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오																			
혈압약 복용	① 예 →한 달에 □□일 ② 아니오																			
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오																			

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년																	
6-10. 고혈압을 관리하는 방법에 대해 병의원이나 보건소 등에서 교육을 받은 적이 있습니까? 단, 진료시간 중 의사, 간호사와 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외 ① 예(☑ 1-10-1번 문항으로) ② 아니오(☑ 「고지혈증」 문항으로) ③ 비해당(문항6-C / O : 고혈압을 현재 갖고 있지 않음) ④ 기타 6-10-1. 고혈압 관리교육은 어디에서 받았습니까? 모두 응답해 주십시오. ① 병의원 ② 한방병의원 ③ 보건소 ④ 기타 ⑤ 비해당(문항6-C / O : 고혈압을 현재 갖고 있지 않음, 문항6-10/② : 교육을 받은 적이 없음) (☑ 7-A 고지혈증, 문항으로)	3-3. 고혈압을 관리하는 방법에 대해, 다음 의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오. (* 단, 진료시간 중 의사, 간호사와 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) <table border="1"> <tr> <td>병의원</td> <td>① 예 ② 아니오</td> </tr> <tr> <td>한방병의원</td> <td>① 예 ② 아니오</td> </tr> <tr> <td>보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)</td> <td>① 예 ② 아니오</td> </tr> </table> 888. 비해당(문항3/② : 의사에게 진단받은 적이 없음)	병의원	① 예 ② 아니오	한방병의원	① 예 ② 아니오	보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)	① 예 ② 아니오	2-3. 고혈압을 관리하는 방법에 대해, 다음 의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오. (* 단, 진료시간 중 의사, 간호사와 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) <table border="1"> <tr> <td>병의원</td> <td>① 예 ② 아니오</td> </tr> <tr> <td>한방병의원</td> <td>① 예 ② 아니오</td> </tr> <tr> <td>보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)</td> <td>① 예 ② 아니오</td> </tr> </table> 888. 비해당(문항2/② : 의사에게 진단받은 적이 없음)	병의원	① 예 ② 아니오	한방병의원	① 예 ② 아니오	보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)	① 예 ② 아니오	2-4. 고혈압을 관리하는 방법에 대해, 다음 의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오. (* 단, 진료시간 중 의사, 간호사와 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) <table border="1"> <tr> <td>병의원</td> <td>① 예 ② 아니오</td> </tr> <tr> <td>한방병의원</td> <td>① 예 ② 아니오</td> </tr> <tr> <td>보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)</td> <td>① 예 ② 아니오</td> </tr> </table> 888. 비해당(문항2/② : 의사에게 진단받은 적이 없음)	병의원	① 예 ② 아니오	한방병의원	① 예 ② 아니오	보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)	① 예 ② 아니오
병의원	① 예 ② 아니오																				
한방병의원	① 예 ② 아니오																				
보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)	① 예 ② 아니오																				
병의원	① 예 ② 아니오																				
한방병의원	① 예 ② 아니오																				
보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)	① 예 ② 아니오																				
병의원	① 예 ② 아니오																				
한방병의원	① 예 ② 아니오																				
보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)	① 예 ② 아니오																				
-	1. 최근 1년 동안 혈당을 몇 번이나 재셨습니까? ① 하루에 ② 일주일에 ③ 한 달에 ④ 일년에 ⑤ 전혀 안 함	1. 최근 1년 동안 혈당을 몇 번이나 재셨습니까? ① 하루에 ② 일주일에 ③ 한 달에 ④ 일년에 ⑤ 전혀 안 함	1. 최근 1년 동안 혈당을 몇 번이나 재셨습니까? ① 하루에 ② 일주일에 ③ 한 달에 ④ 일년에 ⑤ 전혀 안 함	1. 최근 1년 동안 혈당을 몇 번이나 재셨습니까? ① 하루에 ② 일주일에 ③ 한 달에 ④ 일년에 ⑤ 전혀 안 함																	
※ 내분비 대사성 질환에 대한 질문입니다. <table border="1"> <tr> <td>D. 의사에게 진단을 받았음</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21. 당뇨병</td> <td>○</td> </tr> </table>	D. 의사에게 진단을 받았음		21. 당뇨병	○	3. 의사에게 당뇨병을 진단받았습니까? ① 예(☑ 3-1 문항으로) ② 아니오 (☑ 「고지혈증」 1번 문항으로) ③ 비해당(문항2/② : 당뇨병을 평생 앓은 적이 없음)	2. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예(☑ 2-1 문항으로) ② 아니오 (☑ 「고지혈증」 1번 문항으로)	2. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예(☑ 2-1 문항으로) ② 아니오 (☑ 3번 문항으로)	2. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예(☑ 2-1 문항으로) ② 아니오 (☑ 「이상지질혈증」 1번 문항으로)													
D. 의사에게 진단을 받았음																					
21. 당뇨병	○																				

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년																								
21-10. 혈당을 관리하기 위해 치료를 받고 있습니까? ① 예(☑ 2-10-1번 문항으로) ② 아니오(☑ 2-11번 문항으로) ③ 비혜당(문항21-A/C) : 당뇨병을 지금까지 받은 적이 없음	3-2-1. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오. <table><tr><td>인슐린 주사</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr><tr><td>당뇨병약(경구 혈당강하제)</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr><tr><td>비약물요법(운동, 식사요법)</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr></table> 8888. 비혜당(문항3/②): 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항3-2/②: 현재 치료를 받지 않음)	인슐린 주사	① 예 ② 아니오	당뇨병약(경구 혈당강하제)	① 예 ② 아니오	비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오	2-2-1. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오. <table><tr><td>인슐린 주사</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr><tr><td>당뇨병약(경구 혈당강하제)</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr><tr><td>비약물요법(운동, 식사요법)</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr></table> 8888. 비혜당(문항2/②): 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항2-2/②: 현재 치료를 받지 않음)	인슐린 주사	① 예 ② 아니오	당뇨병약(경구 혈당강하제)	① 예 ② 아니오	비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오	2-2-1. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오. <table><tr><td>인슐린 주사</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr><tr><td>당뇨병약(경구 혈당강하제)</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr><tr><td>비약물요법(운동, 식사요법)</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr></table> 8888. 비혜당(문항2/②): 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항2-2/②: 현재 치료를 받지 않음)	인슐린 주사	① 예 ② 아니오	당뇨병약(경구 혈당강하제)	① 예 ② 아니오	비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오	2-2-1. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오. <table><tr><td>인슐린 주사</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr><tr><td>당뇨병약(경구 혈당강하제)</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr><tr><td>비약물요법(운동, 식사요법)</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr></table> 8888. 비혜당(문항2/②): 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항2-2/②: 현재 치료를 받지 않음)	인슐린 주사	① 예 ② 아니오	당뇨병약(경구 혈당강하제)	① 예 ② 아니오	비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오
인슐린 주사	① 예 ② 아니오																											
당뇨병약(경구 혈당강하제)	① 예 ② 아니오																											
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오																											
인슐린 주사	① 예 ② 아니오																											
당뇨병약(경구 혈당강하제)	① 예 ② 아니오																											
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오																											
인슐린 주사	① 예 ② 아니오																											
당뇨병약(경구 혈당강하제)	① 예 ② 아니오																											
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오																											
인슐린 주사	① 예 ② 아니오																											
당뇨병약(경구 혈당강하제)	① 예 ② 아니오																											
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오																											
21-10-1. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오 ① 인슐린 주사 ② 당뇨병약(경구 혈당강하제) ③ 비약물요법(운동, 식사요법) ④ 기타 ⑤ 비혜당(문항21-A/C) : 당뇨병을 지금까지 받은 적이 없음, 문항21-10/②: 혈당 관리 치료를 받고 있지 않음)	3-3. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오. (※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분미만으로 대화한 진료상담은 제외) <table><tr><td>병의원</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr><tr><td>한방병원</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr><tr><td>보건소(보건지소, 진료소, 의원)</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr></table> 888. 비혜당(문항3/②): 의사에게 진단받은 적이 없음)	병의원	① 예 ② 아니오	한방병원	① 예 ② 아니오	보건소(보건지소, 진료소, 의원)	① 예 ② 아니오	2-3. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오. (※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분미만으로 대화한 진료상담은 제외) <table><tr><td>병의원</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr><tr><td>한방병원</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr><tr><td>보건소(보건지소, 진료소, 의원)</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr></table> 888. 비혜당(문항2/②): 의사에게 진단받은 적이 없음)	병의원	① 예 ② 아니오	한방병원	① 예 ② 아니오	보건소(보건지소, 진료소, 의원)	① 예 ② 아니오	2-3. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오. (※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분미만으로 대화한 진료상담은 제외) <table><tr><td>병의원</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr><tr><td>한방병원</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr><tr><td>보건소(보건지소, 진료소, 의원)</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr></table> 888. 비혜당(문항2/②): 의사에게 진단받은 적이 없음)	병의원	① 예 ② 아니오	한방병원	① 예 ② 아니오	보건소(보건지소, 진료소, 의원)	① 예 ② 아니오	2-4. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오. (※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분미만으로 대화한 진료상담은 제외) <table><tr><td>병의원</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr><tr><td>한방병원</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr><tr><td>보건소(보건지소, 진료소, 의원)</td><td>① 예 ② 아니오</td></tr></table> 888. 비혜당(문항2/②): 의사에게 진단받은 적이 없음)	병의원	① 예 ② 아니오	한방병원	① 예 ② 아니오	보건소(보건지소, 진료소, 의원)	① 예 ② 아니오
병의원	① 예 ② 아니오																											
한방병원	① 예 ② 아니오																											
보건소(보건지소, 진료소, 의원)	① 예 ② 아니오																											
병의원	① 예 ② 아니오																											
한방병원	① 예 ② 아니오																											
보건소(보건지소, 진료소, 의원)	① 예 ② 아니오																											
병의원	① 예 ② 아니오																											
한방병원	① 예 ② 아니오																											
보건소(보건지소, 진료소, 의원)	① 예 ② 아니오																											
병의원	① 예 ② 아니오																											
한방병원	① 예 ② 아니오																											
보건소(보건지소, 진료소, 의원)	① 예 ② 아니오																											
21-10-1. 당뇨병 관리교육은 어디에서 받았습니까? 모두 응답해 주십시오. ① 병의원 ② 한방병원 ③ 보건소 ④ 기타 ⑤ 비혜당(문항21-A/C) : 당뇨병을 지금까지 받은 적이 없음, 문항21-9/②: 교육을 받은 적이 없음)																												

2008년		2009년		2010년		2011년		2012년	
※ 순환기계 질환에 대한 질문입니다. D. 의사에게 진단을 받았음		2. 의사에게 고지혈증을 진단받았습니까? ① 예(☞2-1 문항으로) ② 아니오(☞ 「뇌졸중」 1번 문항으로) ③ 비해당(문항1/②: 고지혈증을 평생 앓은 적이 없음)		1. 의사에게 고지혈증을 진단받은 적이 있습니까? ① 예(☞2-1 문항으로) ② 아니오(☞ 「뇌졸중(중풍)」 1번 문항으로)		1. 의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 적이 있습니까? ① 예(☞1-1 문항으로) ② 아니오(☞ 「뇌졸중」 1번 문항으로)		1. 의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 적이 있습니까? ① 예(☞1-1 문항으로) ② 아니오(☞ 「뇌졸중」 1번 문항으로)	
7. 고지혈증		○							
※ 근골격계 질환에 대한 질문입니다. D. 의사에게 진단을 받았음		2. 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받았습니까? ① 예(☞2-1 문항으로) ② 아니오(☞ 「골다공증」 1번 문항으로) ③ 비해당(문항1/②: 관절염을 평생 앓은 적이 없음)		1. 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 적이 있습니까? ① 예(☞1-1 문항으로) ② 아니오(☞ 「골다공증」 1번 문항으로)		1. 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 적이 있습니까? ① 예(☞1-1 문항으로) ② 아니오(☞ 「골다공증」 1번 문항으로)		1. 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 적이 있습니까? ① 예(☞1-1 문항으로) ② 아니오(☞ 「골다공증」 1번 문항으로)	
13. 골관절염		○							
14. 류마티스성 관절염		○							
12-9. 관절염증상의 관리하는 방법에 대해 병의원이나 보건소 등에서 교육을 받은 적이 있습니까? 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료 시간은 제외합니다. ① 예(☞ 12-9-1번 문항으로) ② 아니오(☞ 14-A 「골다공증」 문항으로) ③ 비해당(문항 12-A, 13-A/○: 골관절염 및 류마티스성 관절염을 지금까지 앓은 적이 없음) 12-9-1. 관절염 관리교육은 어디에서 받았습니까? 모두 응답해 주십시오. ① 병의원 ② 한방병원 ③ 보건소 ④ 기타 ⑤ 비해당(문항 12-A, 13-A/②: 관절염을 지금까지 앓은 적이 없음, 문항 12-9/②: 교육받은 적이 없음) (☞14-A 「골다공증」 문항으로)		2-2. 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오. (* 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) 진료상담은 제외) 병의원 한방병원 보건소(보건지소, 진료소, 의료원) 888. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)		1-2. 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오. (* 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) 진료상담은 제외) 병의원 한방병원 보건소(보건지소, 진료소, 의료원) 888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)		1-2. 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오. (* 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) 진료상담은 제외) 병의원 한방병원 보건소(보건지소, 진료소, 의료원) 888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)		1-2. 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오. (* 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) 진료상담은 제외) 병의원 한방병원 보건소(보건지소, 진료소, 의료원) 888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)	
1. 대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오(☞ 「의료이용」 1번 문항으로)		1. 대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오(☞ 「의료이용」 1번 문항으로)		1. 대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오(☞ 「의료이용」 1번 문항으로)		1. 대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오(☞ 「의료이용」 1번 문항으로)		1. 대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오(☞ 「의료이용」 1번 문항으로)	

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
-	-	1. 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니요 (☞ 「의료이용」 1번 문항으로)	1. 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니요 (☞ 「의료이용」 1번 문항으로)	1. 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니요
1. 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 미포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까? ① 예(☞ 1-1번 문항으로) ② 아니요(☞ 2번 문항으로)	1. 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 미포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니요 (☞ 2번 문항으로)	1. 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니요 (☞ 「사고 및 중독」 1번 문항으로)	1. 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 미포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니요 (☞ 「사고 및 중독」 1번 문항으로)	1. 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 미포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니요 (☞ 「사고 및 중독」 1번 문항으로)

10. 사고 및 중독

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ① 예 (☑ 1-1년 문항으로) ② 아니오	1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ① 예 → ☐회 ② 아니오(☑ 「활동제한 및 삶의 질」 1번 문항으로)	1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ① 예 → ☐회 ② 아니오 ※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외	1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ① 예 → ☐회 ② 아니오 ※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외	1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ① 예 → ☐회 ② 아니오 ※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외
1-1. 있다면, 사고 중독은 몇 번 발생했습니까? ☐회 88. 비허위(문항 1/2) 사고 중독 발생한 적 없음	-	-	-	-

11. 활동제한 및 삶의 질

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
1. 평소 본인의 건강은 어떻다고 생각하십니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨 2. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까? ① 예 (☑ 2-1번 문항으로) ② 아니오 (☑ 3번 문항으로) 2-1. 있었다면 며칠입니까? □□일 88. 비혜당(문항2/☑: 질병이나 손상으로 하루 종일 누워있었던 날 없음) 3. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 한 적이 있습니까? ① 예(☑ 3-1번 문항) ② 아니오(☑ 4-1번 문항) 3-1. 있었다면 며칠입니까? □□일 88. 비혜당(문항3/☑: 질병이나 손상으로 결석 또는 결근 한 적 없음, 학교 또는 직장에 다니지 않음)	1. 평소 본인의 건강은 어떻다고 생각하십니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨 2. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 3. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 해야 했던 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ③ 학교 또는 직장을 다니고 있지 않음	1. 평소 본인의 건강은 어떻다고 생각하십니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨 2. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 3. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 해야 했던 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ③ 학교 또는 직장을 다니고 있지 않음	1. 평소 본인의 건강은 어떻다고 생각하십니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨 2. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 3. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 해야 했던 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ③ 학교 또는 직장을 다니고 있지 않음	1. 평소 본인의 건강은 어떻다고 생각하십니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨 2. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 3. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 해야 했던 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ③ 학교 또는 직장을 다니고 있지 않음

12. 보건기관 이용

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년																																																																
-	1. 최근 1년 동안 주로 이용하신 보건기관은 어디입니까? ① 이용한 적 없다(➡ 1-3번 문항으로) ② 보건소(보건의료원 포함) ③ 보건지소 ④ 보건진료소 (➡ 1-1번 문항으로)	1. 최근 1년 동안 주로 이용하신 보건기관은 어디입니까? ① 이용한 적 없다(➡ 1-4번 문항으로) ② 보건소(보건의료원 포함) ③ 보건지소 ④ 보건진료소 (➡ 1-1번 문항으로)	1. 최근 1년 동안 주로 이용하신 보건기관은 어디입니까? ① 이용한 적 없다 ② 보건소(보건의료원 포함) ③ 보건지소 ④ 보건진료소	1. 최근 1년 동안 주로 이용하신 보건기관은 어디입니까? ① 이용한 적 없다 ② 보건소(보건의료원 포함) ③ 보건지소 ④ 보건진료소																																																																
-	-	1-2. 보건기관을 이용하였다면, 어떤 서비스에 참여했습니까? 모두 응답해 주십시오. <table><tr><td>예방접종</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>건강교실 (금연, 절주)</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>건강검진</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>방문보건서비스</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>영양관리서비스</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>정신보건서비스</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>모자보건서비스</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>임차진료</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>서류, 증명서발급</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>기타</td><td>①예 ②아니오</td></tr></table> 8888888888, 비혜당(문항 1/Q: 보건기관 이용한 적이 없음)	예방접종	①예 ②아니오	건강교실 (금연, 절주)	①예 ②아니오	건강검진	①예 ②아니오	방문보건서비스	①예 ②아니오	영양관리서비스	①예 ②아니오	정신보건서비스	①예 ②아니오	모자보건서비스	①예 ②아니오	임차진료	①예 ②아니오	서류, 증명서발급	①예 ②아니오	기타	①예 ②아니오	1-2. 보건기관을 이용하였다면, 어떤 서비스에 참여했습니까? 모두 응답해 주십시오. <table><tr><td>예방접종</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>건강교실 (금연, 절주, 운동, 영양)</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>건강검진</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>방문보건서비스</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>영양보충서비스</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>정신보건서비스</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>모자보건서비스</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>구강보건서비스</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>진료서비스</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>민원서비스 (서류, 증명서발급)</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>기타</td><td>①예 ②아니오</td></tr></table> 8888888888, 비혜당(문항 1/Q: 보건기관 이용한 적이 없음)	예방접종	①예 ②아니오	건강교실 (금연, 절주, 운동, 영양)	①예 ②아니오	건강검진	①예 ②아니오	방문보건서비스	①예 ②아니오	영양보충서비스	①예 ②아니오	정신보건서비스	①예 ②아니오	모자보건서비스	①예 ②아니오	구강보건서비스	①예 ②아니오	진료서비스	①예 ②아니오	민원서비스 (서류, 증명서발급)	①예 ②아니오	기타	①예 ②아니오	1-2. 보건기관을 이용하였다면, 어떤 서비스에 참여했습니까? 모두 응답해 주십시오. <table><tr><td>예방접종</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>건강교실 (금연, 절주, 운동, 영양)</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>건강검진</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>방문보건서비스</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>영양보충서비스</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>정신보건서비스</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>모자보건서비스</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>구강보건서비스</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>진료서비스</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>민원서비스 (서류, 증명서발급)</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>기타</td><td>①예 ②아니오</td></tr></table> 8888888888, 비혜당(문항 1/Q: 보건기관 이용한 적이 없음)	예방접종	①예 ②아니오	건강교실 (금연, 절주, 운동, 영양)	①예 ②아니오	건강검진	①예 ②아니오	방문보건서비스	①예 ②아니오	영양보충서비스	①예 ②아니오	정신보건서비스	①예 ②아니오	모자보건서비스	①예 ②아니오	구강보건서비스	①예 ②아니오	진료서비스	①예 ②아니오	민원서비스 (서류, 증명서발급)	①예 ②아니오	기타	①예 ②아니오
예방접종	①예 ②아니오																																																																			
건강교실 (금연, 절주)	①예 ②아니오																																																																			
건강검진	①예 ②아니오																																																																			
방문보건서비스	①예 ②아니오																																																																			
영양관리서비스	①예 ②아니오																																																																			
정신보건서비스	①예 ②아니오																																																																			
모자보건서비스	①예 ②아니오																																																																			
임차진료	①예 ②아니오																																																																			
서류, 증명서발급	①예 ②아니오																																																																			
기타	①예 ②아니오																																																																			
예방접종	①예 ②아니오																																																																			
건강교실 (금연, 절주, 운동, 영양)	①예 ②아니오																																																																			
건강검진	①예 ②아니오																																																																			
방문보건서비스	①예 ②아니오																																																																			
영양보충서비스	①예 ②아니오																																																																			
정신보건서비스	①예 ②아니오																																																																			
모자보건서비스	①예 ②아니오																																																																			
구강보건서비스	①예 ②아니오																																																																			
진료서비스	①예 ②아니오																																																																			
민원서비스 (서류, 증명서발급)	①예 ②아니오																																																																			
기타	①예 ②아니오																																																																			
예방접종	①예 ②아니오																																																																			
건강교실 (금연, 절주, 운동, 영양)	①예 ②아니오																																																																			
건강검진	①예 ②아니오																																																																			
방문보건서비스	①예 ②아니오																																																																			
영양보충서비스	①예 ②아니오																																																																			
정신보건서비스	①예 ②아니오																																																																			
모자보건서비스	①예 ②아니오																																																																			
구강보건서비스	①예 ②아니오																																																																			
진료서비스	①예 ②아니오																																																																			
민원서비스 (서류, 증명서발급)	①예 ②아니오																																																																			
기타	①예 ②아니오																																																																			

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년																									
-	1-2. 최근 1년 동안 보건소에서 받으신 서비스에 대하여 어느 정도 만족하십니까? ① 대단히 만족한다 ② 만족한 편이다 ③ 보통이다 ④ 불만족한 편이다 ⑤ 대단히 불만족한다 (➡ 2번 문항으로) ⑥비해당(문항1/①: 보건기관 이용한 적이 없음) 2. 보건기관(보건소, 보건지소, 진료소, 의료원)에서 다음 질병의 예방 및 관리를 위한 홍보(교육포함)를 보거나 들어본 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오. <table><tr><td>고혈압</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>당뇨병</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>관절염</td><td>①예 ②아니오</td></tr></table>	고혈압	①예 ②아니오	당뇨병	①예 ②아니오	관절염	①예 ②아니오	1-3. 최근 1년 동안 보건소에서 받으신 서비스에 대하여 어느 정도 만족하십니까? ① 대단히 만족한다 ② 만족한 편이다 ③ 보통이다 ④ 불만족한 편이다 ⑤ 대단히 불만족한다 (➡ 2번 문항으로) ⑥비해당(문항1/①: 보건기관 이용한 적이 없음) 2. 보건기관(보건소, 보건지소, 진료소, 의료원)에서 다음 질병의 예방 및 관리를 위한 홍보(교육포함)를 보거나 들어본 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오. <table><tr><td>고혈압</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>당뇨병</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>관절염</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>아토피·천식</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>치매</td><td>①예 ②아니오</td></tr></table>	고혈압	①예 ②아니오	당뇨병	①예 ②아니오	관절염	①예 ②아니오	아토피·천식	①예 ②아니오	치매	①예 ②아니오	1-3. 최근 1년 동안 보건소에서 받으신 서비스에 대하여 어느 정도 만족하십니까? ① 대단히 만족한다 ② 만족한 편이다 ③ 보통이다 ④ 불만족한 편이다 ⑤ 대단히 불만족한다 (➡ 2번 문항으로) 88888888888, 비해당(문항 1/①: 보건기관 이용한 적이 없음) 2. 보건기관(보건소, 보건지소, 진료소, 의료원)에서 다음 질병의 예방 및 관리를 위한 홍보(교육포함)를 보거나 들어본 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오. <table><tr><td>고혈압</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>당뇨병</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>관절염</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>아토피·천식</td><td>①예 ②아니오</td></tr><tr><td>치매</td><td>①예 ②아니오</td></tr></table>	고혈압	①예 ②아니오	당뇨병	①예 ②아니오	관절염	①예 ②아니오	아토피·천식	①예 ②아니오	치매	①예 ②아니오
고혈압	①예 ②아니오																												
당뇨병	①예 ②아니오																												
관절염	①예 ②아니오																												
고혈압	①예 ②아니오																												
당뇨병	①예 ②아니오																												
관절염	①예 ②아니오																												
아토피·천식	①예 ②아니오																												
치매	①예 ②아니오																												
고혈압	①예 ②아니오																												
당뇨병	①예 ②아니오																												
관절염	①예 ②아니오																												
아토피·천식	①예 ②아니오																												
치매	①예 ②아니오																												
-	-	-	-	-																									

13. 심정지

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
-	-	-	-	1. 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오(▶ 「교육 및 경제활동」 1번 문항으로)
-	-	-	-	1-1. 심폐소생술 교육을 받은 경험이 있습니까? ① 최근 2년간 교육을 받은 적이 있다 (▶ 1-1-1번 문항으로) ② 과거에는 있었지만, 최근 2년간 없다 (▶ 2번 문항으로) ③ 교육을 받은 적이 없다 (▶ 2번 문항으로) ④ 해당(문항1/②): 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음

참고문헌

1. 질병관리본부. 삶의 질 조사도구(EQ-5D)의 질
가중치 추정 연구 보고서. 2007.
2. 보건복지부. 질병관리본부. 2010년 국민건강통계,
국민건강영양조사 제 5기 1차년도(2010). 2011.
3. 보건복지부. 질병관리본부. 2011년 국민건강통계,
국민건강영양조사 제 5기 2차년도(2011). 2012.

참여연구진

총괄책임교수	박노례	인제대학교
지역책임교수	이중정	계명대학교
지역부책임교수	정인성	계명대학교
지역담당연구원	최광득	계명대학교
	최정예	계명대학교
	김윤용	계명대학교
조사관리담당관	강영란	울주군보건소
지역조사원	배현숙	울주군보건소
	안미경	울주군보건소
	최성숙	울주군보건소
	추정숙	울주군보건소

2012년 울산광역시 울주군 지역사회 건강통계

발 행 : 2013. 3.

발 행 인 : 신 장 열 (울산광역시 울주군수)

편 집 인 : 이 중 정 (계명대학교)

발 행 처 : 기 관 명 울산광역시 울주군보건소

홈페이지 <http://health.ulju.ulsan.kr/main/main.asp>

주 소 (689-812) 울산광역시 울주군 삼남면 서향교1길 67-12 (교동리 1605-1)

전화번호 (052) 265-9095

팩 스 (052) 229-8049

이 책은 울산광역시 울주군보건소에 소유권이 있습니다. 울산광역시 울주군보건소 승인 없이 상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.