

발 간 등 록 번 호

11-1352477-000174-10


ISSN 2092-2876
통계승인번호 제 11775호

2013 지역사회 건강통계

울산광역시 울주군



Community Health Survey





발간사



울주군의 2013년 『지역사회건강조사』 통계집을 발간하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.

울주군은 천혜의 자연을 품고 있는 아름답고 살기 좋은 축복의 명품도시입니다. 울주군 보건소는 모든 군민이 보다 건강하고 행복하게 삶을 영위 할 수 있도록 군민의 작은 아픔의 소리에도 귀를 기울여 사전 예방적 건강정책을 강화하고 공공보건의료 서비스를 제공하기 위해 혼신의 노력을 해 나가겠습니다.

2008년부터 시작된 『지역사회건강조사』는 지난 6년간 근거 중심의 보건사업 수행의 기반을 마련하고자 보건사업 통합평가지표를 생산하는데 그 목적을 두고 수행되어 왔습니다. 군민들의 건강을 위해 지역의 상황을 반영하는 신뢰성 있는 건강 지표를 생산하고 이를 바탕으로 지역 실정에 맞는 지역보건사업을 계획하는 것이 『지역사회건강조사』의 의의라 하겠습니다. 앞으로 본 조사자료를 활용하여 군민의 행복한 삶의 기반이 되는 건강문제를 보다 적극적으로 대응하고 효과적이고 알찬 공공 보건의료사업을 펼쳐 나갈 것입니다.

이 조사를 위해 협력해 주시고 성실하게 조사에 참여해 주신 계명대학교의 여러 관계자들과 조사원들에게 심심한 감사를 드립니다.

군민건강을 여는 작은 시작의 길을 우리 보건소 전 직원들의 사랑과 열정으로 희망의 불빛으로 환하게 밝혀 나갈 것임을 약속드립니다.

모든 군민의 앞날에 항상 건강과 행복이 깃드시길 기원 드립니다.

감사합니다.

2014. 3.

울산광역시 울주군보건소장

발간에 즈음하여

2008 시작한 지역사회건강조사가 어느덧 6년이 지나며 2013년 조사도 무사히 마치게 되었습니다.

그동안 모아진 지역사회건강조사 자료들은 우리지역의 각종 보건지표를 생산하며 지역사회 주민들의 건강행태 파악 및 우리지역 보건문제의 파악 과 우선과제가 무엇인지를 도출해내는데 활용이 되어 왔습니다.

그동안 이러한 지표들은 지역보건의료계획, 통합건강증진사업 등 각종 지역보건사업들의 우선순위, 목표치 설정, 평가 등에 종합적으로 활용되어 왔으며 앞으로도 객관적 이고 과학적 통계를 바탕으로 한 지역 내 보건, 복지 정책수립, 조례개정 등에 활용될 수 있기를 바랍니다.

또한 지역사회건강조사 결과가 주민들에게 더욱 홍보되고 건강에 대한 지역사회의 관심을 고취시켜 울주군이 더욱 건강하고 행복한 지역사회가 되기 위한 초석이 되기를 바랍니다.

소중한 자료의 수집을 위하여 수고를 아끼지 않으신 김홍식 소장님, 김재숙 과장님, 제순경 계장님 및 현장에서 직접 발로 뛰며 조사에 임하신 조사원과 무엇보다도 이 조사에 성실히 참여해 주신 지역사회 주민 여러분께 깊은 감사드립니다.

2014. 3.

계명대학교 의과대학 책임교수



이용자를 위하여

- ❖ 보고서는 2013. 8. 16. - 2013. 10. 31. 울산광역시 울주군에서 실시된 지역사회건강조사 결과를 수록한 자료입니다.
- ❖ 이 보고서에 제시된 통계치는 가중치를 적용한 결과(조율)이며, 가중치는 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율, 개인응답률, 당해 연도 모집단 성·연령별 인구 구성비를 반영하여 산출하였습니다.
- ❖ 2부 주요통계결과에서 2009-2013년 비교 가능한 지표(표준화율)에 대해서 당해 연도의 전체·성·연령별 그래프와 함께 울주군 및 울산광역시의 연도별 추이 그래프를 제시하였으며, 지표비교 시, 오차막대가 겹치지 않는 경우에 한해 증감 현황을 기술하였습니다. 지표정의가 변경된 경우 변경내용을 각주로 표시하였으며, 해당 연도 통계치는 연도별 추이 그래프에서 제외하였습니다. 조사문항 변경내용은 제4부 부록 <연도별 문항비교표>에서 확인하실 수 있습니다.
- ❖ 3부 통계표에서는 당해 연도에 선정된 주요지표의 상세분석결과를 제시하였습니다. 또한 주요지표를 포함한 모든 산출지표의 통계표는 엑셀파일 형태로 지역사회건강조사 홈페이지 자료실 (<http://chs.cdc.go.kr>)에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
- ❖ 본 자료 중 2008-2012년 수치는 응답의 이상치와 논리적 오류를 수정하여 산출된 결과로 기 발간된 보고서의 수치와 일부 다를 수 있습니다.
- ❖ 분석대상자 수(N)가 20미만인 경우 2부 주요통계결과 및 3부 통계표에서 통계치를 제시하지 않았으며(통계표에서 하이픈(-) 처리), 변동계수(coefficient of variation, CV)가 30이상인 경우 통계치의 신뢰도가 낮으므로 이용 시 유의하시기 바랍니다.
- ❖ 통계표에 수록된 숫자는 소수점 두 번째 자리에서 반올림되었으며, 반올림된 수치의 총계가 일치하지 않을 수 있으나 이는 통계표의 오류가 아닙니다.
- ❖ 2010년부터 2013까지 1년, 2년, 4년 주기로 조사된 지역사회건강조사 순환조사지표에 대한 정보는 제4부 부록 <순환조사지표>에서 확인하실 수 있습니다.
- ❖ 지역사회건강조사 조사표, 건강통계집, 엑셀 통계표, 원시자료(2008-2012)는 지역사회건강조사 홈페이지 자료실에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
- ❖ 이 보고서에 수록된 통계치 및 지역사회건강조사에 관한 문의는 울산광역시 울주군보건소(☎052-229-8048), 계명대학교(☎053-580-3896)로 해주시기 바랍니다.

용어정의



Community Health Survey

모집단(Population)

되는 집단 전체

② 표본(Sample)

모집단 중 조사를 위해 추출된 일부 집단

③ 표본오차(Sampling Error)

모집단 중 일부를 표본으로 선정하여 조사함에 따라 발생하는 오차로서 표본조사의 정확성을 나타내는 척도

④ 비표본오차(Non-Sampling Error)

표본추출을 제외한 조사 설계, 조사 수행, 자료 집계 및 분석 과정에서 발생하는 오차로서 불명확한 조사개념, 조사문항의 객관성 결여, 조사지 구성의 논리적 오류, 면접방법, 조사원의 자질, 조사원을 감독하는 관리자의 태도, 조사대상자의 무응답, 자료 코딩 등이 비표본오차의 주요 발생 원인에 해당

⑤ 조율(Crude Rate)

총 발생건수를 전체 모집단으로 나눈 값으로, 모집단의 성·연령별 등의 인구 집단 특성을 보정하지 않은 통계치

⑥ 표준화율(Standardized Rate)

비교하고자 하는 집단 간 인구 구조 차이를 보정한 통계치

표준오차 (Standard Error)

표본들의 평균이 모집단의 평균과 얼마만큼의 차이가 있는지 나타내는 값

⑧ 변동계수 (Coefficient of Variation, CV)

표준오차를 평균으로 나눈 값으로, 통계치의 신뢰도를 나타내는 척도이며, 변동계수와 통계치의 신뢰도는 반비례 관계



① CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

컴퓨터를 이용하여 조사 자료를 수집하는 방식으로, 조사원이 전자조사표가 설치된 노트북으로 면접조사를 수행 시, 조사현장에서 직접 자료입력, 수정, 저장 및 전송 가능

② 순환조사체계

타당도, 활용성 및 수행 가능성을 고려하여 조사항목의 순환주기를 1년, 2년, 4년으로 구분하여 조사하는 체계

③ 지역보건지표뱅크

지역사회에서 보건사업 추진 시 활용 가능한 조사문항 및 산출지표를 수집·정리한 것으로 지표별 조사문항 및 응답보기, 지표정의, 산출식, 조사주기 등 상세정보 포함

CONTENTS

발간에 즈음하여	
이용자를 위하여	
용어정의	
요약	2
우리 지역사회의 주요 건강이슈	4

1부 조사체계

I.	11
1. 추진배경 및 목적	12
2. 조사체계	12
3. 표본설계	14
4. 조사방법	15
5. 자료관리	16
6. 조사현황	17
II. 통계 추정방법	21
1. 가중치의 사용	22
2. 자료처리	23
3. 분산추정	24

제2부 주요통계결과

I. 건강행태	27
1. 흡연	28
2. 음주	34
3. 안전의식	36
4. 운동 및 신체활동	38
5. 식생활	42
6. 비만 및 체중조절	46
7. 구강건강	48
8. 정신건강	54
II. 예방접종	57
1. 연간 인플루엔자 예방접종률	58
III. 이환 및 의료이용	61
1. 만성·급성질환 및 사고중독 경험률	68
2. 연간 평균 혈압 측정횟수	62
3. 연간 평균 혈당 측정횟수	62
4. 주요 질환별 평생 의사진단 경험률 및 관리행태	64
5. 질환별 인지율	72
6. 의료이용	72
IV. 사고 및 중독(낙상)	75
1. 연간 낙상 경험률	76
2. 연간 사고중독 경험률	76



Community Health Survey

V. 및 삶의 질	79
1. 주관적 건강수준 인지율	80
2. 침상와병 경험률	80
3. 결근결석 경험률	80
4. 오늘의 건강상태	82
VI. 보건기관 이용	85
1. 보건기관 이용	86
2. 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염) 홍보 및 교육 경험률	88
VII. 사회 물리적 환경	91
1. 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율	92
2. 사회활동 참여율	92
VIII. 개인위생	95
1. 손 씻기 감염병 예방 인지율	96
2. 손 씻기 실천율	96

3부 통계표

I. 통계표	101
--------------	-----

제4부 부록

I. 개인조사표	227
II. 가구조사표	269
III. 2010-2013 순환조사지표	28
참고문헌	282
참여연구진	283

CONTENTS

< >

< 1> 2013년 지역사회건강조사 주요지표 결과	2
<표 2> 기관별 역할	3
<표 3> 동/읍·면별 표본지점 분포	5
<표 4> 2013년 지역사회건강조사 조사영역 및 항목	16
<표 5> 조사현황	17
<표 6> 가구당 조사인원 수	17
<표 7> 2013년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성	19
<표 8> 2013년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성	20
<표 9> 가구가중치 산출 예	22
<표 10> 개인가중치 산출 예	23
<표 11> 보정가중치 산출 예	23
<표 12> 교육수준분류	24
<표 13> 직업분류	24



Community Health Survey

< >

< 1> 2013년 건강행태 관련 주요지표 결과 비교	5	<그림 27> 격렬한 신체활동 실천율	9
<그림 2> 2013년 이환·의료이용, 사고·중독, 삶의 질 관련 주요지표 결과 비교	5	<그림 28> 중등도 신체활동 실천율	9
<그림 3> 2013년 건강행태 관련 주요지표 결과 비교	7	<그림 29> 중등도 이상 신체활동 실천율	9
<그림 4> 2013년 이환·의료이용, 사고·중독, 삶의 질 관련 주요지표의 우선순위	7	<그림 30> 걷기 실천율	14
<그림 5> 추진체계	2	<그림 31> 저염선택율(2013)	3
<그림 6> 수행체계	3	<그림 32> 저염선택율(연도비교)	3
<그림 7> 수행과정	4	<그림 33> 가공식품 선택 시 영양표시 이용률	45
<그림 8> 표본선정과정	4	<그림 34> 영양교육 및 상담수혜율	5
<그림 9> 1기(2010-2013년) 순환조사체계	5	<그림 35> 식품 안정성 확보율	5
<그림 10> 권역콜센터 운영체계	6	<그림 36> 비만율	7
<그림 11> 전화점검 절차	7	<그림 37> 주관적 비만인지율	7
<그림 12> 가중치 산출 과정	2	<그림 38> 체중조절 시도율	7
<그림 13> 현재흡연율	2	<그림 39> 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	49
<그림 14> 흡연시작연령	2	<그림 40> 저작불편 호소율(65세 이상)	9
<그림 15> 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량	9	<그림 41> 틀니 이용 행태(65세 이상)(2013) <그림 42> 틀니 이용 행태(65세 이상) (연도비교)	51
<그림 16> 흡연자의 금연시도율	1	<그림 43> 점심식사 후 칫솔질 실천율	3
<그림 17> 흡연자의 1개월 내 금연계획률	1	<그림 44> 구강검진 수진율	3
<그림 18> 금연캠페인 경험률	3	<그림 45> 연간 스케일링 경험률	3
<그림 19> 금연교육 경험률	3	<그림 46> 스트레스 인지율	5
<그림 20> 현재 흡연자의 금연교육 경험률	3	<그림 47> 우울감 경험률	5
<그림 21> 월간음주율	5	<그림 48> 연간 인플루엔자 예방접종률	9
<그림 22> 음주시작연령	5	<그림 49> 만성·급성질환 및 사고중독 경험률	63
<그림 23> 고위험음주율	5	<그림 50> 연간 평균 혈압 측정횟수	3
<그림 24> 운전 시 안전벨트 착용률	7	<그림 51> 연간 평균 혈당 측정횟수	3
<그림 25> 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	7	<그림 52> 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)	65
<그림 26> 연간 음주운전 경험률 (자동차 또는 오토바이)	37		

CONTENTS

< >

< 53> 고혈압 약물치료율(≥ 30)	5
<그림 54> 고혈압 관리교육 이수율(≥ 30)	5
<그림 55> 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥ 30)	67
<그림 56> 당뇨병 치료율(≥ 30)	71
<그림 57> 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)	7
<그림 58> 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥ 30)	69
<그림 59> 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥ 30)	69
<그림 60> 관절염 평생 의사진단 경험률(≥ 50)	71
<그림 61> 관절염 관리교육 이수율(≥ 50)	1
<그림 62> 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥ 30)	71
<그림 63> 대사증후군 인지율	3
<그림 64> 에이즈 인지율	3
<그림 65> 필요의료서비스 미치료율	3
<그림 66> 연간 낙상 경험률	7
<그림 67> 연간 사고중독 경험률	7
<그림 68> 양호한 주관적 건강수준 인지율	1
<그림 69> 침상와병 경험률	1
<그림 70> 결근결석 경험률	1
<그림 71> 오늘의 건강상태	3
<그림 72> 보건기관 이용률	7
<그림 73> 보건기관 이용 서비스 종류	7
<그림 74> 보건기관 서비스 만족도	7
<그림 75> 보건기관 고혈압 홍보 및 교육 경험률	89
<그림 76> 보건기관 당뇨병 홍보 및 교육 경험률	89
<그림 77> 보건기관 관절염 홍보 및 교육 경험률	89
<그림 78> 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율	93
<그림 79> 사회활동 참여율	3
<그림 80> 손 씻기 감염병 예방 인지율	7
<그림 81> 손 씻기 실천율	7



Community Health Survey

< >

< 표 14> 현재흡연율	12
<표 15> 흡연시작연령	13
<표 16> 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량 ...	4
<표 17> 흡연자의 금연시도율	6
<표 18> 흡연자의 1개월 내 금연계획률	6
<표 19> 현재 흡연자의 금연권고 경험률	7
<표 20> 금연클리닉·금연상담전화 인지율	8
<표 21> 현재 흡연자의 금연클리닉· 금연상담전화 이용률	109
<표 22> 가정실내 간접흡연 노출률	0
<표 23> 가정실내 간접흡연 노출시간	1
<표 24> 직장실내 간접흡연 노출률	2
<표 25> 직장실내 간접흡연 노출시간	3
<표 26> 공공장소 간접흡연 노출률	4
<표 27> 금연캠페인 경험률	5
<표 28> 금연교육 경험률	6
<표 29> 현재 흡연자의 금연교육 경험률	7
<표 30> 금연구역 인지율	8
<표 31> 금연구역 내 흡연 경험률	1
<표 32> 평생음주율	10
<표 33> 연간음주율	11
<표 34> 월간음주율	12
<표 35> 음주시작연령	13
<표 36> 고위험음주율	14
<표 37> 음주문제로 인한 상담경험률	3
<표 38> 음주시작동기	15
<표 39> 연간 음주자의 금주권고 경험률	2
<표 40> 운전 시 안전벨트 착용률	1
<표 41> 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 ...	2
<표 42> 연간 자동차 음주운전차량 동승률 ...	0

<표 43> 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이) 및 연간 자동차 음주운전 경험횟수	131
<표 44> 오토바이 및 자전거 헬멧 착용률 ...	21
<표 45> 격렬한 신체활동 실천율	3
<표 46> 중등도 신체활동 실천율	4
<표 47> 중등도 이상 신체활동 실천율	5
<표 48> 걷기 실천율	6
<표 49> 근력운동 실천율	7
<표 50> 유연성운동 실천빈도	8
<표 51> 주중(월~금) 여가시간에 앉아서 보내는 시간	139
<표 52> 주말(토, 일) 여가시간에 앉아서 보내는 시간	140
<표 53> 아침식사 섭취빈도 및 아침결식예방 인구비율	141
<표 54> 저염선택율	12
<표 55> 가공식품 선택시 영양표시 이용률 ...	30
<표 56> 영양교육 및 상담수혜율	4
<표 57> 식품 안정성 확보율	11
<표 58> 과일섭취율	16
<표 59> 생채소 섭취율	17
<표 60> 비만도 분포 및 비만율	18
<표 61> 주관적 비만인지율	19
<표 62> 체중조절 시도율	0
<표 63> 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	151
<표 64> 저작불편호소율 : 65세 이상	2
<표 65> 발음불편호소율 : 65세 이상	2
<표 66> 치아 결손 형태 : 65세 이상	3
<표 67> 틀니 이용 형태 : 65세 이상	3

CONTENTS

<

>

< 표 68> 주관적 틀니 필요 인지율 : 65세 이상	154
<표 69> 점심식사 후 칫솔질 실천율	5
<표 70> 구강검진 수진율	5
<표 71> 연간 스케일링 경험률	5
<표 72> 치실 및 치간솔 이용률	8
<표 73> 무자격자 치과시술률	9
<표 74> 치과진료 미치료율	9
<표 75> 치과진료 미치료자의 미치료 이유 ..	11
<표 76> 주관적 잇몸건강 인지율	1
<표 77> 하루 평균 수면시간	6
<표 78> 스트레스 인지율	11
<표 79> 우울감 경험률	15
<표 80> 자살생각률	16
<표 81> 자살시도율	17
<표 82> 정신상담률	18
<표 83> 인터넷, 게임(오락), 스마트폰 일상생활 지장 경험 빈도	169
<표 84> 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률 ...	170
<표 85> 연간 인플루엔자 예방접종률	1
<표 86> 만성·급성질환 및 사고중독 경험률 ...	21
<표 87> 만성·급성질환 및 사고중독 경험일수	173
<표 88> 연간 평균 혈압 및 혈당 측정횟수 ...	1
<표 89> 혈압, 혈당 및 총 콜레스테롤 인지율	175
<표 90> 고혈압 평생 의사진단 경험률	1
<표 91> 본인 인지 혈당 조절률	6
<표 92> 당뇨병 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율	177

<표 93> 본인 인지 혈당 조절률	7
<표 94> 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률...	8
<표 95> 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률...	8
<표 96> 심근경색증 평생 의사진단 경험률 ...	11
<표 97> 협심증 평생 의사진단 경험률	11
<표 98> 관절염 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율	180
<표 99> 골다공증 평생 의사진단 경험률 ...	11
<표 100> 천식 평생 의사진단 경험률	11
<표 101> 알레르기비염 평생 의사진단 경험률	181
<표 102> 아토피피부염 평생 의사진단 경험률	181
<표 103> 백내장 평생 의사진단 경험률 ...	21
<표 104> B형 간염 평생 의사진단 경험률 ...	21
<표 105> 우울증 평생 의사진단 경험률 ...	31
<표 106> 고혈압 약물치료율	1
<표 107> 고혈압 합병증검사 수진율	1
<표 108> 당뇨병 치료율	5
<표 109> 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 및 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율	185
<표 110> 고혈압 관리교육 장소 및 고혈압 관리교육 이수율	186
<표 111> 당뇨병 관리교육 장소 및 당뇨병 관리교육 이수율	186
<표 112> 관절염 관리교육 장소 및 관절염 관리교육 이수율	187
<표 113> 천식증상경험률 및 운동성 천식이환율	188



Community Health Survey


< >

< 표 114> 대사증후군 인지율	9
<표 115> 에이즈 인지율	9
<표 116> 에이즈에 대한 지식 정답률 및 긍정적 태도율	190
<표 117> 심뇌혈관질환 인지율	1
<표 118> 심뇌혈관질환 매체 경험률	1
<표 119> 심뇌혈관질환 예방관리수칙 인지율	192
<표 120> 심뇌혈관질환 예방관리수칙 매체 경험률	192
<표 121> 필요의료서비스 미치료를 및 필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료를	193
<표 122> 필요의료서비스 미치료 이유	4
<표 123> 연간 낙상 경험률	5
<표 124> 연간 낙상 건수율	5
<표 125> 장소별 낙상 분포	7
<표 126> 원인별 낙상 분포	8
<표 127> 낙상에 대한 두려움	9
<표 128> 연간 사고중독 경험률	2
<표 129> 연간 사고중독 건수율	2
<표 130> 양호한 주관적 건강수준 인지율	2
<표 131> 침상와병 경험률	3
<표 132> 침상와병일수	2
<표 133> 결근결석 경험률	5
<표 134> 결근결석일수	5
<표 135> 삶의 질 지수(EQ-5D Index)	8
<표 136> 오늘의 건강상태(EQ-VAS)	7

<표 137> 행복감지수	9
<표 138> 보건기관 이용률	21
<표 139> 최근 1년(365일) 동안 주로 이용한 보건기관	210
<표 140> 보건기관 이용 서비스 종류	2
<표 141> 보건기관 서비스 만족도	2
<표 142> 보건기관을 이용하게 되는 주된 이유	213
<표 143> 보건기관을 이용하지 않는 이유	4
<표 144> 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매) 홍보 및 교육 경험률	215
<표 145> 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율	216
<표 146> 사회적 연결망 : 친척(가족포함) ·	2
<표 147> 사회적 연결망 : 이웃	8
<표 148> 사회적 연결망 : 친구(이웃제외) ·	2
<표 149> 사회활동 참여율	21
<표 150> 손 씻기 감염병 예방 인지율	2
<표 151> 손 씻기 실천율	2
<표 152> 비누, 손 세정제 사용률	3
<표 153> 손 씻기 교육 및 홍보 경험률	2



Community Health Survey



요약

‘2013 울산광역시 울주군 지역사회건강조사’ 주요 지표결과의 변화추이와 ‘국민건강영양조사’ 결과와의 비교는 <표 1>과 같다.

< 표 1> 2013년 지역사회건강조사 주요지표 결과 (: %, 조율(표준오차))

	영역	산출지표	지역사회건강조사				국민건강영양조사	
			2010	2011	2012	2013	2011	2012
I.	흡연	현재흡연율	25.3(1.4)	24.3(1.4)	24.3(1.3)	21.9(1.2)	26.3(0.8)	25.0(0.8)
		남자 현재흡연율	47.6(2.6)	46.6(2.7)	45.4(2.5)	41.8(2.1)	46.8(1.3)	43.3(1.2)
		흡연자의 1개월 내 금연계획률	4.2(1.2)	3.9(1.2)	4.6(1.3)	6.8(1.8)	—*	—*
		흡연자의 금연시도율	22.7(3.3)	27.8(3.2)	18.1(2.8)	15.7(3.0)	—*	—*
		금연캠페인 경험률	84.3(1.3)	88.4(1.2)	66.4(1.8)	77.8(2.4)	—**	—**
	음주	월간음주율	56.4(2.0)	54.3(1.9)	50.2(1.6)	53.1(2.0)	59.2(0.9)	56.6(0.9)
		고위험음주율	13.6(1.7)	16.4(1.5)	15.0(1.8)	21.8(1.8)	17.6(0.8) ¹⁾	17.7(0.8)
	안전의식	운전 시 안전벨트 착용률	84.6(2.0)	88.3(1.5)	77.4(2.1)	85.9(1.3)	68.5(1.3) ²⁾	65.8(1.3)
		동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	80.3(2.1)	85.1(1.7)	76.7(1.6)	88.5(2.0)	61.2(1.0)	57.7(1.1)
	신체활동	중등도 이상 신체활동 실천율	21(1.5)	22.2(1.6)	21.8(1.6)	20.9(1.8)	19.2(0.8)	17.0(0.7)
		걷기 실천율	43.5(1.8)	41.7(2.1)	41.3(1.7)	50.4(3.6)	37.6(0.8)	38.7(1.0)
	비만 및 체중조절	비만율	22.2(1.1)	20.6(1.7)	23.7(1.4)	26.4(1.4)	—****	—****
		주관적 비만인지율	33.9(1.3)	32.1(1.8)	31.8(1.7)	31.5(1.8)	—**	—**
		체중조절 시도율	40.0(1.6)	51.9(2.0)	35.1(1.8)	58.0(2.2)	—**	—**
	구강건강	저작불편호소율(≥65)	55.6(3.0)	58.7(4.6)	48.6(5.4)	46.6(3.9)	47.5(1.5)	46.6(1.7)
		점심식사 후 칫솔질 실천율	55.6(1.9)	50.1(1.7)	57.7(1.8)	60.5(3.4)	—***	—***
	정신건강	스트레스 인지율	26.0(1.9)	21.4(1.4)	33.9(1.7)	21.8(2.4)	27.9(0.8)	27.0(0.7)
		우울감 경험률	7.0(1.1)	5.4(0.7)	3.8(0.8)	3.8(0.7)	13.4(0.6) ³⁾	12.9(0.5)
II. 예방접종		연간 인플루엔자 접종률	28.8(1.8)	30.2(1.9)	41.0(1.9)	37.4(1.7)	53.7(0.9)	33.5(1.0)
III. 이환 및 의료이용		고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)	15.5(1.1)	19.2(1.5)	17.4(1.1)	19.9(1.6)	—****	—****
		고혈압 약물치료율(≥30)	81.1(3.9)	86.7(2.7)	89.5(3.8)	84.1(3.6)	—****	—****
		고혈압 관리교육 이수율(≥30)	—****	16.0(2.8)	24.3(2.6)	33.6(5.0)	—****	—****
		당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)	5.8(0.8)	6.8(1.0)	8.0(0.8)	7.9(1.0)	—****	—****
		당뇨병 치료율(≥30)	72.8(5.8)	81.3(6.2)	81.2(5.3)	91.9(2.7)	—****	—****
		당뇨병 관리교육 이수율(≥30)	—****	24.4(3.9)	30.2(4.8)	28.3(5.4)	—****	—****
		당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)	60.7(6.7)	26.4(5.5)	39.6(5.8)	37.1(5.0)	—****	—****
		당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)	—*	29.5(5.0)	51.0(5.7)	31.0(4.8)	—****	—****

	영역	산출지표	지역사회건강조사				국민건강영양조사	
			2010	2011	2012	2013	2011	2012
		평생 의사진단 경험률(≥ 50)	16.3(1.6)	19.5(2.0)	11.7(1.5)	20.8(1.8)	-****	-****
		관절염 관리교육 이수율(≥ 50)	-*****	21.5(3.9)	34.4(4.8)	35.9(4.9)	-****	-****
		필요의료서비스 미치료율	-*	16.6(1.5)	8.7(1.1)	7.2(1.5)	18.7(0.7) ⁴⁾	16.7(0.7)
IV. 사고 및 중독		연간 사고중독 경험률	3.8(0.8)	7.0(0.9)	7.6(0.9)	4.5(1.0)	7.0(0.4) ⁵⁾	7.0(0.5)
		연간 낙상 경험률	-*****	13.7(1.2)	-*****	12.3(1.6)		-**
V. 삶의 질		양호한 주관적 건강수준 인지율	46.2(1.7)	48.0(2.0)	49.8(2.1)	51.0(3.2)	35.3(0.9) ⁶⁾	32.0(0.8)

-* : 다름, -** : 산출 안함, -*** : 문항 및 산출식 다름, -**** : 조사방법 다름, -***** : 지침 다름, -***** : 조사 안함

1) 고위험음주율(국민건강영양조사)

2) 운전자 안전벨트착용률(국민건강영양조사)

3) 우울증상경험률(국민건강영양조사)

4) 연간미치료율(병의원)(국민건강영양조사)

5) 연간손상경험률(국민건강영양조사)

6) 주관적건강인지율(국민건강영양조사)

우리 지역사회의 주요 건강이슈

1. 비교분석

건강행태 지표에 대하여 울산광역시 울주군의 표준화율을 전국 보건소의 표준화율 중앙값과 비교하였다. <그림 1>과 <그림 2>은 각각 건강행태와 이환의료이용 및 사고·중독 범주에 속하는 각 지표의 전국 중앙값을 1로 환산하였을 때 울산광역시 울주군의 상대적인 지표값을 표시한 그래프이다.


. 건강행태

- 흡연: 현재흡연율(0.85)은 전국 중앙값보다 약간 낮았다. 흡연자의 1개월내 금연계획율(1.98)과 현재 흡연자의 금연교육 경험률(2.25)은 상대적으로 높은 반면 금연캠페인 경험률은 전국 중앙값과 큰 차이를 보이지 않았다.
- 음주: 월간 음주율은 0.72로 전국 중앙값에 비해 다소 양호하게 나타났다. 고위험음주율은 1.05였다.
- 안전의식: 운전자의 안전벨트 착용률(1.14)과 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률(1.23)등의 안전의식 지표들은 전국 중앙값을 약간 상회하였다.
- 운동 및 신체활동: 격렬한 신체활동을 포함한 중등도 이상의 신체활동 실천율(0.99)은 전국 중앙값과 유사하였으며 걷기 실천율(1.31)은 전국 중앙값을 약간 상회하였다.


- 비만 및 체중조절: 비만율은 1.08, 주관적 비만인지를 0.86으로 나타냈다.
- 구강건강: 65세 이상 인구의 저작불편 호소율은 0.94, 점심식사 후 칫솔질 실천율은 1.01로 전국 중앙값과 비슷하였다.
- 정신건강: 스트레스 인지율(0.79)과 우울감 경험률(0.71) 모두 전국 중앙값보다 낮았다.
- 연간 인플루엔자 예방접종률은 1.00으로 전국 중앙값과 동일하였다.

나. 이환·의료이용, 사고·중독

- 이환의료이용: 30세 이상의 고혈압 평생 의사진단 경험률은 0.95의 상대값으로 전국 중앙값과 비슷하였다. 30세 이상의 고혈압 약물치료율(0.96)과 고혈압 관리교육 이수율의 상대값(1.39)은 전국 중앙값 수준을 상회하였다. 30세 이상의 당뇨병 평생 의사진단 경험률(0.99)과 당뇨병치료율(1.04)은 전국 수준과 크게 차이 나지 않았다. 당뇨병 안질환 합병증 검사 수진율은 1.28 당뇨병 신장질환 합병증 수진율은 1.21로 높았다. 보건기관 서비스 만족도는 1.00으로 나타났다.
- 사고·중독: 연간 사고·중독 경험률은 전국 중앙값 대비 0.58로 낮았다.



< 1> 2013년 건강행태 관련 주요지표 결과 비교



<그림 2> 2013년 이환의료이용, 사고·중독, 삶의 질 관련 주요지표 결과 비교

2. 우선순위

울주군의 지역사회건강조사 지표 결과 추이 및 전국 중앙값과의 상대적인 비교를 통해 미국 메릴랜드 주의 보건사업 우선순위 결정방법을 이용하여 지역 보건사업의 우선순위를 파악하였다.

2013년 울산광역시 울주군의 지표(표준화율)와 이 지표들의 전국 보건소 중앙값(표준화율)을 비교하여 울산광역시 울주군이 좋음(좋음), 울산광역시 울주군과 전국 중앙값에 차이가 없음(같음), 울산광역시 울주군이 나쁨(나쁨)으로 구분하였다. 두 지표값의 차이가 울주군 표준화율의 표준오차를 넘는 경우에만 좋음과 나쁨으로 정의하였고, 이를 넘지 않는 경우에는 같음으로 분류하였다. 또한 울산광역시 울주군과 전국 중앙값의 2012-2013년 지표 변화추이를 비교하여 울산광역시 울주군이 좋음(좋음), 울산광역시 울주군과 전국 중앙값에 차이가 없음(같음), 울산광역시 울주군이 나쁨(나쁨)으로 구분하였다. 두 지표값의 변화 추이 방향이 같은 경우 울주군 표준화율 대 전국 중앙값의 증감률의 비가 2를 초과하거나 0.5 미만인 경우에만 좋음과 나쁨으로 분류하였고, 0.5이상, 2이하인 경우에는 같음으로 정의하였다.


이 두 가지 기준을 이용하여, 건강행태<그림 3>, 그리고 이환·의료이용, 사고·중독, 삶의 질<그림 4> 범주에 대해 각각 황금다이아몬드 상자형식으로 제시하였다. 황금다이아몬드 상자의 최상단 영역은 보건사업의 최우선순위에 해당하는 지표들을 나타낸다. 2013년 조사결과 울주군의 표준화율이 전국 중앙값보다 나쁘고 울주군 표준화율의 2012-2013년 증감률이 전국 중앙값의 증감률보다 나쁜 경우가 이에 해당된다. 최우선순위 영역 하단은 2순위 영역으로서 전국 중앙값과 비교하여 변화추이가 나쁘고 2013년 조사결과가 비슷한 지표(우측)들이나, 변화추이는 비슷하나 2013년 조사결과가 나쁜 지표들(좌측)을 나타낸다.

. 건강행태


울주군의 건강행태 관련 지표 중에서 1순위에 해당하는 지표는 중등도 신체활동 실천율, 가공식품 선택시 영양표시 이용률, 비만율 등이었다. 2순위에 해당하는 지표 중 전국 중앙값과 비교하여 변화추이가 나쁘고 2013년 조사결과가 비슷한 지표로는 고위험 음주율, 중등도 이상 신체활동 실천율, 영양교육 및 상담수혜율, 연간 인플루엔자 예방접종률 등이 포함되었다. 한편 전국 중앙값과 비교하여 변화추이는 같다.

나. 이환·의료이용, 사고·중독

우선순위 1순위에 해당하는 이환·의료이용, 사고·중독 범주의 지표로는 연간 평균 혈압측정횟수, 고혈압 약물치료율(30세 이상)이 포함되었다. 2순위에 해당하는 지표 중 전국 중앙값과 비교하여 변화추이가 나쁘고 2013년 조사결과가 비슷한 지표에는 고혈압 평생 의사진단 경험률(30세 이상), 관절염 평생 의사진단 경험률(50세 이상), 보건기관 서비스 만족도가 있다. 반면 변화추이는 비슷하나 2013년 조사결과가 나쁜 지표로는 당뇨병 관리교육 이수율(30세 이상)이 있다.



< 3> 2013년 건강행태 관련 주요지표의 우선순위




<그림 4> 2013년 이환의료이용, 사고·중독, 삶의 질 관련 주요지표의 우선순위

1부 조사체계

Community Health Survey

I.

II. 통계 추정방법





1부 >> 조사체계

I.

1. 및 목적
2. 조사체계
3. 표본설계
4. 조사방법
5. 자료관리
6. 조사현황

I. 조사개요

1. 및 목적

나. 추진배경

보건사업의 성공적인 수행을 위해서는 지역주민의 건강상태를 객관적으로 보여주는 통계자료에 근거하여 정확한 정책 방향을 설계하는 것이 중요하다. 1995년 지역보건법이 제정되면서 지방자치단체의 보건사업계획 수립이 의무화되었으나, 이를 뒷받침할 수 있는 지역 통계자료가 부재한 실정이었다. 일부 지방자치단체에서 자체적으로 지역주민을 대상으로 한 건강조사를 수행하였으나, 조사지표 및 수행체계의 표준화가 이루어지지 않아 지역 간 비교가 불가능했다. 이러한 상황에서 지역사회건강조사는 증가하는 지역단위 보건통계에 대한 수요를 충족시키는 동시에 검증된 통계자료 생산하기 위해 추진되었다.

나. 추진목적

지역사회건강조사는 「지역보건법」 제4조(지역보건의료계획의 내용) 및 동법시행령 제4조(지역보건의료계획의 수립방법 등), 제5조(지역보건의료계획 수립시기 등)에 의거하여 지역보건의료계획 수립 및 평가를 위한 지역 건강통계를 생산하는 것이 목적이다. 나아가 이를 바탕으로 근거 중심의 보건사업 수행의 기반을 마련하고 지역 간 비교가 가능하도록 조사지표 및 수행체계를 표준화하여 지방자치단체 보건사업 통합평가지표를 생산하는데 목적을 두고 있다.


2. 조사체계

가. 추진체계

안정적이고 전문적인 사업추진 및 지원체계 확보를 위해 운영위원회를 구성, 산하에 전문분과위원회(교육 및 홍보, 표본설계, 질 관리 및 평가, 지표표준화, 자료 활용)를 두어 세부 분야에 대한 자문을 제공하였다.

35개 책임대학교로 구성된 책임대학교위원회에서는 총괄대표대학교(1개)를 지정하여, 교육·홍보 등 공통적인 사업내용을 수행하였으며, 각 책임대학교는 조사계획 수립, 조사수행, 자료 분석, 건강통계집 작성 등을 담당하였다.

질병관리본부는 조사기획 총괄을 담당하는 관리사무국으로서 지표개발, 시·군·구 보건소 및 책임대학교의 조사수행 및 자료 분석 지원, 조사수행 기관 및 조사원 질관리를 담당하였다.




< 5> 추진체계

· 수행체계

질병관리본부는 지역사회건강조사 사업기본계획을 수립하여 시·도 및 시·군·구 보건소에 배포하고, 표본설계, 조사문항 및 지침표준화, 교육 및 홍보물 개발 등의 사업수행과 관련한 기술 지원 역할을 담당하였다. 사업 관련 주요 현안에 대한 검토 및 심의는 전국의 시·도 및 책임대학교 위원회, 전문분과위원회로 구성된 운영위원회를 통해 이루어졌다.

시·도는 권역대표대학교를 지정하여 지역사회건강조사 수행을 위한 지역 거점센터를 운영하고, 중앙정부로부터 사업예산을 받아 시·군·구 보건소로 배정하는 역할을 담당하여 수행하였다. 시·군·구 보건소는 책임대학교와 협약을 체결하고, 조사수행 관련한 행정지원을 하였다.




< 6> 수행체계

<표 2> 기관별 역할

관		역 할
		◦ 사업기본계획 수립 ◦ 지역사회건강조사 운영위원회 및 전문분과위원회 운영 ◦ 조사수행체계 및 지표 표준화 ◦ 전국 시·군·구 표본설계 총괄 수행 ◦ 조사수행 및 조사문항지침 작성 ◦ 교육자료 및 홍보물 개발 ◦ 전국자료 분석 및 비교 통계집 발간
운영위원회		◦ 사업 관련 주요현안 검토 및 심의 ◦ 표본설계, 지표, 질관리, 교육 및 홍보, 자료활용관련 기술 자문
시·도		◦ 시·군·구 보건소 사업예산 배정 ◦ 지역사회건강조사 운영위원회 참여 ◦ 조사수행 관련 행정 지원
시·군·구 보건소		◦ 책임대학교와 협약체결 및 사업비 지급 ◦ 조사수행 관련 행정지원(표본지점 확인, 가구선정통지서 발송, 홍보) ◦ 시·군·구 건강통계집 검독
책임 대학교	총괄 대표대학교	◦ 사업 교육/홍보/대외협력 지원
	권역 대표대학교	◦ 조사현장 지원 권역콜센터 운영
	소권역 대표대학교	◦ 사업계획서 시·군·구 보건소 제출 ◦ 조사원 선발 및 교육 수행 ◦ 조사수행 지원(가구대체, 가구수 조정) ◦ 조사원 및 조사정도 관리 ◦ 자료 분석 및 보건통계 생산

다. 수행과정

질병관리본부에서 조사표, 지침서, 조사원 교육 자료 개발 및 표본추출 완료 후, 시·군·구 보건소 및 책임대학교에서는 조사원 선발하여 교육을 진행하였다. 이후 표본지점에 대한 사전조사를 통하여 조사가능 여부를 확인하고, 가구방문 1주일 전 가구 선정통지서를 발송하였다. 조사원은 1주일 후 조사 대상 가구를 방문하여 면접조사를 실시하고 조사 완료 자료를 중앙서버로 전송하였다. 모든 표본지점에 대한 조사를 완료한 후 중앙의 자료 확인 절차를 거쳐 책임대학교에서는 자료를 분석하고 당해 연도 시·군·구 건강통계집을 발간하였다.



3.

. 모집단

(1) 모집단은 2013년 7월 기준으로 시·군·구에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.

(2) 조사 모집단은 시·군·구의 동·읍·면 내 통·반·리의 표본지점을 1차 추출단위로 하며, 선정된 통·반·리의 표본지점 내 주거용 주택(아파트, 일반주택)에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.

나. 표본추출

(1) 1차 추출(표본지점)

통·반·리 내 주택유형별 가구 수를 기준으로 주민등록인구자료와 주택자료를 연계하여 작성된 표본추출틀에서 각 동·읍·면 별로 할당된 표본지점을 추출하는데, 이때 통·반·리를 명칭기준으로 정렬한 후 가구 수 크기를 고려하여 추출확률이 비례하도록 추출하였다.

(2) 2차 추출(표본가구)

표본가구는 표본지점으로 선정된 통·반·리의 가구 수를 파악하여 계통추출법으로 선정하였다. 이 때 통·반·리의 규모가 커서 2개 이상의 표본지점이 할당된 경우 표본오차를 최소화하기 위해 표본가구가 가능한 고르게 분포하도록 하였다. 최종적으로 표본지점별로 평균 5개 가구를 표본가구로 선정하였다.

정의	주민등록기준 만 19세 이상 성인(1994.7.31.)		
분석 및 층화	동/읍·면, 주택유형별 층화		
표본 배분	표본크기 결정	보건소별 평균 900명, 목표오차 ±3%	
	동/읍·면 할당	동/읍·면	동/읍·면 최소 1개 이상 표본지점 할당
표본 추출	표본지점 추출	통·반·리	확률비례계통추출(1차 추출)
	표본가구 추출		계통추출(2차 추출)

<그림 8> 표본선정과정

< 3> 동/읍·면별 표본지점 분포

/읍·면	전체 가구 수			표본지점 수		
	아파트	일반	합계	아파트	일반	합계
·면지역	31,311	29,544	60,855	20	45	65
두동면	1	1,213	1,214	0	2	2
두서면	0	1,356	1,356	0	2	2
범서읍	13,808	2,361	16,169	4	4	8
삼남면	2,906	2,460	5,366	3	4	7
삼동면	0	731	731	0	1	1
상북면	1,099	2,131	3,230	2	3	5
서생면	227	2,613	2,840	0	4	4
연양읍	4,053	4,415	8,468	5	7	12
온산읍	2,487	4,909	7,396	2	7	9
온양읍	3,135	2,770	5,905	1	4	5
웅촌면	1,174	2,047	3,221	1	3	4
청량면	2,421	2,538	4,959	2	4	6
합계	31,311	29,544	60,855	20	45	65

조사항목을 1년, 2년, 4년 주기로 구분하여 조사한다.

제1기 순환조사에서는 모든 시·군·구에서 동일한 조사문항으로 조사를 실시하여 전국공통지표를 생산하며, 연도주기별 조사항목의 비율은 순서대로 70%, 20%, 10%순이다.

2013년 지역사회건강조사에서는 손 씻기 관련 문항으로 구성된 개인위생 영역이 4년 주기 문항으로 새롭게 추가되었다.

	주기	제1기(2010-2013년) 순환조사			
		2010	2011	2012	2013
전국 공통 지표	1년				
	2년				
	4년				

<그림 9> 1기(2010-2013년) 순환조사체계

4.

. 조사대상

표본가구에 거주하는 만 19세 이상의 성인(1994년 7월 31일 이전 출생자)이며, 조사단위는 가구(가구조사) 및 가구원(개인조사)이다.

나. 조사기간

조사는 2013년 8월 16일부터 10월 31일까지 이루어졌다.

다. 조사내용

(1) 순환조사

지역사회건강조사에서는 2010년부터 2013년까지 4년을 하나의 조사주기 설정하고 지표의 중요도와 활용성, 표본의 크기 등을 고려하여 각각의

(2) 조사내용

지역사회건강조사의 구성단위는 가구조사와 개인조사이다. 가구조사에서는 표본가구 당 만 19세 이상 성인 1인에게 세대유형, 주택유형, 연간 총 가구소득 등을 조사하고, 개인조사는 가구원 모두에게 건강행태(흡연, 음주, 안전의식, 운동 및 신체활동 등), 예방접종, 이환, 의료이용, 손상, 활동제한 및 삶의 질, 보건기관 이용, 사회 물리적 환경, 개인위생, 교육 및 경제활동을 조사하였다.

2013년 지역사회건강조사 조사표는 18개 영역, 총 258개 문항으로 구성되었으며 이 문항으로부터 179개의 지표를 산출하였다.

2013년 지역사회건강조사 조사영역 및 항목은 다음과 같다.

< 4> 2013년 지역사회건강조사 조사영역 및 항목

	조사항목
	세대 유형, 기초생활수급자 여부, 주택유형, 가구 연간소득, 치매환자 동거여부
건강행태	흡연, 음주, 안전의식, 운동 및 신체활동, 식생활 및 영양, 비만 및 체중조절, 구강건강, 정신건강
예방접종	인플루엔자 예방 접종여부
이환	만성·급성질환 및 사고중독 여부/일수, 평생의사 진단 여부, 현재치료 여부, 혈압·혈당·총콜레스테롤 수치 인지 여부, 연간 평균 혈압/혈당 측정 측정 횟수, 고혈압·당뇨병·이상지질혈증 치료방법 및 약물 복용 여부/횟수, 고혈압·당뇨병·관절염 증상 관리방법 교육장소, 골다공증 골절부위, 평상시·운동성 천식여부 및 악화여부, 대사증후군 및 에이즈 인지 여부, 에이즈 지식 및 태도
의료이용	필요의료서비스 미수진 여부 및 사유
사고 및 중독	최근 1년간 손상 및 낙상 경험 여부
활동제한 및 삶의 질	건강수준, 외병여부 및 일수, 결근·결석여부 및 일수, EQ-5D, EQ-VAS
보건기관 이용	이용한 보건기관 및 서비스의 종류, 보건기관을 이용한 이유/이용하지 않는 이유, 보건기관의 서비스에 대한 만족도, 고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매에 대한 보건기관 홍보 경험 여부
개인위생	손 씻기 감염병 예방 인지, 상황별 손 씻기(외출 후, 식사 전, 화장실 다녀온 후), 비누 또는 손 세정제 사용, 손 씻기 교육 및 홍보 경험
교육 및 경제활동	경제활동 여부, 일의 종류, 직업분류, 종사상 지위, 최종학력, 졸업 여부, 민간의료보험 가입 여부, 결혼 여부, 현재 혼인상태, 광역 시·도 거주기간, 시·군·구 거주기간

조사방법


조사원이 표본가구를 방문하여 노트북에 탑재된 전자조사표(Computer Assisted Personal Interviewing)를 이용하여 조사대상자와 1:1 면접으로 조사하는 방식으로 수행한다.

5.

가. 권역콜센터 운영

2013년 지역사회건강조사에서는 조사원에게 표준화된 조사수행 및 조사문항지침을 전달하고자 전국 19개 지역에 권역콜센터를 설치하여 운영하였다.


권역콜센터에서는 표본가구 및 가구원 선정, 가구 대체, 조사문항, 노트북 관련 질의사항을 처리하고, 담당자는 질의사항 및 조치내역을 질병보건통합관리 시스템에 일단위로 등록하여 질병관리본부, CAPI 시스템 및 전산장비대여업체 담당자들이 실시간으로 점검하여 조치하였다.



<그림 10> 권역콜센터 운영체계

· 자료검증

2013 지역사회건강조사에서는 조사자료 검증 및 조사원 질 관리를 위해 조사완료자 중 10%를 무작위로 추출하여 제3기관을 통해 전화점검을 실시하였다. 전화점검은 조사완료 후 3-4일 이내 실시하였으며, 책임대학교에서 전화점검 결과에 대해 확인 후 최종적으로 조사자료의 사용여부를 결정하였다.



< 11 > 전화점검 절차

6.

가. 조사현황

조사현황은 <표 5>와 같다. 총 조사가구 수는 489가구였고, 조사완료자 수는 918명이었다. 가구당 평균 1.9명이 조사되었다.

<표 5> 조사현황

읍·면	조사가구 수			조사완료자 수(명)		
	아파트	일반	합계	아파트	일반	합계
·면지역	234	255	489	445	473	918
두동면	0	14	14	0	26	26
두서면	0	14	14	0	24	24
범서읍	100	24	124	192	43	235
삼남면	20	24	44	42	47	89
삼동면	0	5	5	0	8	8
상북면	12	15	27	25	27	52
서생면	0	20	20	0	41	41
언양읍	31	35	66	58	70	128
온산읍	20	41	61	35	74	109
온양읍	29	26	55	51	44	95
웅촌면	5	15	20	6	29	35
청량면	17	22	39	36	40	76
합계	234	255	489	445	473	918

<표 6> 가구당 조사인원 수

	아파트	일반	계
읍·면지역	1.9	1.9	1.9
계	1.9	1.9	1.9

. 조사가구 및 인구 특성

2013 지역사회건강조사 대상자의 가구원수는 2명인 경우가 가장 많았고 32.7%, 평균은 2.7명이었다. 조사자의 주거유형은 단독주택이 44.6%, 아파트가 44.0%의 순이었으며, 월 가구소득은 100만원 미만이 28.2%로 가장 많았고, 다음이 400만원이상이 27.6%의 순이었다.

성별분포는 남자가 42.8%, 여자가 57.2%이었다. 연령은 40대가 22.7%로 가장 높았고, 다음이 50대 20.6%의 순이었다. 대상자의 평균연령은 52.7세였다. 결혼은 유배우가 67.5%이고, 교육수준은 고등학교졸업이 39.8%로 가장 많았고, 다음이 대학교 이상 24.4% 순이었다.

< 7> 2013년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성

(: 명, %)

가구특성(N=489)		
	N	(%)
1명	97	19.8
2명	160	32.7
3명	95	19.4
4명	101	20.7
5명	26	5.3
6명	5	1.0
7명 이상	5	1.0
평균(명)	2.7	.
세대유형		
1세대	231	47.2
2세대	228	46.6
3세대	30	6.1
기초생활수급자 여부		
현재 수급자	14	2.9
과거 수급자	1	0.2
미수급자	474	96.9
주거형태		
단독주택	218	44.6
아파트	215	44.0
연립주택	18	3.7
다세대주택	25	5.1
영업용 건물 내 주택	9	1.8
기타	4	0.8
월 가구소득		
100만원미만	137	28.2
100-200만원미만	80	16.5
200-300만원미만	59	12.2
300-400만원미만	75	15.5
400만원이상	134	27.6
치매환자 동거가구	6	1.2
거주유형		
읍면	489	100.0

< 8 > 2013년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성

(: 명, %)

인구특성(N=918)		
	N	(%)
남자	393	42.8
여자	525	57.2
연령		
19-29	78	8.5
30-39	128	13.9
40-49	208	22.7
50-59	189	20.6
60-69	128	13.9
70이상	187	20.4
평균	52.7	
결혼상태		
미혼	111	12.1
유배우	620	67.5
사별, 이혼, 별거	187	20.4
교육수준		
무학	114	12.4
초등학교	134	14.6
중학교	81	8.8
고등학교	365	39.8
대학교이상	224	24.4
직업		
전문행정관리	104	11.3
사무직	78	8.5
판매서비스직	112	12.2
농어업	70	7.6
기능단순노무직	157	17.1
기타 ²⁾	396	43.1

1) : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

2) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직



1부 >> 조사체계

Ⅱ. 추정방법

1. 사용
2. 자료처리
3. 분산추정

II. 통계 추정방법

1. 사용

. 소개

2013 지역사회건강조사는 표본설계를 통하여 추출한 표본을 조사하여 설계 구조를 바탕으로 가중치를 부여함으로써 모집단의 건강수준 등을 추정하였다.

나. 가중치 산출 과정

가중치는 가구별 분석을 위한 가구가중치와 개인별 분석을 위한 개인가중치로 분류된다. 가구가중치는 가구추출률과 조사적격 가구율을 반영하였고, 개인가중치는 가구가중치에 개인 응답률을 반영하였다. 추정에 쓰이는 보정가중치는 개인가중치를 성별, 연령별 인구구조(2013년 7월 주민등록 인구)와 같도록 보정하여 산출하였다.

벤치마킹 가중치		
	→ 개인가중치 →	보정가중치
· 가구추출률 · 조사적격가구율 · 주택유형별 가구 비율	· 개인 응답률	· 성별·연령별 인구보정 - 성별 : 남, 여 - 연령별 : 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+ - 주민등록인구 기준 (2013.07)

< 12> 가중치 산출 과정

(1) 가구가중치

- 표본설계의 표본추출과정을 고려한 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율을 반영한 가중치

$$W_{hi} = \frac{M_{hi}}{n_{hi}} = \frac{e_{hi} \cdot N_{hi}}{n_{hi}}$$

- i : h 동/읍·면 i 주택유형별 가구 수
- M_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 적격가구 수
- n_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사가가구 수
- e_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사적격 가구율

<표 9> 가구가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①②의 가구 수(③)	(2,620)
①②의 조사된 가구 수(④)	(7)
①②의 조사접촉 가구 수(⑤)	(9)
①②의 조사적격 가구 수(⑥)	(8)
가구가중치(⑦)=③÷④×⑥÷⑤	(332.698=2620/7×8/9)
전체 가구가중치 합(⑧)	(8569.456)
전체 ②의 가구 수 합(⑨)	(10,356)
가구가중치 보정(⑩)=⑦×(⑨/⑧)	(402.0583=332.698×10,356/ 8569.456)

(2) 개인가중치

- 가구가중치에 개인 응답률을 반영한 가중치

$$W_{hjk} = W_{hjk} \times \frac{P_{hjk}}{p_{hjk}}$$

- h : 읍·면/동, j : 표본지점
- k : 가구, l : 가구원
- P_{hjk} : 가구내 만 19세 이상 가구원수
- p_{hjk} : 가구내 만 19세 이상 조사 가구원수

< 표 10 > 개인가중치 산출 예

	값
1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①②의 가구가중치(③)	(402.0583)
만 19세 이상 가구원수(④)	(4)
만 19세 이상 조사 가구원수(⑤)	(3)
개인가중치(⑥=③×④/⑤)	(536.0777=402.0583×4/3)

(3) 보정가중치

- 2013 7월 주민등록인구 기준으로 성별, 연령별 인구구조를 보정한 가중치

$$W'_{ijkl} = BF_d \cdot W_{ijkl}$$

$$BF_d = \frac{d(\text{성별} \cdot \text{연령대별}) \text{ 주민등록인구수}}{\sum_h \sum_i \sum_{jkl} W_{ijkl} I_{d \equiv \text{성별} \cdot \text{연령대별}}}$$

< 표 11 > 보정가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①②의 개인가중치(③)	(536.0777)
주민등록인구(④)	(14,693)
성·연령별 개인가중치 합(⑤)	(12,157.23)
성·연령별 보정비(⑥=④/⑤)	(1.208=14,693/12,157.23)
보정가중치(⑦=③×⑥)	(647.89=536.0777×1.208)

(4) 가중치의 이상치 제거

특정 조사대상자의 개인가중치가 다른 조사대상자의 개인가중치보다 월등히 클 경우, 해당 조사대상자의 응답값에 의해 조사결과에 바이어스(bias, 편향성)가 생길 수 있으므로 보정가중치의 이상치를 Raking Ratio 방법으로 제거하여 재보정 하였다.

W'_g) $3 \times IQR$ 보다 큰 가중치는 이상치로 정의하였으며, $Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 로 변경하였다.

$$- IQR: Q_3(W') - Q_1(W')$$

- $Q_1(W')$: 가중치 중 1사분위수

- $Q_3(W')$: 가중치 중 3사분위수

2.

. 무응답처리

무응답은 대체하지 않았으며 지표 산출 시 제외하였다. 무응답은 개체 무응답과 항목 무응답으로 구분한다.

개체 무응답은 조사에 참여하지 않음으로써 모든 문항에 대해 발생한 결측치를 의미하고, 항목 무응답은 조사에 참여한 대상자가 일부항목에 응답하지 않아 발생한 결측치이다.

나. 사회경제적 특성분류

(1) 연령

연령은 2013년 8월 1일 기준으로 만 연령을 정의하였다. 연령분류는 10세 단위로 “19-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60-69세, 70세 이상”으로 분류하였고, 생애주기별로는 “19-64세, 65세 이상”으로 분류하였다.

(2) 교육수준

교육수준은 <교육 및 경제활동> 영역에서 교육 정도와 졸업여부 2개 문항으로 조사하고 있으며 최종 교육수준은 두 문항을 조합하여 “무학, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 이상”으로 구분하였다. 졸업여부가 ‘졸업’인 경우만 해당 교육수준을 의미하며 졸업여부가 ‘수료, 중퇴, 재학/휴학’인 경우에는 이전 정도의 교육수준으로 분류하였다.

< 표 12 > 교육수준분류

	졸업여부	분류
	-	무학
서당/한학	-	
초등학교	졸업	초등학교
중학교	졸업	중학교
고등학교	졸업	고등학교
2년/3년제 대학	졸업	대학교 이상
4년제 대학	졸업	
대학원 이상	전체	

(3) 직업

통계청 한국표준직업분류(KSCO, 제6차 개정)의 대분류 직업군에서 유사한 직업분류를 묶어서 6개 직업군으로 분류하였다.

< 표 13 > 직업분류

제6차 한국표준직업분류	직업분류 재구분
관리자	전문행정관리
전문가 및 관련 종사자	
사무 종사자	사무직
서비스 종사자	판매·서비스직
판매 종사자	
농업, 임업 및 어업숙련 종사자	농림어업
기능원 및 관련 기능 종사자	기능단순노무직
장치, 기계조작 및 조립 종사자	
단순노무 종사자	
군인	기타
학생	
주부	
무직	

(4) 월가구소득

소득수준은 <가구조사> 영역에서 기준기간(연/월)과 소득액으로 조사하였다. 기준기간이 ‘연’인 경우 월단위로 환산 후 “100만원 미만, 100-200만원 미만, 200-300만원 미만, 300-400만원 미만, 400만원 이상”의 5개 그룹으로 분류하였다.

(5) 거주유형

거주유형은 “동과 읍·면”으로 구분하였다.

3.

지역사회건강조사에서는 모집단의 특성을 추정하기 위해 가중치를 적용한 표본가중평균을 제시하였다.

표본조사로 모집단의 특성을 추정할 때 일반적으로 표본오차(sampling error) 및 비표본오차(non-sampling error)가 수반된다. 표본오차는 표본이 모집단의 특성과 어긋나는 정도를 나타내며, 비표본오차는 표본추출과정을 제외한 자료수집 과정이나 분석 과정에서 발생하는 오류를 말한다. 표준오차(standard error)로 표현되는 표본오차는 추정치의 신뢰도에 대한 척도가 되며 분산추정에 의해 측정할 수 있다. 울산광역시 울주군 지역사회건강조사는 SAS 9.3을 활용하여 분산을 추정하였다.

• 표본가중평균

$$\frac{\sum_h \sum_j \sum_k \sum_l W_{h j k l} y_{h j k l}}{W_{\dots}}$$

- h : 동/읍·면, j : 표본지점

- k : 가구, l : 가구원

- $W_{\dots} = \sum_{h=1} \sum_{j=1} \sum_{k=1} \sum_{l=1} W_{h j k l}$: 가중치 계

- $y_{h j k l}$: 해당 문항의 응답값

• 표본오차

$$E(Y) = \sum_{j=1}^n \frac{n_{hj}(1-f_{hj})}{n_{hj}-1} \sum_{k=1}^{n_j} (e_{hjk} - e_{hj})^2$$

$$\text{여기서 } e_{hjk} = \frac{\sum_{l=1} W_{h j k l} (y_{h j k l} - \hat{\bar{Y}})}{W_{\dots}} \text{ 이고,}$$

$$e_{hj.} = (\sum_{k=1} e_{hjk}) / n_{hj} \text{ 이다.}$$


• 변동계수

$$cv(Y) = \frac{SE(\hat{\bar{Y}})}{\hat{\bar{Y}}}$$

2부 주요통계결과

Community Health Survey

- I.
- II. 예방접종
- III. 이환 및 의료이용
- IV. 사고 및 중독
- V. 활동제한 및 삶의 질
- VI. 보건기관 이용
- VII. 사회 물리적 환경
- VIII. 개인위생





2부» 주요통계결과

I.

- 1.
2. 음주
3. 안전의식
4. 운동 및 신체활동
5. 식생활
6. 비만 및 체중조절
7. 구강건강
8. 정신건강

I. 건강행태

1.

. 현재흡연율

- 5갑(100개비)이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 비율(%)로 정의한다.

5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자 (“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 전체 현재흡연율은 21.9%이며 남자는 41.8%, 여자는 1.0%로 조사되었다. 연령별로는 50대의 현재흡연율이 30.0%로 가장 높았으며 40대가 27.3%, 30대가 25.6%로 그 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도에 23.7%보다 3.1%p 감소하였다. 최근 5개년 간의 현재흡연율은 증감을 반복하였다. 울산광역시의 현재흡연율 23.1%보다 낮았다.

나. 흡연시작연령

- 처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이로 정의한다.

처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이의 총 합
평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자 수


- 흡연시작연령은 21.2세로 나타났고, 성별로 남자는 21.0세로 조사되었다. 표준화율을 이용해 5개년간의 흡연시작 연령 비교에서 큰 변동을 보이지 않았으며 울산광역시 전체의 흡연시작연령과 크게 차이하지 않았다.

다. 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량


- 평생 담배 5갑(100개비)이상 흡연한 사람으로서 매일 흡연하는 사람의 하루 평균 흡연량으로 정의한다.

평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 매일 흡연자의 하루 평균 흡연개비 수의 총 합
평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일 흡연자 수


- 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량은 15.7개비, 남자에서도 15.7개비로 나타났다. 연령별로는 50대 매일 흡연자의 흡연량이 가장 많았고, 40대, 30대, 60대 순이었다.



< 13> 현재흡연율



<그림 14> 흡연시작연령



<그림 15> 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량

. 금연

(1) 흡연자의 금연시도율

- 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 중 최근 1년(365일) 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{1\text{년}(365\text{일})\text{ 동안 }24\text{시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수} \times 100}{\text{현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수}}$$


- 전체 흡연자의 금연시도율은 15.7%, 남자 흡연자의 금연시도율은 16%로 나타났다. 연령군별로는 30대가 20.7%로 가장 높았으며 40대가 14.1%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 울주군의 금연시도율은 20.5%로 울산광역시 전체의 28.4% 보다 낮았으며 전년의 금연시도율 19.4%보다 높았다.

(2) 흡연자의 1개월 내 금연계획률


- 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 중 1개월(30일) 내 금연계획이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 중 1개월}(30\text{일})\text{ 내 금연계획이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수}}$$

- 흡연자의 1개월 내 금연계획률은 2013년 전체 6.8%였으며 남자에서는 7.0%로 나타났다. 연령별로는 60대에서 17.4%로 가장 높았다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도 금연계획률 5.0%보다 5.7%p 증가했으며 울산광역시 전체의 6.8%보다 높게 나타났다.



< 16> 흡연자의 금연시도율



<그림 17> 흡연자의 1개월 내 금연계획률

(3) 금연캠페인 경험률

- 1년(365일) 동안 금연에 대한 공익 광고(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

1년(365일) 동안 금연에 대한 공익 광고(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적이 있다고 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 2013년 전체 금연캠페인 경험률은 77.8%이며 성별로는 남자에서 79.2%, 여자에서 76.4%로 나타났다. 연령별로는 20대에서 91.2%로 가장 높았고 40대와 30대가 그 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 울주군의 금연캠페인 경험률은 전년도 67.7%에서 12.1%p 증가하였으며 울산광역시 전체의 83.5%보다 낮았다.

(4) 금연교육 경험률


- 최근 1년(365일) 동안 흡연예방 및 금연교육을 받은 경험이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 전체 금연교육 경험률은 8.6%이며 남자 12.5%, 여자 4.5%로 남자에서 높게 나타났다. 연령별로는 20대가 13.6%로 가장 높게 나타났으며 연령군이 높아질수록 금연교육 경험률은 낮아졌다. 표준화율을 이용한 연도간 추세분석에서 금연교육 경험률은 전년도의 3.4%보다 5.8%p 높아졌으며 울산광역시 전체의 7.5%보다 높았다.
- 현재흡연자의 금연교육 경험률은 16.6%, 남자의 경우 16.9%로 나타났다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도의 2.7%보다 높은 16.9%의 현재 흡연자 금연교육 경험률을 보였으며 울산 광역시 전체의 15.8%보다 높았다.



< 18> 금연캠페인 경험률



<그림 19> 금연교육 경험률



<그림 20> 현재 흡연자의 금연교육 경험률

2.

. 월간음주율

- 1년(365일) 동안 한 달(30일)에 1회 이상 음주한 사람의 분율(%)로 정의한다.

1년(365일) 동안 한 달(30일)에 1회 이상 술을 마신 적이 있다고 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 2013년 월간음주율은 53.1%였으며 남자에서 65.5%, 여자에서 40.0%를 보였다. 연령별로는 40대가 68.2%로 가장 높았고, 20대(66.6%), 30대(51.5%)순으로 나타났다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도 50.3%보다 높은 54.2%의 월간음주율을 보였으며 울산광역시 전체의 60.2%보다 낮았다.

나. 음주시작연령

- 처음으로 술 1잔을 모두 마신 적이 있는 사람의 만 나이로 정의한다.

처음으로 술 1잔을 모두 마신 만 나이의 총 합
1잔 이상의 술을 마신 음주자 수

- 남자의 음주시작연령은 20.4세, 여자의 경우 24.5세로 나타났다. 음주시작 연령은 최근 5년간 큰 변동 없이 유지되었으며 울산광역시 전체의 결과와도 유사하였다.


다. 고위험음주율¹⁾

- 최근 1년(365일) 동안 음주한 사람 중에서 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상, 여자는 5잔 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.


최근 1년(365일) 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 × 100
최근 1년(365일) 동안 음주한 사람의 수

- 고위험음주율은 남자(33.1%)에서 여자(6.1%)보다 높게 나타났으며 연령군별로는 40대가 29.5%로 가장 높았으며 50대와 20대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 울주군의 고위험음주율은 19.6%로 전년도보다 증가하였으며 울산광역시 전체(15.6%)보다 높은 고위험음주율을 나타냈다.


1) 2008 지표정의 : 한 번의 술좌석에서 남자는 7잔 또는 맥주 5캔(여자의 경우 5잔 또는 맥주 3캔 정도) 이상을 한 달(30일) 동안 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 사람의 수*100 / 조사대상자 중 최근 1년간 음주한 사람의 수



< 21> 월간음주율



<그림 22> 음주시작연령



<그림 23> 고위험음주율

3.

나. 운전 시 안전벨트 착용률

- 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 비율(%)로 정의한다.

운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 × 100
자동차 운전자 수

- 자동차 운전 시 안전벨트 착용률은 2013년 전체 85.9%이며 성별로는 남자 83.4%, 여자 90.4%로 조사되었다. 연령별로는 70대 이상 안전벨트 착용률이 91.8%로 가장 높았고 50대와 20대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도의 75.9%에 비해 높은 84.8%의 안전벨트 착용률을 보였으며 울산광역시 전체의 83.7%보다 높았다.

나. 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률

- 다른 사람이 운전하는 자동차의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 비율(%)로 정의한다.

다른 사람이 운전하는 자동차의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 × 100
동승차량 앞좌석 탑승자 수

- 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률은 88.5%이며, 남자에서 85.5%, 여자에서 92.0%를 보였다. 연령별로는 50대가 95.3%로 가장 높았고 이어서 70대 이상, 60대 순이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도의 76.8%보다 높은 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률을 보였으며 울산광역시 전체의 82.4%보다 높았다.


다. 연간 음주운전 경험률

(자동차 또는 오토바이)


- 최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 수 × 100
자동차 또는 오토바이 운전자 수


- 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)은 4.0%였으며 남자의 경우 4.3%, 여자의 경우 3.4%로 조사되었다. 연령별로는 40대에서 5.3%로 가장 높았고 50대와 30대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서는 전년도의 12.0%보다 낮은 3.8%를 기록했으며 울산광역시 전체의 7.2%보다 낮은 음주운전 경험률을 나타냈다.




< 24> 운전 시 안전벨트 착용률




<그림 25> 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률




<그림 26> 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)



<그림 27> 격렬한 신체활동 실천율



<그림 28> 중등도 신체활동 실천율




<그림 29> 중등도 이상 신체활동 실천율

. 걷기 실천율

- 1주일(7일) 동안 걷기를 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{1주일(7일) 동안 걷기를 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--

- 울주군의 걷기 실천율은 50.4%로 조사되었으며 남자에서 54.9%, 여자에서 45.6%로 차이가 있었다. 60대(61.5%)와 40대, 50대에서 걷기 실천율이 높았다. 표준화 실천율은 50.0%로 전년도의 41.2%보다 증가했으며 울산광역시 전체 실천율인 41.9%보다 높았다.



< 30> 걷기 실천율

5.


. 저염선택율

- 식습관, 조리음식 등에서 저염식을 선호하는 사람의 분율(%)로 정의한다. 저염선택율은 제시된 3가지의 문항 중 한 가지만 선택한 경우를 Type I, 두 가지를 선택한 경우를 Type II, 그리고 세 가지 모두를 선택한 경우를 Type III로 구분한다.


- ① 음식을 먹을 때 “약간 싱겁게 먹는다” 또는 “아주 싱겁게 먹는다”에 응답한 사람의 수 또는,
- ② 조리된 음식을 먹을 때 소금이나 간장을 “전혀 더 넣지 않는다”에 응답한 사람의 수 또는,
- ③ 전, 부침, 튀김 등을 먹을 때 간장에 “적어 먹지 않는다”에 응답한 사람의 수 $\times 100$

조사대상 응답자 수

- 저염선택율은 Type I이 33.8%, Type II가 27.6%, Type III가 11.1%로 나타났다. Type I 남자의 경우에는 32.9, 여자의 경우에는 34.6%로 차이를 보였으며, Type II 남자는 26.5%, 여자는 28.8%, 마지막으로 Type III 남자는 9.2%, 여자는 13.0%였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 Type I은 전년도의 35.0%보다 감소한 34.6%를 보였고 Type II는 전년도 30.9%보다 감소한 26.9%, Type III는 전년도 13.8%에서 감소한 10.6%를 보였다. 한편 울산광역시 전체 저염선택율을 보면 Type I 42.6%, Type II 27.6%, Type III 11.6%로 모두에서 울산광역시보다 울주군 선택율이 낮게 나타났다.



< 31> 저임선호율(2013)



<그림 32> 저임선호율(연도비교)

가. 가공식품 선택 시 영양표시 이용률

- 선택 시 영양표시를 읽는 사람의 비율(%)로 정의한다.

“항상 읽는다” 또는 “가끔 읽는다”라고 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 가공식품 선택 시 영양표시 이용률은 26.0%였고 남자의 경우 14.5%, 여자의 경우 38.2%로 성별간 차이를 보였다. 연령별로는 30대(46.1%), 40대(35.0%), 20대(29.6%)의 순서로 이용률이 높았다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도(32.6%)보다 감소하였으며 울산광역시 전체의 34.6%보다 낮게 조사되었다.

다. 영양교육 및 상담수혜율

- 최근 1년(365일) 동안 영양교육이나 상담을 받아 본 경험이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 영양교육 및 상담을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 영양교육 및 상담수혜율은 3.0%이며, 남자에서는 1.9%, 여자에서는 4.1%로 나타났다. 연령별로는 30대(4.4%)와 20대(4.1%)가 높은 수혜율을 보였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 울주군의 영양교육 및 상담수혜율은 전년도(4.4%)보다 하강하였으며 울산광역시 전체의 3.2%보다 높았다.

라. 식품 안정성 확보율


- 최근 1년(365일) 동안 가구 식생활 형편을 물었을 때 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었거나 혹은 충분한 양이지만 다양하지 못한 음식을 먹은 사람의 비율(%)로 정의한다.

“우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다” 혹은 “우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다”라고 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 식품 안정성 확보율은 97.3%로 높게 나타났으며 성별간 연령간 차이는 두드러지지 않았다. 5년간 추세도 꾸준히 높은 식품 안정성 확보율을 보이고 있다.



< 33> 가공식품 선택 시 영양표시 이용률



<그림 34> 영양교육 및 상담수혜율



<그림 35> 식품 안정성 확보율

6. 및 체중조절

. 비만율

- $(\text{체중(kg)}/\text{신장}^2(\text{m}^2))$ 25 이상인 사람의 분율(%)로 정의한다.

(kg/m^2) 25 이상인 사람의 수 $\times 100$
조사대상 응답자 수

- 울주군의 비만율은 26.4%이고 남자의 34.4%, 여자의 17.9%가 비만인 것으로 나타났다. 연령별로는 30대의 비만율(37.2%)이 가장 높았으며 60대와 50대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도(22.7%)보다 상승하였으며, 울산광역시 전체의 비만율(24.1%)보다 높았다.

나. 주관적 비만인지율

- 주관적으로 “약간 비만” 또는 “매우 비만”이라고 생각하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

“약간 비만” 또는 “매우 비만”이라고 응답한 사람의 수 $\times 100$
조사대상 응답자 수


- 주관적 비만인지율은 31.5%였으며 남자는 29.8%, 여자는 33.2%였다. 30대의 주관적 비만인지율이 가장 높았으며(42.9%) 20대와 40대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 주관적 비만인지율(33.2%)은 전년도(31.3%)보다 상승하였으며, 울산광역시 전체의 36.9%보다 낮았다.

다. 체중조절 시도율


- 최근 1년(365일) 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 수 $\times 100$
조사대상 응답자 수


- 체중조절 시도율은 전체 58.0%였으며 남자 54.0%, 여자 62.2%로 차이를 보였다. 연령별로는 40대가 67.6%로 가장 높았으며 20대와 30대의 순서로 높은 시도율을 보였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도 시도율 36.0%보다 상승하였으며, 울산광역시 전체의 61.4%보다 낮은 시도율을 보였다.



<그림 36> 비만율



<그림 37> 주관적 비만인지율



<그림 38> 체중조절 시도율

7.

. 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

- 구강건강이 나쁘다고 인식하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

“ ” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 28.6%로 나타났으며 남자는 27.9%, 여자는 29.4%로 조사되었다. 70대 이상에서 주관적 구강건강이 나쁜 인구분율이 60.5%로 가장 높았으며 60대도 55.1%로 높았다. 표준화율에 의한 비교에서 전년도(35.0%)에 비해 2013년에 분율이 낮아졌으며 울산광역시의 27.2%보다 낮게 나타났다.

나. 저작불편호소율(65세 이상)


- 65세 이상 노인의 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

“매우 불편” 또는 “불편”에 응답한 사람의 수 × 100
65세 이상 조사대상 응답자 수

- 65세 이상 노인의 저작불편호소율은 46.6%였으며 65세 이상 남성의 47.2%, 여성의 46.1%에서 저작불편을 호소하였다. 표준화율에 의한 비교 저작불편 호소율은 42.6%로 전년도의 저작불편호소율(47.6%)보다 낮아졌으며 울산광역시 전체의 43.7%보다 낮았다.



< 39> 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율




<그림 40> 저작불편호소율(65세 이상)

. 틀니 이용 행태(65세 이상)

- 65 이상 노인의 틀니 이용 행태별 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{이용 행태별 사람의 수} \times 100}{\text{65세 이상 조사대상 응답자 수}}$

- 65세 이상 노인의 틀니 이용 행태는 위아래 둘다 있는 경우가 48.7%, 위쪽만 있는 경우가 7.6%, 아래쪽만 있는 경우가 4.7%로 나타났다. 위아래 둘다 있는 경우 남자는 46.0%인데 반해 여자는 50.7%였으며, 위쪽만 있는 경우는 남자는 7.0%, 여자는 8.1%, 마지막으로 아래쪽만 있는 경우가 남자는 4.0%, 여자는 5.1%로 차이를 보였다. 위아래 둘다 틀니가 있는 경우는 전년도에 비해 증가하였으며, 위쪽이나 아래쪽만 있는 경우는 모두 전년도보다 증가하였다.



< 41> 틀니 이용 행태(65세 이상)(2013)



<그림 42> 틀니 이용 행태(65세 이상)(연도비교)

나. 점심식사 후 칫솔질 실천율

- 점심식사 후 칫솔질 한 사람의 분율(%)로 정의한다.

후 칫솔질 한 사람의 수 × 100
점심식사 한 사람의 수

- 점심식사 후 칫솔질 실천율은 60.5%였으며 남자의 경우 56.2%, 여자의 경우 65.0%로 나타났다. 연령별로는 20대가 84.8%로 가장 높았고 30대와 40대가 그 뒤를 따랐다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 점심식사 후 칫솔질 실천율은 전년도에 59.4%보다 증가한 63.5%로 나타났고 이는 울산광역시 전체의 65.9%보다 낮은 실천율이다.

바. 연간 스케일링 경험률

- 최근 1년(365일) 동안 스케일링을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 스케일링을 받은 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 연간 스케일링 경험률은 26.9%였으며 남자는 31.1%, 여자는 22.5%로 나타났다. 40대의 스케일링 경험률이 35.0%로 가장 높았으며 30대와 50대가 그 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 스케일링 경험률은 전년도에 22.7%보다 높은 27.5%로 나타났으며 울산광역시 전체의 30.1%보다 낮았다.

마. 구강검진 수진율


- 최근 1년(365일) 동안 치료목적이 아닌 순수 검진 목적으로 구강검진을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 구강검진을 받은 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 울주군의 구강검진 수진율은 31.9%였으며 남자는 37.4%, 여자는 26.0%를 보였다. 연령별로는 40대가 42.5%로 가장 높았으며 50대와 30대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 구강검진 수진율은 전년도에 35.7%보다 감소한 31.3%로 나타났으며, 울산광역시 전체 수진율인 44.1%보다 낮았다.



< 43> 점심식사 후 칫솔질 실천율



<그림 44> 구강검진 수진율



<그림 45> 연간 스케일링 경험율

8.

. 스트레스 인지율

- 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이” 또는 “많이” 느끼는 사람의 비율(%)로 정의한다.

일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느낀다”에 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 스트레스 인지율은 21.8%였으며 남자와 여자는 각각 23.1%, 20.4%로 나타났다. 연령별로는 40대의 스트레스 인지율이 가장 높은 25.3%를 기록했으며 30대 24.9%, 50대 23.8%로 나타났다. 표준화율을 이용한 추세 비교에서 2013년에는 전년도의 34.6%보다 감소하였으며 울산광역시 전체의 20.5%보다 높았다.

나. 우울감 경험률


- 최근 1년(365일) 동안 연속적으로 2주(14일) 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 연속적으로 2주(14일) 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 경험한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 우울감 경험률은 3.8%로 조사되었고 남자와 여자의 비율은 각각 2.1%와 5.6%였다. 70대 이상 연령군에서 7.6%로 가장 높은 우울감 경험률을 보였다. 표준화율을 이용한 추세 비교에서 전년도의 3.6%으로 동일한 우울감 경험률을 보였으며 울산광역시 전체 역시 3.6%로 동일한 수치를 기록하였다.



< 46> 스트레스 인지율



<그림 47> 우울감 경험률



2부» 주요통계결과

Ⅱ.

1. 인플루엔자 예방접종률


Ⅱ. 예방접종

1. 인플루엔자 예방접종률

- 1년(365일) 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 비율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{1년(365일) 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 연간 인플루엔자 예방접종률은 37.4%였으며 남자는 30.6%, 여자는 44.6%로 차이를 보였다. 70대 이상 연령군의 접종률이 86.8%로 가장 높았으며 60대가 61.1%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 인플루엔자 예방접종률은 전년도의 39.4%보다 감소한 35.9%로 조사되었으며 울산광역시 전체의 39.1%보다 낮은 접종률이었다.



< 48> 연간 인플루엔자 예방접종률



2부» 주요통계결과

Ⅲ. 및 의료이용

1. · 급성질환 및 사고중독 경험률
2. 연간 평균 혈압 측정횟수
3. 연간 평균 혈당 측정횟수
4. 주요 질환별 평생 의사진단 경험률 및 관리행태
5. 질환별 인지율
6. 의료이용

Ⅲ. 이환 및 의료이용

1. 급성질환 및 사고중독 경험률

- 2주(14일) 동안 만성·급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 사람의 비율(%)로 정의한다.

$$\frac{2\text{주}(14\text{일}) \text{ 동안 만성·급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 만성·급성질환 및 사고중독 경험률은 5.0%이며 남자는 3.6%, 여자는 6.4%로 차이를 보였다. 연령별로는 70대 이상에서 14.9%로 가장 높은 경험률을 보였으며 60대와 50대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도 경험률 14.3%보다 감소한 4.6%로 조사된 울산광역시 전체의 4.2%보다 높았다.

3. 연간 평균 혈당 측정횟수

- 최근 1년(365일) 동안 혈당을 측정한 횟수로 정의한다.

$$\frac{(\text{하루 측정횟수} \times 365\text{일}) + (\text{일주일 측정횟수} \times 52\text{주}) + (\text{한 달 측정횟수} \times 12\text{개월}) + (\text{일 년 측정횟수})}{\text{조사대상 응답자 수}}$$


- 연간 평균 혈당 측정횟수는 3.6회(남자 3.7회, 여자 3.5회)였으며, 60대에서 12.2회, 70대 이상에서 8.4회를 측정하는 것으로 조사되었다.

2. 연간 평균 혈압 측정횟수


- 최근 1년(365일) 동안 혈압을 측정한 횟수로 정의한다.

$$\frac{(\text{하루 측정횟수} \times 365\text{일}) + (\text{일주일 측정횟수} \times 52\text{주}) + (\text{한 달 측정횟수} \times 12\text{개월}) + (\text{일 년 측정횟수})}{\text{조사대상 응답자 수}}$$


- 연간 평균 혈압 측정횟수는 7.5회였으며 남자 7.7회, 여자 7.3회로 나타났다. 60대와 70대 이상에서 가장 혈압측정을 많이 한 것으로 조사되었다.



<그림 49> 만성·급성질환 및 사고중독 경험률



< 50> 연간 평균 혈압 측정횟수



<그림 51> 연간 평균 혈당 측정횟수

4. 질환별 평생 의사진단 경험률 및 관리행태

. 고혈압

(1) 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥ 30)

- 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\text{고혈압을 진단받은 사람의 수} \times 100$
30세 이상 조사대상 응답자 수

- 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥ 30)은 19.9%(남자 19.9%, 여자 19.9%)였으며 연령별로는 70대 이상이 53.2%로 가장 높았다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 고혈압 평생 의사진단경험률(≥ 30)은 전년도에 15.9%보다 증가한 18.0%로 나타났으며 울산광역시 전체의 17.3%보다 높았다.

(2) 고혈압 약물치료율(≥ 30)

- 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람 중 현재 혈압조절약을 “한 달(30일)에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\text{현재 혈압조절약을 “한 달(30일)에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수} \times 100$
$\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}$


- 고혈압 약물치료율(≥ 30)은 84.1%(남자 77.2%, 여자 91.0%)였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도에 89.1%보다 감소한 85.2%의 고혈압 약물치료율을 보여 울산광역시 전체의 90.3%보다 낮았다.

(3) 고혈압 관리교육 이수율(≥ 30)


- 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람 중 고혈압 관리에 관한 교육을 받은 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\text{고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수} \times 100$
$\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}$


- 고혈압 관리교육 이수율(≥ 30)은 33.6%(남자 34.9%, 여자 32.2%)로 조사되었다. 50대의 이수율이 40.5%로 70대 이상 연령층보다 높은 이수율을 보였다.



< 52> 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)



<그림 53> 고혈압 약물치료율(≥30)



<그림 54> 고혈압 관리교육 이수율(≥30)

. 당뇨병

(1) 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥ 30)

- 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{당뇨병을 진단받은 사람의 수} \times 100}{\text{30세 이상 조사대상 응답자 수}}$
--

- 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥ 30)은 7.9%(남자 7.6%, 여자 8.3%)였으며 연령별로는 70대 이상이 21.7%로 가장 높았다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥ 30)은 전년도의 7.6%보다 감소한 7.1%로 나타났으며 울산광역시 전체의 6.7%보다 높았다.

(2) 당뇨병 치료율(≥ 30)

- 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)으로 치료를 받고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{현재 당뇨병치료를 위한 혈당조절 방법으로 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 사용한다고 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}}$


- 당뇨병 치료율(≥ 30)은 91.9%(남자 92.4%, 여자 91.4%)였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 84.6%보다 증가한 89.6%의 당뇨병 치료율을 보였으며 울산광역시 전체의 89.1%보다 높은 치료율을 보였다.

(3) 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)


- 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 당뇨병 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}}$
--


- 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)은 28.3%(남자 24.8%, 여자 31.6%)로 조사되었다.



< 55> 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)



<그림 56> 당뇨병 치료율(≥30)



<그림 57> 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)

(4) 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥ 30)

- 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년(365일) 동안 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}}$$

- 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥ 30)은 37.1%(남자 44.6%, 여자 30.2%)였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 39.6%보다 감소한 39.5%의 수진율을 보였으며 울산광역시 전체의 31.2%보다 높았다.


(5) 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥ 30)³⁾

- 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년(365일) 동안 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.


$$\frac{\text{최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}}$$

- 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥ 30)은 31.0%(남자 37.0%, 여자 25.3%)로 나타났다.

3) 2009 지표정의 : 최근 1년 동안 미세단백뇨검사를 받은 적이 있는 사람의 수 $\times 100$ / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
2010년 지표정의 : 최근 1년 동안 소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 $\times 100$ / 의사진단을 받은 30세 이상인 사람의 수



< 58> 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)



<그림 59> 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)

· 관절염

(1) 관절염 평생 의사진단 경험률(≥ 50)

- 관절염을 진단받은 50세 이상 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{관절염을 진단받은 사람의 수} \times 100}{\text{50세 이상 조사대상 응답자 수}}$
--

- 관절염 평생 의사진단 경험률(≥ 50)은 20.8% (남자 9.8%, 여자 31.0%)였으며 70대 이상 연령군에서 40.9%로 가장 높은 경험률을 보였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도 11.9%보다 증가한 21.5%의 관절염 평생 진단율을 보였으며 울산광역시 전체의 17.5%보다 높았다.

(2) 관절염 관리교육 이수율(≥ 50)

- 의사에게 관절염을 진단받은 50세 이상 사람 중 관절염 관리에 관한 교육을 받은 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{관절염 관리 교육을 받은 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수}}$
--

- 관절염 관리교육 이수율(≥ 50)은 35.9%로 나타났다.


라. 이상지질혈증(고지혈증 포함)

(1) 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥ 30)


- 의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 30세 이상 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수} \times 100}{\text{30세 이상 조사대상 응답자 수}}$


- 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥ 30)은 7.3% (남자 8.5%, 여자 6.0%)였으며 연령별로는 60대가 14.3%로 가장 높았고 50대는 10.6%로 조사되었다.



< 60> 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)



<그림 61> 관절염 관리교육 이수율(≥50)



<그림 62> 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30)

5. 인지율

나. 대사증후군 인지율

- 대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 분율(%)로 정의한다.

대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 대사증후군 인지율은 41.5%(남자 39.8%, 여자 43.3%)였다. 40대의 인지율이 58.9%로 가장 높았고 30대와 50대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 대사증후군 인지율은 전년도에 32.8%에서 증가한 40.9%를 보였고 울산광역시 전체의 36.1%보다 높았다.

다. 에이즈 인지율

- 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 분율(%)로 정의한다.

에이즈에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 에이즈 인지율은 75.4%(남자 75.6%, 여자 75.1%)로 조사되었다. 대부분의 연령군에서 에이즈인지는 높게 나타났으나 고연령군으로 갈수록 인지가 낮아지는 것을 알 수 있다.

6. 의료이용

가. 필요의료서비스 미치료율⁴⁾

- 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 분율(%)로 정의한다.


최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 필요의료서비스 미치료율은 7.2%(남자 6.0%, 여자 8.5%)였다. 전년도에 8.4%보다 감소하였으며 울산광역시 전체의 9.6%보다 낮은 미치료율을 보였다.


4) 2008 지표정의 : 최근 1년간 필요한 의료서비스를 받지 못한 사람 수×100 / 조사대상 인구 수

2009년 지표정의 : 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수


2010년 지표정의 : 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 포함)를 받지 못한 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수



< 63> 대사증후군 인지도



<그림 64> 에이즈 인지도



<그림 65> 필요의료서비스 미치료율



2부» 주요통계결과

IV. 및 중독(낙상)

1. 낙상 경험률
2. 연간 사고중독 경험률

IV. 사고 및 중독(낙상)

1. 낙상 경험률

- 1년(365일) 동안 낙상을 경험한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\text{낙상 경험자 수} \times 100$
조사대상 응답자 수


- 연간 낙상 경험률은 12.3%이며 남자는 10.7%, 여자는 14.0%로 조사되었다. 연령별로는 70대 이상 낙상 경험률이 20.4%로 가장 높았고 그 다음으로는 60대, 30대, 20대 순이었다.

2. 연간 사고중독 경험률


- 최근 1년(365일) 동안 병의원이나 응급실 등의 의료기관을 방문한 사고중독을 경험한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\text{연간 사고중독 경험자 수} \times 100$
조사대상 응답자 수

- 연간 사고중독 경험률은 4.5%(남자 3.6%, 여자 5.5%)로 조사되었다. 연령별로는 60대가 10.2%로 가장 높았으며 70대 이상 과 50대가 뒤를 이었다. 전년도 연간 사고중독 경험률 7.4%보다 감소하였으며 울산광역시 전체 경험률 5.4%보다 낮았다.



< 66> 연간 낙상 경험률



<그림 67> 연간 사고중독 경험률



2부» 주요통계결과

V. 및 삶의 질

1. 주관적 건강수준 인지율
2. 침상와병 경험률
3. 결근결석 경험률
4. 오늘의 건강상태

V. 활동제한 및 삶의 질

1. 주관적 건강수준 인지율

- 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”이라고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”이라고
응답한 사람의 수 $\times 100$

조사대상 응답자 수

- 양호한 주관적 건강수준 인지율은 51.0%(남자 59.2%, 여자 42.5%)였다. 20대가 79.1%로 가장 높은 인지율을 보였으며 30대와 40대가 그 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 양호한 주관적 건강수준 인지율 52.3%보다 증가하였으며 울산광역시 전체의 46.0%보다 높았다.

2. 침상와병 경험률

- 최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 한나절 이상 누워 보내야 했던 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 한나절
이상 누워 보내야 했던 사람의 수 $\times 100$

조사대상 응답자 수

- 침상와병 경험률은 3.6%(남자 3.2%, 여자 4.0%)이다. 연령별로는 70대 이상이 10.7%로 가장 높았으며 60대와 50대가 뒤를 이었

다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 침상와병 경험률 6.6%에서 감소하였으며 울산광역시 전체의 4.4%보다 낮았다.

3. 결근결석 경험률


- 최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 학교나 직장에 가지 못한 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 학교나
직장에 가지 못한 사람의 수 $\times 100$


조사대상 응답자 수⁵⁾

- 결근결석 경험률은 2.0%(남자 2.6%, 여자 0.9%)로 연령별로는 30대와 60대가 4.0%로 가장 높았고 20대가 그 뒤를 이었다. 표준화율에 의한 추세비교에서 전년도 결근결석 경험률 4.4%보다 감소하였으며 울산광역시 전체의 3.1%보다 낮았다.


5) 또는 직장을 다니고 있지 않은 대상자(주부, 무직) 제외



< 68> 양호한 주관적 건강수준 인지율



<그림 69> 침상와병 경험률



<그림 70> 결근결석 경험률

4. 건강상태

- 척도로 나타낸 주관적인 오늘의 건강상태로 정의한다.

점수의 총 합
조사대상 응답자 수

- 오늘의 건강상태는 평균 73.0점(남자 75.4점, 여자 70.5점)이었다. 전년도 점수 72.1점에 비해 증가하였으며 울산광역시 전체의 73.3점에 비해 높았다.



< 71> 오늘의 건강상태



2부» 주요통계결과

VI. 이용

1. 이용
2. 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염)
홍보 및 교육 경험률

VI. 보건기관 이용

1. 이용

가. 보건기관 이용률

- 1년(365일) 동안 보건기관을 이용한 사람의 분율(%)로 정의한다.

1년(365일) 동안 보건기관('보건소(보건의료원)', '보건지소', '보건진료소')을 이용한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 보건기관 이용률은 31.7%(남자 22.6%, 여자 41.2%)로 나타났다. 연령별로는 70대 이상에서 70.6%로 가장 높았으며 60대(51.5%), 30대(34.0%)의 순서였다.

나. 보건기관 이용 서비스 종류

- 보건기관 이용 서비스 종류별 분포(%)로 정의한다.

보건기관 이용 서비스 종류별 응답자 수 × 100
최근 1년(365일) 동안 보건기관('보건소(보건의료원)', '보건지소', '보건진료소')을 이용한 사람의 수


- 보건기관 이용 서비스 종류는 예방접종이 73.3%로 가장 높았으며 건강검진(18.9%), 진료서비스(17.7%), 건강교실(12.4%) 순서로 이용이 많았다.

다. 보건기관 서비스 만족도


- 보건기관 서비스에 대해 “대단히 만족한다” 또는 “만족한 편이다”에 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

“대단히 만족한다” 또는 “만족한 편이다”에 응답한 사람의 수 × 100
최근 1년(365일) 동안 보건기관('보건소(보건의료원)', '보건지소', '보건진료소')을 이용한 사람의 수


- 보건기관 서비스 만족도는 전체가 74.0%였으며 남자는 75.9%, 여자는 72.9%로 차이를 보였다. 연령별로는 40대가 76.9%로 만족도가 가장 높았으며 20대와 70대 이상 이 그 뒤를 이었다.



< 72> 보건기관 이용률



<그림 73> 보건기관 이용 서비스 종류



<그림 74> 보건기관 서비스 만족도

2. 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염) 홍보 및 교육 경험률

- 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염)의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

고혈압의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 보건기관 고혈압 홍보 및 교육 경험률은 21.9%였으며 남자는 20.2%, 여자는 23.6%로 차이를 보였다 연령별로는 40대가 27.1%로 가장 높은 고혈압 홍보 및 교육 경험률을 나타냈다.

보건기관에서 당뇨병의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 보건기관 당뇨병 홍보 및 교육 경험률은 21.2%(남자 19.4%, 여자 23.1%)로 나타났으며 연령별로는 40대(26.9%)와 50대(24.3%)가 가장 높은 경험률을 보였다.

보건기관에서 관절염의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 보건기관 관절염 홍보 및 교육 경험률은 17.6%(남자 16.2%, 여자 19.2%)로 조사되었으며 40대에서 22.6%로 가장 높은 보건기관 관절염 홍보 및 교육 경험률을 보였다.



< 75> 보건기관 당뇨병 홍보 및 교육 경험률



<그림 76> 보건기관 관절염 홍보 및 교육 경험률



<그림 77> 보건기관 관절염 홍보 및 교육 경험률



2부» 주요통계결과

VII. 물리적 환경

1. 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도를
2. 사회활동 참여율

VII. 사회 물리적 환경

1. 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율

- 사회 물리적 환경(이웃상호 신뢰감, 상호부조, 안전수준, 자연환경, 생활환경, 대중교통 여건, 의료서비스 여건)에 대해 긍정적으로 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

사회 물리적 환경(이웃상호 신뢰감, 상호부조, 안전수준, 자연환경, 생활환경, 대중교통 여건, 의료서비스 여건)에 대해 긍정적으로 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율은 이웃상호 신뢰감 77.9%, 상호부조 53.9%, 전반적인 안전수준 84.4%, 자연환경 만족도 87.3%, 생활환경 만족도 77.4%, 대중교통 만족도 60.5%, 의료서비스 만족도 53.4%로 조사되었다.

2. 사회활동 참여율


- 한 달에 한 번(1회) 이상 정기적으로 사회활동(종교 활동, 친목활동, 여가/레저 활동, 자선단체 활동)에 참여하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

한 달에 한 번(1회) 이상 정기적으로 사회활동(종교 활동, 친목활동, 여가/레저 활동, 자선단체 활동)에 참여하는 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 사회활동 참여율은 종교활동 27.5%, 친목활동 76.3%, 여가/레저활동 31.8%, 자선단체 활동 11.1%로 조사되었다.



< 78> 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율



<그림 79> 사회활동 참여율



2부» 주요통계결과

VIII.

1. 씻기 감염병 예방 인지율
2. 손 씻기 실천율

VIII. 개인위생

1. 씻기 감염병 예방 인지율

- 씻기가 감염병(전염병) 예방에 “매우 도움이 된다” 또는 “도움이 된다”에 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

“도움이 된다” 또는 “도움이 된다”에 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 손 씻기 감염병 예방 인지율은 모든 성별, 연령군에서 매우 높은 인지율을 보였다.

2. 손 씻기 실천율

- 최근 1주일 동안 (식사 전, 화장실 다녀온 후, 외출 후) “항상” 또는 “자주” 손을 씻는 사람의 비율로 정의한다.

식사하기 전 손을 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 손 씻기 실천율(식사 전)은 93.4%이며 남자는 91.4%, 여자는 95.5%의 실천율을 나타냈다. 연령별로는 60대(97.3%)와 20대(96.5%)가 가장 높은 식사 전 손 씻기 실천율을 갖고 있는 것으로 조사되었다.

화장실 다녀온 후 손을 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 손 씻기 실천율(화장실 다녀온 후)은 91.4% (남자 88.4%, 여자 94.6%)로 연령별로는 20대(96.4%)가 가장 높았고 30대와 40대가 그 뒤를 이었다.

외출 후 집에 돌아왔을 때 손을 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 손 씻기 실천율(외출 후)은 87.2%(남자 83.1%, 여자 91.4%)로 연령별로는 20대(91.2%)와 50대(90.6%)가 가장 높은 실천율을 보였다.




< 80> 손 씻기 감염병 예방 인지도



<그림 81> 손 씻기 실천율

3부 통계표

Community Health Survey





3부 >> 통계표

I.

< 14> 현재흡연율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	21.9(1.2)	5.3	393	41.8(2.1)	4.9	525	1.0(0.4)	39.5
연령									
19-29	78	10.6(3.7)	34.9	33	19.2(6.3)	32.8	45	0.0(0.0)	.
30-39	128	25.6(3.0)	11.6	52	49.9(5.7)	11.5	76	0.0(0.0)	.
40-49	208	27.3(2.6)	9.5	91	50.3(4.2)	8.4	117	1.2(0.6)	52.1
50-59	189	30.0(3.2)	10.5	93	55.5(5.0)	9.0	96	1.0(1.0)	98.2
60-69	128	18.5(3.0)	16.4	51	38.5(5.8)	15.2	77	2.8(2.7)	96.3
70 이상	187	8.2(2.0)	24.0	73	16.8(4.4)	25.9	114	1.8(1.2)	69.0
생애주기별									
19-64	682	23.6(1.4)	5.9	300	44.1(2.5)	5.6	382	0.7(0.3)	43.9
65 이상	236	12.1(2.1)	17.4	93	25.2(4.7)	18.5	143	2.2(1.2)	56.1
교육수준 ²⁾									
무학	114	5.3(2.3)	42.5	24	17.1(9.1)	53.0	90	2.2(1.5)	68.6
초등학교	134	12.0(2.9)	24.2	47	27.3(6.8)	25.0	87	1.2(1.2)	100.5
중학교	81	26.7(6.3)	23.6	34	56.7(9.8)	17.2	47	4.1(2.9)	70.8
고등학교	365	24.4(1.9)	7.8	185	42.0(3.1)	7.3	180	0.6(0.3)	46.0
대학교 이상	224	23.6(2.6)	11.2	103	44.3(4.0)	9.1	121	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	104	27.4(3.7)	13.3	46	54.0(6.8)	12.6	58	0.0(0.0)	.
사무직	78	34.0(4.1)	12.0	52	46.0(4.8)	10.5	26	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	112	20.1(3.5)	17.3	33	53.4(6.5)	12.1	79	2.1(1.5)	72.2
농림어업	70	32.3(6.5)	20.2	48	46.7(9.0)	19.3	22	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	157	36.0(3.6)	10.0	115	44.8(4.2)	9.3	42	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	396	7.9(1.6)	20.4	98	22.7(4.8)	21.1	298	1.2(0.6)	48.9
월 가구소득									
100만원 이하	204	18.2(3.5)	19.1	75	40.9(6.7)	16.4	129	1.5(1.0)	67.0
101-200만원	151	23.5(4.1)	17.2	60	49.5(8.0)	16.1	91	0.8(0.8)	97.2
201-300만원	114	29.5(3.7)	12.4	58	50.0(5.9)	11.8	56	1.6(1.5)	96.5
301-400만원	160	22.0(2.5)	11.2	71	40.9(5.1)	12.4	89	1.3(0.6)	46.6
401만원 이상	282	19.7(2.1)	10.6	126	36.7(3.1)	8.4	156	0.4(0.4)	100.0

: 1) 현재흡연율 : (평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수 / 조사대상 응답자 수 × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 15> 흡연시작연령¹⁾

(: 세)

	전체			남자			여자		
	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수
연령	281	21.2(0.2)	1.1	270	21.0(0.3)	1.2	11	-(-)	-
19-29	8	-(-)	-	8	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	35	19.6(0.2)	1.2	35	19.6(0.2)	1.2	0	-(-)	-
40-49	71	21.2(0.5)	2.1	69	21.2(0.5)	2.2	2	-(-)	-
50-59	74	21.2(0.5)	2.4	72	21.1(0.5)	2.5	2	-(-)	-
60-69	38	24.6(1.2)	5.0	35	23.4(1.2)	5.3	3	-(-)	-
70 이상	55	22.6(0.7)	3.2	51	22.0(0.7)	3.0	4	-(-)	-
생애주기별									
19-64	209	20.8(0.2)	1.0	203	20.7(0.2)	1.1	6	-(-)	-
65 이상	72	23.6(0.9)	4.0	67	23.0(1.0)	4.3	5	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	19	-(-)	-	16	-(-)	-	3	-(-)	-
초등학교	37	21.7(0.8)	3.8	34	20.9(0.7)	3.2	3	-(-)	-
중학교	32	22.5(0.8)	3.6	29	22.5(0.8)	3.7	3	-(-)	-
고등학교	122	21.3(0.4)	1.9	120	21.2(0.4)	2.0	2	-(-)	-
대학교 이상	71	20.5(0.3)	1.3	71	20.5(0.3)	1.3	0	-(-)	-
직업									
전문행정관리	35	20.9(0.6)	2.9	35	20.9(0.6)	2.9	0	-(-)	-
사무직	36	20.3(0.3)	1.5	36	20.3(0.3)	1.5	0	-(-)	-
판매·서비스직	26	22.0(0.6)	2.7	24	21.9(0.5)	2.5	2	-(-)	-
농림어업	38	20.9(0.6)	2.6	37	21.0(0.5)	2.6	1	-(-)	-
기능단순노무직	79	21.1(0.5)	2.5	78	21.0(0.5)	2.6	1	-(-)	-
기타 ³⁾	66	22.2(0.8)	3.6	59	21.4(0.7)	3.3	7	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 이하	60	21.7(0.7)	3.5	56	21.2(0.7)	3.5	4	-(-)	-
101-200만원	47	21.2(0.7)	3.4	45	20.8(0.7)	3.5	2	-(-)	-
201-300만원	40	21.0(0.6)	3.1	39	20.8(0.6)	3.0	1	-(-)	-
301-400만원	48	21.2(0.6)	2.9	46	20.9(0.5)	2.2	2	-(-)	-
401만원 이상	84	20.9(0.5)	2.5	82	20.9(0.5)	2.5	2	-(-)	-

: 1) 흡연시작연령 : 처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 16> 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량¹⁾

(: %, 개비)

	N	10개비 미만		10-19개비		20-39개비		40개비 이상		평균	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	개비(표준오차)	변동계수
성	167	13.0(2.9)	22.7	42.1(4.1)	9.7	42.4(4.8)	11.4	2.6(1.2)	44.7	15.7(0.7)	4.4
남자	160	12.2(3.1)	25.1	42.4(4.3)	10.1	42.7(4.9)	11.5	2.7(1.2)	45.0	15.7(0.7)	4.4
여자	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
연령											
19-29	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	27	7.3(3.6)	49.4	58.9(8.1)	13.8	33.8(8.5)	25.0	0.0(0.0)	.	14.8(1.1)	7.3
40-49	48	15.9(6.3)	39.9	35.3(7.6)	21.4	46.6(7.0)	14.9	2.2(2.2)	100.9	15.3(1.2)	7.9
50-59	52	6.8(3.2)	46.8	39.3(7.7)	19.6	46.7(6.9)	14.9	7.1(3.4)	48.0	18.3(1.3)	6.8
60-69	22	31.1(10.5)	33.7	25.1(9.3)	36.9	43.7(10.8)	24.8	0.0(0.0)	.	13.2(1.6)	12.2
70 이상	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
생애주기별											
19-64	142	11.3(2.9)	25.2	42.9(4.4)	10.3	43.0(5.1)	11.9	2.8(1.3)	44.7	15.9(0.7)	4.4
65 이상	25	31.6(9.5)	30.1	32.6(8.1)	24.8	35.8(9.8)	27.4	0.0(0.0)	.	12.9(1.5)	11.3
교육수준 ²⁾											
무학	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	18	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	85	8.3(3.0)	36.3	42.7(5.7)	13.4	46.5(5.3)	11.5	2.5(1.7)	69.8	16.4(0.8)	4.6
대학교 이상	46	14.8(5.6)	37.8	44.6(6.4)	14.4	40.7(8.7)	21.4	0.0(0.0)	.	14.2(1.1)	7.5
직업											
전문행정관리	26	16.3(9.0)	55.4	40.4(8.1)	19.9	43.3(11.8)	27.3	0.0(0.0)	.	13.9(1.4)	9.7
사무직	25	19.0(10.6)	55.9	35.8(9.9)	27.5	45.2(10.9)	24.2	0.0(0.0)	.	14.2(1.6)	11.1
판매·서비스직	20	6.2(4.5)	73.3	37.3(10.9)	29.2	56.5(10.5)	18.6	0.0(0.0)	.	17.4(1.0)	5.9
농림어업	21	11.7(5.0)	43.1	38.1(10.1)	26.4	44.3(12.4)	28.0	5.8(5.8)	99.1	16.2(2.0)	12.6
기능단순노무직	54	7.9(4.6)	58.7	47.0(7.4)	15.7	41.6(5.7)	13.8	3.5(2.4)	68.0	16.9(1.1)	6.8
기타 ³⁾	21	21.3(8.8)	41.1	48.4(12.6)	26.1	20.5(8.4)	41.0	9.8(7.2)	73.1	14.8(2.1)	14.5
월 가구소득											
100만원 이하	23	25.1(8.7)	34.4	38.1(11.0)	28.9	36.7(14.3)	39.0	0.0(0.0)	.	13.0(1.7)	13.0
101-200만원	28	1.9(1.8)	91.8	42.1(10.5)	24.9	43.3(11.8)	27.2	12.6(5.4)	43.0	20.5(1.8)	8.6
201-300만원	31	10.8(5.1)	46.9	60.6(9.0)	14.9	28.7(9.0)	31.5	0.0(0.0)	.	13.6(1.0)	7.2
301-400만원	33	25.7(10.1)	39.3	42.6(9.0)	21.2	31.7(7.8)	24.5	0.0(0.0)	.	12.5(1.1)	9.1
401만원 이상	50	8.8(4.6)	52.1	30.3(7.1)	23.5	59.4(9.1)	15.2	1.5(1.5)	102.7	17.3(1.1)	6.3

: 1) 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량 : 평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 매일 흡연자의 하루 평균 흡연개비 수의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일 흡연자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 17> 흡연자의 금연시도율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
연령	174	15.7(3.0)	19.3	167	16.0(3.2)	19.7	7	-(-)	-
19-29	7	-(-)	-	7	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	27	20.7(7.3)	35.5	27	20.7(7.3)	35.5	0	-(-)	-
40-49	50	14.1(5.5)	39.1	48	14.4(5.7)	39.5	2	-(-)	-
50-59	54	8.4(4.5)	53.6	53	8.5(4.5)	53.6	1	-(-)	-
60-69	22	9.0(5.9)	65.5	20	9.8(6.4)	64.6	2	-(-)	-
70 이상	14	-(-)	-	12	-(-)	-	2	-(-)	-
생애주기별									
19-64	148	16.4(3.3)	20.0	144	16.6(3.4)	20.4	4	-(-)	-
65 이상	26	7.5(5.1)	68.3	23	8.4(5.7)	68.2	3	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	6	-(-)	-	4	-(-)	-	2	-(-)	-
초등학교	13	-(-)	-	12	-(-)	-	1	-(-)	-
중학교	19	-(-)	-	17	-(-)	-	2	-(-)	-
고등학교	88	13.5(3.5)	26.0	86	13.7(3.6)	26.0	2	-(-)	-
대학교 이상	48	21.7(6.0)	27.7	48	21.7(6.0)	27.7	0	-(-)	-
직업									
전문행정관리	26	10.5(6.1)	57.8	26	10.5(6.1)	57.8	0	-(-)	-
사무직	26	13.8(7.4)	53.8	26	13.8(7.4)	53.8	0	-(-)	-
판매·서비스직	20	12.8(6.8)	52.8	18	-(-)	-	2	-(-)	-
농림어업	21	0.0(0.0)	.	21	0.0(0.0)	.	0	-(-)	-
기능단순노무직	54	22.4(4.9)	21.8	54	22.4(4.9)	21.8	0	-(-)	-
기타 ³⁾	27	19.8(9.3)	47.1	22	22.0(10.3)	46.8	5	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 이하	28	18.4(10.6)	57.6	26	19.3(11.1)	57.4	2	-(-)	-
101-200만원	28	11.8(6.9)	58.0	27	12.0(7.0)	57.7	1	-(-)	-
201-300만원	31	24.7(6.5)	26.1	30	25.3(6.6)	26.2	1	-(-)	-
301-400만원	33	20.4(7.2)	35.1	31	21.0(7.3)	34.8	2	-(-)	-
401만원 이상	52	9.0(4.5)	50.1	51	9.1(4.6)	50.6	1	-(-)	-

: 1) 흡연자의 금연시도율 : (최근 1년(365일) 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수 / 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 18> 흡연자의 1개월 내 금연계획률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	174	6.8(1.8)	27.0	167	7.0(1.9)	27.2	7	-(-)	-
연령									
19-29	7	-(-)	-	7	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	27	3.5(3.5)	99.5	27	3.5(3.5)	99.5	0	-(-)	-
40-49	50	5.9(3.3)	56.5	48	6.1(3.4)	56.4	2	-(-)	-
50-59	54	1.8(1.8)	97.1	53	1.9(1.8)	97.0	1	-(-)	-
60-69	22	17.4(9.1)	52.5	20	19.0(9.8)	51.6	2	-(-)	-
70 이상	14	-(-)	-	12	-(-)	-	2	-(-)	-
생애주기별									
19-64	148	6.5(1.9)	30.0	144	6.6(2.0)	30.1	4	-(-)	-
65 이상	26	11.0(6.8)	61.5	23	12.2(7.4)	60.7	3	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	6	-(-)	-	4	-(-)	-	2	-(-)	-
초등학교	13	-(-)	-	12	-(-)	-	1	-(-)	-
중학교	19	-(-)	-	17	-(-)	-	2	-(-)	-
고등학교	88	7.3(3.1)	42.8	86	7.4(3.2)	42.6	2	-(-)	-
대학교 이상	48	7.3(5.4)	74.3	48	7.3(5.4)	74.3	0	-(-)	-
직업									
전문행정관리	26	0.0(0.0)	.	26	0.0(0.0)	.	0	-(-)	-
사무직	26	9.6(8.9)	92.7	26	9.6(8.9)	92.7	0	-(-)	-
판매·서비스직	20	5.8(5.5)	95.3	18	-(-)	-	2	-(-)	-
농림어업	21	11.7(5.8)	49.7	21	11.7(5.8)	49.7	0	-(-)	-
기능단순노무직	54	7.2(3.8)	53.1	54	7.2(3.8)	53.1	0	-(-)	-
기타 ³⁾	27	9.1(8.6)	94.8	22	10.1(9.6)	94.2	5	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 이하	28	17.6(9.9)	56.2	26	18.5(10.4)	56.0	2	-(-)	-
101-200만원	28	0.0(0.0)	.	27	0.0(0.0)	.	1	-(-)	-
201-300만원	31	5.0(3.4)	68.6	30	5.1(3.5)	68.4	1	-(-)	-
301-400만원	33	10.2(5.8)	57.2	31	10.5(6.0)	57.1	2	-(-)	-
401만원 이상	52	5.4(5.2)	96.8	51	5.4(5.3)	96.7	1	-(-)	-

: 1) 흡연자의 1개월 내 금연계획률 : (현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 중 1개월(30일) 내 금연계획이 있는 사람의 수 / 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 19> 현재 흡연자의 금연권고 경험률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
연령	173	75.6(4.3)	5.6	166	75.7(4.4)	5.8	7	-(-)	-
19-29	7	-(-)	-	7	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	27	69.9(9.4)	13.4	27	69.9(9.4)	13.4	0	-(-)	-
40-49	50	80.7(5.8)	7.2	48	81.3(5.9)	7.2	2	-(-)	-
50-59	53	78.9(5.7)	7.3	52	78.5(5.8)	7.4	1	-(-)	-
60-69	22	70.2(7.8)	11.1	20	72.1(8.3)	11.6	2	-(-)	-
70 이상	14	-(-)	-	12	-(-)	-	2	-(-)	-
생애주기별									
19-64	147	76.1(4.6)	6.0	143	76.1(4.6)	6.1	4	-(-)	-
65 이상	26	70.6(7.7)	10.9	23	71.2(8.1)	11.3	3	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	6	-(-)	-	4	-(-)	-	2	-(-)	-
초등학교	13	-(-)	-	12	-(-)	-	1	-(-)	-
중학교	19	-(-)	-	17	-(-)	-	2	-(-)	-
고등학교	87	76.9(5.2)	6.8	85	77.2(5.3)	6.9	2	-(-)	-
대학교 이상	48	73.8(7.3)	9.9	48	73.8(7.3)	9.9	0	-(-)	-
직업									
전문행정관리	25	71.8(10.2)	14.2	25	71.8(10.2)	14.2	0	-(-)	-
사무직	26	73.3(12.4)	16.9	26	73.3(12.4)	16.9	0	-(-)	-
판매·서비스직	20	81.2(8.8)	10.9	18	-(-)	-	2	-(-)	-
농림어업	21	65.5(10.0)	15.3	21	65.5(10.0)	15.3	0	-(-)	-
기능단순노무직	54	80.9(5.7)	7.0	54	80.9(5.7)	7.0	0	-(-)	-
기타 ³⁾	27	72.4(9.4)	13.0	22	73.9(10.3)	14.0	5	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 이하	28	63.8(11.4)	17.8	26	62.0(11.8)	19.0	2	-(-)	-
101-200만원	28	78.3(9.0)	11.5	27	79.7(9.3)	11.6	1	-(-)	-
201-300만원	30	74.8(7.1)	9.5	29	74.2(7.1)	9.6	1	-(-)	-
301-400만원	33	70.3(8.0)	11.4	31	71.0(8.3)	11.7	2	-(-)	-
401만원 이상	52	81.7(6.3)	7.8	51	81.5(6.4)	7.8	1	-(-)	-

1) 현재 흡연자의 금연권고 경험률 : (주위 사람들로부터 담배를 끊거나 줄이라는 말을 “항상” 또는 “대체로” 듣는 사람의 수 / 현재 흡연자 (“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 20> 금연클리닉·금연상담전화 인지율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	888	52.4(2.1)	4.0	384	59.7(2.7)	4.6	504	44.6(2.5)	5.5
연령									
19-29	78	55.0(5.1)	9.3	33	67.4(6.4)	9.6	45	39.8(6.7)	16.8
30-39	126	57.7(5.7)	9.9	51	55.7(6.9)	12.5	75	59.9(7.4)	12.3
40-49	207	65.1(3.4)	5.3	91	71.9(4.9)	6.8	116	57.3(4.7)	8.2
50-59	184	50.3(4.3)	8.5	92	56.4(4.3)	7.7	92	43.1(6.5)	15.0
60-69	122	43.8(5.2)	11.9	50	54.6(7.3)	13.3	72	34.8(5.7)	16.4
70 이상	171	18.9(3.4)	18.2	67	30.7(5.8)	18.9	104	10.0(2.8)	27.8
생애주기별									
19-64	672	57.1(2.2)	3.9	298	63.0(2.9)	4.6	374	50.4(2.8)	5.6
65 이상	216	22.7(3.3)	14.5	86	34.9(5.2)	14.9	130	13.4(3.0)	22.4
교육수준 ²⁾									
무학	105	18.7(4.0)	21.4	24	19.8(8.1)	40.7	81	18.4(4.3)	23.4
초등학교	125	27.1(4.0)	14.8	44	35.1(7.1)	20.3	81	21.5(5.1)	23.9
중학교	78	51.7(7.5)	14.6	33	58.4(9.8)	16.8	45	46.5(10.2)	22.0
고등학교	357	54.2(2.3)	4.3	180	59.1(2.8)	4.7	177	47.6(3.7)	7.8
대학교 이상	223	63.7(4.6)	7.3	103	69.8(7.1)	10.2	120	56.7(6.3)	11.2
직업									
전문행정관리	104	62.9(5.1)	8.1	46	63.8(7.0)	11.0	58	62.0(7.0)	11.2
사무직	78	69.7(6.4)	9.2	52	76.3(7.4)	9.7	26	50.9(10.5)	20.6
판매·서비스직	108	53.1(3.8)	7.2	32	66.2(7.9)	11.9	76	46.0(5.5)	11.9
농림어업	68	46.5(5.5)	11.9	47	51.9(7.6)	14.6	21	34.2(9.9)	29.0
기능단순노무직	154	48.7(4.0)	8.3	114	49.9(4.0)	8.0	40	43.8(9.0)	20.6
기타 ³⁾	375	44.9(3.1)	6.9	92	57.0(5.5)	9.6	283	39.3(3.1)	8.0
월 가구소득									
100만원 이하	192	38.1(4.1)	10.7	71	51.2(6.6)	13.0	121	28.4(4.7)	16.5
101-200만원	141	50.2(5.9)	11.7	57	54.6(8.3)	15.1	84	46.4(6.4)	13.8
201-300만원	112	55.1(5.0)	9.0	57	65.5(8.4)	12.8	55	41.0(7.5)	18.3
301-400만원	158	58.4(5.5)	9.4	71	60.8(7.1)	11.7	87	55.6(5.9)	10.6
401만원 이상	281	53.8(2.4)	4.4	126	60.2(3.7)	6.1	155	46.4(3.7)	7.9

: 1) 금연클리닉·금연상담전화 인지율 : (금연클리닉 또는 금연상담전화에 있다는 것을 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 21> 현재 흡연자의 금연클리닉·금연상담전화 이용률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	105	7.5(2.5)	33.2	102	7.6(2.5)	33.1	3	—(—)	—
연령									
19-29	5	—(—)	—	5	—(—)	—	0	—(—)	—
30-39	14	—(—)	—	14	—(—)	—	0	—(—)	—
40-49	36	2.8(2.7)	96.6	35	2.9(2.8)	96.5	1	—(—)	—
50-59	31	12.4(5.6)	45.0	30	12.7(5.7)	45.2	1	—(—)	—
60-69	14	—(—)	—	13	—(—)	—	1	—(—)	—
70 이상	5	—(—)	—	5	—(—)	—	0	—(—)	—
생애주기별									
19-64	94	7.0(2.6)	36.8	92	7.1(2.6)	36.8	2	—(—)	—
65 이상	11	—(—)	—	10	—(—)	—	1	—(—)	—
교육수준 ²⁾									
무학	2	—(—)	—	2	—(—)	—	0	—(—)	—
초등학교	6	—(—)	—	5	—(—)	—	1	—(—)	—
중학교	13	—(—)	—	11	—(—)	—	2	—(—)	—
고등학교	49	10.6(4.5)	42.8	49	10.6(4.5)	42.8	0	—(—)	—
대학교 이상	35	1.1(1.1)	100.4	35	1.1(1.1)	100.4	0	—(—)	—
직업									
전문행정관리	17	—(—)	—	17	—(—)	—	0	—(—)	—
사무직	20	11.2(7.3)	65.1	20	11.2(7.3)	65.1	0	—(—)	—
판매·서비스직	14	—(—)	—	12	—(—)	—	2	—(—)	—
농림어업	15	—(—)	—	15	—(—)	—	0	—(—)	—
기능단순노무직	28	10.5(4.6)	43.9	28	10.5(4.6)	43.9	0	—(—)	—
기타 ³⁾	11	—(—)	—	10	—(—)	—	1	—(—)	—
월 가구소득									
100만원 이하	17	—(—)	—	17	—(—)	—	0	—(—)	—
101-200만원	18	—(—)	—	17	—(—)	—	1	—(—)	—
201-300만원	19	—(—)	—	18	—(—)	—	1	—(—)	—
301-400만원	17	—(—)	—	17	—(—)	—	0	—(—)	—
401만원 이상	33	7.4(5.6)	76.0	32	7.5(5.7)	76.0	1	—(—)	—

1) 현재 흡연자의 금연클리닉·금연상담전화 이용률 : (최근 1년 동안 금연클리닉, 금연상담전화를 이용한 사람의 수 / 현재 흡연자 중 금연클리닉, 금연상담전화에 있는 것을 알고 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 22> 가정실내 간접흡연 노출률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	14.7(2.2)	15.0	393	12.2(2.3)	18.5	525	17.3(2.9)	17.0
연령									
19-29	78	14.1(4.7)	33.3	33	11.6(5.5)	47.0	45	17.2(6.1)	35.5
30-39	128	23.4(4.8)	20.4	52	20.8(6.0)	29.0	76	26.0(5.8)	22.1
40-49	208	12.2(3.2)	25.9	91	11.4(4.0)	34.7	117	13.0(4.4)	34.2
50-59	189	12.9(3.2)	25.1	93	6.0(2.1)	35.1	96	20.8(5.5)	26.6
60-69	128	11.9(2.6)	22.0	51	13.4(4.4)	33.2	77	10.7(3.5)	32.5
70 이상	187	10.5(2.9)	27.2	73	9.6(4.0)	41.3	114	11.2(3.1)	27.4
생애주기별									
19-64	682	15.3(2.5)	16.4	300	12.1(2.5)	20.8	382	18.7(3.4)	18.1
65 이상	236	11.5(2.5)	21.5	93	13.1(3.6)	27.2	143	10.2(2.6)	25.6
교육수준 ²⁾									
무학	114	9.0(3.1)	34.0	24	4.4(4.1)	94.4	90	10.3(3.3)	31.8
초등학교	134	10.2(2.6)	25.0	47	9.3(3.5)	37.1	87	10.9(3.1)	28.1
중학교	81	20.3(4.6)	22.9	34	17.7(5.8)	32.8	47	22.2(7.1)	32.1
고등학교	365	15.1(2.7)	17.5	185	11.2(2.8)	24.8	180	20.4(4.5)	22.1
대학교 이상	224	15.4(3.6)	23.3	103	14.3(4.2)	29.4	121	16.6(4.6)	27.9
직업									
전문행정관리	104	19.0(5.1)	26.9	46	12.6(5.9)	46.9	58	25.6(7.4)	29.1
사무직	78	13.1(4.2)	31.8	52	14.2(5.5)	38.9	26	10.2(5.4)	53.3
판매·서비스직	112	12.2(3.1)	25.5	33	5.0(3.3)	65.9	79	16.1(4.3)	26.7
농림어업	70	17.2(4.8)	27.8	48	16.6(5.2)	31.4	22	18.7(10.2)	54.5
기능단순노무직	157	15.5(3.7)	23.9	115	13.5(4.4)	32.5	42	23.3(7.5)	32.2
기타 ³⁾	396	13.2(2.8)	21.6	98	8.5(3.1)	36.8	298	15.4(3.7)	23.8
월 가구소득									
100만원 이하	204	16.8(3.7)	21.8	75	15.8(6.1)	38.9	129	17.6(4.4)	25.1
101-200만원	151	13.3(3.8)	28.3	60	11.1(5.0)	44.8	91	15.2(5.2)	34.0
201-300만원	114	16.5(5.8)	35.5	58	19.6(8.5)	43.5	56	12.1(4.7)	38.6
301-400만원	160	16.6(4.5)	27.1	71	12.9(4.6)	35.9	89	20.7(5.6)	27.2
401만원 이상	282	12.7(3.7)	28.9	126	8.1(3.3)	40.8	156	18.0(5.5)	30.8

1) 가정실내 간접흡연 노출률 : (가정실내 다른 사람이 피우는 담배연기로 인한 간접흡연 경험자("1시간 미만" 또는 "1시간 이상")의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 23> 가정실내 간접흡연 노출시간¹⁾

(: %)

	N	0시간		1시간 미만		1시간 이상	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
성	918	85.3(2.2)	2.6	11.8(2.1)	17.7	2.9(0.7)	25.6
남자	393	87.8(2.3)	2.6	8.1(2.0)	24.1	4.1(1.1)	27.4
여자	525	82.7(2.9)	3.5	15.7(2.8)	17.9	1.6(0.6)	40.0
연령							
19-29	78	85.9(4.7)	5.5	11.6(4.3)	36.8	2.5(2.5)	96.8
30-39	128	76.6(4.8)	6.2	19.4(4.4)	22.6	3.9(1.8)	46.5
40-49	208	87.8(3.2)	3.6	9.7(2.9)	29.3	2.4(1.6)	65.2
50-59	189	87.1(3.2)	3.7	9.1(2.9)	31.5	3.8(1.3)	35.0
60-69	128	88.1(2.6)	3.0	10.1(2.7)	26.5	1.8(0.2)	9.6
70 이상	187	89.5(2.9)	3.2	9.0(2.5)	27.9	1.6(0.9)	56.7
생애주기별							
19-64	682	84.7(2.5)	3.0	12.2(2.4)	19.5	3.1(0.9)	28.1
65 이상	236	88.5(2.5)	2.8	9.7(2.2)	22.8	1.8(0.7)	39.4
교육수준 ²⁾							
무학	114	91.0(3.1)	3.4	8.4(3.1)	37.3	0.6(0.6)	97.2
초등학교	134	89.8(2.6)	2.8	7.9(2.4)	30.7	2.4(0.8)	33.1
중학교	81	79.7(4.6)	5.8	16.3(4.9)	30.0	4.0(2.2)	54.7
고등학교	365	84.9(2.7)	3.1	12.5(2.6)	20.5	2.6(0.9)	35.1
대학교 이상	224	84.6(3.6)	4.2	11.8(3.3)	28.0	3.6(1.6)	43.0
직업							
전문행정관리	104	81.0(5.1)	6.3	17.9(5.1)	28.2	1.0(1.0)	99.8
사무직	78	86.9(4.2)	4.8	9.0(3.2)	35.5	4.1(3.0)	72.5
판매·서비스직	112	87.8(3.1)	3.5	10.9(3.0)	27.3	1.3(0.8)	59.8
농림어업	70	82.8(4.8)	5.8	10.1(3.5)	34.3	7.1(3.3)	46.4
기능단순노무직	157	84.5(3.7)	4.4	11.6(2.8)	24.5	3.9(1.9)	48.9
기타 ³⁾	396	86.8(2.8)	3.3	10.6(2.6)	24.2	2.6(0.9)	36.3
월 가구소득							
100만원 이하	204	83.2(3.7)	4.4	14.0(3.2)	22.6	2.8(1.3)	45.7
101-200만원	151	86.7(3.8)	4.3	9.1(3.6)	40.0	4.2(2.0)	47.5
201-300만원	114	83.5(5.8)	7.0	11.7(4.8)	41.1	4.8(2.7)	55.7
301-400만원	160	83.4(4.5)	5.4	14.4(4.0)	27.5	2.2(1.2)	54.8
401만원 이상	282	87.3(3.7)	4.2	11.0(3.4)	30.4	1.7(1.4)	82.4

: 1) 가정실내 간접흡연 노출시간 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 24> 직장실내 간접흡연 노출률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	671	30.8(2.8)	9.0	337	40.2(4.0)	10.0	334	17.6(2.2)	12.6
연령									
19-29	63	23.4(6.3)	26.8	29	26.1(10.1)	38.5	34	19.4(7.2)	37.2
30-39	102	40.4(4.7)	11.7	50	48.4(5.6)	11.6	52	28.2(6.1)	21.8
40-49	176	39.8(3.1)	7.8	89	59.7(4.1)	6.9	87	10.4(2.4)	22.8
50-59	160	28.4(3.3)	11.5	91	31.8(5.0)	15.8	69	23.1(4.0)	17.3
60-69	79	16.8(3.7)	22.1	40	23.9(6.0)	25.3	39	8.8(3.8)	43.5
70 이상	91	6.4(3.5)	54.9	38	5.6(3.8)	68.4	53	7.0(4.0)	57.2
생애주기별									
19-64	552	33.3(3.0)	9.0	285	42.7(4.3)	10.1	267	19.3(2.5)	12.9
65 이상	119	7.6(2.8)	37.0	52	10.0(4.3)	43.2	67	5.5(3.0)	55.9
교육수준 ²⁾									
무학	57	4.1(2.8)	68.1	15	-(-)	-	42	5.5(3.7)	67.7
초등학교	74	12.4(3.5)	28.5	28	12.5(6.6)	52.3	46	12.2(3.9)	32.3
중학교	57	27.0(5.6)	20.7	26	29.0(7.7)	26.6	31	25.4(6.9)	27.2
고등학교	288	37.1(4.4)	11.9	170	46.8(5.2)	11.0	118	18.1(4.2)	23.1
대학교 이상	195	29.9(2.8)	9.4	98	37.7(5.2)	13.8	97	19.3(4.0)	21.0
직업									
전문행정관리	102	30.5(6.2)	20.4	45	39.5(9.3)	23.4	57	21.2(7.1)	33.3
사무직	77	41.1(4.8)	11.7	51	46.1(5.8)	12.5	26	27.3(9.0)	33.0
판매·서비스직	108	28.4(4.0)	14.3	33	40.6(8.6)	21.2	75	21.5(4.8)	22.4
농림어업	43	16.3(5.8)	35.7	33	21.0(7.0)	33.3	10	-(-)	-
기능단순노무직	151	49.6(3.7)	7.4	113	55.0(4.2)	7.7	38	26.2(6.3)	24.0
기타 ³⁾	189	9.2(2.8)	31.0	61	10.3(4.5)	43.6	128	8.3(2.9)	34.8
월 가구소득									
100만원 이하	116	15.1(5.5)	36.1	48	22.7(8.0)	35.3	68	8.6(5.1)	59.7
101-200만원	101	30.1(5.1)	16.9	46	38.4(7.9)	20.6	55	20.3(5.4)	26.6
201-300만원	87	39.2(5.9)	15.1	51	50.9(6.3)	12.3	36	15.4(6.3)	41.3
301-400만원	130	38.0(5.5)	14.4	68	46.5(9.0)	19.3	62	26.3(7.2)	27.2
401만원 이상	231	28.7(3.9)	13.6	122	37.5(5.0)	13.4	109	14.6(3.1)	20.9

1) 직장실내 간접흡연 노출률 : (직장실내 다른 사람이 피우는 담배연기로 인한 간접흡연 경험자("1시간 미만" 또는 "1시간 이상")의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 25> 직장실내 간접흡연 노출시간¹⁾

(: %)

	N	0시간		1시간 미만		1시간 이상	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
성	671	69.2(2.8)	4.0	25.5(2.9)	11.5	5.4(1.0)	18.2
남자	337	59.8(4.0)	6.7	32.3(4.4)	13.5	7.9(1.6)	20.2
여자	334	82.4(2.2)	2.7	15.8(2.1)	13.3	1.8(0.7)	41.2
연령							
19-29	63	76.6(6.3)	8.2	20.0(5.8)	29.0	3.3(2.6)	76.7
30-39	102	59.6(4.7)	7.9	34.7(5.5)	15.8	5.8(2.2)	38.8
40-49	176	60.2(3.1)	5.2	32.2(3.3)	10.3	7.7(2.8)	36.2
50-59	160	71.6(3.3)	4.6	23.3(3.2)	13.8	5.1(1.9)	37.2
60-69	79	83.2(3.7)	4.5	11.5(3.4)	29.8	5.4(1.9)	35.4
70 이상	91	93.6(3.5)	3.7	5.3(3.1)	59.7	1.1(1.1)	98.9
생애주기별							
19-64	552	66.7(3.0)	4.5	27.6(3.2)	11.5	5.7(1.1)	19.2
65 이상	119	92.4(2.8)	3.0	5.7(2.6)	46.4	1.9(0.9)	45.2
교육수준 ²⁾							
무학	57	95.9(2.8)	2.9	4.1(2.8)	68.1	0.0(0.0)	.
초등학교	74	87.6(3.5)	4.0	8.2(3.3)	40.5	4.2(1.4)	32.8
중학교	57	73.0(5.6)	7.6	17.5(5.4)	30.7	9.5(3.6)	37.9
고등학교	288	62.9(4.4)	7.0	30.0(4.8)	16.1	7.1(1.7)	24.4
대학교 이상	195	70.1(2.8)	4.0	26.9(3.2)	11.9	3.0(1.5)	49.4
직업							
전문행정관리	102	69.5(6.2)	9.0	26.3(6.3)	23.9	4.2(1.6)	37.2
사무직	77	58.9(4.8)	8.1	32.6(4.2)	13.0	8.5(3.7)	44.0
판매·서비스직	108	71.6(4.0)	5.7	24.4(4.6)	18.8	4.0(2.2)	55.3
농림어업	43	83.7(5.8)	7.0	11.6(4.6)	39.5	4.8(3.3)	70.3
기능단순노무직	151	50.4(3.7)	7.3	41.2(4.5)	11.0	8.4(3.1)	36.4
기타 ³⁾	189	90.8(2.8)	3.1	7.0(2.7)	38.4	2.1(1.0)	48.3
월 가구소득							
100만원 이하	116	84.9(5.5)	6.4	10.5(4.5)	43.2	4.7(2.2)	46.8
101-200만원	101	69.9(5.1)	7.2	25.0(5.2)	20.7	5.1(2.5)	49.4
201-300만원	87	60.8(5.9)	9.7	33.1(6.3)	19.0	6.1(4.2)	68.9
301-400만원	130	62.0(5.5)	8.8	33.3(5.2)	15.6	4.8(2.3)	49.0
401만원 이상	231	71.3(3.9)	5.5	23.4(3.9)	16.7	5.4(1.4)	26.5

: 1) 직장실내 간접흡연 노출시간 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 26> 공공장소 간접흡연 노출률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
연령	915	83.7(1.8)	2.1	392	84.4(2.4)	2.8	523	83.0(1.8)	2.1
19-29	78	97.0(1.7)	1.8	33	97.8(2.1)	2.2	45	96.0(2.8)	2.9
30-39	128	83.6(5.5)	6.6	52	78.0(8.3)	10.6	76	89.4(3.5)	3.9
40-49	208	88.9(3.0)	3.4	91	86.6(3.7)	4.2	117	91.5(3.2)	3.5
50-59	188	81.3(3.0)	3.7	92	81.5(4.2)	5.1	96	81.0(3.7)	4.6
60-69	128	77.8(4.0)	5.2	51	83.6(4.6)	5.5	77	73.2(6.0)	8.2
70 이상	185	62.2(4.6)	7.5	73	73.9(5.3)	7.2	112	53.3(5.9)	11.1
생애주기별									
19-64	681	86.9(1.8)	2.1	299	85.8(2.5)	3.0	382	88.1(1.7)	1.9
65 이상	234	64.7(3.8)	5.9	93	73.8(4.8)	6.5	141	57.8(5.1)	8.8
교육수준 ²⁾									
무학	112	60.5(5.8)	9.7	24	66.5(10.2)	15.4	88	58.8(6.3)	10.7
초등학교	134	71.3(4.2)	5.8	47	75.1(6.2)	8.3	87	68.7(5.3)	7.7
중학교	81	75.4(5.5)	7.3	34	75.4(7.9)	10.5	47	75.4(6.5)	8.6
고등학교	364	89.4(1.8)	2.0	184	88.4(2.4)	2.7	180	90.6(2.4)	2.7
대학교 이상	224	85.6(4.3)	5.0	103	82.9(5.9)	7.1	121	88.6(3.5)	3.9
직업									
전문행정관리	104	88.6(4.5)	5.1	46	85.1(6.6)	7.8	58	92.3(3.4)	3.7
사무직	78	88.7(3.7)	4.2	52	87.1(4.8)	5.5	26	93.1(4.5)	4.8
판매·서비스직	112	86.4(3.5)	4.0	33	84.0(5.9)	7.1	79	87.7(3.6)	4.1
농림어업	70	67.0(6.4)	9.6	48	67.4(7.1)	10.5	22	66.1(13.2)	20.0
기능단순노무직	156	82.9(3.7)	4.5	114	82.7(4.4)	5.3	42	83.7(5.8)	6.9
기타 ³⁾	394	82.0(2.2)	2.7	98	88.9(3.2)	3.6	296	78.8(2.6)	3.3
월 가구소득									
100만원 이하	203	70.9(4.0)	5.6	75	72.8(6.1)	8.3	128	69.5(4.7)	6.7
101-200만원	150	78.1(4.7)	6.0	60	77.4(7.3)	9.4	90	78.8(4.0)	5.1
201-300만원	114	81.6(3.0)	3.7	58	81.5(4.8)	5.9	56	81.8(3.3)	4.1
301-400만원	160	87.5(3.2)	3.6	71	86.3(4.3)	5.0	89	88.8(3.4)	3.8
401만원 이상	282	89.6(3.0)	3.3	126	90.3(3.4)	3.7	156	88.9(3.4)	3.8

: 1) 공공장소 간접흡연 노출률 : (공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기로 인한 간접흡연 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 27> 금연캠페인 경험률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	911	77.8(2.4)	3.1	391	79.2(3.3)	4.2	520	76.4(2.0)	2.6
연령									
19-29	78	91.2(3.9)	4.3	33	86.8(5.4)	6.2	45	96.6(2.5)	2.6
30-39	128	83.6(4.3)	5.1	52	82.9(6.9)	8.3	76	84.4(2.8)	3.3
40-49	208	87.6(2.5)	2.9	91	88.0(3.7)	4.2	117	87.1(3.0)	3.4
50-59	189	78.8(2.8)	3.5	93	77.2(3.5)	4.6	96	80.7(3.4)	4.2
60-69	128	57.9(5.0)	8.7	51	68.9(7.1)	10.3	77	49.3(6.1)	12.4
70 이상	180	38.7(4.2)	10.9	71	44.5(6.7)	15.1	109	34.4(4.6)	13.3
생애주기별									
19-64	682	83.9(2.3)	2.8	300	83.4(3.3)	3.9	382	84.6(1.8)	2.1
65 이상	229	41.1(3.5)	8.6	91	48.4(5.8)	12.0	138	35.6(3.7)	10.5
교육수준 ²⁾									
무학	110	45.0(4.8)	10.7	24	57.8(9.3)	16.1	86	41.5(4.7)	11.2
초등학교	132	45.6(5.4)	11.9	46	52.2(8.8)	16.8	86	41.1(4.6)	11.2
중학교	81	79.2(4.5)	5.7	34	80.4(6.4)	8.0	47	78.4(6.3)	8.0
고등학교	364	81.1(2.3)	2.8	184	81.1(2.6)	3.2	180	81.2(2.7)	3.3
대학교 이상	224	88.8(3.8)	4.3	103	83.7(6.4)	7.6	121	94.6(2.0)	2.1
직업									
전문행정관리	104	86.7(5.6)	6.4	46	78.2(8.6)	11.0	58	95.5(2.7)	2.9
사무직	78	87.7(5.5)	6.3	52	88.0(7.2)	8.1	26	86.9(5.2)	5.9
판매·서비스직	112	74.4(4.2)	5.7	33	80.8(6.3)	7.7	79	71.0(4.8)	6.8
농림어업	70	57.0(7.2)	12.7	48	56.1(7.2)	12.8	22	59.0(13.0)	21.9
기능단순노무직	157	80.3(2.7)	3.4	115	80.3(3.0)	3.7	42	80.6(5.0)	6.2
기타 ³⁾	389	73.9(2.3)	3.1	96	77.7(4.8)	6.2	293	72.2(2.5)	3.5
월 가구소득									
100만원 이하	202	54.8(3.7)	6.7	74	59.6(6.3)	10.6	128	51.3(3.7)	7.2
101-200만원	148	74.9(4.1)	5.5	59	74.5(6.7)	8.9	89	75.2(5.1)	6.8
201-300만원	113	82.2(4.6)	5.6	58	84.0(5.6)	6.7	55	79.7(4.8)	6.0
301-400만원	160	82.4(3.1)	3.8	71	85.5(4.4)	5.1	89	79.0(3.8)	4.9
401만원 이상	281	84.4(3.5)	4.2	126	81.5(5.4)	6.6	155	87.8(2.7)	3.0

: 1) 금연캠페인 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 금연에 대한 공익광고(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 28> 금연교육 경험률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	8.6(1.1)	12.9	393	12.5(1.9)	15.3	525	4.5(1.0)	21.6
연령									
19-29	78	13.6(3.6)	26.6	33	16.8(5.3)	31.4	45	9.6(4.0)	41.7
30-39	128	13.1(3.1)	23.6	52	17.9(4.6)	25.7	76	8.0(4.3)	53.2
40-49	208	8.0(1.7)	21.6	91	11.7(3.3)	27.8	117	3.7(1.5)	41.2
50-59	189	5.9(1.1)	18.9	93	9.3(2.4)	25.8	96	1.9(2.0)	101.1
60-69	128	3.4(1.6)	45.6	51	5.3(2.8)	52.9	77	2.0(1.2)	58.7
70 이상	187	3.1(1.5)	50.2	73	7.2(3.5)	49.1	114	0.0(0.0)	.
생애주기별									
19-64	682	9.5(1.3)	13.4	300	13.3(2.2)	16.3	382	5.2(1.2)	22.2
65 이상	236	3.5(1.2)	35.2	93	6.7(2.9)	43.0	143	1.1(0.6)	57.3
교육수준 ²⁾									
무학	114	2.8(1.4)	50.0	24	13.4(6.7)	49.7	90	0.0(0.0)	.
초등학교	134	1.3(0.9)	72.8	47	1.8(1.8)	99.1	87	0.9(0.9)	100.5
중학교	81	5.9(2.9)	49.8	34	13.7(6.8)	49.4	47	0.0(0.0)	.
고등학교	365	8.8(1.4)	15.8	185	11.5(2.1)	18.2	180	5.2(1.5)	28.5
대학교 이상	224	12.3(2.6)	20.8	103	16.3(4.2)	26.0	121	7.7(3.1)	39.9
직업									
전문행정관리	104	9.2(3.4)	36.3	46	10.6(4.3)	40.4	58	7.8(3.6)	45.8
사무직	78	11.6(3.1)	26.9	52	13.1(4.7)	36.1	26	7.5(4.2)	56.6
판매·서비스직	112	7.7(3.3)	43.1	33	9.1(6.0)	66.3	79	7.0(3.4)	48.6
농림어업	70	4.7(2.7)	56.6	48	5.5(3.6)	64.4	22	2.9(3.0)	102.6
기능단순노무직	157	13.7(2.0)	14.5	115	17.0(2.5)	14.9	42	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	396	5.6(1.7)	29.9	98	10.7(4.3)	40.3	298	3.3(1.5)	45.2
월 가구소득									
100만원 이하	204	4.4(1.5)	32.8	75	6.8(3.0)	44.2	129	2.7(1.7)	64.9
101-200만원	151	5.8(2.3)	39.9	60	12.4(4.8)	38.9	91	0.0(0.0)	.
201-300만원	114	6.3(2.1)	33.2	58	9.1(2.8)	30.7	56	2.5(2.0)	80.5
301-400만원	160	11.6(2.3)	19.5	71	17.8(4.8)	26.9	89	4.6(2.6)	56.5
401만원 이상	282	10.8(2.2)	20.6	126	13.2(3.4)	26.0	156	8.1(2.7)	33.6

1) 금연교육 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 29> 현재 흡연자의 금연교육 경험률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
연령	174	16.6(2.9)	17.7	167	16.9(3.0)	17.9	7	-(-)	-
19-29	7	-(-)	-	7	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	27	17.1(5.3)	31.3	27	17.1(5.3)	31.3	0	-(-)	-
40-49	50	14.4(4.6)	31.7	48	14.7(4.7)	31.7	2	-(-)	-
50-59	54	13.3(4.3)	32.1	53	13.5(4.3)	32.1	1	-(-)	-
60-69	22	8.8(5.6)	64.2	20	9.6(6.1)	63.8	2	-(-)	-
70 이상	14	-(-)	-	12	-(-)	-	2	-(-)	-
생애주기별									
19-64	148	16.8(3.1)	18.7	144	17.1(3.2)	18.8	4	-(-)	-
65 이상	26	13.3(6.6)	49.7	23	14.8(7.3)	49.3	3	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	6	-(-)	-	4	-(-)	-	2	-(-)	-
초등학교	13	-(-)	-	12	-(-)	-	1	-(-)	-
중학교	19	-(-)	-	17	-(-)	-	2	-(-)	-
고등학교	88	17.4(3.4)	19.6	86	17.6(3.5)	19.7	2	-(-)	-
대학교 이상	48	16.1(5.1)	31.9	48	16.1(5.1)	31.9	0	-(-)	-
직업									
전문행정관리	26	6.2(1.2)	19.2	26	6.2(1.2)	19.2	0	-(-)	-
사무직	26	15.0(8.5)	56.8	26	15.0(8.5)	56.8	0	-(-)	-
판매·서비스직	20	0.0(0.0)	.	18	-(-)	-	2	-(-)	-
농림어업	21	3.9(3.4)	85.5	21	3.9(3.4)	85.5	0	-(-)	-
기능단순노무직	54	30.1(6.1)	20.2	54	30.1(6.1)	20.2	0	-(-)	-
기타 ³⁾	27	20.0(8.9)	44.3	22	22.3(9.9)	44.4	5	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 이하	28	13.4(6.7)	50.1	26	14.1(7.1)	50.2	2	-(-)	-
101-200만원	28	17.2(7.5)	43.5	27	17.5(7.7)	44.1	1	-(-)	-
201-300만원	31	7.2(3.0)	42.4	30	7.4(3.1)	42.4	1	-(-)	-
301-400만원	33	9.5(4.0)	42.4	31	9.8(4.2)	43.2	2	-(-)	-
401만원 이상	52	27.3(8.4)	30.7	51	27.5(8.4)	30.7	1	-(-)	-

1) 현재 흡연자의 금연교육 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 30> 금연구역 인지율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	914	91.3(1.2)	1.3	393	95.1(1.1)	1.2	521	87.4(1.6)	1.8
연령									
19-29	78	98.8(1.2)	1.2	33	97.8(2.1)	2.2	45	100.0(0.0)	0.0
30-39	128	100.0(0.0)	0.0	52	100.0(0.0)	0.0	76	100.0(0.0)	0.0
40-49	208	98.8(0.9)	0.9	91	98.4(1.6)	1.6	117	99.4(0.6)	0.6
50-59	189	96.2(2.0)	2.1	93	95.8(2.6)	2.7	96	96.5(1.7)	1.8
60-69	128	83.4(3.9)	4.6	51	98.7(1.3)	1.3	77	71.3(5.7)	8.0
70 이상	183	46.1(3.9)	8.6	73	67.2(5.9)	8.7	110	29.8(4.3)	14.4
생애주기별									
19-64	682	97.9(0.6)	0.6	300	98.1(0.9)	0.9	382	97.7(0.6)	0.6
65 이상	232	52.1(4.2)	8.1	93	73.4(5.1)	6.9	139	35.6(4.8)	13.5
교육수준 ²⁾									
무학	111	39.3(4.0)	10.3	24	67.7(9.9)	14.6	87	31.4(4.4)	14.1
초등학교	133	63.9(5.2)	8.2	47	66.6(8.2)	12.3	86	61.9(5.9)	9.5
중학교	81	92.5(3.1)	3.3	34	97.2(2.9)	2.9	47	89.1(4.6)	5.2
고등학교	365	98.3(0.8)	0.8	185	97.2(1.3)	1.3	180	99.6(0.4)	0.4
대학교 이상	224	99.8(0.2)	0.2	103	100.0(0.0)	0.0	121	99.5(0.5)	0.5
직업									
전문행정관리	104	100.0(0.0)	0.0	46	100.0(0.0)	0.0	58	100.0(0.0)	0.0
사무직	78	100.0(0.0)	0.0	52	100.0(0.0)	0.0	26	100.0(0.0)	0.0
판매·서비스직	112	97.5(1.2)	1.2	33	100.0(0.0)	0.0	79	96.1(1.8)	1.9
농림어업	70	77.1(5.6)	7.3	48	81.0(4.6)	5.7	22	68.2(13.2)	19.4
기능단순노무직	157	94.2(2.1)	2.2	115	95.2(2.4)	2.5	42	89.7(4.1)	4.5
기타 ³⁾	392	83.8(2.0)	2.4	98	90.7(2.8)	3.1	294	80.7(2.5)	3.1
월 가구소득									
100만원 이하	204	65.3(3.4)	5.2	75	81.2(4.2)	5.2	129	53.7(4.5)	8.4
101-200만원	149	86.5(3.5)	4.0	60	85.4(5.6)	6.6	89	87.5(3.5)	4.0
201-300만원	113	98.8(0.9)	0.9	58	98.6(1.0)	1.0	55	99.1(0.9)	0.9
301-400만원	160	96.9(1.0)	1.1	71	98.6(1.0)	1.0	89	95.0(1.4)	1.5
401만원 이상	281	98.3(0.5)	0.5	126	99.6(0.4)	0.4	155	96.9(1.0)	1.0

1) 금연구역 인지율 : (금연구역이 “설정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다” 또는 “설정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수)×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 31> 금연구역 내 흡연 경험률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	86	21.8(5.6)	25.8	85	22.0(5.7)	26.1	1	—(—)	—
연령									
19-29	5	—(—)	—	5	—(—)	—	0	—(—)	—
30-39	13	—(—)	—	13	—(—)	—	0	—(—)	—
40-49	28	16.1(7.7)	48.1	27	16.4(8.0)	49.0	1	—(—)	—
50-59	31	15.4(5.4)	34.8	31	15.4(5.4)	34.8	0	—(—)	—
60-69	7	—(—)	—	7	—(—)	—	0	—(—)	—
70 이상	2	—(—)	—	2	—(—)	—	0	—(—)	—
생애주기별									
19-64	81	22.0(5.9)	27.0	80	22.2(6.0)	27.2	1	—(—)	—
65 이상	5	—(—)	—	5	—(—)	—	0	—(—)	—
교육수준 ²⁾									
무학	0	—(—)	—	0	—(—)	—	0	—(—)	—
초등학교	4	—(—)	—	4	—(—)	—	0	—(—)	—
중학교	7	—(—)	—	6	—(—)	—	1	—(—)	—
고등학교	47	25.0(5.3)	21.1	47	25.0(5.3)	21.1	0	—(—)	—
대학교 이상	28	19.4(10.3)	52.8	28	19.4(10.3)	52.8	0	—(—)	—
직업									
전문행정관리	20	16.5(10.8)	65.6	20	16.5(10.8)	65.6	0	—(—)	—
사무직	15	—(—)	—	15	—(—)	—	0	—(—)	—
판매·서비스직	11	—(—)	—	10	—(—)	—	1	—(—)	—
농림어업	6	—(—)	—	6	—(—)	—	0	—(—)	—
기능단순노무직	20	30.7(8.9)	29.1	20	30.7(8.9)	29.1	0	—(—)	—
기타 ³⁾	14	—(—)	—	14	—(—)	—	0	—(—)	—
월 가구소득									
100만원 이하	7	—(—)	—	7	—(—)	—	0	—(—)	—
101-200만원	14	—(—)	—	14	—(—)	—	0	—(—)	—
201-300만원	18	—(—)	—	18	—(—)	—	0	—(—)	—
301-400만원	20	31.7(11.0)	34.7	20	31.7(11.0)	34.7	0	—(—)	—
401만원 이상	25	24.6(11.0)	44.8	24	25.1(11.5)	46.0	1	—(—)	—

: 1) 금연구역 내 흡연 경험률 : (금연구역 내에서 “항상” 또는 “가끔” 흡연하는 사람의 수 / 금연구역이 설정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있는 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수)×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 32> 평생음주율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	70.8(1.9)	2.7	393	79.1(2.8)	3.6	525	62.1(1.9)	3.1
연령									
19-29	78	79.7(4.9)	6.2	33	78.4(6.7)	8.5	45	81.3(5.1)	6.3
30-39	128	74.2(4.8)	6.4	52	81.1(7.2)	8.8	76	66.9(4.5)	6.8
40-49	208	79.9(3.1)	3.9	91	83.0(4.0)	4.8	117	76.4(4.9)	6.4
50-59	189	64.5(3.4)	5.3	93	75.9(4.4)	5.8	96	51.5(4.9)	9.5
60-69	128	60.1(4.8)	7.9	51	74.8(5.4)	7.2	77	48.5(5.7)	11.7
70 이상	187	51.4(3.4)	6.7	73	75.3(4.9)	6.6	114	33.4(4.8)	14.4
생애주기별									
19-64	682	73.6(2.0)	2.7	300	79.5(3.2)	4.0	382	67.1(1.9)	2.8
65 이상	236	54.5(3.0)	5.5	93	76.2(4.4)	5.8	143	38.2(4.3)	11.2
교육수준 ²⁾									
무학	114	51.8(4.8)	9.3	24	63.6(8.6)	13.5	90	48.7(5.9)	12.1
초등학교	134	51.1(5.2)	10.2	47	74.6(6.4)	8.6	87	34.6(5.7)	16.4
중학교	81	64.2(4.7)	7.4	34	69.9(9.0)	12.9	47	59.9(6.6)	11.0
고등학교	365	78.1(2.7)	3.5	185	81.5(3.3)	4.0	180	73.6(3.3)	4.4
대학교 이상	224	70.9(2.7)	3.8	103	79.0(4.8)	6.1	121	61.7(4.6)	7.4
직업									
전문행정관리	104	66.2(6.9)	10.5	46	65.0(9.5)	14.6	58	67.3(6.5)	9.7
사무직	78	84.1(5.8)	6.9	52	89.8(6.4)	7.1	26	67.9(8.7)	12.8
판매·서비스직	112	78.2(3.4)	4.4	33	81.0(7.0)	8.6	79	76.6(4.0)	5.2
농림어업	70	65.8(6.5)	9.8	48	73.1(6.9)	9.5	22	49.1(11.4)	23.3
기능단순노무직	157	76.0(5.0)	6.6	115	81.2(5.2)	6.4	42	54.6(8.2)	15.0
기타 ³⁾	396	63.8(3.0)	4.8	98	77.1(5.4)	7.0	298	57.7(3.0)	5.2
월 가구소득									
100만원 이하	204	58.2(3.5)	6.1	75	78.4(4.8)	6.1	129	43.3(5.2)	12.0
101-200만원	151	71.0(4.2)	6.0	60	84.4(4.9)	5.8	91	59.3(5.5)	9.3
201-300만원	114	70.8(4.5)	6.4	58	74.6(5.4)	7.2	56	65.5(5.9)	9.0
301-400만원	160	74.0(5.0)	6.8	71	81.3(6.5)	8.0	89	66.0(5.8)	8.7
401만원 이상	282	73.8(4.4)	6.0	126	77.9(6.1)	7.8	156	69.0(3.2)	4.7

: 1) 평생음주율 : (지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 33> 연간음주율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
연령	918	64.1(1.9)	2.9	393	72.8(2.4)	3.3	525	54.9(2.4)	4.5
19-29	78	74.9(5.0)	6.7	33	75.3(6.4)	8.5	45	74.4(6.9)	9.3
30-39	128	69.4(4.5)	6.4	52	79.1(7.0)	8.8	76	59.1(4.9)	8.3
40-49	208	76.5(2.2)	2.8	91	80.3(3.4)	4.2	117	72.2(4.5)	6.2
50-59	189	59.0(3.5)	6.0	93	69.5(5.0)	7.1	96	47.0(4.4)	9.5
60-69	128	46.4(5.3)	11.4	51	59.5(6.6)	11.1	77	36.0(5.6)	15.7
70 이상	187	34.1(3.3)	9.7	73	51.7(6.5)	12.7	114	20.9(3.9)	18.5
생애주기별									
19-64	682	68.5(1.9)	2.7	300	75.3(2.6)	3.5	382	60.9(2.5)	4.1
65 이상	236	38.2(3.2)	8.3	93	54.8(6.0)	10.9	143	25.7(3.8)	14.6
교육수준 ²⁾									
무학	114	35.0(4.5)	12.7	24	51.3(8.8)	17.2	90	30.6(5.2)	17.1
초등학교	134	37.3(4.9)	13.1	47	53.1(7.9)	14.8	87	26.2(5.2)	19.9
중학교	81	56.1(5.1)	9.0	34	58.5(8.7)	14.9	47	54.3(7.5)	13.8
고등학교	365	72.9(2.6)	3.6	185	75.5(2.7)	3.6	180	69.3(3.9)	5.7
대학교 이상	224	66.5(3.0)	4.5	103	77.2(4.6)	6.0	121	54.5(5.4)	9.8
직업									
전문행정관리	104	58.5(6.7)	11.4	46	62.8(8.5)	13.6	58	54.0(7.4)	13.7
사무직	78	77.3(5.6)	7.2	52	83.5(6.5)	7.8	26	59.6(6.9)	11.5
판매·서비스직	112	77.2(3.4)	4.5	33	81.0(7.0)	8.6	79	75.2(4.0)	5.3
농림어업	70	52.8(6.7)	12.6	48	54.4(7.3)	13.4	22	49.1(11.4)	23.3
기능단순노무직	157	74.1(4.9)	6.6	115	80.1(5.2)	6.5	42	49.7(7.9)	15.9
기타 ³⁾	396	53.9(3.4)	6.2	98	63.1(5.9)	9.4	298	49.7(3.3)	6.7
월 가구소득									
100만원 이하	204	43.9(3.8)	8.7	75	59.6(6.1)	10.2	129	32.3(5.3)	16.5
101-200만원	151	62.5(4.1)	6.6	60	74.3(5.5)	7.4	91	52.2(5.4)	10.3
201-300만원	114	66.8(4.3)	6.4	58	72.4(5.3)	7.3	56	59.2(7.1)	12.1
301-400만원	160	67.1(5.4)	8.1	71	77.4(6.6)	8.5	89	55.9(6.6)	11.8
401만원 이상	282	70.1(3.5)	5.0	126	74.0(4.7)	6.3	156	65.7(3.3)	5.0

: 1) 연간음주율 : (최근 1년(365일) 동안 1회 이상 술을 마신 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 34> 월간음주율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	53.1(2.0)	3.8	393	65.5(2.5)	3.7	525	40.0(2.4)	6.0
연령									
19-29	78	66.6(5.1)	7.7	33	66.0(8.5)	13.0	45	67.3(7.6)	11.3
30-39	128	51.5(5.5)	10.6	52	69.1(7.0)	10.2	76	32.8(5.6)	17.0
40-49	208	68.2(2.3)	3.3	91	78.6(3.3)	4.2	117	56.3(3.7)	6.6
50-59	189	49.3(4.3)	8.7	93	61.2(6.1)	10.0	96	35.8(4.3)	12.1
60-69	128	32.5(4.7)	14.6	51	47.6(6.8)	14.2	77	20.6(4.8)	23.2
70 이상	187	25.8(3.3)	12.7	73	44.6(6.5)	14.6	114	11.7(3.5)	29.8
생애주기별									
19-64	682	57.5(2.2)	3.8	300	68.2(2.7)	4.0	382	45.7(2.5)	5.5
65 이상	236	26.9(2.9)	10.6	93	46.1(5.7)	12.4	143	12.4(3.4)	27.4
교육수준 ²⁾									
무학	114	23.2(4.5)	19.4	24	46.5(9.0)	19.4	90	16.9(4.9)	28.9
초등학교	134	27.3(4.3)	15.6	47	46.3(7.7)	16.6	87	14.0(3.1)	21.8
중학교	81	42.6(4.7)	11.0	34	46.9(8.1)	17.3	47	39.4(7.1)	17.9
고등학교	365	61.6(2.9)	4.8	185	67.8(3.4)	4.9	180	53.3(3.5)	6.5
대학교 이상	224	56.4(2.6)	4.6	103	71.1(4.2)	6.0	121	39.8(3.6)	9.0
직업									
전문행정관리	104	46.7(5.4)	11.6	46	55.8(7.6)	13.6	58	37.2(7.1)	19.1
사무직	78	68.9(5.6)	8.1	52	74.6(7.3)	9.8	26	52.9(6.2)	11.7
판매·서비스직	112	61.1(5.4)	8.9	33	72.2(8.3)	11.5	79	55.1(5.3)	9.6
농림어업	70	44.3(6.0)	13.5	48	49.5(8.1)	16.3	22	32.3(9.7)	30.1
기능단순노무직	157	69.1(5.1)	7.3	115	75.9(5.5)	7.2	42	41.4(8.2)	19.7
기타 ³⁾	396	40.4(3.6)	8.9	98	52.4(7.8)	14.9	298	35.0(2.8)	8.0
월 가구소득									
100만원 이하	204	35.5(4.2)	11.7	75	54.6(6.5)	11.9	129	21.4(4.7)	22.2
101-200만원	151	46.4(4.8)	10.3	60	62.3(5.6)	8.9	91	32.4(6.4)	19.9
201-300만원	114	53.0(4.1)	7.8	58	60.5(5.4)	8.8	56	42.8(6.9)	16.0
301-400만원	160	51.1(3.9)	7.6	71	64.7(6.2)	9.6	89	36.1(4.1)	11.4
401만원 이상	282	63.7(3.3)	5.1	126	72.1(4.1)	5.7	156	54.0(4.0)	7.4

: 1) 월간음주율 : (최근 1년(365일) 동안 한 달(30일)에 1회 이상 술을 마신 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 35> 음주시작연령¹⁾

(: 세)

	전체			남자			여자		
	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수
연령	606	22.2(0.3)	1.3	307	20.4(0.3)	1.3	299	24.5(0.5)	2.1
19-29	60	19.3(0.2)	1.0	25	19.5(0.4)	1.9	35	19.1(0.2)	0.9
30-39	96	20.0(0.4)	1.9	42	19.2(0.5)	2.6	54	20.9(0.5)	2.2
40-49	163	21.6(0.3)	1.5	75	20.3(0.3)	1.6	88	23.2(0.4)	1.8
50-59	121	23.1(0.6)	2.4	72	20.9(0.5)	2.3	49	26.7(1.0)	3.8
60-69	73	29.5(1.6)	5.4	37	23.5(2.0)	8.4	36	36.7(1.6)	4.4
70 이상	93	27.9(1.3)	4.7	56	21.8(0.9)	4.2	37	38.4(2.4)	6.2
생애주기별									
19-64	482	21.3(0.3)	1.4	235	20.2(0.3)	1.3	247	22.8(0.4)	1.9
65 이상	124	29.0(1.1)	3.8	72	22.1(0.8)	3.8	52	39.2(1.7)	4.3
교육수준 ²⁾									
무학	54	31.2(2.1)	6.7	15	—(—)	—	39	35.3(2.5)	7.1
초등학교	69	28.1(1.3)	4.8	38	21.6(0.8)	3.8	31	37.9(2.0)	5.4
중학교	49	23.8(1.0)	4.4	24	22.5(1.0)	4.6	25	24.9(1.8)	7.3
고등학교	275	21.5(0.3)	1.5	148	20.3(0.4)	1.8	127	23.2(0.5)	2.1
대학교 이상	159	20.3(0.3)	1.4	82	20.0(0.4)	2.0	77	20.6(0.4)	1.7
직업									
전문행정관리	68	21.2(0.7)	3.4	31	20.4(1.3)	6.3	37	22.0(0.7)	3.1
사무직	64	20.2(0.4)	2.1	46	19.6(0.2)	0.9	18	—(—)	—
판매·서비스직	87	23.8(0.9)	3.7	28	21.7(1.1)	5.0	59	24.9(1.1)	4.4
농림어업	46	20.6(0.7)	3.4	37	20.2(0.7)	3.7	9	—(—)	—
기능단순노무직	114	20.9(0.4)	1.7	91	20.3(0.4)	1.8	23	25.1(1.3)	5.3
기타 ³⁾	226	23.8(0.5)	2.0	73	20.9(0.6)	3.0	153	25.5(0.7)	2.8
월 가구소득									
100만원 이하	110	26.8(1.2)	4.3	58	21.4(0.8)	3.8	52	33.9(2.1)	6.2
101-200만원	100	22.5(0.8)	3.6	50	20.6(1.0)	4.7	50	24.9(1.3)	5.2
201-300만원	79	22.1(0.8)	3.7	44	20.3(1.0)	4.8	35	24.9(1.2)	5.0
301-400만원	111	21.2(0.5)	2.3	57	19.9(0.4)	2.1	54	23.1(0.7)	3.3
401만원 이상	201	21.1(0.3)	1.4	96	20.4(0.3)	1.2	105	22.1(0.5)	2.5

: 1) 음주시작연령 : 처음으로 술 1잔을 모두 마신 만 나이의 총 합 / 1잔 이상의 술을 마신 음주자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 36> 고위험음주율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	532	21.8(1.8)	8.4	273	33.1(3.1)	9.3	259	6.1(1.3)	22.2
연령									
19-29	57	17.3(4.5)	25.9	24	21.7(7.0)	32.2	33	11.9(5.0)	42.2
30-39	88	16.6(3.5)	21.1	41	27.1(6.0)	22.2	47	1.8(1.8)	100.7
40-49	156	29.5(4.9)	16.7	74	47.6(6.6)	13.9	82	6.6(2.7)	40.6
50-59	112	27.9(5.5)	19.7	66	39.8(7.2)	18.0	46	7.8(3.6)	46.7
60-69	56	12.9(4.2)	32.7	28	22.8(7.2)	31.6	28	0.0(0.0)	.
70 이상	63	8.5(2.8)	32.8	40	13.1(4.0)	30.7	23	0.0(0.0)	.
생애주기별									
19-64	444	22.9(1.9)	8.4	220	34.8(3.3)	9.6	224	6.6(1.5)	22.3
65 이상	88	10.0(3.3)	33.3	53	16.3(5.0)	31.0	35	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	36	5.2(3.6)	70.0	12	-(-)	-	24	0.0(0.0)	.
초등학교	51	8.5(3.8)	44.5	27	14.4(6.2)	42.9	24	0.0(0.0)	.
중학교	43	20.7(6.1)	29.6	20	27.7(9.1)	32.9	23	15.0(6.6)	44.1
고등학교	253	25.3(2.6)	10.1	135	36.7(3.8)	10.3	118	8.7(2.6)	30.1
대학교 이상	149	20.2(3.6)	17.8	79	31.9(5.6)	17.7	70	1.2(1.2)	101.3
직업									
전문행정관리	62	19.6(7.2)	36.7	30	32.7(12.7)	38.9	32	3.9(3.9)	98.3
사무직	60	29.2(5.5)	18.6	44	36.6(6.2)	17.0	16	-(-)	-
판매·서비스직	85	19.4(4.0)	20.6	28	40.6(10.2)	25.1	57	6.9(3.4)	49.0
농림어업	36	25.5(8.1)	31.6	27	31.9(8.9)	27.9	9	-(-)	-
기능단순노무직	110	30.6(4.4)	14.5	89	34.7(5.3)	15.3	21	3.5(3.6)	101.0
기타 ³⁾	178	13.9(3.0)	21.6	54	25.1(6.0)	23.8	124	7.3(2.2)	30.6
월 가구소득									
100만원 이하	79	11.4(4.9)	43.3	42	19.7(8.0)	40.3	37	0.0(0.0)	.
101-200만원	87	26.7(4.6)	17.2	42	39.7(7.2)	18.2	45	10.5(5.6)	53.5
201-300만원	72	20.2(5.5)	27.4	41	29.6(9.6)	32.3	31	4.5(3.4)	75.7
301-400만원	101	24.7(3.5)	14.3	54	32.6(5.1)	15.7	47	12.6(3.2)	25.5
401만원 이상	190	22.2(3.1)	13.8	92	36.8(5.7)	15.6	98	3.4(1.8)	52.6

: 1) 고위험음주율 : (최근 1년(365일) 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 37> 음주문제로 인한 상담경험률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
연령	531	0.4(0.3)	69.5	273	0.7(0.5)	70.7	258	0.0(0.0)	.
19-29	57	0.0(0.0)	.	24	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.
30-39	88	0.0(0.0)	.	41	0.0(0.0)	.	47	0.0(0.0)	.
40-49	156	0.7(0.7)	100.0	74	1.2(1.2)	99.6	82	0.0(0.0)	.
50-59	112	1.3(1.3)	97.8	66	2.1(2.0)	94.8	46	0.0(0.0)	.
60-69	56	0.0(0.0)	.	28	0.0(0.0)	.	28	0.0(0.0)	.
70 이상	62	0.0(0.0)	.	40	0.0(0.0)	.	22	0.0(0.0)	.
생애주기별									
19-64	444	0.5(0.3)	69.3	220	0.8(0.6)	70.8	224	0.0(0.0)	.
65 이상	87	0.0(0.0)	.	53	0.0(0.0)	.	34	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	35	0.0(0.0)	.	12	-(-)	-	23	0.0(0.0)	.
초등학교	51	0.0(0.0)	.	27	0.0(0.0)	.	24	0.0(0.0)	.
중학교	43	0.0(0.0)	.	20	0.0(0.0)	.	23	0.0(0.0)	.
고등학교	253	0.8(0.5)	68.6	135	1.3(0.9)	70.3	118	0.0(0.0)	.
대학교 이상	149	0.0(0.0)	.	79	0.0(0.0)	.	70	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	62	0.0(0.0)	.	30	0.0(0.0)	.	32	0.0(0.0)	.
사무직	60	0.0(0.0)	.	44	0.0(0.0)	.	16	-(-)	-
판매·서비스직	85	0.0(0.0)	.	28	0.0(0.0)	.	57	0.0(0.0)	.
농림어업	36	0.0(0.0)	.	27	0.0(0.0)	.	9	-(-)	-
기능단순노무직	110	1.9(1.4)	71.7	89	2.2(1.6)	72.2	21	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	177	0.0(0.0)	.	54	0.0(0.0)	.	123	0.0(0.0)	.
월 가구소득									
100만원 이하	79	0.0(0.0)	.	42	0.0(0.0)	.	37	0.0(0.0)	.
101-200만원	86	0.0(0.0)	.	42	0.0(0.0)	.	44	0.0(0.0)	.
201-300만원	72	0.0(0.0)	.	41	0.0(0.0)	.	31	0.0(0.0)	.
301-400만원	101	0.0(0.0)	.	54	0.0(0.0)	.	47	0.0(0.0)	.
401만원 이상	387	0.0(0.0)	.	216	0.0(0.0)	.	171	0.0(0.0)	.

: 1) 음주문제로 인한 상담경험률 : (최근 1년(365일) 동안 음주문제로 상담을 받아본 적이 있는 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 38> 음주시작동기¹⁾

(: %)

	N	주위 사람 권유		호기심으로		친목도모를 위해		축하를 위해		스트레스 해소		매스컴에 멋있게 보여서		기타	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
성	606	69.0(6.6)	9.5	11.5(2.3)	20.3	16.3(4.1)	24.9	1.8(0.4)	22.3	0.4(0.2)	50.0	0.0(0.0)	.	1.0(0.5)	54.8
남자	307	70.4(6.0)	8.5	16.0(3.7)	23.3	10.9(2.6)	24.2	1.0(0.4)	45.9	0.3(0.2)	72.3	0.0(0.0)	.	1.3(0.6)	46.7
여자	299	67.1(7.9)	11.8	5.4(1.4)	26.7	23.5(6.1)	26.1	3.0(0.7)	22.9	0.5(0.3)	63.8	0.0(0.0)	.	0.5(0.5)	94.9
연령															
19-29	60	67.4(10.2)	15.1	4.7(2.7)	58.7	26.5(9.1)	34.2	1.4(1.4)	95.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
30-39	96	68.1(7.0)	10.3	13.9(3.4)	24.2	14.7(4.5)	30.9	1.9(0.7)	38.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.4(1.4)	96.1
40-49	163	68.5(9.5)	13.9	12.5(4.9)	39.0	14.7(4.3)	29.1	3.5(0.8)	24.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.8(0.8)	97.4
50-59	121	72.9(6.8)	9.4	12.8(3.9)	30.1	12.8(4.5)	34.9	0.8(0.9)	104.6	0.7(0.7)	104.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
60-69	73	68.5(5.1)	7.5	10.5(3.1)	29.7	14.8(4.8)	32.1	0.9(0.9)	96.9	3.9(1.8)	45.7	0.0(0.0)	.	1.4(1.4)	97.8
70 이상	93	68.7(5.1)	7.4	14.5(4.7)	32.2	12.4(3.5)	28.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	4.3(1.7)	40.1
생애주기별															
19-64	482	69.3(7.4)	10.7	11.0(2.6)	23.4	16.7(4.6)	27.3	2.1(0.5)	22.5	0.2(0.2)	78.4	0.0(0.0)	.	0.7(0.6)	83.9
65 이상	124	67.0(4.2)	6.3	15.3(3.6)	23.5	12.8(2.6)	20.4	0.0(0.0)	.	1.7(0.9)	52.7	0.0(0.0)	.	3.2(1.3)	39.6
교육수준 ²⁾															
무학	54	70.6(7.0)	9.9	7.9(3.8)	48.5	18.2(6.6)	36.0	0.0(0.0)	.	3.3(1.6)	47.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
초등학교	69	64.9(4.6)	7.1	13.9(3.6)	25.5	17.2(4.8)	27.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	4.0(2.2)	55.4
중학교	49	73.0(5.9)	8.0	14.8(5.4)	36.4	10.5(4.7)	44.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.8(0.3)	14.9
고등학교	275	69.8(7.1)	10.2	11.3(2.9)	25.9	16.0(4.4)	27.3	2.3(0.8)	33.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.6(0.5)	77.2
대학교 이상	159	67.5(9.6)	14.3	11.3(3.4)	30.2	17.5(6.1)	34.8	2.0(0.2)	12.3	0.7(0.6)	77.0	0.0(0.0)	.	1.0(0.9)	93.3
직업															
전문행정관리	68	76.3(7.5)	9.8	3.5(2.1)	59.8	15.0(5.1)	33.8	2.9(0.5)	17.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.3(2.4)	101.7
사무직	64	67.9(9.9)	14.6	24.6(6.7)	27.4	5.8(3.8)	64.9	1.7(0.3)	20.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	87	66.0(9.4)	14.3	12.8(4.9)	38.2	17.5(6.2)	35.2	0.5(0.5)	101.6	0.7(0.7)	98.6	0.0(0.0)	.	2.5(1.8)	70.5
농림어업	46	72.3(5.8)	8.1	15.5(5.3)	33.9	8.4(4.2)	50.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.8(2.4)	63.5
기능단순노무직	114	67.9(6.1)	8.9	12.9(3.8)	29.1	17.2(4.4)	25.8	1.5(1.2)	75.1	0.4(0.0)	9.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	226	68.7(6.9)	10.1	6.2(1.8)	29.0	21.4(6.0)	27.9	2.4(0.9)	34.8	0.6(0.5)	76.9	0.0(0.0)	.	0.5(0.2)	41.1
월 가구소득															
100만원 이하	110	77.6(4.5)	5.7	7.5(3.3)	44.2	11.3(2.8)	25.1	0.0(0.0)	.	1.5(1.1)	72.5	0.0(0.0)	.	2.1(1.2)	57.1
101-200만원	100	61.5(6.0)	9.7	12.5(4.0)	32.0	22.4(5.1)	22.6	2.2(1.8)	81.7	0.6(0.1)	12.9	0.0(0.0)	.	0.7(0.1)	12.9
201-300만원	79	61.6(8.8)	14.2	19.1(5.0)	26.4	18.5(6.6)	35.5	0.7(0.7)	101.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
301-400만원	111	59.9(7.9)	13.3	12.3(3.9)	31.5	21.0(5.3)	25.1	3.7(1.3)	35.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.1(2.3)	75.8
401만원 이상	201	76.7(8.9)	11.6	9.1(3.3)	36.0	12.1(5.6)	46.0	1.7(0.6)	37.2	0.3(0.4)	111.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.

: 1) 음주시작동기 : (응답보기별 응답자 수 / 1잔 이상의 술을 마신 음주자 수)×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 39> 연간 음주자의 금주권고 경험률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
연령	532	18.5(2.5)	13.3	273	28.1(4.5)	15.9	259	5.2(1.3)	25.8
19-29	57	7.6(3.0)	39.4	24	4.2(4.1)	98.6	33	11.9(5.3)	44.4
30-39	88	14.3(5.6)	39.1	41	22.8(9.6)	42.3	47	2.2(2.2)	99.0
40-49	156	24.0(4.3)	18.0	74	39.8(7.1)	17.7	82	4.1(2.0)	48.8
50-59	112	25.9(4.9)	19.1	66	37.4(7.0)	18.7	46	6.5(3.6)	54.6
60-69	56	18.5(5.6)	30.1	28	32.7(9.3)	28.4	28	0.0(0.0)	.
70 이상	63	19.9(4.3)	21.8	40	30.6(6.0)	19.6	23	0.0(0.0)	.
생애주기별									
19-64	444	18.2(2.6)	14.4	220	27.3(4.8)	17.4	224	5.6(1.5)	26.2
65 이상	88	22.0(4.1)	18.5	53	35.7(5.7)	15.9	35	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	36	12.6(5.1)	40.2	12	-(-)	-	24	0.0(0.0)	.
초등학교	51	15.1(4.4)	29.5	27	25.6(7.4)	29.0	24	0.0(0.0)	.
중학교	43	28.4(6.8)	23.9	20	41.2(10.5)	25.5	23	18.1(8.4)	46.3
고등학교	253	19.4(2.9)	15.0	135	29.3(4.7)	15.9	118	5.0(2.0)	39.4
대학교 이상	149	16.4(3.5)	21.5	79	24.0(6.8)	28.3	70	4.1(2.9)	72.6
직업									
전문행정관리	62	23.3(8.4)	36.1	30	39.3(13.9)	35.3	32	3.9(3.9)	98.3
사무직	60	19.6(5.7)	29.1	44	24.5(7.5)	30.8	16	-(-)	-
판매·서비스직	85	15.1(3.6)	23.8	28	29.9(7.7)	25.7	57	6.5(2.9)	44.4
농림어업	36	25.5(7.5)	29.3	27	35.7(10.4)	29.0	9	-(-)	-
기능단순노무직	110	28.1(4.6)	16.2	89	31.5(5.0)	16.0	21	6.0(6.0)	99.6
기타 ³⁾	178	9.0(1.7)	18.7	54	14.4(4.1)	28.7	124	5.9(2.1)	35.1
월 가구소득									
100만원 이하	79	21.2(5.0)	23.7	42	28.5(7.5)	26.2	37	11.3(7.6)	67.3
101-200만원	87	14.9(4.1)	27.4	42	19.7(5.9)	30.1	45	8.9(4.8)	54.1
201-300만원	72	21.1(4.7)	22.4	41	30.1(8.2)	27.4	31	6.0(4.3)	71.1
301-400만원	101	18.1(2.7)	14.8	54	27.3(5.1)	18.6	47	4.1(3.0)	71.8
401만원 이상	190	18.5(5.0)	26.9	92	30.9(9.2)	29.7	98	2.6(1.6)	61.7

: 1) 연간 음주자의 금주권고 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 본인이 술을 마시는 것에 대하여 가족이나 의사가 걱정을 하거나, 술을 끊거나 줄이라는 권고를 한 적이 있는 사람의 수 / 최근 1년 동안 음주한 사람의 수)×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 40> 운전 시 안전벨트 착용률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
연령	513	85.9(1.3)	1.5	297	83.4(1.8)	2.1	216	90.4(1.8)	2.0
19-29	39	85.8(6.0)	7.0	21	86.5(7.3)	8.4	18	-(-)	-
30-39	95	79.5(4.3)	5.5	50	74.1(5.4)	7.4	45	89.6(4.1)	4.6
40-49	172	86.4(3.5)	4.0	87	84.0(5.0)	5.9	85	90.0(2.8)	3.1
50-59	139	91.4(2.4)	2.6	84	89.3(2.5)	2.8	55	95.0(3.6)	3.8
60-69	48	85.3(4.8)	5.7	37	83.9(5.4)	6.4	11	-(-)	-
70 이상	20	91.8(6.0)	6.5	18	-(-)	-	2	-(-)	-
생애주기별									
19-64	479	85.5(1.3)	1.5	268	82.8(1.8)	2.2	211	90.4(1.9)	2.1
65 이상	34	95.0(3.5)	3.7	29	96.3(3.6)	3.7	5	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	7	-(-)	-	4	-(-)	-	3	-(-)	-
초등학교	17	-(-)	-	13	-(-)	-	4	-(-)	-
중학교	45	81.4(6.5)	8.0	25	82.0(7.7)	9.4	20	80.7(9.9)	12.3
고등학교	259	82.6(2.2)	2.7	155	79.4(3.2)	4.1	104	88.6(2.6)	2.9
대학교 이상	185	90.9(1.6)	1.8	100	89.1(2.5)	2.8	85	93.9(2.3)	2.4
직업									
전문행정관리	92	87.7(3.3)	3.7	46	85.0(4.7)	5.5	46	91.4(3.7)	4.0
사무직	70	86.1(3.4)	3.9	50	83.5(4.5)	5.4	20	95.6(1.2)	1.3
판매·서비스직	77	80.1(5.0)	6.3	30	73.2(6.5)	8.9	47	85.7(5.4)	6.3
농림어업	30	89.0(5.8)	6.5	26	87.1(6.6)	7.6	4	-(-)	-
기능단순노무직	121	83.7(3.2)	3.8	106	84.3(3.6)	4.3	15	-(-)	-
기타 ³⁾	122	89.6(3.4)	3.8	38	84.3(7.2)	8.5	84	92.7(2.4)	2.6
월 가구소득									
100만원 이하	35	97.9(2.1)	2.1	25	96.9(3.0)	3.1	10	-(-)	-
101-200만원	76	85.2(4.1)	4.8	42	81.7(6.7)	8.2	34	90.9(4.9)	5.4
201-300만원	73	83.6(4.1)	4.9	50	81.8(5.1)	6.2	23	89.0(6.0)	6.8
301-400만원	107	92.6(2.4)	2.6	62	93.8(3.5)	3.7	45	90.5(2.7)	3.0
401만원 이상	219	82.0(2.2)	2.6	116	77.3(3.4)	4.4	103	89.4(2.9)	3.2

: 1) 운전 시 안전벨트 착용률 : (자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 / 자동차 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 41> 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
연령	515	88.5(2.0)	2.2	241	85.5(3.4)	4.0	274	92.0(1.6)	1.7
19-29	55	87.7(4.4)	5.0	23	92.5(5.1)	5.5	32	81.8(5.8)	7.1
30-39	84	85.1(2.3)	2.8	32	73.9(4.7)	6.4	52	95.3(2.2)	2.3
40-49	162	85.7(4.4)	5.2	72	80.1(8.2)	10.2	90	92.4(2.7)	2.9
50-59	127	95.3(1.3)	1.3	64	94.7(2.0)	2.1	63	96.0(2.0)	2.1
60-69	58	89.5(4.2)	4.7	29	86.5(5.7)	6.6	29	93.1(4.9)	5.3
70 이상	29	94.2(4.3)	4.5	21	95.4(4.6)	4.9	8	-(-)	-
생애주기별									
19-64	473	88.2(2.0)	2.3	212	84.8(3.6)	4.2	261	92.1(1.6)	1.7
65 이상	42	94.3(3.3)	3.5	29	96.6(3.4)	3.5	13	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	13	-(-)	-	3	-(-)	-	10	-(-)	-
초등학교	40	94.6(2.5)	2.6	18	-(-)	-	22	88.6(5.3)	5.9
중학교	43	86.8(5.2)	6.0	17	-(-)	-	26	92.0(5.9)	6.4
고등학교	244	85.6(2.6)	3.1	123	81.6(4.3)	5.2	121	91.2(2.6)	2.8
대학교 이상	175	91.9(2.8)	3.1	80	91.1(4.6)	5.1	95	92.9(2.2)	2.4
직업									
전문행정관리	80	94.1(3.0)	3.2	36	93.2(4.6)	4.9	44	95.0(3.5)	3.7
사무직	59	82.7(5.0)	6.1	38	82.3(5.5)	6.7	21	83.6(8.1)	9.7
판매·서비스직	74	81.5(4.5)	5.5	26	69.5(7.6)	11.0	48	90.2(4.8)	5.4
농림어업	36	93.0(4.0)	4.3	27	92.9(4.7)	5.1	9	-(-)	-
기능단순노무직	105	88.9(2.9)	3.3	78	89.5(3.3)	3.7	27	86.5(6.9)	7.9
기타 ³⁾	160	91.4(2.6)	2.9	35	85.1(7.2)	8.4	125	94.1(2.3)	2.5
월 가구소득									
100만원 이하	51	96.5(1.9)	2.0	26	97.0(2.9)	3.0	25	95.9(2.9)	3.1
101-200만원	66	84.8(5.6)	6.6	24	75.8(10.4)	13.8	42	91.0(4.8)	5.3
201-300만원	70	85.1(5.3)	6.3	39	84.1(6.4)	7.6	31	86.8(5.9)	6.8
301-400만원	102	94.6(1.9)	2.0	45	94.1(2.9)	3.1	57	95.1(1.2)	1.3
401만원 이상	225	86.5(2.7)	3.1	107	82.5(5.1)	6.1	118	91.5(2.7)	3.0

1) 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 : (다른 사람이 운전하는 자동차의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 / 동승차량 앞좌석 탑승자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 42> 연간 자동차 음주운전차량 동승률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	4.4(1.6)	35.4	393	4.3(1.6)	37.4	525	4.6(1.8)	38.2
연령									
19-29	78	3.9(1.8)	45.5	33	0.0(0.0)	.	45	8.7(4.0)	45.7
30-39	128	6.4(3.3)	52.5	52	8.0(4.4)	55.5	76	4.7(2.8)	60.0
40-49	208	6.7(3.1)	46.0	91	5.2(2.3)	44.8	117	8.4(5.6)	66.0
50-59	189	3.6(1.8)	51.1	93	5.4(3.0)	55.5	96	1.6(1.2)	75.8
60-69	128	1.9(1.0)	50.1	51	3.1(2.1)	66.8	77	1.0(1.0)	100.6
70 이상	187	0.0(0.0)	.	73	0.0(0.0)	.	114	0.0(0.0)	.
생애주기별									
19-64	682	5.1(1.8)	35.7	300	4.8(1.8)	38.5	382	5.5(2.1)	37.7
65 이상	236	0.4(0.4)	100.6	93	0.8(0.8)	100.6	143	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	114	0.0(0.0)	.	24	0.0(0.0)	.	90	0.0(0.0)	.
초등학교	134	0.0(0.0)	.	47	0.0(0.0)	.	87	0.0(0.0)	.
중학교	81	5.5(2.4)	44.8	34	4.3(3.1)	70.7	47	6.3(3.9)	62.1
고등학교	365	4.9(1.9)	38.3	185	5.3(2.4)	44.4	180	4.3(1.5)	35.6
대학교 이상	224	5.8(2.6)	45.3	103	3.9(2.0)	50.8	121	7.9(3.9)	49.1
직업									
전문행정관리	104	7.3(3.6)	49.9	46	8.8(5.0)	56.8	58	5.8(3.6)	61.9
사무직	78	0.7(0.7)	103.8	52	0.0(0.0)	.	26	2.8(2.9)	103.5
판매·서비스직	112	7.7(3.6)	47.2	33	5.4(3.6)	66.0	79	8.9(4.4)	49.4
농림어업	70	1.1(1.1)	99.9	48	1.6(1.6)	99.4	22	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	157	7.2(2.9)	40.0	115	6.9(3.1)	44.4	42	8.1(3.6)	43.9
기타 ³⁾	396	2.6(1.0)	37.6	98	1.7(1.3)	72.4	298	3.0(1.3)	43.3
월 가구소득									
100만원 이하	204	1.6(1.6)	96.8	75	0.0(0.0)	.	129	2.8(2.7)	95.0
101-200만원	151	4.1(2.0)	49.4	60	6.7(4.1)	61.9	91	1.8(1.3)	70.8
201-300만원	114	4.3(1.6)	37.5	58	2.7(1.4)	52.1	56	6.4(3.0)	47.2
301-400만원	160	5.1(2.9)	56.2	71	3.3(2.3)	69.5	89	7.1(3.7)	52.5
401만원 이상	282	5.5(2.6)	46.8	126	6.0(3.0)	49.9	156	4.9(2.5)	50.8

1) 연간 자동차 음주운전차량 동승률 : (최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 탄 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 43> 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이) 및 연간 자동차 음주운전 경험횟수

(: %, 회)

	연간 음주운전 경험률 ¹⁾ (자동차 또는 오토바이)									연간 자동차 음주운전 경험횟수 ²⁾		
	전체			남자			여자			N	회(표준오차)	변동계수
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수			
	532	4.0(1.8)	44.4	311	4.3(2.2)	51.8	221	3.4(1.2)	34.4	23	3.8(0.0)	1.2
연령												
19-29	39	2.0(0.3)	17.6	21	0.0(0.0)	.	18	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	96	3.3(2.5)	76.5	50	4.2(3.9)	92.4	46	1.6(1.7)	100.8	3	-(-)	-
40-49	172	5.3(3.1)	59.0	87	5.7(3.2)	55.7	85	4.6(3.2)	68.7	10	-(-)	-
50-59	140	5.0(1.6)	31.4	85	6.3(2.6)	42.1	55	2.8(2.0)	72.5	8	-(-)	-
60-69	55	1.5(1.5)	95.8	42	1.9(1.9)	97.4	13	-(-)	-	1	-(-)	-
70 이상	30	0.0(0.0)	.	26	0.0(0.0)	.	4	-(-)	-	0	-(-)	-
생애주기별												
19-64	483	4.2(1.8)	44.2	270	4.6(2.4)	51.6	213	3.5(1.2)	34.4	23	3.8(0.0)	1.2
65 이상	49	0.0(0.0)	.	41	0.0(0.0)	.	8	-(-)	-	0	-(-)	-
교육수준 ³⁾												
무학	12	-(-)	-	7	-(-)	-	5	-(-)	-	0	-(-)	-
초등학교	26	6.6(6.6)	100.0	19	-(-)	-	7	-(-)	-	1	-(-)	-
중학교	47	3.8(2.7)	70.5	27	7.0(4.8)	68.8	20	0.0(0.0)	.	2	-(-)	-
고등학교	261	4.1(1.6)	40.6	157	3.9(2.0)	51.5	104	4.3(1.5)	34.7	12	-(-)	-
대학교 이상	186	3.8(2.7)	70.5	101	4.0(3.3)	81.8	85	3.4(1.9)	57.4	8	-(-)	-
직업												
전문행정관리	92	2.7(1.8)	68.7	46	4.6(3.1)	67.9	46	0.0(0.0)	.	2	-(-)	-
사무직	70	3.4(2.7)	80.6	50	4.3(3.5)	82.3	20	0.0(0.0)	.	2	-(-)	-
판매·서비스직	80	7.4(3.0)	40.8	32	5.7(4.0)	70.3	48	8.8(5.2)	59.4	7	-(-)	-
농림어업	35	1.9(1.9)	99.3	31	2.2(2.2)	97.4	4	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	124	2.9(1.6)	55.1	108	2.8(1.8)	64.5	16	-(-)	-	5	-(-)	-
기타 ⁴⁾	130	3.6(1.3)	36.8	43	3.9(2.9)	74.4	87	3.4(1.2)	36.2	5	-(-)	-
월 가구소득												
100만원 이하	46	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	13	-(-)	-	0	-(-)	-
101-200만원	81	6.6(2.4)	35.8	45	7.4(3.6)	48.4	36	5.2(3.6)	68.5	6	-(-)	-
201-300만원	76	4.5(3.0)	66.9	53	4.9(3.3)	66.8	23	3.4(2.7)	78.8	3	-(-)	-
301-400만원	107	4.0(1.8)	43.9	62	3.7(2.6)	70.3	45	4.6(1.4)	30.3	4	-(-)	-
401만원 이상	219	3.6(2.3)	65.1	116	4.1(2.8)	68.8	103	2.8(1.8)	65.6	10	-(-)	-

1) 연간 음주운전 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 수/ 자동차 또는 오토바이 운전자 수) × 100

2) 연간 자동차 음주운전 경험횟수 : 자동차 음주운전 횟수의 총 합 / 자동차 음주운전자 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 44> 오토바이 및 자전거 헬멧 착용률

(: %)

	오토바이 헬멧 착용률			자전거 헬멧 착용률		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
연령	41	68.6(6.0)	8.7	137	10.4(3.4)	33.0
19-29	34	71.4(6.4)	8.9	96	12.9(4.9)	37.7
30-39	7	-(-)	-	41	3.3(2.5)	75.6
40-49						
50-59	1	-(-)	-	18	-(-)	-
60-69	2	-(-)	-	18	-(-)	-
70 이상	4	-(-)	-	36	12.9(6.5)	50.9
생애주기별	12	-(-)	-	32	18.4(7.8)	42.1
19-64	9	-(-)	-	19	-(-)	-
65 이상	13	-(-)	-	14	-(-)	-
교육수준 ²⁾						
무학	22	73.3(9.4)	12.8	117	10.8(3.6)	33.6
초등학교	19	-(-)	-	20	4.9(5.2)	104.7
중학교						
고등학교	5	-(-)	-	7	-(-)	-
대학교 이상	8	-(-)	-	17	-(-)	-
직업	9	-(-)	-	12	-(-)	-
전문행정관리	14	-(-)	-	63	16.0(7.0)	43.7
사무직	5	-(-)	-	38	6.0(4.8)	80.0
판매·서비스직						
농림어업	1	-(-)	-	14	-(-)	-
기능단순노무직	1	-(-)	-	12	-(-)	-
기타 ³⁾	9	-(-)	-	20	8.0(6.0)	75.8
월 가구소득	7	-(-)	-	13	-(-)	-
100만원 이하	10	-(-)	-	35	16.3(5.4)	33.2
101-200만원	13	-(-)	-	43	0.0(0.0)	.
201-300만원						
301-400만원	11	-(-)	-	19	-(-)	-
401만원 이상	12	-(-)	-	23	5.9(5.7)	96.7

: 1) 오토바이 헬멧 착용률 : (오토바이를 탈 때 헬멧을 “항상 착용한다”에 응답한 사람의 수/오토바이 운전자 수)×100

2) 자전거 헬멧 착용률 : (자전거를 탈 때 헬멧을 “항상 착용한다”에 응답한 사람의 수/자전거를 타는 사람의 수)×100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 45> 격렬한 신체활동 실천율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	917	16.2(1.5)	9.5	392	20.6(2.7)	13.0	525	11.5(1.2)	10.6
연령									
19-29	77	22.6(4.8)	21.4	32	25.0(6.8)	27.2	45	19.7(6.0)	30.7
30-39	128	20.9(3.6)	17.4	52	29.6(5.2)	17.7	76	11.8(2.9)	24.8
40-49	208	18.9(3.0)	16.1	91	23.1(5.2)	22.6	117	14.2(4.0)	28.1
50-59	189	11.9(2.0)	16.8	93	14.4(3.4)	23.6	96	9.1(2.5)	27.8
60-69	128	11.5(3.2)	27.6	51	11.2(4.4)	39.1	77	11.8(3.7)	31.6
70 이상	187	3.5(1.8)	51.0	73	7.0(3.1)	45.2	114	0.9(0.9)	99.7
생애주기별									
19-64	681	18.2(1.8)	9.8	299	22.5(3.1)	13.6	382	13.5(1.4)	10.5
65 이상	236	4.1(1.6)	38.4	93	6.7(2.7)	39.6	143	2.0(1.2)	57.5
교육수준 ²⁾									
무학	114	3.0(1.7)	58.4	24	4.4(4.4)	99.7	90	2.6(1.8)	71.7
초등학교	134	4.4(1.9)	43.1	47	6.0(4.2)	69.1	87	3.3(1.3)	39.9
중학교	81	7.8(2.7)	34.8	34	9.1(4.5)	49.3	47	6.9(2.3)	33.0
고등학교	364	18.6(2.1)	11.4	184	24.7(3.0)	12.0	180	10.5(2.2)	20.6
대학교 이상	224	20.6(3.4)	16.3	103	20.5(5.2)	25.6	121	20.8(3.4)	16.3
직업									
전문행정관리	104	22.8(5.1)	22.2	46	26.7(8.0)	30.1	58	18.8(5.9)	31.3
사무직	78	22.4(5.9)	26.5	52	21.5(6.7)	31.0	26	25.1(7.4)	29.4
판매·서비스직	112	13.0(3.3)	25.5	33	18.0(6.0)	33.0	79	10.3(3.3)	32.5
농림어업	70	16.4(6.6)	40.1	48	15.0(6.7)	44.7	22	19.6(8.4)	42.6
기능단순노무직	157	19.1(2.8)	14.8	115	22.3(3.5)	15.5	42	6.1(2.9)	48.7
기타 ³⁾	395	11.2(2.0)	17.8	97	16.7(5.3)	31.7	298	8.7(1.3)	14.5
월 가구소득									
100만원 이하	204	10.9(3.2)	29.4	75	14.6(5.8)	39.8	129	8.1(2.6)	32.2
101-200만원	151	12.1(3.4)	28.0	60	17.7(5.6)	31.4	91	7.1(2.7)	38.3
201-300만원	114	21.8(4.5)	20.5	58	24.2(4.8)	19.8	56	18.5(5.8)	31.5
301-400만원	159	14.0(4.1)	29.0	70	14.8(5.5)	37.1	89	13.1(4.7)	36.1
401만원 이상	282	19.0(2.6)	13.6	126	25.0(4.2)	16.9	156	12.3(2.8)	22.5

1) 격렬한 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 46> 중등도 신체활동 실천율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	917	9.0(1.3)	14.6	392	11.6(1.7)	14.7	525	6.3(1.3)	20.5
연령									
19-29	77	6.9(3.9)	55.8	32	9.5(5.5)	58.1	45	3.8(2.5)	66.8
30-39	128	8.9(2.8)	31.5	52	13.8(4.2)	30.3	76	3.8(2.5)	66.1
40-49	208	7.9(1.3)	16.7	91	7.4(1.8)	23.7	117	8.4(2.5)	29.4
50-59	189	10.9(2.6)	23.6	93	12.5(3.7)	29.5	96	9.0(2.9)	32.7
60-69	128	12.6(3.7)	29.2	51	19.4(6.4)	32.9	77	7.2(3.1)	43.0
70 이상	187	8.8(2.7)	30.2	73	13.7(4.8)	34.8	114	5.1(2.1)	41.4
생애주기별									
19-64	681	9.1(1.5)	16.7	299	11.3(1.9)	16.6	382	6.7(1.5)	23.0
65 이상	236	8.3(2.5)	29.5	93	13.2(4.5)	33.9	143	4.7(1.8)	38.3
교육수준 ²⁾									
무학	114	8.7(3.1)	35.3	24	20.8(8.0)	38.7	90	5.4(2.4)	43.8
초등학교	134	4.8(2.3)	47.2	47	8.1(4.6)	57.1	87	2.5(1.9)	74.6
중학교	81	11.7(3.8)	32.8	34	14.6(5.8)	39.6	47	9.6(4.4)	45.9
고등학교	364	9.0(1.8)	20.0	184	10.2(2.4)	23.2	180	7.3(2.4)	33.4
대학교 이상	224	9.7(2.0)	20.3	103	13.2(2.5)	19.2	121	5.8(2.4)	41.5
직업									
전문행정관리	104	14.8(3.2)	21.8	46	22.2(5.0)	22.6	58	7.2(3.0)	41.5
사무직	78	8.1(3.1)	38.2	52	9.6(3.7)	38.7	26	3.7(4.3)	117.7
판매·서비스직	112	13.3(4.5)	34.1	33	16.1(7.0)	43.7	79	11.7(3.7)	31.7
농림어업	70	19.8(5.9)	29.8	48	22.1(8.2)	37.0	22	14.6(8.1)	55.5
기능단순노무직	157	6.2(2.1)	34.5	115	5.6(1.9)	33.2	42	8.2(6.1)	74.0
기타 ³⁾	395	5.9(1.2)	20.8	97	10.0(3.5)	34.6	298	4.0(1.1)	27.0
월 가구소득									
100만원 이하	204	9.3(2.9)	31.2	75	12.8(4.7)	36.6	129	6.7(2.4)	36.6
101-200만원	151	7.6(2.3)	29.7	60	10.4(3.6)	34.2	91	5.1(2.3)	44.9
201-300만원	114	7.2(3.2)	44.1	58	6.7(3.0)	44.8	56	7.9(5.1)	64.6
301-400만원	159	9.3(2.9)	30.8	70	14.6(4.5)	30.7	89	3.6(1.9)	52.2
401만원 이상	282	10.2(2.4)	23.7	126	12.4(3.3)	26.5	156	7.8(2.6)	33.2

1) 중등도 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 47> 중등도 이상 신체활동 실천율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	917	20.9(1.8)	8.6	392	26.6(2.7)	10.1	525	15.0(1.3)	8.5
연령									
19-29	77	24.6(5.0)	20.3	32	28.7(7.4)	25.7	45	19.7(6.0)	30.7
30-39	128	25.0(4.0)	16.1	52	35.1(5.2)	14.9	76	14.4(3.9)	27.2
40-49	208	23.2(3.4)	14.6	91	25.6(5.1)	19.8	117	20.5(3.9)	18.8
50-59	189	18.4(2.6)	14.1	93	22.9(4.1)	18.0	96	13.2(3.1)	23.5
60-69	128	17.5(3.8)	21.6	51	23.2(6.3)	27.1	77	13.1(3.8)	28.9
70 이상	187	10.6(2.7)	25.3	73	17.9(4.9)	27.4	114	5.1(2.1)	41.4
생애주기별									
19-64	681	22.8(2.2)	9.7	299	28.0(3.3)	11.6	382	17.0(1.5)	9.1
65 이상	236	10.2(2.5)	24.2	93	16.4(4.5)	27.1	143	5.4(1.9)	35.3
교육수준 ²⁾									
무학	114	9.6(3.2)	33.4	24	25.2(8.9)	35.2	90	5.4(2.4)	43.8
초등학교	134	6.7(2.4)	35.6	47	8.1(4.6)	57.1	87	5.8(2.2)	38.7
중학교	81	13.9(3.7)	26.8	34	17.4(5.7)	33.0	47	11.2(3.9)	34.8
고등학교	364	23.7(2.7)	11.5	184	30.0(3.1)	10.3	180	15.3(3.3)	21.3
대학교 이상	224	24.9(3.5)	14.0	103	26.9(5.3)	19.8	121	22.7(3.4)	15.2
직업									
전문행정관리	104	28.8(4.9)	17.0	46	34.6(7.6)	22.0	58	22.7(5.5)	24.2
사무직	78	26.7(6.7)	25.2	52	27.3(7.8)	28.7	26	25.1(7.4)	29.4
판매·서비스직	112	19.8(4.8)	24.1	33	24.3(7.2)	29.5	79	17.4(4.4)	25.5
농림어업	70	25.1(7.8)	31.0	48	25.0(8.2)	32.6	22	25.2(9.2)	36.6
기능단순노무직	157	23.3(3.4)	14.6	115	25.5(3.6)	14.2	42	14.3(6.2)	43.1
기타 ³⁾	395	14.9(2.3)	15.1	97	24.5(5.4)	21.9	298	10.6(1.5)	13.7
월 가구소득									
100만원 이하	204	15.7(3.1)	20.1	75	21.3(5.9)	27.6	129	11.5(2.7)	23.1
101-200만원	151	16.0(3.5)	22.0	60	24.9(6.0)	24.2	91	8.2(2.8)	34.9
201-300만원	114	28.4(5.3)	18.8	58	30.9(5.9)	19.1	56	24.9(6.3)	25.2
301-400만원	159	20.1(4.3)	21.4	70	25.7(6.0)	23.4	89	14.0(4.8)	34.4
401만원 이상	282	22.9(3.4)	14.9	126	27.7(4.7)	16.8	156	17.4(3.3)	19.2

: 1) 중등도 이상 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 48> 걷기 실천율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	917	50.4(3.6)	7.2	392	54.9(3.8)	7.0	525	45.6(3.9)	8.6
연령									
19-29	77	49.9(9.0)	18.0	32	57.9(10.6)	18.3	45	40.3(8.8)	21.9
30-39	128	42.0(3.0)	7.1	52	50.0(5.0)	9.9	76	33.6(4.7)	13.8
40-49	208	53.1(4.9)	9.2	91	55.4(4.6)	8.3	117	50.4(7.1)	14.1
50-59	189	52.3(5.8)	11.1	93	57.0(6.9)	12.0	96	47.0(6.6)	14.0
60-69	128	61.5(4.6)	7.4	51	60.4(7.1)	11.7	77	62.3(6.1)	9.9
70 이상	187	49.0(4.4)	9.1	73	50.7(5.9)	11.6	114	47.8(4.9)	10.3
생애주기별									
19-64	681	50.1(4.0)	8.0	299	55.3(4.0)	7.3	382	44.4(4.6)	10.3
65 이상	236	51.8(3.9)	7.6	93	52.5(5.3)	10.0	143	51.2(4.4)	8.7
교육수준 ²⁾									
무학	114	45.2(5.6)	12.4	24	43.4(11.3)	26.1	90	45.7(5.8)	12.7
초등학교	134	58.0(4.7)	8.2	47	55.4(7.8)	14.2	87	59.8(5.7)	9.5
중학교	81	53.7(7.4)	13.8	34	61.0(9.1)	14.9	47	48.2(9.4)	19.6
고등학교	364	51.3(4.6)	9.0	184	55.3(5.0)	9.1	180	46.0(5.3)	11.6
대학교 이상	224	47.2(4.1)	8.8	103	54.3(3.8)	7.1	121	39.2(5.3)	13.4
직업									
전문행정관리	104	56.3(5.1)	9.1	46	58.7(7.3)	12.5	58	53.8(7.3)	13.6
사무직	78	48.6(5.1)	10.4	52	51.0(4.6)	9.0	26	41.6(10.9)	26.3
판매·서비스직	112	44.5(5.7)	12.7	33	52.0(10.1)	19.4	79	40.4(6.2)	15.2
농림어업	70	61.8(5.8)	9.4	48	65.3(7.2)	11.0	22	53.8(10.5)	19.5
기능단순노무직	157	53.3(4.8)	9.0	115	50.7(5.6)	11.0	42	63.9(6.7)	10.5
기타 ³⁾	395	47.8(5.6)	11.6	97	60.4(8.6)	14.2	298	42.2(4.5)	10.7
월 가구소득									
100만원 이하	204	56.8(4.6)	8.0	75	60.6(6.0)	9.9	129	54.0(5.3)	9.7
101-200만원	151	43.5(5.2)	11.9	60	41.8(7.5)	17.9	91	45.1(5.2)	11.6
201-300만원	114	48.4(3.5)	7.1	58	58.3(5.8)	9.9	56	35.0(6.5)	18.7
301-400만원	159	49.4(4.8)	9.7	70	47.9(7.5)	15.6	89	50.9(4.8)	9.5
401만원 이상	282	51.6(6.4)	12.3	126	59.5(5.9)	10.0	156	42.7(7.0)	16.3

: 1) 걷기 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 걷기를 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 49> 근력운동 실천율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	14.8(1.3)	8.8	393	19.8(2.2)	11.0	525	9.6(1.4)	14.4
연령									
19-29	78	27.4(4.1)	15.1	33	38.8(6.9)	17.8	45	13.3(5.0)	37.7
30-39	128	14.1(3.9)	27.6	52	18.7(5.6)	30.1	76	9.4(3.1)	33.4
40-49	208	19.8(3.0)	15.1	91	22.9(4.6)	20.0	117	16.2(2.4)	15.1
50-59	189	10.5(2.8)	26.8	93	12.1(4.4)	36.0	96	8.7(2.8)	32.2
60-69	128	6.1(2.1)	34.3	51	9.9(4.1)	42.1	77	3.1(1.6)	51.7
70 이상	187	1.2(0.8)	70.6	73	2.8(2.0)	70.5	114	0.0(0.0)	.
생애주기별									
19-64	682	17.0(1.5)	8.7	300	22.0(2.4)	11.0	382	11.4(1.6)	14.1
65 이상	236	2.2(0.8)	39.5	93	4.3(1.9)	43.5	143	0.5(0.5)	99.0
교육수준 ²⁾									
무학	114	1.2(1.2)	99.4	24	0.0(0.0)	.	90	1.5(1.5)	99.2
초등학교	134	3.0(1.3)	42.1	47	5.4(3.0)	56.0	87	1.4(0.1)	9.6
중학교	81	2.9(1.4)	49.5	34	5.1(2.9)	56.0	47	1.1(1.2)	101.2
고등학교	365	17.2(2.7)	15.4	185	22.3(4.3)	19.1	180	10.5(2.3)	22.3
대학교 이상	224	20.2(2.8)	14.1	103	23.4(3.7)	15.8	121	16.7(3.3)	19.6
직업									
전문행정관리	104	17.1(2.7)	15.5	46	20.9(4.7)	22.4	58	13.2(3.7)	28.2
사무직	78	23.4(4.2)	17.9	52	25.3(5.0)	19.6	26	18.0(8.1)	44.8
판매·서비스직	112	17.8(4.4)	24.6	33	17.8(6.2)	34.8	79	17.8(4.8)	26.8
농림어업	70	3.6(2.3)	65.3	48	1.8(1.7)	95.7	22	7.7(7.1)	92.7
기능단순노무직	157	13.7(2.6)	19.0	115	16.3(3.1)	19.2	42	3.3(2.9)	87.3
기타 ³⁾	396	12.4(2.5)	19.8	98	26.1(6.5)	24.8	298	6.2(1.4)	23.0
월 가구소득									
100만원 이하	204	9.2(3.7)	39.9	75	16.6(6.5)	39.0	129	3.8(2.1)	54.9
101-200만원	151	3.1(1.3)	40.2	60	3.5(2.0)	56.9	91	2.9(1.6)	56.8
201-300만원	114	15.0(4.8)	31.8	58	18.9(6.5)	34.3	56	9.7(4.1)	42.5
301-400만원	160	20.8(4.1)	19.9	71	27.6(7.3)	26.3	89	13.3(3.6)	27.2
401만원 이상	282	18.6(2.7)	14.6	126	22.9(3.9)	17.2	156	13.6(2.3)	17.2

: 1) 근력운동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 2일 이상 근력운동을 한 사람의 수/조사대상 응답자 수)×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 50> 유연성운동 실천빈도¹⁾

(: %)

	N	전혀 하지 않음		1일		2일		3일		4일		5일 이상	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
성	918	58.0(2.3)	3.9	3.8(0.7)	19.4	7.3(1.2)	16.6	8.9(1.1)	12.6	5.6(1.0)	17.3	16.3(1.4)	8.8
남자	393	64.4(2.7)	4.2	3.4(0.9)	25.5	5.0(1.4)	28.0	6.1(1.3)	21.4	5.3(1.6)	30.1	15.8(2.7)	16.9
여자	525	51.4(2.8)	5.5	4.2(0.9)	20.9	9.7(1.6)	16.2	12.0(2.0)	16.9	5.9(0.8)	13.1	16.9(1.6)	9.2
연령													
19-29	78	57.0(4.3)	7.6	3.2(1.5)	48.3	6.4(3.0)	47.2	7.1(3.2)	45.2	5.2(2.5)	48.4	21.2(5.0)	23.6
30-39	128	51.5(5.5)	10.6	6.5(2.2)	33.3	7.5(2.7)	36.5	8.9(2.8)	31.0	7.7(2.1)	27.8	18.0(3.3)	18.3
40-49	208	48.6(3.3)	6.9	4.8(1.7)	35.6	10.3(2.0)	19.8	8.9(1.8)	20.2	7.2(1.4)	19.8	20.2(3.5)	17.4
50-59	189	60.1(3.6)	6.0	1.4(0.8)	59.6	4.2(1.3)	31.5	13.0(3.0)	22.8	5.5(1.9)	34.3	15.8(3.0)	18.7
60-69	128	69.3(4.6)	6.7	2.8(1.3)	47.7	6.2(1.8)	29.4	7.5(2.2)	29.9	4.3(2.0)	47.2	9.8(2.4)	24.7
70 이상	187	79.8(3.3)	4.1	2.7(1.0)	36.0	7.9(2.4)	30.4	5.7(1.5)	26.3	0.0(0.0)	.	3.9(1.9)	48.2
생애주기별													
19-64	682	54.5(2.4)	4.4	4.0(0.8)	20.4	7.4(1.4)	18.5	9.3(1.3)	13.6	6.5(1.1)	17.3	18.4(1.7)	9.3
65 이상	236	78.8(3.1)	4.0	2.9(0.9)	32.4	7.0(2.0)	28.3	6.6(1.5)	21.9	0.3(0.3)	98.6	4.3(1.6)	36.3
교육수준 ²⁾													
무학	114	79.2(3.9)	4.9	3.9(1.8)	46.1	7.6(3.2)	42.5	6.1(1.9)	32.1	0.0(0.0)	.	3.2(1.7)	51.1
초등학교	134	77.4(4.2)	5.4	2.4(1.1)	47.1	5.3(1.8)	34.5	6.1(2.1)	34.8	1.9(1.1)	55.0	6.9(2.3)	33.9
중학교	81	73.7(5.0)	6.8	2.1(1.5)	73.3	5.8(2.3)	40.2	6.4(2.3)	36.1	1.1(1.1)	99.0	10.9(3.9)	36.1
고등학교	365	55.7(2.8)	5.0	3.1(0.9)	28.1	8.2(1.8)	21.7	6.0(1.2)	19.2	7.5(1.7)	22.4	19.4(2.4)	12.5
대학교 이상	224	47.7(3.7)	7.8	5.6(1.4)	25.6	6.7(1.5)	22.8	15.5(2.8)	18.1	5.9(1.5)	25.1	18.6(2.8)	15.3
직업													
전문행정관리	104	47.7(5.2)	10.9	4.4(1.8)	41.1	8.0(2.7)	34.1	14.1(3.3)	23.2	1.2(0.8)	71.6	24.6(2.8)	11.6
사무직	78	49.6(7.5)	15.1	7.7(3.3)	42.0	9.5(3.4)	35.7	10.9(3.9)	35.5	11.0(5.6)	50.5	11.2(3.5)	31.1
판매·서비스직	112	54.1(5.1)	9.5	3.4(1.5)	43.7	8.5(2.8)	32.9	11.1(3.4)	30.4	6.2(2.4)	38.6	16.7(4.0)	23.9
농림어업	70	89.8(5.3)	5.9	4.8(3.3)	68.5	3.6(2.1)	58.5	0.9(0.9)	97.8	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	97.8
기능단순노무직	157	60.7(4.5)	7.4	3.2(1.3)	39.1	5.3(2.2)	41.0	5.2(1.3)	24.7	8.8(2.5)	28.3	16.8(3.4)	20.5
기타 ³⁾	396	59.8(2.8)	4.6	2.7(0.9)	35.3	7.5(1.6)	20.8	8.8(1.6)	18.5	4.3(0.9)	21.6	16.8(2.3)	13.4
월 가구소득													
100만원 이하	204	63.0(4.7)	7.5	3.7(1.3)	36.1	8.0(3.1)	38.8	9.8(2.7)	27.9	2.7(1.3)	49.2	13.0(4.1)	31.8
101-200만원	151	74.5(3.9)	5.3	4.3(1.8)	41.0	6.0(1.8)	30.1	4.7(1.6)	34.1	2.6(1.8)	66.8	7.9(2.6)	32.7
201-300만원	114	54.2(8.0)	14.8	2.8(1.5)	52.5	9.8(3.0)	30.9	10.9(3.6)	33.0	7.2(4.1)	56.7	15.1(3.8)	25.2
301-400만원	160	53.4(4.7)	8.8	4.6(2.0)	43.6	6.2(2.2)	35.3	7.0(1.6)	22.2	6.7(2.5)	38.2	22.1(3.5)	15.8
401만원 이상	282	52.2(3.7)	7.0	3.7(1.1)	30.9	7.4(1.8)	23.8	10.9(1.8)	16.5	6.9(2.0)	28.7	18.9(3.4)	17.8

: 1) 유연성운동 실천빈도 : (응답보기별 응답자 수/조사대상 응답자 수)×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 51> 주중(월~금) 여가시간에 앉아서 보내는 시간¹⁾

(: %)

	N	하루 1시간 미만		하루 1시간 - 2시간미만		하루 2시간 - 3시간미만		하루 3시간 - 4시간미만		하루 4시간 이상	
		%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수
성	918	19.2(1.4)	7.1	38.1(3.4)	8.9	23.3(1.7)	7.1	10.0(1.4)	13.7	9.4(1.9)	20.8
남자	393	19.5(2.3)	11.7	41.4(4.5)	10.8	20.0(2.3)	11.8	10.5(2.0)	19.4	8.6(2.0)	22.8
여자	525	18.9(1.4)	7.3	34.7(3.1)	8.8	26.9(1.8)	6.6	9.4(1.2)	12.9	10.1(2.3)	23.0
연령											
19-29	78	23.3(6.0)	25.9	39.4(5.7)	14.6	16.3(4.0)	24.7	9.5(3.9)	41.2	11.4(6.1)	53.7
30-39	128	21.0(2.3)	11.2	40.1(4.4)	11.0	26.4(3.3)	12.6	4.0(1.6)	40.9	8.6(2.4)	28.1
40-49	208	23.5(2.3)	9.9	44.5(5.7)	12.8	19.3(4.5)	23.2	7.3(2.0)	27.9	5.5(1.9)	35.5
50-59	189	19.1(3.2)	16.6	32.6(3.7)	11.3	24.2(3.2)	13.3	18.2(2.9)	15.7	5.9(3.0)	50.5
60-69	128	10.1(2.6)	25.6	35.8(4.3)	12.0	32.8(3.9)	11.9	10.2(2.4)	23.7	11.0(3.5)	31.4
70 이상	187	7.8(1.6)	19.9	30.2(4.1)	13.5	28.5(4.0)	14.0	12.8(2.6)	20.6	20.7(2.5)	12.2
생애주기별											
19-64	682	21.2(1.6)	7.5	39.4(3.8)	9.6	22.4(1.9)	8.5	9.5(1.5)	16.0	7.5(2.1)	28.4
65 이상	236	7.7(1.3)	16.4	30.3(3.3)	11.0	28.8(3.3)	11.4	13.1(2.1)	16.2	20.2(2.5)	12.4
교육수준 ²⁾											
무학	114	8.0(2.4)	30.3	29.9(4.4)	14.8	33.5(4.7)	14.0	11.4(2.9)	25.1	17.2(3.4)	19.9
초등학교	134	11.7(2.4)	20.9	29.7(4.4)	14.8	19.5(3.4)	17.4	16.9(3.8)	22.6	22.2(3.8)	17.2
중학교	81	6.6(2.7)	41.4	30.5(5.1)	16.7	38.9(5.7)	14.8	17.1(4.1)	23.8	6.9(4.1)	59.0
고등학교	365	21.1(2.1)	9.8	39.8(4.1)	10.2	22.7(2.4)	10.8	10.1(1.9)	19.0	6.3(1.8)	28.6
대학교 이상	224	23.9(2.9)	12.0	41.4(5.2)	12.5	19.6(2.5)	12.7	5.9(1.2)	20.6	9.2(3.5)	38.3
직업											
전문행정관리	104	24.2(3.4)	14.1	45.7(4.8)	10.5	16.6(3.5)	21.1	5.4(2.2)	40.3	8.1(3.8)	47.1
사무직	78	19.5(5.9)	30.5	48.0(7.8)	16.3	16.6(3.3)	19.6	10.3(3.4)	32.7	5.6(3.3)	59.4
판매·서비스직	112	32.4(3.4)	10.4	39.0(5.3)	13.6	18.6(4.1)	22.1	7.2(2.7)	37.2	2.8(1.6)	56.3
농림어업	70	16.1(4.4)	27.3	37.9(6.8)	17.9	25.3(5.6)	22.2	12.6(3.4)	26.7	8.1(3.3)	40.4
기능단순노무직	157	18.1(3.2)	17.6	41.4(4.0)	9.7	27.7(3.4)	12.4	6.2(2.1)	33.3	6.7(3.1)	46.4
기타 ³⁾	396	14.3(1.6)	11.5	29.8(3.8)	12.7	27.1(2.5)	9.3	14.1(2.1)	15.2	14.7(2.6)	17.9
월 가구소득											
100만원 이하	204	7.4(1.7)	22.9	36.6(3.4)	9.4	27.6(3.5)	12.6	13.1(2.7)	20.2	15.3(3.5)	22.9
101-200만원	151	18.6(3.1)	16.5	29.1(3.7)	12.6	31.9(4.3)	13.5	7.6(2.4)	31.1	12.7(3.9)	31.0
201-300만원	114	20.9(3.1)	15.0	33.7(4.8)	14.3	22.2(4.4)	19.7	9.5(3.2)	34.2	13.7(4.5)	33.2
301-400만원	160	20.8(3.8)	18.1	39.8(5.3)	13.4	21.3(3.0)	14.1	13.3(3.2)	23.9	4.8(1.7)	36.5
401만원 이상	282	22.7(2.0)	8.7	42.8(5.5)	13.0	20.0(3.3)	16.3	8.4(2.1)	25.1	6.2(2.9)	47.9

: 1) 주중(월~금) 여가시간에 앉아서 보내는 시간 : (응답보기별 응답자 수/조사대상 응답자 수)×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 52> 주말(토, 일) 여가시간에 앉아서 보내는 시간¹⁾

(: %)

	N	하루 1시간 미만		하루 1시간 - 2시간미만		하루 2시간 - 3시간미만		하루 3시간 - 4시간미만		하루 4시간 이상	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
성	917	16.4(1.1)	6.7	34.6(4.0)	11.7	24.6(1.3)	5.4	11.4(1.8)	15.8	13.1(2.7)	20.8
남자	392	15.1(1.8)	12.0	36.3(4.9)	13.5	25.0(2.0)	8.0	12.0(2.2)	18.3	11.6(2.7)	23.3
여자	525	17.8(1.3)	7.5	32.7(3.8)	11.5	24.2(1.9)	7.7	10.7(1.9)	17.7	14.6(3.1)	21.6
연령											
19-29	78	18.4(4.8)	25.9	32.9(7.7)	23.2	24.0(4.6)	19.0	11.7(4.5)	38.8	12.9(7.3)	56.4
30-39	128	18.4(3.6)	19.7	35.1(5.0)	14.2	26.3(3.7)	14.2	5.5(1.8)	32.2	14.7(3.6)	24.7
40-49	208	20.9(1.8)	8.8	37.3(6.2)	16.5	17.5(2.2)	12.4	15.7(5.1)	32.5	8.6(2.6)	30.0
50-59	188	16.9(2.4)	14.1	36.1(4.6)	12.7	23.8(3.3)	13.9	12.2(1.9)	15.6	10.9(3.3)	29.9
60-69	128	9.2(1.9)	21.2	33.5(4.7)	13.9	31.2(5.1)	16.2	11.2(3.2)	28.1	14.9(3.6)	23.9
70 이상	187	4.6(1.4)	30.9	28.1(3.8)	13.4	34.3(4.1)	11.9	10.8(2.0)	18.2	22.1(2.9)	13.0
생애주기별											
19-64	681	18.3(1.3)	6.9	35.5(4.5)	12.8	23.3(1.4)	6.2	11.6(2.0)	17.5	11.3(3.0)	26.6
65 이상	236	5.3(1.3)	24.6	29.3(3.2)	11.0	31.9(3.3)	10.3	10.1(1.7)	16.5	23.4(2.5)	10.5
교육수준 ²⁾											
무학	114	8.2(2.4)	29.6	29.8(5.3)	17.7	35.8(4.6)	13.0	9.0(2.5)	28.2	17.2(3.4)	19.9
초등학교	134	10.1(3.0)	29.9	31.1(4.9)	15.8	23.6(3.8)	16.1	9.5(2.2)	23.0	25.7(4.1)	16.0
중학교	81	7.7(3.1)	39.8	29.1(6.2)	21.2	32.8(5.9)	17.8	18.6(4.6)	24.7	11.8(5.1)	43.5
고등학교	364	17.5(1.9)	11.1	34.9(4.5)	12.9	25.4(2.3)	9.1	12.4(2.7)	22.0	9.8(2.7)	27.8
대학교 이상	224	20.3(2.8)	13.9	37.4(6.4)	17.0	19.3(2.6)	13.4	9.2(1.8)	19.7	13.8(4.2)	30.2
직업											
전문·행정관리	104	20.9(3.4)	16.4	38.3(4.8)	12.6	20.2(2.6)	12.9	12.2(4.0)	32.8	8.6(3.6)	41.8
사무직	78	13.3(4.8)	35.9	50.2(6.3)	12.6	17.8(4.7)	26.5	6.4(2.2)	34.4	12.3(4.6)	37.8
판매·서비스직	112	27.3(3.7)	13.5	40.1(7.0)	17.3	13.6(3.8)	27.8	13.7(5.5)	40.2	5.3(1.9)	36.9
농림어업	70	9.4(3.9)	41.3	41.0(6.7)	16.4	23.9(5.0)	20.9	16.7(4.7)	28.1	9.0(3.3)	36.4
기능·단순노무직	156	19.8(3.6)	18.0	36.2(4.5)	12.5	26.7(3.3)	12.3	9.2(2.3)	24.7	8.2(4.1)	50.3
기타 ³⁾	396	11.6(1.4)	12.0	25.0(4.9)	19.8	30.5(3.2)	10.6	12.4(1.8)	14.7	20.6(3.7)	18.0
월 가구소득											
100만원 이하	204	5.2(1.8)	35.0	37.6(3.8)	10.2	28.5(3.2)	11.2	11.6(2.5)	21.5	17.2(3.6)	21.2
101-200만원	151	16.3(3.0)	18.2	35.3(4.2)	11.9	28.2(4.4)	15.7	7.2(2.0)	27.6	13.0(3.8)	29.7
201-300만원	114	26.2(4.1)	15.8	31.2(5.7)	18.4	16.2(3.4)	20.9	5.4(2.1)	38.3	21.0(5.6)	26.7
301-400만원	160	16.5(3.6)	22.2	33.0(5.7)	17.4	26.4(3.8)	14.5	15.4(3.3)	21.7	8.8(2.9)	32.5
401만원 이상	281	17.1(1.9)	10.9	35.7(6.3)	17.7	23.2(2.3)	10.0	13.3(4.0)	30.0	10.6(4.9)	45.9

: 1) 주말(토, 일) 여가시간에 앉아서 보내는 시간 : (응답보기별 응답자 수/조사대상 응답자 수)×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 53> 아침식사 섭취빈도 및 아침결식예방 인구비율¹⁾

(: %)

	N	0일		1-2일		3-4일		5-7	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	회(표준오차)	변동계수
전체	918	11.1(1.4)	12.2	4.9(1.5)	31.3	7.3(1.2)	16.4	76.7(3.2)	4.2
성									
남자	393	12.2(1.7)	14.2	4.9(1.9)	37.7	8.4(1.5)	17.8	74.5(3.3)	4.5
여자	525	10.0(1.6)	16.1	4.9(1.4)	29.4	6.1(1.5)	25.2	79.0(3.7)	4.7
연령									
19-29	78	22.9(4.7)	20.5	13.3(3.9)	29.6	14.4(4.5)	31.3	49.5(5.6)	11.3
30-39	128	19.7(3.5)	17.8	7.1(3.0)	42.3	8.9(2.5)	28.0	64.3(6.4)	10.0
40-49	208	9.4(1.8)	19.4	2.5(2.0)	80.3	5.8(2.0)	33.6	82.3(4.3)	5.2
50-59	189	5.4(1.8)	32.9	3.4(1.6)	46.4	7.3(1.8)	25.2	83.9(3.4)	4.0
60-69	128	0.9(0.9)	99.5	0.5(0.5)	98.2	2.1(1.0)	48.0	96.5(1.8)	1.9
70 이상	187	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.1(0.8)	71.4	98.9(0.8)	0.8
생애주기별									
19-64	682	13.0(1.5)	12.0	5.7(1.8)	31.0	8.3(1.3)	16.2	73.0(3.6)	5.0
65 이상	236	0.5(0.5)	100.7	0.0(0.0)	.	1.3(1.0)	76.2	98.3(1.1)	1.1
교육수준 ³⁾									
무학	114	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0
초등학교	134	3.8(2.3)	59.9	0.0(0.0)	.	2.8(2.3)	79.7	93.4(2.9)	3.1
중학교	81	2.6(2.6)	99.1	1.5(1.5)	99.5	8.8(3.2)	36.7	87.1(4.4)	5.1
고등학교	365	12.4(2.7)	22.1	5.7(1.6)	27.4	8.3(2.1)	25.1	73.6(4.2)	5.7
대학교 이상	224	15.8(2.9)	18.5	6.9(3.1)	45.1	8.3(1.5)	18.2	69.0(4.7)	6.8
직업									
전문행정관리	104	15.0(4.8)	31.9	6.2(3.2)	52.2	6.2(3.1)	49.2	72.6(7.6)	10.4
사무직	78	17.3(2.6)	14.8	4.4(2.0)	45.7	10.5(1.9)	18.2	67.8(3.2)	4.7
판매·서비스직	112	11.7(2.4)	20.3	5.3(2.4)	44.8	8.9(3.9)	43.7	74.1(5.4)	7.2
농림어업	70	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0
기능단순노무직	157	11.8(2.5)	21.3	5.5(1.5)	26.5	7.1(2.3)	32.2	75.5(4.3)	5.7
기타 ⁴⁾	396	8.8(2.6)	29.3	4.8(1.9)	39.6	7.3(2.3)	31.4	79.2(3.5)	4.4
월 가구소득									
100만원 이하	204	4.1(2.3)	55.3	3.9(2.7)	68.7	1.2(0.9)	75.2	90.8(3.2)	3.5
101-200만원	151	7.3(2.8)	38.6	5.1(2.8)	55.7	5.0(2.2)	43.7	82.6(4.4)	5.4
201-300만원	114	13.1(4.1)	30.9	9.3(4.3)	46.2	9.7(3.5)	36.2	67.9(5.4)	7.9
301-400만원	160	21.0(3.8)	18.1	3.1(1.2)	38.4	8.3(2.5)	30.3	67.6(5.4)	8.1
401만원 이상	282	9.7(2.5)	25.7	4.6(2.2)	47.7	9.4(1.7)	18.1	76.3(4.7)	6.1

: 1) 아침결식예방 인구비율 : (최근 1주일(7일)동안 5회 이상 아침식사를 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 54> 저염선택율¹⁾

(: %)

	N	Type I		Type II		Type III	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
	918	33.8(1.6)	4.7	27.6(2.5)	8.9	11.1(1.4)	12.6
성							
남자	393	32.9(2.6)	7.9	26.5(2.6)	9.8	9.2(1.6)	17.3
여자	525	34.6(2.4)	7.1	28.8(3.5)	12.1	13.0(1.9)	14.7
연령							
19-29	78	41.0(6.6)	16.2	16.9(5.5)	32.4	6.2(2.6)	41.9
30-39	128	35.0(6.0)	17.2	28.5(4.7)	16.7	9.0(2.7)	29.5
40-49	208	37.7(3.0)	8.1	25.9(3.8)	14.8	13.4(3.3)	24.4
50-59	189	32.2(3.6)	11.3	31.7(3.1)	9.8	10.9(2.3)	20.9
60-69	128	25.2(4.1)	16.1	38.8(4.6)	11.8	13.5(3.6)	26.4
70 이상	187	21.6(3.2)	14.7	30.1(3.8)	12.7	15.2(3.0)	20.0
생애주기별							
19-64	682	35.9(1.8)	5.0	26.3(2.6)	9.9	10.6(1.6)	14.8
65 이상	236	21.5(3.0)	14.0	35.0(4.1)	11.7	13.7(2.6)	19.0
교육수준 ³⁾							
무학	114	27.6(5.0)	18.1	33.3(4.8)	14.3	13.4(3.3)	24.5
초등학교	134	22.7(4.6)	20.4	30.4(4.2)	13.7	12.4(3.0)	24.6
중학교	81	35.9(6.8)	18.9	21.2(5.2)	24.5	9.7(4.0)	41.4
고등학교	365	33.1(2.2)	6.7	26.6(3.0)	11.3	11.8(2.1)	18.0
대학교 이상	224	38.8(3.3)	8.6	28.5(4.3)	15.1	9.4(2.1)	22.0
직업							
전문행정관리	104	33.9(4.7)	13.8	30.5(6.6)	21.6	6.6(1.8)	26.7
사무직	78	40.7(5.5)	13.6	21.1(4.4)	20.8	12.8(3.7)	28.7
판매·서비스직	112	32.1(3.6)	11.1	35.6(3.4)	9.5	10.1(3.0)	29.9
농림어업	70	20.9(5.1)	24.5	33.0(5.2)	15.8	16.9(5.1)	30.1
기능단순노무직	157	33.8(4.0)	11.8	29.8(4.4)	14.7	9.2(3.4)	37.2
기타 ⁴⁾	396	33.9(2.5)	7.4	23.8(2.8)	12.0	12.7(1.7)	13.5
월 가구소득							
100만원 이하	204	28.2(5.1)	18.2	26.2(3.7)	14.3	15.1(3.0)	19.6
101-200만원	151	22.0(3.8)	17.2	35.2(5.0)	14.2	14.3(3.5)	24.3
201-300만원	114	46.2(5.0)	10.7	20.9(4.0)	18.9	6.4(1.6)	25.0
301-400만원	160	33.9(4.5)	13.2	25.3(4.6)	18.4	9.8(3.5)	35.4
401만원 이상	282	36.4(2.3)	6.3	28.5(4.3)	15.3	10.3(2.7)	25.8

: 1) 저염선택율 : 3문항 중 「한 가지만 선택한 경우 Type I, 두 가지를 선택한 경우 Type II, 세 가지 모두 선택 시 Type III」

- ① 음식을 먹을 때 “약간 싱겁게 먹는다” 또는 “아주 싱겁게 먹는다”에 응답한 사람의 수 또는,
 ② 조리된 음식을 먹을 때 소금이나 간장을 “전혀 더 넣지 않는다”에 응답한 사람의 수 또는, / 조사대상 응답자 수 × 100
 ③ 전, 부침, 튀김 등을 먹을 때 간장에 “짜여 먹지 않는다”에 응답한 사람의 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 55> 가공식품 선택시 영양표시 이용률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	26.0(1.6)	6.3	393	14.5(2.2)	15.5	525	38.2(2.1)	5.5
연령									
19-29	78	29.6(4.8)	16.3	33	22.5(5.2)	23.1	45	38.3(6.3)	16.5
30-39	128	46.1(4.0)	8.6	52	31.1(5.8)	18.8	76	61.9(6.8)	11.0
40-49	208	35.0(3.5)	9.8	91	11.0(4.0)	36.4	117	62.3(4.8)	7.6
50-59	189	14.5(2.8)	19.5	93	4.8(2.3)	46.8	96	25.5(4.3)	16.9
60-69	128	3.8(1.8)	48.8	51	4.3(2.6)	60.6	77	3.3(1.9)	57.4
70 이상	187	1.4(1.1)	76.5	73	1.1(1.1)	101.8	114	1.7(1.7)	100.3
생애주기별									
19-64	682	30.2(1.8)	5.8	300	16.2(2.4)	15.1	382	45.8(2.3)	5.0
65 이상	236	1.6(1.0)	60.8	93	2.0(1.5)	71.6	143	1.3(1.3)	100.5
교육수준 ²⁾									
무학	114	2.1(1.3)	59.8	24	3.6(3.6)	100.1	90	1.7(1.6)	95.7
초등학교	134	4.2(1.8)	43.1	47	0.0(0.0)	.	87	7.2(3.0)	42.0
중학교	81	15.9(6.0)	37.7	34	5.2(3.5)	67.6	47	24.0(8.8)	36.5
고등학교	365	28.7(2.0)	7.0	185	15.2(3.1)	20.5	180	46.9(3.7)	7.8
대학교 이상	224	35.9(3.2)	9.0	103	19.1(4.4)	23.1	121	55.0(4.2)	7.7
직업									
전문행정관리	104	29.8(4.3)	14.3	46	8.2(6.6)	80.4	58	52.1(5.5)	10.6
사무직	78	28.9(5.2)	17.9	52	20.2(5.4)	26.9	26	53.7(9.3)	17.3
판매·서비스직	112	35.2(4.5)	12.7	33	18.3(7.0)	38.1	79	44.4(5.5)	12.4
농림어업	70	8.7(3.3)	37.8	48	4.5(3.3)	74.6	22	18.3(8.7)	47.5
기능단순노무직	157	22.4(3.7)	16.6	115	15.9(3.9)	24.3	42	49.1(9.8)	19.9
기타 ³⁾	396	24.7(2.8)	11.2	98	12.0(4.9)	40.7	298	30.4(3.0)	9.9
월 가구소득									
100만원 이하	204	9.5(2.9)	30.5	75	5.8(3.3)	56.7	129	12.3(4.2)	34.3
101-200만원	151	22.2(3.8)	17.0	60	10.4(5.0)	48.2	91	32.5(5.4)	16.6
201-300만원	114	29.4(3.8)	13.0	58	15.4(4.1)	26.7	56	48.6(5.6)	11.5
301-400만원	160	33.4(4.9)	14.6	71	24.9(6.2)	25.1	89	42.7(5.6)	13.2
401만원 이상	282	29.3(2.5)	8.5	126	12.6(2.6)	20.7	156	48.3(4.9)	10.2

: 1) 가공식품 선택 시 영양표시 이용률 : (영양표시를 “항상 읽는다” 또는 “가끔 읽는다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 56> 영양교육 및 상담수혜율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	3.0(0.9)	29.1	393	1.9(1.2)	62.1	525	4.1(1.4)	32.9
연령									
19-29	78	4.1(2.4)	58.9	33	3.6(3.6)	99.8	45	4.8(4.9)	101.2
30-39	128	4.4(2.0)	44.6	52	0.0(0.0)	.	76	9.1(4.1)	45.5
40-49	208	2.2(0.9)	38.7	91	0.0(0.0)	.	117	4.7(1.8)	38.1
50-59	189	3.2(1.7)	52.5	93	4.4(2.7)	59.9	96	1.8(1.7)	98.2
60-69	128	3.1(2.0)	64.4	51	5.5(4.2)	76.7	77	1.2(1.2)	99.4
70 이상	187	0.0(0.0)	.	73	0.0(0.0)	.	114	0.0(0.0)	.
생애주기별									
19-64	682	3.5(1.0)	28.9	300	2.2(1.3)	62.1	382	5.0(1.6)	32.5
65 이상	236	0.0(0.0)	.	93	0.0(0.0)	.	143	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	114	0.0(0.0)	.	24	0.0(0.0)	.	90	0.0(0.0)	.
초등학교	134	0.6(0.6)	99.8	47	0.0(0.0)	.	87	1.1(1.1)	99.4
중학교	81	3.2(2.4)	77.4	34	1.9(1.9)	101.8	47	4.1(3.9)	96.0
고등학교	365	2.9(1.1)	39.2	185	3.0(1.9)	61.6	180	2.7(1.5)	57.4
대학교 이상	224	4.4(1.5)	33.2	103	0.6(0.6)	102.1	121	8.8(2.8)	31.3
직업									
전문행정관리	104	4.7(2.2)	46.9	46	0.0(0.0)	.	58	9.5(4.5)	47.1
사무직	78	2.5(1.6)	65.4	52	0.6(0.6)	101.4	26	7.8(6.0)	77.3
판매·서비스직	112	3.7(2.0)	54.5	33	2.4(2.4)	99.4	79	4.5(2.4)	54.5
농림어업	70	2.0(2.0)	98.7	48	2.9(3.0)	100.6	22	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	157	2.0(1.2)	57.0	115	2.5(1.4)	56.6	42	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	396	2.9(1.1)	38.4	98	2.7(2.7)	97.8	298	3.0(1.5)	48.3
월 가구소득									
100만원 이하	204	0.4(0.4)	101.7	75	0.0(0.0)	.	129	0.7(0.7)	102.7
101-200만원	151	2.7(2.1)	79.2	60	3.4(2.5)	72.1	91	2.0(2.0)	100.4
201-300만원	114	0.8(0.8)	96.2	58	0.0(0.0)	.	56	2.0(2.0)	99.8
301-400만원	160	6.2(2.4)	38.5	71	3.1(3.1)	98.3	89	9.7(4.5)	46.4
401만원 이상	282	3.0(1.3)	42.7	126	1.6(1.3)	85.1	156	4.6(2.0)	42.9

: 1) 영양교육 및 상담수혜율 : (최근 1년(365일) 동안 영양교육 및 상담을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 57> 식품 안정성 확보율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
연령	918	97.3(0.6)	0.6	393	98.3(0.6)	0.6	525	96.3(0.8)	0.8
19-29	78	100.0(0.0)	0.0	33	100.0(0.0)	0.0	45	100.0(0.0)	0.0
30-39	128	98.6(1.1)	1.1	52	98.1(1.9)	1.9	76	99.1(0.9)	0.9
40-49	208	99.2(0.5)	0.5	91	99.1(0.9)	0.9	117	99.4(0.6)	0.6
50-59	189	97.0(1.5)	1.5	93	97.1(1.7)	1.7	96	96.9(1.9)	1.9
60-69	128	95.5(1.9)	2.0	51	100.0(0.0)	0.0	77	91.9(3.3)	3.6
70 이상	187	88.9(2.5)	2.8	73	94.6(2.4)	2.5	114	84.6(3.2)	3.8
생애주기별									
19-64	682	98.5(0.5)	0.5	300	98.6(0.6)	0.6	382	98.4(0.6)	0.6
65 이상	236	90.1(2.1)	2.4	93	95.8(1.9)	2.0	143	85.8(2.8)	3.2
교육수준 ²⁾									
무학	114	84.8(4.0)	4.8	24	92.1(4.1)	4.4	90	82.8(4.7)	5.6
초등학교	134	93.4(2.2)	2.4	47	97.4(2.6)	2.7	87	90.6(3.2)	3.5
중학교	81	98.3(1.2)	1.3	34	97.6(2.4)	2.5	47	98.8(1.2)	1.2
고등학교	365	98.0(0.8)	0.8	185	97.8(1.1)	1.1	180	98.2(0.9)	1.0
대학교 이상	224	100.0(0.0)	0.0	103	100.0(0.0)	0.0	121	100.0(0.0)	0.0
직업									
전문행정관리	104	100.0(0.0)	0.0	46	100.0(0.0)	0.0	58	100.0(0.0)	0.0
사무직	78	98.3(1.6)	1.7	52	97.7(2.1)	2.2	26	100.0(0.0)	0.0
판매·서비스직	112	99.5(0.5)	0.5	33	100.0(0.0)	0.0	79	99.2(0.8)	0.8
농림어업	70	97.3(2.1)	2.1	48	100.0(0.0)	0.0	22	91.1(6.7)	7.4
기능단순노무직	157	98.5(0.7)	0.8	115	98.7(0.9)	0.9	42	97.8(2.2)	2.2
기타 ³⁾	396	94.6(1.1)	1.2	98	95.9(1.7)	1.7	298	94.0(1.3)	1.4
월 가구소득									
100만원 이하	204	86.3(2.5)	2.9	75	92.1(3.0)	3.2	129	82.1(3.3)	4.0
101-200만원	151	98.2(1.8)	1.8	60	98.4(1.6)	1.6	91	98.0(2.0)	2.0
201-300만원	114	99.5(0.4)	0.4	58	100.0(0.0)	0.0	56	98.9(1.1)	1.1
301-400만원	160	98.9(0.8)	0.9	71	99.1(0.9)	0.9	89	98.8(0.9)	0.9
401만원 이상	282	99.4(0.6)	0.6	126	99.0(1.0)	1.0	156	100.0(0.0)	0.0

1) 식품 안정성 확보율 : (“우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다” 또는 “우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 58> 과일섭취율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	59.2(2.8)	4.8	393	54.4(4.2)	7.7	525	64.2(2.2)	3.5
연령									
19-29	78	67.6(4.9)	7.2	33	72.8(6.5)	8.9	45	61.2(8.6)	14.1
30-39	128	60.8(4.7)	7.7	52	48.3(8.2)	17.0	76	73.9(3.9)	5.2
40-49	208	61.5(4.4)	7.2	91	54.1(6.9)	12.8	117	70.0(3.4)	4.9
50-59	189	65.4(6.3)	9.6	93	55.0(7.2)	13.1	96	77.2(6.1)	7.9
60-69	128	53.2(5.3)	10.0	51	53.6(7.7)	14.4	77	52.9(5.4)	10.2
70 이상	187	33.3(4.2)	12.6	73	34.1(6.0)	17.6	114	32.7(4.4)	13.3
생애주기별									
19-64	682	63.5(3.0)	4.8	300	57.2(4.4)	7.8	382	70.5(2.5)	3.6
65 이상	236	34.1(3.9)	11.4	93	34.5(5.6)	16.3	143	33.8(3.9)	11.6
교육수준 ²⁾									
무학	114	29.1(4.8)	16.6	24	17.2(6.0)	34.7	90	32.3(5.4)	16.7
초등학교	134	46.5(5.3)	11.3	47	35.0(8.2)	23.5	87	54.6(5.1)	9.4
중학교	81	50.9(6.5)	12.8	34	40.4(8.1)	20.0	47	58.7(8.4)	14.3
고등학교	365	64.0(4.1)	6.5	185	59.7(5.2)	8.8	180	69.9(4.0)	5.7
대학교 이상	224	64.0(2.7)	4.2	103	55.8(5.3)	9.4	121	73.4(3.4)	4.7
직업									
전문행정관리	104	69.0(4.9)	7.1	46	62.1(7.1)	11.4	58	76.1(4.9)	6.4
사무직	78	57.4(5.6)	9.7	52	54.9(6.5)	11.8	26	64.4(9.3)	14.4
판매·서비스직	112	57.4(7.7)	13.5	33	44.9(11.1)	24.7	79	64.2(7.1)	11.1
농림어업	70	55.5(7.9)	14.2	48	53.2(10.1)	18.9	22	60.6(7.9)	13.1
기능단순노무직	157	56.9(4.6)	8.0	115	54.4(5.2)	9.6	42	67.4(8.1)	12.0
기타 ³⁾	396	58.1(2.7)	4.7	98	52.3(5.0)	9.7	298	60.8(2.9)	4.8
월 가구소득									
100만원 이하	204	41.8(4.6)	10.9	75	42.8(6.6)	15.4	129	41.0(4.7)	11.5
101-200만원	151	56.9(5.5)	9.7	60	48.0(7.5)	15.7	91	64.7(5.9)	9.2
201-300만원	114	57.5(6.5)	11.3	58	50.5(9.3)	18.5	56	67.0(5.3)	7.9
301-400만원	160	69.0(5.1)	7.4	71	68.3(5.7)	8.3	89	69.8(6.4)	9.2
401만원 이상	282	62.5(5.1)	8.1	126	54.2(7.2)	13.2	156	72.0(4.5)	6.2

: 1) 과일 섭취율 : (최근 1달(30일) 동안 하루(매일) 1회 이상 과일(과일 주스 제외)을 먹은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 59> 생채소 섭취율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	62.2(5.3)	8.6	393	59.3(6.4)	10.9	525	65.3(4.5)	7.0
연령									
19-29	78	62.5(7.5)	11.9	33	58.4(10.7)	18.4	45	67.6(7.8)	11.5
30-39	128	54.3(5.1)	9.4	52	52.1(6.3)	12.1	76	56.7(6.0)	10.7
40-49	208	60.0(10.1)	16.8	91	60.6(12.0)	19.8	117	59.4(8.4)	14.2
50-59	189	67.1(7.0)	10.5	93	60.3(7.2)	11.9	96	74.9(7.7)	10.2
60-69	128	71.6(3.8)	5.3	51	63.5(6.6)	10.3	77	78.0(4.3)	5.5
70 이상	187	65.3(3.9)	6.0	73	67.1(5.9)	8.9	114	64.0(5.0)	7.8
생애주기별									
19-64	682	61.3(6.1)	9.9	300	57.8(7.1)	12.4	382	65.2(5.2)	8.0
65 이상	236	67.6(3.4)	5.0	93	70.0(5.2)	7.5	143	65.8(4.1)	6.3
교육수준 ²⁾									
무학	114	66.6(5.0)	7.5	24	61.3(10.0)	16.4	90	68.1(5.5)	8.1
초등학교	134	68.0(4.7)	6.9	47	66.1(8.1)	12.2	87	69.4(5.1)	7.4
중학교	81	67.9(6.7)	9.9	34	71.4(8.1)	11.4	47	65.3(9.7)	14.9
고등학교	365	59.6(7.3)	12.2	185	57.2(8.4)	14.7	180	62.7(6.6)	10.6
대학교 이상	224	62.3(5.7)	9.2	103	58.8(7.3)	12.4	121	66.3(5.0)	7.5
직업									
전문행정관리	104	62.3(7.9)	12.6	46	59.2(9.5)	16.1	58	65.5(7.0)	10.7
사무직	78	51.8(8.4)	16.2	52	48.5(9.9)	20.4	26	61.1(9.0)	14.8
판매·서비스직	112	71.1(9.2)	12.9	33	61.9(10.6)	17.1	79	76.1(9.6)	12.7
농림어업	70	79.0(5.2)	6.6	48	79.1(7.0)	8.8	22	78.7(7.5)	9.5
기능단순노무직	157	55.5(7.2)	13.1	115	52.0(8.3)	15.9	42	69.7(6.5)	9.3
기타 ³⁾	396	63.7(4.6)	7.3	98	69.5(6.4)	9.2	298	61.0(4.7)	7.7
월 가구소득									
100만원 이하	204	67.1(4.1)	6.1	75	66.2(6.9)	10.4	129	67.7(4.7)	6.9
101-200만원	151	70.9(5.2)	7.3	60	66.2(7.1)	10.7	91	75.1(5.4)	7.1
201-300만원	114	59.9(5.3)	8.9	58	57.1(6.9)	12.1	56	63.6(8.1)	12.8
301-400만원	160	62.8(5.3)	8.4	71	59.7(7.6)	12.7	89	66.2(4.4)	6.7
401만원 이상	282	57.1(11.0)	19.3	126	54.2(12.4)	22.9	156	60.5(10.0)	16.5

: 1) 생채소 섭취율 : (최근 1달(30일) 동안 하루(매일) 1회 이상 생으로 먹는 채소(쌈, 샐러드, 생채소 무침)를 먹은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수)×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 60> 비만도 분포 및 비만율¹⁾

(: %, 평균)

	N	비만도 분포						(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율)			
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	평균(표준오차)	변동계수
전체	913	5.5(0.8)	14.2	68.1(1.5)	2.2	26.4(1.4)	5.2	23.2(0.1)	0.4
성									
남자	393	2.9(1.0)	32.3	62.6(2.4)	3.8	34.4(2.4)	6.9	23.9(0.2)	0.6
여자	520	8.2(1.2)	14.6	73.9(1.9)	2.6	17.9(1.6)	9.0	22.4(0.1)	0.5
연령									
19-29	77	10.2(3.2)	31.6	68.6(4.9)	7.1	21.2(4.0)	18.9	22.6(0.3)	1.5
30-39	127	5.3(2.1)	38.5	57.5(3.6)	6.3	37.2(3.5)	9.4	23.5(0.3)	1.2
40-49	208	3.0(0.8)	25.5	73.4(3.3)	4.4	23.6(3.1)	13.0	23.5(0.2)	0.7
50-59	189	4.4(1.6)	35.6	68.5(3.6)	5.2	27.1(3.6)	13.1	23.3(0.2)	0.9
60-69	128	1.5(1.1)	73.1	69.2(4.2)	6.1	29.3(4.2)	14.2	23.8(0.2)	1.0
70 이상	184	9.3(2.4)	25.4	73.5(3.2)	4.3	17.2(2.6)	14.8	22.4(0.2)	1.1
생애주기별									
19-64	680	5.2(0.9)	16.6	67.0(1.7)	2.5	27.8(1.5)	5.3	23.3(0.1)	0.5
65 이상	233	7.3(1.8)	25.2	74.3(2.9)	3.9	18.4(2.5)	13.7	22.7(0.2)	0.9
교육수준 ²⁾									
무학	112	10.1(3.7)	36.3	68.1(4.7)	6.9	21.8(3.6)	16.4	22.4(0.3)	1.3
초등학교	133	7.5(2.7)	35.9	74.7(3.5)	4.6	17.8(3.5)	19.4	22.7(0.3)	1.3
중학교	81	1.3(1.3)	98.9	75.5(5.1)	6.7	23.2(5.0)	21.5	23.4(0.3)	1.5
고등학교	364	5.0(1.4)	28.0	66.3(2.7)	4.1	28.6(3.0)	10.4	23.3(0.2)	0.9
대학교 이상	223	5.6(1.3)	23.0	67.2(2.6)	3.8	27.2(2.8)	10.2	23.4(0.2)	0.9
직업									
전문행정관리	103	3.2(1.1)	32.8	64.1(5.2)	8.2	32.7(5.4)	16.5	23.7(0.3)	1.2
사무직	78	8.0(2.9)	35.7	70.9(5.8)	8.3	21.1(5.2)	24.7	23.0(0.3)	1.5
판매·서비스직	112	3.5(1.9)	54.1	73.9(4.1)	5.5	22.6(4.3)	19.2	22.9(0.3)	1.3
농림어업	70	1.5(1.5)	100.5	70.2(5.9)	8.4	28.3(5.6)	19.8	23.6(0.4)	1.5
기능단순노무직	157	3.4(1.6)	48.4	61.8(4.0)	6.4	34.8(4.1)	11.7	23.8(0.3)	1.1
기타 ³⁾	392	7.9(1.5)	18.5	69.7(2.0)	2.9	22.5(2.3)	10.0	22.8(0.2)	0.8
월 가구소득									
100만원 이하	204	9.7(2.5)	25.8	63.9(3.8)	5.9	26.4(3.9)	14.9	22.9(0.3)	1.5
101-200만원	147	4.4(1.6)	36.4	71.4(3.4)	4.7	24.3(3.7)	15.1	23.0(0.3)	1.2
201-300만원	114	3.4(2.3)	68.4	71.4(5.7)	8.0	25.2(5.5)	21.8	23.4(0.3)	1.5
301-400만원	160	6.4(2.0)	31.1	61.1(4.3)	7.0	32.5(3.8)	11.8	23.5(0.3)	1.1
401만원 이상	281	4.8(1.1)	22.1	71.0(3.5)	4.9	24.2(3.6)	14.8	23.1(0.2)	0.8

: 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만율 : (체질량지수(kg/m²) 25 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 61> 주관적 비만인지율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	31.5(1.8)	5.6	393	29.8(2.3)	7.8	525	33.2(2.9)	8.6
연령									
19-29	78	35.5(6.3)	17.7	33	35.3(7.9)	22.5	45	35.9(7.2)	20.2
30-39	128	42.9(4.1)	9.6	52	49.6(5.6)	11.3	76	35.9(5.5)	15.4
40-49	208	31.8(2.7)	8.5	91	24.7(4.9)	19.8	117	39.8(5.3)	13.3
50-59	189	25.7(2.9)	11.4	93	21.4(4.8)	22.4	96	30.5(5.2)	17.0
60-69	128	31.2(3.8)	12.1	51	28.3(6.5)	23.0	77	33.6(4.9)	14.5
70 이상	187	14.9(2.6)	17.5	73	10.3(3.1)	30.4	114	18.3(4.1)	22.5
생애주기별									
19-64	682	33.7(2.0)	5.9	300	31.8(2.7)	8.3	382	35.8(3.2)	9.1
65 이상	236	18.3(2.3)	12.3	93	15.5(3.3)	21.3	143	20.4(3.7)	18.1
교육수준 ²⁾									
무학	114	21.2(3.7)	17.7	24	20.5(6.7)	32.7	90	21.3(4.4)	20.7
초등학교	134	17.8(3.8)	21.1	47	10.4(4.8)	46.4	87	23.0(4.9)	21.2
중학교	81	25.3(4.5)	17.7	34	14.0(5.9)	42.1	47	33.7(6.9)	20.4
고등학교	365	31.8(3.1)	9.9	185	28.2(3.2)	11.2	180	36.7(5.6)	15.3
대학교 이상	224	38.6(3.4)	8.9	103	40.5(4.8)	11.9	121	36.4(3.9)	10.7
직업									
전문행정관리	104	35.9(4.9)	13.7	46	35.4(9.0)	25.5	58	36.5(6.7)	18.3
사무직	78	28.7(5.8)	20.2	52	32.6(8.0)	24.5	26	17.5(5.7)	32.4
판매·서비스직	112	36.4(5.7)	15.7	33	37.5(8.1)	21.7	79	35.7(6.4)	17.9
농림어업	70	24.5(5.5)	22.2	48	18.3(5.8)	31.6	22	38.6(10.9)	28.2
기능단순노무직	157	30.1(3.8)	12.7	115	28.8(4.1)	14.2	42	35.6(8.5)	23.9
기타 ³⁾	396	31.0(3.1)	9.9	98	27.0(6.2)	22.9	298	32.8(4.1)	12.6
월 가구소득									
100만원 이하	204	22.5(3.9)	17.4	75	18.3(5.9)	32.1	129	25.6(5.1)	20.1
101-200만원	151	27.3(3.9)	14.4	60	25.1(7.2)	28.7	91	29.3(5.1)	17.4
201-300만원	114	30.5(4.9)	16.1	58	32.1(6.7)	20.8	56	28.4(5.8)	20.4
301-400만원	160	39.3(5.7)	14.4	71	40.9(6.9)	16.8	89	37.5(6.3)	16.7
401만원 이상	282	33.0(3.8)	11.5	126	28.8(4.7)	16.3	156	37.8(6.1)	16.1

: 1) 주관적 비만인지율 : (“약간 비만” 또는 “매우 비만”이라고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 62> 체중조절 시도율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	58.0(2.2)	3.8	393	54.0(2.8)	5.2	525	62.2(2.4)	3.9
연령									
19-29	78	67.5(7.3)	10.8	33	56.6(10.9)	19.3	45	80.9(7.8)	9.6
30-39	128	64.6(7.7)	12.0	52	60.5(10.8)	17.9	76	68.9(5.9)	8.5
40-49	208	67.6(3.3)	4.9	91	59.9(4.1)	6.9	117	76.5(3.7)	4.8
50-59	189	53.2(3.2)	6.0	93	48.5(4.9)	10.0	96	58.6(4.6)	7.9
60-69	128	50.6(4.8)	9.5	51	56.8(7.6)	13.3	77	45.8(5.2)	11.3
70 이상	187	26.0(3.7)	14.3	73	29.7(5.7)	19.3	114	23.2(5.0)	21.3
생애주기별									
19-64	682	63.0(2.2)	3.5	300	56.7(2.9)	5.1	382	70.1(2.5)	3.6
65 이상	236	28.7(3.8)	13.4	93	34.9(5.2)	14.9	143	24.0(4.8)	20.0
교육수준 ²⁾									
무학	114	25.0(4.5)	18.1	24	25.9(8.9)	34.2	90	24.7(5.0)	20.4
초등학교	134	37.5(4.9)	13.1	47	35.7(9.5)	26.6	87	38.8(4.4)	11.2
중학교	81	47.2(5.6)	11.9	34	36.6(8.3)	22.6	47	55.2(7.7)	13.9
고등학교	365	59.1(3.2)	5.4	185	48.6(4.1)	8.4	180	73.2(3.3)	4.5
대학교 이상	224	72.1(3.7)	5.2	103	72.7(5.0)	6.8	121	71.5(3.8)	5.3
직업									
전문행정관리	104	74.3(5.1)	6.8	46	73.8(7.0)	9.5	58	74.7(5.7)	7.6
사무직	78	67.2(6.6)	9.9	52	64.8(8.7)	13.4	26	74.0(7.5)	10.1
판매·서비스직	112	58.3(4.8)	8.3	33	39.6(8.8)	22.2	79	68.4(5.1)	7.5
농림어업	70	30.5(6.1)	19.9	48	29.4(7.2)	24.6	22	33.0(11.7)	35.5
기능단순노무직	157	53.5(4.0)	7.4	115	53.1(5.1)	9.5	42	55.1(8.8)	16.0
기타 ³⁾	396	54.8(3.0)	5.5	98	46.8(6.3)	13.4	298	58.5(3.4)	5.9
월 가구소득									
100만원 이하	204	44.5(5.0)	11.1	75	45.9(7.9)	17.2	129	43.5(5.6)	12.8
101-200만원	151	51.6(4.7)	9.1	60	49.7(7.6)	15.3	91	53.3(4.0)	7.5
201-300만원	114	55.9(6.4)	11.4	58	48.1(7.3)	15.2	56	66.6(8.2)	12.3
301-400만원	160	61.7(6.0)	9.8	71	61.5(7.9)	12.9	89	61.8(7.6)	12.3
401만원 이상	282	65.3(4.1)	6.3	126	57.0(5.5)	9.7	156	74.6(3.8)	5.1

: 1) 체중조절 시도율 : (최근 1년(365일) 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 63> 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	28.6(1.9)	6.5	393	27.9(2.4)	8.4	525	29.4(2.6)	8.7
연령									
19-29	78	10.3(4.7)	45.9	33	2.2(2.1)	99.8	45	20.3(8.2)	40.3
30-39	128	14.3(3.1)	21.5	52	15.1(5.6)	36.7	76	13.5(4.6)	34.1
40-49	208	22.0(3.2)	14.3	91	26.5(3.9)	14.7	117	17.0(4.2)	24.8
50-59	189	37.4(3.8)	10.1	93	37.9(5.7)	15.0	96	36.8(5.0)	13.5
60-69	128	55.1(3.6)	6.6	51	53.0(6.7)	12.6	77	56.7(5.0)	8.8
70 이상	187	60.5(3.4)	5.5	73	66.7(5.7)	8.6	114	55.9(4.1)	7.4
생애주기별									
19-64	682	22.8(1.9)	8.5	300	22.4(2.3)	10.4	382	23.2(2.7)	11.6
65 이상	236	62.9(3.0)	4.7	93	67.9(4.7)	6.9	143	59.1(3.9)	6.6
교육수준 ²⁾									
무학	114	69.4(4.1)	5.9	24	81.4(7.7)	9.5	90	66.2(5.5)	8.3
초등학교	134	56.2(4.6)	8.2	47	64.8(7.1)	11.0	87	50.2(5.6)	11.2
중학교	81	42.9(6.1)	14.3	34	48.0(10.7)	22.3	47	39.0(7.9)	20.3
고등학교	365	25.0(2.1)	8.5	185	27.5(2.5)	9.0	180	21.6(3.2)	14.9
대학교 이상	224	13.9(3.1)	22.3	103	12.0(2.8)	23.2	121	16.0(5.2)	32.7
직업									
전문행정관리	104	13.8(2.9)	20.9	46	16.8(6.0)	35.5	58	10.6(3.8)	36.1
사무직	78	19.7(5.3)	26.7	52	21.7(4.9)	22.6	26	14.0(10.2)	73.4
판매·서비스직	112	33.3(4.5)	13.4	33	39.8(6.9)	17.4	79	29.8(4.8)	16.0
농림어업	70	48.7(6.5)	13.4	48	49.9(7.5)	15.0	22	46.1(9.4)	20.4
기능단순노무직	157	25.6(3.1)	12.1	115	22.7(3.2)	13.9	42	37.4(7.2)	19.2
기타 ³⁾	396	34.5(3.8)	11.0	98	35.9(5.2)	14.5	298	33.8(4.3)	12.8
월 가구소득									
100만원 이하	204	48.4(4.0)	8.3	75	49.7(6.2)	12.4	129	47.4(4.7)	9.9
101-200만원	151	36.4(5.2)	14.3	60	38.4(7.6)	19.9	91	34.7(6.1)	17.7
201-300만원	114	32.6(4.4)	13.5	58	34.9(6.4)	18.5	56	29.3(5.2)	17.6
301-400만원	160	21.3(2.5)	11.8	71	17.2(3.7)	21.3	89	25.8(4.4)	17.0
401만원 이상	282	19.6(2.3)	11.7	126	20.5(4.0)	19.4	156	18.6(3.8)	20.3

: 1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 : (“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 표 64 > 저작불편호소율 : 65세 이상¹⁾

(단위 : %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
교육수준 ²⁾	236	46.6(3.9)	8.4	93	47.2(5.1)	10.7	143	46.1(4.6)	10.0
무학	95	59.5(5.9)	9.9	20	67.6(10.0)	14.8	75	57.2(6.4)	11.1
초등학교	91	41.0(5.6)	13.6	39	49.6(7.4)	14.9	52	33.3(7.3)	21.9
중학교	22	37.9(10.0)	26.4	14	-()	-	8	-()	-
고등학교	22	37.0(9.8)	26.3	16	-()	-	6	-()	-
대학교 이상	6	-()	-	4	-()	-	2	-()	-
월 가구소득									
100만원 이하	145	47.7(4.7)	9.8	53	57.4(5.9)	10.3	92	41.3(5.2)	12.6
101-200만원	41	46.2(8.7)	18.9	20	31.9(11.6)	36.4	21	61.5(11.2)	18.2
201-300만원	16	-()	-	9	-()	-	7	-()	-
301-400만원	16	-()	-	6	-()	-	10	-()	-
401만원 이상	15	-()	-	4	-()	-	11	-()	-

: 1) 저작불편호소율 : (“매우 불편” 또는 “불편”에 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

< 표 65 > 발음불편호소율 : 65세 이상¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	236	24.5(3.6)	14.7	93	22.9(4.8)	20.8	143	25.7(4.1)	15.8
교육수준 ²⁾									
무학	95	32.5(6.1)	18.9	20	51.9(12.2)	23.5	75	27.0(6.0)	22.2
초등학교	91	22.7(4.4)	19.4	39	20.1(5.6)	27.7	52	24.9(6.4)	25.7
중학교	22	22.1(4.6)	20.8	14	-()	-	8	-()	-
고등학교	22	8.0(6.1)	76.8	16	-()	-	6	-()	-
대학교 이상	6	-()	-	4	-()	-	2	-()	-
월 가구소득									
100만원 이하	145	27.9(4.4)	15.7	53	34.5(6.8)	19.6	92	23.6(4.8)	20.5
101-200만원	41	20.7(8.2)	39.6	20	11.9(8.4)	70.0	21	30.0(10.8)	35.9
201-300만원	16	-()	-	9	-()	-	7	-()	-
301-400만원	16	-()	-	6	-()	-	10	-()	-
401만원 이상	15	-()	-	4	-()	-	11	-()	-

주 : 1) 발음불편호소율 : (“매우 불편” 또는 “불편”에 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

< 66> 치아 결손 형태 : 65세 이상¹⁾

(단위 : %)

구분	N	위아래 치아 모두 빠졌다		위쪽 치아만 빠졌다		아래쪽 치아만 빠졌다			
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	236	31.5(3.6)	11.4	4.9(1.6)	32.6	4.5(1.4)	31.5	59.0(4.2)	7.0
성									
남자	93	34.6(5.0)	14.6	5.4(2.1)	38.6	6.6(2.6)	38.8	53.4(5.3)	9.9
여자	143	29.2(4.1)	14.0	4.6(2.3)	50.5	2.9(1.2)	41.0	63.3(4.9)	7.8
교육수준 ²⁾									
무학	95	41.8(5.2)	12.5	4.8(3.0)	62.5	5.7(2.5)	43.2	47.7(4.9)	10.2
초등학교	91	27.5(4.5)	16.3	5.7(2.0)	35.0	3.8(1.9)	49.7	63.0(4.5)	7.1
중학교	22	14.2(5.8)	41.1	5.5(5.3)	95.9	4.4(4.3)	97.7	75.9(8.0)	10.5
고등학교	22	25.2(12.0)	47.6	3.6(3.0)	84.4	4.1(4.0)	98.5	67.1(14.4)	21.5
대학교 이상	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 이하	145	27.6(4.0)	14.4	6.1(2.3)	37.2	4.5(1.6)	35.2	61.9(4.7)	7.6
101-200만원	41	46.7(10.1)	21.7	0.0(0.0)	.	2.2(2.2)	100.5	51.1(10.3)	20.1
201-300만원	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
301-400만원	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
401만원 이상	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-

: 1) 치아 결손 형태 : (치아 결손 형태별 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

<표 67> 틀니 이용 행태 : 65세 이상¹⁾

(단위 : %)

구분	N	위아래 둘 다 있음		위쪽만 있음		아래쪽만 있음		아니오	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	236	48.7(3.7)	7.7	7.6(2.6)	33.5	4.7(1.3)	28.8	39.0(3.8)	9.6
성									
남자	93	46.0(5.4)	11.8	7.0(3.4)	48.3	4.0(2.0)	49.6	42.9(5.6)	13.0
여자	143	50.7(4.3)	8.5	8.1(2.7)	33.6	5.1(1.9)	36.3	36.1(4.4)	12.1
교육수준 ²⁾									
무학	95	64.2(5.7)	8.9	5.8(2.9)	50.6	6.7(2.6)	38.9	23.4(5.3)	22.5
초등학교	91	43.3(4.9)	11.2	11.5(4.4)	38.4	1.7(1.2)	70.0	43.6(4.6)	10.5
중학교	22	26.4(7.6)	28.7	10.7(7.2)	67.0	5.3(4.9)	91.5	57.6(8.8)	15.3
고등학교	22	37.6(13.8)	36.8	0.0(0.0)	.	3.6(3.7)	102.1	58.8(13.8)	23.4
대학교 이상	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 이하	145	49.3(4.2)	8.6	7.8(2.7)	35.0	3.2(1.4)	43.1	39.7(4.5)	11.3
101-200만원	41	49.4(9.6)	19.4	8.5(4.7)	55.2	6.5(3.5)	52.7	35.5(8.8)	24.8
201-300만원	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
301-400만원	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
401만원 이상	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-

주 : 1) 틀니 이용 행태 : (틀니 이용 행태별 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

< 68> 주관적 틀니 필요 인지율 : 65세 이상¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	91	15.6(3.3)	21.4	40	15.2(4.7)	31.1	51	16.0(3.9)	24.4
교육수준 ²⁾									
무학	22	10.0(4.0)	39.7	5	—(—)	—	17	—(—)	—
초등학교	40	17.1(4.6)	26.9	17	—(—)	—	23	21.8(7.7)	35.1
중학교	13	—(—)	—	6	—(—)	—	7	—(—)	—
고등학교	13	—(—)	—	10	—(—)	—	3	—(—)	—
대학교 이상	3	—(—)	—	2	—(—)	—	1	—(—)	—
월 가구소득									
100만원 이하	56	10.4(4.0)	38.4	25	11.4(6.0)	52.2	31	9.4(4.8)	51.1
101-200만원	14	—(—)	—	7	—(—)	—	7	—(—)	—
201-300만원	6	—(—)	—	4	—(—)	—	2	—(—)	—
301-400만원	9	—(—)	—	3	—(—)	—	6	—(—)	—
401만원 이상	6	—(—)	—	1	—(—)	—	5	—(—)	—

: 1) 주관적 틀니 필요 인지율 : (현재 틀니가 필요하다고 생각하는 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 중 틀니 미착용자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

< 69> 점심식사 후 컷슬질 실천율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	907	60.5(3.4)	5.6	390	56.2(5.2)	9.3	517	65.0(2.8)	4.3
연령									
19-29	76	84.8(5.3)	6.2	32	88.9(6.0)	6.8	44	79.9(6.8)	8.5
30-39	123	65.0(5.7)	8.8	51	53.2(8.3)	15.5	72	77.9(4.0)	5.1
40-49	208	64.6(5.4)	8.4	91	59.0(7.9)	13.4	117	70.9(5.5)	7.7
50-59	186	56.8(4.2)	7.3	92	50.3(6.0)	11.9	94	64.2(5.4)	8.3
60-69	128	42.0(4.5)	10.8	51	39.1(7.1)	18.1	77	44.2(6.2)	14.0
70 이상	186	29.8(3.8)	12.7	73	22.6(6.1)	27.0	113	35.2(4.8)	13.5
생애주기별									
19-64	672	65.8(3.7)	5.7	297	60.8(5.6)	9.3	375	71.4(3.2)	4.5
65 이상	235	29.8(3.0)	10.1	93	23.8(5.4)	22.6	142	34.4(4.2)	12.2
교육수준 ²⁾									
무학	114	27.9(3.7)	13.1	24	20.0(8.9)	44.6	90	30.0(4.4)	14.7
초등학교	132	36.6(5.0)	13.7	47	25.7(7.2)	28.0	85	44.5(6.7)	15.1
중학교	80	47.3(6.2)	13.2	34	35.3(9.3)	26.4	46	56.4(7.4)	13.2
고등학교	359	63.6(3.3)	5.3	182	58.2(5.0)	8.5	177	70.9(5.1)	7.2
대학교 이상	222	73.0(6.1)	8.4	103	66.8(8.8)	13.2	119	80.1(4.3)	5.3
직업									
전문행정관리	104	81.6(4.9)	6.1	46	74.1(7.5)	10.1	58	89.4(3.8)	4.2
사무직	77	74.7(5.7)	7.6	51	68.4(7.3)	10.7	26	92.3(5.9)	6.4
판매·서비스직	110	62.2(6.3)	10.2	32	56.9(10.6)	18.5	78	65.0(6.0)	9.3
농림어업	70	29.3(5.4)	18.3	48	19.9(6.3)	31.6	22	50.6(13.0)	25.7
기능단순노무직	157	54.7(5.3)	9.6	115	51.2(6.0)	11.7	42	69.2(6.7)	9.7
기타 ³⁾	388	55.2(3.6)	6.5	97	54.9(7.6)	13.9	291	55.3(3.2)	5.7
월 가구소득									
100만원 이하	202	41.2(4.9)	12.0	74	34.9(7.4)	21.3	128	45.6(5.1)	11.3
101-200만원	150	52.3(4.9)	9.5	60	37.1(7.1)	19.0	90	65.7(5.2)	7.9
201-300만원	109	63.8(6.3)	9.9	57	55.2(9.0)	16.3	52	76.2(8.3)	10.9
301-400만원	159	62.5(4.6)	7.3	71	58.7(6.6)	11.3	88	66.8(4.8)	7.2
401만원 이상	280	68.9(6.1)	8.8	125	67.5(8.4)	12.4	155	70.5(5.9)	8.3

: 1) 점심식사 후 컷슬질 실천율 : (점심식사 후 컷슬질 한 사람의 수 / 점심식사 한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 70> 구강검진 수진율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	31.9(3.5)	10.8	393	37.4(3.8)	10.3	525	26.0(3.9)	15.0
연령									
19-29	78	27.9(4.9)	17.6	33	35.2(9.0)	25.5	45	18.9(6.0)	31.8
30-39	128	30.5(3.2)	10.4	52	39.1(5.0)	12.7	76	21.4(5.6)	26.3
40-49	208	42.5(6.4)	15.1	91	43.0(7.1)	16.5	117	42.0(7.3)	17.3
50-59	189	36.1(4.7)	13.0	93	40.2(6.8)	16.9	96	31.4(4.6)	14.6
60-69	128	21.1(3.6)	17.2	51	29.3(7.1)	24.1	77	14.7(3.3)	22.3
70 이상	187	17.6(3.2)	18.4	73	23.1(6.2)	26.7	114	13.4(3.2)	23.6
생애주기별									
19-64	682	34.2(3.9)	11.5	300	39.2(4.2)	10.8	382	28.6(4.6)	16.2
65 이상	236	18.5(3.3)	17.6	93	24.8(5.7)	23.0	143	13.7(3.1)	22.6
교육수준 ²⁾									
무학	114	15.7(3.4)	21.8	24	23.6(6.4)	27.2	90	13.5(4.1)	30.5
초등학교	134	21.0(4.1)	19.6	47	26.6(7.8)	29.3	87	17.0(3.5)	20.9
중학교	81	23.9(5.7)	23.8	34	20.4(8.2)	40.3	47	26.5(7.2)	27.0
고등학교	365	32.4(4.0)	12.3	185	34.4(4.6)	13.2	180	29.6(4.9)	16.6
대학교 이상	224	39.7(6.1)	15.4	103	49.1(7.1)	14.5	121	29.0(7.7)	26.5
직업									
전문행정관리	104	37.6(7.3)	19.4	46	46.4(8.7)	18.8	58	28.4(8.2)	28.9
사무직	78	44.0(6.3)	14.3	52	47.2(6.9)	14.6	26	34.7(8.6)	24.8
판매·서비스직	112	36.0(5.5)	15.4	33	46.8(8.3)	17.7	79	30.1(7.1)	23.4
농림어업	70	32.5(6.6)	20.2	48	35.3(7.3)	20.8	22	26.2(9.5)	36.4
기능단순노무직	157	33.6(4.7)	13.9	115	34.5(4.7)	13.7	42	30.2(8.3)	27.7
기타 ³⁾	396	23.3(4.6)	19.6	98	24.9(7.1)	28.5	298	22.5(4.6)	20.3
월 가구소득									
100만원 이하	204	15.4(3.2)	20.9	75	22.2(6.0)	26.9	129	10.4(2.9)	28.3
101-200만원	151	23.9(4.8)	20.3	60	29.0(6.8)	23.4	91	19.3(4.4)	22.9
201-300만원	114	37.3(4.4)	11.7	58	46.7(5.3)	11.3	56	24.5(8.1)	32.9
301-400만원	160	28.4(3.4)	11.8	71	31.9(5.6)	17.6	89	24.5(4.9)	20.0
401만원 이상	282	40.6(6.1)	15.1	126	43.0(6.5)	15.1	156	37.8(6.6)	17.5

: 1) 구강검진 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 구강검진을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 71> 연간 스케일링 경험률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
	918	26.9(2.1)	7.9	393	31.1(2.9)	9.5	525	22.5(2.1)	9.5
연령									
19-29	78	26.2(6.3)	24.2	33	24.9(7.7)	31.1	45	27.8(9.4)	33.8
30-39	128	32.2(4.7)	14.6	52	36.0(6.0)	16.8	76	28.2(5.0)	17.8
40-49	208	35.0(4.3)	12.3	91	42.1(6.8)	16.1	117	27.0(2.4)	9.0
50-59	189	26.9(3.5)	12.8	93	33.6(5.4)	15.9	96	19.2(3.8)	19.8
60-69	128	20.5(3.8)	18.4	51	19.7(6.1)	30.7	77	21.0(5.1)	24.1
70 이상	187	5.7(1.8)	30.6	73	5.8(2.8)	48.5	114	5.7(2.5)	43.7
생애주기별									
19-64	682	30.1(2.4)	8.1	300	34.5(3.2)	9.3	382	25.3(2.5)	9.9
65 이상	236	7.8(2.1)	27.0	93	6.5(2.9)	44.4	143	8.7(3.2)	37.1
교육수준 ²⁾									
무학	114	6.3(2.1)	32.8	24	7.8(4.6)	58.8	90	5.9(2.3)	38.6
초등학교	134	12.2(3.6)	29.3	47	12.8(6.5)	50.5	87	11.7(3.5)	29.6
중학교	81	17.9(4.3)	24.3	34	12.8(5.8)	45.5	47	21.6(6.1)	28.3
고등학교	365	25.8(3.0)	11.6	185	26.6(4.2)	15.8	180	24.6(3.0)	12.4
대학교 이상	224	39.5(4.2)	10.5	103	47.9(5.4)	11.2	121	30.0(5.2)	17.3
직업									
전문행정관리	104	40.7(5.1)	12.6	46	52.4(8.6)	16.3	58	28.6(5.5)	19.1
사무직	78	38.1(5.1)	13.5	52	41.5(7.8)	18.7	26	28.7(9.0)	31.2
판매·서비스직	112	25.5(3.6)	14.2	33	29.4(7.3)	24.7	79	23.4(5.5)	23.5
농림어업	70	23.0(5.4)	23.2	48	18.7(5.5)	29.4	22	32.8(10.1)	30.7
기능단순노무직	157	32.4(4.1)	12.7	115	35.5(4.0)	11.2	42	19.8(7.7)	38.8
기타 ³⁾	396	16.5(2.4)	14.8	98	9.6(3.7)	38.3	298	19.6(3.0)	15.2
월 가구소득									
100만원 이하	204	13.1(3.7)	28.1	75	11.8(4.1)	34.9	129	14.1(5.1)	36.5
101-200만원	151	21.0(3.4)	16.1	60	26.4(5.5)	20.9	91	16.2(3.6)	22.0
201-300만원	114	30.8(4.3)	13.8	58	36.1(6.8)	18.9	56	23.6(9.0)	38.3
301-400만원	160	32.0(4.6)	14.5	71	32.7(6.5)	19.7	89	31.1(5.3)	16.9
401만원 이상	282	31.0(4.3)	13.8	126	36.8(6.3)	17.2	156	24.5(2.9)	12.0

: 1) 연간 스케일링 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 스케일링을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 72> 치실 및 치간솔 이용률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	26.6(2.6)	9.7	393	22.8(3.4)	15.0	525	30.6(2.6)	8.4
연령									
19-29	78	41.2(7.1)	17.3	33	40.9(10.8)	26.5	45	41.5(7.4)	17.9
30-39	128	27.1(3.2)	11.9	52	19.1(5.0)	26.2	76	35.5(3.5)	9.9
40-49	208	32.7(4.2)	12.8	91	23.3(6.9)	29.4	117	43.4(5.6)	13.0
50-59	189	23.1(3.9)	17.0	93	19.0(4.1)	21.6	96	27.7(5.3)	19.2
60-69	128	17.2(3.3)	19.4	51	23.3(5.9)	25.2	77	12.3(3.3)	26.4
70 이상	187	4.6(1.6)	35.7	73	3.9(2.2)	57.2	114	5.1(2.3)	45.5
생애주기별									
19-64	682	30.3(2.9)	9.5	300	25.4(3.7)	14.7	382	35.9(2.9)	8.2
65 이상	236	4.5(1.3)	29.1	93	4.3(1.9)	44.3	143	4.7(1.9)	39.9
교육수준 ²⁾									
무학	114	2.3(1.6)	69.4	24	0.0(0.0)	.	90	3.0(2.1)	68.9
초등학교	134	4.4(1.5)	33.8	47	2.1(2.1)	98.0	87	6.0(2.1)	35.0
중학교	81	16.8(3.7)	21.9	34	11.8(5.4)	45.4	47	20.6(6.0)	29.0
고등학교	365	32.5(4.3)	13.2	185	26.3(5.8)	22.2	180	40.8(4.1)	10.1
대학교 이상	224	31.5(3.3)	10.6	103	25.5(4.4)	17.3	121	38.3(4.2)	11.0
직업									
전문행정관리	104	43.3(6.5)	15.1	46	35.2(7.8)	22.2	58	51.6(8.9)	17.3
사무직	78	31.5(6.7)	21.2	52	31.5(8.8)	27.8	26	31.3(6.0)	19.1
판매·서비스직	112	24.7(7.0)	28.4	33	10.1(5.9)	58.8	79	32.6(8.5)	26.1
농림어업	70	7.4(4.4)	58.9	48	6.1(4.3)	70.7	22	10.4(6.7)	64.5
기능단순노무직	157	15.8(3.3)	20.8	115	17.1(4.0)	23.6	42	10.2(4.7)	46.1
기타 ³⁾	396	27.8(3.5)	12.7	98	26.2(7.7)	29.3	298	28.6(2.7)	9.4
월 가구소득									
100만원 이하	204	11.9(3.2)	27.1	75	11.0(5.8)	52.4	129	12.5(3.3)	26.5
101-200만원	151	15.4(3.6)	23.5	60	10.1(3.7)	36.6	91	20.0(4.9)	24.3
201-300만원	114	30.4(4.1)	13.7	58	24.9(6.8)	27.2	56	37.9(3.4)	9.0
301-400만원	160	34.8(5.2)	14.9	71	29.1(5.9)	20.3	89	41.2(6.6)	16.0
401만원 이상	282	31.7(5.5)	17.3	126	27.4(6.6)	23.9	156	36.6(5.1)	14.0

: 1) 치실 및 치간솔 이용률 : (치실(floss) 혹은 치간솔을 사용하는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 73> 무자격자 치과시술률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	10.6(1.2)	11.4	393	8.3(1.6)	18.9	525	12.9(1.5)	11.7
연령									
19-29	78	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.
30-39	128	2.9(1.6)	53.6	52	4.5(3.0)	65.9	76	1.3(1.3)	104.4
40-49	208	6.0(1.6)	26.9	91	4.5(2.5)	55.4	117	7.6(2.2)	28.2
50-59	189	9.7(2.0)	21.0	93	8.9(2.6)	28.8	96	10.5(3.0)	28.3
60-69	128	30.2(3.8)	12.5	51	20.7(5.2)	25.1	77	37.7(5.3)	14.0
70 이상	187	36.5(4.0)	11.0	73	31.2(4.6)	14.8	114	40.5(4.7)	11.6
생애주기별									
19-64	682	6.1(1.1)	17.6	300	5.0(1.5)	29.9	382	7.3(1.4)	19.5
65 이상	236	36.7(3.3)	9.0	93	32.0(4.3)	13.3	143	40.2(3.9)	9.7
교육수준 ²⁾									
무학	114	40.3(4.8)	11.9	24	42.5(10.7)	25.2	90	39.7(4.6)	11.7
초등학교	134	29.8(3.2)	10.6	47	19.8(4.5)	22.8	87	36.9(5.0)	13.6
중학교	81	21.0(4.7)	22.5	34	20.6(5.7)	27.8	47	21.2(7.0)	33.1
고등학교	365	6.2(1.3)	21.6	185	6.5(1.8)	27.8	180	5.8(1.6)	27.3
대학교 이상	224	2.6(1.0)	39.7	103	3.3(1.5)	45.2	121	1.8(0.8)	46.3
직업									
전문행정관리	104	3.1(2.0)	63.7	46	6.1(3.9)	63.6	58	0.0(0.0)	.
사무직	78	3.7(2.3)	61.4	52	5.0(3.2)	64.4	26	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	112	11.0(3.1)	28.1	33	11.5(5.0)	43.9	79	10.7(3.6)	33.7
농림어업	70	27.6(4.8)	17.4	48	25.0(7.3)	29.1	22	33.4(9.2)	27.5
기능단순노무직	157	7.1(2.2)	30.7	115	3.5(1.7)	50.4	42	21.9(8.4)	38.4
기타 ³⁾	396	14.9(1.9)	13.0	98	12.6(2.9)	22.9	298	16.0(2.2)	13.6
월 가구소득									
100만원 이하	204	23.1(3.0)	13.2	75	13.8(3.1)	22.9	129	29.9(4.2)	14.0
101-200만원	151	19.8(3.0)	15.1	60	22.7(5.6)	24.7	91	17.2(3.1)	18.2
201-300만원	114	13.5(2.7)	20.4	58	9.8(3.7)	37.7	56	18.5(4.2)	22.7
301-400만원	160	5.0(1.6)	31.3	71	5.3(2.1)	40.1	89	4.7(1.3)	27.7
401만원 이상	282	3.8(1.2)	31.0	126	2.6(1.1)	44.0	156	5.2(2.0)	38.9

: 1) 무자격자 치과시술률 : (치과가 아닌 곳에서 무자격자에 의한 치과시술(야매)을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 74> 치과진료 미치료율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	15.3(2.8)	18.5	393	14.5(3.6)	24.5	525	16.1(2.6)	16.1
연령									
19-29	78	11.8(3.7)	31.4	33	6.2(4.4)	70.6	45	18.7(5.0)	26.8
30-39	128	18.6(4.5)	24.0	52	20.7(6.7)	32.3	76	16.4(4.4)	27.2
40-49	208	13.7(4.3)	31.1	91	11.6(5.1)	43.9	117	16.1(4.4)	27.1
50-59	189	14.7(4.7)	32.1	93	18.0(5.9)	33.1	96	11.0(4.1)	36.9
60-69	128	15.0(3.0)	19.8	51	15.5(6.1)	39.7	77	14.7(3.3)	22.1
70 이상	187	18.8(2.8)	15.0	73	16.1(4.0)	25.1	114	20.8(4.2)	20.4
생애주기별									
19-64	682	14.6(3.3)	22.4	300	14.0(3.9)	28.2	382	15.4(3.0)	19.5
65 이상	236	19.0(2.6)	13.6	93	18.3(3.5)	19.0	143	19.5(4.0)	20.6
교육수준 ²⁾									
무학	114	24.6(4.4)	18.0	24	12.5(6.1)	48.6	90	27.9(4.8)	17.3
초등학교	134	18.0(4.2)	23.6	47	24.7(6.8)	27.6	87	13.3(3.8)	28.3
중학교	81	18.5(4.7)	25.3	34	19.6(7.5)	38.1	47	17.7(5.5)	31.1
고등학교	365	13.7(2.9)	21.0	185	15.1(4.2)	28.0	180	11.9(3.0)	25.5
대학교 이상	224	14.0(4.4)	31.5	103	10.4(4.0)	38.6	121	18.1(5.3)	29.5
직업									
전문행정관리	104	14.0(4.9)	34.9	46	16.2(7.5)	46.3	58	11.8(2.9)	24.4
사무직	78	6.8(3.6)	52.3	52	7.4(5.1)	68.2	26	5.1(3.0)	58.9
판매·서비스직	112	21.1(5.7)	26.8	33	24.9(8.7)	34.9	79	19.0(5.0)	26.4
농림어업	70	12.7(4.5)	35.3	48	13.8(5.0)	36.5	22	10.4(6.1)	59.0
기능단순노무직	157	15.7(4.2)	26.6	115	14.4(4.4)	30.5	42	20.9(5.6)	26.8
기타 ³⁾	396	16.8(2.5)	15.1	98	15.7(5.0)	31.6	298	17.3(3.0)	17.6
월 가구소득									
100만원 이하	204	14.9(3.3)	21.9	75	13.4(3.4)	25.3	129	16.0(4.4)	27.6
101-200만원	151	21.0(4.6)	21.9	60	24.2(8.0)	33.1	91	18.1(4.1)	22.5
201-300만원	114	22.1(5.1)	23.0	58	24.6(6.3)	25.5	56	18.8(6.2)	33.2
301-400만원	160	15.9(3.6)	22.8	71	14.0(5.1)	36.5	89	18.0(3.3)	18.4
401만원 이상	282	9.7(3.7)	38.8	126	8.0(3.2)	40.5	156	11.6(4.8)	41.0

1) 치과진료 미치료율 : (최근 1년(365일) 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 75> 치과진료 미치료자의 미치료 이유¹⁾

(: %)

	N	경제적인 이유로		치과병의원이 너무멀어서		직장이나 학교를 비울수 없어서		거동이 불편해서 혹은 건강문제 때문에		아이를봐줄 사람이없어서		다른문제들에 비해서덜 중요하다고 느껴서		치과진료를 받기가 무서워서		기 타	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
성	142	37.7(4.2)	11.1	3.8(2.0)	52.8	30.6(3.6)	11.7	2.1(0.7)	32.9	2.5(1.9)	74.4	7.6(3.4)	44.9	8.4(2.5)	30.1	7.3(3.2)	43.6
남자	61	38.1(6.5)	17.2	4.2(3.4)	80.8	42.3(6.0)	14.3	0.8(0.2)	23.2	0.0(0.0)	.	4.9(3.1)	63.7	2.1(2.2)	101.6	7.5(4.6)	61.9
여자	81	37.4(5.1)	13.5	3.4(1.9)	56.3	19.6(3.7)	18.7	3.3(1.2)	37.0	4.8(3.4)	70.2	10.0(4.8)	48.2	14.4(4.8)	33.0	7.0(2.4)	33.4
연령																	
19-29	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	23	24.8(7.3)	29.5	6.8(6.6)	97.5	32.1(7.9)	24.7	0.0(0.0)	.	10.0(7.6)	76.1	9.9(7.5)	76.3	4.2(4.3)	103.1	12.3(9.9)	80.7
40-49	29	21.8(8.7)	39.6	0.0(0.0)	.	50.9(9.8)	19.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	15.9(8.5)	53.9	11.4(4.0)	35.4	0.0(0.0)	.
50-59	29	38.6(10.2)	26.5	0.0(0.0)	.	37.0(8.9)	24.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	6.7(6.0)	89.3	3.1(2.7)	89.1	14.6(4.7)	32.2
60-69	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
70 이상	34	68.9(5.8)	8.4	2.9(2.7)	95.7	2.7(2.7)	98.4	14.8(3.8)	25.7	0.0(0.0)	.	2.6(2.7)	101.1	0.0(0.0)	.	8.1(4.7)	58.8
생애주기별																	
19-64	100	29.8(4.1)	13.6	4.1(2.4)	57.7	36.5(4.0)	11.0	0.0(0.0)	.	3.0(2.3)	76.5	8.8(4.1)	47.0	10.3(3.0)	29.3	7.5(3.7)	50.1
65 이상	42	73.6(5.3)	7.3	2.2(2.1)	94.7	4.2(2.9)	68.6	11.6(2.8)	23.7	0.0(0.0)	.	2.1(2.1)	102.3	0.0(0.0)	.	6.3(3.9)	61.6
교육수준 ²⁾																	
무학	26	70.3(6.5)	9.2	3.6(3.2)	88.6	4.1(4.0)	97.8	16.1(5.4)	33.4	0.0(0.0)	.	3.3(3.4)	101.9	0.0(0.0)	.	2.5(2.4)	96.8
초등학교	20	69.7(10.4)	15.0	4.1(1.1)	27.9	7.4(5.0)	66.7	3.0(2.8)	94.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	15.8(8.1)	50.9
중학교	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	50	30.4(7.1)	23.2	6.2(4.4)	71.4	43.8(7.7)	17.5	0.0(0.0)	.	2.0(2.0)	104.3	6.3(5.0)	79.4	8.1(4.5)	55.2	3.2(2.8)	85.0
대학교 이상	31	15.7(7.2)	45.8	1.3(1.4)	104.9	32.1(9.5)	29.7	0.0(0.0)	.	5.9(6.9)	116.8	16.2(9.7)	60.0	17.9(6.3)	35.5	10.9(7.6)	69.9
직업																	
전문행정관리	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
사무직	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	25	22.9(9.5)	41.3	8.1(5.5)	67.0	43.9(6.3)	14.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	16.6(7.3)	43.7	8.4(6.8)	80.6
농림어업	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	23	24.9(8.3)	33.5	8.4(7.7)	91.5	49.3(12.1)	24.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	8.5(6.3)	73.8	0.0(0.0)	.	8.9(4.3)	48.0
기타 ³⁾	63	50.9(5.7)	11.2	1.0(1.0)	98.5	9.2(5.4)	58.7	5.1(1.4)	28.0	6.0(4.2)	69.1	12.5(6.1)	49.1	12.7(5.3)	41.8	2.6(1.6)	60.0
월 가구소득																	
100만원 이하	31	71.1(10.0)	14.1	2.9(3.0)	103.0	2.8(2.8)	99.9	9.9(3.1)	31.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	10.8(8.7)	80.3	2.6(2.7)	104.9
101-200만원	30	48.4(8.6)	17.8	8.3(7.4)	89.6	26.5(9.9)	37.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.1(3.0)	96.8	9.9(4.2)	42.7	3.8(3.0)	77.3
201-300만원	24	36.7(7.5)	20.4	1.8(1.9)	104.6	26.1(7.8)	30.1	2.1(1.9)	92.0	0.0(0.0)	.	16.4(7.3)	44.7	0.0(0.0)	.	16.9(6.2)	36.6
301-400만원	23	34.1(11.7)	34.4	0.0(0.0)	.	39.4(9.3)	23.7	0.0(0.0)	.	8.2(8.7)	106.5	0.0(0.0)	.	14.2(8.1)	57.0	4.1(3.3)	79.9
401만원 이상	32	29.1(8.3)	28.7	0.0(0.0)	.	15.9(7.2)	45.2	0.0(0.0)	.	2.3(2.3)	102.6	30.5(7.6)	24.8	18.8(6.8)	36.1	3.5(3.4)	97.9

: 1) 치과진료 미치료자의 미치료 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 치과진료를 받지 못한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 76> 주관적 잇몸건강 인지율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	914	82.0(2.2)	2.7	391	85.2(2.5)	2.9	523	78.7(2.6)	3.2
연령									
19-29	78	85.9(4.2)	4.9	33	100.0(0.0)	0.0	45	68.4(7.1)	10.5
30-39	128	78.3(4.3)	5.4	52	78.8(6.5)	8.3	76	77.9(4.5)	5.7
40-49	208	85.9(2.9)	3.4	91	86.5(3.9)	4.5	117	85.3(4.0)	4.7
50-59	186	85.5(3.4)	3.9	91	82.9(5.4)	6.5	95	88.3(3.7)	4.2
60-69	128	80.9(3.2)	4.0	51	84.3(4.8)	5.7	77	78.2(4.7)	6.0
70 이상	186	70.0(4.1)	5.9	73	73.8(5.6)	7.5	113	67.1(4.3)	6.4
생애주기별									
19-64	679	83.9(2.5)	3.0	298	86.9(2.7)	3.1	381	80.7(2.9)	3.6
65 이상	235	70.8(3.6)	5.1	93	72.8(4.7)	6.5	142	69.3(3.7)	5.4
교육수준 ²⁾									
무학	112	67.3(5.4)	8.1	24	70.5(10.2)	14.4	88	66.4(5.5)	8.3
초등학교	134	71.7(4.5)	6.2	47	67.5(7.4)	11.0	87	74.7(4.4)	5.9
중학교	81	82.5(4.2)	5.1	34	79.7(7.9)	9.9	47	84.6(4.9)	5.8
고등학교	363	81.6(2.5)	3.1	183	85.6(2.7)	3.1	180	76.4(3.6)	4.7
대학교 이상	224	88.8(4.2)	4.7	103	90.7(4.3)	4.7	121	86.5(4.3)	5.0
직업									
전문행정관리	104	87.3(4.6)	5.3	46	81.3(7.9)	9.8	58	93.5(2.9)	3.1
사무직	77	82.3(3.9)	4.8	51	82.5(4.1)	5.0	26	81.7(11.6)	14.2
판매·서비스직	111	77.1(3.2)	4.2	33	80.2(6.3)	7.8	78	75.4(4.4)	5.8
농림어업	70	81.3(4.6)	5.7	48	80.1(6.1)	7.6	22	83.9(6.6)	7.9
기능단순노무직	156	88.2(3.3)	3.8	114	90.1(3.5)	3.9	42	80.4(5.7)	7.1
기타 ³⁾	395	78.9(3.1)	3.9	98	87.6(3.4)	3.9	297	74.9(3.3)	4.4
월 가구소득									
100만원 이하	203	77.0(3.8)	5.0	75	78.3(4.9)	6.2	128	75.9(5.0)	6.5
101-200만원	150	84.0(3.8)	4.5	60	84.3(6.4)	7.6	90	83.8(4.3)	5.1
201-300만원	114	81.9(3.7)	4.6	58	88.4(3.4)	3.9	56	73.1(5.0)	6.8
301-400만원	159	81.0(3.6)	4.4	70	89.1(3.5)	3.9	89	72.1(5.0)	6.9
401만원 이상	281	84.1(3.2)	3.8	125	83.8(3.9)	4.6	156	84.4(3.4)	4.0

: 1) 주관적 잇몸건강 인지율 : ('정상이다'에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 77> 하루 평균 수면시간¹⁾

(: %, 시간)

	N	6시간 이하		7-8시간		9시간 이상		수면	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	시간(표준오차)	변동계수
전체	917	37.3(2.1)	5.7	59.0(2.2)	3.7	3.6(0.8)	21.0	6.8(0.0)	0.7
성									
남자	393	38.9(2.7)	7.0	57.0(2.8)	5.0	4.1(1.1)	27.8	6.8(0.1)	0.9
여자	524	35.7(2.7)	7.6	61.2(2.6)	4.3	3.1(0.9)	29.6	6.8(0.1)	1.1
연령									
19-29	78	30.2(6.7)	22.1	64.5(7.4)	11.4	5.3(3.2)	59.9	6.9(0.2)	2.6
30-39	128	35.7(4.7)	13.3	59.7(4.3)	7.3	4.6(1.9)	41.2	6.8(0.1)	1.5
40-49	208	38.7(2.7)	7.1	59.4(2.8)	4.6	1.9(1.1)	58.0	6.7(0.1)	0.8
50-59	189	38.7(3.5)	9.0	59.2(3.4)	5.8	2.1(0.9)	41.8	6.8(0.1)	1.3
60-69	127	39.1(4.0)	10.1	57.0(4.1)	7.2	3.9(1.4)	36.3	6.7(0.1)	1.2
70 이상	187	43.9(4.0)	9.1	50.7(3.6)	7.1	5.4(1.6)	30.5	6.7(0.1)	1.6
생애주기별									
19-64	681	36.2(2.4)	6.5	60.6(2.3)	3.8	3.3(0.9)	27.3	6.8(0.1)	0.8
65 이상	236	44.3(3.4)	7.6	50.2(3.1)	6.3	5.5(1.4)	25.5	6.7(0.1)	1.3
교육수준 ³⁾									
무학	113	46.1(5.1)	11.0	47.8(4.9)	10.2	6.2(1.5)	23.9	6.6(0.1)	2.1
초등학교	134	37.5(4.1)	10.9	56.4(4.0)	7.0	6.1(2.7)	44.7	6.9(0.1)	1.8
중학교	81	43.2(6.5)	15.1	53.2(7.0)	13.1	3.5(2.1)	57.9	6.6(0.2)	2.5
고등학교	365	39.7(3.4)	8.6	56.7(3.2)	5.7	3.6(1.3)	36.5	6.7(0.1)	1.3
대학교 이상	224	30.4(3.8)	12.5	67.2(3.4)	5.1	2.4(1.6)	68.1	6.9(0.1)	1.2
직업									
전문행정관리	104	33.1(4.0)	12.2	66.9(4.0)	6.0	0.0(0.0)	.	6.7(0.1)	1.1
사무직	78	39.9(4.6)	11.5	60.1(4.6)	7.7	0.0(0.0)	.	6.6(0.1)	1.4
판매·서비스직	112	38.1(5.8)	15.2	60.0(5.7)	9.6	1.9(1.4)	77.2	6.7(0.1)	1.8
농림어업	70	37.4(5.4)	14.4	59.2(5.8)	9.8	3.4(1.8)	53.6	6.8(0.1)	1.8
기능단순노무직	157	47.9(3.4)	7.1	48.3(3.2)	6.6	3.8(1.4)	37.5	6.7(0.1)	1.2
기타 ⁴⁾	395	32.5(2.5)	7.8	60.9(2.9)	4.7	6.6(1.8)	26.8	6.9(0.1)	1.3
월 가구소득									
100만원 이하	203	42.4(4.3)	10.1	52.0(4.2)	8.1	5.5(1.7)	30.2	6.7(0.1)	1.7
101-200만원	151	38.9(5.0)	12.9	56.1(5.0)	8.9	5.0(1.9)	38.9	6.8(0.1)	1.6
201-300만원	114	35.6(3.7)	10.4	58.5(4.9)	8.3	5.8(2.5)	43.7	7.0(0.1)	1.0
301-400만원	160	40.1(4.7)	11.7	54.2(4.2)	7.7	5.6(2.4)	43.4	6.7(0.1)	1.7
401만원 이상	282	34.1(3.3)	9.7	65.5(3.4)	5.2	0.5(0.4)	89.1	6.8(0.1)	0.9

: 1) 하루 평균 수면시간 : 수면시간의 총 합 / 조사대상 응답자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 78> 스트레스 인지율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	917	21.8(2.4)	11.1	393	23.1(3.8)	16.6	524	20.4(2.7)	13.2
연령									
19-29	78	18.7(4.0)	21.3	33	14.4(4.4)	30.7	45	23.9(6.8)	28.4
30-39	128	24.9(3.4)	13.9	52	28.2(6.1)	21.8	76	21.3(4.6)	21.7
40-49	207	25.3(5.0)	19.8	91	33.3(7.6)	22.9	116	16.1(3.8)	23.4
50-59	189	23.8(3.8)	16.1	93	24.2(4.6)	18.9	96	23.3(5.0)	21.3
60-69	128	13.5(2.8)	21.1	51	10.0(4.9)	49.1	77	16.2(4.3)	26.4
70 이상	187	15.6(3.2)	20.7	73	8.2(3.3)	41.1	114	21.2(4.2)	19.9
생애주기별									
19-64	681	22.7(2.7)	11.9	300	24.8(4.2)	17.0	381	20.3(3.0)	14.7
65 이상	236	16.7(2.6)	15.8	93	11.0(3.2)	28.8	143	21.1(3.7)	17.5
교육수준 ²⁾									
무학	114	22.9(4.8)	21.2	24	9.2(6.3)	68.4	90	26.6(5.6)	21.2
초등학교	134	14.9(3.2)	21.7	47	15.9(7.0)	43.7	87	14.2(3.5)	24.9
중학교	80	22.0(5.4)	24.4	34	17.8(7.4)	41.7	46	25.3(7.0)	27.8
고등학교	365	21.7(3.1)	14.3	185	24.8(5.1)	20.5	180	17.6(3.3)	18.8
대학교 이상	224	23.5(3.9)	16.4	103	24.1(4.6)	18.9	121	22.8(4.9)	21.5
직업									
전문행정관리	104	21.1(4.6)	21.6	46	22.1(5.5)	24.7	58	20.1(6.2)	30.7
사무직	78	25.7(4.7)	18.3	52	29.3(6.3)	21.5	26	15.5(8.2)	52.5
판매·서비스직	111	30.4(6.0)	19.8	33	43.8(12.8)	29.2	78	23.1(5.2)	22.6
농림어업	70	11.2(4.0)	35.2	48	12.3(5.2)	42.4	22	8.9(6.3)	70.5
기능단순노무직	157	20.8(3.4)	16.2	115	19.6(4.0)	20.2	42	25.9(6.2)	24.1
기타 ³⁾	396	19.6(1.9)	9.9	98	18.3(5.7)	30.9	298	20.1(3.2)	16.0
월 가구소득									
100만원 이하	204	20.8(4.2)	20.0	75	24.8(6.2)	24.8	129	17.9(5.3)	29.9
101-200만원	151	16.0(2.9)	18.2	60	10.5(4.5)	43.4	91	20.8(4.7)	22.6
201-300만원	113	25.4(4.5)	17.6	58	29.7(9.6)	32.3	55	19.3(7.1)	36.6
301-400만원	160	26.0(4.1)	16.0	71	26.3(5.9)	22.6	89	25.7(5.8)	22.4
401만원 이상	282	20.7(4.2)	20.3	126	22.8(4.5)	19.8	156	18.3(5.0)	27.5

1) 스트레스 인지율 : (평균 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느낀다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 79> 우울감 경험률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
	916	3.8(0.7)	17.3	393	2.1(0.8)	36.5	523	5.6(0.8)	14.7
연령									
19-29	78	0.9(0.9)	98.2	33	0.0(0.0)	.	45	2.0(1.8)	87.9
30-39	128	5.1(1.9)	36.4	52	3.6(2.7)	74.4	76	6.7(2.3)	33.9
40-49	208	1.6(0.9)	55.8	91	0.0(0.0)	.	117	3.4(1.9)	56.2
50-59	189	4.3(1.6)	36.5	93	2.5(2.0)	77.7	96	6.2(2.3)	37.0
60-69	128	6.6(2.0)	29.9	51	4.7(1.9)	39.8	77	8.0(2.9)	35.7
70 이상	185	7.6(2.1)	27.3	73	5.9(2.9)	48.9	112	8.9(2.8)	30.8
생애주기별									
19-64	682	3.4(0.7)	21.2	300	1.8(0.8)	45.9	382	5.1(0.9)	17.6
65 이상	234	6.3(1.6)	25.0	93	4.6(2.3)	49.5	141	7.6(2.1)	27.7
교육수준 ²⁾									
무학	113	10.5(2.8)	26.1	24	13.1(7.6)	58.2	89	9.8(3.0)	30.2
초등학교	133	6.5(2.6)	40.2	47	4.9(4.7)	97.3	86	7.6(3.1)	41.1
중학교	81	7.3(2.5)	34.4	34	4.5(3.1)	70.4	47	9.4(4.2)	44.5
고등학교	365	3.3(0.9)	26.3	185	1.9(1.1)	56.5	180	5.1(1.3)	25.9
대학교 이상	224	1.6(0.8)	47.2	103	0.6(0.6)	101.3	121	2.8(1.4)	50.6
직업									
전문행정관리	104	1.8(1.4)	78.2	46	2.7(2.7)	97.0	58	0.9(0.9)	98.8
사무직	78	1.2(0.8)	69.1	52	0.6(0.6)	101.4	26	2.8(2.7)	97.1
판매·서비스직	112	4.6(1.8)	39.9	33	0.0(0.0)	.	79	7.1(2.7)	38.1
농림어업	70	0.9(0.9)	103.9	48	0.0(0.0)	.	22	2.9(3.1)	106.3
기능단순노무직	157	1.9(1.1)	55.5	115	1.5(1.2)	79.0	42	3.5(2.5)	71.7
기타 ³⁾	394	6.5(1.3)	20.6	98	5.2(2.3)	44.0	296	7.1(1.4)	19.7
월 가구소득									
100만원 이하	203	6.6(2.1)	31.3	75	4.6(2.4)	51.6	128	8.1(2.5)	31.1
101-200만원	150	3.7(1.1)	30.6	60	0.0(0.0)	.	90	6.9(2.2)	31.2
201-300만원	114	6.0(1.9)	31.1	58	5.6(3.1)	55.8	56	6.5(2.3)	35.3
301-400만원	160	3.6(1.2)	33.7	71	1.8(1.8)	99.2	89	5.6(1.6)	29.3
401만원 이상	282	1.6(0.6)	36.5	126	1.0(0.5)	56.0	156	2.3(0.9)	39.5

: 1) 우울감 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 연속적으로 2주(14일) 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 경험한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 80> 자살생각률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	5.7(0.9)	15.4	393	3.9(1.0)	24.7	525	7.6(1.1)	14.6
연령									
19-29	78	4.3(2.2)	50.3	33	3.0(2.9)	94.4	45	5.9(3.7)	62.9
30-39	128	4.4(1.5)	32.9	52	3.3(2.4)	72.6	76	5.7(2.0)	35.8
40-49	208	2.6(1.4)	51.7	91	1.8(1.2)	66.3	117	3.6(2.1)	57.4
50-59	189	4.9(1.8)	37.8	93	5.1(2.6)	51.3	96	4.7(2.1)	45.6
60-69	128	10.9(2.7)	25.1	51	2.9(2.1)	73.0	77	17.1(4.2)	24.3
70 이상	187	14.2(3.4)	23.8	73	10.8(3.7)	34.3	114	16.8(4.0)	23.9
생애주기별									
19-64	682	4.4(0.8)	18.9	300	3.2(1.0)	30.1	382	5.7(1.2)	21.0
65 이상	236	13.5(3.0)	22.5	93	9.2(3.1)	33.6	143	16.7(3.7)	22.4
교육수준 ²⁾									
무학	114	20.8(4.3)	20.5	24	9.2(6.0)	65.0	90	24.0(4.9)	20.4
초등학교	134	9.3(2.7)	29.4	47	11.0(5.4)	48.6	87	8.1(2.8)	34.1
중학교	81	9.4(3.1)	33.2	34	9.3(5.8)	61.8	47	9.4(4.2)	44.5
고등학교	365	4.0(1.0)	25.9	185	3.6(1.3)	36.9	180	4.4(1.7)	37.1
대학교 이상	224	3.1(1.7)	56.1	103	1.4(1.0)	70.4	121	5.1(2.6)	51.9
직업									
전문행정관리	104	1.2(0.9)	72.8	46	1.5(1.5)	99.6	58	0.9(0.9)	98.8
사무직	78	1.2(0.9)	72.1	52	1.7(1.2)	72.1	26	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	112	8.5(2.5)	29.0	33	6.3(4.2)	66.3	79	9.6(2.9)	29.9
농림어업	70	5.0(3.0)	59.2	48	3.6(2.4)	66.8	22	8.3(8.0)	96.3
기능단순노무직	157	2.0(1.1)	55.2	115	1.2(1.2)	98.4	42	5.2(2.9)	55.0
기타 ³⁾	396	10.0(1.8)	17.7	98	10.0(3.1)	30.9	298	10.0(2.0)	19.8
월 가구소득									
100만원 이하	204	11.3(3.3)	29.5	75	11.0(5.1)	46.4	129	11.5(3.6)	31.2
101-200만원	151	6.5(1.6)	24.2	60	1.8(1.3)	72.7	91	10.6(2.4)	22.5
201-300만원	114	8.0(1.7)	21.6	58	8.2(3.7)	45.1	56	7.8(3.5)	45.1
301-400만원	160	5.9(2.0)	33.1	71	4.2(2.4)	57.7	89	7.8(3.0)	38.8
401만원 이상	282	2.1(1.0)	48.0	126	0.7(0.5)	73.6	156	3.7(1.9)	52.7

: 1) 자살생각률 : (최근 1년(365일) 동안 자살을 생각해 본 적이 있는 사람의 수/ 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 81> 자살시도율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	917	0.4(0.2)	51.6	393	0.0(0.0)	.	524	0.7(0.4)	50.8
연령									
19-29	78	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.
30-39	128	1.1(0.8)	71.7	52	0.0(0.0)	.	76	2.2(1.6)	73
40-49	208	0.0(0.0)	.	91	0.0(0.0)	.	117	0.0(0.0)	.
50-59	189	0.4(0.4)	99.1	93	0.0(0.0)	.	96	0.8(0.8)	99.3
60-69	128	0.8(0.8)	101.7	51	0.0(0.0)	.	77	1.4(1.4)	100.2
70 이상	186	0.0(0.0)	.	73	0.0(0.0)	.	113	0.0(0.0)	.
생애주기별									
19-64	682	0.4(0.2)	51.7	300	0.0(0.0)	.	382	0.9(0.4)	50.8
65 이상	235	0.0(0.0)	.	93	0.0(0.0)	.	142	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	114	0.9(0.9)	101.6	24	0.0(0.0)	.	90	1.1(1.2)	102
초등학교	133	0.0(0.0)	.	47	0.0(0.0)	.	86	0.0(0.0)	.
중학교	81	1.1(1.1)	98.3	34	0.0(0.0)	.	47	1.9(2.0)	100.4
고등학교	365	0.5(0.3)	70.7	185	0.0(0.0)	.	180	1.1(0.8)	68.8
대학교 이상	224	0.0(0.0)	.	103	0.0(0.0)	.	121	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	104	0.0(0.0)	.	46	0.0(0.0)	.	58	0.0(0.0)	.
사무직	78	0.0(0.0)	.	52	0.0(0.0)	.	26	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	112	1.9(1.3)	69.7	33	0.0(0.0)	.	79	2.9(1.9)	67.8
농림어업	70	0.0(0.0)	.	48	0.0(0.0)	.	22	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	157	0.0(0.0)	.	115	0.0(0.0)	.	42	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	395	0.4(0.3)	71.7	98	0.0(0.0)	.	297	0.5(0.4)	71.4
월 가구소득									
100만원 이하	204	0.4(0.4)	100.2	75	0.0(0.0)	.	129	0.7(0.7)	99.1
101-200만원	150	0.0(0.0)	.	60	0.0(0.0)	.	90	0.0(0.0)	.
201-300만원	114	0.6(0.6)	102.6	58	0.0(0.0)	.	56	1.3(1.3)	102.3
301-400만원	160	0.7(0.7)	99.4	71	0.0(0.0)	.	89	1.4(1.3)	95.2
401만원 이상	282	0.2(0.2)	101	126	0.0(0.0)	.	156	0.5(0.5)	101

: 1) 자살시도율 : (최근 1년(365일) 동안 실제로 자살시도를 해 본적이 있는 사람의 수/ 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 82> 정신상담률

(: %)

	스트레스로 인한 정신상담률 ¹⁾			우울증상으로 인한 정신상담률 ²⁾			자살생각으로 인한 정신상담률 ³⁾			자살시도로 인한 정신상담률 ⁴⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
성	188	3.9(1.8)	45.0	47	15.5(5.4)	34.6	69	16.5(6.9)	41.8	4	—(—)	—
남자	82	4.3(3.0)	70.5	11	—(—)	—	19	—(—)	—	0	—(—)	—
여자	106	3.5(1.7)	46.9	36	7.6(2.8)	36.5	50	6.0(2.8)	46.0	4	—(—)	—
연령												
19-29	15	—(—)	—	1	—(—)	—	3	—(—)	—	0	—(—)	—
30-39	32	4.9(3.4)	69.8	8	—(—)	—	7	—(—)	—	2	—(—)	—
40-49	50	0.0(0.0)	.	5	—(—)	—	7	—(—)	—	0	—(—)	—
50-59	44	5.0(3.6)	72.1	9	—(—)	—	9	—(—)	—	1	—(—)	—
60-69	16	—(—)	—	10	—(—)	—	14	—(—)	—	1	—(—)	—
70 이상	31	0.0(0.0)	.	14	—(—)	—	29	4.1(4.1)	100.1	0	—(—)	—
생애주기별												
19-64	149	4.4(2.0)	45.9	32	18.9(6.7)	35.3	35	21.7(10.3)	47.3	4	—(—)	—
65 이상	39	0.0(0.0)	.	15	—(—)	—	34	6.6(4.4)	66.1	0	—(—)	—
교육수준 ³⁾												
무학	25	3.2(3.2)	100.1	12	—(—)	—	26	3.5(3.5)	100.8	1	—(—)	—
초등학교	17	—(—)	—	8	—(—)	—	12	—(—)	—	0	—(—)	—
중학교	17	—(—)	—	7	—(—)	—	8	—(—)	—	1	—(—)	—
고등학교	80	2.7(2.8)	104.4	15	—(—)	—	15	—(—)	—	2	—(—)	—
대학교 이상	49	4.7(2.6)	54.6	5	—(—)	—	8	—(—)	—	0	—(—)	—
직업												
전문행정관리	19	—(—)	—	2	—(—)	—	2	—(—)	—	0	—(—)	—
사무직	19	—(—)	—	2	—(—)	—	2	—(—)	—	0	—(—)	—
판매·서비스직	33	0.0(0.0)	.	6	—(—)	—	11	—(—)	—	2	—(—)	—
농림어업	7	—(—)	—	1	—(—)	—	3	—(—)	—	0	—(—)	—
기능단순노무직	33	0.0(0.0)	.	4	—(—)	—	4	—(—)	—	0	—(—)	—
기타 ⁴⁾	76	11.7(4.6)	39.4	32	12.1(4.9)	40.3	47	18.8(8.7)	46.6	2	—(—)	—
월 가구소득												
100만원 이하	36	16.8(9.7)	57.9	14	—(—)	—	22	25.5(15.8)	62.1	1	—(—)	—
101-200만원	24	2.1(2.1)	100.3	9	—(—)	—	15	—(—)	—	0	—(—)	—
201-300만원	29	3.7(4.0)	110.1	7	—(—)	—	12	—(—)	—	1	—(—)	—
301-400만원	39	3.4(2.7)	78.1	6	—(—)	—	10	—(—)	—	1	—(—)	—
401만원 이상	57	0.0(0.0)	.	9	—(—)	—	9	—(—)	—	1	—(—)	—

- 1) 스트레스로 인한 정신상담률 : (스트레스로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 스트레스를 인지하고 있다고 응답한 사람의 수) × 100
- 2) 우울증상으로 인한 정신상담률 : (우울증상으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 우울증상이 있다고 응답한 사람의 수) × 100
- 3) 자살생각으로 인한 정신상담률 : (자살 생각으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 자살을 생각해 본 적이 있는 사람의 수) × 100
- 4) 자살시도로 인한 정신상담률 : (자살 시도로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 실제로 자살을 시도해 본 적이 있는 사람의 수) × 100
- 5) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
- 6) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 83> 인터넷, 게임(오락), 스마트폰 일상생활 지장 경험 빈도¹⁾

(: %)

	N	전혀 없다		한 달에 1번 미만		한 달에 1번 정도		일주일에 1번 정도		매일	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	762	93.5(2.0)	2.1	3.4(1.6)	46.8	1.1(0.5)	42.0	1.7(0.7)	38.4	0.3(0.3)	96.6
성											
남자	323	92.4(2.8)	3.0	3.4(2.5)	73.1	1.8(0.8)	47.2	2.5(1.2)	47.2	0.0(0.0)	.
여자	439	94.8(1.5)	1.6	3.4(1.0)	30.1	0.4(0.4)	99.3	0.9(0.5)	57.0	0.5(0.5)	95.2
연령											
19-29	71	86.0(3.9)	4.5	5.7(2.3)	41.1	2.8(2.1)	74.9	4.1(2.7)	67.4	1.5(1.5)	98.1
30-39	109	89.5(3.0)	3.3	4.9(2.3)	46.1	2.4(1.6)	64.9	3.1(1.3)	40.7	0.0(0.0)	.
40-49	182	94.5(4.1)	4.4	5.1(4.1)	81.2	0.4(0.4)	100.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
50-59	152	98.3(0.9)	0.9	0.5(0.5)	96.7	0.0(0.0)	.	1.1(0.8)	70.8	0.0(0.0)	.
60-69	96	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
70 이상	152	98.8(1.2)	1.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.2(1.2)	100.8	0.0(0.0)	.
생애주기별											
19-64	578	92.7(2.2)	2.4	3.9(1.8)	46.7	1.3(0.5)	41.8	1.8(0.6)	35.2	0.3(0.3)	96.2
65 이상	184	99.0(1.0)	1.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.0(1.0)	100.3	0.0(0.0)	.
교육수준 ³⁾											
무학	93	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
초등학교	103	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
중학교	64	98.4(1.6)	1.6	0.0(0.0)	.	1.6(1.6)	99.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
고등학교	303	91.9(2.2)	2.4	3.3(1.8)	55.5	1.5(0.8)	53.2	3.3(1.5)	45.4	0.0(0.0)	.
대학교 이상	199	92.2(3.9)	4.2	5.8(2.5)	43.5	0.8(0.7)	92.7	0.4(0.4)	104.3	0.8(0.8)	92.7
직업											
전문행정관리	91	90.7(4.1)	4.6	6.6(3.0)	45.6	2.1(2.1)	98.9	0.6(0.6)	99.2	0.0(0.0)	.
사무직	64	89.2(4.2)	4.7	1.3(1.3)	97.1	3.0(2.3)	77.5	4.2(1.5)	36.5	2.3(2.2)	97.1
판매·서비스직	85	94.8(3.6)	3.8	3.8(3.5)	92.1	0.0(0.0)	.	1.4(1.4)	97.3	0.0(0.0)	.
농림어업	56	97.4(2.5)	2.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.6(2.5)	98.0	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	137	97.1(2.3)	2.4	2.9(2.3)	79.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
기타 ⁴⁾	328	93.9(1.7)	1.8	3.4(1.2)	36.1	0.5(0.5)	99.6	2.3(1.6)	69.6	0.0(0.0)	.
월 가구소득											
100만원 이하	170	93.6(3.4)	3.7	3.4(2.1)	61.1	2.1(2.1)	96.9	0.9(0.9)	102.6	0.0(0.0)	.
101-200만원	110	96.8(1.9)	2.0	0.8(0.8)	101.6	1.5(1.4)	97.2	1.0(1.0)	99.8	0.0(0.0)	.
201-300만원	90	90.2(3.5)	3.8	7.0(2.6)	37.3	0.8(0.8)	99.3	0.0(0.0)	.	2.0(1.6)	79.6
301-400만원	133	92.3(2.5)	2.7	4.2(1.7)	41.2	0.0(0.0)	.	3.4(2.1)	61.8	0.0(0.0)	.
401만원 이상	256	94.1(2.9)	3.0	2.7(2.2)	82.8	1.3(0.9)	73.2	1.9(1.1)	55.7	0.0(0.0)	.

: 1) 인터넷, 게임(오락), 스마트폰 일상생활 지장 경험 빈도 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 84> 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	762	3.0(0.8)	28.2	323	4.1(1.3)	32.2	439	1.9(0.6)	32.8
연령									
19-29	71	6.7(2.9)	43.5	30	6.4(4.5)	70.8	41	6.9(2.8)	40.9
30-39	109	6.8(2.1)	31.1	42	10.4(4.1)	39.8	67	3.5(2.0)	58.7
40-49	182	1.3(0.9)	67.4	81	2.4(1.6)	66.8	101	0.0(0.0)	.
50-59	152	0.5(0.5)	100.3	75	0.9(0.9)	100.4	77	0.0(0.0)	.
60-69	96	0.0(0.0)	.	39	0.0(0.0)	.	57	0.0(0.0)	.
70 이상	152	0.0(0.0)	.	56	0.0(0.0)	.	96	0.0(0.0)	.
생애주기별									
19-64	578	3.4(1.0)	27.6	254	4.5(1.5)	31.9	324	2.2(0.7)	32.0
65 이상	184	0.0(0.0)	.	69	0.0(0.0)	.	115	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	93	0.0(0.0)	.	21	0.0(0.0)	.	72	0.0(0.0)	.
초등학교	103	0.0(0.0)	.	35	0.0(0.0)	.	68	0.0(0.0)	.
중학교	64	0.0(0.0)	.	26	0.0(0.0)	.	38	0.0(0.0)	.
고등학교	303	5.0(1.4)	28.0	151	5.7(2.1)	37.5	152	4.0(1.4)	35.9
대학교 이상	199	2.0(1.1)	57.2	90	3.2(2.2)	69.6	109	0.7(0.7)	101.3
직업									
전문행정관리	91	3.1(2.0)	64.8	41	4.6(3.7)	79.5	50	1.4(1.4)	99.8
사무직	64	4.3(2.8)	65.4	40	6.2(3.8)	60.4	24	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	85	3.8(2.6)	67.4	25	6.7(6.1)	91.2	60	2.2(2.0)	93.1
농림어업	56	0.0(0.0)	.	39	0.0(0.0)	.	17	-(-)	-
기능단순노무직	137	1.6(1.1)	65.6	100	2.1(1.4)	68.1	37	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	328	3.4(1.3)	38.8	77	5.4(3.7)	68.3	251	2.5(1.0)	40.7
월 가구소득									
100만원 이하	170	0.8(0.8)	102.6	61	0.0(0.0)	.	109	1.3(1.4)	101.5
101-200만원	110	4.8(2.6)	54.3	41	7.6(5.3)	69.2	69	2.6(2.5)	97.0
201-300만원	90	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.
301-400만원	133	5.5(2.2)	40.4	60	6.1(3.9)	65.1	73	4.8(1.9)	38.8
401만원 이상	256	3.0(1.2)	41.1	115	4.8(2.0)	41.4	141	1.0(1.0)	100.8

: 1) 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률 : (주위 사람들로부터 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 너무 많이 한다고 “항상” 또는 “대체로” 지적받는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 85> 연간 인플루엔자 예방접종률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	917	37.4(1.7)	4.6	393	30.6(2.3)	7.4	524	44.6(1.8)	4.1
연령									
19-29	78	27.4(5.4)	19.8	33	24.1(6.4)	26.5	45	31.5(7.6)	24.1
30-39	128	30.2(3.4)	11.4	52	20.8(5.3)	25.5	76	40.2(4.7)	11.7
40-49	208	29.3(3.2)	10.9	91	24.8(4.2)	16.8	117	34.4(3.2)	9.2
50-59	188	24.4(4.4)	18.0	93	18.8(4.5)	24.1	95	31.0(5.9)	19.2
60-69	128	61.1(4.6)	7.6	51	48.4(7.2)	14.8	77	71.2(5.1)	7.2
70 이상	187	86.8(2.8)	3.3	73	90.3(3.8)	4.2	114	84.1(3.5)	4.2
생애주기별									
19-64	681	29.2(1.7)	5.7	300	22.8(2.2)	9.4	381	36.3(2.0)	5.4
65 이상	236	85.4(2.5)	3.0	93	85.9(3.6)	4.2	143	85.0(3.3)	3.9
교육수준 ²⁾									
무학	114	72.1(5.2)	7.2	24	81.2(9.0)	11.0	90	69.7(5.9)	8.4
초등학교	134	73.3(4.9)	6.7	47	68.0(8.2)	12.1	87	77.1(4.9)	6.3
중학교	81	44.5(6.3)	14.1	34	45.8(10.4)	22.7	47	43.5(6.5)	14.9
고등학교	364	26.8(3.0)	11.0	185	21.8(3.6)	16.5	179	33.5(3.3)	9.9
대학교 이상	224	34.0(3.6)	10.6	103	29.5(6.1)	20.8	121	39.1(3.0)	7.6
직업									
전문행정관리	103	31.6(5.3)	16.7	46	22.5(6.2)	27.7	57	41.2(7.5)	18.1
사무직	78	23.9(5.3)	22.4	52	23.2(6.3)	27.2	26	25.8(10.5)	40.9
판매·서비스직	112	24.3(4.4)	17.9	33	13.6(6.0)	44.0	79	30.1(5.1)	17.0
농림어업	70	56.4(6.2)	11.1	48	57.5(6.4)	11.0	22	53.7(11.1)	20.6
기능단순노무직	157	26.2(3.0)	11.5	115	21.1(3.5)	16.6	42	47.2(7.5)	16.0
기타 ³⁾	396	51.4(2.8)	5.5	98	52.1(6.5)	12.5	298	51.2(2.7)	5.4
월 가구소득									
100만원 이하	204	68.7(3.6)	5.2	75	66.2(5.5)	8.2	129	70.6(4.5)	6.3
101-200만원	151	45.9(5.5)	12.0	60	44.3(7.4)	16.7	91	47.2(5.8)	12.3
201-300만원	114	32.8(4.4)	13.4	58	26.0(3.3)	12.7	56	42.2(8.2)	19.6
301-400만원	159	33.4(4.5)	13.4	71	22.1(5.4)	24.2	88	46.0(5.8)	12.7
401만원 이상	282	25.2(2.4)	9.6	126	20.6(3.4)	16.7	156	30.3(3.6)	11.8

: 1) 연간 인플루엔자 예방접종률 : (최근 1년(365일) 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 86> 만성·급성질환 및 사고중독 경험률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	5.0(1.1)	22.1	393	3.6(1.3)	35.3	525	6.4(1.2)	19.1
연령									
19-29	78	3.2(2.0)	61.3	33	3.0(2.9)	94.4	45	3.4(2.4)	68.6
30-39	128	2.7(1.3)	48.7	52	3.5(2.4)	66.6	76	1.9(1.8)	98.5
40-49	208	2.7(2.2)	84.1	91	2.1(2.0)	93.7	117	3.3(2.6)	79.9
50-59	189	5.0(2.1)	42.0	93	3.2(1.9)	61.1	96	7.0(3.5)	50.6
60-69	128	7.4(2.4)	32.7	51	5.9(3.5)	58.8	77	8.6(3.5)	40.6
70 이상	187	14.9(2.9)	19.4	73	8.1(3.2)	39.5	114	19.9(3.5)	17.7
생애주기별									
19-64	682	3.6(1.2)	31.9	300	3.2(1.3)	39.4	382	4.0(1.3)	33.2
65 이상	236	13.1(2.8)	21.4	93	6.4(2.5)	39.7	143	18.2(4.0)	21.8
교육수준 ²⁾									
무학	114	17.8(3.6)	20.3	24	7.7(5.5)	72.4	90	20.5(4.3)	21.0
초등학교	134	8.0(2.1)	26.9	47	5.6(3.0)	53.6	87	9.7(3.2)	32.6
중학교	81	4.0(1.9)	46.0	34	5.1(3.5)	69.4	47	3.2(2.2)	69.2
고등학교	365	4.2(1.1)	26.8	185	4.0(1.3)	33.8	180	4.4(1.8)	40.0
대학교 이상	224	2.7(2.2)	79.0	103	2.0(1.9)	97.9	121	3.6(2.5)	68.1
직업									
전문행정관리	104	1.5(1.1)	78.5	46	0.0(0.0)	.	58	3.0(2.3)	78.3
사무직	78	4.4(3.3)	73.5	52	6.0(4.5)	75.4	26	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	112	4.2(2.4)	57.2	33	3.8(3.7)	98.0	79	4.4(3.2)	73.5
농림어업	70	4.1(3.0)	72.0	48	2.1(2.1)	98.7	22	8.6(7.8)	90.7
기능단순노무직	157	0.0(0.0)	.	115	0.0(0.0)	.	42	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	396	8.9(1.6)	18.3	98	7.5(2.7)	36.6	298	9.6(1.9)	20.4
월 가구소득									
100만원 이하	204	12.5(2.7)	21.4	75	12.0(4.9)	41.3	129	13.0(2.9)	22.7
101-200만원	151	5.6(1.5)	27.2	60	0.0(0.0)	.	91	10.5(2.9)	27.5
201-300만원	114	4.9(2.8)	56.2	58	5.3(3.9)	72.2	56	4.3(2.0)	46.5
301-400만원	160	2.5(1.2)	46.8	71	4.8(2.3)	47.3	89	0.0(0.0)	.
401만원 이상	282	3.0(1.5)	49.7	126	1.1(1.1)	104.2	156	5.2(2.3)	43.6

: 1) 만성·급성질환 및 사고중독 경험률 : (최근 2주(14일) 동안 만성·급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 87> 만성·급성질환 및 사고중독 경험일수¹⁾

(: 일)

	전체			남자			여자		
	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수
연령	58	8.5(1.0)	11.3	16	-(-)	-	42	9.3(1.0)	11.2
19-29	3	-(-)	-	1	-(-)	-	2	-(-)	-
30-39	4	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-
40-49	5	-(-)	-	1	-(-)	-	4	-(-)	-
50-59	8	-(-)	-	3	-(-)	-	5	-(-)	-
60-69	9	-(-)	-	3	-(-)	-	6	-(-)	-
70 이상	29	10.6(0.9)	8.5	6	-(-)	-	23	10.0(1.1)	11.0

: 1) 만성·급성질환 및 사고중독 경험일수 : 최근 2주(14일) 동안 이환일 수의 총 합 / 만성·급성질환 및 사고중독 경험자 수

< 88> 연간 평균 혈압 및 혈당 측정횟수

(단위 : 회)

	연간 평균 혈압 측정횟수 ¹⁾			연간 평균 혈당 측정횟수 ²⁾		
	N	회(표준오차)	변동계수	N	회(표준오차)	변동계수
성	917	7.5(0.9)	11.4	912	3.6(0.8)	21.8
남자	393	7.7(1.5)	19.8	390	3.7(1.1)	28.7
여자	524	7.3(0.8)	11.4	522	3.5(0.9)	26.1
연령						
19-29	78	3.2(0.8)	24.5	78	0.8(0.3)	31.7
30-39	128	3.2(0.9)	27.2	127	0.8(0.2)	20.9
40-49	208	6.6(1.3)	19.9	208	1.6(0.4)	25.1
50-59	189	8.9(2.1)	23.4	187	5.1(2.1)	40.9
60-69	128	17.6(7.3)	41.4	128	12.2(4.8)	39.4
70 이상	186	13.8(3.3)	24.0	184	8.4(2.8)	33.1
생애주기별						
19-64	682	5.7(0.7)	11.5	679	2.5(0.6)	23.4
65 이상	235	18.0(4.7)	26.5	233	10.0(3.4)	33.8
교육수준 ²⁾						
무학	113	14.0(4.0)	28.4	111	7.4(3.4)	45.9
초등학교	134	11.3(2.6)	23.1	134	9.9(4.2)	42.3
중학교	81	8.7(1.7)	19.1	79	10.9(6.1)	56.3
고등학교	365	7.8(1.4)	17.7	364	2.4(0.6)	25.2
대학교 이상	224	4.1(0.6)	13.9	224	1.2(0.2)	15.0
직업						
전문행정관리	104	4.9(1.0)	20.3	104	3.5(2.5)	71.1
사무직	78	2.8(0.5)	18.2	78	1.3(0.3)	25.9
판매·서비스직	112	6.6(1.7)	25.4	111	1.3(0.3)	23.3
농림어업	70	9.5(2.0)	21.0	70	6.5(3.9)	59.2
기능단순노무직	157	10.0(3.1)	31.0	156	3.0(1.1)	37.3
기타 ³⁾	395	8.7(1.3)	15.4	392	5.1(1.6)	31.3
월 가구소득						
100만원 이하	204	10.7(1.8)	17.0	201	8.1(3.1)	38.6
101-200만원	151	6.6(1.1)	16.7	151	4.5(2.4)	52.8
201-300만원	114	10.8(4.1)	37.9	113	1.6(0.4)	22.1
301-400만원	160	7.3(1.0)	13.3	159	5.8(2.8)	48.2
401만원 이상	282	5.5(1.1)	19.3	282	1.2(0.2)	14.3

: 1) 연간 평균 혈압 측정횟수 : ((하루 측정횟수×365일)+(일주일 측정횟수×52주)+(한 달 측정횟수×12개월)+(일 년 측정횟수)) / 조사대상 응답자 수

2) 연간 평균 혈당 측정횟수 : ((하루 측정횟수×365일)+(일주일 측정횟수×52주)+(한 달 측정횟수×12개월)+(일 년 측정횟수)) / 조사대상 응답자 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 89> 혈압, 혈당 및 총 콜레스테롤 인지율

(: %)

	혈압 인지율 ¹⁾			혈당 인지율 ²⁾			총 콜레스테롤 인지율 ¹⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
성	895	48.0(5.8)	12.2	890	10.4(1.2)	11.4	879	5.9(1.0)	16.5
남자	384	51.7(7.4)	14.3	383	10.3(1.4)	13.7	378	7.3(1.6)	22.6
여자	511	44.1(4.9)	11.0	507	10.5(1.4)	13.6	501	4.5(0.9)	19.9
연령									
19-29	78	24.8(7.6)	30.4	78	3.2(1.8)	56.5	78	0.0(0.0)	.
30-39	126	42.6(7.9)	18.6	123	7.1(3.1)	43.2	125	3.4(1.6)	47.4
40-49	207	62.5(9.5)	15.1	205	12.1(2.1)	17.7	204	12.7(2.5)	20.0
50-59	186	57.3(7.4)	12.8	189	13.5(2.3)	16.9	185	5.8(1.7)	29.5
60-69	123	56.8(5.3)	9.3	121	20.7(4.3)	20.8	118	9.3(3.5)	37.4
70 이상	175	37.4(4.5)	11.9	174	10.8(2.3)	21.7	169	2.1(1.1)	50.4
생애주기별									
19-64	673	49.3(6.7)	13.6	670	10.1(1.3)	13.2	663	6.2(1.1)	17.6
65 이상	222	40.0(4.4)	11.0	220	12.1(2.4)	19.9	216	4.1(1.6)	38.6
교육수준 ²⁾									
무학	107	29.8(3.9)	13.0	107	11.4(3.2)	27.9	103	3.8(2.2)	57.1
초등학교	124	41.6(5.4)	13.0	124	10.6(2.6)	24.7	124	5.8(1.9)	31.8
중학교	79	55.5(6.1)	10.9	78	15.8(4.5)	28.7	76	5.2(2.7)	51.5
고등학교	362	50.9(7.4)	14.6	362	10.9(1.8)	16.9	358	4.8(1.1)	23.3
대학교 이상	223	47.4(7.3)	15.5	219	8.1(1.5)	18.2	218	8.2(2.2)	26.9
직업									
전문행정관리	104	47.7(8.8)	18.5	103	10.5(2.4)	23.0	103	7.9(2.4)	30.0
사무직	78	50.0(10.7)	21.5	76	7.9(2.7)	34.2	76	14.4(5.6)	38.7
판매·서비스직	111	45.6(8.0)	17.6	111	9.0(3.6)	39.7	109	3.1(1.4)	43.9
농림어업	66	57.1(7.4)	13.0	66	11.6(4.5)	38.9	66	3.3(2.3)	71.0
기능단순노무직	154	58.1(6.6)	11.4	155	14.7(2.4)	16.5	154	8.3(2.4)	28.8
기타 ³⁾	381	41.4(5.0)	12.0	378	9.2(1.3)	14.6	370	2.4(0.7)	28.9
월 가구소득									
100만원 이하	195	38.5(4.8)	12.6	196	13.8(3.2)	23.0	189	3.9(1.5)	39.2
101-200만원	143	39.3(5.1)	13.0	141	10.5(2.0)	19.1	141	3.7(1.9)	50.8
201-300만원	111	55.9(5.0)	9.0	109	10.6(3.2)	30.1	109	9.6(3.0)	31.1
301-400만원	160	51.4(6.4)	12.4	158	12.6(2.4)	19.4	157	6.4(1.9)	29.7
401만원 이상	280	50.7(12.2)	24.0	281	8.0(2.0)	25.6	279	5.7(1.7)	30.2

: 1) 혈압 인지율 : (본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 혈당 인지율 : (본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 총 콜레스테롤 인지율 : (본인의 총 콜레스테롤 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

4) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

5) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 표 90 > 고혈압 평생 의사진단 경험률

(단위 : %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
평생 의사진단 경험률									
전체 ¹⁾	917	17.0(1.3)	7.9	393	17.0(2.2)	13.1	524	17.0(1.4)	8.1
30세 이상 ²⁾	839	19.9(1.6)	8.0	360	19.9(2.6)	13.0	479	19.9(1.5)	7.5
연령									
19-29	78	1.7(1.6)	95	33	3.0(2.8)	93.1	45	0.0(0.0)	.
30-39	128	3.9(1.7)	43.2	52	7.5(3.2)	42.1	76	0.0(0.0)	.
40-49	208	10.4(2.5)	24	91	14.2(4.2)	29.4	117	6.1(1.6)	25.6
50-59	189	21.7(3.4)	15.9	93	20.2(5.9)	29.2	96	23.4(3.3)	14.3
60-69	127	37.8(4.2)	11.1	51	33.5(5.3)	15.7	76	41.3(5.9)	14.4
70 이상	187	53.2(3.5)	6.6	73	50.7(5.6)	11	114	55.0(4.5)	8.2
고혈압 현재치료율									
전체 ³⁾	216	86.9(3.4)	3.9	92	80.9(6.1)	7.5	124	93.1(2.6)	2.8
30세 이상 ⁴⁾	215	88.3(3.7)	4.2	91	83.5(6.6)	7.9	124	93.1(2.6)	2.8
연령									
19-29	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	4	-(-)	-	4	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	19	-(-)	-	11	-(-)	-	8	-(-)	-
50-59	41	89.0(5.3)	5.9	20	90.0(8.4)	9.3	21	88.0(6.8)	7.7
60-69	51	94.1(3.2)	3.4	19	-(-)	-	32	93.3(4.5)	4.8
70 이상	100	94.2(2.6)	2.7	37	90.3(5.4)	5.9	63	96.9(2.1)	2.2

: 1) 고혈압 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 고혈압 현재치료율 : (현재 고혈압을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

4) 고혈압 현재치료율(≥30) : (현재 고혈압을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

< 표 91 > 본인 인지 혈압 조절률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	215	93.3(2.6)	2.7	92	88.9(4.6)	5.2	123	98.0(0.9)	0.9
30 이상 ²⁾	214	94.8(2.3)	2.5	91	91.7(4.2)	4.6	123	98.0(0.9)	0.9
연령									
19-29	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	4	-(-)	-	4	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	19	-(-)	-	11	-(-)	-	8	-(-)	-
50-59	41	100.0(0.0)	0	20	100.0(0.0)	0	21	100.0(0.0)	0
60-69	51	95.8(2.1)	2.2	19	-(-)	-	32	93.0(3.3)	3.6
70 이상	99	95.6(2.1)	2.2	37	91.1(4.8)	5.3	62	98.8(1.2)	1.2

주 : 1) 본인 인지 혈압 조절률 : (혈압이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 본인 인지 혈압 조절률(≥30) : (혈압이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

< 표 92 > 당뇨병 평생 의사진단 경험률 및 현재치료를

(단위 : %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
평생 의사진단 경험률									
전체 ¹⁾	917	6.6(0.9)	13.1	393	6.2(1.2)	19.9	524	7.0(1.0)	14.6
30세 이상 ²⁾	839	7.9(1.0)	12.8	360	7.6(1.5)	20.0	479	8.3(1.1)	13.4
연령									
19-29	78	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.
30-39	128	0.6(0.6)	103.4	52	0.0(0.0)	.	76	1.1(1.2)	102.7
40-49	208	3.4(1.7)	49.4	91	3.4(2.4)	72.3	117	3.4(2.2)	65.3
50-59	189	9.3(1.9)	19.9	93	11.4(2.7)	23.8	96	6.9(2.9)	41.6
60-69	128	17.4(3.7)	21.4	51	18.0(5.6)	31.3	77	16.9(4.4)	26
70 이상	186	21.7(2.7)	12.6	73	19.2(4.7)	24.3	113	23.6(2.9)	12.3
당뇨병 현재치료를									
전체 ³⁾	90	92.6(2.7)	2.9	37	92.4(4.1)	4.4	53	92.7(3.5)	3.8
30세 이상 ⁴⁾	90	92.6(2.7)	2.9	37	92.4(4.1)	4.4	53	92.7(3.5)	3.8
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	0	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	5	-(-)	-	2	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	17	-(-)	-	11	-(-)	-	6	-(-)	-
60-69	24	94.3(5.2)	5.6	10	-(-)	-	14	-(-)	-
70 이상	43	96.0(2.8)	2.9	14	-(-)	-	29	97.2(2.7)	2.8

: 1) 당뇨병 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 당뇨병 현재치료를 : (현재 당뇨병을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

4) 당뇨병 현재치료를(≥30) : (현재 당뇨병을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

< 표 93 > 본인 인지 혈당 조절률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	89	85.7(4.5)	5.2	37	90.7(5.5)	6.1	52	80.9(6.8)	8.3
30세 이상 ²⁾	89	85.7(4.5)	5.2	37	90.7(5.5)	6.1	52	80.9(6.8)	8.3
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	0	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	5	-(-)	-	2	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	17	-(-)	-	11	-(-)	-	6	-(-)	-
60-69	24	96.0(3.9)	4.1	10	-(-)	-	14	-(-)	-
70 이상	42	93.0(1.8)	2.0	14	-(-)	-	28	88.6(2.9)	3.3

주 : 1) 본인 인지 혈당 조절률 : (혈당이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 본인 인지 혈당 조절률(≥30) : (혈당이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

< 표 94 > 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
30세 이상 ²⁾	916	6.1(0.8)	13.7	393	7.0(1.3)	18.9	523	5.1(0.9)	18.2
연령	838	7.3(1.0)	13.3	360	8.5(1.5)	17.6	478	6.0(1.1)	18.0
19-29	78	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.
30-39	128	5.5(1.9)	33.3	52	10.8(3.8)	35.3	76	0.0(0.0)	.
40-49	208	4.9(1.5)	31.1	91	7.3(2.8)	38	117	2.2(1.0)	46.5
50-59	189	10.6(1.9)	18.2	93	6.2(2.2)	34.5	96	15.6(3.8)	24.1
60-69	128	14.3(3.5)	24.8	51	14.5(5.9)	40.7	77	14.1(4.5)	31.7
70 이상	185	4.9(2.1)	42.7	73	7.4(3.8)	51.4	112	2.9(1.8)	61.3

: 1) 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

< 표 95 > 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	918	1.0(0.3)	28.9	393	0.6(0.3)	40.3	525	1.4(0.5)	34.9
50세 이상 ²⁾	504	2.6(0.7)	28.0	217	1.7(0.7)	39.6	287	3.5(1.2)	34.2
연령									
19-29	78	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.
30-39	128	0.0(0.0)	.	52	0.0(0.0)	.	76	0.0(0.0)	.
40-49	208	0.0(0.0)	.	91	0.0(0.0)	.	117	0.0(0.0)	.
50-59	189	0.0(0.0)	.	93	0.0(0.0)	.	96	0.0(0.0)	.
60-69	128	3.2(1.4)	44.1	51	5.5(3.2)	57.7	77	1.4(1.4)	100.2
70 이상	187	6.6(2.0)	30	73	2.6(1.4)	53	114	9.7(3.5)	36.1

주 : 1) 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 뇌졸중(중풍)을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률(≥50) : (의사에게 뇌졸중(중풍)을 진단받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 1000

< 96> 심근경색증 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
40세 이상 ²⁾	918	0.4(0.1)	38.5	393	0.3(0.2)	72.2	525	0.5(0.2)	44.7
연령	712	0.6(0.2)	38.2	308	0.4(0.3)	71.3	404	0.8(0.4)	44.7
19-29	78	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.
30-39	128	0.0(0.0)	.	52	0.0(0.0)	.	76	0.0(0.0)	.
40-49	208	0.0(0.0)	.	91	0.0(0.0)	.	117	0.0(0.0)	.
50-59	189	0.4(0.4)	99.7	93	0.7(0.7)	99.9	96	0.0(0.0)	.
60-69	128	2.0(1.1)	55.3	51	0.0(0.0)	.	77	3.6(2.0)	55.8
70 이상	187	1.3(0.7)	59.3	73	1.2(1.2)	99	114	1.3(1.0)	72.9

: 1) 심근경색증 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 심근경색증을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 심근경색증 평생 의사진단 경험률(≥40) : (의사에게 심근경색증을 진단받은 사람의 수 / 40세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

<표 97> 협심증 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	917	1.4(0.3)	23.2	393	1.6(0.5)	29.3	524	1.1(0.4)	37.3
40세 이상 ²⁾	711	2.1(0.5)	24.0	308	2.5(0.7)	29.3	403	1.7(0.7)	38.5
연령									
19-29	78	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.
30-39	128	0.0(0.0)	.	52	0.0(0.0)	.	76	0.0(0.0)	.
40-49	208	0.6(0.5)	96.3	91	1.1(1.0)	93.7	117	0.0(0.0)	.
50-59	189	1.7(0.8)	49.6	93	1.7(1.2)	69.8	96	1.6(1.2)	70.2
60-69	128	3.4(1.7)	49.8	51	3.7(2.7)	73.2	77	3.2(2.2)	68
70 이상	186	5.4(1.5)	28.1	73	7.4(2.6)	35.1	113	3.8(2.1)	55.8

주 : 1) 협심증 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 협심증을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 협심증 평생 의사진단 경험률(≥40) : (의사에게 협심증을 진단받은 사람의 수 / 40세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

< 표 98 > 관절염 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율

(단위 : %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
평생 의사진단 경험률									
전체 ¹⁾	916	9.5(0.9)	9.1	392	4.4(0.9)	21.3	524	14.7(1.3)	9.1
50세 이상 ²⁾	502	20.8(1.8)	8.5	216	9.8(1.7)	17.4	286	31.0(3.0)	9.7
연령									
19-29	78	1.7(1.7)	101.1	33	3.0(2.9)	94.4	45	0.0(0.0)	.
30-39	128	3.0(1.1)	36.7	52	1.4(1.4)	98.8	76	4.7(1.7)	37.2
40-49	208	1.9(0.4)	22.6	91	0.0(0.0)	.	117	4.1(1.0)	23
50-59	189	6.8(2.1)	30.4	93	1.5(1.5)	98.1	96	12.9(4.3)	33.4
60-69	128	26.4(4.4)	16.8	51	15.6(5.7)	36.5	77	34.9(6.7)	19.3
70 이상	185	40.9(3.6)	8.7	72	23.6(5.4)	22.8	113	53.9(4.7)	8.6
관절염 현재치료율									
전체 ³⁾	135	59.0(6.3)	10.7	28	71.6(10.1)	14.1	107	55.0(5.9)	10.8
50세 이상 ⁴⁾	124	60.4(5.5)	9.1	26	73.3(9.0)	12.3	98	56.6(5.4)	9.5
연령									
19-29	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	1	-(-)	-	4	-(-)	-
40-49	5	-(-)	-	0	-(-)	-	5	-(-)	-
50-59	11	-(-)	-	1	-(-)	-	10	-(-)	-
60-69	33	66.7(7.1)	10.7	7	-(-)	-	26	59.7(7.9)	13.3
70 이상	80	63.0(6.7)	10.6	18	-(-)	-	62	63.0(6.7)	10.6

: 1) 관절염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 관절염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50) : (의사에게 관절염을 진단받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 관절염 현재치료율 : (현재 관절염을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

4) 관절염 현재치료율(≥50) : (현재 관절염을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

< 표 99 > 골다공증 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	917	5.1(0.7)	13.7	393	0.1(0.1)	100.4	524	10.3(1.4)	13.2
50세 이상 ²⁾	503	12.2(1.6)	13.0	217	0.4(0.4)	99.6	286	23.2(2.8)	12.0
연령									
19-29	78	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.
30-39	128	0.5(0.5)	100	52	0.0(0.0)	.	76	0.9(0.9)	98.5
40-49	208	1.1(0.7)	58.8	91	0.0(0.0)	.	117	2.4(1.4)	59
50-59	189	5.8(2.1)	36.5	93	0.0(0.0)	.	96	12.3(4.1)	33.1
60-69	128	14.4(3.1)	21.5	51	2.0(1.9)	96.5	77	24.2(5.4)	22.4
70 이상	186	21.5(3.1)	14.2	73	0.0(0.0)	.	113	37.9(4.6)	12.1

주 : 1) 골다공증 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 골다공증을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 골다공증 평생 의사진단 경험률(≥50) : (의사에게 골다공증을 진단받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

< 표 100 > 천식 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
연령	918	2.3(0.4)	18.5	393	2.0(0.7)	35.6	525	2.6(0.6)	23.6
19-29	78	1.0(0.1)	14.1	33	0.0(0.0)	.	45	2.1(0.4)	20.7
30-39	128	2.0(1.5)	73.5	52	2.8(2.7)	98.9	76	1.3(1.2)	94.9
40-49	208	0.6(0.5)	96.3	91	1.1(1.0)	93.7	117	0.0(0.0)	.
50-59	189	2.5(1.1)	45.8	93	0.9(0.9)	99.3	96	4.3(2.2)	52.6
60-69	128	1.7(1.2)	71.9	51	2.2(2.1)	97.7	77	1.3(1.3)	99.9
70 이상	187	8.3(1.6)	19.6	73	8.8(2.7)	30.5	114	8.0(2.4)	29.5

: 1) 천식 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 천식을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

< 표 101 > 알레르기비염 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	917	10.3(1.3)	13.0	393	7.9(1.9)	23.4	524	12.7(1.1)	8.4
연령									
19-29	78	16.9(3.6)	21.5	33	11.3(5.3)	46.7	45	23.8(5.2)	21.8
30-39	128	14.9(3.2)	21.7	52	14.1(5.0)	35.3	76	15.7(2.7)	16.9
40-49	208	9.5(1.7)	18.2	91	6.2(2.2)	36.5	117	13.3(2.9)	21.6
50-59	189	9.8(2.2)	22.7	93	6.7(2.9)	43.1	96	13.2(3.0)	22.8
60-69	128	0.5(0.5)	98.2	51	0.0(0.0)	.	77	1.0(1.0)	99.0
70 이상	186	1.9(1.0)	51.4	73	1.5(1.5)	100.8	113	2.2(1.3)	58.9

주 : 1) 알레르기비염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 알레르기비염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

< 표 102 > 아토피피부염 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	917	1.6(0.4)	27.9	393	1.1(0.5)	47.3	524	2.1(0.6)	26.9
연령									
19-29	78	4.1(1.8)	43.2	33	2.2(2.2)	97.4	45	6.3(2.6)	41.5
30-39	128	1.1(0.8)	73.0	52	0.0(0.0)	.	76	2.2(1.6)	71.9
40-49	208	2.1(0.7)	36.3	91	1.8(1.2)	66.3	117	2.4(0.9)	38.9
50-59	189	0.0(0.0)	.	93	0.0(0.0)	.	96	0.0(0.0)	.
60-69	128	1.4(1.0)	70.0	51	1.5(1.5)	97.9	77	1.2(1.2)	99.2
70 이상	186	0.9(0.9)	100.3	73	2.1(2.0)	98.8	113	0.0(0.0)	.

주 : 1) 아토피피부염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 아토피피부염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

< 표 103 > 백내장 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
50세 이상 ²⁾	918	6.5(0.7)	11.3	393	5.3(1.0)	18.5	525	7.7(0.9)	11.8
연령	504	16.6(1.5)	9.0	217	14.5(2.3)	15.6	287	18.6(2.1)	11.1
19-29	78	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.
30-39	128	0.0(0.0)	.	52	0.0(0.0)	.	76	0.0(0.0)	.
40-49	208	0.0(0.0)	.	91	0.0(0.0)	.	117	0.0(0.0)	.
50-59	189	2.5(1.3)	54.4	93	1.8(1.3)	71.7	96	3.2(1.9)	60.5
60-69	128	14.1(3.7)	26.4	51	16.0(6.4)	40	77	12.7(3.8)	30.4
70 이상	187	42.3(3.2)	7.5	73	40.3(5.6)	14	114	43.9(4.2)	9.5

1) 백내장 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 백내장을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 백내장 평생 의사진단 경험률(≥50) : (의사에게 백내장을 진단받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

< 표 104 > B형 간염 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	917	1.8(0.4)	24.2	393	2.0(0.7)	32.9	524	1.5(0.6)	39.3
연령									
19-29	78	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.
30-39	128	1.1(0.8)	70.1	52	0.0(0.0)	.	76	2.2(1.6)	70.7
40-49	208	1.7(1.0)	58.1	91	2.7(1.9)	70.2	117	0.6(0.7)	100.9
50-59	189	4.9(1.6)	31.7	93	5.8(2.5)	42.7	96	3.9(2.0)	51.4
60-69	128	1.3(0.7)	53.6	51	0.0(0.0)	.	77	2.3(1.3)	54.8
70 이상	186	0.6(0.6)	100.8	73	1.3(1.3)	101.4	113	0.0(0.0)	.

주 : 1) B형 간염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 B형 간염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

< 105> 우울증 평생 의사진단 경험률¹⁾ (: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	1.7(0.4)	24.4	393	1.7(0.7)	42.2	525	1.8(0.6)	31.8
연령									
19-29	78	1.7(1.7)	101.1	33	3.0(2.9)	94.4	45	0.0(0.0)	.
30-39	128	2.1(1.2)	57.9	52	1.8(1.8)	100.8	76	2.5(1.6)	66.1
40-49	208	0.3(0.3)	98.5	91	0.0(0.0)	.	117	0.6(0.6)	99.0
50-59	189	2.3(1.3)	53.9	93	3.0(1.8)	60.3	96	1.6(1.7)	102.8
60-69	128	4.0(1.9)	46.5	51	1.6(1.6)	103.0	77	5.9(2.5)	42.7
70 이상	187	1.7(0.8)	48.6	73	1.4(1.4)	98.8	114	2.0(1.0)	51.1

: 1) 우울증 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 우울증을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

< 106> 고혈압 약물치료율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
30세 이상 ²⁾	216	82.7(3.3)	4.0	92	74.8(6.1)	8.2	124	91.0(2.6)	2.8
연령	215	84.1(3.6)	4.3	91	77.2(6.5)	8.4	124	91.0(2.6)	2.8
19-29	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	4	-(-)	-	4	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	19	-(-)	-	11	-(-)	-	8	-(-)	-
50-59	41	87.5(5.1)	5.8	20	90.0(8.4)	9.3	21	85.0(6.5)	7.7
60-69	51	92.2(3.5)	3.8	19	-(-)	-	32	90.2(5.1)	5.6
70 이상	100	92.0(2.6)	2.9	37	87.2(5.3)	6.1	63	95.4(2.5)	2.7

: 1) 고혈압 약물치료율 : (현재 혈압조절약을 한 달(30일)에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 약물치료율(≥30) : (현재 혈압조절약을 한 달(30일)에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

<표 107> 고혈압 합병증검사 수진율

(단위 : %)

구분	신장질환 합병증검사 수진율 ¹⁾			심장질환 합병증검사 수진율 ²⁾			뇌혈관질환 합병증검사 수진율 ³⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	213	17.5(2.5)	14.0	215	13.5(2.1)	15.7	214	14.3(2.3)	16.4
성									
남자	90	15.8(3.1)	19.8	92	13.0(2.8)	21.6	91	15.2(3.4)	22.2
여자	123	19.4(2.9)	15.1	123	14.0(2.7)	19.1	123	13.4(2.7)	20.2
30세 이상 ^{4),5),6)}	212	17.8(2.4)	13.7	214	13.7(2.1)	15.5	213	14.6(2.4)	16.2
연령									
19-29	1	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	4	-(-)	-	4	-(-)	-	4	-(-)	-
40-49	19	-(-)	-	19	-(-)	-	19	-(-)	-
50-59	39	18.9(5.8)	30.5	41	14.0(5.2)	37.2	41	11.8(4.8)	40.5
60-69	51	19.1(5.6)	29.2	51	15.5(4.5)	29.1	50	19.8(6.0)	30.3
70 이상	99	22.6(4.2)	18.6	99	16.5(4.1)	24.9	99	16.9(3.9)	22.9

주 : 1) 고혈압 신장질환 합병증검사 수진율 : {최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수} × 100

2) 고혈압 심장질환 합병증검사 수진율 : {최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 심장질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 검사를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수} × 100

3) 고혈압 뇌혈관질환 합병증검사 수진율 : {최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 뇌혈관질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 검사를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수} × 100

4) 고혈압 신장질환 합병증검사 수진율(≥30) : {최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수} × 100

5) 고혈압 심장질환 합병증검사 수진율(≥30) : {최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 심장질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 검사를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수} × 100

6) 고혈압 뇌혈관질환 합병증검사 수진율(≥30) : {최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 뇌혈관질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 검사를 받은 적이 있는 30세 이상 사람의 수} × 100

< 108> 당뇨병 치료율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
30세 이상 ²⁾	90	91.9(2.7)	3.0	37	92.4(4.1)	4.4	53	91.4(3.8)	4.1
연령	90	91.9(2.7)	3.0	37	92.4(4.1)	4.4	53	91.4(3.8)	4.1
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	0	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	5	-(-)	-	2	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	17	-(-)	-	11	-(-)	-	6	-(-)	-
60-69	24	91.0(5.8)	6.4	10	-(-)	-	14	-(-)	-
70 이상	43	96.0(2.8)	2.9	14	-(-)	-	29	97.2(2.7)	2.8

1) 당뇨병 치료율 : (현재 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 치료율(≥30) : (현재 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

<표 109> 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 및 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율

(단위 : %)

구분	당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 ¹⁾			당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	90	37.1(5.0)	13.4	89	31.0(4.8)	15.5
성						
남자	37	44.6(8.2)	18.5	37	37.0(7.8)	21.1
여자	53	30.2(6.0)	19.9	52	25.3(5.2)	20.5
30세 이상 ^{3),4)}	90	37.1(5.0)	13.4	89	31.0(4.8)	15.5
연령						
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	5	-(-)	-	5	-(-)	-
50-59	17	-(-)	-	17	-(-)	-
60-69	24	58.4(10.3)	17.7	24	36.7(6.5)	17.7
70 이상	43	35.8(8.1)	22.6	42	20.7(5.7)	27.5

주 : 1) 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30세) : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30세) : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

< 110> 고혈압 관리교육 장소 및 고혈압 관리교육 이수율

(: %)

	고혈압 관리교육 장소 ¹⁾						고혈압 관리교육 이수율 ²⁾	
	병의원		한방병의원		보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)			
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
성	30.2(5.2)	17.3	0.7(0.5)	72.3	3.2(1.7)	52.0	33.0(5.1)	15.6
남자	29.7(5.5)	18.5	0.8(0.8)	101.5	4.2(2.2)	51.6	33.9(5.6)	16.5
여자	30.7(5.9)	19.3	0.7(0.7)	98.7	2.1(1.5)	73.4	32.2(5.7)	17.9
30세 이상 ^{3),4)}	30.7(5.1)	16.6	0.8(0.5)	72.4	3.2(1.7)	52	33.6(5.0)	14.8
연령								
19-29	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	34.3(10.3)	30.0	0.0(0.0)	.	6.2(6.1)	97.9	40.5(10.7)	26.3
60-69	23.4(6.5)	27.6	0.0(0.0)	.	3.7(2.6)	69.7	25.3(6.7)	26.5
70 이상	28.0(5.3)	18.8	2.0(1.4)	70.7	2.7(1.9)	70.7	30.7(5.9)	19.3

: 1) 고혈압 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 관리교육 이수율 : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 고혈압 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 고혈압 관리교육 이수율(≥30) : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

<표 111> 당뇨병 관리교육 장소 및 당뇨병 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	당뇨병 관리교육 장소 ¹⁾						당뇨병 관리교육 이수율 ²⁾	
	병의원		한방병의원		보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)			
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	24.2(4.9)	20.1	0.0(0.0)	.	4.1(2.0)	50.2	28.3(5.4)	18.9
성								
남자	20.2(6.7)	33.2	0.0(0.0)	.	4.5(3.1)	68.6	24.8(6.9)	28.0
여자	27.9(6.4)	22.9	0.0(0.0)	.	3.6(2.6)	72.6	31.6(7.3)	23.0
30세 이상 ^{3),4)}	24.2(4.9)	20.1	0.0(0.0)	.	4.1(2.0)	50.2	28.3(5.4)	18.9
연령								
19-29	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
60-69	29.7(11.0)	37.1	0.0(0.0)	.	4.0(3.9)	99.3	33.7(11.3)	33.6
70 이상	34.5(6.7)	19.5	0.0(0.0)	.	5.8(4.1)	71.3	40.3(7.6)	18.9

주 : 1) 당뇨병 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 관리교육 이수율 : (당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 당뇨병 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 당뇨병 관리교육 이수율(≥30) : (당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

< 112> 관절염 관리교육 장소 및 관절염 관리교육 이수율

(: %)

	관절염 관리교육 장소 ¹⁾						관절염 관리교육 이수율 ²⁾	
	병의원		한방병의원		보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)			
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
	36.6(5.0)	13.8	6.2(3.0)	48.4	3.5(2.8)	81.8	37.0(5.1)	13.7
성								
남자	44.2(10.1)	22.9	12.0(10.4)	87.3	12.0(10.4)	87.3	44.2(10.1)	22.9
여자	34.1(5.4)	15.7	4.3(2.6)	59.2	0.8(0.1)	8.8	34.7(5.5)	15.8
50세 이상 ^{3),4)}	35.4(4.9)	13.8	3.8(2.2)	57.3	0.7(0.0)	6.3	35.9(4.9)	13.6
연령								
19-29	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
60-69	17.5(5.2)	29.8	0.0(0.0)	.	2.6(0.4)	15.3	17.5(5.2)	29.8
70 이상	35.7(7.0)	19.6	3.5(2.1)	58.6	0.0(0.0)	.	36.7(6.8)	18.6

: 1) 관절염 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 관절염 관리교육 이수율 : (관절염 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 관절염 관리교육 장소(≥50) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

4) 관절염 관리교육 이수율(≥50) : (관절염 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

< 113> 천식증상경험률 및 운동성 천식이환율

(: %)

	천식증상경험률 ¹⁾			운동성 천식이환율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
성	917	2.1(0.4)	20.7	918	2.5(0.7)	28.5
남자	393	1.5(0.5)	33.0	393	2.7(1.2)	43.0
여자	524	2.8(0.7)	24.8	525	2.2(0.7)	30.8
연령						
19-29	78	1.3(1.3)	99.9	78	1.3(1.3)	99.9
30-39	128	0.8(0.8)	100.2	128	0.8(0.8)	100.2
40-49	208	1.1(0.8)	73.2	208	3.1(2.1)	67.7
50-59	189	1.8(1.0)	58.5	189	2.0(1.0)	50.7
60-69	128	2.1(1.5)	71.4	128	1.5(1.1)	73.7
70 이상	186	8.6(2.0)	23.2	187	7.4(1.8)	24.7

: 1) 천식증상경험률 : (최근 1년(365일) 동안 가슴에서 켹켹하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 운동성 천식이환율 : (최근 1년(365일) 동안 운동중이나 운동 후에 숨 쉴 때, 가슴에서 켹켹하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

< 표 114 > 대사증후군 인지율¹⁾

(단위 : %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
연령	900	41.5(3.1)	7.5	385	39.8(3.9)	9.9	515	43.3(3.0)	7.0
19-29	77	23.1(6.6)	28.7	32	26.1(10.7)	41.0	45	19.5(4.9)	25.2
30-39	128	52.1(4.5)	8.6	52	43.6(6.1)	13.9	76	61.1(5.9)	9.7
40-49	206	58.9(4.3)	7.4	89	52.8(4.9)	9.3	117	65.6(6.1)	9.4
50-59	189	46.0(5.1)	11.2	93	43.5(5.9)	13.6	96	48.8(6.4)	13.2
60-69	123	30.5(4.5)	14.7	51	36.3(6.9)	18.9	72	25.4(4.9)	19.5
70 이상	177	9.8(2.5)	25.5	68	15.2(4.8)	31.8	109	5.9(2.5)	42.1

: 1) 대사증후군 인지율 : (대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

<표 115> 에이즈 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	902	75.4(2.9)	3.8	388	75.6(3.8)	5.0	514	75.1(2.3)	3.0
연령									
19-29	78	90.0(3.6)	3.9	33	91.4(4.6)	5.0	45	88.3(4.8)	5.4
30-39	128	82.6(4.7)	5.8	52	76.0(7.9)	10.3	76	89.5(3.3)	3.7
40-49	208	90.0(4.0)	4.4	91	87.4(6.1)	7.0	117	92.9(2.4)	2.5
50-59	188	76.1(5.2)	6.8	92	72.9(6.0)	8.3	96	79.8(6.0)	7.5
60-69	123	56.4(6.5)	11.5	51	62.4(8.6)	13.8	72	51.3(6.9)	13.5
70 이상	177	19.2(3.6)	18.9	69	27.2(6.2)	22.7	108	13.4(3.4)	25.7

주 : 1) 에이즈 인지율 : (에이즈에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

< 116> 에이즈에 대한 지식 정답률 및 긍정적 태도율

(: %)

	에이즈에 대한 지식 정답률 ¹⁾			에이즈에 대한 긍정적 태도율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
성	314	25.6(5.7)	22.0	350	1.8(0.8)	43.3
남자	146	27.7(6.5)	23.6	157	3.0(1.4)	46.8
여자	168	23.1(5.6)	24.1	193	0.4(0.4)	100.4
연령						
19-29	37	27.7(10.1)	36.6	33	4.7(4.4)	93.9
30-39	61	24.2(6.0)	24.7	63	2.2(2.1)	99.4
40-49	116	28.2(6.8)	24.1	124	0.0(0.0)	.
50-59	66	22.7(7.2)	31.6	83	0.8(0.9)	100.9
60-69	25	25.3(9.0)	35.7	33	6.3(4.0)	63.6
70 이상	9	-(-)	-	14	-(-)	-
생애주기별						
19-64	299	26.3(5.7)	21.8	326	1.7(0.8)	46.2
65 이상	15	-(-)	-	24	4.1(3.8)	92.1
교육수준 ³⁾						
무학	4	-(-)	-	5	-(-)	-
초등학교	12	-(-)	-	20	0.0(0.0)	.
중학교	20	20.8(9.7)	46.7	26	6.4(4.3)	67.7
고등학교	156	25.5(6.0)	23.7	169	2.8(1.4)	50.1
대학교 이상	122	27.6(6.7)	24.3	130	0.0(0.0)	.
직업						
전문행정관리	58	22.2(5.7)	25.7	62	0.0(0.0)	.
사무직	40	31.8(10.8)	34.0	38	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	34	18.9(8.4)	44.3	47	0.0(0.0)	.
농림어업	9	-(-)	-	18	-(-)	-
기능단순노무직	68	30.6(6.2)	20.4	70	2.3(2.3)	98.4
기타 ⁴⁾	104	23.8(6.3)	26.7	114	3.1(2.5)	81.0
월 가구소득						
100만원 이하	26	0.0(0.0)	.	30	2.3(2.2)	96.5
101-200만원	37	20.1(9.2)	45.7	49	1.3(1.3)	98.2
201-300만원	41	26.6(7.8)	29.5	51	0.0(0.0)	.
301-400만원	67	37.0(9.1)	24.6	71	3.7(3.6)	97.5
401만원 이상	141	25.0(7.9)	31.6	147	1.5(1.2)	81.6

1) 에이즈에 대한 지식 정답률 : (에이즈에 대한 지식 4문항) 모두 정답에 응답한 사람의 수 / 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어본 사람 중 에이즈에 대한 지식 4문항에 대해 “예” 또는 “아니오”에 응답한 사람의 수) × 100

2) 에이즈에 대한 긍정적 태도율 : (에이즈에 대한 태도 4문항) 모두 긍정적 태도에 응답한 사람의 수 / 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어본 사람 중 에이즈에 대한 태도 4문항에 대해 “예” 또는 “아니오”에 응답한 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

에이즈에 대한 지식 문항 :

- Q1. 콘돔으로 에이즈를 예방할 수 있다.
 Q2. 에이즈에 걸린 사람도 건강해 보일 수 있다.
 Q3. 보기도 에이즈에 감염될 수 있다.
 Q4. 에이즈에 감염된 사람과 함께 식사를 하면 에이즈에 감염될 수 있다.

#에이즈에 대한 태도 문항 :

- Q1. 가족 중 에이즈 감염인이 생긴다면 집에서 돌보겠다.
 Q2. 에이즈 감염인이 일하는 가게에서도 채소나 과일을 사겠다.
 Q3. 자녀가 에이즈 감염인과 같은 학교에 다니도록 허용하겠다.
 Q4. 가족 중 에이즈 감염인이 있다면 가족 이외의 사람에게에는 비밀로 하겠다.

< 표 117 > 심뇌혈관질환 인지율¹⁾

(단위 : %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
연령	905	46.8(3.4)	7.2	389	46.7(4.1)	8.8	516	46.9(3.3)	7.0
19-29	78	32.8(7.4)	22.7	33	37.6(11.0)	29.4	45	26.8(5.5)	20.5
30-39	128	46.2(4.0)	8.7	52	36.5(5.7)	15.6	76	56.5(5.0)	8.8
40-49	208	64.6(6.2)	9.6	91	64.6(5.9)	9.1	117	64.5(7.9)	12.2
50-59	187	57.9(3.7)	6.3	91	56.4(4.6)	8.2	96	59.5(5.3)	8.9
60-69	125	38.4(5.3)	13.9	51	43.1(6.4)	14.8	74	34.5(6.3)	18.2
70 이상	179	15.4(3.3)	21.2	71	19.9(5.0)	25.3	108	11.9(3.5)	29.7

주 : 1) 심뇌혈관질환 인지율 : (심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

< 표 118 > 심뇌혈관질환 매체 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	인터넷		TV, 라디오, 옥외광고, 지하철 등		병원		보건기관 (보건소, 보건지소, 진료소)	
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	22.9(2.3)	10.0	80.9(4.0)	5.0	42.1(5.1)	12.1	15.4(2.7)	17.4
성								
남자	25.1(3.7)	14.9	77.9(5.1)	6.5	42.6(4.9)	11.4	13.9(3.8)	27.5
여자	20.6(2.6)	12.7	84.1(4.9)	5.9	41.6(7.0)	16.8	17.0(3.8)	22.4
연령								
19-29	49.8(9.5)	19.0	97.5(2.5)	2.6	49.5(8.5)	17.2	15.5(7.0)	45.5
30-39	31.2(4.7)	15.1	70.0(7.5)	10.7	38.6(9.7)	25.2	10.2(4.7)	46.1
40-49	18.1(3.6)	20.1	77.7(5.7)	7.4	40.4(6.9)	17.1	14.0(3.5)	25.1
50-59	13.6(4.6)	34.1	85.8(3.5)	4.1	38.3(5.6)	14.7	16.6(4.3)	25.7
60-69	14.1(6.3)	44.6	84.7(6.3)	7.4	55.3(9.7)	17.6	25.7(8.1)	31.6
70 이상	13.4(8.1)	60.2	81.4(6.0)	7.3	58.2(11.7)	20.1	32.4(14.0)	43.1

주 : 1) 심뇌혈관질환 매체 경험률 : (응답보기별 응답자 수 / 심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수) × 100

< 119> 심뇌혈관질환 예방관리수칙 인지율¹⁾

(단위 : %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
연령	909	16.0(2.4)	15.1	391	17.1(2.7)	15.6	518	14.8(3.7)	24.8
19-29	78	5.4(3.0)	56.2	33	6.6(4.4)	66.3	45	3.9(2.7)	69.5
30-39	128	18.4(4.7)	25.7	52	19.5(5.8)	29.6	76	17.2(6.7)	38.9
40-49	208	25.5(3.4)	13.2	91	27.7(4.9)	17.6	117	22.9(4.4)	19.0
50-59	188	17.0(3.2)	18.9	92	15.0(3.8)	25.6	96	19.2(7.0)	36.6
60-69	125	10.2(3.6)	35.2	51	9.1(3.9)	43.1	74	11.1(4.5)	40.9
70 이상	182	8.3(2.4)	28.9	72	12.8(4.3)	33.7	110	4.9(2.5)	50.6

1) 심뇌혈관질환 예방관리수칙 인지율 : ('심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙'에 관한 홍보물을 본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

<표 120> 심뇌혈관질환 예방관리수칙 매체 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	인터넷		TV, 라디오, 옥외광고, 지하철 등		병의원		보건기관 (보건소, 보건지소, 진료소)	
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	32.3(3.7)	11.3	73.6(8.3)	11.3	64.1(5.7)	8.8	29.7(5.4)	18.2
성								
남자	33.4(5.8)	17.3	69.3(8.1)	11.6	55.9(4.6)	8.2	23.1(7.6)	32.9
여자	31.0(4.1)	13.2	78.8(9.7)	12.3	74.2(9.9)	13.4	37.8(5.1)	13.6
연령								
19-29	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
30-39	47.6(9.2)	19.4	82.2(12.1)	14.8	79.4(13.1)	16.5	31.4(11.0)	35.0
40-49	23.6(6.3)	26.8	70.5(10.4)	14.8	59.3(6.6)	11.1	20.5(6.7)	32.7
50-59	33.9(10.0)	29.6	70.4(10.8)	15.3	59.2(10.0)	16.8	35.6(10.6)	29.9
60-69	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
70 이상	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-

주 : 1) 심뇌혈관질환 예방관리수칙 매체 경험률 : (응답보기별 응답자 수 / '심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙'에 관한 홍보물을 본 적이 있는 사람의 수) × 100

< 121> 필요의료서비스 미치료율 및 필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율

(: %)

	필요의료서비스 미치료율 ¹⁾			필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
성	917	7.2(1.5)	20.9	74	27.0(8.0)	29.5
남자	393	6.0(1.6)	26.3	24	20.2(8.6)	42.5
여자	524	8.5(1.7)	19.5	50	32.0(9.0)	28.0
연령						
19-29	78	1.9(1.3)	70.1	2	-(-)	-
30-39	128	10.7(3.5)	33.0	15	-(-)	-
40-49	208	8.5(2.6)	30.1	18	-(-)	-
50-59	189	4.4(1.6)	37.0	9	-(-)	-
60-69	128	7.4(2.0)	27.0	10	-(-)	-
70 이상	186	10.2(2.5)	24.7	20	48.0(9.7)	20.3
생애주기별						
19-64	682	6.7(1.8)	26.7	50	20.5(8.4)	41.2
65 이상	235	9.9(2.1)	20.8	24	53.1(9.1)	17.1
교육수준 ³⁾						
무학	113	13.8(3.3)	23.8	16	-(-)	-
초등학교	134	10.3(2.3)	22.5	12	-(-)	-
중학교	81	5.3(2.8)	53.3	5	-(-)	-
고등학교	365	5.6(1.6)	28.0	22	20.1(8.3)	41.4
대학교 이상	224	7.7(2.9)	37.9	19	-(-)	-
직업						
전문행정관리	104	10.0(2.4)	24.4	10	-(-)	-
사무직	78	1.1(1.0)	97.8	1	-(-)	-
판매·서비스직	112	13.9(5.2)	37.0	16	-(-)	-
농림어업	70	6.9(3.0)	44.0	5	-(-)	-
기능단순노무직	157	5.8(1.6)	28.4	10	-(-)	-
기타 ⁴⁾	395	6.3(1.2)	19.6	31	41.9(10.7)	25.5
월 가구소득						
100만원 이하	203	10.0(2.2)	21.6	22	49.2(10.6)	21.5
101-200만원	151	10.0(2.3)	22.6	16	-(-)	-
201-300만원	114	8.7(3.3)	37.8	9	-(-)	-
301-400만원	160	5.7(2.0)	34.1	9	-(-)	-
401만원 이상	282	5.2(2.2)	41.6	17	-(-)	-

: 1) 필요의료서비스 미치료율 : (최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율 : (경제적 이유로 치료를 받지 못한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 122> 필요의료서비스 미치료 이유¹⁾

(: %)

	N	경제적인 이유로		병의원 등에 예약을 하기 힘들어서		교통편이 불편해서		내가 갈 수 있는 시간에 병의원 등이 문을 열지 않아서		병의원 등에서 오래 기다리기 싫어서		증상이 가벼워서		기 타	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
성	917	1.9(0.5)	26.0	1.0(0.4)	36.2	0.7(0.4)	48.5	0.8(0.5)	66.2	0.2(0.1)	62.0	0.4(0.3)	65.6	2.0(0.6)	31.8
남자	393	1.2(0.5)	41.3	1.2(0.6)	46.9	0.6(0.4)	68.6	1.1(0.8)	71.5	0.0(0.0)	.	0.3(0.3)	98.3	1.6(0.6)	35.4
여자	524	2.7(0.7)	26.3	0.9(0.4)	43.7	0.9(0.4)	41.9	0.5(0.3)	70.0	0.5(0.3)	61.5	0.6(0.3)	56.2	2.5(0.9)	38.2
연령															
19-29	78	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	98.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.0(1.0)	100.7
30-39	128	2.1(1.2)	57.9	1.7(1.1)	67.3	1.5(1.6)	103.4	2.1(1.4)	67.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.3(1.5)	44.2
40-49	208	1.3(0.8)	62.9	2.4(1.0)	43.8	0.0(0.0)	.	0.6(0.5)	96.3	0.5(0.5)	98.9	1.4(1.1)	75.6	2.4(1.2)	51.3
50-59	189	1.6(1.0)	61.1	0.6(0.6)	100.8	0.4(0.4)	99.8	0.4(0.4)	99.7	0.4(0.4)	101.1	0.0(0.0)	.	1.0(1.0)	100.2
60-69	128	4.0(1.5)	37.2	0.0(0.0)	.	0.8(0.8)	100.8	0.0(0.0)	.	0.5(0.5)	98.2	0.8(0.8)	97.1	1.3(1.0)	74.1
70 이상	186	4.9(1.5)	31.5	0.0(0.0)	.	2.7(1.1)	42.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.6(1.2)	46.0
생애주기별															
19-64	682	1.4(0.5)	39.6	1.2(0.4)	35.7	0.5(0.4)	75.2	0.9(0.6)	65.8	0.3(0.2)	61.9	0.4(0.3)	75.8	2.0(0.8)	38.5
65 이상	235	5.2(1.4)	27.0	0.0(0.0)	.	2.1(0.9)	42.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.4(0.4)	98.8	2.1(1.0)	46.5
교육수준 ²⁾															
무학	113	4.8(2.0)	41.4	0.0(0.0)	.	3.7(1.6)	41.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	5.3(1.8)	33.2
초등학교	134	5.1(2.0)	38.8	0.0(0.0)	.	1.3(0.9)	68.3	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	99.5	0.7(0.7)	98.6	2.3(1.8)	79.5
중학교	81	4.2(2.2)	52.4	0.0(0.0)	.	1.1(1.1)	99.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
고등학교	365	1.1(0.4)	38.2	0.9(0.4)	43.4	0.7(0.7)	99.8	0.7(0.7)	98.9	0.3(0.3)	76.4	0.5(0.3)	71.8	1.4(0.9)	66.1
대학교 이상	224	1.2(0.7)	62.0	2.1(1.1)	51.8	0.0(0.0)	.	1.5(0.9)	58.6	0.0(0.0)	.	0.4(0.4)	93.7	2.6(1.2)	47.2
직업															
전문행정관리	104	0.0(0.0)	.	2.6(0.8)	30.6	1.4(1.4)	99.0	2.2(1.7)	77.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.8(1.9)	51.2
사무직	78	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.1(1.0)	97.8
판매·서비스직	112	3.6(2.3)	63.4	1.8(1.2)	67.1	0.6(0.6)	99.1	0.0(0.0)	.	2.0(1.2)	59.9	1.2(1.1)	93.6	4.7(3.4)	71.1
농림어업	70	2.4(1.6)	67.7	2.3(2.3)	99.6	2.3(1.6)	68.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	157	2.1(1.0)	45.4	0.7(0.7)	103.1	0.0(0.0)	.	1.8(1.3)	70.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.1(0.6)	49.1
기타 ³⁾	395	2.6(0.8)	30.1	0.0(0.0)	.	1.0(0.4)	44.9	0.4(0.4)	99.3	0.0(0.0)	.	0.7(0.4)	59.0	1.5(0.6)	40.3
월 가구소득															
100만원 이하	203	4.9(1.6)	32.0	0.0(0.0)	.	2.2(0.9)	42.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.9(1.3)	44.6
101-200만원	151	3.7(1.4)	38.9	1.5(0.6)	39.1	0.0(0.0)	.	1.5(1.5)	101.1	0.8(0.6)	75.0	0.4(0.4)	97.8	2.0(1.2)	60.9
201-300만원	114	3.0(2.1)	71.7	0.0(0.0)	.	2.2(2.1)	96.2	2.6(2.2)	84.1	0.0(0.0)	.	0.9(0.8)	84.1	0.0(0.0)	.
301-400만원	160	0.0(0.0)	.	2.4(1.0)	43.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.2(0.8)	66.1	2.2(1.2)	52.9
401만원 이상	282	0.6(0.4)	72.1	1.0(0.6)	58.6	0.4(0.3)	79.0	0.6(0.5)	74.5	0.3(0.3)	99.2	0.0(0.0)	.	2.4(1.2)	52.5

1) 필요의료서비스 미치료 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 123> 연간 낙상 경험률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
65세이상 ²⁾	916	12.3(1.6)	13.0	393	10.7(1.9)	17.3	523	14.0(1.9)	13.8
연령	235	19.5(2.2)	11.5	93	13.4(3.6)	27.0	142	24.1(3.5)	14.5
19-29	78	9.7(3.5)	35.5	33	3.9(3.7)	94.9	45	16.9(6.4)	38
30-39	128	15.5(2.8)	18.3	52	18.5(5.1)	27.6	76	12.3(4.1)	33.8
40-49	208	8.9(2.4)	26.9	91	11.2(3.8)	34	117	6.3(2.0)	31.6
50-59	189	9.2(3.4)	37	93	6.9(2.9)	42.2	96	11.9(4.6)	38.9
60-69	127	15.7(3.4)	21.7	51	7.5(3.3)	43.4	76	22.2(4.9)	21.8
70 이상	186	20.4(3.2)	15.7	73	15.4(4.7)	30.5	113	24.2(4.3)	17.7
생애주기별									
19-64	681	11.1(1.8)	16.2	300	10.4(2.0)	19.7	381	11.9(2.3)	19.1
65 이상	235	19.5(2.4)	12.2	93	13.4(3.6)	27	142	24.1(3.6)	14.9
교육수준 ³⁾									
무학	113	21.3(4.3)	20.1	24	11.9(6.5)	54.8	89	23.8(5.0)	21.2
초등학교	133	19.0(3.3)	17.1	47	13.1(5.4)	40.7	86	23.2(3.9)	16.8
중학교	81	14.3(5.8)	40.8	34	5.3(3.7)	70.1	47	21.1(8.9)	42.4
고등학교	365	9.2(1.7)	18.8	185	9.1(2.3)	25.6	180	9.2(2.5)	27.1
대학교 이상	224	12.8(2.8)	21.8	103	13.7(4.2)	30.5	121	11.7(3.7)	32.1
직업									
전문행정관리	104	3.6(1.7)	46.6	46	5.8(2.9)	50.7	58	1.2(1.3)	101.9
사무직	78	18.1(5.5)	30.4	52	20.2(6.5)	32.4	26	12.0(5.1)	42
판매·서비스직	112	13.4(3.9)	29	33	8.2(4.5)	55.3	79	16.2(4.8)	29.3
농림어업	70	24.5(4.7)	19.3	48	16.5(5.1)	30.6	22	42.4(10.9)	25.7
기능단순노무직	157	11.4(3.5)	30.9	115	9.3(2.8)	30.2	42	20.1(9.4)	47.1
기타 ⁴⁾	394	12.2(1.8)	14.8	98	7.8(3.3)	41.8	296	14.2(2.2)	15.1
월 가구소득									
100만원 이하	202	19.3(3.7)	19.3	75	10.1(3.3)	32.2	127	26.2(5.7)	21.9
101-200만원	151	18.6(2.8)	15	60	20.8(5.1)	24.5	91	16.7(3.4)	20.2
201-300만원	114	10.3(3.7)	35.8	58	9.8(4.9)	50.4	56	10.9(4.5)	40.9
301-400만원	160	15.1(3.8)	25.5	71	13.4(4.9)	36.8	89	16.9(4.4)	25.9
401만원 이상	282	6.3(1.6)	24.9	126	6.0(1.6)	25.9	156	6.6(1.9)	29.5

: 1) 연간 낙상 경험률 : (연간 낙상 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 연간 낙상 경험률(≥65) : (연간 낙상 경험자 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 124> 연간 낙상 건수율¹⁾

(: 건 / 인구 1,000명)

	전체			남자			여자		
	N	건(표준오차)	변동계수	N	건(표준오차)	변동계수	N	건(표준오차)	변동계수
65세이상 ²⁾	916	209.3(32.3)	15.4	393	187.9(47.4)	25.2	523	231.9(36.0)	15.5
연령	235	318.4(47.3)	14.8	93	266.8(92.0)	34.5	142	357.9(53.2)	14.9
19-29	78	228.1(85.6)	37.5	33	39.4(37.4)	94.9	45	461.0(187.5)	40.7
30-39	128	195.1(38.1)	19.5	52	232.9(70.7)	30.3	76	155.4(50.4)	32.5
40-49	208	180.5(78.2)	43.3	91	278.9(141.5)	50.7	117	69.0(22.8)	33
50-59	189	160.8(62.4)	38.8	93	125.3(59.7)	47.7	96	201.3(89.3)	44.4
60-69	127	230.8(57.8)	25	51	136.2(68.6)	50.4	76	306.6(68.1)	22.2
70 이상	186	337.6(64.0)	19	73	291.0(115.8)	39.8	113	373.1(61.9)	16.6
생애주기별									
19-64	681	190.8(34.3)	18	300	176.9(49.3)	27.9	381	206.3(40.2)	19.5
65 이상	235	318.4(48.8)	15.3	93	266.8(91.7)	34.4	142	357.9(53.6)	15
교육수준 ³⁾									
무학	113	320.0(57.9)	18.1	24	198.7(112.4)	56.6	89	353.0(65.6)	18.6
초등학교	133	304.2(66.5)	21.9	47	229.1(133.9)	58.5	86	358.3(71.4)	19.9
중학교	81	211.2(87.0)	41.2	34	133.4(95.4)	71.5	47	269.6(107.3)	39.8
고등학교	365	164.8(37.1)	22.5	185	128.0(34.9)	27.2	180	214.2(71.3)	33.3
대학교 이상	224	225.9(57.4)	25.4	103	287.4(114.5)	39.8	121	155.8(48.7)	31.2
직업									
전문행정관리	104	42.2(20.6)	48.9	46	71.2(37.6)	52.8	58	12.3(12.5)	101.9
사무직	78	369.4(159.9)	43.3	52	444.0(207.0)	46.6	26	157.2(65.8)	41.9
판매·서비스직	112	147.7(45.3)	30.7	33	81.6(45.2)	55.3	79	183.5(57.6)	31.4
농림어업	70	419.9(115.4)	27.5	48	344.0(140.6)	40.9	22	591.2(149.6)	25.3
기능단순노무직	157	166.0(48.0)	28.9	115	144.5(51.3)	35.5	42	253.9(89.9)	35.4
기타 ⁴⁾	394	234.8(42.5)	18.1	98	118.0(47.4)	40.2	296	288.4(59.3)	20.6
월 가구소득									
100만원 이하	202	306.7(76.0)	24.8	75	123.1(39.8)	32.4	127	444.6(117.3)	26.4
101-200만원	151	328.8(57.0)	17.3	60	377.3(104.6)	27.7	91	286.3(66.7)	23.3
201-300만원	114	304.8(150.1)	49.2	58	334.6(212.1)	63.4	56	264.2(179.5)	67.9
301-400만원	160	209.5(47.8)	22.8	71	154.5(55.8)	36.1	89	270.1(60.5)	22.4
401만원 이상	282	85.5(26.1)	30.5	126	92.1(36.7)	39.8	156	77.9(24.9)	32

: 1) 연간 낙상 건수율 : (연간 낙상 건수 / 조사대상 응답자 수) × 1,000

2) 연간 낙상 건수율(≥65) : (연간 낙상 건수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 1,000

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 125> 장소별 낙상 분포¹⁾

(: %)

N	집 안												집 밖										
	화장실 / 욕조		방		부엌		거실 / 마루		계단		기타 집안		농어업시설		운송지역		스포츠 / 운동장소		상업 또는 서비스시설		기타 집밖		
	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	
성	198	2.6 (1.2)	47.3	2.3 (1.1)	47.6	0.9 (0.5)	60.7	1.6 (1.1)	64.4	4.2 (2.3)	55.3	2.5 (1.0)	39.2	11.1 (3.5)	31.5	0.0 (0.0)	.	2.6 (1.4)	53.2	3.6 (1.3)	37.5	68.5 (4.1)	6.0
남자	75	1.1 (1.1)	97.9	0.6 (0.6)	102.8	0.0 (0.0)	.	0.0 (0.0)	.	3.7 (3.7)	100.4	0.6 (0.6)	103.0	13.4 (5.2)	39.2	0.0 (0.0)	.	5.2 (3.3)	64.2	1.5 (1.5)	100.7	74.1 (7.0)	9.5
여자	123	3.9 (1.7)	42.5	3.8 (1.8)	47.8	1.7 (1.0)	59.3	3.1 (1.9)	61.7	4.6 (2.5)	55.4	4.1 (1.8)	42.9	9.2 (2.8)	30.0	0.0 (0.0)	.	0.5 (0.5)	101.0	5.4 (2.1)	38.9	63.8 (4.9)	7.8
65세이상 ²⁾	75	1.0 (1.0)	95.0	8.6 (4.7)	55.0	1.3 (1.3)	98.8	2.0 (1.1)	56.5	3.6 (2.0)	56.2	6.2 (3.5)	56.7	40.9 (11.7)	28.7	0.0 (0.0)	.	0.0 (0.0)	.	1.3 (1.4)	102.0	35.1 (8.6)	24.5
연령																							
19-29	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	25	6.1 (3.9)	64	0.0 (0.0)	.	0.0 (0.0)	.	0.0 (0.0)	.	3.0 (2.9)	96	0.0 (0.0)	.	0.0 (0.0)	.	0.0 (0.0)	.	10.3 (7.2)	70	0.0 (0.0)	.	80.6 (8.0)	10
40-49	31	1.6 (1.7)	.	0.0 (0.0)	.	0.0 (0.0)	.	0.0 (0.0)	.	0.0 (0.0)	.	0.0 (0.0)	.	0.0 (0.0)	.	0.0 (0.0)	.	1.2 (1.3)	.	5.0 (4.0)	80	92.2 (5.0)	5
50-59	30	6.1 (3.5)	57	2.8 (2.2)	78	2.3 (2.4)	.	0.0 (0.0)	.	0.0 (0.0)	.	2.5 (2.7)	.	3.3 (2.6)	78	0.0 (0.0)	.	2.8 (2.9)	.	8.4 (6.6)	78	71.7 (13.1)	18
60-69	31	0.0 (0.0)	.	2.6 (2.6)	.	3.0 (3.0)	99	2.3 (2.4)	.	0.0 (0.0)	.	3.1 (3.2)	.	37.7 (14.7)	39	0.0 (0.0)	.	0.0 (0.0)	.	6.4 (4.2)	65	44.9 (12.5)	28
70 이상	62	1.2 (1.1)	94	9.0 (5.1)	56	1.5 (1.6)	.	2.4 (1.3)	56	4.3 (2.3)	55	6.0 (3.7)	62	39.9 (13.1)	33	0.0 (0.0)	.	0.0 (0.0)	.	0.0 (0.0)	.	35.7 (10.2)	29

: 1) 장소별 낙상 분포 : (장소별 낙상 건수 / 낙상 건수) × 100

2) 장소별 낙상 분포(≥65) : (장소별 낙상 건수 / 65세 이상 조사대상 응답자의 낙상 건수) × 100

< 126> 원인별 낙상 분포¹⁾

(: %)

	N	바닥이 미끄러워서		사람이나 사물에 부딪혀서		보도나 문의 턱에 걸려		경사가 급해서		조명이 어두워서		다리를 접질려서		갑자기 어지러워서		기타	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
성	197	29.5 (2.9)	9.8	15.1 (6.4)	42.4	15.8 (4.2)	26.5	4.2 (1.4)	33.6	0.8 (0.6)	78.4	23.7 (6.7)	28.3	5.0 (1.3)	25.5	5.9 (1.9)	32.7
남자	75	35.2 (7.0)	19.9	25.0 (10.3)	41.2	9.0 (3.6)	40.1	5.6 (2.7)	48.9	0.0 (0.0)	.	14.2 (6.5)	45.9	3.4 (2.3)	68.6	7.6 (3.5)	46.4
여자	122	24.7 (3.8)	15.5	6.6 (2.4)	36.7	21.6 (5.9)	27.3	3.0 (0.9)	29.7	1.5 (1.1)	77.1	31.9 (7.1)	22.1	6.3 (1.8)	29.1	4.5 (1.8)	40.2
65세이상 ²⁾	74	28.2 (5.9)	20.9	8.5 (4.2)	49.8	5.1 (2.3)	45.1	8.9 (3.5)	39.2	1.0 (1.0)	94.9	26.4 (7.7)	29.0	12.9 (4.6)	35.9	8.9 (4.4)	49.4
연령																	
19-29	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	25	41.5 (12.9)	31.1	9.5 (6.9)	72.5	30.5 (14.9)	48.8	0.0 (0.0)	.	3.0 (2.9)	96.4	10.2 (5.7)	55.9	0.0 (0.0)	.	5.4 (5.6)	104
40-49	31	38.5 (5.5)	14.2	31.8 (11.3)	35.5	6.6 (4.2)	63.9	3.2 (3.3)	103	0.0 (0.0)	.	12.1 (7.3)	60.8	2.9 (1.3)	44.1	4.9 (3.9)	80.4
50-59	30	27.3 (10.7)	39.1	22.0 (13.8)	62.8	7.8 (4.9)	63	5.4 (4.3)	79.6	0.0 (0.0)	.	19.8 (17.1)	86.4	6.7 (5.2)	77.9	11.0 (5.3)	47.9
60-69	31	26.1 (8.7)	33.3	15.5 (10.1)	65	7.9 (6.5)	82.8	8.3 (5.6)	67.2	0.0 (0.0)	.	21.4 (9.1)	42.7	15.4 (8.6)	55.5	5.5 (3.1)	57.1
70 이상	61	30.2 (6.5)	21.4	4.4 (2.9)	65	4.1 (2.3)	56.2	10.6 (4.1)	38.8	1.2 (1.1)	93.5	29.0 (8.3)	28.6	11.0 (4.4)	40.1	9.5 (5.1)	53.2

: 1) 원인별 낙상 분포 : (원인별 낙상 건수 / 낙상 건수) × 100

2) 원인별 낙상 분포(≥65) : (원인별 낙상 건수 / 65세 이상 조사대상 응답자의 낙상 건수) × 100

< 127> 낙상에 대한 두려움¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
65세이상 ²⁾	915	20.4(3.6)	17.5	392	15.5(3.8)	24.5	523	25.6(3.6)	13.9
연령	233	64.3(3.3)	5.1	92	51.8(5.1)	9.8	141	73.8(3.9)	5.3
19-29	78	12.8(4.9)	38.4	33	16.3(7.6)	46.5	45	8.4(3.8)	45.5
30-39	128	10.5(3.6)	34.2	52	7.0(3.8)	53.7	76	14.1(5.4)	38.2
40-49	208	11.0(6.8)	61.9	91	8.4(7.0)	83.5	117	13.9(7.0)	50.5
50-59	189	14.0(4.6)	32.7	93	8.7(4.4)	50.2	96	19.9(6.0)	30
60-69	128	34.3(4.2)	12.2	51	28.1(7.4)	26.2	77	39.2(5.0)	12.7
70 이상	184	71.0(3.0)	4.3	72	56.7(5.7)	10.1	112	81.8(3.2)	3.9
생애주기별									
19-64	682	13.0(4.0)	30.5	300	10.5(4.1)	39.2	382	15.8(4.2)	26.5
65 이상	233	64.3(3.2)	5	92	51.8(4.9)	9.5	141	73.8(3.8)	5.2
교육수준 ³⁾									
무학	114	69.5(4.9)	7.1	24	71.5(10.0)	14.1	90	69.0(5.6)	8.2
초등학교	132	50.0(5.4)	10.8	47	33.3(7.7)	23	85	62.1(5.6)	9
중학교	81	30.1(6.9)	22.8	34	36.7(9.6)	26	47	25.2(7.6)	30.2
고등학교	364	12.5(3.7)	29.8	184	13.1(4.2)	32.1	180	11.7(4.0)	34.4
대학교 이상	224	10.9(4.9)	44.9	103	6.6(4.5)	68.2	121	15.8(5.8)	36.7
직업									
전문행정관리	104	1.7(1.0)	58.5	46	0.0(0.0)	.	58	3.4(2.1)	59.6
사무직	78	5.9(4.8)	81.8	52	2.7(2.8)	100.7	26	14.9(9.8)	66.1
판매·서비스직	112	18.7(6.8)	36.7	33	12.8(8.9)	69.4	79	21.9(6.7)	30.8
농림어업	70	40.4(7.5)	18.5	48	34.9(6.9)	19.7	22	52.7(13.1)	24.9
기능단순노무직	157	11.6(4.0)	34.4	115	6.3(2.9)	45.9	42	33.2(8.1)	24.3
기타 ⁴⁾	393	33.9(3.8)	11.3	97	40.4(7.1)	17.6	296	31.0(3.7)	12.1
월 가구소득									
100만원 이하	202	52.0(4.3)	8.3	74	38.2(6.0)	15.8	128	62.1(4.5)	7.2
101-200만원	150	21.6(3.8)	17.6	60	21.1(5.3)	25.2	90	22.0(4.2)	19.3
201-300만원	114	16.9(4.7)	28	58	10.1(3.7)	36.9	56	26.1(6.9)	26.4
301-400만원	160	17.2(4.5)	26.3	71	17.0(6.1)	35.8	89	17.4(3.5)	20.1
401만원 이상	282	9.7(4.6)	47	126	6.5(4.8)	74.2	156	13.4(5.0)	37.1

: 1) 낙상에 대한 두려움 : (평소 넘어지는 것에 대해 “약간” 또는 “많이” 두려워한다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 낙상에 대한 두려움(≥65) : 평소 넘어지는 것에 대해 “약간” 또는 “많이” 두려워한다고 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 128> 연간 사고중독 경험률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	918	4.5(1.0)	21.2	393	3.6(1.4)	39.0	525	5.5(0.9)	16.9
연령									
19-29	78	1.7(1.7)	98.2	33	3.0(3.3)	107.6	45	0.0(0.0)	.
30-39	128	2.5(1.2)	49.5	52	2.0(1.9)	92.6	76	3.0(1.7)	57.4
40-49	208	2.5(1.3)	53.4	91	0.0(0.0)	.	117	5.4(2.7)	50.9
50-59	189	6.8(2.2)	32.3	93	6.2(2.4)	38.0	96	7.5(2.9)	38.2
60-69	128	10.2(2.6)	25.3	51	7.4(3.7)	50.4	77	12.5(2.6)	20.6
70 이상	187	8.3(1.9)	23.2	73	8.9(3.2)	36.5	114	7.9(2.8)	35.8
생애주기별									
19-64	682	3.8(1.0)	27.6	300	3.0(1.4)	46.6	382	4.6(1.0)	22.1
65 이상	236	8.9(1.9)	20.9	93	7.8(2.8)	35.8	143	9.8(2.8)	29.1
교육수준 ²⁾									
무학	114	6.5(2.6)	39.4	24	7.4(5.3)	72.1	90	6.3(2.6)	40.9
초등학교	134	13.8(2.9)	21.3	47	9.4(4.0)	42.5	87	17.0(4.0)	23.6
중학교	81	7.8(3.3)	42.0	34	6.9(3.9)	57.1	47	8.4(4.1)	48.3
고등학교	365	3.5(1.1)	31.3	185	3.2(1.3)	41.1	180	3.8(1.5)	40.4
대학교 이상	224	2.3(1.3)	57.5	103	2.0(1.9)	97.9	121	2.6(1.2)	46.4
직업									
전문행정관리	104	2.6(1.7)	65.8	46	3.0(3.1)	100.9	58	2.2(1.6)	72.3
사무직	78	2.1(1.4)	67.0	52	2.9(1.9)	66.7	26	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	112	1.5(1.0)	66.5	33	0.0(0.0)	.	79	2.3(1.5)	66.6
농림어업	70	9.5(3.6)	38.4	48	13.6(4.9)	36.0	22	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	157	2.5(0.9)	37.2	115	0.9(0.7)	72.8	42	8.8(3.1)	35.7
기타 ³⁾	396	7.3(1.7)	23.0	98	6.3(3.4)	54.3	298	7.8(1.7)	21.2
월 가구소득									
100만원 이하	204	5.3(1.3)	25.3	75	5.1(2.2)	44.3	129	5.5(1.5)	27.2
101-200만원	151	6.9(1.7)	23.8	60	5.0(2.6)	53.1	91	8.7(2.6)	29.7
201-300만원	114	6.7(1.7)	24.5	58	7.2(3.1)	43.4	56	6.1(3.7)	60.8
301-400만원	160	3.8(2.0)	52.1	71	5.9(3.7)	63.7	89	1.6(1.0)	66.5
401만원 이상	282	2.8(1.1)	39.8	126	0.0(0.0)	.	156	6.1(2.3)	37.3

: 1) 연간 사고중독 경험률 : (연간 사고중독 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 129> 연간 사고중독 건수율¹⁾

(: 건 / 인구 1,000명)

	전체			남자			여자		
	N	건(표준오차)	변동계수	N	건(표준오차)	변동계수	N	건(표준오차)	변동계수
연령	918	55.0(12.4)	22.6	393	39.3(17.1)	43.5	525	71.6(12.3)	17.2
19-29	78	16.8(16.5)	98.2	33	30.4(32.8)	107.6	45	0.0(0.0)	.
30-39	128	29.5(14.5)	49.1	52	20.4(18.9)	92.6	76	39.2(23.3)	59.4
40-49	208	28.8(14.7)	51.1	91	0.0(0.0)	.	117	61.4(30.2)	49.2
50-59	189	80.5(31.4)	39.0	93	72.4(30.0)	41.4	96	89.7(39.0)	43.4
60-69	128	133.5(30.8)	23.1	51	74.0(37.3)	50.4	77	180.5(36.2)	20.1
70 이상	187	112.1(30.8)	27.4	73	104.0(42.0)	40.4	114	118.2(46.7)	39.5
생애주기별									
19-64	682	43.8(12.9)	29.4	300	32.2(16.0)	49.8	382	56.8(13.1)	23.0
65 이상	236	120.7(27.9)	23.1	93	90.3(34.6)	38.3	143	143.6(43.7)	30.4
교육수준 ²⁾									
무학	114	107.0(50.7)	47.4	24	73.5(53.1)	72.1	90	115.9(60.7)	52.4
초등학교	134	173.8(40.2)	23.1	47	94.0(39.9)	42.5	87	230.1(60.8)	26.4
중학교	81	120.6(60.7)	50.3	34	94.6(58.0)	61.3	47	140.1(74.3)	53.1
고등학교	365	34.5(10.8)	31.3	185	32.1(13.2)	41.1	180	37.9(15.3)	40.4
대학교 이상	224	26.2(16.1)	61.3	103	26.1(25.6)	97.9	121	26.3(12.2)	46.4
직업									
전문행정관리	104	26.1(17.2)	65.8	46	30.5(30.8)	100.9	58	21.5(15.5)	72.3
사무직	78	30.1(20.3)	67.4	52	40.7(27.8)	68.5	26	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	112	22.1(15.8)	71.8	33	0.0(0.0)	.	79	34.0(24.3)	71.6
농림어업	70	94.6(36.4)	38.4	48	136.5(49.1)	36.0	22	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	157	31.7(12.6)	39.7	115	9.4(6.8)	72.8	42	122.4(46.9)	38.3
기타 ³⁾	396	91.2(20.3)	22.3	98	69.1(39.9)	57.8	298	101.2(21.3)	21.0
월 가구소득									
100만원 이하	204	73.0(24.2)	33.1	75	50.5(22.4)	44.3	129	89.6(36.7)	40.9
101-200만원	151	75.7(19.7)	26.0	60	49.8(26.4)	53.1	91	98.5(32.9)	33.4
201-300만원	114	88.2(22.6)	25.6	58	81.9(38.6)	47.2	56	96.7(57.3)	59.3
301-400만원	160	43.7(24.3)	55.7	71	69.0(46.4)	67.2	89	15.7(10.5)	66.5
401만원 이상	282	34.5(14.4)	41.8	126	0.0(0.0)	.	156	73.7(28.9)	39.2

: 1) 연간 사고중독 건수율 : (연간 사고중독 건수 / 조사대상 응답자 수) × 1,000

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 130> 양호한 주관적 건강수준 인지율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
연령	918	51.0(3.2)	6.3	393	59.2(3.4)	5.7	525	42.5(3.5)	8.2
19-29	78	79.1(6.1)	7.7	33	87.7(6.8)	7.7	45	68.3(9.2)	13.5
30-39	128	64.8(4.7)	7.3	52	71.3(5.5)	7.7	76	57.9(7.4)	12.8
40-49	208	57.4(5.5)	9.6	91	64.4(7.1)	11.0	117	49.4(6.2)	12.6
50-59	189	36.7(3.2)	8.8	93	41.0(4.5)	11.0	96	31.7(4.2)	13.3
60-69	128	29.7(4.1)	13.7	51	36.6(6.9)	19.0	77	24.2(4.1)	17.0
70 이상	187	13.4(2.4)	18.0	73	22.4(3.9)	17.6	114	6.7(2.4)	36.0
생애주기별									
19-64	682	57.2(3.6)	6.3	300	63.9(3.6)	5.7	382	49.8(4.0)	8.0
65 이상	236	15.0(2.3)	15.1	93	25.2(3.8)	15.2	143	7.3(2.0)	27.8
교육수준 ²⁾									
무학	114	14.4(3.6)	25.4	24	12.3(7.8)	63.5	90	15.0(3.4)	22.5
초등학교	134	20.6(4.4)	21.5	47	30.5(6.3)	20.7	87	13.6(5.9)	43.4
중학교	81	30.0(5.1)	17.0	34	35.2(7.3)	20.6	47	26.2(6.6)	25.4
고등학교	365	57.0(3.8)	6.7	185	60.0(4.3)	7.1	180	53.0(4.6)	8.7
대학교 이상	224	63.6(5.1)	8.0	103	72.6(5.0)	6.9	121	53.3(6.1)	11.5
직업									
전문행정관리	104	63.7(6.2)	9.8	46	72.1(6.9)	9.6	58	55.1(10.3)	18.7
사무직	78	61.4(8.8)	14.3	52	60.7(9.1)	15.0	26	63.6(11.3)	17.7
판매·서비스직	112	48.4(5.3)	10.9	33	60.1(8.3)	13.7	79	42.0(5.1)	12.1
농림어업	70	35.9(6.1)	17.0	48	42.5(7.2)	16.9	22	20.9(9.4)	45.0
기능단순노무직	157	59.2(3.7)	6.2	115	61.4(4.4)	7.1	42	50.4(6.8)	13.5
기타 ³⁾	396	41.4(3.8)	9.2	98	51.2(6.7)	13.1	298	37.0(3.4)	9.3
월 가구소득									
100만원 이하	204	24.1(4.1)	16.9	75	29.8(6.4)	21.4	129	19.9(4.1)	20.6
101-200만원	151	41.2(3.8)	9.3	60	46.7(6.3)	13.4	91	36.3(4.9)	13.5
201-300만원	114	47.5(6.1)	12.8	58	53.6(9.0)	16.7	56	39.2(5.3)	13.6
301-400만원	160	65.5(3.2)	4.9	71	75.5(4.0)	5.2	89	54.4(5.9)	10.9
401만원 이상	282	60.4(5.7)	9.4	126	67.7(5.2)	7.7	156	52.0(7.0)	13.4

: 1) 양호한 주관적 건강수준 인지율 : (주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 131> 침상와병 경험률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	917	3.6(0.7)	19.7	392	3.2(0.9)	29.5	525	4.0(0.8)	20.9
연령									
19-29	77	1.7(1.7)	101.2	32	3.1(3.0)	94.4	45	0.0(0.0)	.
30-39	128	2.9(1.9)	66.3	52	4.5(3.0)	65.9	76	1.3(1.2)	94.9
40-49	208	0.9(0.3)	36.6	91	0.0(0.0)	.	117	1.8(0.7)	40.1
50-59	189	3.9(1.7)	43.9	93	2.5(1.4)	57.2	96	5.4(3.2)	59.7
60-69	128	6.2(2.1)	34.3	51	6.2(3.5)	56.1	77	6.2(2.8)	44.5
70 이상	187	10.7(3.1)	29.1	73	8.1(2.9)	36.2	114	12.6(4.4)	34.6
생애주기별									
19-64	681	2.6(0.7)	25.7	299	2.6(0.9)	36.2	382	2.6(0.9)	34.3
65 이상	236	9.3(2.6)	27.6	93	7.4(2.4)	32.0	143	10.8(3.5)	32.9
교육수준 ²⁾									
무학	114	12.3(3.7)	30.1	24	12.3(5.6)	45.4	90	12.3(4.8)	38.9
초등학교	134	6.6(2.3)	34.5	47	3.9(2.7)	68.0	87	8.5(3.4)	39.4
중학교	81	4.1(1.9)	45.5	34	7.3(4.0)	55.0	47	1.7(1.7)	100.5
고등학교	364	2.9(1.0)	35.9	184	2.9(1.5)	50.2	180	2.8(1.5)	54.0
대학교 이상	224	1.7(1.3)	78.3	103	1.9(1.4)	74.9	121	1.5(1.3)	89.2
직업									
전문행정관리	104	2.2(1.7)	75.4	46	4.4(3.3)	75.5	58	0.0(0.0)	.
사무직	78	0.0(0.0)	.	52	0.0(0.0)	.	26	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	112	0.7(0.6)	93.6	33	0.0(0.0)	.	79	1.1(1.0)	94.6
농림어업	70	5.3(2.2)	41.0	48	7.6(2.8)	37.3	22	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	157	2.4(1.5)	62.3	115	1.6(1.6)	99.0	42	5.3(3.3)	62.4
기타 ³⁾	395	6.5(1.3)	20.2	97	6.8(2.7)	39.2	298	6.4(1.5)	22.7
월 가구소득									
100만원 이하	204	10.4(3.0)	28.6	75	12.5(5.2)	41.5	129	8.8(3.0)	34.3
101-200만원	151	4.0(2.0)	50.2	60	3.7(3.6)	97.4	91	4.2(2.3)	54.4
201-300만원	114	3.6(1.8)	49.8	58	5.4(3.2)	59.7	56	1.1(1.1)	106.4
301-400만원	159	2.2(1.0)	45.9	70	1.7(1.2)	71.5	89	2.7(1.5)	53.4
401만원 이상	282	1.5(0.9)	56.6	126	0.0(0.0)	.	156	3.3(1.8)	54.6

: 1) 침상와병 경험률 : (최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 한나절 이상 누워 보내야 했던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 132> 침상와병일수¹⁾

(: 일)

	전체			남자			여자		
	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수
	41	9.4(1.1)	11.3	15	-(-)	-	26	9.5(1.1)	11.6
연령									
19-29	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	2	-(-)	-	0	-(-)	-	2	-(-)	-
50-59	7	-(-)	-	3	-(-)	-	4	-(-)	-
60-69	8	-(-)	-	3	-(-)	-	5	-(-)	-
70 이상	20	13.3(1.1)	8.3	6	-(-)	-	14	-(-)	-

: 1) 침상와병일수 : 최근 1달(30일) 동안 침상와병일 수 / 와병 경험자 수

< 표 133 > 결근결석 경험률¹⁾

(단위 : %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
연령	502	2.0(0.7)	34.0	284	2.6(1.0)	39.9	218	0.9(0.6)	66.5
19-29	57	2.1(2.1)	99.8	24	3.8(3.7)	99.0	33	0.0(0.0)	.
30-39	86	4.0(2.4)	59.8	49	4.5(3.2)	71.7	37	2.9(2.8)	96.6
40-49	160	1.1(0.6)	55.0	88	1.1(1.1)	99.2	72	1.2(1.1)	97.0
50-59	131	0.7(0.7)	98.6	80	1.1(1.1)	99.6	51	0.0(0.0)	.
60-69	52	4.0(2.7)	69.0	34	6.0(4.1)	68.2	18	-(-)	-
70 이상	16	-(-)	-	9	-(-)	-	7	-(-)	-
생애주기별									
19-64	467	1.9(0.7)	36.0	263	2.5(1.1)	42.9	204	1.0(0.6)	66.2
65 이상	35	2.7(2.6)	97.4	21	4.6(4.4)	95.4	14	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	18	-(-)	-	6	-(-)	-	12	-(-)	-
초등학교	24	0.0(0.0)	.	10	-(-)	-	14	-(-)	-
중학교	41	3.9(2.7)	68.3	21	8.2(5.5)	67.5	20	0.0(0.0)	.
고등학교	251	2.4(1.1)	47.0	154	3.0(1.6)	52.5	97	1.2(1.2)	96.2
대학교 이상	168	1.4(1.0)	75.5	93	1.6(1.6)	97.7	75	0.9(0.8)	87.2
직업									
전문행정관리	101	0.7(0.7)	98.9	45	1.4(1.3)	97.0	56	0.0(0.0)	.
사무직	78	0.0(0.0)	.	52	0.0(0.0)	.	26	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	108	1.8(1.2)	67.0	33	0.0(0.0)	.	75	2.9(1.9)	64.5
농림어업	44	4.0(2.7)	68.6	31	5.5(3.6)	65.2	13	-(-)	-
기능단순노무직	150	4.3(2.0)	47.6	114	5.2(2.4)	46.6	36	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	21	0.0(0.0)	.	9	-(-)	-	12	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 이하	37	2.0(1.9)	95.3	21	3.2(2.9)	92.9	16	-(-)	-
101-200만원	75	3.9(3.0)	77.4	35	5.6(5.4)	96.7	40	2.0(2.0)	100.9
201-300만원	73	0.8(0.8)	102.2	49	1.0(1.1)	101.9	24	0.0(0.0)	.
301-400만원	108	4.4(2.0)	45.7	63	5.6(3.0)	53.2	45	2.5(2.2)	89.9
401만원 이상	207	0.5(0.5)	96.7	115	0.8(0.8)	95.2	92	0.0(0.0)	.

: 1) 결근결석 경험률 : (최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 학교나 직장에 가지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 134> 결근결석일수¹⁾

(단위 : 일)

구분	전체			남자			여자		
	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수
전체	9	-(-)	-	7	-(-)	-	2	-(-)	-
연령									
19-29	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
50-59	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
60-69	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
70 이상	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-

주 : 1) 결근결석일수 : 최근 1달(30일) 동안 결근결석일 수 / 결근결석 경험자 수

조사대상 응답자 수 : 학교 또는 직장을 다니고 있지 않은(주부, 무직)대상자 제외

< 135> 삶의 질 지수(EQ-5D Index) ^{1),2)}

(: 평균)

	전체			남자			여자		
	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수
연령	917	0.946(0.005)	0.6	392	0.964(0.005)	0.6	525	0.928(0.006)	0.7
19-29	78	0.985(0.007)	0.7	33	0.981(0.010)	1.0	45	0.989(0.007)	0.7
30-39	128	0.985(0.004)	0.4	52	0.988(0.006)	0.6	76	0.981(0.005)	0.5
40-49	208	0.986(0.006)	0.6	91	0.993(0.005)	0.5	117	0.978(0.008)	0.9
50-59	189	0.954(0.010)	1.1	93	0.972(0.010)	1.0	96	0.933(0.015)	1.6
60-69	128	0.894(0.012)	1.3	51	0.935(0.016)	1.7	77	0.862(0.016)	1.9
70 이상	186	0.762(0.017)	2.3	72	0.801(0.027)	3.3	114	0.733(0.019)	2.6
생애주기별									
19-64	682	0.974(0.004)	0.4	300	0.982(0.004)	0.4	382	0.965(0.006)	0.6
65 이상	235	0.785(0.015)	2.0	92	0.829(0.023)	2.8	143	0.751(0.016)	2.2
교육수준 ³⁾									
무학	114	0.736(0.019)	2.6	24	0.755(0.051)	6.8	90	0.731(0.023)	3.2
초등학교	134	0.853(0.015)	1.8	47	0.876(0.026)	3.0	87	0.837(0.019)	2.2
중학교	81	0.917(0.015)	1.7	34	0.897(0.025)	2.8	47	0.932(0.015)	1.6
고등학교	364	0.974(0.005)	0.5	184	0.977(0.006)	0.6	180	0.971(0.008)	0.8
대학교 이상	224	0.984(0.006)	0.6	103	0.991(0.003)	0.3	121	0.975(0.008)	0.8
직업									
전문행정관리	104	0.987(0.004)	0.4	46	0.993(0.003)	0.3	58	0.980(0.007)	0.7
사무직	78	0.989(0.006)	0.6	52	0.991(0.006)	0.6	26	0.984(0.009)	0.9
판매·서비스직	112	0.964(0.009)	0.9	33	0.980(0.011)	1.1	79	0.956(0.010)	1.0
농림어업	70	0.927(0.014)	1.5	48	0.932(0.015)	1.7	22	0.914(0.021)	2.3
기능단순노무직	157	0.985(0.004)	0.4	115	0.996(0.002)	0.2	42	0.941(0.014)	1.5
기타 ⁴⁾	395	0.894(0.010)	1.1	97	0.885(0.019)	2.2	298	0.898(0.010)	1.1
월 가구소득									
100만원 이하	203	0.826(0.019)	2.3	74	0.838(0.026)	3.2	129	0.817(0.020)	2.4
101-200만원	151	0.929(0.012)	1.3	60	0.951(0.015)	1.6	91	0.910(0.015)	1.6
201-300만원	114	0.966(0.006)	0.6	58	0.981(0.006)	0.6	56	0.944(0.014)	1.5
301-400만원	160	0.976(0.006)	0.7	71	0.980(0.008)	0.8	89	0.970(0.007)	0.7
401만원 이상	282	0.980(0.006)	0.6	126	0.992(0.003)	0.3	156	0.966(0.010)	1.1

: 1) 삶의 질 지수 : 건강관련 삶의 질의 5가지 차원(운동능력, 자기관리, 일상 활동, 통증/불편, 불안/우울)의 기술체계를 종합한 지표

2) 삶의 질 조사도구(EQ-5D Index)의 질 가중치 추정연구(남해성, 2007)

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 136> 오늘의 건강상태(EQ-VAS)¹⁾

(: 평균)

	전체			남자			여자		
	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수
연령	918	73.0(0.7)	0.9	393	75.4(0.7)	1.0	525	70.5(1.0)	1.4
19-29	78	80.3(2.5)	3.1	33	83.2(3.0)	3.6	45	76.7(3.3)	4.3
30-39	128	76.6(1.0)	1.3	52	77.2(1.4)	1.8	76	76.0(1.7)	2.2
40-49	208	75.3(1.2)	1.6	91	76.6(1.3)	1.7	117	73.8(1.8)	2.5
50-59	189	72.5(1.6)	2.3	93	72.7(2.4)	3.3	96	72.2(1.4)	2.0
60-69	128	66.2(1.9)	2.8	51	71.8(1.9)	2.6	77	61.8(2.4)	3.8
70 이상	187	57.0(1.6)	2.9	73	62.3(1.8)	2.9	114	53.1(2.0)	3.7
생애주기별									
19-64	682	75.5(0.7)	0.9	300	77.0(0.8)	1.0	382	73.9(0.9)	1.3
65 이상	236	58.2(1.7)	2.9	93	63.9(1.7)	2.6	143	53.9(2.2)	4.1
교육수준 ²⁾									
무학	114	52.7(2.2)	4.1	24	60.6(3.4)	5.6	90	50.6(2.2)	4.4
초등학교	134	63.2(1.8)	2.8	47	64.8(2.5)	3.8	87	62.0(2.3)	3.7
중학교	81	69.7(2.5)	3.5	34	72.9(3.7)	5.0	47	67.2(2.6)	3.9
고등학교	365	76.1(1.0)	1.3	185	76.6(1.1)	1.5	180	75.3(1.4)	1.8
대학교 이상	224	76.4(0.9)	1.2	103	77.4(1.1)	1.5	121	75.3(1.3)	1.7
직업									
전문행정관리	104	75.1(1.4)	1.9	46	77.6(1.2)	1.5	58	72.5(2.3)	3.2
사무직	78	76.4(1.6)	2.1	52	77.9(1.5)	1.9	26	72.3(2.3)	3.2
판매·서비스직	112	74.8(1.7)	2.3	33	75.3(3.0)	4.0	79	74.5(1.9)	2.6
농림어업	70	69.9(2.2)	3.1	48	70.3(2.7)	3.8	22	69.1(3.7)	5.4
기능단순노무직	157	75.9(1.0)	1.3	115	77.8(1.1)	1.5	42	67.9(2.8)	4.1
기타 ³⁾	396	69.4(1.5)	2.2	98	70.3(2.8)	4.0	298	69.0(1.3)	1.9
월 가구소득									
100만원 이하	204	61.3(2.3)	3.7	75	63.7(3.4)	5.3	129	59.6(2.5)	4.2
101-200만원	151	72.9(1.4)	1.9	60	75.7(2.2)	2.9	91	70.5(2.1)	2.9
201-300만원	114	74.0(1.1)	1.5	58	75.3(1.4)	1.9	56	72.2(1.9)	2.6
301-400만원	160	76.5(1.5)	2.0	71	78.8(1.9)	2.4	89	73.9(1.7)	2.3
401만원 이상	282	75.7(1.1)	1.5	126	77.3(1.3)	1.6	156	73.9(1.6)	2.2

: 1) 오늘의 건강상태 : 건강상태 점수의 총 합 / 조사대상 응답자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 137> 행복감지수¹⁾

(: 평균)

	전체			남자			여자		
	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수
연령	915	6.8(0.1)	1.1	391	6.9(0.1)	1.7	524	6.8(0.1)	1.2
19-29	78	7.7(0.2)	2.7	33	8.0(0.2)	3.1	45	7.3(0.2)	2.1
30-39	128	7.1(0.1)	1.9	52	7.2(0.2)	2.8	76	7.1(0.2)	2.7
40-49	208	7.0(0.1)	1.9	91	6.8(0.2)	2.7	117	7.3(0.1)	1.6
50-59	189	6.6(0.1)	1.8	93	6.5(0.2)	2.7	96	6.6(0.2)	2.3
60-69	127	6.1(0.2)	2.5	50	6.7(0.2)	3.6	77	5.7(0.2)	3.7
70 이상	185	5.6(0.2)	2.9	72	5.5(0.2)	3.9	113	5.7(0.2)	3.1
생애주기별									
19-64	682	7.0(0.1)	1.2	300	7.0(0.1)	1.8	382	7.0(0.1)	1.2
65 이상	233	5.6(0.1)	2.6	91	5.7(0.2)	3.6	142	5.6(0.2)	2.8
교육수준 ²⁾									
무학	113	5.5(0.2)	2.7	24	5.8(0.3)	5.2	89	5.5(0.1)	2.6
초등학교	133	5.9(0.2)	3.9	46	5.6(0.4)	6.7	87	6.1(0.2)	3.6
중학교	81	6.2(0.2)	3.1	34	6.0(0.4)	6.6	47	6.3(0.2)	3.2
고등학교	364	6.9(0.1)	2.0	184	6.9(0.2)	2.8	180	6.9(0.1)	2.0
대학교 이상	224	7.4(0.1)	1.3	103	7.4(0.1)	1.7	121	7.4(0.1)	1.7
직업									
전문행정관리	104	7.4(0.1)	2.0	46	7.4(0.2)	2.6	58	7.5(0.2)	2.4
사무직	78	7.2(0.2)	2.9	52	7.1(0.3)	4.1	26	7.3(0.2)	3.2
판매·서비스직	112	6.7(0.2)	2.5	33	6.6(0.3)	4.5	79	6.8(0.2)	2.8
농림어업	70	6.2(0.2)	3.4	48	6.2(0.2)	3.5	22	6.2(0.6)	9.5
기능단순노무직	157	6.9(0.1)	1.7	115	6.9(0.1)	1.7	42	6.5(0.3)	3.8
기타 ³⁾	393	6.6(0.2)	2.3	96	6.6(0.3)	5.0	297	6.6(0.1)	1.9
월 가구소득									
100만원 이하	202	6.0(0.2)	3.0	74	6.1(0.3)	5.1	128	5.9(0.2)	3.3
101-200만원	151	6.6(0.2)	2.6	60	6.5(0.2)	3.2	91	6.7(0.2)	3.6
201-300만원	114	6.6(0.2)	2.7	58	6.5(0.3)	4.8	56	6.7(0.1)	1.7
301-400만원	160	6.9(0.1)	2.1	71	7.0(0.2)	3.0	89	6.8(0.2)	2.6
401만원 이상	282	7.3(0.1)	1.7	126	7.3(0.2)	2.1	156	7.2(0.1)	1.9

: 1) 행복감지수 : 현재 수준에서의 삶에 대한 전반적인 만족도(1~10점)

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 138> 보건기관 이용률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	917	31.7(2.2)	6.8	393	22.6(2.2)	9.9	524	41.2(3.3)	7.9
연령									
19-29	78	22.8(5.2)	22.9	33	14.6(6.6)	44.9	45	33.0(7.0)	21.2
30-39	127	34.0(4.4)	13.1	52	20.8(4.9)	23.7	75	48.1(6.0)	12.5
40-49	208	21.2(2.9)	13.4	91	11.8(2.5)	20.9	117	32.0(4.6)	14.4
50-59	189	18.5(3.4)	18.3	93	10.5(3.6)	34.2	96	27.5(5.8)	21.2
60-69	128	51.5(4.3)	8.4	51	53.4(5.9)	11.0	77	50.0(6.7)	13.3
70 이상	187	70.6(3.7)	5.3	73	72.8(5.5)	7.5	114	68.9(4.1)	6.0
생애주기별									
19-64	681	25.2(2.4)	9.7	300	15.8(2.3)	14.7	381	35.6(3.7)	10.5
65 이상	236	69.6(3.6)	5.2	93	71.3(4.6)	6.5	143	68.4(4.3)	6.3
교육수준 ²⁾									
무학	114	61.0(5.2)	8.5	24	59.2(10.7)	18.0	90	61.4(5.5)	8.9
초등학교	134	55.3(4.7)	8.5	47	52.5(7.7)	14.7	87	57.2(5.6)	9.8
중학교	81	33.3(6.2)	18.6	34	38.8(9.3)	23.9	47	29.3(7.0)	23.8
고등학교	364	24.5(2.5)	10.2	185	17.3(3.0)	17.1	179	34.3(4.2)	12.3
대학교 이상	224	28.9(3.9)	13.4	103	18.6(3.8)	20.7	121	40.6(5.8)	14.2
직업									
전문행정관리	103	22.7(4.8)	21.2	46	12.8(6.2)	48.5	57	33.2(8.0)	24.1
사무직	78	10.9(3.8)	35.2	52	8.2(3.3)	39.6	26	18.5(7.7)	41.7
판매·서비스직	112	38.9(5.3)	13.6	33	34.2(9.4)	27.3	79	41.5(5.6)	13.4
농림어업	70	39.2(6.2)	15.8	48	37.8(7.6)	20.0	22	42.5(10.9)	25.7
기능단순노무직	157	18.2(3.2)	17.6	115	13.1(3.9)	29.7	42	38.9(8.9)	22.8
기타 ³⁾	396	45.4(3.2)	7.1	98	43.7(6.6)	15.1	298	46.2(3.9)	8.4
월 가구소득									
100만원 이하	204	49.4(4.0)	8.2	75	42.2(6.7)	16.0	129	54.7(4.4)	8.1
101-200만원	151	40.9(5.2)	12.7	60	37.4(7.4)	19.7	91	43.9(5.8)	13.2
201-300만원	114	34.6(5.1)	14.6	58	25.9(5.7)	22.1	56	46.5(8.3)	17.8
301-400만원	159	21.9(3.6)	16.3	71	11.8(3.0)	25.2	88	33.1(6.4)	19.3
401만원 이상	282	24.9(3.2)	12.9	126	15.1(3.8)	25.2	156	35.9(5.1)	14.1

: 1) 보건기관 이용률:(최근 1년(365일) 동안 보건기관(‘보건소(보건의료원)’, ‘보건지소’, ‘보건진료소’)을 이용한 사람의 수/조사대상 응답자 수)×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 139> 최근 1년(365일) 동안 주로 이용한 보건기관¹⁾

(: %)

	N	이용한 적 없다		보건소(보건의료원)		보건지소		보건진료소	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
	917	68.3(2.2)	3.2	22.0(2.6)	11.8	8.6(1.2)	14.4	1.1(0.7)	62.9
성									
남자	393	77.4(2.2)	2.9	16.0(2.1)	12.9	5.9(1.3)	21.3	0.6(0.5)	74.1
여자	524	58.8(3.3)	5.5	28.3(4.0)	14.1	11.4(1.5)	13.4	1.5(0.9)	58.5
연령									
19-29	78	77.2(5.2)	6.8	14.8(4.4)	29.6	5.6(2.2)	40.0	2.4(2.4)	98.5
30-39	127	66.0(4.4)	6.7	23.2(5.4)	23.3	10.3(1.9)	18.4	0.6(0.6)	100.2
40-49	208	78.8(2.9)	3.6	14.0(3.4)	24.6	6.9(1.0)	14.5	0.3(0.3)	100.8
50-59	189	81.5(3.4)	4.2	15.3(3.1)	20.4	3.1(1.8)	56.5	0.0(0.0)	.
60-69	128	48.5(4.3)	9.0	36.2(3.8)	10.4	12.9(3.5)	27.2	2.3(0.7)	31.3
70 이상	187	29.4(3.7)	12.7	48.5(4.2)	8.8	19.5(3.4)	17.5	2.6(1.3)	48.9
생애주기별									
19-64	681	74.8(2.4)	3.3	17.3(2.8)	16.1	7.0(1.3)	18.3	0.8(0.7)	81.4
65 이상	236	30.4(3.6)	11.8	49.5(4.0)	8.1	17.7(3.0)	16.9	2.4(1.2)	47.6
교육수준 ³⁾									
무학	114	39.0(5.2)	13.3	44.6(5.3)	11.8	12.9(3.4)	26.1	3.5(1.2)	34.4
초등학교	134	44.7(4.7)	10.5	36.2(3.9)	10.8	16.4(3.8)	23.2	2.7(1.5)	57.0
중학교	81	66.7(6.2)	9.3	25.2(5.8)	23.1	8.2(3.5)	42.3	0.0(0.0)	.
고등학교	364	75.5(2.5)	3.3	17.8(2.8)	15.8	5.7(1.0)	17.9	1.0(1.0)	99.0
대학교 이상	224	71.1(3.9)	5.4	18.6(4.2)	22.7	9.9(2.1)	21.6	0.4(0.4)	99.7
직업									
전문행정관리	103	77.3(4.8)	6.2	18.2(4.6)	25.3	4.5(1.4)	31.1	0.0(0.0)	.
사무직	78	89.1(3.8)	4.3	7.5(3.7)	49.2	3.4(1.9)	56.2	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	112	61.1(5.3)	8.7	31.3(6.3)	20.2	7.1(3.2)	45.3	0.5(0.5)	98.8
농림어업	70	60.8(6.2)	10.2	16.3(5.3)	32.5	21.4(5.6)	26.3	1.5(1.5)	101.1
기능단순노무직	157	81.8(3.2)	3.9	13.4(2.9)	21.5	4.1(1.3)	31.5	0.7(0.1)	9.8
기타 ⁴⁾	396	54.6(3.2)	5.9	30.4(3.5)	11.7	12.8(1.7)	13.5	2.1(1.6)	74.2
월 가구소득									
100만원 이하	204	50.6(4.0)	8.0	37.8(4.1)	10.7	9.9(2.5)	25.4	1.7(1.1)	63.7
101-200만원	151	59.1(5.2)	8.8	26.7(4.5)	16.8	12.2(3.8)	31.2	2.0(1.1)	55.8
201-300만원	114	65.4(5.1)	7.8	23.4(6.2)	26.5	11.2(2.4)	21.7	0.0(0.0)	.
301-400만원	159	78.1(3.6)	4.6	16.5(3.4)	20.4	5.4(2.2)	41.2	0.0(0.0)	.
401만원 이상	282	75.1(3.2)	4.3	15.9(3.6)	22.8	7.5(1.7)	22.3	1.4(1.4)	99.3

: 1) 최근 1년(365일) 동안 주로 이용한 보건기관 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 140> 보건기관 이용 서비스 종류¹⁾

(: %)

	예방접종		건강교실 (, 절주, 운동, 영양)		건강검진		방문보건 서비스		영양보충 서비스		정신보건 서비스		모자보건 서비스		구강보건 서비스		진료서비스		민원서비스 (서류증명서 발급)		기타	
	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
성	73.3 (3.2)	4.3	12.4 (2.4)	19.1	18.9 (2.7)	14.1	4.3 (1.2)	27.1	1.8 (0.9)	50.9	0.0 (0.0)	-	2.6 (1.0)	39	0.3 (0.2)	70.4	17.7 (2.8)	15.7	9.8 (3.1)	31.2	3.9 (1.4)	34.9
남자	69.4 (5.0)	7.3	15.1 (3.5)	23.2	19.0 (5.2)	27.3	4.1 (1.8)	44.4	1.4 (1.0)	71.0	0.0 (0.0)	-	0.9 (0.9)	-	0.0 (0.0)	-	16.0 (3.5)	21.7	7.2 (3.3)	46.5	7.6 (3.2)	41.9
여자	75.5 (2.8)	3.7	10.8 (2.6)	24.4	18.8 (3.0)	15.8	4.4 (1.3)	29.4	2.0 (1.2)	62.8	0.0 (0.0)	-	3.5 (1.5)	42	0.5 (0.4)	70.7	18.7 (3.4)	18.2	11.4 (3.9)	33.9	1.7 (0.9)	50.8
연령																						
19-29	49.0 (9.4)	19.1	11.6 (7.6)	65.3	30.1 (9.4)	31.3	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	3.8 (3.7)	98	0.0 (0.0)	-	17.1 (7.2)	41.9	34.3 (11.5)	33.5	0.0 (0.0)	-
30-39	57.1 (6.4)	11.1	15.9 (4.8)	30.0	24.2 (6.5)	26.8	0.0 (0.0)	-	4.9 (3.3)	66.7	0.0 (0.0)	-	8.2 (3.9)	47	0.0 (0.0)	-	7.1 (4.4)	61.8	4.4 (3.9)	87.9	6.8 (4.7)	68.6
40-49	67.0 (8.0)	11.9	6.6 (2.6)	40.2	22.2 (7.7)	34.9	3.3 (2.4)	71.8	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	26.4 (7.0)	26.5	13.1 (9.5)	72.1	4.5 (4.4)	97.4
50-59	56.0 (11.7)	21.0	18.0 (9.0)	49.7	8.2(4.4)	53.4	5.4 (3.6)	68.2	2.5 (2.5)	99.6	0.0 (0.0)	-	2.9 (2.8)	97	0.0 (0.0)	-	26.4 (8.4)	31.9	19.0 (8.1)	42.8	8.0 (4.5)	55.5
60-69	94.0 (2.2)	2.4	10.4 (4.0)	39.0	12.6 (5.3)	42.3	5.5 (2.7)	48.3	1.4 (1.4)	100.7	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	2.6 (1.7)	66.9	19.0 (4.6)	24.0	4.3 (3.1)	71.5	1.4 (1.4)	101.3
70 이상	99.3 (0.7)	0.7	11.9 (3.4)	28.3	15.1 (3.8)	25.0	9.4 (2.4)	25.0	0.9 (0.9)	100.2	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	17.1 (4.0)	23.5	0.0 (0.0)	-	2.2 (1.6)	72.7
생애주기별																						
19-64	60.9 (4.3)	7.0	12.7 (3.3)	26.0	20.9 (3.1)	14.8	2.3 (1.1)	48.5	2.0 (1.2)	58.2	0.0 (0.0)	-	3.8 (1.5)	39	0.3 (0.3)	97.8	19.1 (3.6)	18.9	13.7 (4.6)	33.7	4.9 (1.9)	39.3
65 이상	99.4 (0.6)	0.6	11.7 (3.0)	25.9	14.7 (3.9)	26.7	8.6 (2.3)	26.4	1.3 (1.3)	100.0	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	0.4 (0.4)	101.0	15.0 (3.2)	21.3	1.7 (1.3)	74.0	1.7 (1.3)	72.8
교육수준 ²⁾																						
무학	92.5 (3.4)	3.7	6.6 (1.7)	25.5	15.6 (5.3)	34.2	11.6 (4.3)	37.5	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	1.4 (1.4)	99.4	24.7 (4.9)	20.0	5.9 (4.0)	68.4	2.8 (2.0)	71.2
초등학교	96.9 (2.3)	2.4	5.3 (2.8)	52.2	9.5(4.6)	48.6	6.1 (2.3)	37.8	1.2 (1.2)	100.0	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	0.9 (0.9)	101.5	10.7 (4.0)	37.8	3.2 (2.3)	72.7	2.4 (2.4)	101.6
중학교	83.4 (7.3)	8.8	32.2 (12.4)	38.5	20.7 (7.8)	37.6	3.1 (3.0)	95.5	3.1 (3.0)	95.5	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	16.5 (6.7)	40.6	11.3 (6.2)	55.2	0.0 (0.0)	-
고등학교	63.9 (5.9)	9.3	12.7 (4.3)	34.2	15.3 (4.2)	27.2	3.6 (1.9)	51.8	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	1.9 (1.3)	70	0.0 (0.0)	-	21.4 (5.1)	23.6	16.4 (5.9)	36.2	6.3 (3.2)	51.3
대학교 이상	60.8 (6.8)	11.1	13.5 (5.8)	42.7	29.8 (5.6)	18.7	1.0 (1.0)	101.7	4.9 (2.7)	55.5	0.0 (0.0)	-	6.7 (3.4)	50	0.0 (0.0)	-	13.7 (4.8)	35.4	6.3 (4.1)	65.3	3.1 (1.6)	51.6
직업																						
전문행정관리	57.0 (10.0)	17.5	3.7 (3.7)	100.3	33.6 (9.0)	26.9	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	8.1 (5.8)	71	0.0 (0.0)	-	19.4 (8.5)	43.6	1.7 (1.9)	106.2	9.6 (6.8)	71.5
사무직	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	42.8 (8.8)	20.6	9.1 (4.8)	52.7	28.2 (9.1)	32.3	2.2 (2.2)	101.5	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	26.2 (7.8)	29.8	29.0 (12.3)	42.3	4.5 (3.0)	67.0
농림어업	100.0 (0.0)	0.0	11.1 (5.0)	44.9	14.7 (7.9)	53.6	15.0 (6.6)	43.8	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	5.2 (5.2)	-	5.3 (3.8)	71.0	30.4 (11.2)	36.6	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-
기능단순노무직	71.4 (8.3)	11.7	17.1 (9.5)	55.9	6.5(4.9)	75.1	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	18.1 (7.7)	42.4	2.0 (2.0)	99.7	7.3 (6.9)	95.0
기타 ³⁾	82.7 (4.1)	5.0	12.9 (3.2)	25.1	14.1 (2.6)	18.7	5.6 (1.6)	28.8	3.3 (1.7)	51.6	0.0 (0.0)	-	2.6 (1.7)	65	0.0 (0.0)	-	13.6 (2.8)	20.7	9.2 (3.4)	36.6	1.4 (0.8)	61.5
월 가구소득																						
100만원 이하	98.1 (1.4)	1.4	13.3 (5.1)	38.2	16.4 (4.9)	30.0	11.2 (3.5)	31.5	3.1 (2.1)	69.7	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	1.5(1.1)	71.6	16.6 (4.7)	28.1	0.9 (0.9)	99.9	1.6 (1.2)	74.0
101-200만원	73.1 (6.6)	9.1	12.7 (5.5)	43.6	14.2 (3.9)	27.8	5.9 (3.3)	55.5	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	1.7 (1.6)	97	0.0 (0.0)	-	20.3 (5.8)	28.4	10.5 (4.7)	45.3	6.1 (4.4)	72.7
201-300만원	70.2 (11.9)	17.0	3.6 (2.8)	78.0	16.5 (5.6)	33.9	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	5.1 (3.3)	65	0.0 (0.0)	-	6.2 (3.2)	51.8	14.2 (6.5)	45.9	6.8 (4.4)	64.6
301-400만원	66.4 (8.1)	12.1	9.4 (4.6)	48.9	24.0 (5.3)	22.0	3.4 (2.6)	75.6	7.9 (5.4)	67.6	0.0 (0.0)	-	5.3 (3.6)	69	0.0 (0.0)	-	26.3 (8.1)	31.0	18.6 (8.7)	47.1	0.0 (0.0)	-
401만원 이상	57.8 (5.4)	9.3	16.8 (6.0)	35.7	23.6 (6.4)	27.0	0.6 (0.6)	96.7	0.0 (0.0)	-	0.0 (0.0)	-	2.7 (1.9)	73	0.0 (0.0)	-	19.6 (4.2)	21.2	10.4 (7.4)	70.9	3.6 (1.8)	50.1

: 1) 보건기관 이용 서비스 종류 : (보건기관 이용 서비스 종류별 응답자 수 / 최근 1년(365일) 동안 보건기관(보건소(보건의료원), '보건지소', '보건진료소')을 이용한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 141> 보건기관 서비스 만족도¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	340	74.0(3.3)	4.5	118	75.9(4.4)	5.7	222	72.9(4.1)	5.6
연령									
19-29	21	76.8(9.0)	11.7	5	-(-)	-	16	-(-)	-
30-39	44	68.7(7.2)	10.5	10	-(-)	-	34	68.7(10.0)	14.5
40-49	47	76.9(8.0)	10.4	12	-(-)	-	35	74.4(7.3)	9.8
50-59	33	74.9(9.9)	13.1	11	-(-)	-	22	73.5(11.0)	15.0
60-69	64	72.2(6.0)	8.3	27	55.2(9.9)	17.9	37	86.6(5.4)	6.3
70 이상	131	76.0(3.2)	4.2	53	79.0(5.3)	6.7	78	73.7(4.3)	5.8
생애주기별									
19-64	177	72.2(4.3)	6.0	52	73.3(6.0)	8.2	125	71.6(5.4)	7.5
65 이상	163	77.9(2.9)	3.7	66	80.1(4.3)	5.3	97	76.2(3.8)	4.9
교육수준 ²⁾									
무학	70	79.0(5.8)	7.4	15	-(-)	-	55	76.9(6.7)	8.7
초등학교	78	73.3(5.5)	7.5	28	64.8(8.6)	13.2	50	78.8(7.1)	9.0
중학교	27	81.7(7.2)	8.8	15	-(-)	-	12	-(-)	-
고등학교	94	68.0(5.1)	7.5	39	64.8(8.7)	13.5	55	70.2(5.9)	8.4
대학교 이상	71	77.9(7.3)	9.3	21	95.7(3.1)	3.2	50	68.5(9.9)	14.4
직업									
전문행정관리	25	68.7(8.2)	12.0	5	-(-)	-	20	65.7(8.2)	12.5
사무직	10	-(-)	-	5	-(-)	-	5	-(-)	-
판매·서비스직	44	75.0(9.6)	12.9	12	-(-)	-	32	74.9(11.9)	15.9
농림어업	31	67.0(5.5)	8.2	20	64.4(11.0)	17.1	11	-(-)	-
기능단순노무직	33	67.6(10.1)	14.9	17	-(-)	-	16	-(-)	-
기타 ³⁾	197	74.9(3.7)	4.9	59	82.5(4.3)	5.2	138	71.6(4.7)	6.5
월 가구소득									
100만원 이하	112	80.2(3.5)	4.3	38	81.4(6.1)	7.5	74	79.5(4.5)	5.6
101-200만원	67	75.5(6.3)	8.3	28	66.6(9.6)	14.3	39	82.2(7.5)	9.1
201-300만원	42	72.0(7.9)	11.0	19	-(-)	-	23	73.0(8.7)	12.0
301-400만원	41	81.2(8.3)	10.2	12	-(-)	-	29	76.2(9.1)	11.9
401만원 이상	74	65.7(7.1)	10.8	19	-(-)	-	55	60.3(7.9)	13.1

: 1) 보건기관 서비스 만족도 : (“대단히 만족 한다” 또는 “만족한 편이다”에 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 보건기관(‘보건소(보건의료원)’, ‘보건지소’, ‘보건진료소’)을 이용한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 142> 보건기관을 이용하게 되는 주된 이유¹⁾

(: %)

	N	거리가 가까워서		비용이 저렴해서		신뢰할 수 있어서		시설이 좋아서		직원이 친절해서		다른곳에서 제공하지 않는 서비스를 제공		기타	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
성	342	10.2(1.8)	17.9	68.8(5.0)	7.2	3.1(1.3)	40.1	0.0(0.0)	.	0.8(0.4)	53.0	7.6(2.4)	31.9	9.5(2.8)	29.4
남자	118	14.3(3.1)	21.7	65.8(4.4)	6.7	3.3(1.9)	58.7	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	100.2	8.2(3.4)	42.1	7.5(3.4)	44.8
여자	224	7.9(2.1)	26.4	70.5(5.9)	8.4	3.1(1.6)	53.2	0.0(0.0)	.	0.7(0.3)	50.6	7.3(2.3)	32.2	10.6(3.0)	28.2
연령															
19-29	21	23.0(10.6)	46.0	48.6(12.9)	26.5	10.4(6.9)	66.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	7.3(5.2)	71.3	10.7(5.4)	50.3
30-39	44	3.6(2.5)	69.3	76.4(8.5)	11.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	6.5(4.8)	74.0	13.5(7.2)	53.3
40-49	49	4.3(2.4)	56.5	67.8(11.6)	17.1	6.4(5.1)	79.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	7.5(6.2)	81.8	14.0(5.8)	41.7
50-59	33	7.9(4.4)	56.0	62.4(12.0)	19.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.0(3.0)	100.4	11.3(5.1)	45.4	15.5(8.9)	57.5
60-69	64	13.2(4.7)	35.4	69.4(5.4)	7.8	3.1(2.1)	67.4	0.0(0.0)	.	1.1(1.1)	98.1	11.3(3.1)	27.3	1.9(0.2)	11.8
70 이상	131	13.5(3.1)	22.9	74.6(3.8)	5.1	1.9(1.1)	55.8	0.0(0.0)	.	1.1(0.7)	68.8	5.2(2.2)	42.2	3.8(1.3)	34.8
생애주기별															
19-64	179	8.7(3.0)	35.0	67.4(7.2)	10.6	3.9(1.8)	47.2	0.0(0.0)	.	0.5(0.5)	100.4	7.3(3.4)	46.9	12.2(4.1)	34.0
65 이상	163	13.6(2.9)	21.0	71.6(3.7)	5.1	1.5(0.9)	56.8	0.0(0.0)	.	1.3(0.6)	49.9	8.2(2.4)	28.7	3.8(1.1)	28.5
교육수준 ²⁾															
무학	70	7.4(3.4)	45.7	74.8(6.1)	8.1	1.3(1.3)	96.9	0.0(0.0)	.	2.1(1.4)	69.2	8.5(5.0)	59.5	6.0(2.2)	37.0
초등학교	78	12.1(3.1)	25.8	70.4(4.3)	6.2	2.4(1.7)	70.5	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	101.5	11.6(3.4)	29.1	2.7(1.1)	41.0
중학교	27	15.9(5.7)	35.7	63.6(10.9)	17.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	9.6(5.3)	55.8	10.9(8.1)	73.9
고등학교	96	11.9(4.3)	35.6	64.9(7.7)	11.9	4.6(2.8)	59.9	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	99.9	7.4(5.0)	68.0	10.2(4.0)	38.9
대학교 이상	71	6.9(3.3)	47.2	71.5(9.2)	12.9	3.3(2.6)	78.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	4.8(3.1)	65.3	13.5(6.0)	44.6
직업															
전문행정관리	25	0.0(0.0)	.	81.8(10.2)	12.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	11.3(8.4)	74.0	6.9(6.5)	93.8
사무직	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	44	10.7(6.9)	64.2	50.6(11.9)	23.5	5.3(5.2)	97.0	0.0(0.0)	.	2.3(2.3)	97.9	11.7(4.3)	36.2	19.3(7.4)	38.3
농림어업	31	20.7(8.3)	39.9	53.7(7.3)	13.5	5.5(4.2)	76.5	0.0(0.0)	.	4.5(2.3)	50.3	11.1(5.2)	46.2	4.5(4.1)	91.5
기능단순노무직	33	12.5(6.8)	54.0	77.3(7.3)	9.4	1.8(1.8)	99.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	8.4(5.8)	69.7	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	199	10.3(2.7)	26.1	72.2(4.9)	6.7	3.4(1.6)	48.7	0.0(0.0)	.	0.3(0.2)	99.2	4.2(1.6)	38.6	9.6(3.1)	32.2
월 가구소득															
100만원 이하	112	8.0(2.4)	30.3	77.3(3.9)	5.1	0.9(0.8)	98.5	0.0(0.0)	.	1.3(0.7)	57.8	8.9(3.1)	35.2	3.7(1.6)	43.9
101-200만원	67	20.6(4.1)	20.1	68.1(5.7)	8.3	2.0(1.4)	71.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	5.6(3.5)	61.7	3.8(3.2)	83.6
201-300만원	42	6.7(3.2)	47.1	71.2(8.0)	11.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.3(2.3)	100.9	8.7(3.8)	43.6	11.2(6.2)	55.3
301-400만원	42	5.8(3.3)	56.8	71.2(9.5)	13.4	6.1(4.7)	76.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	8.0(5.5)	68.8	8.8(5.3)	59.6
401만원 이상	75	9.4(6.2)	66.0	60.8(10.7)	17.6	6.1(3.5)	56.6	0.0(0.0)	.	0.5(0.5)	102.3	7.4(6.1)	82.2	15.8(7.8)	49.2

: 1) 보건기관을 이용하게 되는 주된 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 1년(365일) 동안 보건기관(‘보건소(보건의료원)’, ‘보건지소’, ‘보건진료소’)을 이용한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 143> 보건기관을 이용하지 않는 이유¹⁾

(: %)

	N	위치를 잘 몰라서		거리가 멀고 교통이 불편해서		원하는 서비스가 제공되지 않아서		제공되는 서비스의 질이 높지 않다고 생각하기 때문에		저소득층, 특수계층이 이용한다고 생각하기 때문에		제공되는 서비스가 어떤 것들이 있는지 몰라서		주로 이용하는 병원이 있어서		건강해서		기타	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
성	575	1.3(0.6)	48.8	16.7(1.6)	9.4	3.0(0.7)	23.8	2.7(0.8)	29.7	0.2(0.2)	96.6	3.2(1.0)	31.2	21.3(2.6)	12.4	49.4(4.6)	9.3	2.3(1.2)	53.2
남자	275	2.0(1.0)	50.5	14.7(2.1)	14.6	3.6(1.0)	26.8	4.1(1.3)	32.6	0.0(0.0)	.	1.9(0.9)	48.8	18.5(3.8)	20.6	53.4(5.8)	10.9	1.8(1.5)	83.7
여자	300	0.2(0.2)	100.4	19.6(1.6)	8.4	2.1(0.7)	35.0	0.6(0.4)	54.6	0.4(0.4)	94.2	5.0(1.4)	28.1	25.1(2.4)	9.5	44.0(3.6)	8.1	2.9(1.1)	37.6
연령																			
19-29	57	2.8(2.7)	95.8	10.0(3.3)	33.2	2.2(2.2)	99.6	2.6(2.6)	99.6	0.0(0.0)	.	4.5(2.7)	60.7	13.1(4.2)	32.0	64.9(6.5)	10.0	0.0(0.0)	.
30-39	83	2.8(1.7)	58.7	19.5(5.7)	29.4	1.1(1.1)	99.1	1.4(1.4)	100.7	0.0(0.0)	.	5.2(2.3)	44.3	11.2(3.0)	26.6	54.6(6.1)	11.1	4.2(3.2)	77.3
40-49	159	0.0(0.0)	.	12.5(2.8)	22.3	3.5(1.5)	42.9	3.0(1.5)	50.1	0.6(0.6)	95.0	3.6(1.8)	51.2	18.9(3.6)	19.3	53.7(8.0)	14.9	4.1(1.9)	45.3
50-59	156	0.5(0.5)	100.2	15.4(3.0)	19.7	3.9(1.8)	44.9	4.0(2.1)	51.8	0.0(0.0)	.	1.6(1.0)	62.1	28.9(4.9)	17.0	44.6(5.8)	13.1	1.2(0.7)	60.3
60-69	64	1.4(1.3)	97.8	27.1(6.9)	25.3	5.3(3.0)	55.5	2.6(1.6)	60.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	46.2(7.1)	15.3	17.4(4.6)	26.4	0.0(0.0)	.
70 이상	56	0.0(0.0)	.	49.3(6.5)	13.1	3.0(2.2)	72.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	40.1(6.4)	15.9	7.6(4.0)	53.1	0.0(0.0)	.
생애주기별																			
19-64	502	1.3(0.7)	48.6	14.7(1.6)	11.0	3.0(0.8)	25.5	2.8(0.8)	30.3	0.2(0.2)	96.6	3.4(1.1)	31.3	19.7(2.7)	13.6	52.4(4.9)	9.3	2.4(1.3)	53.2
65 이상	73	0.0(0.0)	.	46.0(6.3)	13.7	2.3(1.7)	73.4	1.0(1.0)	99.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	43.7(6.4)	14.8	7.0(3.7)	52.6	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾																			
무학	44	0.0(0.0)	.	39.7(9.3)	23.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	56.9(9.2)	16.2	3.4(3.4)	98.3	0.0(0.0)	.
초등학교	56	1.3(1.3)	100.8	40.7(6.1)	15.0	3.9(2.0)	52.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	30.8(6.3)	20.6	23.3(5.9)	25.1	0.0(0.0)	.
중학교	54	0.0(0.0)	.	20.5(5.8)	28.2	4.0(2.9)	71.4	1.2(1.2)	102.2	0.0(0.0)	.	5.4(2.8)	52.7	32.9(6.9)	21.1	36.0(7.8)	21.7	0.0(0.0)	.
고등학교	268	1.8(1.2)	64.6	17.0(2.3)	13.5	4.1(1.3)	32.5	3.1(1.3)	42.9	0.0(0.0)	.	2.3(1.0)	44.6	18.4(3.1)	17.0	51.9(4.9)	9.4	1.4(0.8)	53.6
대학교 이상	153	0.8(0.1)	10.4	8.3(2.3)	27.8	1.2(0.8)	66.3	3.1(1.3)	42.9	0.6(0.5)	93.5	5.2(2.0)	37.9	17.4(4.1)	23.7	58.7(7.3)	12.5	4.8(2.6)	54.7
직업																			
전문·행정관리	78	0.7(0.7)	98.6	8.8(4.1)	47.1	1.7(1.6)	97.2	4.4(2.4)	53.9	0.0(0.0)	.	3.7(2.8)	75.8	18.3(5.2)	28.1	57.7(8.0)	13.8	4.8(3.7)	77.0
사무직	68	3.6(1.9)	53.6	12.5(7.8)	61.9	0.0(0.0)	.	0.5(0.5)	100.2	0.0(0.0)	.	4.7(2.8)	59.1	22.7(7.4)	32.8	54.7(9.8)	17.9	1.3(1.3)	97.8
판매·서비스직	68	0.0(0.0)	.	18.1(4.5)	24.8	0.6(0.6)	102.1	3.5(2.3)	65.2	0.0(0.0)	.	5.9(3.0)	50.4	17.3(5.1)	29.8	50.2(7.3)	14.5	4.5(2.9)	65.4
농림어업	39	0.0(0.0)	.	25.4(5.7)	22.4	8.8(4.5)	51.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	40.6(9.4)	23.3	25.2(8.2)	32.6	0.0(0.0)	.
기능·단순노무직	124	0.0(0.0)	.	19.5(3.8)	19.6	5.0(2.2)	44.6	3.8(2.0)	53.5	0.0(0.0)	.	2.0(1.1)	56.0	17.3(3.3)	19.2	51.2(6.2)	12.2	1.2(1.2)	99.6
기타 ³⁾	197	2.0(1.7)	86.6	19.3(2.6)	13.3	3.6(1.5)	41.0	2.1(1.5)	75.0	0.6(0.6)	99.2	2.7(1.5)	54.4	23.8(3.2)	13.3	44.0(4.6)	10.5	1.9(0.9)	46.2
월 가구소득																			
100만원 이하	92	0.7(0.7)	97.9	31.4(6.0)	19.2	5.1(3.8)	73.6	0.6(0.6)	100.9	0.0(0.0)	.	4.9(3.4)	69.7	34.2(4.4)	12.8	21.8(5.6)	25.9	1.3(1.3)	100.8
101-200만원	84	0.0(0.0)	.	16.0(5.9)	36.5	3.1(1.9)	62.0	3.1(2.7)	86.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	25.9(4.8)	18.5	51.8(5.8)	11.1	0.0(0.0)	.
201-300만원	72	0.0(0.0)	.	25.6(8.3)	32.7	2.0(1.3)	64.4	1.1(1.0)	92.9	1.4(1.1)	82.6	5.8(2.6)	45.6	23.0(7.9)	34.1	39.6(6.0)	15.0	1.5(1.3)	82.6
301-400만원	117	3.4(2.2)	65.6	16.4(3.8)	23.2	4.9(2.1)	42.4	5.8(2.6)	45.0	0.0(0.0)	.	3.2(1.7)	53.7	19.8(4.4)	22.3	43.6(6.0)	13.9	2.8(2.0)	70.5
401만원 이상	207	1.1(0.8)	73.7	10.3(3.7)	35.6	1.7(1.0)	59.3	1.9(0.9)	45.1	0.0(0.0)	.	3.0(1.7)	56.6	15.3(3.1)	20.2	63.5(7.2)	11.4	3.3(1.7)	52.5

: 1) 보건기관을 이용하게 되는 주된 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 1년(365일) 동안 보건기관을 이용하지 않은 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 144> 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매) 홍보 및 교육 경험률

(: %)

	보건기관 고혈압 홍보 및 교육 경험률 ¹⁾		보건기관 당뇨병 홍보 및 교육 경험률 ²⁾		보건기관 관절염 홍보 및 교육 경험률 ³⁾		보건기관 아토피·천식 홍보 및 교육 경험률 ⁴⁾		보건기관 치매 홍보 및 교육 경험률 ⁵⁾	
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
	21.9(3.2)	14.4	21.2(3.2)	15.1	17.6(3.1)	17.3	14.6(3.1)	20.9	15.1(3.2)	21.1
성										
남자	20.2(2.7)	13.1	19.4(2.7)	14.0	16.2(2.6)	16.2	13.7(2.6)	19.1	13.7(2.8)	20.3
여자	23.6(4.4)	18.5	23.1(4.3)	18.7	19.2(4.0)	20.8	15.5(3.9)	25.4	16.6(4.0)	23.9
연령										
19-29	14.7(4.3)	29.0	14.7(4.3)	29.0	12.5(3.5)	27.7	11.6(3.5)	30.0	12.4(3.9)	31.5
30-39	18.0(6.2)	34.7	17.9(6.2)	34.8	16.4(6.7)	40.9	13.7(6.5)	47.6	14.3(6.7)	46.8
40-49	27.1(5.7)	21.0	26.9(5.8)	21.6	22.6(4.5)	20.1	18.7(4.4)	23.6	20.2(4.9)	24.1
50-59	26.6(4.1)	15.4	24.3(4.0)	16.3	20.4(3.6)	17.5	15.6(3.3)	21.1	15.6(3.3)	21.1
60-69	22.2(5.0)	22.5	21.1(4.8)	22.8	15.1(4.5)	30.1	11.9(4.4)	37.1	11.9(4.4)	37.1
70 이상	19.7(3.8)	19.5	18.6(3.6)	19.3	13.6(3.1)	23.0	11.8(2.8)	23.6	11.1(2.8)	25.0
생애주기별										
19-64	22.2(3.4)	15.5	21.6(3.5)	16.3	18.3(3.3)	18.3	15.1(3.3)	22.2	15.8(3.5)	22.2
65 이상	20.1(3.4)	16.9	18.8(3.2)	17.1	13.8(3.0)	21.5	11.5(2.7)	23.9	11.0(2.8)	25.1
교육수준 ³⁾										
무학	14.6(3.8)	25.9	13.8(3.7)	26.9	9.9(2.8)	28.7	5.9(2.0)	33.3	5.8(1.8)	31.7
초등학교	18.0(3.6)	19.8	17.7(3.5)	19.9	10.8(2.6)	23.9	10.2(2.6)	25.7	9.5(2.5)	26.1
중학교	24.0(5.4)	22.3	24.0(5.4)	22.3	20.2(5.2)	25.7	16.9(5.1)	30.3	16.9(5.1)	30.3
고등학교	21.6(3.2)	14.8	20.3(3.5)	17.4	16.2(3.0)	18.2	14.0(3.0)	21.4	15.0(3.1)	20.9
대학교 이상	24.7(5.8)	23.6	24.5(5.4)	21.9	23.0(5.8)	25.1	18.2(5.7)	31.5	18.6(5.8)	31.1
직업										
전문행정관리	28.9(4.8)	16.7	28.6(5.4)	18.7	25.3(5.3)	20.8	21.4(5.6)	26.3	23.4(6.1)	26.2
사무직	20.2(4.5)	22.0	20.2(4.5)	22.0	20.2(4.5)	22.0	17.3(4.2)	24.3	17.3(4.2)	24.3
판매·서비스직	28.8(7.8)	27.0	28.8(7.8)	27.0	19.6(5.7)	29.1	19.4(5.6)	28.9	19.7(5.8)	29.6
농림어업	23.4(5.5)	23.4	21.9(5.4)	24.7	13.9(5.0)	35.9	11.6(3.7)	32.1	9.0(3.5)	39.1
기능단순노무직	20.4(4.9)	24.2	19.5(4.8)	24.7	16.2(4.6)	28.7	11.1(4.2)	37.7	11.1(4.2)	37.7
기타 ⁴⁾	18.3(2.8)	15.3	17.2(2.7)	15.6	14.7(2.7)	18.1	12.0(2.7)	22.9	13.0(2.8)	21.5
월 가구소득										
100만원 이하	24.5(4.5)	18.4	23.2(4.4)	18.9	18.5(4.3)	23.4	16.7(4.3)	25.9	16.2(4.3)	26.5
101-200만원	15.9(3.9)	24.4	15.1(3.9)	25.9	14.1(3.3)	23.2	11.9(3.1)	26.4	12.0(3.1)	26.3
201-300만원	19.5(7.2)	37.1	18.9(7.2)	38.1	14.6(7.7)	52.9	12.8(7.3)	56.9	12.3(7.3)	58.8
301-400만원	22.8(5.0)	22.1	21.5(5.4)	25.0	20.5(5.0)	24.6	18.2(4.8)	26.5	20.0(5.5)	27.4
401만원 이상	24.2(5.0)	20.5	24.1(5.0)	20.7	18.8(3.7)	19.9	13.9(3.6)	26.3	14.8(3.6)	24.4

1) 보건기관 고혈압 홍보 및 교육 경험률 : (보건기관에서 고혈압의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 보건기관 당뇨병 홍보 및 교육 경험률 : (보건기관에서 당뇨병의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 보건기관 관절염 홍보 및 교육 경험률 : (보건기관에서 관절염의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

4) 보건기관 아토피·천식 홍보 및 교육 경험률 : (보건기관에서 아토피·천식의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

5) 보건기관 치매 홍보 및 교육 경험률 : (보건기관에서 치매의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

6) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

7) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 145> 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율¹⁾

(: %)

	이웃상호 신뢰감 ²⁾		상호부조 ³⁾		전반적인 안전수준 ⁴⁾		자연환경 만족도 ⁵⁾		생활환경 만족도 ⁶⁾		대중교통 만족도 ⁷⁾		의료서비스 만족도 ⁸⁾	
	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
성	77.9(1.7)	2.2	53.9(3.4)	6.3	84.4(2.2)	2.6	87.3(2.1)	2.5	77.4(2.9)	3.8	60.5(4.1)	6.7	53.4(4.5)	8.4
남자	81.2(2.6)	3.2	54.0(3.0)	5.6	87.7(2.5)	2.9	90.4(1.6)	1.7	82.1(2.8)	3.4	63.3(4.3)	6.8	58.9(4.7)	8.0
여자	74.4(2.5)	3.4	53.7(4.4)	8.1	80.9(2.5)	3.0	83.9(3.2)	3.8	72.3(3.8)	5.3	57.5(4.5)	7.8	47.7(4.8)	10.1
연령														
19-29	67.7(4.3)	6.4	33.1(6.9)	20.8	84.5(4.4)	5.3	86.9(3.7)	4.3	73.5(5.3)	7.2	57.5(7.0)	12.2	55.2(7.1)	12.8
30-39	62.5(3.9)	6.3	31.5(5.5)	17.4	72.8(5.1)	7.1	80.4(5.6)	6.9	74.8(7.1)	9.4	56.3(7.0)	12.4	45.3(7.5)	16.5
40-49	83.4(3.3)	3.9	51.9(4.9)	9.4	82.6(3.9)	4.7	86.0(3.1)	3.6	77.3(4.2)	5.5	63.3(6.0)	9.4	53.6(6.3)	11.7
50-59	85.3(2.9)	3.4	68.2(4.4)	6.4	90.9(1.8)	1.9	91.8(2.5)	2.7	78.9(3.5)	4.4	64.0(5.2)	8.2	57.4(5.3)	9.2
60-69	87.9(3.3)	3.7	81.6(3.3)	4.0	91.5(2.5)	2.7	89.4(3.4)	3.8	81.7(2.9)	3.5	59.2(4.8)	8.1	48.4(5.5)	11.4
70 이상	87.2(2.9)	3.3	81.7(3.3)	4.1	92.3(2.1)	2.3	93.5(1.6)	1.7	81.8(3.4)	4.2	61.2(4.6)	7.6	61.9(4.0)	6.5
생애주기별														
19-64	76.1(1.9)	2.5	48.9(3.7)	7.6	83.0(2.5)	3.0	86.3(2.5)	2.9	76.6(3.3)	4.4	60.8(4.6)	7.5	52.7(5.2)	9.8
65 이상	88.3(2.7)	3.0	82.5(2.7)	3.3	92.1(1.7)	1.9	93.2(1.4)	1.5	81.8(2.8)	3.5	58.4(4.1)	7.0	57.5(4.1)	7.1
교육수준 ²⁾														
무학	86.2(3.8)	4.4	85.1(3.5)	4.1	92.3(2.7)	2.9	95.7(1.6)	1.7	83.3(4.6)	5.6	55.8(5.4)	9.7	45.2(5.7)	12.7
초등학교	89.2(3.5)	3.9	78.4(5.5)	6.9	91.7(2.6)	2.8	88.1(4.0)	4.5	77.2(4.2)	5.5	59.5(4.9)	8.2	57.1(4.4)	7.6
중학교	81.2(5.3)	6.5	66.1(7.6)	11.6	89.5(3.7)	4.1	90.9(3.4)	3.8	78.7(5.3)	6.8	54.7(6.9)	12.5	51.7(6.6)	12.9
고등학교	76.4(2.7)	3.5	52.3(4.1)	7.9	82.3(2.8)	3.4	86.8(2.5)	2.9	74.4(3.8)	5.1	62.5(4.6)	7.3	54.1(5.2)	9.7
대학교 이상	74.1(3.5)	4.8	39.0(4.8)	12.3	82.6(5.1)	6.2	85.0(4.7)	5.5	80.4(4.8)	6.0	60.1(6.6)	11.0	53.7(7.2)	13.5
직업														
전문·행정관리	76.6(4.9)	6.5	47.5(6.3)	13.3	83.0(5.9)	7.1	86.0(4.8)	5.6	74.6(5.2)	7.0	59.1(7.3)	12.3	53.9(7.9)	14.7
사무직	71.6(4.7)	6.6	38.7(5.6)	14.4	89.2(3.6)	4.1	84.1(7.1)	8.4	77.6(5.6)	7.2	66.3(6.8)	10.3	60.7(7.4)	12.1
판매·서비스직	78.6(4.6)	5.9	57.7(5.6)	9.6	81.8(4.2)	5.1	91.6(4.0)	4.4	75.9(5.4)	7.1	66.9(6.8)	10.2	57.5(6.4)	11.1
농림어업	98.1(1.9)	2.0	92.8(3.1)	3.3	93.6(3.8)	4.0	91.5(3.7)	4.1	85.9(3.7)	4.3	56.0(8.1)	14.5	48.9(6.3)	12.8
기능·단순노무직	80.3(2.7)	3.4	50.6(4.4)	8.8	83.6(2.2)	2.6	85.2(2.9)	3.4	80.7(2.9)	3.6	58.9(4.4)	7.5	51.3(5.3)	10.3
기타 ³⁾	75.9(2.8)	3.7	56.1(4.1)	7.3	83.8(2.6)	3.1	87.8(3.1)	3.6	75.8(3.7)	4.9	58.5(4.8)	8.2	51.1(5.2)	10.2
월 가구소득														
100만원 이하	83.6(3.5)	4.2	67.2(5.3)	7.9	89.2(2.9)	3.3	88.7(3.0)	3.3	74.0(3.9)	5.3	61.5(5.0)	8.1	51.7(5.3)	10.3
101-200만원	81.6(4.6)	5.7	79.9(4.4)	5.5	87.2(3.2)	3.7	93.1(2.4)	2.6	78.7(4.8)	6.1	54.0(4.8)	8.9	44.2(4.9)	11.1
201-300만원	73.5(4.3)	5.9	38.6(4.2)	11.0	78.0(3.9)	4.9	76.9(6.7)	8.7	69.2(5.6)	8.2	52.9(6.0)	11.4	50.6(5.2)	10.3
301-400만원	75.0(4.9)	6.5	48.8(4.6)	9.4	76.3(4.4)	5.7	85.4(3.3)	3.9	73.3(4.6)	6.3	57.4(5.5)	9.6	49.3(6.1)	12.3
401만원 이상	77.3(2.8)	3.7	46.7(6.7)	14.3	88.2(3.1)	3.5	89.2(3.4)	3.9	83.1(3.8)	4.5	67.1(6.5)	9.7	61.6(7.3)	11.8

: 1) 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율 : (지역의 사회 물리적 환경에 대해 긍정적으로 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 우리 동네 사람들은 서로 믿고 신뢰할 수 있다

3) 이웃에 경조사가 있을 때, 주민 사이에 서로 도움을 주고받는 전통이 있다

4) 우리 동네의 전반적 안전수준(자연재해, 교통사고, 농작업 사고, 범죄)에 대해 만족한다

5) 우리 동네의 자연환경(공기질, 수질 등)에 대해 만족한다

6) 우리 동네의 생활환경(전기, 상하수도, 쓰레기 수거, 스포츠시설 등)에 대해 만족한다

7) 우리 동네의 대중교통 여건(버스, 택시, 지하철, 기차 등)에 대해 만족한다

8) 우리 동네의 의료서비스 여건(보건소, 병원, 한방병원, 약국 등)에 대해 만족한다

9) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

10) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 146> 사회적 연결망 : 친척(가족포함)¹⁾

(: %)

	N	한 달에 1번 미만		한 달에 1번		한 달에 2~3번		일주일에 1번		일주일에 2~3번		일주일에 4번 이상	
		% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
성	917	24.7(2.3)	9.5	18.3(1.9)	10.4	14.5(1.4)	9.7	23.8(2.5)	10.5	11.7(1.3)	11.0	7.0(1.2)	17.7
남자	392	23.7(2.4)	10.2	20.5(2.8)	13.4	14.9(1.8)	11.8	26.2(3.0)	11.6	10.5(1.6)	14.8	4.1(1.2)	29.1
여자	525	25.8(3.3)	12.9	15.9(1.9)	11.9	14.0(2.0)	14.6	21.3(2.6)	12.1	12.9(1.8)	13.6	10.0(1.7)	17.1
65세 이상 ²⁾	235	19.6(3.3)	17.0	15.0(2.2)	14.5	11.1(2.1)	18.9	34.3(3.6)	10.6	15.9(2.4)	15.0	4.1(1.2)	28.8
연령													
19-29	78	37.3(5.7)	15.4	20.9(4.5)	21.6	6.4(2.8)	44.4	18.2(4.4)	24.4	9.2(3.1)	34.2	8.1(3.6)	44.9
30-39	128	27.4(2.7)	10	14.0(3.5)	24.9	15.0(2.9)	19.4	22.3(4.8)	21.7	11.0(2.8)	25.6	10.3(3.1)	30.5
40-49	208	21.4(5.0)	23.4	25.9(4.8)	18.5	18.2(2.8)	15.7	19.0(1.9)	9.8	6.9(2.3)	33.9	8.6(2.0)	22.8
50-59	189	18.0(3.3)	18.4	15.1(2.8)	18.7	19.4(3.4)	17.8	26.2(4.2)	16.2	17.7(3.0)	17.2	3.7(1.3)	35
60-69	128	24.3(4.0)	16.4	12.7(3.2)	25.5	12.5(3.3)	26.7	29.9(5.1)	17	15.7(3.6)	22.7	4.9(1.9)	39.4
70 이상	186	21.2(3.6)	17	15.3(2.3)	15.4	10.3(2.5)	23.8	36.3(3.7)	10.3	13.7(2.8)	20.2	3.3(1.1)	32.2
생애주기별													
19-64	682	25.6(2.6)	10.1	18.8(2.1)	11	15.1(1.5)	10.2	22.0(2.6)	11.8	11.0(1.4)	12.7	7.5(1.4)	19.3
65 이상	235	19.6(3.2)	16.3	15.0(2.1)	14.2	11.1(2.1)	18.5	34.3(3.6)	10.4	15.9(2.4)	15.2	4.1(1.2)	28.6
교육수준 ³⁾													
무학	114	32.0(5.2)	16.2	10.5(2.8)	26.5	8.4(2.5)	30.3	34.3(4.0)	11.6	11.9(3.6)	30.5	2.9(1.5)	51.4
초등학교	134	22.6(4.3)	19.1	13.4(2.5)	18.5	12.8(2.8)	22	27.9(3.6)	12.8	20.3(3.9)	19.3	3.1(1.4)	44.4
중학교	81	20.5(6.7)	32.6	20.1(4.9)	24.7	29.9(5.5)	18.5	17.3(5.7)	33.1	8.3(2.7)	33	4.0(2.4)	59.9
고등학교	364	24.8(3.3)	13.4	18.2(1.9)	10.2	13.4(2.2)	16.5	24.7(2.5)	9.9	10.4(1.3)	12.2	8.4(1.8)	21.7
대학교 이상	224	24.5(2.5)	10.4	21.1(4.1)	19.5	14.6(2.6)	17.8	20.3(4.5)	21.9	11.9(2.7)	22.9	7.5(2.0)	26.4
직업													
전문행정관리	104	21.2(5.5)	26.2	18.7(5.3)	28.4	14.1(3.7)	26	26.5(4.4)	16.4	12.0(4.0)	33.1	7.6(2.4)	31.8
사무직	78	27.3(6.0)	22	23.7(6.9)	29.1	22.2(4.1)	18.4	18.0(4.2)	23.6	7.2(2.2)	30.2	1.6(1.3)	80.4
판매·서비스직	112	20.9(3.1)	14.6	21.5(4.7)	22	14.1(3.7)	26.2	21.4(4.9)	22.9	16.4(3.8)	23	5.8(2.9)	51.1
농림어업	70	24.4(5.6)	23.1	14.6(4.8)	33	16.0(4.2)	26.5	28.0(7.2)	25.8	12.1(4.8)	39.2	4.8(2.5)	51.3
기능단순노무직	157	23.5(3.3)	14.1	20.3(3.3)	16.2	17.4(3.8)	21.7	23.1(4.0)	17.4	8.8(1.9)	22.2	6.9(2.0)	29.5
기타 ⁴⁾	395	27.2(4.5)	16.5	15.0(1.8)	12.2	10.7(1.8)	16.4	25.3(2.9)	11.3	12.5(2.3)	18.2	9.2(2.0)	21.7
월 가구소득													
100만원 이하	203	23.9(3.8)	15.8	12.2(2.5)	20.3	8.7(2.3)	26.7	36.7(4.5)	12.2	11.6(2.7)	23.2	6.8(2.7)	38.9
101-200만원	151	23.0(4.7)	20.3	15.6(3.1)	20.2	17.5(4.2)	24	22.3(5.1)	22.9	11.7(3.7)	31.8	9.9(3.8)	38.8
201-300만원	114	27.5(3.7)	13.5	26.1(6.2)	23.9	8.0(2.1)	26.2	21.4(5.3)	24.9	11.0(3.5)	31.6	5.9(1.4)	23.2
301-400만원	160	21.1(3.7)	17.4	20.4(3.0)	14.9	17.7(3.0)	16.8	21.2(4.9)	23.2	9.8(2.8)	28.4	9.8(2.5)	25.3
401만원 이상	282	26.3(4.6)	17.4	17.0(2.4)	14	16.3(2.0)	12.4	22.2(3.1)	13.7	13.2(2.0)	15	5.0(1.8)	36.1

: 1) 사회적 연결망(친척(가족포함)) : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 사회적 연결망(친척(가족포함))(≥65) : (응답보기별 응답자 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 147> 사회적 연결망 : 이웃¹⁾

(: %)

	N	한 달에 1번 미만		한 달에 1번		한 달에 2~3번		일주일에 1번		일주일에 2~3번		일주일에 4번 이상	
		% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
성	917	34.1(2.2)	6.4	9.2(1.4)	15.5	6.2(1.0)	16.8	19.6(2.1)	10.7	15.3(1.8)	11.6	15.6(1.5)	9.4
남자	392	36.8(3.2)	8.7	10.6(2.0)	19.1	5.9(1.2)	20.5	20.9(2.5)	12.1	13.7(2.1)	15.5	12.1(1.5)	12.0
여자	525	31.3(3.0)	9.5	7.7(1.4)	18.2	6.4(1.3)	20.6	18.3(2.5)	13.6	17.0(2.1)	12.5	19.3(2.2)	11.3
65세 이상 ²⁾	235	14.6(2.4)	16.4	5.3(1.3)	23.6	4.1(1.2)	29.5	25.9(3.6)	14.0	17.2(3.1)	18.0	32.9(3.4)	10.3
연령													
19-29	78	56.6(6.1)	10.7	9.9(3.5)	35.1	7.9(3.7)	46.3	16.5(4.4)	26.5	6.9(3.3)	47.9	2.2(2.1)	95
30-39	128	44.0(4.7)	10.8	12.2(2.8)	22.8	4.7(1.9)	40.7	21.1(3.6)	17.1	8.3(2.4)	28.6	9.8(2.6)	27
40-49	208	32.4(3.9)	12.1	9.7(2.4)	25.2	9.7(2.2)	22.4	13.3(2.6)	19.7	22.4(3.3)	14.5	12.4(2.1)	17
50-59	189	25.9(3.5)	13.5	9.0(2.0)	22.5	4.6(1.5)	32.3	23.0(3.4)	14.8	17.3(3.1)	18.1	20.2(3.1)	15.5
60-69	128	14.3(2.9)	20.4	5.3(1.8)	33.2	1.2(0.9)	70.1	24.7(4.6)	18.5	22.5(4.0)	17.6	32.0(4.6)	14.3
70 이상	186	16.1(2.9)	18	4.8(1.3)	27.2	4.7(1.3)	28	25.4(3.7)	14.6	16.3(3.2)	19.5	32.7(3.7)	11.4
생애주기별													
19-64	682	37.4(2.4)	6.4	9.8(1.6)	16.4	6.5(1.2)	18.1	18.5(2.1)	11.5	15.0(2.0)	13.3	12.7(1.5)	11.5
65 이상	235	14.6(2.5)	17	5.3(1.3)	23.6	4.1(1.2)	29.5	25.9(3.5)	13.6	17.2(3.1)	18	32.9(3.4)	10.3
교육수준 ³⁾													
무학	114	14.0(3.4)	24.3	8.6(2.5)	29	0.0(0.0)	.	20.5(4.0)	19.4	25.9(5.1)	19.5	31.0(5.0)	16.2
초등학교	134	20.2(4.6)	23	3.6(1.3)	36.5	7.2(2.2)	30.3	22.9(4.0)	17.4	16.8(3.4)	20	29.3(3.9)	13.3
중학교	81	26.4(6.0)	22.7	9.3(2.9)	30.9	4.3(2.2)	50.1	17.2(5.4)	31.3	20.8(4.5)	21.7	22.1(4.5)	20.4
고등학교	364	33.9(3.1)	9.3	10.0(1.9)	18.8	8.3(1.7)	20.4	20.1(2.8)	13.9	13.2(2.3)	17.4	14.6(1.8)	12.7
대학교 이상	224	44.7(3.3)	7.4	9.6(2.7)	28.4	4.4(1.5)	34.1	18.3(3.4)	18.7	14.6(2.5)	17	8.4(3.0)	36.2
직업													
전문·행정관리	104	42.6(5.1)	11.9	5.1(2.1)	41.5	4.9(1.4)	28.4	22.5(4.0)	17.9	15.3(4.4)	28.8	9.6(2.5)	25.7
사무직	78	51.2(5.5)	10.8	7.6(2.3)	30	4.8(3.9)	81.3	20.1(5.0)	25	13.0(4.1)	31.6	3.2(1.5)	47.5
판매·서비스직	112	32.7(4.2)	12.7	3.0(2.2)	73.8	8.8(3.2)	36.1	17.6(4.4)	25.1	14.7(3.5)	23.8	23.0(4.4)	19.2
농림어업	70	7.8(2.8)	36.2	8.6(3.0)	34.2	4.1(2.4)	58.6	17.1(5.4)	31.5	28.4(6.5)	22.9	34.0(5.9)	17.5
기능·단순노무직	157	32.0(4.7)	14.7	18.0(2.9)	16	5.3(2.1)	39.2	17.6(3.9)	22.4	14.0(3.1)	22.3	13.2(2.9)	21.7
기타 ⁴⁾	395	30.8(3.1)	9.9	8.1(1.9)	23.2	7.0(2.0)	28.1	20.5(3.3)	16.1	15.2(2.1)	13.5	18.4(2.0)	11.1
월 가구소득													
100만원 이하	203	21.9(3.0)	13.7	6.4(2.0)	31.6	5.3(2.0)	37	27.7(4.8)	17.4	15.3(3.1)	20.2	23.4(3.6)	15.4
101-200만원	151	22.8(4.8)	21.1	5.0(2.1)	43.1	6.2(2.3)	36.6	20.2(4.4)	21.9	17.7(3.8)	21.4	28.2(4.1)	14.4
201-300만원	114	34.8(3.4)	9.8	7.1(3.1)	43.4	8.1(3.6)	44.4	23.9(3.7)	15.4	13.0(3.3)	25.6	13.2(3.2)	23.9
301-400만원	160	41.2(5.1)	12.3	8.8(1.9)	21.2	9.6(3.3)	34.2	18.2(4.9)	27.2	12.0(2.1)	17.3	10.2(3.2)	31.1
401만원 이상	282	39.7(3.7)	9.2	11.7(2.7)	22.7	4.1(1.4)	35.1	15.8(3.1)	19.4	17.4(2.6)	15.2	11.3(2.1)	18.4

: 1) 사회적 연결망(이웃) : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 사회적 연결망(이웃)(≥65) : (응답보기별 응답자 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 148> 사회적 연결망 : 친구(이웃제외)¹⁾

(: %)

	N	한 달에 1번 미만		한 달에 1번		한 달에 2~3번		일주일에 1번		일주일에 2~3번		일주일에 4번 이상	
		% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
성	917	16.6(2.0)	12.3	13.3(1.1)	8.6	7.7(0.9)	11.8	15.0(1.3)	8.6	20.8(1.6)	7.5	26.6(1.7)	6.4
남자	392	15.3(2.5)	16.4	13.1(1.9)	14.4	6.0(1.0)	17.3	18.8(2.3)	12.4	21.6(2.5)	11.6	25.1(2.1)	8.5
여자	525	17.9(2.3)	13.1	13.5(1.2)	8.9	9.4(1.4)	14.9	11.0(1.5)	13.9	20.0(1.8)	8.9	28.2(1.9)	6.7
65세 이상 ²⁾	235	27.1(3.4)	12.5	12.9(2.2)	16.7	3.1(1.0)	33.1	15.3(2.6)	16.9	17.0(2.6)	15.2	24.6(3.1)	12.6
연령													
19-29	78	7.2(3.1)	42.3	1.7(1.6)	96.8	1.7(1.8)	105	14.4(4.5)	31.4	23.0(4.4)	19	52.0(5.6)	10.8
30-39	128	25.5(4.7)	18.4	12.4(2.0)	16	11.6(2.3)	19.6	15.4(3.8)	24.5	16.4(2.6)	16	18.6(3.5)	18.6
40-49	208	11.7(2.7)	23.4	17.7(2.5)	14.3	9.2(2.2)	23.6	13.4(2.5)	18.9	23.9(2.7)	11.3	24.0(4.1)	16.9
50-59	189	12.2(2.8)	22.9	17.4(2.7)	15.5	9.9(2.0)	20.2	16.4(3.0)	18.6	23.8(3.2)	13.3	20.4(3.0)	14.8
60-69	128	20.7(3.6)	17.3	21.9(3.3)	15.3	6.3(2.0)	32.2	19.0(3.1)	16.4	11.2(3.0)	27	20.9(2.8)	13.5
70 이상	186	28.8(3.6)	12.6	8.9(2.2)	24.5	3.0(1.2)	41.5	13.4(2.8)	20.8	20.5(3.1)	15	25.4(3.3)	13.2
생애주기별													
19-64	682	14.8(2.3)	15.2	13.4(1.3)	9.6	8.4(1.1)	12.6	14.9(1.4)	9.5	21.5(1.8)	8.5	27.0(1.9)	7.1
65 이상	235	27.1(3.3)	12.2	12.9(2.1)	16.6	3.1(1.0)	33.2	15.3(2.6)	16.7	17.0(2.6)	15.2	24.6(3.1)	12.4
교육수준 ³⁾													
무학	114	34.1(4.5)	13.3	13.7(3.9)	28.6	0.6(0.6)	97.3	12.0(2.6)	21.3	25.1(4.8)	18.9	14.5(3.7)	25.9
초등학교	134	21.5(4.5)	21.1	18.4(3.1)	16.9	8.0(2.3)	28.6	14.6(3.7)	25.3	13.0(3.2)	24.8	24.5(4.0)	16.3
중학교	81	18.3(4.1)	22.4	16.0(4.7)	29.5	8.3(3.1)	37.5	20.6(4.4)	21.3	19.3(4.5)	23.3	17.7(5.0)	28.1
고등학교	364	11.7(1.9)	16.5	11.6(1.8)	15.2	8.2(1.6)	19.5	13.6(2.1)	15.4	21.3(2.1)	10	33.6(2.4)	7.1
대학교 이상	224	18.3(3.8)	20.9	13.8(2.0)	14.5	8.2(1.7)	20.7	16.8(2.2)	13.4	21.7(3.0)	13.7	21.2(3.6)	17
직업													
전문행정관리	104	15.2(4.2)	27.9	11.1(2.3)	20.6	9.1(2.3)	24.9	16.2(4.0)	24.7	27.7(5.4)	19.6	20.8(3.5)	17.1
사무직	78	22.6(5.7)	25.2	15.3(5.0)	32.7	6.5(2.0)	30.3	13.3(4.0)	30.2	20.9(5.7)	27.5	21.4(6.9)	32.4
판매·서비스직	112	19.4(5.2)	26.8	14.9(2.9)	19.7	9.9(3.0)	30.3	12.2(3.9)	32.3	13.0(3.2)	24.6	30.6(5.5)	17.8
농림어업	70	19.1(5.4)	28.5	19.5(4.6)	23.7	3.1(1.8)	58.1	16.2(4.9)	30.5	20.7(5.1)	24.6	21.4(4.6)	21.7
기능단순노무직	157	10.6(3.2)	29.7	11.3(2.9)	25.3	8.9(2.3)	26.2	18.2(3.6)	19.7	25.0(3.7)	14.7	25.9(3.6)	13.8
기타 ⁴⁾	395	17.2(1.8)	10.4	12.7(1.7)	13.2	6.8(1.8)	25.9	14.3(2.2)	15.6	18.6(2.6)	13.9	30.5(2.3)	7.6
월 가구소득													
100만원 이하	203	23.8(3.2)	13.4	12.9(2.6)	20.5	7.7(2.4)	30.9	13.0(2.2)	17.2	18.3(2.9)	16.1	24.4(4.2)	17.2
101-200만원	151	16.7(3.8)	22.8	12.4(3.2)	25.5	4.4(2.2)	49.3	16.5(3.1)	18.8	15.0(3.4)	22.9	35.0(4.6)	13.2
201-300만원	114	14.3(3.0)	20.9	19.9(3.4)	17.2	5.8(2.6)	44.9	18.9(4.3)	22.6	23.5(4.5)	18.9	17.5(5.5)	31.4
301-400만원	160	18.0(3.7)	20.6	5.9(1.4)	24.5	8.0(2.1)	26.4	17.9(3.1)	17.5	19.9(3.5)	17.5	30.3(4.0)	13
401만원 이상	282	14.0(3.4)	24.2	15.1(2.7)	17.6	9.4(1.9)	20.5	11.5(1.7)	14.7	24.2(2.7)	11.2	25.8(2.6)	10.1

: 1) 사회적 연결망(친구(이웃제외)) : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 사회적 연결망(친구(이웃제외))(≥65) : (응답보기별 응답자 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 149> 사회활동 참여율¹⁾

(: %)

	종교 활동		친목 활동		여가 / 레저 활동		활동	
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	27.5(2.0)	7.3	76.3(2.9)	3.8	31.8(1.8)	5.7	11.1(1.4)	12.9
성								
남자	21.9(2.9)	13.0	80.3(3.3)	4.2	39.1(2.9)	7.3	10.5(2.1)	19.5
여자	33.4(1.8)	5.3	72.1(2.9)	4.1	24.2(2.0)	8.3	11.8(1.5)	12.5
연령								
19-29	21.1(7.1)	33.7	62.4(7.8)	12.5	44.2(5.6)	12.6	14.4(5.7)	39.5
30-39	23.7(4.1)	17.1	76.8(4.7)	6.1	36.0(4.3)	11.8	5.0(1.8)	34.8
40-49	30.9(3.6)	11.5	83.6(4.4)	5.3	43.6(4.6)	10.5	15.2(2.4)	15.5
50-59	30.3(3.2)	10.6	83.8(3.5)	4.2	26.0(2.5)	9.8	13.5(2.6)	19.1
60-69	36.3(4.4)	12.1	80.8(4.0)	4.9	13.0(3.3)	25.2	12.2(3.0)	24.8
70 이상	25.2(3.3)	13.2	63.5(3.4)	5.4	4.8(1.8)	37.1	4.0(1.6)	40.1
생애주기별								
19-64	27.7(2.2)	8.0	77.8(3.3)	4.2	36.2(1.9)	5.2	12.0(1.7)	13.8
65 이상	26.4(3.1)	11.6	67.5(2.9)	4.3	5.9(1.9)	31.8	5.8(1.9)	33.6
교육수준 ³⁾								
무학	26.7(3.9)	14.8	64.0(4.6)	7.1	2.6(1.8)	68.5	1.3(1.3)	97.3
초등학교	24.3(3.4)	13.8	67.9(3.9)	5.7	5.4(2.6)	49.1	6.5(2.3)	36.2
중학교	26.3(4.8)	18.3	82.0(4.6)	5.6	7.8(3.2)	40.2	5.2(1.3)	25.6
고등학교	26.9(3.3)	12.1	80.0(2.6)	3.2	35.1(2.8)	8.1	14.7(2.3)	15.8
대학교 이상	29.8(3.2)	10.6	74.5(6.4)	8.6	46.3(4.0)	8.6	10.5(2.2)	20.9
직업								
전문행정관리	30.2(4.5)	14.9	82.5(4.6)	5.6	47.6(5.2)	11.0	12.8(2.4)	18.7
사무직	29.3(8.0)	27.5	82.3(6.2)	7.6	55.0(5.5)	10.0	12.6(5.5)	43.5
판매·서비스직	29.2(4.9)	16.9	78.7(3.9)	5.0	30.5(4.9)	16.2	12.2(4.3)	35.2
농림어업	19.4(4.4)	22.9	72.5(6.4)	8.9	6.2(3.0)	48.5	8.6(3.1)	36.1
기능단순노무직	16.7(2.5)	15.1	89.2(3.1)	3.5	30.1(3.9)	13.0	6.5(1.9)	28.4
기타 ⁴⁾	31.7(2.7)	8.7	65.0(4.4)	6.8	23.5(3.1)	13.2	12.5(3.0)	24.0
월 가구소득								
100만원 이하	32.1(3.7)	11.6	68.0(3.8)	5.7	17.5(3.7)	20.9	11.3(3.3)	29.5
101-200만원	23.4(3.6)	15.2	77.7(4.9)	6.3	17.9(4.5)	24.9	11.4(2.8)	24.7
201-300만원	18.9(3.5)	18.5	68.0(6.9)	10.2	26.2(6.3)	24.0	5.8(2.2)	39.1
301-400만원	23.7(4.3)	18.2	78.5(3.9)	5.0	37.4(4.8)	13.0	10.1(3.1)	30.2
401만원 이상	33.3(3.1)	9.2	82.3(3.9)	4.8	42.5(4.0)	9.5	13.8(2.3)	16.9

: 1) 사회활동 참여율 : (한 달에 한 번(1회) 이상 정기적으로 사회활동에 참여하는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 150> 손 씻기 감염병 예방 인지율¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	912	99.7(0.2)	0.2	391	99.7(0.2)	0.2	521	99.8(0.2)	0.2
연령									
19-29	78	100.0(0.0)	0.0	33	100.0(0.0)	0.0	45	100.0(0.0)	0.0
30-39	128	100.0(0.0)	0.0	52	100.0(0.0)	0.0	76	100.0(0.0)	0.0
40-49	207	100.0(0.0)	0.0	90	100.0(0.0)	0.0	117	100.0(0.0)	0.0
50-59	189	99.5(0.5)	0.5	93	100.0(0.0)	0.0	96	99.0(1.0)	1.0
60-69	128	100.0(0.0)	0.0	51	100.0(0.0)	0.0	77	100.0(0.0)	0.0
70 이상	182	98.5(0.8)	0.8	72	96.4(1.8)	1.9	110	100.0(0.0)	0.0
생애주기별									
19-64	681	99.9(0.1)	0.1	299	100.0(0.0)	0.0	382	99.8(0.2)	0.2
65 이상	231	98.8(0.6)	0.6	92	97.2(1.5)	1.5	139	100.0(0.0)	0.0
교육수준 ²⁾									
무학	111	97.6(1.6)	1.7	24	95.4(4.5)	4.7	87	98.2(1.7)	1.7
초등학교	133	98.8(0.7)	0.7	47	97.1(1.7)	1.8	86	100.0(0.0)	0.0
중학교	81	100.0(0.0)	0.0	34	100.0(0.0)	0.0	47	100.0(0.0)	0.0
고등학교	363	100.0(0.0)	0.0	183	100.0(0.0)	0.0	180	100.0(0.0)	0.0
대학교 이상	224	100.0(0.0)	0.0	103	100.0(0.0)	0.0	121	100.0(0.0)	0.0
직업									
전문행정관리	104	100.0(0.0)	0.0	46	100.0(0.0)	0.0	58	100.0(0.0)	0.0
사무직	78	100.0(0.0)	0.0	52	100.0(0.0)	0.0	26	100.0(0.0)	0.0
판매·서비스직	112	100.0(0.0)	0.0	33	100.0(0.0)	0.0	79	100.0(0.0)	0.0
농림어업	70	97.1(1.8)	1.9	48	98.5(1.5)	1.6	22	94.0(6.0)	6.4
기능단순노무직	156	100.0(0.0)	0.0	114	100.0(0.0)	0.0	42	100.0(0.0)	0.0
기타 ³⁾	391	99.7(0.2)	0.2	97	99.0(0.7)	0.7	294	100.0(0.0)	0.0
월 가구소득									
100만원 이하	202	98.8(0.6)	0.6	74	97.1(1.5)	1.5	128	100.0(0.0)	0.0
101-200만원	149	99.4(0.6)	0.6	60	100.0(0.0)	0.0	89	98.8(1.2)	1.2
201-300만원	113	100.0(0.0)	0.0	58	100.0(0.0)	0.0	55	100.0(0.0)	0.0
301-400만원	160	100.0(0.0)	0.0	71	100.0(0.0)	0.0	89	100.0(0.0)	0.0
401만원 이상	281	100.0(0.0)	0.0	125	100.0(0.0)	0.0	156	100.0(0.0)	0.0

: 1) 손 씻기 감염병 예방 인지율 : (“매우 도움이 된다” 또는 “도움이 된다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 151> 손 씻기 실천율

(: %)

	식사 전 ¹⁾			화장실 다녀온 후 ²⁾			외출 후 ³⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
성	917	93.4(1.0)	1.1	917	91.4(1.4)	1.6	917	87.2(2.6)	3.0
남자	392	91.4(1.6)	1.7	392	88.4(2.2)	2.5	392	83.1(3.8)	4.6
여자	525	95.5(0.8)	0.9	525	94.6(1.0)	1.1	525	91.4(1.7)	1.8
연령									
19-29	78	96.5(1.8)	1.8	78	96.4(2.0)	2.1	78	91.2(4.2)	4.6
30-39	128	92.3(1.8)	2.0	128	95.2(1.7)	1.8	128	88.5(5.0)	5.6
40-49	208	94.8(2.3)	2.4	208	91.4(3.8)	4.1	208	87.4(5.6)	6.4
50-59	189	95.6(1.4)	1.5	189	91.4(1.8)	2.0	189	90.6(2.3)	2.6
60-69	128	97.3(1.3)	1.3	128	93.1(2.1)	2.3	128	87.6(3.4)	3.9
70 이상	186	81.3(2.8)	3.5	186	76.8(3.3)	4.2	186	72.3(3.3)	4.6
생애주기별									
19-64	682	94.9(1.1)	1.1	682	93.3(1.5)	1.6	682	89.2(3.0)	3.3
65 이상	235	84.5(2.3)	2.8	235	80.3(2.7)	3.4	235	75.4(2.7)	3.6
교육수준 ⁴⁾									
무학	114	80.6(3.9)	4.8	114	79.2(3.8)	4.8	114	71.9(4.6)	6.4
초등학교	134	89.0(3.3)	3.8	134	80.3(4.0)	4.9	134	82.1(3.8)	4.7
중학교	81	94.6(2.3)	2.4	81	91.4(2.8)	3.0	81	87.0(3.6)	4.2
고등학교	364	94.6(1.3)	1.4	364	93.4(1.9)	2.0	364	87.9(3.4)	3.9
대학교 이상	224	95.3(1.5)	1.5	224	94.5(1.7)	1.8	224	90.9(3.6)	4.0
직업									
전문행정관리	104	94.7(2.2)	2.4	104	91.5(3.1)	3.4	104	87.0(5.7)	6.6
사무직	78	93.6(3.0)	3.2	78	93.8(4.7)	5.1	78	89.2(4.7)	5.3
판매·서비스직	112	92.9(2.9)	3.1	112	95.1(2.0)	2.1	112	86.0(5.6)	6.6
농림어업	70	91.4(3.0)	3.3	70	83.1(5.5)	6.7	70	80.1(5.7)	7.1
기능단순노무직	157	95.4(1.6)	1.7	157	90.3(1.8)	2.0	157	86.9(3.6)	4.2
기타 ⁵⁾	395	92.1(1.3)	1.5	395	91.2(1.4)	1.6	395	88.0(1.9)	2.2
월 가구소득									
100만원 이하	203	85.6(2.7)	3.1	203	82.2(2.7)	3.2	203	79.5(2.9)	3.7
101-200만원	151	94.4(2.0)	2.1	151	91.5(2.0)	2.2	151	91.1(2.5)	2.8
201-300만원	114	92.0(2.6)	2.9	114	88.3(3.5)	3.9	114	84.0(4.3)	5.1
301-400만원	160	93.0(1.9)	2.1	160	93.8(1.4)	1.5	160	88.2(3.3)	3.8
401만원 이상	282	96.7(1.3)	1.3	282	94.8(2.0)	2.1	282	89.4(4.3)	4.8

- : 1) 손 씻기 실천율(식사 전) : (식사하기 전 손을 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
 2) 손 씻기 실천율(화장실 다녀온 후) : (화장실 다녀온 후 손을 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
 3) 손 씻기 실천율(외출 후) : (외출 후 집에 돌아왔을 때 손을 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
 4) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
 5) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 152> 비누, 손 세정제 사용률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
연령	917	83.3(2.1)	2.6	392	82.3(3.3)	4.1	525	84.3(1.7)	2.1
19-29	78	86.7(4.3)	5.0	33	82.4(6.3)	7.7	45	92.1(3.8)	4.1
30-39	128	90.3(3.1)	3.4	52	90.5(5.0)	5.5	76	90.2(3.8)	4.2
40-49	208	87.0(3.0)	3.5	91	85.1(5.2)	6.1	117	89.1(2.8)	3.1
50-59	189	87.8(2.2)	2.5	93	84.6(3.6)	4.3	96	91.4(2.3)	2.5
60-69	128	72.8(4.2)	5.8	51	71.5(7.1)	9.9	77	73.9(5.2)	7.0
70 이상	186	57.4(3.5)	6.0	72	60.0(6.2)	10.3	114	55.5(3.9)	7.0
생애주기별									
19-64	682	87.1(2.3)	2.6	300	85.0(3.4)	4.0	382	89.3(1.9)	2.1
65 이상	235	60.9(3.4)	5.5	92	62.5(5.4)	8.6	143	59.7(3.6)	6.0
교육수준 ²⁾									
무학	114	52.5(4.7)	8.9	24	34.9(10.2)	29.1	90	57.2(5.0)	8.7
초등학교	134	71.0(4.4)	6.2	47	69.9(7.3)	10.4	87	71.7(5.0)	6.9
중학교	81	77.2(4.8)	6.2	34	74.8(8.2)	11.0	47	79.0(5.6)	7.1
고등학교	364	85.6(2.9)	3.4	184	80.9(4.2)	5.1	180	91.8(2.5)	2.7
대학교 이상	224	91.6(2.9)	3.2	103	92.9(3.4)	3.7	121	90.0(3.1)	3.4
직업									
전문행정관리	104	87.4(3.1)	3.5	46	84.0(5.1)	6.1	58	90.8(3.1)	3.4
사무직	78	92.0(3.2)	3.5	52	90.5(3.7)	4.1	26	96.3(3.1)	3.3
판매·서비스직	112	88.6(3.4)	3.8	33	87.3(6.7)	7.6	79	89.3(3.1)	3.5
농림어업	70	62.0(5.9)	9.6	48	61.3(6.7)	10.9	22	63.8(11.9)	18.6
기능단순노무직	157	85.9(3.5)	4.0	115	85.9(4.5)	5.2	42	85.8(5.2)	6.0
기타 ³⁾	395	78.7(3.1)	4.0	97	74.4(6.3)	8.4	298	80.6(2.4)	3.0
월 가구소득									
100만원 이하	203	66.0(3.9)	5.9	74	66.4(5.3)	7.9	129	65.7(4.8)	7.3
101-200만원	151	86.5(3.3)	3.9	60	89.1(4.2)	4.8	91	84.1(3.3)	4.0
201-300만원	114	85.5(4.0)	4.7	58	83.0(5.5)	6.7	56	88.8(5.5)	6.2
301-400만원	160	84.3(3.6)	4.3	71	80.8(5.6)	6.9	89	88.1(3.9)	4.5
401만원 이상	282	87.2(3.7)	4.3	126	84.8(5.3)	6.3	156	90.0(2.5)	2.8

: 1) 비누, 손 세정제 사용률 : (평소 손을 씻을 때, 비누나 손 세정제를 “항상 사용한다” 또는 “자주 사용한다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

< 153> 손 씻기 교육 및 홍보 경험률¹⁾

(: %)

	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
	911	60.1(2.2)	3.7	391	54.5(2.3)	4.3	520	66.0(3.0)	4.5
연령									
19-29	78	64.1(6.2)	9.7	33	57.4(7.3)	12.8	45	72.3(8.1)	11.2
30-39	128	69.8(5.7)	8.2	52	59.6(7.6)	12.7	76	80.5(5.5)	6.8
40-49	207	75.9(2.1)	2.8	90	69.9(3.5)	5.1	117	82.7(3.3)	4.0
50-59	189	62.2(3.8)	6.1	93	51.3(4.6)	9.0	96	74.5(5.6)	7.5
60-69	127	38.2(4.7)	12.4	51	40.1(8.3)	20.8	76	36.8(5.2)	14.3
70 이상	182	14.1(2.5)	17.5	72	14.5(4.4)	30.6	110	13.8(3.4)	24.4
생애주기별									
19-64	680	67.1(2.3)	3.5	299	59.3(2.6)	4.4	381	75.8(2.9)	3.8
65 이상	231	18.0(2.5)	14.1	92	19.5(4.3)	22.2	139	16.8(3.2)	19.3
교육수준 ²⁾									
무학	110	14.8(3.4)	22.6	24	8.2(5.7)	69.8	86	16.7(4.2)	25.0
초등학교	133	21.0(4.7)	22.2	47	17.1(5.9)	34.7	86	23.8(4.9)	20.7
중학교	81	50.8(6.8)	13.4	34	32.3(8.7)	26.8	47	64.6(7.9)	12.2
고등학교	363	64.4(3.4)	5.3	183	55.0(4.4)	8.0	180	77.0(3.1)	4.1
대학교 이상	224	76.5(3.8)	5.0	103	70.1(4.9)	7.0	121	83.8(4.2)	5.0
직업									
전문행정관리	104	63.1(5.5)	8.8	46	51.8(7.0)	13.5	58	74.7(7.4)	10.0
사무직	78	80.7(4.0)	5.0	52	77.7(4.3)	5.5	26	89.2(7.1)	7.9
판매·서비스직	112	67.8(4.6)	6.8	33	52.5(6.5)	12.4	79	76.1(5.9)	7.7
농림어업	70	27.7(6.4)	23.2	48	21.7(6.1)	28.3	22	41.3(12.4)	29.9
기능단순노무직	157	59.0(3.8)	6.4	115	59.4(5.0)	8.5	42	57.8(10.6)	18.3
기타 ³⁾	389	54.6(3.4)	6.1	96	41.6(6.4)	15.4	293	60.6(3.3)	5.4
월 가구소득									
100만원 이하	198	26.6(3.5)	13.2	73	21.9(4.2)	19.0	125	30.0(4.6)	15.3
101-200만원	151	47.2(4.7)	10.0	60	40.9(7.4)	18.1	91	52.6(5.0)	9.6
201-300만원	113	71.7(4.8)	6.7	58	66.4(6.1)	9.2	55	79.0(6.7)	8.4
301-400만원	160	65.4(5.7)	8.7	71	60.3(7.7)	12.8	89	71.1(7.3)	10.3
401만원 이상	282	72.2(2.8)	3.9	126	62.8(3.4)	5.5	156	82.8(3.8)	4.5

1) 손 씻기 교육 및 홍보 경험률 : (최근 1년 동안 올바른 손 씻기에 관한 교육이나 이와 관련한 홍보물을 본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직


4부 부록

Community Health Survey

I.

II. 가구조사표

III. 2010-2013 순환조사지표





4부 >> 부록

I.

CHS

Community Health Survey

다음은 2013년 지역사회건강조사 개인조사표입니다. ➔

 승인번호 제11775호	 지역사회건강조사 Community Health Survey	이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.
--	---	---

안녕하십니까?

질병관리본부에서는「지역보건법」제4조(지역보건의료계획의 내용), 「지역보건법 시행령」제4조(지역보건의료계획의 수립방법 등), 제5조(지역보건의료계획의 수립시기 등)에 의거하여 지역 건강통계를 생산하여 근거 중심의 보건사업 수행 기반을 마련하고자 매년「지역사회건강조사」를 실시하오니 적극적인 협조 부탁드립니다.

지역사회건강조사는 전국 253개 보건소에서 매년 8월에서 10월까지 실시하며, 만 19세 이상 성인을 대상으로 흡연, 음주, 신체활동 등의 건강행태, 의료이용, 삶의 질 등을 조사합니다.

조사 자료는 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며, 통계작성 외의 목적으로는 사용하지 않습니다. 정확한 응답을 위하여 반드시 본인이 조사에 응하여 주시기 바랍니다.

※ 통계법 제33조(비밀의 보호)

- ① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
- ② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.

보건소, 책임대학교, 질병관리본부 연락처를
여기에 붙여주세요

 보건복지부  질병관리본부	※ 시·도명, 보건소명, 책임대학교명 스티커를 여기에 붙여주세요 시도 보건소 책임대학교
---	--

시도 보건소 표본지점 가구 가구원

관리번호 :

2013년 지역사회건강조사 참여 동의서

본인은 『지역사회건강조사』 내용을 충분히 이해하고 자의(自意)에 의해 건강면접조사에 참여합니다.

『지역사회건강조사』는 지역주민의 건강통계 생산을 목적으로 수행되고 있으며, 수집된 정보는 통계용으로만 활용됩니다. 또한, 개인을 구별할 수 있는 정보가 발표되거나 공개되지 않으며, 설문에 대한 참여는 조사대상자의 자발적인 동의하에 이루어집니다.

- 수집 개인정보 범위 : 성명, 성별, 생년월일, 전화번호, 주소
- 개인정보 보유기간 : 조사수행일부터 2014년 2월 28일까지
※ 2014년 3월 1일, 수집된 개인정보 파기
- 개인정보 이용목적 : 조사의 진실성 검증을 위한 전화 확인 조사

※ 개인정보 이용에 대한 자세한 내용은 지역사회건강조사 홈페이지
(<http://chs.cdc.go.kr/>)에서 확인하실 수 있습니다.

2013년 월 일

참여자 성명 : _____ (인) 또는 서명

설명자 성명 : _____ (인) 또는 서명

 승인번호 제11775호	2013년 지역사회건강조사	이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.
--	----------------	---

※ 조사대상자 번호를 정확히 기입하십시오.

시도 번호	보건소번호	표본지점번호	가구번호	가구원번호

조 사 대 상 자	
성명	
성별	① 남자 ② 여자
주민등록 생년월일	년 월 일 가구명부의 주민등록상 생년월일과 동일하지 확인하십시오. 다른 경우 가구명부를 수정합니다.

조사원명 _____ (서명)

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

1. 평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

☐

흡연

1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 6번 문항으로)

☐


1-1. 처음으로 담배 한 대를 다 피운 시기는 언제입니까?

만 세 888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음)

 세

888. 비해당

2. 현재 담배를 피웁니까?

☐

8. 비해당

① 매일 피움 → 하루 평균 흡연량 개비 (→ 3번 문항으로)

888. 비해당(문항1/②, 문항2/②③)

 개비

888. 비해당

② 가끔 피움 → 지난 1달간 흡연일 수 일

→ 흡연하는 날 하루 평균 흡연량 개비 (→ 3번 문항으로)

88 888. 비해당(문항1/②, 문항2/①③)

 일

 개비

88 888. 비해당

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음

→ 과거흡연 기간 년 개월

→ 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량 개비 (→ 6번 문항으로)

88 88 888. 비해당(문항1/②, 문항2/①②)

 년 월

 개비

88 88 888. 비해당

④ 비해당(문항 1/②: 평생 5갑(100개비)이상 피우지 않았음)

3. 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

- ① 최근 1년간 금연한 적이 있다
 ② 과거에는 있었지만, 최근 1년간 없다
 ③ 금연한 적이 없다
 ④ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항2/③: 과거흡연자)

☐

8. 비해당

4. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까?

- ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
 ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
 ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
 ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다
 ④ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항2/③: 과거흡연자)

☐

8. 비해당

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

5. 본인이 담배를 피우는 것에 대하여 주위 사람들로부터 담배를 끊거나 줄이라는 말을 듣는 편입니까?

- ① 전혀 그렇지 않다
② 거의 그렇지 않다
③ 대체로 그렇다
④ 항상 그렇다
⑤ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항2/③: 과거흡연자)

☐

8. 비해당

6. 흡연자의 금연을 돕기 위한 금연클리닉 또는 금연상담전화에 있다는 것을 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 7번 문항으로)

☐

6-1. 최근 1년 동안 금연클리닉 또는 금연상담전화를 이용해 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항6/②: 금연클리닉이나 금연상담전화에 있다는 것을 모름)

☐

8. 비해당

※ 7-9번은 간접흡연에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

7. 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 시간은 하루 몇 시간 정도입니까?

- ① 0시간
② 1시간 미만
③ 1시간 이상 → 시간

시간

1 00. 0시간

2 00. 1시간미만

8. 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 시간은 하루 몇 시간 정도입니까?

※ 농사 등 실외에서만 근무하는 경우 0시간에 해당

- ① 0시간
② 1시간 미만
③ 1시간 이상 → 시간
④ 직장을 다니고 있지 않음(주부, 학생, 무직 등)

시간

1 00. 0시간

2 00. 1시간미만

4 88. 직장 안다님

9. 최근 1년 동안 공공장소(버스/택시 정거장, 길거리, 음식점, 유흥업소, PC방 등)에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

10. 최근 1년 동안 금연에 대한 공익광고(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

11. 최근 1년 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

12. 금연구역이 설정되어 있다는 것을 알고 있습니까?

- ① 설정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다
② 설정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다 (→ 「음주」 1번 문항으로)
③ 설정된 것을 모른다 (→ 「음주」 1번 문항으로)

☐

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게



12-1. 금연구역 내에서 흡연한 적이 있습니까?

- ① 금연구역 내에서 항상 흡연한다
- ② 금연구역 내에서 가끔 흡연한다
- ③ 금연구역 내에서 흡연을 하지 않는다
- ④ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항2/③: 과거흡연자 문항 12/②③ 설정구역 모름)

☐

8. 비해당

음주

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다.

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「안전의식」 1번 문항으로)

☐

1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?

만 세 888. 비해당(문항1/②: 평생 술을 마셔본 적이 없음)세
888. 비해당

1-2. 처음 술을 마신 이유(동기)는 무엇입니까?

- ① 주위 사람(가족, 친척, 친구, 동료, 선후배 등)이 권해서
 ② 호기심으로
 ③ 친목도모를 위해
 ④ 축하할 일이 있어서
 ⑤ 스트레스를 풀기위해
 ⑥ 광고, TV, 영화에 멋있게 보여서
 ⑦ 기타()
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마셔본 적이 없음)

☐
8. 비해당

2. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 3번 문항으로)
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마셔본 적이 없음)

☐
8. 비해당

2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까?

- ① 한 달에 1번 미만
 ② 한 달에 1번 정도
 ③ 한 달에 2~4번 정도
 ④ 일주일에 2~3번 정도
 ⑤ 일주일에 4번 이상
 ⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음)

☐
8. 비해당

2-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?

(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다)

- ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
 ⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음)

☐
8. 비해당

2-3. 본인이 술을 마시는 것에 대하여 가족이나 의사가 걱정을 하거나, 술을 끊거나 줄이라는 권고를 한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음)

☐
8. 비해당

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

3. 최근 1년 동안 음주문제로 의료기관, 보건소, 알코올상담센터, 정신보건센터 등에서 상담을 받아본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마셔본 적이 없음)

☐
8. 비해당

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게



4-1. 오토바이를 운전할 때 헬멧을 착용합니까?

- ① 전혀 착용하지 않는다
- ② 거의 착용하지 않는 편이다
- ③ 가끔 착용하는 편이다
- ④ 대체로 착용하는 편이다
- ⑤ 항상 착용한다
- ⑧ 비해당(문항4/②: 오토바이 운전을 하지 않음)

4-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까?

- ① 예 ➡ ☐☐☐회 ② 아니오
- ⑧ 비해당(문항4/②: 오토바이 운전을 하지 않음)

☐

8. 비해당

☐ ☐ ☐ 회

2 000. 아니오
8 888. 비해당

【자전거 운전】

5. 자전거를 탑니까?

- ① 예 ② 아니오 (➡ 「운동 및 신체활동」 1번 문항으로)

☐


5-1. 자전거를 탈 때 헬멧을 착용합니까?

- ① 전혀 착용하지 않는다
- ② 거의 착용하지 않는 편이다
- ③ 가끔 착용하는 편이다
- ④ 대체로 착용하는 편이다
- ⑤ 항상 착용한다
- ⑧ 비해당(문항5/②: 자전거를 타지 않음)

☐

8. 비해당

운동 및 신체활동

1. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까? ☐ 일

※ 격렬한(고강도) 신체활동

달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

- 1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 시간 분 88 88. 비해당(문항1/0일: 격렬한 신체활동 없음)

시 분
88 88. 비해당

2. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다.) ☐ 일

※ 중등도(중강도) 신체활동

천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

- 2-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 시간 분 88 88. 비해당(문항2/0일: 중등도 신체활동 없음)

시 분
88 88. 비해당

3. 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까? ☐ 일

※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.

- 3-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까?

하루에 시간 분 88 88. 비해당(문항3/0일: 걷기운동 없음)

시 분
88 88. 비해당

4. 최근 1주일 동안 스트레칭, 맨손체조 등의 유연성 운동을 한 날은 며칠입니까?

- ① 전혀 하지 않음
② 1일
③ 2일
④ 3일
⑤ 4일
⑥ 5일 이상

☐

5. 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력 운동을 한 날은 며칠입니까?

- ① 전혀 하지 않음
② 1일
③ 2일
④ 3일
⑤ 4일
⑥ 5일 이상

☐

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

6. 지난주 주중(월~금요일) 여가시간에 TV 보기, 게임, 인터넷 등으로 앉아서 보낸 시간이 하루에 보통 몇 시간 정도입니까? ☐
- ① 하루 1시간 미만
 - ② 하루 1시간~2시간 미만
 - ③ 하루 2시간~3시간 미만
 - ④ 하루 3시간~4시간 미만
 - ⑤ 하루 4시간 이상
7. 지난주 주말(토~일요일) 여가시간에 TV보기, 게임, 인터넷 등으로 앉아서 보낸 시간이 하루에 보통 몇 시간 정도입니까? ☐
- ① 하루 1시간 미만
 - ② 하루 1시간~2시간 미만
 - ③ 하루 2시간~3시간 미만
 - ④ 하루 3시간~4시간 미만
 - ⑤ 하루 4시간 이상

영양

1. 최근 1주일 동안 아침식사를 한 날은 며칠입니까? ☐ 일 ☐ 일

2. 최근 1달 동안 과일(과일 주스 제외)을 얼마나 자주 먹었습니까? ☐
 - ① 한 달 동안 과일을 먹지 않았다
 - ② 하루에 1번 미만
 - ③ 하루 1번
 - ④ 하루 2번
 - ⑤ 하루 3번 이상

3. 최근 1달 동안 생으로 먹는 채소(쌈, 샐러드, 생채소 무침)를 얼마나 자주 먹었습니까? ☐
 - ① 한 달 동안 생으로 먹는 채소를 먹지 않았다.
 - ② 하루에 1번 미만
 - ③ 하루 1번
 - ④ 하루 2번
 - ⑤ 하루 3번 이상

4. 평상시 음식을 먹을 때, 다음 중 본인은 어디에 해당합니까? ☐
 - ① 아주 짜게 먹는다
 - ② 약간 짜게 먹는다
 - ③ 보통으로 먹는다
 - ④ 약간 싱겁게 먹는다
 - ⑤ 아주 싱겁게 먹는다

5. 식탁이나 상에 차려진 음식을 먹을 때, 소금이나 간장을 더 넣어 먹습니까? ☐
 - ① 항상 더 넣는다
 - ② 자주 더 넣는다
 - ③ 거의 더 넣지 않는다
 - ④ 전혀 더 넣지 않는다

6. 전, 부침, 튀김을 먹을 때, 간장에 찍어 먹습니까? ☐
 - ① 항상 찍어 먹는다
 - ② 가끔 찍어 먹는다
 - ③ 찍어 먹지 않는다

7. 가공식품을 사거나 고를 때, '영양표시'를 읽습니까? ☐
 - ① 항상 읽는다
 - ② 가끔 읽는다
 - ③ 읽지 않는다
 - ④ 영양표시가 무엇인지 모른다
 - ⑤ 가공식품을 먹지 않는다

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

8. 최근 1년 동안 보건소, 구청, 동사무소, 복지시설, 학교, 병원 등에서 실시된 영양교육 및 상담을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

9. 다음 중 최근 1년 동안 귀댁의 식생활 행편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?

- ① 우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다
 ② 우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다
 ③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다
 ④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다

☐

비만 및 체중조절

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까?

- ① 매우 마른 편임
 ② 약간 마른 편임
 ③ 보통임
 ④ 약간 비만임
 ⑤ 매우 비만임

☐

2. 최근 1년 동안 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다
 ② 몸무게를 유지하려고 노력했다
 ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다
 ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해 본 적 없다

☐

3. 현재 본인의 키는 얼마입니까?

. cm. cm

4. 현재 본인의 몸무게는 얼마입니까?

. kg. kg

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

구강건강

1. 스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

☐

2. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?
(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.)

☐

- ① 매우 불편하다
② 불편하다
③ 그저 그렇다
④ 별로 불편하지 않다
⑤ 전혀 불편하지 않다

3. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 명확히 발음을 하는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?
(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.)

☐

- ① 매우 불편하다
② 불편하다
③ 그저 그렇다
④ 별로 불편하지 않다
⑤ 전혀 불편하지 않다

4. 위쪽 치아 혹은 아래쪽 치아 모두가 빠진 상태입니까?

☐

- ① 위아래 치아 모두가 빠졌다
② 위쪽 치아만 모두 빠졌다
③ 아래쪽 치아만 모두 빠졌다
④ 아니오

5. 현재 끼었다 뺏다 할 수 있는 틀니를 하고 있습니까?

☐

- ① 위아래 둘 다 있음 — (→ 6번 문항으로)
② 위쪽만 있음
③ 아래쪽만 있음 } (→ 5-1번 문항으로)
④ 아니오



5-1. 현재 틀니가 필요하다고 생각합니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항5/①: 위아래 둘 다 있음)

☐

8. 비해당

6. 어제 하루 동안 점심 식사 후 칫솔질(잇솔질)을 했습니까?

☐

- ① 예 ② 아니오 ③ 식사하지 않음

7. 치약과 칫솔이외에 치아의 건강을 위해 평소에 치실(floss) 혹은 치간솔을 사용합니까?

☐

- ① 예 ② 아니오

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

8. 치과가 아닌 곳에서 무자격자에 의한 치과시술(아매)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

9. 최근 1년 동안, 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (▶ 10번 문항으로)

☐


9-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까?(한 가지만 선택)

- ① 경제적인 이유로
 ② 치과병의원(또는 보건소, 보건지소 등)이 너무 멀어서
 ③ 직장이나 학교를 비울 수 없어서
 ④ 거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에
 ⑤ 아이를 봐줄 사람이 없어서
 ⑥ 다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서
 ⑦ 치과진료를 받기가 무서워서
 ⑧ 기타()

☐

88. 비해당

88. 비해당(문항9/②: 진료를 받지 못한 적이 없음)

10. 최근 1년 동안 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까?

※ 학교·사업장 구강검진, 국민건강보험공단 구강검진 포함

- ① 예 ② 아니오

☐

11. 최근 1년 동안 스케일링(치석제거)을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

12. 치주조직(잇몸)의 건강은 어느 정도라고 생각합니까?

- ① 이가 흔들린다
 ② 잇몸이 자주 붓는다
 ③ 치석이 많다
 ④ 잇몸에서 피가 난다
 ⑤ 정상이다

☐

정신건강

1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까? 시간

시간

2. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

- ① 대단히 많이 느낀다
② 많이 느끼는 편이다
③ 조금 느끼는 편이다
④ 거의 느끼지 않는다
- (→ 2-1번 문항으로)
(→ 3번 문항으로)

2-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항2/③④: 평소 스트레스를 조금 느끼거나 거의 느끼지 않음)

8. 비해당

3. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 4번 문항으로)

3-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항3/②: 2주 이상 슬프거나 절망감을 느낀 적이 없음)

8. 비해당

4. 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 5번 문항으로)

4-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항4/②: 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 없음)

8. 비해당

5. 최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 6번 문항으로)

5-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항5/②: 자살 시도를 해 본 적이 없음)

8. 비해당

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

6. 최근 1년 동안 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용으로 일상생활에 지장을 받은 적이 있습니까?

☐

- ① 전혀 없다
- ② 한 달에 1번 미만
- ③ 한 달에 1번 정도
- ④ 일주일에 1번 정도
- ⑤ 거의 매일
- ⑥ 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 이용한 적이 없음 (→ 「예방접종」 1번 문항으로)

7. 주위 사람들로부터 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 너무 많이 한다고 지적을 받는 편입니까?

☐

- ① 전혀 그렇지 않다
- ② 거의 그렇지 않다
- ③ 대체로 그렇다
- ④ 항상 그렇다
- ⑧ 비해당(문항6/⑥: 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 이용한 적이 없음)

8. 비해당

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

예방접종

1. 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

이환

1. 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까?

- ① 예 ➡ 일 ② 아니오

 일
2 00. 아니오

※ 지금부터 우리나라 국민들이 많이 걸리는 질병에 대해서 질문하도록 하겠습니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용을 응답해 주시기 바랍니다.

【고혈압】

1. 최근 1년 동안 혈압을 몇 번이나 잴습니까?

- ① 하루에
② 일주일에
③ 한 달에
④ 일 년에
⑤ 전혀 안함
- ➡ 회

 회
5 000. 전혀 안함

2. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (➡ 3번 문항으로)

☐

2-1. 본인의 혈압은 잘 조절되고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐
8. 비해당

2-2 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (➡ 2-3번 문항으로)
⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐
8. 비해당

2-2-1. 혈압을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

혈압약 복용	① 예 ➡ 한 달에 일 ② 아니오
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오

 한달에 일
2 00. 아니오
8 88. 비해당
☐ 8. 비해당

8 88 8. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음,
문항2-2/②: 현재 치료를 받지 않음)

2-3. 고혈압을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오. (* 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분미만으로 대화한 진료상담은 제외)

병의원	① 예 ② 아니오
한방병원	① 예 ② 아니오
보건소(보건지소, 진료소, 의료원)	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항2/②): 의사에게 진단받은 적이 없음

2-4. 최근 1년 동안 고혈압으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 스팩 검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항2/②): 의사에게 진단받은 적이 없음

2-5. 최근 1년 동안 고혈압으로 인한 심장질환 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 검사를 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항2/②): 의사에게 진단받은 적이 없음

2-6. 최근 1년 동안 고혈압으로 인한 뇌혈관질환 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 검사를 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항2/②): 의사에게 진단받은 적이 없음

3. 본인의 혈압수치를 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

【당뇨병】

1. 최근 1년 동안 혈당을 몇 번이나 잴습니까?

- ① 하루에 회
 ② 일주일에 회
 ③ 한 달에 회
 ④ 일 년에 회
 ⑤ 전혀 안함

2. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 3번 문항으로)

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

2-1. 본인의 혈당은 잘 조절되고 있습니까?
 ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2-2. 현재 치료를 받고 있습니까?
 ① 예 ② 아니오 (→ 2-3번 문항으로)
 ⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2-2-1. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

인슐린 주사	① 예 ② 아니오
당뇨병약(경구 혈당강하제)	① 예 ② 아니오
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음,
 문항2-2/②: 현재 치료를 받고 있지 않음)

2-3. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까?
 모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분미만으로 대화한
 진료상담은 제외).

병의원	① 예 ② 아니오
한방병의원	① 예 ② 아니오
보건소(보건지소, 진료소, 의료원)	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2-4. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈검사
 (안저검사)를 받은 적이 있습니까?
 ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2-5. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해
 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까?
 ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당

3. 본인의 혈당수치를 알고 있습니까?
 ① 예 ② 아니오

☐

【이상지질혈증(고지혈증 포함)】

1. 의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 적이 있습니까?
 ① 예 ② 아니오 (→ 2번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예 ② 아니오 (⇒ 2번 문항으로)
 ③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1-1-1. 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

이상지질혈증 약 복용	① 예 ⇒ 한 달에 일 ② 아니오
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오

8 88 8. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음,
문항1-1/②: 현재 치료를 받고 있지 않음)

☐
8. 비해당

☐ 한 달에 일
2 00. 아니오
8 88. 비해당
☐ 8. 비해당

2. 본인의 총 콜레스테롤 수치를 알고 있습니까?
- ① 예 ② 아니오

☐

【뇌졸중(중풍)】

1. 의사에게 뇌졸중(중풍)을 진단받은 적이 있습니까?
- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「심근경색증」 1번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐
8. 비해당

【심근경색증】

1. 의사에게 심근경색증을 진단받은 적이 있습니까?
- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「협심증」 1번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐
8. 비해당

【협심증】

1. 의사에게 협심증을 진단받은 적이 있습니까?
- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「심뇌혈관질환 예방관리」 1번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐
8. 비해당

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

【심뇌혈관질환 예방관리】

1. 심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 2번 문항으로)

☐


1-1. 심뇌혈관질환에 대한 내용을 어떤 경로를 통해 보거나 들어 보았습니까? 모두 응답해 주십시오.

인터넷	① 예 ② 아니오
TV, 라디오, 옥외광고, 지하철 등	① 예 ② 아니오
병의원	① 예 ② 아니오
보건기관(보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소)	① 예 ② 아니오

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

8888. 비해당(문항1/②: 심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음)

2. '심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙'에 관한 홍보물(소책자, 동영상, 홍보물품)을 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「관절염」 1번 문항으로)

☐


2-1. '심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙'에 관한 홍보물(소책자, 동영상, 홍보물품)을 어떤 경로를 통해 보았습니까? 모두 응답해 주십시오.

인터넷	① 예 ② 아니오
TV, 라디오, 옥외광고, 지하철 등	① 예 ② 아니오
병의원	① 예 ② 아니오
보건기관(보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소)	① 예 ② 아니오

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

8888. 비해당(문항1/②: 심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음)

【관절염】

1. 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「골다공증」 1번 문항으로)

☐


1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
8. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

1-2. 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외).

병의원	① 예 ② 아니오
한방병원	① 예 ② 아니오
보건소(보건지소, 진료소, 의료원)	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당

【골다공증】

1. 의사에게 골다공증을 진단받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 (⇒ 「천식」 1번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐ 8. 비해당

1-2. 의사에게 다음의 부위가 골절되었다고 들어본 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오.

엉덩이뼈	① 예 ② 아니오
척추	① 예 ② 아니오
손목뼈	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당

【천식】

1. 최근 1년 동안 숨 쉴 때, 가슴에서 쌽쌽하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

☐

2. 최근 1년 동안 운동 중이나 운동 후에 숨 쉴 때, 가슴에서 쌽쌽하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

☐

3. 의사에게 천식을 진단받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 (⇒ 「알레르기비염」 1번 문항으로)

☐

3-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항3/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐ 8. 비해당

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

3-2. 최근 1년 동안 천식의 증상이 악화되었습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항3/②): 의사에게 진단받은 적이 없음

☐
8. 비해당

3-3. 최근 1년 동안 천식증상으로 급작스럽게 응급실 또는 병원에 간 적이 있습니까?

- ① 예, 응급실에 간 적이 있다
② 예, 병원에 간 적이 있다
③ 아니오
④ 비해당(문항3/②): 의사에게 진단받은 적이 없음

☐
8. 비해당

【알레르기비염】

1. 의사에게 알레르기비염을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「아토피피부염」 1번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②): 의사에게 진단받은 적이 없음

☐
8. 비해당

【아토피피부염】

1. 의사에게 아토피피부염을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「백내장」 1번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②): 의사에게 진단받은 적이 없음

☐
8. 비해당

【백내장】

1. 의사에게 백내장을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「B형 간염」 1번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②): 의사에게 진단받은 적이 없음

☐
8. 비해당

【B형 간염】

1. 의사에게 B형 간염을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「우울증」 1번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②): 의사에게 진단받은 적이 없음

☐
8. 비해당

【우울증】

1. 의사에게 우울증을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「대시증후군」 1번 문항으로)

--	--

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
- ⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1

8. 비해당

【대사증후군】

1. 대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

--	--

【에이즈(AIDS)】

1. 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

--	--

※ 다음의 질문들은 귀하의 에이즈에 대한 지식을 알아보기 위한 것입니다. 맞다고 생각되면 "예", 아니라고 생각되면 "아니오", 혹은 잘 모르겠다고 생각되면 "모르겠다"를 선택해 주십시오.

2-1. 콘돔으로 에이즈를 예방할 수 있다.

- ① 예
② 아니오
③ 모르겠다
④ 비 해당 (문항 1/②: 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 없음)

1

8. 비 해당

2-2. 에이즈에 걸린 사람도 건강해 보일 수 있다.

- ① 예
② 아니오
③ 모르겠다
④ 비 해당 (문항 1/2: 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 없음)

--	--

8. 비혜당

2-3. 모기로도 에이즈에 감염될 수 있다.

- ① 예
② 아니오
③ 모르겠다
④ 비 해당 (문항1/②: 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 없음)

1

8. 비해당

2-4. 에이즈에 감염된 사람과 함께 식사를 하면 에이즈에 감염될 수 있다.

- ① 예
② 아니오
③ 모르겠다
④ 비 해당 (문항1/2: 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 없음)

1

8. 비 해당

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

※ 다음의 질문들은 귀하의 에이즈에 대한 태도를 알아보기 위한 것입니다. 맞다고 생각되면 "예", 아니라고 생각되면 "아니오", 혹은 잘 모르겠다고 생각되면 "모르겠다"를 선택해 주십시오.

3-1. 가족 중 에이즈 감염인이 생긴다면 집에서 돌보겠다.

- ① 예
- ② 아니오
- ③ 모르겠다
- ④ 비해당(문항1/②: 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 없음)

☐
8. 비해당

3-2. 에이즈 감염인이 일하는 가게에서도 채소나 과일을 사겠다.

- ① 예
- ② 아니오
- ③ 모르겠다
- ④ 비해당(문항1/②: 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 없음)

☐
8. 비해당

3-3. 자녀가 에이즈 감염인과 같은 학교에 다니도록 허용하겠다.

- ① 예
- ② 아니오
- ③ 모르겠다
- ④ 비해당(문항1/②: 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 없음)

☐
8. 비해당

3-4. 가족 중 에이즈 감염인이 있다면 가족 이외의 사람에게는 비밀로 하겠다.

- ① 예
- ② 아니오
- ③ 모르겠다
- ④ 비해당(문항1/②: 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 없음)

☐
8. 비해당

의료이용

1. 최근 1년 동안 본인이 병원(치과 미포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까?

① 예

② 아니오 (▶ 「사고 및 중독(낙상)」 1번 문항으로)

☐

1-1. 그런 적이 있다면, 다음 중 어떤 이유로 본인이 원하는 때 병원에 가지 못했습니까?

(한 가지만 선택)

① 경제적인 이유로

② 병원 등 예약을 하기가 힘들어서

③ 교통편이 불편해서

④ 내가 갈 수 있는 시간에 병원 등이 문을 열지 않아서

⑤ 병원 등에서 오래 기다리기 싫어서

⑥ 증상이 가벼워서

⑦ 기타()

⑧ 비해당(문항1/②: 병원에 가지 못한 적이 없음)

☐

8. 비해당

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

사고 및 중독(낙상)

1. 최근 1년 동안 넘어진 적이 있습니까?

※ 미끄러짐, 헛디딤, 주저앉음, 떨어짐 포함

① 예 ➡ ☐ 회

② 아니오 (➡ 4번 문항으로)

☐ 회
2 0. 아니오

※ 여러 번 발생했다면, 각각의 낙상에 대해 2~3번 문항을 반복합니다.

2. 넘어진 장소는 어디입니까?

집안	① 화장실/욕조
	② 방
	③ 부엌
	④ 거실/마루
	⑤ 계단
	⑥ 기타 집안 지역(장소)
집밖	⑦ 농어업시설
	⑧ 운송지역
	⑨ 스포츠 또는 운동장소
	⑩ 상업 또는 서비스 시설
	⑪ 기타 집밖 지역(장소)

3. 넘어진 이유는 무엇이었습니까?

- ① 바닥이 미끄러워서
- ② 사람이나 사물에 부딪혀서
- ③ 보도나 문의 턱에 걸려
- ④ 경사가 급해서
- ⑤ 조명이 어두워서
- ⑥ 다리를 접질려서(발을 헛디딤서)
- ⑦ 갑자기 어지러워서(갑자기 주저앉아서)
- ⑧ 기타()

낙상 응답표				
1회	2회	3회	4회	5회
☐	☐	☐	☐	☐
기 타	기 타	기 타	기 타	기 타

4. 평소 넘어지는 것에 대한 두려움을 느낍니까?

- ① 전혀 두려워하지 않는다
- ② 약간 두려워 한다
- ③ 많이 두려워 한다

☐

5. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외

① 예 ➡ ☐ 회

② 아니오

☐ 회
2 0. 아니오

활동제한 및 삶의 질

※ 다음은 귀하의 삶에 대해 얼마나 만족하고 있는지를 알아보기 위한 질문입니다. 매우 만족하는 경우를 '10'으로, 매우 불만족하는 경우를 '1'로 생각하시고 다음 질문에 응답해 주십시오.

1. 모든 사항을 고려할 때, 최근 귀하의 삶에 (대체로) 어느 정도 만족합니까?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

매우 불만족

매우 만족

※ 지금부터 질병이나 손상 등으로 인해 몸이 아팠거나, 결석이나 결근 등을 해야 했던 내용에 대해서 질문하겠습니다. 질문을 잘 듣고 응답해 주십시오.

2. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 적이 있습니까?

- ① 예 → 일 ② 아니오

일
2 00. 아니오

3. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 했던 적이 있습니까?

※ 농사/장사를 못나간 경우 결근에 해당

- ① 예 → 일 ② 아니오 ③ 학교 또는 직장을 다니고 있지 않음

일
2 00. 아니오
3 88. 학교, 직장 안
다님

※ 아래의 각 문항에서 오늘 귀하의 건강상태를 가장 잘 설명해주는 하나의 항목에 표시해 주십시오.

4-1. 운동능력

- ① 나는 걷는데 지장이 없다
② 나는 걷는데 다소 지장이 있다
③ 나는 종일 누워 있어야 한다

☐

4-2. 자기관리

- ① 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다
② 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다
③ 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다

☐

4-3. 일상 활동(예: 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가활동)

- ① 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다
② 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다
③ 나는 일상 활동을 할 수가 없다

☐

4-4. 통증/불편

- ① 나는 통증이나 불편감이 없다
② 나는 다소 통증이나 불편감이 있다
③ 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다

☐

4-5. 불안/우울

- ① 나는 불안하거나 우울하지 않다
② 나는 다소 불안하거나 우울하다
③ 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다

☐


건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

건강상태가 얼마나 좋고 나쁜지를 표현하는 것을 돕고자, 당신이 상상할 수 있는 최고의 상태를 100으로, 당신이 상상할 수 있는 최저의 상태를 0으로 표시한 눈금자(온도계와 비슷함)를 그려 놓았습니다.

당신의 생각에 오늘 당신의 건강상태가 얼마나 좋고 나쁜지를, 아래의 상자로부터, 오늘 당신의 건강상태가 얼마나 좋고 나쁜지를 나타낸 눈금자위의 한곳으로 선을 그어서 표시해 주십시오.

오늘
당신의
건강상태

상상할 수 있는
최고의
건강상태



상상할 수 있는
최저의
건강상태

	백	십	일
점수			

보건기관 이용

1. 최근 1년 동안 주로 이용한 보건기관은 어디입니까?

- ① 이용한 적 없다 — (➡ 1-4번 문항으로)
 ② 보건소(보건의료원 포함) }
 ③ 보건지소 (➡ 1-1번 문항으로)
 ④ 보건진료소 }

☐

1-1. 보건기관을 이용한 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 거리가 가까워서
 ② 비용이 저렴해서
 ③ 신뢰할 수 있어서
 ④ 시설이 좋아서
 ⑤ 직원이 친절해서
 ⑥ 다른 곳에서 제공하지 않는 서비스를 제공하기 때문에(만성질환자등록관리 등)
 ⑦ 기타()
 ⑧ 비해당(문항1/①: 보건기관 이용한 적이 없음)

☐기
타

8. 비해당

1-2. 보건기관을 이용하였다면, 어떤 서비스에 참여했습니까? 모두 응답해 주십시오.

예방접종	① 예 ② 아니오
건강교실(금연, 절주, 운동, 영양)	① 예 ② 아니오
건강검진	① 예 ② 아니오
방문보건서비스	① 예 ② 아니오
영양보충서비스	① 예 ② 아니오
정신보건서비스	① 예 ② 아니오
모자보건서비스	① 예 ② 아니오
구강보건서비스	① 예 ② 아니오
진료서비스	① 예 ② 아니오
민원서비스(서류, 증명서발급)	① 예 ② 아니오
기타	① 예 ② 아니오

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

888888888888. 비해당(문항1/①: 보건기관 이용한 적이 없음)

1-3. 보건기관의 서비스 전반에 대해 어느 정도 만족했습니까?

- ① 대단히 만족한다
 ② 만족한 편이다
 ③ 보통이다 } (➡ 2번 문항으로)
 ④ 불만족한 편이다
 ⑤ 대단히 불만족한다
 ⑧ 비해당(문항1/①: 보건기관 이용한 적이 없음)

☐

8. 비해당

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

1-4. 보건기관을 이용하지 않은 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 위치를 잘 몰라서
- ② 거리가 멀고 교통이 불편해서
- ③ 원하는 서비스가 제공되지 않아서
- ④ 제공되는 서비스의 질이 높지 않다고 생각하기 때문에
- ⑤ 저소득층이나 특수계층만이 이용한다고 생각하기 때문에
- ⑥ 제공되는 서비스가 어떤 것들이 있는지 몰라서
- ⑦ 주로 이용하는 병원이 있어서
- ⑧ 건강해서
- ⑨ 기타()

88. 비해당(문항1/②③④: 보건기관 이용한 적이 있음)

☐

기
타

88. 비해당

2. 보건기관(보건소(보건의료원), 보건지소, 진료소)에서 다음 질병의 예방 및 관리를 위한 홍보(교육 포함)를 보거나 들어본 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오.

고혈압	① 예 ② 아니오
당뇨병	① 예 ② 아니오
관절염	① 예 ② 아니오
아토피·천식	① 예 ② 아니오
치매	① 예 ② 아니오

☐
☐
☐
☐
☐

사회 물리적 환경

1. 다음 문항에 대한 생각은 어떻습니까? 모두 응답해 주십시오.

우리 동네 사람들은 서로 믿고 신뢰할 수 있다	① 예 ② 아니오	☐
이웃에 경조사가 있을 때, 주민 사이에 서로 도움을 주고받는 전통이 있다	① 예 ② 아니오	☐
우리 동네의 전반적 안전수준(자연재해, 교통사고, 농작업 사고, 범죄)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오	☐
우리 동네의 자연환경(공기질, 수질 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오	☐
우리 동네의 생활환경(전기, 상하수도, 쓰레기 수거, 스포츠시설 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오	☐
우리 동네의 대중교통 여건(버스, 택시, 지하철, 기차 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오	☐
우리 동네의 의료서비스 여건(보건소, 병의원, 한방병원, 약국 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오	☐

2. 가장 많이 접촉하는 친척(가족포함)과 얼마나 자주보거나 연락합니까?

- ① 한 달에 1번 미만
 ② 한 달에 1번
 ③ 한 달에 2~3번
 ④ 일주일에 1번
 ⑤ 일주일에 2~3번
 ⑥ 일주일에 4번 이상

☐

3. 가장 많이 접촉하는 이웃과 얼마나 자주보거나 연락합니까?

- ① 한 달에 1번 미만
 ② 한 달에 1번
 ③ 한 달에 2~3번
 ④ 일주일에 1번
 ⑤ 일주일에 2~3번
 ⑥ 일주일에 4번 이상

☐

4. 가장 많이 접촉하는 친구(이웃제외)와 얼마나 자주보거나 연락합니까?

- ① 한 달에 1번 미만
 ② 한 달에 1번
 ③ 한 달에 2~3번
 ④ 일주일에 1번
 ⑤ 일주일에 2~3번
 ⑥ 일주일에 4번 이상

☐

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

5. 다음 활동에 한 달에 한 번(1회) 이상 정기적으로 참여합니까?

종교활동	① 예 ② 아니오
친목활동(계모임, 동창회, 노인정, 향우회, 종친회 등)	① 예 ② 아니오
여가/레저 활동	① 예 ② 아니오
자선단체 활동	① 예 ② 아니오

☐

☐

☐

☐

손 씻기

1. 손 씻기가 감염병(전염병) 예방에 어느 정도 도움이 된다고 생각합니까?

- ① 매우 도움이 된다
 ② 도움이 된다
 ③ 도움이 되지 않는다
 ④ 전혀 도움이 되지 않는다

☐

2. 최근 1주일 동안 식사하기 전 얼마나 자주 손을 씻었습니까?

- ① 항상 씻었다
 ② 자주 씻었다
 ③ 가끔 씻었다
 ④ 거의 씻지 않았다

☐

3. 최근 1주일 동안 화장실 다녀온 후 얼마나 자주 손을 씻었습니까?

- ① 항상 씻었다
 ② 자주 씻었다
 ③ 가끔 씻었다
 ④ 거의 씻지 않았다

☐

4. 최근 1주일 동안 외출 후 집에 돌아왔을 때 얼마나 자주 손을 씻었습니까?

- ① 항상 씻었다
 ② 자주 씻었다
 ③ 가끔 씻었다
 ④ 거의 씻지 않았다

☐

5. 평소 손을 씻을 때, 비누나 손 세정제를 얼마나 자주 사용합니까?

- ① 항상 사용한다
 ② 자주 사용한다
 ③ 가끔 사용한다
 ④ 거의 사용하지 않는다
 ⑤ 전혀 사용하지 않는다

☐

6. 최근 1년 동안 올바른 손 씻기에 관한 교육이나 이와 관련한 홍보물을 본 경험이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

교육 및 경제활동

1. 귀하께서는 최근 1주일 동안 수입을 목적으로 1시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급 가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태도 일을 하신 경우에 포함 됩니다.

- ① 예 ② 아니오

2. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해주시시오.
(예를 들면, 은행에서 출납 일을 함, 건설현장에서 교통정리를 함, 벽지 도배, 내과질환진료 및 치료 등)

일의 종류	
직업 분류	① 관리자 ② 전문가 및 관련종사자
	③ 사무종사자 ④ 서비스종사자
	⑤ 판매종사자 ⑥ 농·림·어업종사자
	⑦ 기능원 및 관련기능종사자 ⑧ 장치, 기계조작 및 조립종사자
	⑨ 단순노무종사자 ⑩ 군인(직업군인)
	⑪ 학생/재수생 ⑫ 주부 ⑬ 무직

2-1. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?
(※ 문항 2번 보기문항 ①~⑩에 응답하신 분만 응답해 주십시오.)

- ① 고용주 및 자영업자(내 사업을 한다)
② 임금근로자(타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다)
③ 무급가족종사자(가족, 친척의 일을 돈을 받지 않고 돕는다)
④ 비해당(문항2/⑪, ⑫, ⑬: 학생/재수생, 주부, 무직)

3. 귀하는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

- ① 무학 (→ 4번 문항으로) ② 서당/한학 (→ 4번 문항으로) ③ 초등학교
④ 중학교 ⑤ 고등학교 ⑥ 2년/3년제 대학
⑦ 4년제 대학 ⑧ 대학원 이상

3-1. 귀하는 그 학교를 졸업하셨습니다? 졸업여부를 말씀해 주십시오.

- ① 졸업 ② 수료 ③ 중퇴 ④ 재학/휴학 중
⑤ 비해당(문항3/①, ②: 무학, 서당/한학)

4. 보험회사에서 판매하는 암보험, 심혈관질환보험, 사고·보장보험 등의 의료비를 보조해주는 민간 의료보험에 가입했습니까?

- ① 예 ② 아니오

5. 귀하께서는 결혼한 적(사실혼 포함)이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 6번 문항으로)

5-1. 현재의 혼인상태는 다음 중 무엇에 해당됩니까?

- ① 배우자가 있으며, 함께 살고 있음
② 배우자가 있으나, 함께 살고 있지 않음(출장 등의 일시적 상태 제외)

- ③ 배우자 사망으로 배우자가 없음
- ④ 이혼으로 배우자가 없음
- ⑤ 비해당(문항5/②: 결혼한 적이 없음)

6. 현재 살고 있는 광역 시·도에서 얼마나 오래 살았습니까?

- ① 5년 미만
- ② 5-10년 미만
- ③ 10-15년 미만
- ④ 15-20년 미만
- ⑤ 20년 이상

☐

7. 현재 살고 있는 시·군·구에서 얼마나 오래 살았습니까?

- ① 5년 미만
- ② 5-10년 미만
- ③ 10-15년 미만
- ④ 15-20년 미만
- ⑤ 20년 이상

☐

최 종 점 검 자			
입 력 완 료 일			
재 조 사 일			
재 조사 완료일			

건강조사 정확하게 지역사회 튼튼하게

설문에 응해주셔서 감사합니다.

답례품 수령 확인

설문을 마친 후 조사원으로부터 답례품을 받았습니다.

2013년 월 일

성명

서명 또는 날인

※ 개인조사는 마쳤습니다. 가구대표 1명이 가구조사에 참여하여 주십시오.



4부 >> 부록

II.

CHS

Community Health Survey

다음은 2013년 지역사회건강조사 가구조사표입니다. ➔

2013년 지역사회건강조사 가구명부

시도 보건소 표본지점 가구

번호 :

가구현황

주소	(표본지점 주소)			총 방문횟수	() 회	
	(이하 상세주소)		방문 일		1차	2013. . .
	집전화 ☎ () - -			2차	2013. . .	
				3차	2013. . .	

가구원현황

‘가구조사’ 기입란은 가구조사를 한 대표 가구원 1인만 ☒ 하십시오

가구원 번호	가구원 성명	성별	주민등록상 생년월일	가구주와의 관계	휴대전화	조사수행 여부	미수행 사유	가구 조사
01		남 / 여			- -	Y / N		☐
02		남 / 여			- -	Y / N		☐
03		남 / 여			- -	Y / N		☐
04		남 / 여			- -	Y / N		☐
05		남 / 여			- -	Y / N		☐
06		남 / 여			- -	Y / N		☐
07		남 / 여			- -	Y / N		☐
08		남 / 여			- -	Y / N		☐
09		남 / 여			- -	Y / N		☐
10		남 / 여			- -	Y / N		☐
11		남 / 여			- -	Y / N		☐
12		남 / 여			- -	Y / N		☐

조사원 성명: _____

가구완료

조사인원 : 만 19세 이상 성인 ()명 중 ()명 조사
 조사완료 : 만 19세 이상 성인을 모두 조사하였습니까? ☐예 ☐아니오
 가구조사 : 가구 대표1명만 가구조사를 실시하였습니까? ☐예 ☐아니오
 답례품전달 : 조사인원 수만큼 답례품을 제공하였습니까? ☐예 ☐아니오
 가구선정통지문 : 이 가구는 가구선정통지문을 받았습니까? ☐예 ☐아니오

가구조사

※ 가구대표 1명만 가구조사에 참여해 주시기 바랍니다.

1. 세대 유형은 다음 중 무엇에 해당합니까?

1 세 대	☐ 1. 1인 가구	☐ 2. 응답자 + 미혼형제자매	☐ 7. 기타 : 상기를 제외한 모든 1세대 가구
	☐ 3. 부부(응답자 + 배우자)	☐ 4. 부부 + 기타 친인척	
	☐ 5. 부부 + 미혼형제자매	☐ 6. 응답자 + 기타 친인척	
2 세 대	☐ 8. 부부 + 미혼자녀	☐ 9. 부부 + 양친	☐ 10. 조부모 부부 + 미혼 손자녀
	☐ 11. 편부 + 미혼자녀	☐ 12. 부부 + 편부모	☐ 13. 편조부/편조모 + 미혼 손자녀
	☐ 14. 편모 + 미혼자녀	☐ 15. 부부 + 자녀 + 부부의 형제 또는 자매	☐ 16. 기타 : 상기를 제외한 모든 2세대 가구
3 세 대	☐ 17. 부부 + 미혼자녀 + 양친		
	☐ 18. 부부 + 미혼자녀 + 편부모		
	☐ 19. 기타 상기를 제외한 모든 3세대 이상 가구		

2. 귀 가구는 현재 기초생활 수급자(구. 생활보호대상자 혹은 영세민)입니까?

- ① 그렇다
② 지금은 아니지만, 과거에 수급자였던 적이 있다
③ 아니다

3. 지금 살고 있는 집은 다음 중 어떤 형태에 해당하십니까?

- ① 단독주택
- ② 아파트
- ③ 연립주택
- ④ 다세대 주택
- ⑤ 영업용 건물 내 주택
- ⑥ 기타()

4. 임금, 부동산 소득, 연금, 이자, 정부 보조금, 친척이나 자녀들의 용돈 등 모든 수입을 합쳐 **최근 1년 동안** 가구의 총 소득은 대략 얼마입니까? 만일 연간 소득을 대답하기 어려운 경우 월 평균 액수를 말씀해 주십시오.

(기준기간)

(소득액)

- ① 연

--	--	--	--	--

 만원

5. 귀 가구는 현재 치매환자와 함께 거주하고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오



4부 >> 부록

Ⅲ. 2010-2013

	산출지표	(2010-2013) 제1기 순환조사				비고
		2010	2011	2012	2013	
	흡연시작연령	○	○	○	○	'08 지표명: 처음 흡연경험연령
	현재 흡연율	○	○	○	○	
	남자 현재흡연율	○	○	○	○	
	매일 흡연자의 하루 평균 흡연량	○	○	○	○	
	흡연자의 1개월 내 금연 계획률	○	○	○	○	
	흡연자의 금연 시도율	○	○	○	○	
	흡연자의 금연이유	○	-	○	-	
	흡연자의 금연방법	○	-	○	-	
	가정실내 간접흡연 노출률	○	○	-	○	'08년 지표명: 가정 내 간접흡연 노출률
	가정실내 간접흡연 노출시간	○	○	-	○	
	직장실내 간접흡연 노출률	○	○	-	○	
	직장실내 간접흡연 노출시간	○	○	-	○	
	금연캠페인 경험률	○	○	○	○	
	금연교육 경험률	○	○	○	○	
	현재흡연자의 금연교육 경험률	○	○	○	○	
	금연구역 내 흡연 경험률	-	○	-	○	
	금연구역 인지율	-	○	-	○	
	공공장소 간접흡연 노출률	-	○	-	○	
	현재 흡연자의 금연권고 경험률	-	-	-	○	
	금연클리닉, 금연상담전화 인지율	-	-	-	○	
	현재 흡연자의 금연클리닉, 금연상담전화 이용율	-	-	-	○	
음주	평생 음주율	○	○	○	○	
	음주시작연령	○	○	○	○	'08년 지표명: 처음 음주경험연령
	연간 음주율	○	○	○	○	
	월간 음주율	○	○	○	○	
	고위험 음주율	○	○	○	○	
	알코올 의존정도(AUDIT)	○	-	○	-	
	고위험 음주행동 분포	-	-	-	-	
	음주문제로 인한 상담 경험률	○	○	○	○	
	음주시작동기	-	-	-	○	
	연간 음주자의 금주권고 경험률	-	-	-	○	

	산출지표	(2010-2013) 제1기 순환조사				비고
		2010	2011	2012	2013	
	운전 시 안전벨트 착용률	○	○	○	○	
	동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	○	○	○	○	
	연간 음주운전 경험률 (자동차 또는 오토바이)	○	○	○	○	'08 지표명: 연간 음주운전 경험률(자동차, 오토바이)
	연간 자동차 음주운전 경험횟수	○	○	○	○	
	연간 자동차 음주운전차량 동승률	○	○	○	○	
	오토바이 헬멧 착용률	○	○	-	○	'09년 지표명: 오토바이 보호장구(헬멧 등) 착용률
	연간 오토바이 음주운전 경험횟수	○	○	-	-	
	자전거 헬멧 착용률	○	○	-	○	'09년 지표명: 자전거 보호 장구(헬멧, 무릎보호대)착용률
	스쿨존 인지율	-	○	-	-	
	스쿨존 과속운전 경험률	-	○	-	-	
	'1339' 전화번호 인지율	-	○	-	-	
운동 및 신체활동	격렬한 신체활동 실천율	○	○	○	○	
	중등도 신체활동 실천율	○	○	○	○	
	중등도 이상 신체활동 실천율	○	○	○	○	
	걷기 실천율	○	○	○	○	'08년 지표명: 걷기운동 실천율
	지역사회 내 운동시설 접근율	○	-	○	-	'08년 지표명: 지역사회 내 운동시설 접근성
	지역사회 내 운동프로그램 참여율	○	-	○	-	
	주중(월~금) 여가시간에 있어서 보내는 시간	-	○	-	○	
	주말(토~일) 여가시간에 있어서 보내는 시간	-	○	-	○	
	근력운동 실천율	-	○	-	○	
	유연성운동 실천 빈도	-	○	-	○	
식생활	아침식사 섭취빈도	○	○	○	○	
	아침결식예방 인구비율	○	○	○	○	
	저염 선호율	○	○	○	○	
	가공식품 선택 시 영양표시 이용률	○	○	○	○	
	영양교육 및 상담 수혜율	○	○	○	○	
	식품 안정성 확보율	○	○	○	○	
	식생활 지침 인지율	○	-	○	-	
	식생활 실천지침 점수	○	-	-	-	
	과일 섭취율	-	○	-	○	
	생채소 섭취율	-	○	-	○	

	산출지표	(2010-2013) 제1기 순환조사				비고
		2010	2011	2012	2013	
및 체중조절	비만율	○	○	○	○	'08 지표명: 비만인구율
	평균 BMI(체질량지수)	○	○	○	○	
	주관적 비만인지율	○	○	○	○	
	체중조절 시도율	○	○	○	○	
	체중조절 시도방법	○	-	○	-	
구강건강	주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	○	○	○	○	
	저작불편 호소율(65세 이상)	○	○	○	○	
	발음불편 호소율(65세 이상)	○	○	○	○	
	틀니 이용 행태(65세 이상)	○	○	○	○	
	점심식사 후 칫솔질 실천율	○	○	○	○	
	구강검진 수진율	○	○	○	○	
	연간 스케일링 경험률	○	○	○	○	
	치아 결손 형태(65세 이상)	-	○	-	○	'08년 지표명: 치아결손형태
	치실 및 치간솔 이용률	-	○	-	○	
	무자격자 치과시술률	-	○	-	○	
	치과진료 미치료율	-	○	○	○	
	치과진료 미치료 이유	-	○	○	○	
	주관적 틀니 필요 인지율(65세 이상)	-	○	-	○	
	주관적 잇몸 건강인지율	-	○	-	○	
정신건강	하루 평균 수면시간	○	○	○	○	
	스트레스 인지율	○	○	○	○	'08년 지표명: 주관적 스트레스 인지율
	주관적 스트레스 인지정도	-	-	-	-	
	스트레스로 인한 정신 상담률	○	○	○	○	
	우울감 경험률	○	○	○	○	
	우울증상으로 인한 정신상담률	○	○	○	○	
	자살생각률	-	-	-	○	
	자살생각으로 인한 정신상담률	-	-	-	○	
	자살시도율	-	-	-	○	
	자살시도로 인한 정신상담률	-	-	-	○	
	인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 일상생활 지장 경험 빈도	-	-	-	○	
	인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률	-	-	-	○	

	산출지표	(2010-2013) 제1기 순환조사				비고
		2010	2011	2012	2013	
및 예방접종	연간 인플루엔자 예방접종률	○	○	○	○	
	건강검진 수진율	○	-	○	-	
	건강검진 사후 관리 상담률	○	-	○	-	
	건강검진 미수진 이유	○	-	○	-	
	암 검진율	○	-	○	-	
	최근 2년간 수검 암 검진 종류(남/여)	○	-	○	-	: 암종별
	암 검진 사후관리 상담률	○	-	○	-	
	암 검진 미수진 이유	○	-	○	-	
	신종 인플루엔자 예방접종률	○	-	-	-	
이환	만성·급성질환 및 사고중독 경험률	○	○	○	○	'08-'10년 영역: 활동제한 삶의 질
	만성·급성질환 및 사고중독 경험일수	○	○	○	○	
고혈압	연간 평균 혈압 측정횟수	○	○	○	○	
	고혈압 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	'08년 지표명: 고혈압 평생 의사진단 유병률
	본인 인지 혈압조절률	○	○	○	○	
	고혈압 현재치료율	○	○	○	○	
	고혈압 약물치료율	○	○	○	○	'08년 지표명: 혈압조절약의 정기적 복용률
	고혈압 관리교육 이수율	○	○	○	○	
	고혈압 관리교육 장소	○	○	○	○	
	고혈압 의료기관 방문횟수	-	-	○		
	혈압 인지율	-	○	-	○	
	고혈압 신장질환 합병증검사 수진율	-	○	-	○	
	고혈압 심장질환 합병증검사 수진율	-	○	-	○	
	고혈압 뇌혈관질환 합병증검사 수진율	-	○	-	○	
당뇨병	연간 평균 혈당 측정횟수	○	○	○	○	
	당뇨병 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	'08년 지표명: 당뇨병 평생 의사진단 유병률
	본인 인지 혈당조절율	○	○	○	○	
	당뇨병 현재치료율	○	○	○	○	
	당뇨병 치료율	○	○	○	○	'08년 지표명: 당뇨병 관리형태(혈당관리방법)
	당뇨병 관리교육 이수율	○	○	○	○	
	당뇨병 관리교육 장소	○	○	○	○	
	당뇨병 의료기관 방문횟수	-	-	○	-	
	당화혈색소 인지율	-	-	○	-	
	당화혈색소 검사 횟수	-	-	○	-	
	당뇨병 안질환 합병증검사 수진율	○	○	○	○	'08년 지표명: 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율
	당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율	○	○	○	○	'08년 지표명: 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율
	혈당 인지율	-	○	-	○	

	산출지표	(2010-2013) 제1기 순환조사				비고
		2010	2011	2012	2013	
지질혈증	이상지질혈증(고지혈증 포함) 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	'08 지표명: 고지혈증 평생 의사진단 유병률 '09-'10년 지표명: 고지혈증 평생 의사진단 경험률
	총 콜레스테롤 인지율	-	○	-	○	
뇌졸중	뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률(≥50)	○	○	○	○	'08년 지표명: 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 유병률
심근경색증	심근경색증 평생 의사진단 경험률(≥40)	○	○	○	○	'08년 지표명: 심근경색증 평생 의사진단 유병률
협심증	협심증 평생 의사진단 경험률(≥40)	○	○	○	○	'08년 지표명: 협심증 평생 의사진단 유병률
관절염	관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)	○	○	○	○	'08년 지표명: 골관절염 평생 의사진단 유병률
	관절염 현재치료율(≥50)	○	○	○	○	
	관절염 관리교육 이수율(≥50)	○	○	○	○	
	관절염 관리교육 장소(≥50)	○	○	○	○	
골다공증	골다공증 평생 의사진단 경험률(≥50)	○	○	○	○	'08년 지표명: 골다공증 평생 의사진단 유병률
폐결핵	폐결핵 평생 의사진단 경험률	○	○	○	-	'08년 지표명: 폐결핵 평생 의사진단 유병률
천식	천식 증상 경험률	○	○	○	○	'08년 지표명: 천식 평생 의사진단 유병률
	운동성 천식이환율	○	○	○	○	
	천식 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	
알레르기 비염	알레르기비염 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	'08년 지표명: 알레르기성 비염 평생 의사진단 유병률
아토피 피부염	아토피피부염 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	'08년 지표명: 아토피피부염 평생 의사진단 유병률
백내장	백내장 평생 의사진단 경험률(≥50)	○	○	○	○	'08년 지표명: 백내장 평생 의사진단 유병률
녹내장	녹내장 평생 의사진단 경험률(≥50)	-	○	-	-	'08년 지표명: 녹내장 평생 의사진단 유병률
B형 간염	B형 간염 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	'08년 지표명: B형 간염 평생 의사진단 유병률
C형 간염	C형 간염 평생 의사진단 경험률	-	-	○	-	
빈혈	빈혈 평생 의사진단 경험률	-	-	○	-	
중이염	중이염 평생 의사진단 경험률	-	-	○	-	
위십이지장 궤양	위십이지장궤양 평생 의사진단 경험률	-	-	○	-	
치질	치질 평생 의사진단 경험률	-	-	○	-	
암	암 평생 의사진단 경험률	-	-	○	-	
요실금	요실금 평생 의사진단 경험률	-	○	○	-	'08년 지표명: 요실금 평생 의사진단 유병률

	산출지표	(2010-2013) 제1기 순환조사				비고
		2010	2011	2012	2013	
	전립선 평생 의사진단 경험률	-	○	-	-	
	전립선 증상 점수	-	○	-	-	
	배뇨증상 관련 삶의 질	-	○	-	-	
갑상선	갑상선 장애 평생 의사진단 경험률	-	-	○	-	
우울증	우울증 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	
대사 증후군	대사증후군 인지율	○	○	○	○	
	대사증후군 매체경험률	○	-	-	-	
에이즈	에이즈 인지율	○	○	○	○	
	에이즈 매체경험률	○	-	-		
	에이즈에 대한 지식 정답률	-	○	-	○	
	에이즈에 대한 긍정적 태도율	-	○	-	○	
과민성 방광	과민성방광 증상 점수	-	-	○	-	
	과민성방광 평생 의사진단 경험률	-	-	○	-	
심뇌혈관 질환 예방관리	심뇌혈관질환 인지율	-	-	-	○	
	심뇌혈관질환 매체 경험률	-	-	-	○	
	심뇌혈관질환 예방관리수칙 인지율	-	-	-	○	
	심뇌혈관질환 예방생활수칙 매체 경험률	-	-	-	○	
의료이용	필요의료서비스 미치료율	○	○	○	○	'10 치과포함 미치료율
	필요의료서비스 미치료 이유	-	○	○	○	
	필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율	○	○	○	○	
사고 및 중독	연간 사고중독 경험률	○	○	○	○	'08년 지표명: 사고중독 발생률
	연간 사고중독 건수율	○	○	○	○	'08년 지표명: 연간 사고중독 발생 건수율
	계절별 사고중독 건수율	○	-	-	-	
	원인별 사고중독 건수율	○	-	-	-	
	의도성 및 비의도성 사고분포	○	-	-	-	
	주 치료처별 분포	○	-	-	-	'08년 지표명: 연간 사고중독 치료 의료기관
	연간 낙상 경험률	-	○	-	○	
	연간 낙상 건수율	-	○	-	○	
	장소별 낙상 분포	-	○	-	○	
	원인별 낙상 분포	-	○	-	○	
	낙상에 대한 두려움	-	○	-	○	

	산출지표	(2010-2013) 제1기 순환조사				비고
		2010	2011	2012	2013	
및 삶의 질	양호한 주관적 건강수준 인지율	○	○	○	○	'09-'11 지표명: 주관적 건강수준 인지율
	침상와병 경험률	○	○	○	○	
	침상와병 일수	○	○	-	-	'08년 지표명: 연간 침상와병일수
	결근결석 경험률	○	○	○	○	
	결근결석 일수	○	○	-	-	'08년 지표명: 연간 결근결석일수
	삶의 질 지수(EQ-5D Index)	○	○	○	○	
	오늘의 건강상태(EQ-VAS)	○	○	○	○	
	행복감지수	-	○	-	○	
보건기관 이용	보건기관 이용률	○	○	○	○	
	최근 1년(365일) 동안 주로 이용한 보건기관	○	○	○	○	
	보건기관을 이용하게 되는 주된 이유	○	○	○	○	
	보건기관 이용서비스 종류	○	○	○	○	
	보건기관 서비스 만족도	○	○	○	○	
	보건기관을 이용하지 않는 이유	○	○	○	○	
	보건기관 질병 홍보 및 교육 경험률					
	고혈압, 당뇨병, 관절염	○	○	○	○	
	아토피·천식, 치매	-	○	○	○	
사회 물리적 환경	지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율	-	○	-	○	
	사회적 연결망(친척, 이웃, 친구)	-	○	-	○	
	사회활동 참여율	-	○	-	○	
심정지	심폐소생술 인지율	-	-	○	-	
	심폐소생술 교육경험률	-	-	○	-	
	심폐소생술 마네킹 실습 경험률	-	-	○	-	
	심폐소생술 시행능력률	-	-	○	-	
개인위생	손 씻기 감염병 예방 인지율	-	-	-	○	
	손 씻기 실천율(식사 전)	-	-	-	○	
	손 씻기 실천율(화장실 다녀온 후)	-	-	-	○	
	손 씻기 실천율(외출 후)	-	-	-	○	
	비누 혹은 손세정제 사용 빈도	-	-	-	○	
	손 씻기 교육 및 홍보 경험률	-	-	-	○	

참고문헌

1. , 삶의 질 조사도구(EQ-5D)의 질
가중치 추정 연구 보고서. 2007
2. 보건복지부. 질병관리본부. 2011 국민건강통계,
국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011). 2012.
3. 보건복지부. 질병관리본부. 2011 국민건강통계,
국민건강영양조사 제5기 3차년도(2012). 2013.
4. Brownson, R. C.(2011). Evidence-based
public health(2nd ed). Oxford ; New York:
Oxford University Press.

참여연구진

지역 책임 교수

이 중 정

인 제 대 학 교

지역 부 책임 교수

정 인 성

계 명 대 학 교

지역 담당 연구원

최 영 철

계 명 대 학 교

지역 담당 연구 보조원

최 광 득

계 명 대 학 교

최 정 예

계 명 대 학 교

유 동 국

계 명 대 학 교

최 정 인

계 명 대 학 교

조사 관리 담당관

제 순 경

울 주 군 보 건 소

지 역 조 사 원

김 미 자

울 주 군 보 건 소

박 은 경

울 주 군 보 건 소

안 미 경

울 주 군 보 건 소

이 원 주

울 주 군 보 건 소

허 연 희

울 주 군 보 건 소

2013년 울산광역시 울주군 지역사회 건강통계

발 행 : 2014. 3.

발 행 인 : 신 장 열 (울산광역시 울주군수)

편 집 인 : 이 중 정 (계명대학교)

발 행 처 : 기 관 명 울산광역시 울주군보건소

홈페이지 <http://health.ulju.ulsan.kr/main/main.asp>

주 소 (689-812) 울산광역시 울주군 삼남면 서향교1길 67-12

전화번호 (052) 229-8048

팩 스 (052) 229-8049

이 책은 울산광역시 울주군보건소에 소유권이 있습니다. 울산광역시 울주군보건소 승인 없이 상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.