

발 간 등 록 번 호

11-1352477-000174-10

ISSN 2092-2876
통계승인번호 제 11775호

2014 지역사회 건강통계

울산광역시 울주군





발간사



안녕하십니까?

울주군 보건소장 김홍식입니다.

건강하고 행복한 삶을 영위하고자 하는 우리의 욕구와 노력으로 우리나라 국민들의 평균기대 수명은 81.2세로 OECD 국가들의 평균을 넘어 선지 이미 오래된 이때 공공보건의료사업은 어느 때보다도 그 역할이 크다 하겠습니다.

이에 대응하기 위하여 울주군 보건소도 더 건강한 울주군을 만드는 사명에 혼신을 다하고자 그간 보건진료소, 보건지소 일체 시설개선을 완료하여 보다 질 높은 보건의료서비스 제공에 기여하였습니다. 또한 장애인 재활사업, 건강생활 실천사업, 감염병 예방사업 등의 추진으로 중앙정부 등으로부터 우수기관으로 표창을 수상했으며, 지난 3년 연속 전국 군 단위 건강도시 평가 1위를 받았습니다.

그러나 앞으로 우리가 당면하고 있는 현실은 그리 낙관적이지 않습니다. 생활양식이 서구화 되면서 고혈압, 당뇨병과 같은 만성질환은 지속적으로 늘어나고 있습니다. 이러한 질환들은 평생 치료와 투약이 필요하며, 쉽게 고쳐지지 않는 특성이 있습니다.

이에 따라 우리 보건소도 사전 예방적 기능 중심으로 전환하여 건강증진사업 등에 지속적으로 매진해 나가겠습니다.

이번 조사한 지역사회 건강통계는 보다 과학적이고 체계적인 보건의료서비스를 제공하기위한 기초자료로 활용하고자 책자로 발간하게 되었습니다. 지역사회 주민들의 건강향상을 위한 보다 수준 높은 보건의료서비스를 지속적이고 효율적으로 수행하도록 최선의 노력을 기울이겠습니다.

이번 조사를 전담해 주신 계명대학교 의과대학 이중정 책임교수님과 관계자 여러분의 노고에도 감사드리며 명품 울주군민들의 모든 가정에 건강과 행복을 기원합니다.

감사합니다.

2015. 3.

울산광역시 울주군보건소장 김홍식



발간에 즈음하여

우리가 살고 있는 지역을 건강하게 만들어 가기 위한 기본 자료인 2014년 지역사회 건강조사를 마치고 지역사회건강통계를 발간하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다.

지역사회 건강조사가 매년 어렵고 힘든 문제를 당면하고 해결해 나가면서 조사의 질적인 부분에서 해를 거듭할수록 성장해 나가는 것 같습니다.

울산 울주군을 대상으로 한 분석결과들은 시민 건강의 소중한 지표입니다. 지금까지 어느 조사도 제시하지 못하였던 다양한 울산 울주군 구민의 건강행태, 건강 수준과 삶의 질의 수준에 대해 지역사회건강조사가 시작된 2008년 이후의 축적된 정보를 산출할 수 있게 되었습니다.



이 소중한 정보를 활용하여 전국 혹은 타 시, 군과 결과를 비교분석, 우리 지역 보건사업의 우선순위를 결정하는 데에도 활용할 수 있을 것입니다. 또한 우리 울주군이 그 기간 동안의 변화를 바탕으로 보건사업을 새로이 시작할지, 확대할지, 축소하여도 좋을지 등의 판단도 가능할 것으로 생각합니다.

선진국에서는 정책의 윤리성을 강조합니다. 이는 지역주민의 세금으로 운영 되는 모든 지역사업의 계획과 평가는 사실과 근거를 바탕으로 하여 수행하여야 한다는 의미일 것입니다. 주민의 건강행태, 질병의 이환상태와 삶의 질에 대한 사실에 근거한 계획과 보건사업의 평가만이 탁상공론과 선심성 의사결정에 의한 낮은 지역보건사업의 수준을 극복하고, 매해 실제 주민들을 대상으로 파악한 현황 및 요구를 바탕으로 하여 지역 주민의 요구와 필요를 충족시킴으로써, 주민의 건강문제를 해결 할 수 있는 높은 수준의 보건사업을 펼칠 수 있을 것입니다.

소중한 자료의 수집을 위하여 여러 어려움에도 불구하고, 묵묵히 성공적인 조사를 함께 수행한 울산 울주군 조사원 여러분과 조사에 응해 주신 울주군 구민 여러분께 감사드립니다.

그리고 어려운 조사에 격려를 아끼지 않으시고 아낌없는 행정적인 지원을 해주신 울주군 보건소장님 이하 계장님, 사업 담당자 여러분들께 깊은 감사를 드립니다. 마지막으로 통계집이 나올 수 있도록 애써주신 계명대학교 연구진들께도 감사드립니다.

2015. 3.

계명대학교 의과대학 책임교수 이중정

이용자를 위하여

- ❖ 지역사회건강조사는 질병관리본부 연구윤리심의위원회 승인을 받아 수행하였으며(승인번호 : 2014-08EXP-09-4C-A), 본 통계집은 2014. 8. 16. - 2014. 10. 31. 울산광역시 울주군에서 실시된 지역사회건강조사 결과를 수록한 자료입니다.
- ❖ 본 통계집에 제시된 추정치는 가중치를 적용한 결과(조율)이며, 가중치는 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율, 개인응답률, 당해 연도 모집단 성·연령별 인구 구성비를 반영하여 산출하였습니다.
- ❖ 2부 주요통계결과에서 2010-2014년 비교 가능한 지표(표준화율)에 대해서 당해 연도의 전체·성·연령별 그래프와 함께 울주군 및 울산광역시의 연도별 추이 그래프를 제시하였으며, 증감 현황을 기술하였습니다. 지표정의가 변경된 경우 변경내용을 각주로 표시하였으며, 해당 연도 통계치는 연도별 추이 그래프에서 제외하였습니다. 조사문항 변경내용은 제4부 부록 <연도별 문항비교표>에서 확인하실 수 있습니다.
- ❖ 제3부 통계표에서는 당해 연도에 선정된 주요지표의 상세분석결과를 제시하였으며, 주요지표를 포함한 모든 산출지표의 통계표는 엑셀파일 형태로 지역사회건강조사 홈페이지(<http://chs.cdc.go.kr>) 자료실에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
- ❖ 본 자료 중 2008-2013년 수치는 응답의 이상치와 논리적 오류를 수정하여 산출된 결과로 기 발간된 보고서의 수치와 일부 다를 수 있습니다.
- ❖ 분석대상자 수(N)가 20명 미만인 경우 제2부 주요통계결과에서 제시하지 않았으며 제3부 통계표에서 해당 값을 하이픈(-)으로 처리하였습니다. 변동계수(또는 상대표준오차, Coefficient of Variation, CV)가 30%이상인 경우 ‘*’를 표시하였으며, 변동계수가 크다는 것은 추정치의 신뢰도가 낮다는 것을 의미하므로, 변동계수가 30% 이상인 경우에 결과해석 시 주의를 바랍니다.
- ❖ 통계표에 수록된 숫자는 소수점 두 번째 자리에서 반올림되었으며, 반올림된 수치의 총계가 일치하지 않을 수 있으나 이는 통계표의 오류가 아닙니다.
- ❖ 본 통계집 및 조사표, 지침서 등 기타 지역사회건강조사 관련 자료는 지역사회건강조사 홈페이지 「자료실」에서 다운로드 받으실 수 있으며, 2008년부터 2013년까지의 지역사회건강조사 원시자료는 홈페이지를 통한 신청 및 승인절차를 통해 제공하고 있습니다.
- ❖ 수록된 자료 및 지역사회건강조사에 관한 문의는 울주군보건소(☎052-229-8048), 계명대학교(☎053-580-3896)로 해주시기 바랍니다.

용어정의

통계

Community Health Survey



① 모집단(Population)

조사대상이 되는 집단 전체

② 표본(Sample)

모집단 중 조사를 위해 추출된 일부 집단

③ 표본오차(Sampling Error)

모집단 중 일부를 표본으로 선정하여 조사함에 따라 발생하는 오차로서 표본조사의 정확성을 나타내는 척도

④ 비표본오차(Non-Sampling Error)

표본추출을 제외한 조사 설계, 조사 수행, 자료 집계 및 분석 과정에서 발생하는 오차로서 불명확한 조사개념, 조사문항의 객관성 결여, 조사지 구성의 논리적 오류, 면접방법, 조사원의 자질, 조사원을 감독하는 관리자의 태도, 조사대상자의 무응답, 자료 코딩 등이 비표본오차의 주요 발생 원인에 해당

⑤ 조율(Crude Rate)

총 발생건수를 전체 모집단으로 나눈 값으로, 모집단의 성·연령별 등의 인구 집단 특성을 보정하지 않은 통계치

⑥ 표준화율(Standardized Rate)

비교하고자 하는 집단 간 인구 구조 차이를 보정한 통계치

⑦ 표준오차 (Standard Error, SE)

각 표본들의 평균이 모집단의 평균과 얼마만큼의 차이가 있는지 나타내는 값

⑧ 변동계수 (Coefficient of Variation, CV)

표준오차를 평균으로 나눈 값($\text{표준오차}/\text{추정치} \times 100$)으로 통계치의 신뢰도를 나타내는 척도이며, 변동계수와 통계치의 신뢰도는 반비례 관계

⑨ 가중치 (Weight)

전체집단에서 개별 구성요소가 차지하는 비중이나 중요도를 수치로 나타내는 값

조사

Community Health Survey



① CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

컴퓨터를 이용하여 조사 자료를 수집하는 방식으로, 조사원이 전자조사표가 설치된 노트북으로 면접조사를 수행 시, 조사현장에서 직접 자료입력, 수정, 저장 및 전송 가능

② 순환조사체계

타당도, 활용성 및 수행 가능성을 고려하여 조사항목의 순환주기를 1년, 2년, 4년으로 구분하여 조사하는 체계

③ 지역보건지표뱅크

지역사회에서 보건사업 추진 시 활용 가능한 조사문항 및 산출지표를 수집·정리한 것으로 지표별 조사문항 및 응답보기, 지표정의, 산출식, 조사주기 등 상세정보 포함

CONTENTS


발간사	
발간에 즈음하여	
이용자를 위하여	
용어정의	
2014년 울주군 주요 건강지표 요약	2
우리 지역사회의 주요 건강이슈	4

제1부 조사체계

I. 조사개요	11
1. 조사목적	12
2. 조사방법	12
3. 조사내용	12
4. 표본설계	13
5. 조사체계	14
6. 자료관리	15
7. 조사현황	15
II. 통계 추정방법	19
1. 가중치의 사용	20
2. 자료처리	21
3. 분산추정	22

제2부 주요통계결과

I. 건강행태	25
1. 흡연	26
2. 음주	32
3. 안전의식	36
4. 운동 및 신체활동	38
5. 식생활	42
6. 비만 및 체중조절	46
7. 구강건강	48
8. 정신건강	56
II. 예방접종 및 검진	63
1. 예방접종	64
2. 검진	64
III. 이환 및 의료이용	67
1. 만성·급성질환 및 사고중독 경험률	68
2. 주요 질환별 평생 의사진단 경험률 및 관리행태	70
3. 의료이용	80
IV. 사고 및 중독	83
1. 연간 사고중독 경험률	84
V. 활동제한 및 삶의 질	87
1. 양호한 주관적 건강수준 인지율	88
VI. 보건기관 이용	91
1. 보건기관 이용	92



● ● Community Health Survey

제3부 통계표

I. 통계표	97
--------------	----


제4부 부록

I. 개인조사표	157
II. 가구조사표	187
III. 지표정의	191
IV. 2008-2014 산출지표	215
참고문헌	224
참여연구진	225

CONTENTS

〈표목차〉

〈표 1〉 2014년 지역사회건강조사 주요지표 결과	2
〈표 2〉 2014년 전국공통 조사항목	12
〈표 3〉 2014년 울산광역시 지역선택 조사항목	13
〈표 4〉 동/읍·면별 표본지점 분포	14
〈표 5〉 조사현황	15
〈표 6〉 가구당 조사인원 수	15
〈표 7〉 2014년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성	17
〈표 8〉 2014년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성	18
〈표 9〉 가구가중치 산출 예	20
〈표 10〉 개인가중치 산출 예	21
〈표 11〉 보정가중치 산출 예	21
〈표 12〉 교육수준분류	22
〈표 13〉 직업분류	22



● ● Community Health Survey


〈그림목차〉

〈그림 1〉 2014년 주요지표 결과 비교 - 긍정적 지표 5	〈그림 28〉 걷기 실천율 41
〈그림 2〉 2014년 주요지표 결과 비교 - 부정적 지표 5	〈그림 29〉 지역사회 내 운동프로그램 참여율 · 41
〈그림 3〉 2014년 주요지표 우선순위 7	〈그림 30〉 저염선택율(2014) 43
〈그림 4〉 표본선정과정 13	〈그림 31〉 저염선택율(연도비교) 43
〈그림 5〉 수행체계 14	〈그림 32〉 영양표시 활용률 43
〈그림 6〉 수행과정 15	〈그림 33〉 식품 안정성 확보율 45
〈그림 7〉 전화점검 절차 15	〈그림 34〉 영양교육 및 상담수혜율 45
〈그림 8〉 가중치 산출 과정 20	〈그림 35〉 비만을 47
〈그림 9〉 현재 흡연율 27	〈그림 36〉 주관적 비만인지를 47
〈그림 10〉 흡연시작연령 27	〈그림 37〉 체중조절 시도율 47
〈그림 11〉 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량 · 27	〈그림 38〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 49
〈그림 12〉 현재흡연자의 금연시도율 29	〈그림 39〉 저작불편호소율(65세 이상) 49
〈그림 13〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률 · 29	〈그림 40〉 틀니 이용 행태 (50세 이상) (2014) 51
〈그림 14〉 금연교육 경험률 29	〈그림 41〉 틀니 이용 행태 (50세 이상) (연도비교) 51
〈그림 15〉 금연구역 인지율 31	〈그림 42〉 치솔질 실천율 53
〈그림 16〉 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률 31	〈그림 43〉 구강검진 수진율 55
〈그림 17〉 공공장소 간접흡연 노출률 31	〈그림 44〉 연간 스케일링 경험률 55
〈그림 18〉 월간음주율 33	〈그림 45〉 스트레스 인지율 57
〈그림 19〉 음주시작연령 33	〈그림 46〉 우울감 경험률 57
〈그림 20〉 고위험음주율 35	〈그림 47〉 자살생각률 59
〈그림 21〉 평생 음주예방 교육 경험률 35	〈그림 48〉 자살시도율 59
〈그림 22〉 운전 시 안전벨트 착용률 37	〈그림 49〉 자살생각으로 인한 정신상담률 61
〈그림 23〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 · 37	〈그림 50〉 스트레스 원인 61
〈그림 24〉 연간 음주운전 경험률 (자동차 또는 오토바이) 37	〈그림 51〉 인터넷, 게임(오락), 스마트 폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률 · 61
〈그림 25〉 격렬한 신체활동 실천율 39	〈그림 52〉 연간 인플루엔자 예방접종률 65
〈그림 26〉 중등도 신체활동 실천율 39	〈그림 53〉 건강검진 수검율 65
〈그림 27〉 중등도 이상 신체활동 실천율 39	〈그림 54〉 암 검진율 65

CONTENTS

〈그림목차〉

〈그림 55〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률 · 69	
〈그림 56〉 고혈압 평생 의사진단 경험률 71	
〈그림 57〉 고혈압 약물치료율(≥30) 71	
〈그림 58〉 고혈압 관리교육 이수율(≥30) 71	
〈그림 59〉 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30) · 73	
〈그림 60〉 당뇨병 치료율(≥30) 73	
〈그림 61〉 당뇨병 관리교육 이수율(≥30) 73	
〈그림 62〉 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30) 75	
〈그림 63〉 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30) 75	
〈그림 64〉 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50) · 77	
〈그림 65〉 관절염 관리교육 이수율(≥50) 77	
〈그림 66〉 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30) 77	
〈그림 67〉 대사증후군 인지율 79	
〈그림 68〉 평생 치매 선별검사 수검율(≥60) 79	
〈그림 69〉 필요의료서비스 미치료를 81	
〈그림 70〉 연간 사고중독 경험률 85	
〈그림 71〉 양호한 주관적 건강수준 인지율 ... 89	
〈그림 72〉 보건기관 이용률 93	



● ● Community Health Survey

〈통계표목차〉

〈표 14〉 현재흡연율	98	〈표 42〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	126
〈표 15〉 흡연시작연령	99	〈표 43〉 저작불편호소율 : 65세 이상	127
〈표 16〉 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량 ...	100	〈표 44〉 틀니 이용 행태 : 50세 이상	128
〈표 17〉 현재흡연자의 금연시도율	101	〈표 45〉 어제 하루 칫솔질 실천율	129
〈표 18〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률	102	〈표 46〉 구강검진 수진율	130
〈표 19〉 금연교육 경험률	103	〈표 47〉 연간 스케일링 경험률	131
〈표 20〉 금연구역 인지율	104	〈표 48〉 스트레스 인지율	132
〈표 21〉 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률	105	〈표 49〉 우울감 경험률	133
〈표 22〉 공공장소 간접흡연 노출률	106	〈표 50〉 자살생각률	134
〈표 23〉 월간음주율	107	〈표 51〉 자살시도율	135
〈표 24〉 음주시작연령	108	〈표 52〉 자살생각으로 인한 정신상담률	136
〈표 25〉 고위험음주율	109	〈표 53〉 스트레스원인	137
〈표 26〉 평생 음주예방 교육 경험률	110	〈표 54〉 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률 ...	138
〈표 27〉 운전 시 안전벨트 착용률	111	〈표 55〉 연간 인플루엔자 예방접종률	139
〈표 28〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 ...	112	〈표 56〉 건강검진 수진율	140
〈표 29〉 연간 음주운전 경험률 (자동차 또는 오토바이)	113	〈표 57〉 암 검진율	141
〈표 30〉 격렬한 신체활동 실천율	114	〈표 58〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률 ·	142
〈표 31〉 중등도 신체활동 실천율	115	〈표 59〉 고혈압 평생 의사진단 경험률	143
〈표 32〉 중등도 이상 신체활동 실천율	116	〈표 60〉 고혈압 약물치료율	143
〈표 33〉 걷기 실천율	117	〈표 61〉 당뇨병 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율	144
〈표 34〉 지역사회 내 운동프로그램 참여율 ·	118	〈표 62〉 당뇨병 치료율	144
〈표 35〉 저염선호율	119	〈표 63〉 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 및 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 ·	145
〈표 36〉 영양표시 활용률	120	〈표 64〉 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률 ·	145
〈표 37〉 식품 안정성 확보율	121	〈표 65〉 관절염 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율	146
〈표 38〉 영양교육 및 상담수혜율	122	〈표 66〉 고혈압 관리교육 장소 및 고혈압 관리교육 이수율	147
〈표 39〉 비만도 분포 및 비만율	123		
〈표 40〉 주관적 비만인지율	124		
〈표 41〉 체중조절 시도율	125		

CONTENTS

〈통계표목차〉

〈표 67〉 당뇨병 관리교육 장소 및 당뇨병 관리교육 이수율	147
〈표 68〉 관절염 관리교육 장소 및 관절염 관리교육 이수율	148
〈표 69〉 대사증후군 인지율	149
〈표 70〉 평생 치매 선별검사 수검율 : 60세 이상	149
〈표 71〉 필요의료서비스 미치료율 및 필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율	150
〈표 72〉 연간 사고중독 경험률	151
〈표 73〉 양호한 주관적 건강수준 인지율	152
〈표 74〉 보건기관 이용률	153



Community **H**ealth **S**urvey

요약

2014년 울주군 주요 건강지표 요약

‘2014년 울산광역시 울주군 지역사회건강조사’ 주요 지표결과의 변화추이와 ‘국민건강영양조사’ 결과와의 비교는 <표 1>과 같다.

<표 1> 2014년 지역사회건강조사 주요지표 결과

(단위 : %, 조율(표준오차))

분류	영역	산출지표	지역사회건강조사				국민건강영양조사	
			2011	2012	2013	2014	2012	2013
I. 건강행태	흡연	현재흡연율	24.3(1.4)	24.3(1.3)	21.9(1.2)	22.2(1.4)	25.0(0.8)	23.2(0.8)
		남자 현재흡연율	46.6(2.7)	45.4(2.5)	41.8(2.1)	41.5(2.8)	43.3(1.2)	41.4(1.4)
		흡연자의 1개월 내 금연계획률	3.9(1.2)	4.6(1.3)	6.8(1.8)	4.2(1.6)	-*	-*
		흡연자의 금연시도율	27.8(3.2)	18.1(2.8)	15.7(3.0)	15.1(3.1)	-*	-*
		가정실내 간접흡연 노출률	-***	-***	-***	5.8(1.0)	-***	-***
		직장실내 간접흡연 노출률	-***	-***	-***	40.1(1.9)	-***	-***
	음주	월간음주율	54.3(1.9)	50.2(1.6)	53.1(2.0)	57.9(1.8)	56.6(0.9)	58.3(0.9)
		고위험음주율	16.4(1.5)	15.0(1.8)	21.8(1.8)	20.2(1.6)	17.7(0.8) ¹⁾	15.9(0.7)
	안전의식	운전 시 안전벨트 착용률	88.3(1.5)	77.4(2.1)	85.9(1.3)	78.5(2.0)	65.8(1.3) ²⁾	67.3(1.2)
		동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	-*	-*	-*	70.7(2.1)	57.7(1.1)	57.3(0.9)
	신체활동	중등도 이상 신체활동 실천율	22.2(1.6)	21.8(1.6)	20.9(1.8)	29.3(2.2)	17.0(0.7)	19.9(0.7)
		걷기 실천율	41.7(2.1)	41.3(1.7)	50.4(3.6)	49.4(2.3)	38.7(1.0)	37.4(0.9)
	식생활	영양표시 활용률	-***	-***	-***	89.8(2.4)	76.5(1.7) ³⁾	82.4(1.3)
	비만 및 체중조절	비만율	20.6(1.7)	23.7(1.4)	26.4(1.4)	23.5(1.5)	-****	-****
		주관적 비만인지율	32.1(1.8)	31.8(1.7)	31.5(1.8)	36.7(1.7)	-**	-**
		체중조절 시도율	51.9(2.0)	35.1(1.8)	58.0(2.2)	52.5(1.8)	-**	-**
	구강건강	저작불편호소율(≥65)	58.7(4.6)	48.6(5.4)	46.6(3.9)	46.3(4.0)	46.6(1.7)	49.2(1.5)
	정신건강	스트레스 인지율	21.4(1.4)	33.9(1.7)	21.8(2.4)	27.3(1.9)	27.0(0.7)	23.8(0.7)
		우울감 경험률	5.4(0.7)	3.8(0.8)	3.8(0.7)	4.8(0.8)	12.9(0.5) ⁴⁾	10.7(0.5)
II. 예방접종 및 검진		연간 인플루엔자 접종률	30.2(1.9)	41.0(1.9)	37.4(1.7)	33.5(1.9)	33.5(1.0)	-*****
		건강검진 수진율	-*****	-**	-**	65.2(1.6)	56.1(1.0)	60.7(0.8)
		암 검진율	-*****	-**	-**	43.8(1.6)	47.9(1.0)	46.3(0.9)
III. 이환 및 의료이용		고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)	19.2(1.5)	17.4(1.1)	19.9(1.6)	20.8(1.6)	-***	-***
		고혈압 약물치료율(≥30)	86.7(2.7)	89.5(3.8)	84.1(3.6)	89.1(2.1)	-****	-****
		고혈압 관리교육 이수율(≥30)	16.0(2.8)	24.3(2.6)	33.6(5.0)	56.9(3.6)	-****	-****
		당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)	6.8(1.0)	8.0(0.8)	7.9(1.0)	9.6(1.0)	-****	-****
		당뇨병 치료율(≥30)	81.3(6.2)	81.2(5.3)	91.9(2.7)	85.8(4.4)	-****	-****

분류	영역	산출지표	지역사회건강조사				국민건강영양조사	
			2011	2012	2013	2014	2012	2013
		당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)	24.4(3.9)	30.2(4.8)	28.3(5.4)	58.3(5.0)	—****	—****
		당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥ 30)	26.4(5.5)	39.6(5.8)	37.1(5.0)	30.0(5.2)	—****	—****
		당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥ 30)	29.5(5.0)	51.0(5.7)	31.0(4.8)	36.0(5.2)	—****	—****
		관절염 평생 의사진단 경험률(≥ 50)	19.5(2.0)	11.7(1.5)	20.8(1.8)	18.1(2.0)	—****	—****
		관절염 관리교육 이수율(≥ 50)	21.5(3.9)	34.4(4.8)	35.9(4.9)	59.1(3.4)	—****	—****
		필요의료서비스 미치료율	16.6(1.5)	8.7(1.1)	7.2(1.5)	11.1(1.1)	16.7(0.7) ⁵⁾	12.4(0.5)
IV. 사고 및 중독(손상)		연간 사고중독 경험률	7.0(0.9)	7.6(0.9)	4.5(1.0)	2.8(0.5)	7.0(0.5) ⁶⁾	7.7(0.4)
V. 삶의 질		양호한 주관적 건강수준 인지율	48.0(2.0)	49.8(2.1)	51.0(3.2)	42.0(2.0)	32.0(0.8) ⁷⁾	33.5(0.8)

—* : 문항 다름, —** : 산출 안함, —*** : 문항 및 산출식 다름, —**** : 조사방법 다름, —***** : 지침 다름, —***** : 조사 안함

- 1) 연간음주자의 고위험음주율
- 2) 운전자의 안전벨트착용률
- 3) 영양표시이용률
- 4) 우울증상경험률
- 5) 연간미치료율(병의원)
- 6) 연간손상경험률
- 7) 주관적건강인지율

우리 지역사회의 주요 건강이슈

1. 주요지표 비교분석

주요 지표에 대하여 울산광역시 울주군의 표준화율을 전국 보건소의 표준화율 중앙값과 비교하였다. <그림 1>과 <그림 2>은 각각 긍정적 지표와 부정적 지표에 대하여 울산 울주군과 전국의 결과를 비교한 차트이다. 긍정적 지표는 높은 값을 긍정적으로 해석할 수 있는 지표이며, 부정적 지표는 낮은 값이 긍정적인 지표이다. 각 지표의 전국 중앙값을 1로 환산하였을 때 울산광역시 울주군의 상대적인 지표값을 표시한 그래프이다.


- 구강건강: 65세 이상 인구의 저작불편 호소율은 0.89로 전국 중앙값보다 약간 낮은 수준이었으며, 점심식사 후 칫솔질 실천율은 1.07로 양호하였다.
- 정신건강: 스트레스 인지율(1.00)은 전국 중앙값과 동일하였으나 우울감 경험률(0.72)은 전국 중앙값보다 낮게 나타났다.
- 연간 인플루엔자 예방접종률은 0.91로 전국 중앙값과 크게 차이 나지 않았다.

나. 이환·의료이용, 사고·중독


가. 건강행태

- 흡연: 현재흡연율(0.90)과 흡연자의 금연시도율은 전국 중앙값보다 낮게 나타났고, 흡연자의 1개월 내 금연계획률 또한 (0.56)으로 전국 중앙값에 비해 낮게 나타났다.
- 음주: 월간 음주율(0.98)과 고위험음주율(0.96) 모두 전국 중앙값과 유사한 수준을 보였다.
- 안전의식: 운전자의 안전벨트 착용률(1.00)과 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률(1.00)은 전국 중앙값과 동일하였다.
- 운동 및 신체활동: 격렬한 신체활동을 포함한 중등도 이상의 신체활동 실천율(1.39)과 걷기 실천율(1.33)은 전국 중앙값보다 높게 나타났다.
- 비만 및 체중조절: 비만율(0.90)과 주관적비만 인지율(0.98)은 모두 전국 중앙값과 비슷한 수준을 보였다.

- 이환·의료이용: 30세 이상의 고혈압 평생 의사진단 경험률은 0.97의 상대값으로 전국 중앙값과 비슷하였다. 30세 이상의 고혈압 약물 치료율(1.00)은 전국 중앙값과 같았고, 고혈압 관리 교육 이수율의 상대값(2.65)은 전국 중앙값에 비해 높았다. 30세 이상의 당뇨병 평생 의사진단 경험률(1.12)과 당뇨병 치료율(1.01)은 전국 수준과 유사하게 나타났다. 당뇨병 안질환 합병증 검사 수진율은 0.89로 전국 중앙값보다 낮았고, 당뇨병 신장질환 합병증 수진율은 1.03으로 높았다.
- 사고·중독: 연간 사고중독 경험률은 전국 중앙값 대비 0.58로 다소 낮았다.



〈그림 1〉 2014년 주요지표 결과 비교 - 긍정적 지표



〈그림 2〉 2014년 주요지표 결과 비교 - 부정적 지표


2. 보건사업 우선순위

울산광역시 울주군의 지역사회건강조사 지표 결과 추이 및 전국 중앙값과의 상대적인 비교를 바탕으로 미국 메릴랜드주의 보건사업 우선순위 결정방법을 사용하여 지역 보건사업의 우선순위를 파악하였다.

이 우선순위 결정방법은 두 개의 비교축을 이용한다. 2014년 울산광역시 울주군의 지표(표준화율)와 이 지표들의 전국 보건소 중앙값(표준화율)을 비교하여 울산광역시 울주군이 좋음(‘좋음’), 두 값의 차이가 없음(‘같음’), 울산광역시 울주군이 나쁨(‘나쁨’)의 세 단계로 구분하였다. 또한 울산광역시 울주군 지표의 2013 ~ 2014년간 변화추이를 전국 중앙값의 2013 ~ 2014년간 변화 추이와 비교하였다. 변화추이가 울산광역시 울주군이 좋음(‘좋음’), 울산광역시 울주군과 전국 중앙값의 변화추이에 차이가 없음(‘같음’), 울산광역시 울주군이 나쁨(‘나쁨’)으로 분류하였다. 두 지표값의 변화 추이 방향이 같은 경우 울산광역시 울주군의 표준화율 대 전국 중앙값의 증감률의 비가 2.0을 초과하거나 0.5 미만인 경우에만 좋음과 나쁨으로 분류하였고 0.5 이상, 2.0 이하인 경우에는 같음으로 정의하였다.

이상의 두 기준을 양측으로 하여 건강행태, 의료 이용, 이환, 사고 및 중독 등의 주요 지표를 다이아몬드 상자 형식으로 제시하였다. 다이아몬드 상자의 최상단 영역은 보건사업의 최우선순위에 해당하는 지표들을 의미한다. 2014년 조사결과 울주군의 지표가 전국 중앙값보다 나쁘고, 울주군 지표의 변화 추이가 전국 중앙값의 변화추이보다 나쁜 경우가 이에 해당한다. 최우선순위 하단은 2순위 영역으로서 전국 중앙값과 비교하여 울주군의 변화추이가 나쁘고 2014년 조사결과가 비슷한 지표(우측)들과, 변화 추이는 비슷하나 2014지표가 나쁜 지표들(좌측)이 이에 해당한다.

울주군의 주요 지표들 중 최우선순위에 해당하는 지표는 흡연자의 금연시도율, 구강검진 수진율, 연간 인플루엔자 예방접종률, 당뇨병 평생의사진단 경험률(≥ 30), 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥ 30)의 다섯 가지 지표로 나타났다. 2순위에 해당하는 지표 중 전국 중앙값과 비교하여 변화추이가 같고 2014년 지표가 나쁜 지표는 없었다. 전국 중앙값과 비교하여 변화추이가 나쁘고 2014년 결과가 같은 지표로는 월간 음주율, 체중조절 시도율, 필요의 료서비스 미치료율, 당뇨병의 현재치료율(≥ 30), 당뇨병 신장질환합병증검사 수진율(≥ 30) 등이 있다.



〈그림 3〉 2014년 주요지표 우선순위



Community Health Survey

제1부 조사체계

I. 조사개요

II. 통계 추정방법

제 1 부

조사체계

I. 조사개요

1. 조사목적
2. 조사방법
3. 조사내용
4. 표본설계
5. 조사체계
6. 자료관리
7. 조사현황

I. 조사개요

1. 조사목적

1995년 지방자치단체의 보건사업계획 수립을 의무화하는 지역보건법이 제정되었으나 시·군·구 단위의 대표성과 신뢰성 있는 통계가 부재한 상황이었다. 이에 질병관리본부에서는 지역보건법제4조 및 동법시행령 제4조, 제5조에 의거, 지역보건의료계획 수립 및 보건사업수행에 필요한 건강통계를 생산하기 위하여 2008년 이후 매년 시·군·구에서 지역사회건강조사를 수행하고 있다. 생산된 통계자료는 지역보건의료계획 수립 및 보건사업의 성과를 평가하는 자료로 활용되고 있다.

2. 조사방법

가. 조사대상

조사시점 표본가구에 거주하는 만 19세 이상 가구원(1995년 7월 31일 이전 출생자)

나. 조사시기

2014년 8월 16일 - 10월 31일(2.5개월)

다. 조사방법

조사원이 표본가구를 방문하여 노트북에 탑재된 전자조사표를 이용해 조사대상자와 1:1 면접 조사하는 방법

3. 조사내용

지역사회건강조사에서는 2010년부터 4년 주기의 순환조사체계를 도입하여 지표의 중요도와 활용성, 표본의 크기 등을 고려하여 각각의 조사항목을 1년, 2년, 4년 주기로 구분하여 조사하고 있다.

2014년부터 제3기 순환조사가 시작되었으며, 전국의 모든 시·군·구에서 조사하는 전국공통문항 외에 각 시·도별로 지역선택문항을 선정하여 조사하였다.

가. 전국공통 조사항목

총 18개 영역, 총 168개 문항으로 구성된 전국 공통조사표는 가구원 대표 1인이 참여하는 가구조사와 전체 가구원이 참여하는 개인조사로 구성하였다.

개인조사 영역에서는 건강행태(흡연, 음주, 안전의식, 운동 및 신체활동, 식생활, 비만 및 체중조절, 구강건강, 정신건강), 검진 및 예방접종, 이환, 의료이용, 사고 및 중독, 활동제한 및 삶의 질, 보건기관 이용, 사회 물리적 환경, 심정지, 교육 및 경제활동을 조사하였다.

〈표 2〉 2014년 전국공통 조사항목

영역		조사항목
가구조사		세대유형, 기초생활수급자, 소득, 치매환자 동거여부, 가구식품안전성
개인조사	흡연	평생흡연, 현재흡연, 흡연시작연령, 금연기간, 금연계획 및 이유, 간접흡연, 전자담배 흡연
	음주	평생음주, 음주시작연령, 음주빈도, 음주량, 음주폐해, 절주 및 금주시도
	안전의식	안전벨트 착용, 음주운전, 음주운전차량 동승, 헬멧 착용

영역	조사항목
운동 및 신체활동	격렬한 신체활동, 중등도 신체활동, 걷기, 지역사회 내 운동시설 접근
식생활	아침식사, 저염선택, 영양표시
비만 및 체중조절	키, 몸무게, 본인인지체형, 체중조절 경험 및 방법
구강건강	주관적 구강건강, 저작불편, 발음불편, 치솔질, 구강검진, 스케일링, 치과진료
정신건강	수면시간, 스트레스, 우울감, 정신상담
검진	건강검진, 암 검진
예방접종	인플루엔자 예방접종
이환	만성·급성질환 및 사고중독 경험, 만성질환별(고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 뇌졸중, 심근경색증 및 협심증, 관절염) 이환
의료이용	의료서비스 미수진 경험, 미수진 이유
사고 및 중독	사고중독 경험 및 건수, 주 치료처, 사고 중독 의도성 여부
활동제한 및 삶의 질	주관적 건강수준, 삶의 질 지수(EQ-5D)
보건기관 이용	보건기관 이용
사회 물리적 환경	광역 시·도 및 시·군·구 거주기간
심정지	심폐소생술 인지, 교육경험, 마네킹 실습 경험, 시행능력 정도
교육 및 경제활동	직업, 학력, 혼인상태

나. 지역선택 조사항목

〈표 3〉 2014년 울산광역시 지역선택 조사항목

영역	조사항목
흡연	공공장소 간접흡연 노출경험, 금연교육 경험, 금연구역 인지, 금연구역내 흡연
음주	평생 음주예방교육 경험
운동 및 신체활동	지역사회 내 운동프로그램 참여
식생활	영양교육 및 상담
정신건강	스트레스 원인, 자살생각 경험, 자살 시도율, 자살생각으로 인한 정신상담, 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험
이환	대사증후군인지여부, 치매선별검사 수검여부(60세 이상)

4. 표본설계

가. 모집단

(1) 목표 모집단은 2014년 7월 기준으로 시·군·구에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.

(2) 조사 모집단은 시·군·구의 동·읍·면 내 통·반·리의 표본지점을 1차 추출단위로 하며, 선정된 통·반·리의 표본지점 내 주거용 주택(아파트, 일반주택)에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.


나. 표본추출

(1) 1차 추출(표본지점)

통·반·리 내 주택유형별 가구 수를 기준으로 주민등록인구자료와 주택자료를 연계하여 작성된 표본추출틀에서 각 동·읍·면 별로 할당된 표본지점을 추출하는데, 이때 통·반·리를 명칭기준으로 정렬한 후 가구 수 크기를 고려하여 추출확률이 비례하도록 추출하였다.

(2) 2차 추출(표본가구)


표본가구는 표본지점으로 선정된 통·반·리의 가구 수를 파악하여 계통추출법으로 선정하였다. 이 때 통·반·리의 규모가 커서 2개 이상의 표본지점이 할당된 경우 표본오차를 최소화하기 위해 표본가구가 가능한 고르게 분포하도록 하였다. 최종적으로 표본지점별로 평균 5개 가구를 표본가구로 선정하였다.



〈그림 4〉 표본선정과정

〈표 4〉 동/읍·면별 표본지점 분포

동/읍·면	전체 가구 수			표본지점 수		
	아파트	일반	합계	아파트	일반	합계
읍·면지역	37,176	31,720	68,896	47	44	91
두동면	1	1,069	1,070	0	1	1
두서면	0	1,244	1,244	0	2	2
범서읍	17,368	3,911	21,279	22	6	28
삼남면	2,796	3,058	5,854	4	4	8
삼동면	0	667	667	0	1	1
상북면	1,078	1,952	2,860	1	3	4
서생면	271	2,589	3,030	0	4	4
연양읍	4,750	4,110	8,860	6	6	12
온산읍	2,413	5,548	7,961	3	7	10
온양읍	4,934	3,419	8,353	6	5	11
웅촌면	1,174	1,889	3,063	2	2	4
청량면	2,391	2,264	4,655	3	3	6
합계	37,176	31,720	68,896	47	44	91



〈그림 5〉 수행체계

5. 조사체계


가. 수행체계

질병관리본부는 지역사회건강조사 사업계획을 수립하여 시·도에 배포하고, 표본설계, 조사문항 및 지침표준화, 교육 및 홍보물 개발 등의 사업수행과 관련한 기술지원을 하였다. 사업 관련 주요 현안에 대한 검토 및 심의는 시·도 및 책임대학교 위원회, 전문분과위원회로 구성된 운영위원회를 통해 이루어졌다.

시·도는 권역대표대학교를 지정하여 지역사회건강조사 수행을 위한 지역 거점센터를 운영하고, 중앙정부로부터 사업예산을 받아 시·군·구 보건소에 배정하는 역할을 담당하여 수행하였다. 시·군·구 보건소는 책임대학교와 협약을 체결하고, 조사수행 관련한 행정지원을 하였다.

나. 수행과정

질병관리본부에서 가장 먼저 조사항목에 대한 수요도조사 심의결과를 바탕으로 작성한 지역보건 지표은행을 통해 표준 설문지를 개발한 뒤, 표본추출을 통해 조사 대상가구를 선정하였다. 시·군·구 보건소와 책임대학교에서는 조사원 선발 후 중앙집체교육을 진행하였고, 사전조사로 조사가능 여부를 파악하였다. 조사원은 가구선정통지서가 발송되고 난 1-2주 후 조사 대상가구를 방문하여 면접조사를 진행하고 조사자료를 중앙서버로 전송하였다. 이후 질병관리본부의 조사자료 확인 및 책임대학교의 자료분석 절차를 거쳐 지역사회 건강통계를 발간하였다.



〈그림 6〉 수행과정

6. 자료관리


가. 콜센터 운영

2014년 지역사회건강조사에서는 조사원에게 표준화된 조사수행 및 조사문항지침을 전달하고자 책임대학교 단위의 콜센터를 운영하였다.

콜센터에서는 표본가구 및 가구원 선정, 가구대체, 조사문항, 노트북 관련 질의사항을 처리하고, 담당자는 질의사항 및 조치내역을 질병보건통합관리 시스템에 일단위로 등록하여 질병관리본부, CAPI 시스템 및 전산장비대여업체 담당자들이 실시간으로 점검하여 조치하였다.

나. 자료검증

2014년 지역사회건강조사에서는 조사완료자 중 10%를 무작위로 추출하여 제3기관을 통해 전화 점검을 실시하였다. 전화점검은 조사완료 후 평균 3~4일 이내 실시하였으며, 책임대학교에서 전화점검 결과에 대해 확인 후 최종적으로 조사자료의 사용 여부를 결정하였다.



〈그림 7〉 전화점검 절차

7. 조사현황

가. 조사현황

조사현황은 <표 5>와 같다. 총 조사가구 수는 505가구였고, 조사완료자 수는 916명이었다. 가구당 평균 1.8명이 조사되었다.

〈표 5〉 조사현황

동/읍·면	조사가구 수			조사완료자 수(명)		
	아파트	일반	합계	아파트	일반	합계
읍·면지역	251	254	505	479	437	916
두동면	0	5	5	0	11	11
두서면	0	10	10	0	18	18
범서읍	118	36	154	233	61	294
삼남면	20	20	40	35	28	63
삼동면	0	7	7	0	13	13
상북면	5	15	20	11	25	36
서생면	0	20	20	0	38	38
언양읍	32	30	62	57	44	101
온산읍	15	49	64	30	89	119
온양읍	32	31	63	56	47	103
웅촌면	14	10	24	24	24	48
청량면	15	21	36	33	39	72
합계	251	254	505	479	437	916

〈표 6〉 가구당 조사인원 수

	아파트	일반	계
읍·면지역	1.9	1.7	1.8
계	1.9	1.7	1.8

나. 조사가구 및 인구 특성

2014년 지역사회건강조사 대상자의 가구원수는 2명인 경우가 가장 많았고 27.7%, 평균은 2.7명이었다. 조사자의 기초생활수급 여부는 미수급자가 98.2%로 가장 높았고, 월 가구소득은 200-300만원 미만, 300-400만원 미만 16.9%로 가장 많았으며, 다음이 50만원 미만 15.8%의 순이었다.

성별분포는 남자가 44.2%, 여자가 55.8%이었다. 연령은 40대가 25.9%로 가장 높았고, 다음이 50대 20.6%의 순이었다. 대상자의 평균연령은 50.7세였다. 결혼은 유배우가 71.8%이고, 교육수준은 고등학교 졸업이 36.4%로 가장 많았고, 다음이 대학교 이상 31.7% 순이었다.

〈표 7〉 2014년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성

(단위 : 명, %)

조사대상 가구특성 (N=505)		
	N	(%)
가구원 수		
1명	117	23.2
2명	140	27.7
3명	83	16.4
4명	133	26.3
5명	28	5.5
6명	4	0.8
7명 이상		
평균(명)	2.7	.
세대유형		
1세대	235	46.5
2세대	244	48.3
3세대	26	5.1
기초생활수급자 여부		
현재 수급자	8	1.6
과거 수급자	1	0.2
미수급자	496	98.2
월 가구소득		
50만원 미만	77	15.8
50-100만원 미만	56	11.5
100-200만원 미만	54	11.1
200-300만원 미만	82	16.9
300-400만원 미만	82	16.9
400-500만원 미만	50	10.3
500-600만원 미만	26	5.3
600만원 이상	59	12.1
치매환자 동거가구	3	0.6
거주유형		
읍·면	505	100.0

〈표 8〉 2014년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성

(단위 : 명, %)

조사대상 인구특성 (N=916)		
	N	(%)
성별		
남자	405	44.2
여자	511	55.8
연령(10세 간격)		
19-29세	86	9.4
30-39세	142	15.5
40-49세	237	25.9
50-59세	189	20.6
60-69세	121	13.2
70세 이상	141	15.4
평균(세)	50.7	
생애주기별		
19-64세	716	78.2
65세 이상	200	21.8
결혼상태		
미혼	126	13.8
유배우	658	71.8
사별, 이혼, 별거	132	14.4
교육수준 ¹⁾		
무학	84	9.2
초등학교	112	12.2
중학교	90	9.8
고등학교	333	36.4
대학교 이상	290	31.7
직업		
전문행정관리직	123	13.4
사무직	78	8.5
판매·서비스직	109	11.9
농림어업	48	5.2
기능단순노무직	190	20.7
기타 ²⁾	368	40.2

1) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

2) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

제 1 부

조사체계

Ⅱ. 통계 추정방법

1. 가중치의 사용
2. 자료처리
3. 분산추정

II. 통계 추정방법

1. 가중치의 사용

가. 소개

2014년 지역사회건강조사는 표본설계를 통하여 추출한 표본을 조사하여 설계 구조를 바탕으로 가중치를 부여함으로써 모집단의 건강수준 등을 추정하였다. 가중치는 가구단위 분석을 위한 가구 가중치와 개인단위 분석을 위한 개인가중치로 분류하였다.

나. 가중치 산출 과정

가구가중치는 가구추출률과 조사적격 가구율을 반영하였고, 개인가중치는 가구가중치에 개인 응답률을 반영하였다. 추정에 쓰이는 보정가중치는 개인가중치를 성별, 연령별 인구구조(2014년 7월 주민등록인구)와 같도록 보정하여 산출하였다.

설계가중치		벤치마킹 가중치
가구가중치	→	개인가중치 → 보정가중치
· 가구추출률 · 조사적격가구율 · 주택유형별 가구 비율	· 개인 응답률	· 성별·연령별 인구보정 - 성별 : 남, 여 - 연령별 : 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+ - 주민등록인구 기준 (2014. 07)

〈그림 8〉 가중치 산출 과정

(1) 가구가중치

- 표본설계의 표본추출과정을 고려한 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율을 반영한 가중치

$$W_{hi} = \frac{M_{hi}}{n_{hi}} = \frac{e_{hi} \cdot N_{hi}}{n_{hi}}$$

- N_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 가구 수
- M_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 적격가구 수
- n_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사가구 수
- e_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사적격 가구율

〈표 9〉 가구가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 가구 수(③)	(2,620)
①, ②의 조사된 가구 수(④)	(7)
①, ②의 조사접촉 가구 수(⑤)	(9)
①, ②의 조사적격 가구 수(⑥)	(8)
가구가중치(⑦) = ③ ÷ ④ × ⑥ ÷ ⑤	(332.698 = 2620/7 × 8/9)
전체 가구가중치 합(⑧)	(8569.456)
전체 ②의 가구 수 합(⑨)	(10,356)
가구가중치 보정(⑩) = ⑦ × (⑨/⑧)	(402.0583 = 332.698 × 10,356 / 8569.456)

(2) 개인가중치

- 가구가중치에 개인 응답률을 반영한 가중치

$$W_{hjk} = W_{hjk} \times \frac{P_{hjk}}{p_{hjk}}$$

- h : 읍·면/동, j : 표본지점
- k : 가구, l : 가구원
- P_{hjk} : 가구내 만 19세 이상 가구원수
- p_{hjk} : 가구내 만 19세 이상 조사 가구원수

〈표 10〉 개인가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 가구가중치(③)	(402.0583)
만 19세 이상 가구원수(④)	(4)
만 19세 이상 조사 가구원수(⑤)	(3)
개인가중치(⑥=③×④/⑤)	(536.0777=402.0583×4/3)

(3) 보정가중치

- 2014년 7월 주민등록인구 기준으로 성별, 연령별 인구구조를 보정한 가중치

$$W'_{hijkl} = BF_d \cdot W_{hijkl}$$

$$BF_d = \frac{d(\text{성별} \cdot \text{연령대별}) \text{ 주민등록인구수}}{\sum_h \sum_i \sum_{jkl} W_{hijkl} I_{d \in \text{성별} \cdot \text{연령대별}}}$$

〈표 11〉 보정가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 개인가중치(③)	(536.0777)
주민등록인구(④)	(14,693)
성·연령별 개인가중치 합(⑤)	(12,157.23)
성·연령별 보정비(⑥=④/⑤)	(1.208=14,693/12,157.23)
보정가중치(⑦=③×⑥)	(647.89=536.0777×1.208)

(4) 가중치의 이상치 제거

특정 조사대상자의 개인가중치가 다른 조사대상자의 개인가중치보다 월등히 클 경우, 해당 조사대상자의 응답값에 의해 조사결과에 바이어스(bias, 편향성)가 생길 수 있으므로 보정가중치의 이상치를 Raking Ratio 방법으로 제거하여 재보정 하였다.

$Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 보다 큰 가중치는 이상치로 정의하였으며, $Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 로 변경하였다.

$$- IQR: Q_3(W') - Q_1(W')$$

- $Q_1(W')$: 가중치 중 1사분위수

- $Q_3(W')$: 가중치 중 3사분위수

2. 자료처리

가. 무응답처리

무응답은 대체하지 않았으며 지표 산출 시 제외하였다. 무응답은 개체 무응답과 항목 무응답으로 구분하는데 개체 무응답은 조사에 참여하지 않음으로써 모든 문항에 대해 발생한 결측치를 의미하고, 항목 무응답은 조사에 참여한 대상자가 일부항목에 응답하지 않아 발생한 결측치이다.

나. 사회경제적 특성분류

(1) 연령

연령은 2014년 8월 1일 기준으로 만 연령을 정의하였다. 연령분류는 10세 단위로 “19-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60-69세, 70세 이상”으로 분류하였고, 생애주기별 특성을 알아보기 위해 “19-64세, 65세 이상”의 연령구분을 추가하였다.

(2) 교육수준

교육수준은 <교육 및 경제활동> 영역에서 교육 정도와 졸업여부 2개 문항으로 조사하고 있으며 최종 교육수준은 두 문항을 조합하여 “무학, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 이상”으로 구분하였다. 졸업여부가 ‘졸업’인 경우만 해당 교육수준을 의미하며 졸업여부가 ‘수료, 중퇴, 재학/휴학’인 경우에는 이전 정도의 교육수준으로 분류하였다.

〈표 12〉 교육수준분류

교육수준	졸업여부	분류
무학	-	무학
서당/한학	-	
초등학교	졸업	초등학교
중학교	졸업	중학교
고등학교	졸업	고등학교
2년/3년제 대학	졸업	대학교 이상
4년제 대학	졸업	
대학원 이상	전체	

(3) 직업

직업분류는 통계청 한국표준직업분류(KSCO, 제6차 개정)의 대분류 직업군에서 유사한 직업분류를 묶어서 6개 직업군으로 분류하였다.

〈표 13〉 직업분류

제6차 한국표준직업분류	직업분류 재구분
관리자	전문행정관리
전문가 및 관련 종사자	
사무 종사자	사무직
서비스 종사자	판매·서비스직
판매 종사자	
농업, 임업 및 어업숙련 종사자	농림어업
기능원 및 관련 기능 종사자	기능단순노무직
장치, 기계조작 및 조립 종사자	
단순노무 종사자	
군인	기타
학생	
주부	
무직	

(4) 가구소득

소득수준은 월 단위로 “50만원 미만, 50-100만원 미만, 100-200만원 미만, 200-300만원 미만, 300-400만원 미만, 400-500만원 미만, 500-600만원 미만, 600만원 이상”의 8개 그룹으로 분류하였다.

(5) 거주유형

거주유형은 “동”과 “읍·면”으로 구분하였다.

3. 분산추정

지역사회건강조사에서는 모집단의 특성을 추정하기 위해 가중치를 적용한 표본가중평균을 제시하였다.

표본조사로 모집단의 특성을 추정할 때 일반적으로 표본오차(sampling error) 및 비표본오차(non-sampling error)가 수반된다. 표본오차는 표본이 모집단의 특성과 어긋나는 정도를 나타내며, 비표본오차는 표본추출과정을 제외한 자료수집 과정이나 분석 과정에서 발생하는 오류를 말한다. 표준오차(standard error)로 표현되는 표본오차는 추정치의 신뢰도에 대한 척도가 되며 분산추정에 의해 측정할 수 있다. 울산광역시 읍·면·동 지역사회건강조사는 SAS 9.3을 활용하여 분산을 추정하였다.

- 표본가중평균

$$\hat{Y} = \frac{\left(\sum_h \sum_j \sum_k \sum_l W_{h j k l} y_{h j k l} \right)}{W_{....}}$$

- h : 동/읍·면, j : 표본지점
- k : 가구, l : 가구원
- $W_{....} = \sum_{h=1} \sum_{j=1} \sum_{k=1} \sum_{l=1} W_{h j k l}$: 가중치 계
- $y_{h j k l}$: 해당 문항의 응답값

- 표본오차

$$SE(\hat{Y}) = \sqrt{\sum_{h=1} \sum_{j=1} \frac{n_{hj}(1-f_{hj})}{n_{hj}-1} \sum_{k=1}^{n_{hj}} (e_{hjk} - \overline{e_{hj}})^2}$$

$$\text{여기서 } e_{hjk} = \frac{\left(\sum_{l=1} W_{h j k l} (y_{h j k l} - \hat{Y}) \right)}{W_{....}} \text{이고,}$$

$$\overline{e_{hj}} = \left(\sum_{k=1} e_{hjk} \right) / n_{hj} \text{이다.}$$

- 변동계수

$$cv(\hat{Y}) = \frac{SE(\hat{Y})}{\hat{Y}}$$



Community Health Survey

제2부 주요통계결과

- I. 건강행태
- II. 예방접종 및 검진
- III. 이환 및 의료이용
- IV. 사고 및 중독
- V. 활동제한 및 삶의 질
- VI. 보건기관 이용

제 2 부

주요통계결과

I. 건강행태

1. 흡연
2. 음주
3. 안전의식
4. 운동 및 신체활동
5. 식생활
6. 비만 및 체중조절
7. 구강건강
8. 정신건강

I. 건강행태

1. 흡연

가. 현재흡연율

- 현재 흡연율은 평생 5갑(100개비)이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자 (“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--

- 전체 현재흡연율은 22.2%이며 남자는 41.5%, 여자는 1.9%로 조사되었다. 연령별로는 40대의 현재흡연율이 28.6%로 가장 높았으며 30대가 25.5%, 50대가 21.4%로 그 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 5개년간의 추이 비교에서 전년도에 20.6%보다 1.0%p 증가하였다. 최근 5개년간의 현재흡연율은 증감을 반복하였다. 울주군의 현재흡연율은 울산광역시 전체의 현재흡연율(22.5%)보다 낮았다.

나. 흡연시작연령

- 흡연시작연령은 처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이로 정의한다.

$\frac{\text{처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이의 총 합}}{\text{평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자 수}}$
--


- 흡연시작연령은 20.2세로 나타났고, 성별로는 남자 19.8세로 나타났다. 표준화율을 이용해 5개년간의 흡연시작 연령 비교에서 큰 변동을 보이지 않았으며 울산광역시 전체의 흡연시작연령과 크게 차이 나지 않았다.

다. 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량


- 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량은 평생 담배 5갑(100개비)이상 흡연한 사람으로서 매일 흡연하는 사람의 하루 평균 흡연량으로 정의한다.

$\frac{\text{평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 매일 흡연자의 하루 평균 흡연개비 수의 총 합}}{\text{평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일 흡연자 수}}$


- 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량은 17.2개비, 남자에서는 17.4개비로 나타났다. 연령별로는 50대 매일 흡연자의 흡연량이 가장 높았고, 40대, 30대 순이었다.



〈그림 9〉 현재 흡연율



〈그림 10〉 흡연시작연령



〈그림 11〉 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량

라. 금연

(1) 현재흡연자의 금연시도율

- 현재흡연자의 금연시도율은 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)중 최근 1년(365일) 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수 × 100
현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수

- 전체 흡연자의 금연시도율은 15.1%, 남자 흡연자의 금연시도율은 14.8%로 나타났다. 연령군별로는 30대가 12.6%로 가장 높았으며 50대가 10.5%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 울주군의 금연시도율은 18.4%로 울산광역시 전체의 29.9% 보다 낮았으며 전년도에 금연시도율 20.5%보다 낮았다.

(2) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률

- 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률은 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 중 1개월(30일) 내 금연계획이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 중 1개월(30일) 내 금연계획이 있는 사람의 수 × 100
현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수

- 흡연자의 1개월 내 금연계획률은 2014년 전체 4.2%였으며 남자에서도 4.4%로 나타났다. 연령별로는 30대에서 6.5%로 가장 높았다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도 금연계획률 10.7%보다 6.3%p 감소했으며 울산광역시 전체의 8.8%보다 낮게 나타났다.

【울산 선택지표】


(3) 금연교육 경험률

- 금연교육 경험률은 최근 1년(365일) 동안 흡연 예방 및 금연교육을 받은 경험이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.


최근 1년(365일) 동안 흡연예방 및 금연교육을 받은 적이 있는 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수


- 전체 금연교육 경험률은 7.7%이며 남자 12.3%, 여자 3.0%로 남자에서 높게 나타났다. 연령별로는 20대가 13.6%로 가장 높게 나타났다. 조율을 이용한 연도간 추세분석에서 금연교육 경험률은 전년도의 8.6%보다 0.9%p 낮아졌다.



〈그림 12〉 현재흡연자의 금연시도율



〈그림 13〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률



〈그림 14〉 금연교육 경험률

(4) 금연구역 인지율

- 금연구역 인지율은 금연구역이 “지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다” 또는 “지정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다”에 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

금연구역이 “지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다” 또는 “지정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다”에 응답한 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 전체 금연구역 인지율은 90.1%이며 남자 94.3%, 여자 85.8%로 남자에서 높게 나타났다. 연령별로는 20대가 98.2%로 가장 높게 나타났으며 연령군이 높아질수록 금연구역 인지율은 낮아졌다. 조율을 이용한 연도간 추세 분석에서 금연구역 인지율은 전년도의 91.3%보다 1.2%p 낮아졌다.

(5) 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률

- 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률은 금연구역 내에서 “항상 흡연한다” 또는 “가끔 흡연한다”에 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

금연구역 내에서 “항상 흡연한다” 또는 “가끔 흡연한다”에 응답한 사람의 수 × 100

금연구역이 지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있는 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수

- 전체 흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률은 25.0%, 남자 흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률은 25.5%로 나타났다. 조율을 이용한 비교에서 흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률은 25.0%로 전년도의 21.8%보다 높았다.


(6) 공공장소 간접흡연 노출률

- 공공장소 간접흡연 노출률은 공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.


공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있는 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수


- 전체 공공장소 간접흡연 노출률은 90.6%이며 남자 90.9%, 여자 90.3%로 남자에서 높게 나타났다. 연령대별로는 50대가 96.5%로 가장 높게 나타났다. 조율을 이용한 비교에서 울주군의 공공장소 간접흡연 노출률은 90.6%로 전년도의 83.7%보다 높았다.



〈그림 15〉 금연구역 인지도



〈그림 16〉 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률



〈그림 17〉 공공장소 간접흡연 노출률

2. 음주

가. 월간음주율

- 월간음주율은 최근 1년(365일) 동안 한 달(30일)에 1회 이상 음주한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 1년(365일) 동안 한 달(30일)에 1회 이상 술을 마신 적이 있다고 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$


- 2014년 월간음주율은 57.9%였으며 남자에서 74.0%, 여자에서 41.1%를 보였다. 연령별로는 20대가 69.0%로 가장 높았고, 30대(68.5%), 40대(63.4%) 순으로 나타났다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도의 54.2%보다 높은 59.3%의 월간음주율을 보였으며 울산광역시 전체의 63.2%보다 낮았다.

나. 음주시작연령


- 음주시작연령은 처음으로 술 1잔을 모두 마신 적이 있는 사람의 만 나이로 정의한다.

처음으로 술 1잔을 모두 마신 만 나이의 총 합
1잔 이상의 술을 마신 음주자 수

- 남자의 음주시작연령은 19.1세, 여자의 경우 25.0세로 나타났다. 음주시작 연령은 최근 5년간 큰 변동 없이 유지되었으며 울산광역시 전체의 결과와도 유사하였다.



〈그림 18〉 월간음주율



〈그림 19〉 음주시작연령

다. 고위험음주율¹⁾

- 고위험음주율은 최근 1년(365일) 동안 음주한 사람 중에서 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상, 여자는 5잔 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 × 100

최근 1년(365일) 동안 음주한 사람의 수

- 고위험음주율은 남자(29.9%)에서 여자(6.4%)보다 높게 나타났으며 연령군별로는 50대가 26.2%로 가장 높았으며 40대와 30대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 울주군의 고위험음주율은 18.0%로 전년보다 감소하였으며 울산광역시 전체(17.7%)보다 높은 고위험음주율을 나타냈다.

【울산 선택지표】


라. 평생 음주예방 교육 경험률

- 평생 음주예방 교육 경험률은 음주예방에 대한 교육을 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.


음주예방에 대한 교육을 받은 적이 있는 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 2014년 평생 음주예방 교육 경험률은 4.5%였으며 남자에서 7.2%, 여자에서 1.7%를 보였다. 연령별로는 20대가 7.2%로 가장 높았고, 40대(6.5%), 30대(4.9%) 순으로 나타났다.

1) 2008년 지표정의 : 한 번의 술자리에서 남자는 7잔 또는 맥주 5캔(여자의 경우 5잔 또는 맥주 3캔 정도) 이상을 한 달(30일) 동안 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 사람의 수*100 / 조사대상자 중 최근 1년간 음주한 사람의 수



〈그림 20〉 고위험음주율



〈그림 21〉 평생 음주예방 교육 경험률

3. 안전의식

가. 운전 시 안전벨트 착용률

- 자동차 운전 시 안전벨트 착용률은 자동차 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 × 100
자동차 운전자 수

- 자동차 운전 시 안전벨트 착용률은 2014년 전체 78.5%이며 성별로는 남자 76.3%, 여자 82.9%로 조사되었다. 연령별로는 60대의 안전벨트 착용률이 89.2%로 가장 높았고 50대와 30대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도와 84.8%에 비해 낮은 77.0%의 안전벨트 착용률을 보였으며 울산광역시 전체의 80.8%보다 낮았다.

나. 동승차량 안전벨트 착용률

- 동승차량 안전벨트 착용률은 다른 사람이 운전하는 자동차의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

다른 사람이 운전하는 자동차의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 × 100
동승차량 앞좌석 탑승자 수


- 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률은 70.7%이며, 남자에서 63.1%, 여자에서 79.3%를 보였다. 연령별로는 60대가 95.0%로 가장 높았고 이어서 70대, 50대 순이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도와 87.9%보다 낮은 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률을 보였으며 울산광역시 전체의 69.9%보다 낮았다.

다. 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)


- 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)은 최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 수 × 100
자동차 또는 오토바이 운전자 수


- 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)은 16.9%였으며 남자의 경우 21.1%, 여자의 경우 8.7%로 조사되었다. 연령별로는 40대에서 19.3%로 가장 높았고 20대와 60대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서는 전년도와 3.8%보다 높은 17.6%를 기록했으며 울산광역시 전체의 13.2%보다 높은 음주운전 경험률을 나타냈다.



〈그림 22〉 운전 시 안전벨트 착용률



〈그림 23〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률



〈그림 24〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)

4. 운동 및 신체활동

가. 신체활동 실천율

(1) 격렬한 신체활동 실천율

- 격렬한 신체활동 실천율은 최근 1주일(7일) 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이가쁜 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 격렬한 신체활동 실천율은 14.3%였으며 남자는 19.0%, 여자는 9.3%로 차이를 보였다. 연령별로는 20대(23.0%)에서 격렬한 신체활동을 가장 많이 하는 것으로 나타났고 40대와 50대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도 격렬한 신체활동 실천율보다 감소하였으며 울산광역시 전체의 13.4%에 비해 높았다.

(2) 중등도 신체활동 실천율

- 중등도 신체활동 실천율은 최근 1주일(7일) 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 중등도 신체활동 실천율은 19.8%이고 남자에서 22.9%, 여자에서 16.5%로 차이를 보였다. 연령별로는 20대(23.9%)의 실천율이 가장 높았으며 60대와 50대가 그 다음으로 높았다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도 실천율(8.8%)보다 증가하였으며 울산광역시 전체의 10.6%에 비해 높았다.


(3) 중등도 이상 신체활동 실천율²⁾

- 중등도 이상 신체활동 실천율은 최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람 또는 최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 비율(%)로 정의한다.


$\frac{\text{최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--

- 중등도 이상 신체활동 실천율은 29.3%로 조사되었으며 남자에서 34.7%, 여자에서 23.5%였다. 연령별로는 20대(39.8%), 40대(31.0%), 50대(30.1%)순서로 높았다. 표준화율을 이용한 추세비교에서는 전년도의 21.6%에서 30.1%로 실천율이 증가하였으며 울산광역시 전체의 21.4%보다 높았다.


2) 2008년 지표정의 : 최근 1주일 동안 신체활동을 1회 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람 수×100 / 조사대상 인구 수



〈그림 25〉 격렬한 신체활동 실천율



〈그림 26〉 중등도 신체활동 실천율



〈그림 27〉 중등도 이상 신체활동 실천율

나. 걷기 실천율

- 걷기 실천율은 최근 1주일(7일) 동안 걷기를 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 1주일(7일) 동안 걷기를 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 울주군의 걷기 실천율은 49.4%로 조사되었으며 남자에서 54.6%, 여자에서 44.0%로 차이가 있었다. 60대(59.9%)와 20대, 50대에서 걷기 실천율이 높았다. 표준화 실천율은 49.7%로 전년도 50.0%보다 감소했으며 울산광역시 전체 실천율인 40.7%보다 높았다.


【울산 선택지표】

다. 지역사회 내 운동프로그램 참여율


- 지역사회 내 운동프로그램 참여율은 최근 1년(365일) 동안 본인이 거주하고 있는 지역의 동사무소, 보건소, 구청, 시청 등의 지방자치단체 운동프로그램에 참여한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 1년(365일) 동안 본인이 거주하고 있는 지역의 동사무소, 보건소, 구청, 시청 등의 지방자치단체 운동프로그램에 참여한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--

- 울주군의 지역사회 내 운동프로그램 참여율은 8.5%로 조사되었으며 남자에서 3.2%, 여자에서 14.0%로 차이가 있었다. 연령별로는 70대의 참여율이 10.6%로 가장 높았으며, 30대와 60대가 그 다음으로 높았다.



〈그림 28〉 건기 실천율



〈그림 29〉 지역사회 내 운동프로그램 참여율

5. 식생활

가. 저염선택율

- 저염선택율은 평소 식습관, 조리음식 등에서 저염식을 선호하는 사람의 분율(%)로 정의한다. 저염선택율은 제시된 3가지의 문항 중 한 가지만 선택한 경우를 Type I, 두 가지를 선택한 경우를 Type II, 그리고 세 가지 모두를 선택한 경우를 Type III로 구분한다.

- ① 평소 음식을 먹을 때 “약간 싱겁게 먹는다” 또는 “아주 싱겁게 먹는다”에 응답한 사람의 수 또는,
- ② 조리된 음식을 먹을 때 소금이나 간장을 “전혀 더 넣지 않는다”에 응답한 사람의 수 또는,
- ③ 전, 부침, 튀김 등을 먹을 때 간장에 “찍어 먹지 않는다”에 응답한 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 저염선택율은 Type I이 41.8%, Type II가 29.0%, Type III가 13.8%로 나타났다. Type I은 남자 45.3%, 여자 38.1%를 보였으며, Type II 남자는 24.2%, 여자는 34.0%, 마지막으로 Type III 남자는 11.5%, 여자는 16.2%였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 Type I은 전년도 34.6%보다 증가한 42.5%를 보였고 Type II는 전년도 26.9%보다 증가한 28.7%, Type III는 전년도 10.6%에서 증가한 13.2%를 보였다. 한편 울산광역시 전체 저염선택율을 보면 Type I 46.6%, Type II 27.5%, Type III 11.1%로 울산광역시 보다 울주군이 Type I은 낮게, Type II, Type III는 높게 나타났다.


나. 영양표시 활용률

- 영양표시 활용률은 영양표시 내용이 가공식품 선택 시 영향을 미친다고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.


영양표시 내용이 가공식품을 고를 때 영향을 미친다고
응답한 사람의 수 × 100

가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수


- 가공식품 선택 시 영양표시 활용률은 89.8%였고 남자의 경우 84.3%, 여자의 경우 91.8%로 성별간 차이를 보였다. 연령별로는 50대(93.1%), 20대(92.2%), 30대(91.8%)의 순서로 이용률이 높았다.



〈그림 30〉 저염선택률(2014)



〈그림 31〉 저염선택률(연도비교)



〈그림 32〉 영양표시 활용률

다. 식품 안정성 확보율

- 식품 안정성 확보율은 최근 1년(365일) 동안 가구 식생활 형편을 물었을 때 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었거나 혹은 충분한 양이지만 다양하지 못한 음식을 먹은 사람의 분율(%)로 정의한다.

“우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다” 혹은 “우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다”라고 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 가구 수

- 식품 안정성 확보율은 94.7%로 높게 나타났으며 성별간 연령간 차이는 두드러지지 않았다. 5년간 추세도 꾸준히 높은 식품 안정성 확보율을 보이고 있다.


【울산 선택지표】

라. 영양교육 및 상담수혜율


- 영양교육 및 상담수혜율은 최근 1년(365일) 동안 영양교육이나 상담을 받아 본 경험이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 영양교육 및 상담을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 영양교육 및 상담수혜율은 1.7%이며, 남자에서는 1.0%, 여자에서는 2.4%로 나타났다. 연령별 40대(2.7%)와 20대(2.5%)가 높은 수혜율을 보였다. 조율을 이용한 추세비교에서 울주군의 영양교육 및 상담수혜율은 전년도(3.0%)보다 감소하였다.



〈그림 33〉 식품 안정성 확보율



〈그림 34〉 영양교육 및 상담수혜율

6. 비만 및 체중조절

가. 비만을

- 비만율은 체질량지수(체중(kg)/신장²(m²)) 25 이상인 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{체질량지수(kg/m}^2\text{) 25 이상인 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 울주군의 비만율은 23.5%이고 남자의 28.6%, 여자의 18.0%가 비만인 것으로 나타났다. 연령 별로는 60대의 비만율(28.5%)이 가장 높았으며 30대와 40대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도(26.5%)보다 감소하였으며, 울산광역시 전체의 비만율(23.5%)보다 약간 낮았다.

나. 주관적 비만인지율

- 주관적 비만인지율은 주관적으로 “약간 비만” 또는 “매우 비만”이라고 생각하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{“약간 비만” 또는 “매우 비만”이라고 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$


- 주관적 비만인지율은 36.7%였으며 남자는 33.4%, 여자는 40.2%였다. 30대의 주관적 비만인지율이 가장 높았으며(49.8%) 40대와 60대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 주관적 비만인지율(38.4%)은 전년도(33.2%)보다 감소하였으며, 울산광역시 전체의 주관적 비만인지율(38.9%)과 비슷하였다.

다. 체중조절 시도율


- 체중조절 시도율은 최근 1년(365일) 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 1년(365일) 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$


- 체중조절 시도율은 전체 52.5%였으며 남자 43.3%, 여자 62.1%로 차이를 보였다. 연령 별로는 30대가 66.7%로 가장 높았으며 20대와 40대의 순서로 높은 시도율을 보였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도 시도율(60.4%)보다 감소하였으며 울산광역시 전체의 57.9%보다 낮은 시도율을 보였다.



〈그림 35〉 비만율



〈그림 36〉 주관적 비만인지율



〈그림 37〉 체중조절 시도율

7. 구강건강

가. 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

- 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 주관적으로 구강건강이 나쁘다고 인식하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$


- 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 34.7%로 나타났으며 남자는 36.4%, 여자는 32.9%로 조사되었다. 70세 이상의 연령군에서 주관적 구강건강이 나쁜 인구분율이 61.5%로 가장 높았으며 60대도 47.1%로 높았다. 표준화율에 의한 비교에서 전년도(25.9%)에 비해 2014년 분율이 높아졌으며 울산광역시 28.6%보다 높게 나타났다.

나. 저작불편호소율(65세 이상)


- 65세 이상 노인의 저작불편호소율은 65세 이상 노인의 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{“매우 불편” 또는 “불편”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{65세 이상 조사대상 응답자 수}}$$

- 65세이상 노인 저작불편 호소율은 46.3%였으며 65세 이상 남성의 49.9%, 여성의 43.8%에서 저작불편을 호소하였다. 표준화율에 의한 비교 저작불편 호소율은 41.6%로 전년도 저작불편 호소율(42.6%)보다 낮아졌으며 울산광역시 전체의 44.5%보다 낮았다.



〈그림 38〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율




〈그림 39〉 저작불편호소율(65세 이상)

다. 틀니 이용 행태(50세 이상)


- 틀니 이용 행태(50세 이상)는 50세 이상 노인의 틀니 이용 행태별 분율(%)로 정의한다.

$\text{틀니 이용 행태별 사람의 수} \times 100$
50세 이상 조사대상 응답자 수

- 50세 이상 노인의 틀니 이용 행태는 위아래 둘 다 있는 경우가 19.8%, 위쪽만 있는 경우가 9.6%, 아래쪽만 있는 경우가 2.1%로 나타났다. 위아래 둘 다 있는 경우 남자는 14.1%, 여자는 25.2%였으며, 위쪽만 있는 경우는 남자는 11.6%, 여자는 7.7%, 마지막으로 아래쪽만 있는 경우는 매우 드물었다. 위아래 둘 다 틀니가 있는 경우는 전년도에 비해 감소하였으며, 위쪽만 있는 경우는 증가, 아래쪽만 있는 경우는 감소하였다.



〈그림 40〉 틀니 이용 행태(50세 이상) (2014)



〈그림 41〉 틀니 이용 행태(50세 이상) (연도비교)

라. 치솔질 실천율

(1) 아침식사 후 치솔질 실천율

- 아침식사 후 치솔질 실천율은 아침식사 후 치솔질 한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{아침식사 후 치솔질 한 사람의 수} \times 100}{\text{어제 하루 동안 아침식사 한 사람의 수}}$

- 아침식사 후 치솔질 실천율은 89.8%였으며 남자의 경우 86.8%, 여자의 경우 92.8%로 나타났다.

(2) 점심식사 후 치솔질 실천율

- 점심식사 후 치솔질 실천율은 점심식사 후 치솔질 한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{점심식사 후 치솔질 한 사람의 수} \times 100}{\text{어제 하루 동안 점심식사 한 사람의 수}}$

- 점심식사 후 치솔질 실천율은 57.0%였으며 남자의 경우 56.2%, 여자의 경우 57.8%로 나타났다.

(3) 저녁식사 후 치솔질 실천율

- 저녁식사 후 치솔질 실천율은 저녁식사 후 치솔질 한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{저녁식사 후 치솔질 한 사람의 수} \times 100}{\text{어제 하루 동안 저녁식사 한 사람의 수}}$


- 저녁식사 후 치솔질 실천율은 71.8%였으며 남자의 경우 70.8%, 여자의 경우 72.7%로 나타났다.

(4) 잠자기 전 치솔질 실천율

- 잠자기 전 치솔질 실천율은 잠자기 전 치솔질 한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{잠자기 전 치솔질 한 사람의 수} \times 100}{\text{어제 하루 동안 잠을 잔 사람의 수}}$
--

- 잠자기 전 치솔질 실천율은 60.1%였으며 남자의 경우 57.3%, 여자의 경우 63.0%로 나타났다.



〈그림 42〉 치솔질 실천율

마. 구강검진 수진율

- 구강검진 수진율은 최근 1년(365일) 동안 치료 목적이 아닌 순수검진 목적으로 구강검진을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 구강검진을 받은 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 울주군의 구강검진 수진율은 28.2%였으며 남자는 31.4%, 여자는 25.0%를 보였다. 연령별로는 40대가 34.9%로 가장 높았으며 30대와 20대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 구강검진 수진율은 전년도의 31.3%보다 감소한 29.5%로 나타났으며, 울산광역시 전체 수진율인 42.5%보다 낮았다.

바. 연간 스케일링 경험률


- 연간 스케일링 경험률은 최근 1년(365일) 동안 스케일링을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 스케일링을 받은 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 연간 스케일링 경험률은 33.9%였으며 남자는 33.3%, 여자는 34.6%로 나타났다. 50대의 스케일링 경험률이 43.7%로 가장 높았으며 30대와 20대가 그 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 스케일링 경험률은 전년도의 27.5%보다 높은 34.5%로 나타났으며 울산광역시 전체의 36.2%보다 낮았다.



〈그림 43〉 구강검진 수진율



〈그림 44〉 연간 스케일링 경험률

8. 정신건강

가. 스트레스 인지율

- 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이” 또는 “많이” 느끼는 사람의 비율(%)로 정의한다.

평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다”
또는 “많이 느낀다”에 응답한 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 스트레스 인지율은 27.3%였으며 남자와 여자는 각각 28.6%, 26.0%로 나타났다. 연령별로는 20대, 40대의 스트레스 인지율이 가장 높은 32.3%를 기록했으며 30대 29.6%, 50대 22.7%로 나타났다. 표준화율을 이용한 추세 비교에서 2014년에는 전년도의 21.6%보다 증가하였으며 울산광역시 전체의 25.2%보다 높았다.


나. 우울감 경험률

- 우울감 경험률은 최근 1년(365일) 동안 연속적으로 2주(14일) 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 비율(%)로 정의한다.


최근 1년(365일) 동안 연속적으로 2주(14일) 이상
일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을
경험한 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 우울감 경험률은 4.8%로 조사되었고 남자와 여자의 비율은 각각 4.3%와 5.3%였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 3.6%보다 증가한 4.7%의 우울감 경험률을 보였으며 울산광역시 전체의 5.3%보다 낮은 수치를 기록하였다.



〈그림 45〉 스트레스 인지율



〈그림 46〉 우울감 경험률

【울산 선택지표】

다. 자살생각률

- 자살생각률은 최근 1년(365일) 동안 자살을 생각해 본 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 1년(365일) 동안 자살을 생각해 본 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--


- 자살생각률은 6.6%로 조사되었고 남자와 여자의 분율은 각각 3.6%와 9.8%였다. 조율을 이용한 추세비교에서 전년도의 5.7%보다 증가하였다.

라. 자살시도율


- 자살시도율은 최근 1년(365일) 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 1년(365일) 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--

- 자살시도율은 0.5%로 조사되었고 남자와는 0.8%, 여자는 0.3%였다. 조율을 이용한 추세비교에서 전년도의 0.4%보다 증가하였다.



〈그림 47〉 자살생각률



〈그림 48〉 자살시도율

마. 자살생각으로 인한 정신상담률

- 자살생각으로 인한 정신상담률은 자살생각으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있다고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

자살생각으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있다고 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 자살생각으로 인한 정신상담률은 15.9%였으며 여자는 17.9%로 나타났다. 조울을 이용한 추세 비교에서 전년도의 16.2%와 비슷한 수준을 보였다.

바. 스트레스 원인

- 스트레스 원인은 평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이” 또는 “많이” 느끼는 사람의 분율(%)로 정의한다.

일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느낀다”에 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 스트레스 원인은 기타가 가장 높은 27.8%를 기록했으며 경제적인 문제 23.2%, 대인관계 22.6%, 가족문제 14.2%, 질병문제 8.2% 순으로 나타났으며 진로문제는 4.0%였다.

사. 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률


- 인터넷, 게임(오락), 스마트 폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률은 주위 사람들로부터 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 너무 많이 한다고 “항상” 또는 “대체로” 지적받는 사람의 분율(%)로 정의한다.

주위 사람들로부터 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 너무 많이 한다고 “항상” 또는 “대체로” 지적받는 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 인터넷, 게임(오락), 스마트 폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률은 10.0%였으며 남자와 여자의 분율은 각각 11.8%와 8.1%였다. 조울을 이용한 추세비교에서 전년도의 3.0%보다 증가하였다.



〈그림 49〉 자살생각으로 인한 정신상담률



〈그림 50〉 스트레스 원인



〈그림 51〉 인터넷, 게임(오락), 스마트 폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률

제 2 부

주요통계결과

Ⅱ. 예방접종 및 검진

1. 예방접종
2. 검진

II. 예방접종 및 검진

1. 예방접종

가. 연간 인플루엔자 예방접종률

- 연간 인플루엔자 예방접종률은 최근 1년(365일) 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 인플루엔자(독감)
예방접종을 받은 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 연간 인플루엔자 예방접종률은 33.5%였으며 남자와 여자는 각각 27.7%, 39.5%로 나타났다. 70세 이상 연령군의 접종률이 81.3%로 가장 높았으며 60대가 59.3%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 인플루엔자 예방접종률은 전년도에 비해 35.9%보다 감소한 31.1%로 조사되었으며 울산광역시 전체의 38.8%보다 낮은 접종률이었다.

2. 검진

가. 건강검진 수진율

- 건강검진 수진율은 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 2년 동안 건강검진(암 검진 제외)을
받은 적이 있는 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 건강검진 수진율은 65.2%였으며 남자와 여자는 각각 68.7%, 61.5%로 나타났다. 연령별로는 50대가 81.9%로 가장 높았으며 60대가 78.7%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 건강검진 수진율은 12년도의 63.8%보다 감소한 61.8%로 조사되었으며 울산광역시 전체의 67.1%보다 낮은 수진율이었다.


나. 암 검진율

- 암 검진율은 최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.


최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있는
사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수


- 암 검진율은 43.8%였으며 남자와 여자는 각각 37.5%, 50.3%로 나타났다. 연령별로는 60대가 65.1%로 가장 높았으며 50대가 62.6%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 암 검진율은 12년도의 33.1%보다 증가한 39.9%로 조사되었으며 울산광역시 전체의 43.7%보다 낮은 검진율이었다.



〈그림 52〉 연간 인플루엔자 예방접종률



〈그림 53〉 건강검진 수검율



〈그림 54〉 암 검진율

제 2 부

주요통계결과

Ⅲ. 이환 및 의료이용

1. 만성·급성질환 및 사고중독 경험을
2. 주요 질환별 평생 의사진단 경험을
및 관리행태
3. 의료이용

Ⅲ. 이환 및 의료이용


1. 만성·급성질환 및 사고중독 경험률

- 만성·급성질환 및 사고중독 경험률은 최근 2주(14일) 동안 만성·급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 2주(14일) 동안 만성·급성질환 및
사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을
느꼈던 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 만성·급성질환 및 사고중독 경험률은 5.1%이며 남자는 2.7%, 여자는 7.7%로 나타났다. 연령별로는 70세 이상 연령군에서 11.9%로 가장 높은 경험률을 보였으며 60대와 30대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도 경험률 4.6%보다 증가한 5.0%로 울산광역시 전체의 6.5%보다 낮았다.



〈그림 55〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률

2. 주요 질환별 평생 의사진단 경험률 및 관리행태

가. 고혈압

(1) 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)

- 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)은 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수} \times 100}{\text{30세 이상 조사대상 응답자 수}}$

- 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)은 20.8%(남자 20.6%, 여자 21.0%)였으며 연령별로는 70세 이상군이 57.1%로 가장 높았다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)은 전년도의 18.0%보다 증가한 18.6%로 나타났으며 울산광역시 전체의 18.3%보다 높았다.

(2) 고혈압 약물치료율(≥30)

- 고혈압 약물치료율(≥30)은 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람 중 현재 혈압조절약을 “한 달(30일)에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{현재 혈압조절약을 “한 달(30일)에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}}$


- 고혈압 약물치료율(≥30)은 89.1%(남자 90.1%, 여자 88.2%)였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 85.2%보다 증가한 88.4%의 고혈압 약물치료율을 보였으며, 울산광역시 전체의 87.0%보다 높은 치료율을 보였다.

(3) 고혈압 관리교육 이수율(≥30)


- 고혈압 관리교육 이수율(≥30)은 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람 중 고혈압 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}}$
--


- 고혈압 관리교육 이수율(≥30)은 56.9%(남자 58.5%, 여자 51.9%)로 조사되었다. 50대의 이수율이 69.8%로 가장 높은 이수율을 보였다.



〈그림 56〉 고혈압 평생 의사진단 경험률



〈그림 57〉 고혈압 약물치료율(≥30)



〈그림 58〉 고혈압 관리교육 이수율(≥30)

나. 당뇨병

(1) 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)

- 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)은 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수} \times 100}{\text{30세 이상 조사대상 응답자 수}}$

- 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)은 9.6% (남자 11.2%, 여자 8.0%)였으며 연령별로는 70세 이상군이 23.5%로 가장 높았다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 당뇨병 평생 의사진단경험률(≥30)은 전년도의 7.1%보다 증가한 8.6%로 나타났으며 울산광역시 전체의 8.1%보다 높았다.

(2) 당뇨병 치료율(≥30)

- 당뇨병 치료율(≥30)은 의사에게 당뇨병을 진단 받은 30세 이상 사람 중 현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{현재 당뇨병치료를 위한 혈당조절 방법으로 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 사용한다고 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}}$
--


- 당뇨병 치료율(≥30)은 85.8% (남자 87.6%, 여자 83.3%)였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 89.6%보다 감소한 85.3%의 당뇨병 치료율을 보였으며 울산광역시 전체의 당뇨병 치료율(79.6%)보다 높았다.

(3) 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)


- 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)은 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 당뇨병 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}}$
--


- 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)은 58.3% (남자 57.6%, 여자 59.3%)로 조사되었다.



〈그림 59〉 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)



〈그림 60〉 당뇨병 치료율(≥30)



〈그림 61〉 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)

(4) 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)

- 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)은 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년(365일) 동안 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 × 100

의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수

- 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)은 30.0% (남자 35.8%, 여자 21.5%)였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 39.5%보다 낮은 수진율을 보였으며 울산광역시 전체의 28.8%보다 높았다.

(5) 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)³⁾

- 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)은 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년(365일) 동안 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 × 100


의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수

- 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)은 36.0%(남자 39.6%, 여자 30.8%)로 나타났다.

3) 2009년 지표정의 : 최근 1년 동안 미세단백뇨검사를 받은 적이 있는 사람의 수×100 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
2010년 지표정의 : 최근 1년 동안 소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수×100 / 의사진단을 받은 30세 이상인 사람의 수



〈그림 62〉 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)



〈그림 63〉 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)

다. 관절염

(1) 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)

- 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)은 의사에게 관절염을 진단받은 50세 이상 사람의 분율(%)로 정의한다.

의사에게 관절염을 진단받은 사람의 수 × 100
50세 이상 조사대상 응답자 수

- 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)은 18.1% (남자 7.0%, 여자 28.6%)였으며 70세 이상 연령군에서 28.1%로 가장 높은 경험률을 보였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도 21.5%보다 감소한 19.5%의 관절염 평생 진단율을 보였으며 울산광역시 전체의 16.7%보다 높았다.

(2) 관절염 관리교육 이수율(≥50)

- 관절염 관리교육 이수율(≥50)은 의사에게 관절염을 진단받은 50세 이상 사람 중 관절염 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

관절염 관리 교육을 받은 사람의 수 × 100
의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수

- 관절염 관리교육 이수율(≥50)은 59.1%였으며 여자는 60.6%로 나타났다.


라. 이상지질혈증(고지혈증 포함)

(1) 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30)


- 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30)은 의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 30세 이상 사람의 분율(%)로 정의한다.

의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수 × 100
30세 이상 조사대상 응답자 수


- 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30)은 10.6% (남자 9.7%, 여자 11.5%)였으며 연령별로는 60대가 21.1%로 가장 높았고 50대는 13.2%로 조사되었다.



〈그림 64〉 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)



〈그림 65〉 관절염 관리교육 이수율(≥50)



〈그림 66〉 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30)

【울산 선택지표】

마. 대사증후군 인지율

- 대사증후군 인지율은 대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$


- 대사증후군 인지율은 24.8%였으며 남자와 여자의 인지율은 각각 22.8%와 27.0%였다. 조율을 이용한 추세비교에서 전년도의 41.5%보다 감소하였다.

바. 평생 치매 선별검사 수검율(≥60)


- 평생 치매 선별검사 수검율(≥60)은 평생동안 치매 선별검사를 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{평생동안 치매 선별검사를 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--

- 평생 치매 선별검사 수검율(≥60)은 12.6%였으며 남자와 여자의 분율은 각각 7.2%와 16.7%였다.



〈그림 67〉 대사증후군 인지율



〈그림 68〉 평생 치매 선별검사 수검율(≥60)

3. 의료이용


가. 필요의료서비스 미치료율⁴⁾

- 필요의료서비스 미치료율은 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스 (치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--

- 필요의료서비스 미치료율은 11.1%(남자 9.9%, 여자 12.4%)였다. 전년도의 7.1%보다 증가하였으며 울산광역시 전체의 11.2%과 비슷한 수치를 나타냈다.

4) 2008년 지표정의 : 최근 1년간 필요한 의료서비스를 받지 못한 사람 수×100 / 조사대상 인구 수
 2009년 지표정의 : 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수
 2010년 지표정의 : 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 포함)를 받지 못한 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수



〈그림 69〉 필요의료서비스 미치료를

제 2 부

주요통계결과

IV. 사고 및 중독

1. 연간 사고중독 경험률


IV. 사고 및 중독

1. 연간 사고중독 경험률

- 연간 사고중독 경험률은 최근 1년(365일) 동안 병의원이나 응급실 등의 의료기관을 방문한 사고중독을 경험한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{연간 사고중독 경험자 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 연간 사고중독 경험률은 2.8%(남자 3.3%, 여자 2.4%)로 조사되었다. 연령별로는 20대가 3.3%로 가장 높았으며 30대와 40대가 뒤를 이었다. 전년도 연간 사고중독 경험률 4.1% 보다 감소하였으며 울산광역시 전체 경험률(4.3%)보다 낮았다.



〈그림 70〉 연간 사고중독 경험률

제 2 부

주요통계결과

V. 활동제한 및 삶의 질

1. 양호한 주관적 건강수준 인지율

V. 활동제한 및 삶의 질


1. 양호한 주관적 건강수준 인지율

- 양호한 주관적 건강수준 인지율은 주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음” 이라고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”이라고
응답한 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 양호한 주관적 건강수준 인지율은 42.0%(남자 45.5%, 여자 38.3%)였다. 20대가 60.9%로 가장 높은 인지율을 보였으며 40대와 30대가 그 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전연도의 양호한 주관적 건강수준 인지율 54.8%보다 감소하였으며 울산광역시 전체의 44.7%보다 약간 낮았다.



〈그림 71〉 양호한 주관적 건강수준 인지도

제 2 부

주요통계결과

Ⅵ. 보건기관 이용

1. 보건기관 이용

VI. 보건기관 이용


1. 보건기관 이용

- 보건기관 이용률은 최근 1년(365일) 동안 보건기관을 이용한 사람의 비율(%)로 정의한다.


최근 1년(365일) 동안 보건기관('보건소(보건의료원)', '보건지소', '보건진료소')을 이용한 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 보건기관 이용률은 21.5%(남자 17.4%, 여자 25.8%)로 나타났다. 연령별로는 70세 이상 연령군에서 61.9%로 가장 높았으며 60대(38.4%), 20대(20.0%)의 순서였다.



〈그림 72〉 보건기관 이용률



Community Health Survey

제3부 통계표

제 3 부

통계표

I. 통계표

〈표 14〉 현재흡연율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	916	22.2(1.4)	6.5	405	41.5(2.8)	6.8	511	1.9(0.5)	26.0
연령									
19-29	86	20.2(3.9)	19.2	41	36.6(6.9)	19.0	45	0.0(0.0)	.
30-39	142	25.5(3.3)	13.0	61	49.0(5.9)	12.0	81	0.9(0.9)	98.9
40-49	237	28.6(2.6)	9.1	113	53.9(3.9)	7.2	124	0.5(0.5)	99.9
50-59	189	21.4(3.0)	13.8	84	36.0(5.1)	14.1	105	4.7(2.0)	42.5
60-69	121	15.5(3.7)	24.0	56	26.4(6.5)	24.6	65	4.6(2.6)	57.2
70 이상	141	11.3(3.1)	27.4	50	26.5(7.1)	26.8	91	2.0(1.4)	69.3
19-64	716	23.8(1.6)	6.8	329	43.6(3.1)	7.1	387	1.7(0.5)	28.4
65 이상	200	12.5(2.9)	22.8	76	26.1(5.4)	20.7	124	3.0(1.7)	58.5
교육수준 ²⁾									
무학	84	5.5(2.5)	45.1	14	-(-)	-	70	1.2(1.2)	100.5
초등학교	112	13.5(3.5)	26.0	37	27.0(7.4)	27.2	75	6.3(2.6)	41.6
중학교	90	19.2(4.7)	24.7	33	42.6(8.6)	20.1	57	2.6(1.8)	69.4
고등학교	333	27.4(2.3)	8.6	170	47.0(3.8)	8.0	163	1.7(1.0)	60.0
대학교 이상	290	21.9(2.3)	10.4	149	39.0(4.0)	10.3	141	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	123	26.3(4.2)	16.0	69	45.2(6.0)	13.3	54	0.0(0.0)	.
사무직	78	25.3(5.3)	21.1	42	43.5(8.0)	18.5	36	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	109	15.3(3.7)	24.1	28	44.8(8.9)	20.0	81	1.9(1.2)	66.0
농림어업	48	11.8(4.5)	37.9	23	20.7(9.1)	43.9	25	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	190	44.3(4.0)	9.1	156	49.5(4.4)	9.0	34	8.8(4.2)	48.0
기타 ³⁾	368	8.1(1.5)	18.4	87	23.9(4.4)	18.5	281	2.0(0.9)	42.2
월 가구소득									
50만원 미만	98	13.6(4.0)	29.4	23	42.0(11.2)	26.7	75	2.8(2.6)	93.7
50-100만원 미만	92	8.8(2.7)	31.3	36	15.7(5.6)	35.7	56	3.4(2.5)	71.7
100-200만원 미만	97	31.2(5.1)	16.4	45	52.4(8.4)	16.0	52	8.6(3.6)	41.7
200-300만원 미만	135	26.6(4.1)	15.5	71	45.4(6.6)	14.6	64	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	157	20.2(3.1)	15.1	66	43.6(5.8)	13.4	91	0.7(0.7)	99.6
400-500만원 미만	111	26.4(4.1)	15.5	54	45.5(6.3)	14.0	57	1.3(1.2)	94.1
500-600만원 미만	51	23.2(5.8)	25.1	25	41.6(10.6)	25.6	26	0.0(0.0)	.
600만원 이상	137	20.9(3.6)	17.4	65	38.3(6.9)	18.1	72	0.0(0.0)	.

주 : 1) 현재흡연율 : (평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수 / 조사대상 응답자 수 × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 15〉 흡연시작연령¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	313	20.2(0.3)	1.5	296	19.8(0.3)	1.4	17	—(—)	—
연령									
19-29	17	—(—)	—	17	—(—)	—	0	—(—)	—
30-39	45	18.8(0.4)	1.9	43	18.6(0.4)	1.9	2	—(—)	—
40-49	95	20.2(0.4)	2.2	93	20.2(0.4)	2.2	2	—(—)	—
50-59	71	20.0(0.7)	3.4	66	19.8(0.6)	3.0	5	—(—)	—
60-69	45	23.6(1.2)	5.2	41	21.3(0.6)	2.7	4	—(—)	—
70 이상	40	22.0(1.2)	5.3	36	21.2(1.1)	5.3	4	—(—)	—
19-64	252	19.7(0.3)	1.4	241	19.5(0.3)	1.3	11	—(—)	—
65 이상	61	23.3(1.0)	4.4	55	21.9(0.8)	3.7	6	—(—)	—
교육수준 ²⁾									
무학	13	—(—)	—	10	—(—)	—	3	—(—)	—
초등학교	35	22.8(1.4)	6.3	30	20.7(1.1)	5.2	5	—(—)	—
중학교	30	21.3(1.2)	5.9	27	19.7(0.9)	4.8	3	—(—)	—
고등학교	133	19.5(0.3)	1.6	128	19.4(0.3)	1.7	5	—(—)	—
대학교 이상	99	20.0(0.4)	2.0	99	20.0(0.4)	2.0	0	—(—)	—
직업									
전문행정관리	48	20.7(0.6)	3.0	48	20.7(0.6)	3.0	0	—(—)	—
사무직	32	20.1(0.7)	3.4	32	20.1(0.7)	3.4	0	—(—)	—
판매·서비스직	24	19.5(0.5)	2.7	21	19.1(0.6)	2.9	3	—(—)	—
농림어업	17	—(—)	—	17	—(—)	—	0	—(—)	—
기능단순노무직	126	19.5(0.4)	2.0	123	19.2(0.3)	1.7	3	—(—)	—
기타 ³⁾	66	21.3(0.9)	4.3	55	19.8(0.8)	3.9	11	—(—)	—
월 가구소득									
50만원 미만	19	—(—)	—	17	—(—)	—	2	—(—)	—
50-100만원 미만	30	22.0(1.3)	5.7	27	21.2(1.3)	6.0	3	—(—)	—
100-200만원 미만	41	21.4(1.1)	5.0	35	19.6(0.9)	4.5	6	—(—)	—
200-300만원 미만	57	19.7(0.5)	2.6	56	19.7(0.5)	2.6	1	—(—)	—
300-400만원 미만	50	19.8(0.4)	2.1	49	19.7(0.4)	1.9	1	—(—)	—
400-500만원 미만	38	20.7(0.6)	3.1	37	20.3(0.5)	2.6	1	—(—)	—
500-600만원 미만	18	—(—)	—	17	—(—)	—	1	—(—)	—
600만원 이상	44	19.3(0.6)	3.0	44	19.3(0.6)	3.0	0	—(—)	—

주 : 1) 흡연시작연령 : 처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 16〉 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량¹⁾

(단위 : %, 개비)

구분	N	10개비 미만		10-19개비		20-39개비		40개비 이상		평균	
		%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	개비 (표준오차)	변동 계수
전체	165	5.9(2.0)	34.6	40.0(3.9)	9.7	50.8(3.8)	7.5	3.3(1.2)	36.1	17.2(0.6)	3.4
성											
남자	155	4.9(1.9)	39.7	40.2(4.0)	10.0	51.5(4.0)	7.7	3.4(1.2)	35.9	17.4(0.6)	3.4
여자	10	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
연령											
19-29	14	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
30-39	28	0.0(0.0)	.	62.6(8.8)	14.1	37.4(8.8)	23.6	0.0(0.0)	.	16.1(0.9)	5.4
40-49	59	1.6(1.6)	99.2	32.9(6.9)	21.0	64.0(6.6)	10.3	1.5(1.5)	99.1	18.2(0.8)	4.4
50-59	32	6.2(4.4)	70.8	29.8(8.6)	28.8	53.7(9.5)	17.7	10.3(4.8)	46.6	19.3(1.4)	7.4
60-69	18	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
70 이상	14	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
19-64	142	4.3(2.0)	47.5	39.3(4.2)	10.7	53.3(4.2)	7.9	3.2(1.2)	38.7	17.6(0.6)	3.4
65 이상	23	22.3(7.9)	35.6	48.0(9.7)	20.2	25.4(7.5)	29.3	4.3(4.4)	100.8	13.6(2.0)	14.4
교육수준 ²⁾											
무학	4	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
초등학교	14	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
중학교	14	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
고등학교	77	0.7(0.7)	97.0	36.2(6.8)	18.7	59.9(6.8)	11.4	3.3(1.8)	53.4	18.3(0.7)	4.1
대학교 이상	55	9.0(4.6)	51.5	49.6(6.6)	13.2	40.2(6.4)	16.0	1.2(1.2)	102.9	15.7(0.9)	5.6
직업											
전문행정관리	25	3.1(3.0)	97.2	53.9(7.8)	14.6	43.0(7.1)	16.6	0.0(0.0)	.	16.3(0.5)	3.4
사무직	17	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
판매·서비스직	15	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
농림어업	5	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
기능단순노무직	76	1.2(1.2)	100.7	35.0(5.6)	15.9	61.0(5.4)	8.9	2.9(1.6)	57.1	18.2(0.7)	4.0
기타 ³⁾	27	23.9(8.5)	35.8	37.5(8.4)	22.4	31.3(9.3)	29.7	7.4(5.2)	70.0	15.8(2.2)	13.8
월 가구소득											
50만원 미만	7	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
50-100만원 미만	9	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
100-200만원 미만	27	4.6(4.6)	100.7	32.7(11.0)	33.4	52.5(11.2)	21.3	10.2(5.6)	55.0	20.2(2.2)	10.9
200-300만원 미만	31	5.8(3.1)	54.1	23.6(8.0)	33.7	65.8(8.2)	12.5	4.7(3.3)	70.3	19.1(1.0)	5.4
300-400만원 미만	27	2.0(2.0)	99.6	45.7(9.5)	20.8	48.6(10.5)	21.7	3.7(3.4)	91.9	17.7(1.1)	6.0
400-500만원 미만	25	3.1(3.1)	99.7	28.2(10.4)	36.7	68.7(10.6)	15.5	0.0(0.0)	.	17.6(1.0)	5.7
500-600만원 미만	8	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
600만원 이상	22	13.9(9.4)	67.8	47.8(10.9)	22.8	38.2(11.4)	29.7	0.0(0.0)	.	14.4(1.4)	10.0

주 : 1) 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량 : 평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 매일 흡연자의 하루 평균 흡연개비 수의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일 흡연자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 17〉 현재흡연자의 금연시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	178	15.1(3.1)	20.7	166	14.8(3.2)	21.4	12	—(—)	—
연령									
19-29	16	—(—)	—	16	—(—)	—	0	—(—)	—
30-39	32	12.6(5.3)	42.4	31	12.8(5.4)	42.2	1	—(—)	—
40-49	62	10.4(3.4)	32.4	61	9.6(3.3)	34.0	1	—(—)	—
50-59	35	10.5(4.3)	41.2	30	7.9(4.3)	54.1	5	—(—)	—
60-69	18	—(—)	—	15	—(—)	—	3	—(—)	—
70 이상	15	—(—)	—	13	—(—)	—	2	—(—)	—
19-64	154	15.9(3.4)	21.1	146	15.4(3.4)	21.9	8	—(—)	—
65 이상	24	5.5(5.1)	93.7	20	6.4(5.9)	92.0	4	—(—)	—
교육수준 ²⁾									
무학	5	—(—)	—	4	—(—)	—	1	—(—)	—
초등학교	14	—(—)	—	9	—(—)	—	5	—(—)	—
중학교	15	—(—)	—	13	—(—)	—	2	—(—)	—
고등학교	84	14.2(3.8)	26.6	81	13.2(3.9)	29.3	3	—(—)	—
대학교 이상	59	17.5(5.7)	32.7	59	17.5(5.7)	32.7	0	—(—)	—
직업									
전문행정관리	30	20.6(7.3)	35.4	30	20.6(7.3)	35.4	0	—(—)	—
사무직	17	—(—)	—	17	—(—)	—	0	—(—)	—
판매·서비스직	15	—(—)	—	13	—(—)	—	2	—(—)	—
농림어업	5	—(—)	—	5	—(—)	—	0	—(—)	—
기능단순노무직	79	9.2(3.7)	40.2	76	9.4(3.8)	40.0	3	—(—)	—
기타 ³⁾	32	22.9(8.9)	38.9	25	19.3(8.8)	45.7	7	—(—)	—
월 가구소득									
50만원 미만	10	—(—)	—	9	—(—)	—	1	—(—)	—
50-100만원 미만	9	—(—)	—	7	—(—)	—	2	—(—)	—
100-200만원 미만	28	11.2(10.4)	92.6	23	10.4(9.8)	94.0	5	—(—)	—
200-300만원 미만	33	11.4(5.3)	46.9	33	11.4(5.3)	46.9	0	—(—)	—
300-400만원 미만	29	11.4(4.7)	41.7	28	11.6(4.8)	41.6	1	—(—)	—
400-500만원 미만	26	6.1(6.2)	102.5	25	6.2(6.4)	102.5	1	—(—)	—
500-600만원 미만	10	—(—)	—	10	—(—)	—	0	—(—)	—
600만원 이상	24	22.5(9.7)	43.2	24	22.5(9.7)	43.2	0	—(—)	—

주 : 1) 현재흡연자의 금연시도율 : (최근 1년(365일) 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수 / 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 18〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	178	4.2(1.6)	38.8	166	4.4(1.7)	38.6	12	-()	-
연령									
19-29	16	-()	-	16	-()	-	0	-()	-
30-39	32	6.5(4.4)	66.8	31	6.6(4.4)	66.8	1	-()	-
40-49	62	6.1(3.3)	53.7	61	6.2(3.3)	53.8	1	-()	-
50-59	35	0.0(0.0)	.	30	0.0(0.0)	.	5	-()	-
60-69	18	-()	-	15	-()	-	3	-()	-
70 이상	15	-()	-	13	-()	-	2	-()	-
19-64	154	4.6(1.8)	38.5	146	4.7(1.8)	38.3	8	-()	-
65 이상	24	0.0(0.0)	.	20	0.0(0.0)	.	4	-()	-
교육수준 ²⁾									
무학	5	-()	-	4	-()	-	1	-()	-
초등학교	14	-()	-	9	-()	-	5	-()	-
중학교	15	-()	-	13	-()	-	2	-()	-
고등학교	84	8.5(3.4)	39.7	81	8.7(3.5)	39.6	3	-()	-
대학교 이상	59	0.0(0.0)	.	59	0.0(0.0)	.	0	-()	-
직업									
전문행정관리	30	0.0(0.0)	.	30	0.0(0.0)	.	0	-()	-
사무직	17	-()	-	17	-()	-	0	-()	-
판매·서비스직	15	-()	-	13	-()	-	2	-()	-
농림어업	5	-()	-	5	-()	-	0	-()	-
기능단순노무직	79	7.2(3.0)	42.2	76	7.4(3.1)	42.2	3	-()	-
기타 ³⁾	32	6.0(5.9)	98.0	25	7.3(7.0)	95.9	7	-()	-
월 가구소득									
50만원 미만	10	-()	-	9	-()	-	1	-()	-
50-100만원 미만	9	-()	-	7	-()	-	2	-()	-
100-200만원 미만	28	4.1(4.0)	98.5	23	4.7(4.6)	98.2	5	-()	-
200-300만원 미만	33	2.5(2.5)	100.5	33	2.5(2.5)	100.5	0	-()	-
300-400만원 미만	29	9.9(6.7)	67.4	28	10.1(6.8)	67.3	1	-()	-
400-500만원 미만	26	4.5(4.5)	98.2	25	4.6(4.6)	98.0	1	-()	-
500-600만원 미만	10	-()	-	10	-()	-	0	-()	-
600만원 이상	24	0.0(0.0)	.	24	0.0(0.0)	.	0	-()	-

주 : 1) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률 : 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 중 (1개월(30일) 내 금연계획이 있는 사람의 수 / 현재 흡연자 (“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 19〉 금연교육 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	916	7.7(1.0)	13.6	405	12.3(1.9)	15.4	511	3.0(1.0)	32.0
연령									
19-29	86	13.6(3.6)	26.8	41	18.5(5.9)	32.2	45	7.5(4.2)	55.7
30-39	142	8.3(2.4)	29.4	61	14.0(4.3)	30.8	81	2.3(2.2)	98.8
40-49	237	9.4(1.9)	19.8	113	12.9(2.8)	21.9	124	5.6(2.6)	46.5
50-59	189	3.5(1.6)	45.1	84	6.5(2.8)	43.3	105	0.0(0.0)	.
60-69	121	7.6(2.8)	37.2	56	15.1(5.3)	35.2	65	0.0(0.0)	.
70 이상	141	2.1(1.5)	69.3	50	4.1(2.8)	69.8	91	0.9(0.9)	99.7
19-64	716	8.5(1.2)	14.0	329	13.0(2.1)	15.9	387	3.5(1.1)	32.8
65 이상	200	3.4(1.4)	39.6	76	7.4(2.8)	38.2	124	0.6(0.6)	100.4
교육수준 ²⁾									
무학	84	0.0(0.0)	.	14	-(-)	-	70	0.0(0.0)	.
초등학교	112	1.7(1.2)	70.3	37	5.0(3.4)	67.1	75	0.0(0.0)	.
중학교	90	3.5(2.1)	59.2	33	6.6(4.6)	69.9	57	1.3(1.3)	100.1
고등학교	333	7.9(1.6)	20.8	170	11.9(2.6)	21.6	163	2.5(1.5)	60.5
대학교 이상	290	11.2(2.0)	17.5	149	15.4(3.3)	21.4	141	5.9(2.4)	40.2
직업									
전문행정관리	123	14.3(3.4)	23.9	69	13.4(4.6)	33.9	54	15.5(5.6)	36.2
사무직	78	14.0(4.7)	33.3	42	24.1(7.2)	30.0	36	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	109	6.8(2.8)	41.6	28	14.3(8.0)	56.0	81	3.4(2.4)	71.0
농림어업	48	1.7(1.6)	96.2	23	2.9(2.9)	98.2	25	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	190	8.6(2.1)	24.2	156	9.9(2.4)	24.0	34	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	368	3.5(1.4)	40.3	87	11.0(3.9)	35.9	281	0.6(0.5)	74.0
월 가구소득									
50만원 미만	98	5.3(3.2)	60.5	23	16.3(9.5)	58.2	75	1.1(1.1)	103.0
50-100만원 미만	92	3.6(2.0)	55.0	36	8.3(4.6)	55.7	56	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	97	4.8(2.0)	41.8	45	9.4(3.8)	41.0	52	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	135	7.8(2.5)	32.1	71	11.8(4.0)	34.2	64	2.2(2.2)	98.1
300-400만원 미만	157	6.7(2.4)	35.2	66	9.7(4.0)	41.1	91	4.2(2.4)	57.2
400-500만원 미만	111	8.1(2.2)	27.9	54	10.7(3.6)	33.7	57	4.6(3.5)	75.5
500-600만원 미만	51	17.3(6.6)	38.0	25	21.6(9.3)	43.0	26	11.7(7.8)	66.2
600만원 이상	137	10.5(2.8)	26.8	65	17.4(5.3)	30.5	72	2.3(1.6)	69.9

주 : 1) 금연교육 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 흡연예방 및 금연교육을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 20〉 금연구역 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	916	90.1(1.0)	1.1	405	94.3(1.1)	1.1	511	85.8(1.5)	1.8
연령									
19-29	86	98.2(1.3)	1.3	41	100.0(0.0)	0.0	45	95.9(2.9)	3.0
30-39	142	98.1(1.1)	1.1	61	97.0(2.1)	2.2	81	99.3(0.1)	0.1
40-49	237	97.9(1.0)	1.0	113	98.6(1.0)	1.0	124	97.2(1.7)	1.8
50-59	189	96.7(1.1)	1.2	84	96.9(1.8)	1.8	105	96.5(1.5)	1.6
60-69	121	87.2(3.0)	3.5	56	94.8(2.9)	3.1	65	79.6(5.4)	6.7
70 이상	141	34.2(4.7)	13.6	50	52.5(8.5)	16.3	91	23.0(4.4)	19.0
19-64	716	97.1(0.6)	0.6	329	97.9(0.7)	0.7	387	96.2(1.0)	1.0
65 이상	200	50.2(4.5)	8.9	76	67.4(6.7)	10.0	124	38.1(4.7)	12.3
교육수준 ²⁾									
무학	84	25.3(4.7)	18.6	14	-(-)	-	70	21.8(4.5)	20.6
초등학교	112	65.0(5.6)	8.6	37	74.1(7.1)	9.6	75	60.2(6.7)	11.1
중학교	90	95.6(1.8)	1.9	33	97.4(2.6)	2.7	57	94.4(2.5)	2.6
고등학교	333	96.4(0.9)	1.0	170	95.7(1.3)	1.4	163	97.4(1.1)	1.2
대학교 이상	290	98.3(1.0)	1.0	149	98.1(1.1)	1.2	141	98.6(1.0)	1.0
직업									
전문행정관리	123	98.5(1.2)	1.2	69	98.1(1.9)	1.9	54	99.0(1.0)	1.0
사무직	78	98.9(1.1)	1.1	42	98.1(1.9)	1.9	36	100.0(0.0)	0.0
판매·서비스직	109	95.8(1.6)	1.6	28	100.0(0.0)	0.0	81	93.8(2.3)	2.4
농림어업	48	68.8(7.5)	11.0	23	75.5(8.8)	11.6	25	59.8(11.0)	18.4
기능단순노무직	190	97.0(0.9)	0.9	156	98.4(0.9)	0.9	34	87.3(4.6)	5.3
기타 ³⁾	368	80.2(2.1)	2.7	87	82.3(4.1)	5.0	281	79.3(2.4)	3.0
월 가구소득									
50만원 미만	98	51.8(6.7)	13.0	23	73.9(9.7)	13.1	75	43.3(7.4)	17.0
50-100만원 미만	92	66.4(4.6)	6.9	36	72.6(7.4)	10.2	56	61.7(5.6)	9.1
100-200만원 미만	97	83.1(3.5)	4.2	45	86.3(4.6)	5.4	52	79.7(5.4)	6.8
200-300만원 미만	135	95.6(1.5)	1.5	71	97.3(1.9)	1.9	64	93.1(2.7)	2.9
300-400만원 미만	157	95.1(2.0)	2.1	66	96.7(2.3)	2.4	91	93.7(2.4)	2.5
400-500만원 미만	111	98.8(0.8)	0.8	54	97.9(1.5)	1.5	57	100.0(0.0)	0.0
500-600만원 미만	51	100.0(0.0)	0.0	25	100.0(0.0)	0.0	26	100.0(0.0)	0.0
600만원 이상	137	98.1(1.0)	1.1	65	99.2(0.8)	0.8	72	96.7(1.6)	1.7

주 : 1) 금연구역 인지율 : (금연구역이 “지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다” 또는 “지정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 21〉 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	79	25.0(4.9)	19.6	73	25.5(5.2)	20.6	6	—(—)	—
연령									
19-29	8	—(—)	—	8	—(—)	—	0	—(—)	—
30-39	15	—(—)	—	14	—(—)	—	1	—(—)	—
40-49	27	21.4(6.3)	29.3	26	21.8(6.4)	29.3	1	—(—)	—
50-59	19	—(—)	—	16	—(—)	—	3	—(—)	—
60-69	9	—(—)	—	8	—(—)	—	1	—(—)	—
70 이상	1	—(—)	—	1	—(—)	—	0	—(—)	—
19-64	75	24.3(5.1)	21.0	70	25.3(5.3)	21.1	5	—(—)	—
65 이상	4	—(—)	—	3	—(—)	—	1	—(—)	—
교육수준 ²⁾									
무학	1	—(—)	—	1	—(—)	—	0	—(—)	—
초등학교	2	—(—)	—	0	—(—)	—	2	—(—)	—
중학교	8	—(—)	—	7	—(—)	—	1	—(—)	—
고등학교	39	22.2(8.1)	36.3	36	23.5(8.6)	36.6	3	—(—)	—
대학교 이상	29	25.6(7.0)	27.5	29	25.6(7.0)	27.5	0	—(—)	—
직업									
전문행정관리	19	—(—)	—	19	—(—)	—	0	—(—)	—
사무직	9	—(—)	—	9	—(—)	—	0	—(—)	—
판매·서비스직	6	—(—)	—	4	—(—)	—	2	—(—)	—
농림어업	1	—(—)	—	1	—(—)	—	0	—(—)	—
기능단순노무직	35	20.8(7.8)	37.7	34	21.1(8.0)	37.9	1	—(—)	—
기타 ³⁾	9	—(—)	—	6	—(—)	—	3	—(—)	—
월 가구소득									
50만원 미만	2	—(—)	—	1	—(—)	—	1	—(—)	—
50-100만원 미만	2	—(—)	—	1	—(—)	—	1	—(—)	—
100-200만원 미만	9	—(—)	—	7	—(—)	—	2	—(—)	—
200-300만원 미만	14	—(—)	—	14	—(—)	—	0	—(—)	—
300-400만원 미만	13	—(—)	—	13	—(—)	—	0	—(—)	—
400-500만원 미만	13	—(—)	—	12	—(—)	—	1	—(—)	—
500-600만원 미만	5	—(—)	—	5	—(—)	—	0	—(—)	—
600만원 이상	15	—(—)	—	15	—(—)	—	0	—(—)	—

주 : 1) 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률 : (금연구역 내에서 “항상 흡연한다” 또는 “가끔 흡연한다”에 응답한 사람의 수 / 금연구역이 지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있는 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 22〉 공공장소 간접흡연 노출률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	916	90.6(1.2)	1.3	405	90.9(1.8)	1.9	511	90.3(1.3)	1.4
연령									
19-29	86	94.1(3.0)	3.2	41	89.3(5.3)	6.0	45	100.0(0.0)	0.0
30-39	142	91.1(2.9)	3.1	61	91.5(3.6)	3.9	81	90.7(3.3)	3.7
40-49	237	89.5(2.2)	2.5	113	87.8(3.2)	3.6	124	91.3(2.8)	3.1
50-59	189	96.5(1.5)	1.5	84	99.1(0.9)	0.9	105	93.5(2.7)	2.9
60-69	121	91.0(2.3)	2.6	56	93.5(3.3)	3.5	65	88.4(3.2)	3.6
70 이상	141	75.0(3.9)	5.2	50	77.5(5.6)	7.2	91	73.4(5.0)	6.8
19-64	716	92.7(1.2)	1.3	329	91.9(1.8)	1.9	387	93.6(1.3)	1.4
65 이상	200	78.4(3.1)	3.9	76	83.2(4.3)	5.1	124	75.0(3.8)	5.1
교육수준 ²⁾									
무학	84	73.0(5.5)	7.6	14	-(-)	-	70	73.6(5.9)	8.1
초등학교	112	84.4(2.9)	3.4	37	92.3(3.7)	4.0	75	80.3(4.0)	5.0
중학교	90	97.1(1.5)	1.6	33	94.6(3.6)	3.8	57	98.9(0.1)	0.1
고등학교	333	90.6(2.1)	2.3	170	88.5(3.1)	3.5	163	93.3(2.1)	2.2
대학교 이상	290	93.6(1.6)	1.8	149	93.7(2.1)	2.2	141	93.5(2.2)	2.3
직업									
전문행정관리	123	91.9(2.2)	2.4	69	92.9(2.8)	3.1	54	90.4(3.5)	3.9
사무직	78	94.7(2.6)	2.7	42	94.4(3.1)	3.3	36	95.1(3.2)	3.4
판매·서비스직	109	92.4(3.2)	3.5	28	84.5(7.6)	9.0	81	96.0(2.3)	2.4
농림어업	48	97.2(0.8)	0.8	23	97.4(0.9)	0.9	25	97.0(0.9)	0.9
기능단순노무직	190	92.8(2.3)	2.4	156	92.8(2.4)	2.6	34	92.7(4.2)	4.5
기타 ³⁾	368	86.2(2.1)	2.5	87	83.9(5.6)	6.7	281	87.1(1.9)	2.2
월 가구소득									
50만원 미만	98	75.1(5.0)	6.7	23	83.9(8.0)	9.5	75	71.7(5.6)	7.8
50-100만원 미만	92	82.6(5.1)	6.2	36	75.9(9.5)	12.5	56	87.7(5.5)	6.3
100-200만원 미만	97	87.8(4.0)	4.5	45	85.5(5.2)	6.1	52	90.2(3.9)	4.4
200-300만원 미만	135	93.7(2.1)	2.2	71	92.8(3.3)	3.5	64	95.1(1.9)	2.0
300-400만원 미만	157	92.6(2.3)	2.5	66	95.0(2.4)	2.6	91	90.6(3.2)	3.6
400-500만원 미만	111	93.5(2.6)	2.8	54	92.2(4.2)	4.6	57	95.3(2.6)	2.7
500-600만원 미만	51	93.8(4.5)	4.7	25	92.8(6.9)	7.4	26	95.0(4.9)	5.2
600만원 이상	137	91.6(3.1)	3.4	65	90.0(4.6)	5.1	72	93.5(2.7)	2.9

주 : 1) 공공장소 간접흡연 노출률 : (공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험에 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 23〉 월간음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	916	57.9(1.8)	3.2	405	74.0(2.5)	3.3	511	41.1(2.4)	5.9
연령									
19-29	86	69.0(4.8)	6.9	41	73.4(6.9)	9.4	45	63.7(6.4)	10.0
30-39	142	68.5(4.6)	6.7	61	79.4(4.8)	6.1	81	57.0(6.0)	10.6
40-49	237	63.4(3.2)	5.1	113	86.0(3.2)	3.7	124	38.3(5.1)	13.4
50-59	189	59.9(3.5)	5.9	84	72.5(4.9)	6.8	105	45.6(4.5)	9.8
60-69	121	40.7(4.2)	10.4	56	64.4(5.8)	9.0	65	16.8(4.9)	28.9
70 이상	141	20.3(3.3)	16.5	50	38.6(6.2)	16.1	91	9.1(3.3)	36.2
19-64	716	63.2(2.1)	3.3	329	77.1(2.6)	3.3	387	47.6(2.9)	6.0
65 이상	200	27.6(3.3)	11.8	76	51.3(5.4)	10.5	124	11.0(2.9)	26.0
교육수준 ²⁾									
무학	84	14.5(3.5)	24.5	14	-(-)	-	70	14.0(4.0)	28.7
초등학교	112	29.9(5.2)	17.4	37	62.0(8.1)	13.1	75	13.0(5.5)	42.4
중학교	90	42.0(5.4)	12.8	33	57.7(8.5)	14.8	57	30.9(5.5)	17.7
고등학교	333	63.8(2.9)	4.6	170	75.8(3.8)	5.1	163	47.9(4.3)	8.9
대학교 이상	290	68.1(3.2)	4.7	149	79.8(3.4)	4.3	141	53.0(4.8)	9.0
직업									
전문행정관리	123	71.2(4.0)	5.6	69	82.1(4.7)	5.7	54	56.2(6.7)	12.0
사무직	78	75.2(6.1)	8.1	42	85.9(5.3)	6.2	36	60.2(8.9)	14.8
판매·서비스직	109	54.8(5.6)	10.2	28	67.1(11.9)	17.8	81	49.3(5.5)	11.1
농림어업	48	41.8(6.9)	16.5	23	58.1(7.3)	12.6	25	20.1(11.6)	57.9
기능단순노무직	190	75.2(3.1)	4.1	156	80.2(3.3)	4.1	34	41.0(8.3)	20.3
기타 ³⁾	368	38.7(2.8)	7.2	87	53.2(5.9)	11.1	281	33.1(3.1)	9.2
월 가구소득									
50만원 미만	98	20.6(4.7)	22.8	23	60.2(9.3)	15.5	75	5.6(3.4)	61.7
50-100만원 미만	92	26.2(4.0)	15.3	36	42.6(7.7)	18.1	56	13.6(3.9)	28.9
100-200만원 미만	97	51.9(5.7)	11.0	45	60.8(8.0)	13.1	52	42.6(6.9)	16.2
200-300만원 미만	135	66.1(4.4)	6.6	71	77.1(5.0)	6.5	64	50.6(6.6)	13.1
300-400만원 미만	157	65.6(3.7)	5.7	66	81.3(4.8)	5.9	91	52.4(5.6)	10.6
400-500만원 미만	111	62.4(5.1)	8.1	54	75.4(6.8)	9.0	57	45.2(6.5)	14.4
500-600만원 미만	51	66.9(6.1)	9.1	25	87.2(6.9)	7.9	26	41.4(8.2)	19.8
600만원 이상	137	67.0(4.3)	6.5	65	80.0(5.6)	7.0	72	51.4(5.3)	10.3

주 : 1) 월간음주율 : (최근 1년(365일) 동안 한 달(30일)에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 24〉 음주시작연령¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	676	21.6(0.3)	1.3	355	19.1(0.2)	1.0	321	25.0(0.6)	2.6
연령									
19-29	79	18.4(0.2)	1.2	37	18.0(0.4)	2.1	42	18.8(0.2)	0.9
30-39	118	18.9(0.3)	1.4	55	18.2(0.5)	2.6	63	19.7(0.2)	0.9
40-49	191	20.9(0.4)	1.8	105	19.2(0.3)	1.7	86	23.4(0.7)	3.1
50-59	150	22.7(0.6)	2.5	80	19.3(0.5)	2.5	70	28.1(1.2)	4.2
60-69	69	25.8(1.1)	4.1	42	20.3(0.5)	2.6	27	36.4(1.9)	5.3
70 이상	69	33.9(2.3)	6.7	36	22.9(1.1)	4.8	33	46.6(3.1)	6.5
19-64	574	20.5(0.2)	1.0	299	18.8(0.2)	1.1	275	22.8(0.4)	1.9
65 이상	102	31.9(1.7)	5.4	56	22.4(0.8)	3.6	46	44.9(2.4)	5.3
교육수준 ²⁾									
무학	37	38.9(2.7)	7.1	7	-(-)	-	30	43.5(2.7)	6.1
초등학교	58	28.3(2.4)	8.6	30	20.7(0.8)	3.9	28	36.9(3.8)	10.3
중학교	60	27.4(1.2)	4.4	27	22.3(1.3)	5.9	33	32.8(1.8)	5.6
고등학교	267	20.5(0.3)	1.2	154	19.0(0.2)	1.3	113	23.1(0.6)	2.6
대학교 이상	249	19.3(0.2)	1.1	136	18.6(0.3)	1.8	113	20.4(0.3)	1.3
직업									
전문행정관리	105	20.4(0.4)	2.2	62	19.1(0.4)	1.9	43	22.4(0.8)	3.5
사무직	71	19.6(0.5)	2.3	40	19.2(0.7)	3.8	31	20.3(0.6)	3.0
판매·서비스직	81	22.3(0.7)	3.3	23	19.0(0.4)	2.3	58	23.8(1.0)	4.3
농림어업	27	24.4(1.5)	6.4	19	-(-)	-	8	-(-)	-
기능단순노무직	162	19.5(0.3)	1.3	141	18.6(0.3)	1.5	21	27.5(2.1)	7.5
기타 ³⁾	230	24.4(0.8)	3.3	70	19.6(0.5)	2.8	160	26.8(1.1)	4.2
월 가구소득									
50만원 미만	50	36.2(2.8)	7.8	18	-(-)	-	32	46.4(3.0)	6.4
50-100만원 미만	52	26.3(1.7)	6.4	28	21.6(0.8)	3.7	24	32.4(3.0)	9.4
100-200만원 미만	61	22.8(0.9)	4.1	33	19.2(0.7)	3.8	28	27.8(2.0)	7.2
200-300만원 미만	110	20.2(0.5)	2.5	67	18.8(0.4)	2.1	43	23.0(1.0)	4.5
300-400만원 미만	126	20.6(0.4)	2.1	61	19.1(0.5)	2.6	65	22.1(0.6)	2.8
400-500만원 미만	93	21.4(0.5)	2.5	46	19.6(0.5)	2.5	47	23.8(0.9)	3.9
500-600만원 미만	43	19.1(0.3)	1.7	24	18.5(0.4)	2.3	19	-(-)	-
600만원 이상	109	19.6(0.3)	1.7	61	18.3(0.4)	2.4	48	21.7(0.6)	2.6

주 : 1) 음주시작연령 : 처음으로 술 1잔을 모두 마신 만 나이의 총 합 / 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 음주자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 25〉 고위험음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	582	20.2(1.6)	7.7	314	29.9(2.6)	8.8	268	6.4(1.6)	25.4
연령									
19-29	75	13.7(3.4)	25.2	34	23.1(6.3)	27.5	41	3.4(2.5)	71.8
30-39	107	20.0(3.8)	19.1	53	25.0(6.0)	24.1	54	13.3(5.1)	38.3
40-49	180	22.2(3.5)	15.6	102	32.4(4.6)	14.3	78	6.1(2.9)	46.8
50-59	126	26.2(4.1)	15.8	66	40.5(6.4)	15.9	60	5.3(1.4)	27.2
60-69	56	17.7(5.4)	30.5	38	24.0(7.7)	32.1	18	-(-)	-
70 이상	38	14.6(6.0)	40.8	21	25.5(9.7)	38.2	17	-(-)	-
19-64	516	20.6(1.6)	7.8	273	30.5(2.8)	9.0	243	6.8(1.7)	25.4
65 이상	66	15.0(4.9)	32.5	41	22.5(7.5)	33.2	25	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	22	9.8(6.6)	67.2	3	-(-)	-	19	-(-)	-
초등학교	38	20.2(7.3)	36.0	23	25.8(10.6)	41.2	15	-(-)	-
중학교	43	26.7(6.3)	23.6	20	41.3(11.6)	28.0	23	10.4(6.2)	59.1
고등학교	242	23.3(2.5)	10.5	137	32.4(4.0)	12.2	105	8.8(3.0)	34.6
대학교 이상	232	17.3(2.4)	13.7	130	26.3(3.8)	14.4	102	4.0(1.8)	44.7
직업									
전문행정관리	98	16.3(3.7)	22.9	60	23.7(5.5)	23.0	38	3.9(1.8)	45.6
사무직	67	29.2(6.1)	21.0	36	45.4(8.5)	18.8	31	6.7(4.0)	60.0
판매·서비스직	73	20.0(5.4)	27.2	22	37.7(10.2)	27.0	51	10.6(5.5)	51.9
농림어업	23	16.2(9.8)	60.7	16	-(-)	-	7	-(-)	-
기능단순노무직	147	28.9(3.5)	12.2	129	32.0(3.8)	12.0	18	-(-)	-
기타 ³⁾	174	10.5(2.5)	24.2	51	18.3(5.8)	31.7	123	6.9(2.7)	38.9
월 가구소득									
50만원 미만	26	14.3(7.3)	50.8	13	-(-)	-	13	-(-)	-
50-100만원 미만	35	18.2(7.2)	39.8	18	-(-)	-	17	-(-)	-
100-200만원 미만	52	25.4(5.0)	19.8	26	37.2(9.7)	26.1	26	11.1(6.6)	59.5
200-300만원 미만	101	31.6(4.7)	15.0	63	39.6(6.3)	16.0	38	15.4(6.0)	38.7
300-400만원 미만	116	15.7(3.3)	21.0	57	24.5(5.6)	23.0	59	6.2(3.3)	54.0
400-500만원 미만	84	16.5(3.6)	22.0	44	25.2(6.5)	25.6	40	4.3(2.0)	46.0
500-600만원 미만	41	11.5(5.1)	44.2	23	12.8(6.1)	47.6	18	-(-)	-
600만원 이상	101	20.0(4.4)	21.8	55	31.9(7.0)	21.9	46	2.0(2.0)	101.0

주 : 1) 고위험음주율 : (최근 1년(365일) 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔)이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 26〉 평생 음주예방 교육 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	916	4.5(0.7)	15.4	405	7.2(1.2)	16.7	511	1.7(0.7)	39.1
연령									
19-29	86	7.2(2.7)	37.2	41	9.1(4.1)	44.8	45	4.8(3.4)	69.5
30-39	142	4.9(1.9)	39.1	61	9.6(3.7)	38.3	81	0.0(0.0)	.
40-49	237	6.5(1.8)	28.4	113	8.7(2.9)	33.0	124	4.1(1.8)	44.9
50-59	189	2.0(1.0)	50.8	84	3.8(1.9)	50.9	105	0.0(0.0)	.
60-69	121	4.2(2.2)	52.6	56	8.4(4.2)	49.6	65	0.0(0.0)	.
70 이상	141	0.0(0.0)	.	50	0.0(0.0)	.	91	0.0(0.0)	.
19-64	716	5.2(0.8)	15.5	329	8.0(1.4)	16.9	387	2.1(0.8)	38.9
65 이상	200	0.5(0.5)	99.3	76	1.3(1.3)	99.9	124	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	84	0.0(0.0)	.	14	-(-)	-	70	0.0(0.0)	.
초등학교	112	1.9(1.3)	66.1	37	5.6(3.6)	65.6	75	0.0(0.0)	.
중학교	90	3.4(2.0)	57.9	33	5.8(4.1)	69.9	57	1.7(1.7)	100.7
고등학교	333	5.5(1.3)	24.6	170	7.6(2.2)	28.6	163	2.6(1.4)	54.3
대학교 이상	290	5.1(1.4)	28.0	149	7.7(2.1)	27.9	141	1.9(1.1)	58.9
직업									
전문행정관리	123	11.0(3.2)	29.2	69	13.5(4.3)	32.0	54	7.6(4.0)	51.9
사무직	78	4.2(2.1)	49.6	42	7.2(3.6)	49.9	36	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	109	5.0(2.1)	42.5	28	9.2(5.3)	57.8	81	3.1(1.8)	57.1
농림어업	48	0.0(0.0)	.	23	0.0(0.0)	.	25	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	190	4.6(1.8)	39.6	156	5.3(2.1)	39.6	34	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	368	2.0(0.9)	43.9	87	6.3(2.9)	45.9	281	0.3(0.3)	99.7
월 가구소득									
50만원 미만	98	2.3(2.3)	101.0	23	8.4(8.1)	96.5	75	0.0(0.0)	.
50-100만원 미만	92	3.7(2.2)	59.8	36	8.6(5.1)	59.2	56	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	97	2.0(1.2)	60.9	45	3.9(2.3)	60.0	52	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	135	3.5(1.6)	44.5	71	5.2(2.5)	47.3	64	1.1(1.1)	100.8
300-400만원 미만	157	5.5(2.3)	42.5	66	10.4(4.3)	41.1	91	1.4(1.4)	97.3
400-500만원 미만	111	5.0(2.0)	40.2	54	5.8(3.3)	56.9	57	4.1(2.3)	57.6
500-600만원 미만	51	9.6(4.9)	50.8	25	9.9(7.0)	70.2	26	9.2(5.9)	64.6
600만원 이상	137	5.0(1.7)	34.4	65	8.4(3.0)	36.1	72	1.0(1.0)	96.7

주 : 1) 평생 음주예방 교육 경험률 : (음주예방에 대한 교육을 받은 적이있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 27〉 운전 시 안전벨트 착용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	550	78.5(2.0)	2.5	334	76.3(2.5)	3.2	216	82.9(2.7)	3.3
연령									
19-29	43	73.4(7.1)	9.7	26	69.8(9.6)	13.8	17	-(-)	-
30-39	119	75.3(4.4)	5.8	60	70.8(5.5)	7.8	59	81.6(5.9)	7.3
40-49	187	75.2(3.5)	4.6	111	73.4(3.8)	5.2	76	78.5(5.5)	7.0
50-59	126	84.1(3.4)	4.0	79	81.6(4.4)	5.4	47	89.8(4.2)	4.7
60-69	58	89.2(4.1)	4.6	42	87.4(4.8)	5.5	16	-(-)	-
70 이상	17	-(-)	-	16	-(-)	-	1	-(-)	-
19-64	510	77.8(2.1)	2.7	301	75.2(2.7)	3.6	209	82.6(2.8)	3.4
65 이상	40	93.5(3.3)	3.5	33	92.4(3.7)	4.1	7	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	5	-(-)	-	2	-(-)	-	3	-(-)	-
초등학교	25	100.0(0.0)	0.0	18	-(-)	-	7	-(-)	-
중학교	47	86.3(6.2)	7.1	26	83.7(7.4)	8.9	21	90.4(6.8)	7.5
고등학교	223	74.3(3.1)	4.1	141	71.6(4.0)	5.6	82	79.9(4.7)	5.9
대학교 이상	247	79.9(2.6)	3.2	146	78.4(3.4)	4.3	101	82.8(3.9)	4.7
직업									
전문행정관리	103	80.6(3.9)	4.9	69	79.2(5.1)	6.4	34	84.0(5.6)	6.7
사무직	74	89.5(4.7)	5.2	41	88.9(6.4)	7.2	33	90.3(7.2)	8.0
판매·서비스직	73	71.4(6.5)	9.1	24	67.8(9.5)	14.0	49	73.8(6.4)	8.7
농림어업	18	-(-)	-	13	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	158	71.9(4.2)	5.9	148	70.7(4.3)	6.1	10	-(-)	-
기타 ³⁾	124	83.2(4.3)	5.2	39	85.8(5.3)	6.2	85	81.9(5.2)	6.3
월 가구소득									
50만원 미만	14	-(-)	-	8	-(-)	-	6	-(-)	-
50-100만원 미만	31	91.8(4.0)	4.3	19	-(-)	-	12	-(-)	-
100-200만원 미만	48	74.9(5.7)	7.6	33	66.9(7.3)	10.9	15	-(-)	-
200-300만원 미만	95	77.6(4.7)	6.1	64	77.9(5.2)	6.7	31	76.7(8.6)	11.2
300-400만원 미만	116	72.4(4.5)	6.2	65	66.1(5.7)	8.6	51	82.1(5.1)	6.2
400-500만원 미만	83	72.5(5.1)	7.1	48	74.5(7.2)	9.7	35	68.6(8.3)	12.1
500-600만원 미만	41	96.1(2.5)	2.6	24	100.0(0.0)	0.0	17	-(-)	-
600만원 이상	99	80.9(5.6)	6.9	59	77.2(6.5)	8.4	40	87.6(6.5)	7.4

주 : 1) 운전 시 안전벨트 착용률 : (자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 / 자동차 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 28〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	816	70.7(2.1)	2.9	380	63.1(2.8)	4.4	436	79.3(2.5)	3.2
연령									
19-29	82	61.0(6.1)	10.1	41	57.9(8.8)	15.2	41	65.4(7.2)	11.1
30-39	137	64.7(4.9)	7.6	59	52.2(5.8)	11.1	78	77.8(5.9)	7.6
40-49	220	61.2(3.4)	5.5	104	50.0(5.1)	10.2	116	73.3(4.5)	6.1
50-59	179	77.3(3.7)	4.8	78	68.3(5.2)	7.6	101	87.0(4.6)	5.2
60-69	110	95.0(1.8)	1.9	54	95.5(2.7)	2.8	56	94.5(2.3)	2.5
70 이상	88	91.6(3.5)	3.8	44	92.6(5.0)	5.4	44	90.4(4.5)	5
19-64	675	67.8(2.3)	3.5	311	59.2(3.2)	5.4	364	77.5(2.7)	3.5
65 이상	141	92.8(2.5)	2.6	69	92.9(3.5)	3.8	72	92.7(3.3)	3.5
교육수준 ²⁾									
무학	44	88.3(5.0)	5.7	11	-(-)	-	33	86.6(6.5)	7.5
초등학교	96	94.4(2.7)	2.8	34	89.6(5.6)	6.2	62	97.1(2.0)	2.1
중학교	79	83.6(4.3)	5.1	30	74.6(8.3)	11.1	49	89.9(3.6)	4
고등학교	309	63.4(3.4)	5.3	158	55.6(4.9)	8.8	151	73.7(3.5)	4.7
대학교 이상	281	69.5(3.1)	4.4	145	64.6(3.9)	6	136	75.9(4.5)	5.9
직업									
전문행정관리	118	68.1(5.3)	7.7	65	70.2(6.6)	9.4	53	65.3(7.2)	11
사무직	78	71.3(6.2)	8.6	42	64.6(8.0)	12.4	36	80.5(9.7)	12
판매·서비스직	103	69.1(5.6)	8.1	26	63.0(8.4)	13.4	77	71.8(6.0)	8.3
농림어업	43	88.4(4.3)	4.9	23	81.3(6.8)	8.3	20	100.0(0.0)	0
기능단순노무직	173	58.3(4.0)	6.9	145	54.7(4.2)	7.7	28	85.1(8.2)	9.6
기타 ³⁾	301	79.1(2.7)	3.4	79	68.2(6.5)	9.6	222	83.9(2.4)	2.8
월 가구소득									
50만원 미만	67	82.5(4.8)	5.8	21	74.3(11.1)	15	46	87.1(5.2)	6
50-100만원 미만	74	82.1(5.1)	6.2	34	76.6(7.6)	9.9	40	87.5(6.0)	6.9
100-200만원 미만	89	73.1(5.8)	7.9	42	63.2(7.2)	11.4	47	83.9(6.2)	7.4
200-300만원 미만	122	63.3(5.6)	8.9	66	56.9(6.5)	11.5	56	73.3(6.4)	8.7
300-400만원 미만	139	74.5(4.3)	5.8	59	59.1(6.8)	11.4	80	87.0(3.9)	4.5
400-500만원 미만	107	64.7(5.3)	8.2	52	58.5(7.5)	12.9	55	72.9(6.7)	9.1
500-600만원 미만	50	73.8(5.5)	7.4	25	77.1(7.6)	9.8	25	69.5(6.2)	9
600만원 이상	133	69.0(6.5)	9.5	62	66.7(7.6)	11.4	71	71.7(8.7)	12.2

주 : 1) 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 : (승용차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 / 동승차량 앞좌석 탑승자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 29〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	565	16.9(1.6)	9.7	349	21.1(2.3)	10.9	216	8.7(1.8)	20.8
연령									
19-29	44	18.4(6.5)	35.7	27	20.8(8.9)	42.6	17	-(-)	-
30-39	119	15.5(3.7)	24.1	60	22.2(5.9)	26.6	59	6.1(2.4)	39.7
40-49	187	19.3(2.6)	13.4	111	23.3(3.6)	15.6	76	12.4(3.5)	28.3
50-59	128	15.7(3.2)	20.6	81	20.0(4.0)	20.1	47	5.5(3.1)	57.0
60-69	62	15.9(4.8)	30.2	46	19.1(5.6)	29.5	16	-(-)	-
70 이상	25	10.8(5.7)	52.9	24	11.2(5.9)	52.6	1	-(-)	-
19-64	514	17.1(1.7)	10.0	305	21.5(2.5)	11.5	209	8.9(1.8)	20.8
65 이상	51	14.0(5.3)	38.1	44	15.8(5.8)	36.7	7	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	10	-(-)	-	7	-(-)	-	3	-(-)	-
초등학교	30	9.0(5.5)	61.7	23	11.4(6.8)	59.3	7	-(-)	-
중학교	50	18.6(6.1)	32.5	29	23.6(8.4)	35.6	21	10.0(6.7)	66.9
고등학교	225	13.7(2.4)	17.2	143	18.2(3.2)	17.6	82	4.0(2.3)	56.6
대학교 이상	247	19.8(2.8)	14.1	146	24.0(4.1)	17.1	101	12.2(3.3)	27.2
직업									
전문행정관리	103	18.7(4.2)	22.5	69	19.6(5.7)	29.2	34	16.5(6.3)	38.0
사무직	74	24.7(5.6)	22.7	41	35.6(7.8)	22.0	33	8.9(4.6)	51.7
판매·서비스직	73	14.8(4.5)	30.4	24	19.3(8.8)	45.8	49	11.8(4.5)	37.8
농림어업	24	17.6(6.8)	38.3	19	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	158	16.3(2.9)	17.7	148	17.2(3.0)	17.5	10	-(-)	-
기타 ³⁾	133	12.2(3.1)	25.6	48	24.1(7.4)	30.7	85	5.3(2.0)	38.6
월 가구소득									
50만원 미만	18	-(-)	-	12	-(-)	-	6	-(-)	-
50-100만원 미만	37	14.0(5.0)	35.5	25	17.1(6.6)	38.8	12	-(-)	-
100-200만원 미만	50	17.7(5.3)	30.2	35	17.2(6.7)	39.1	15	-(-)	-
200-300만원 미만	95	21.6(3.5)	16.3	64	27.5(4.6)	16.6	31	5.2(3.6)	70.4
300-400만원 미만	116	20.2(4.0)	19.7	65	24.7(4.9)	20.0	51	13.2(4.9)	37.2
400-500만원 미만	84	6.3(2.3)	35.7	49	4.2(1.7)	40.0	35	10.2(6.2)	60.3
500-600만원 미만	42	10.8(6.3)	58.2	25	11.9(8.1)	67.8	17	-(-)	-
600만원 이상	99	18.3(4.5)	24.5	59	28.1(7.2)	25.6	40	0.0(0.0)	.

주 : 1) 연간 음주운전 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 수 / 자동차 또는 오토바이 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 30〉 격렬한 신체활동 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	913	14.3(1.8)	12.4	404	19.0(2.6)	13.5	509	9.3(1.8)	19.7
연령									
19-29	86	23.0(5.6)	24.2	41	33.1(7.5)	22.5	45	10.5(5.2)	49.9
30-39	142	11.2(3.1)	27.6	61	14.3(4.3)	30.1	81	7.9(3.3)	41.7
40-49	236	19.4(3.6)	18.7	113	22.9(4.9)	21.2	123	15.6(4.4)	28.6
50-59	187	12.6(2.8)	22.6	83	15.9(4.0)	25.0	104	8.6(3.2)	36.7
60-69	121	9.6(3.0)	31.3	56	12.8(4.7)	36.4	65	6.4(3.6)	55.4
70 이상	141	2.3(1.3)	56.8	50	2.3(2.3)	99.1	91	2.4(1.6)	69.5
19-64	713	16.1(2.1)	12.8	328	20.7(2.9)	14.1	385	10.8(2.2)	20.7
65 이상	200	4.5(1.6)	35.2	76	7.1(3.1)	43.8	124	2.6(1.5)	57.2
교육수준 ²⁾									
무학	84	5.0(2.5)	50.0	14	-(-)	-	70	3.3(2.3)	69.4
초등학교	110	2.5(1.5)	58.5	36	0.0(0.0)	.	74	3.9(2.3)	58.8
중학교	90	7.5(2.7)	36.3	33	8.6(5.0)	58.3	57	6.7(2.8)	42.1
고등학교	332	15.8(3.0)	19.0	170	21.9(4.4)	19.9	162	7.8(2.5)	32.0
대학교 이상	290	17.6(3.4)	19.1	149	19.5(4.1)	20.9	141	15.1(4.3)	28.4
직업									
전문행정관리	123	19.1(3.4)	18.0	69	23.6(4.2)	17.6	54	13.0(6.4)	49.8
사무직	78	19.1(4.6)	24.0	42	22.8(7.2)	31.7	36	13.8(5.0)	36.5
판매·서비스직	109	13.0(4.5)	34.6	28	16.9(8.3)	49.1	81	11.3(4.0)	35.6
농림어업	48	12.8(4.5)	34.8	23	22.5(7.9)	35.1	25	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	190	15.3(3.2)	21.2	156	17.5(3.7)	21.0	34	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	365	10.8(2.2)	20.2	86	15.8(5.0)	31.8	279	8.8(2.1)	24.0
월 가구소득									
50만원 미만	98	4.1(2.4)	58.0	23	0.0(0.0)	.	75	5.7(3.4)	59.3
50-100만원 미만	92	9.3(5.1)	55.0	36	11.3(6.8)	59.7	56	7.7(4.4)	56.9
100-200만원 미만	97	7.5(3.1)	42.0	45	9.6(4.8)	49.6	52	5.2(3.0)	56.7
200-300만원 미만	135	15.5(3.3)	21.3	71	19.6(4.2)	21.6	64	9.7(3.5)	36.3
300-400만원 미만	155	14.7(3.4)	23.0	66	18.2(5.6)	30.8	89	11.6(3.5)	29.7
400-500만원 미만	110	13.9(3.3)	23.6	53	20.1(5.1)	25.1	57	5.7(2.6)	46.2
500-600만원 미만	51	14.7(5.3)	36.2	25	21.6(8.1)	37.4	26	6.0(4.5)	74.5
600만원 이상	137	21.9(5.3)	24.3	65	26.7(7.5)	28.2	72	16.2(5.9)	36.5

주 : 1) 격렬한 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 31〉 중등도 신체활동 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	915	19.8(1.5)	7.6	404	22.9(2.1)	9.4	511	16.5(1.6)	9.8
연령									
19-29	86	23.9(4.4)	18.5	41	24.3(6.9)	28.3	45	23.5(6.2)	26.3
30-39	142	20.4(3.7)	18.0	61	25.4(5.8)	22.7	81	15.1(3.7)	24.7
40-49	237	18.0(2.5)	13.7	113	19.8(3.1)	15.5	124	16.1(3.3)	20.8
50-59	188	21.9(3.4)	15.6	83	24.8(5.1)	20.7	105	18.6(3.2)	17.2
60-69	121	23.0(4.6)	20.1	56	26.8(5.9)	22.0	65	19.2(5.0)	26.2
70 이상	141	9.1(2.9)	31.6	50	13.8(5.0)	36.0	91	6.2(2.5)	39.6
19-64	715	21.2(1.8)	8.3	328	23.8(2.5)	10.3	387	18.3(1.9)	10.4
65 이상	200	11.7(2.2)	18.9	76	16.5(4.0)	24.4	124	8.3(2.3)	28.2
교육수준 ²⁾									
무학	84	7.1(2.7)	38.4	14	-(-)	-	70	7.2(3.0)	42.2
초등학교	111	20.2(3.9)	19.3	36	27.5(6.9)	25.1	75	16.5(3.4)	20.3
중학교	90	20.0(4.7)	23.3	33	21.5(8.3)	38.7	57	19.0(4.8)	25.3
고등학교	333	19.5(2.2)	11.2	170	24.4(2.9)	12.0	163	13.1(2.6)	20.0
대학교 이상	290	21.1(2.7)	12.6	149	21.4(3.5)	16.5	141	20.7(3.6)	17.7
직업									
전문행정관리	123	19.1(3.3)	17.3	69	21.0(4.1)	19.6	54	16.6(5.5)	33.1
사무직	78	23.1(5.0)	21.9	42	18.3(6.2)	33.9	36	29.8(8.1)	27.3
판매·서비스직	109	21.3(3.9)	18.3	28	24.7(10.1)	40.9	81	19.8(4.0)	20.0
농림어업	48	37.8(8.2)	21.8	23	45.4(8.4)	18.5	25	27.7(8.4)	30.4
기능단순노무직	190	20.6(3.0)	14.8	156	21.9(3.3)	15.0	34	11.2(5.5)	48.8
기타 ³⁾	367	16.2(2.0)	12.6	86	23.6(4.7)	19.9	281	13.3(2.1)	15.8
월 가구소득									
50만원 미만	98	11.8(2.9)	24.4	23	10.9(5.5)	49.9	75	12.1(3.5)	28.9
50-100만원 미만	92	14.2(5.5)	38.9	36	17.1(7.3)	42.4	56	11.9(5.0)	41.6
100-200만원 미만	97	17.7(5.0)	28.2	45	19.5(6.8)	35.0	52	15.7(5.0)	32.1
200-300만원 미만	135	20.0(3.5)	17.7	71	23.3(5.0)	21.3	64	15.3(5.0)	33.0
300-400만원 미만	157	19.0(3.9)	20.4	66	24.7(5.8)	23.7	91	14.2(4.1)	28.9
400-500만원 미만	110	19.6(4.1)	20.9	53	18.8(5.7)	30.3	57	20.5(5.5)	26.9
500-600만원 미만	51	15.2(4.6)	30.1	25	22.9(7.4)	32.3	26	5.6(4.2)	75.7
600만원 이상	137	26.0(3.2)	12.4	65	27.8(5.5)	19.6	72	23.9(4.8)	20.2

주 : 1) 중등도 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 32〉 중등도 이상 신체활동 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	913	29.3(2.2)	7.6	404	34.7(2.9)	8.3	509	23.5(2.2)	9.6
연령									
19-29	86	39.8(5.7)	14.2	41	46.1(7.6)	16.5	45	32.1(6.8)	21.1
30-39	142	28.0(4.1)	14.7	61	33.8(5.9)	17.3	81	21.9(4.3)	19.7
40-49	236	31.0(4.0)	12.8	113	34.0(5.1)	14.9	123	27.7(4.9)	17.7
50-59	187	30.1(3.7)	12.4	83	34.6(5.5)	15.9	104	24.8(4.2)	17.0
60-69	121	27.0(4.6)	16.9	56	33.1(5.6)	17.0	65	20.8(5.2)	24.9
70 이상	141	11.4(3.0)	26.0	50	16.1(5.2)	32.2	91	8.6(2.9)	33.5
19-64	713	31.7(2.6)	8.1	328	36.6(3.3)	9.0	385	26.2(2.6)	10.1
65 이상	200	15.3(2.5)	16.3	76	21.4(4.3)	20.2	124	10.9(2.7)	24.7
교육수준 ²⁾									
무학	84	9.5(3.2)	33.3	14	-(-)	-	70	8.8(3.4)	38.1
초등학교	110	22.8(4.0)	17.5	36	27.5(6.9)	25.1	74	20.2(3.7)	18.4
중학교	90	24.1(4.7)	19.7	33	26.6(8.6)	32.3	57	22.4(4.9)	22.0
고등학교	332	29.1(3.0)	10.3	170	37.0(4.2)	11.4	162	18.7(3.4)	18.4
대학교 이상	290	33.8(3.9)	11.6	149	35.0(4.8)	13.8	141	32.4(4.7)	14.5
직업									
전문행정관리	123	31.2(4.4)	14.0	69	35.6(4.6)	13.1	54	25.1(7.3)	28.9
사무직	78	37.8(6.2)	16.4	42	35.1(8.3)	23.6	36	41.6(9.7)	23.3
판매·서비스직	109	28.0(5.0)	18.0	28	30.0(10.5)	35.0	81	27.1(4.9)	18.1
농림어업	48	43.1(9.6)	22.3	23	54.6(10.3)	18.8	25	27.7(8.4)	30.4
기능단순노무직	190	29.9(3.9)	13.1	156	32.7(4.3)	13.1	34	11.2(5.5)	48.8
기타 ³⁾	365	24.5(2.8)	11.3	86	35.3(5.9)	16.6	279	20.2(2.7)	13.5
월 가구소득									
50만원 미만	98	13.9(3.4)	24.3	23	10.9(5.5)	49.9	75	15.0(4.3)	28.9
50-100만원 미만	92	17.6(5.9)	33.7	36	21.8(7.6)	34.6	56	14.4(6.0)	41.6
100-200만원 미만	97	22.3(5.2)	23.5	45	23.5(7.1)	30.1	52	20.9(5.5)	26.5
200-300만원 미만	135	28.7(4.4)	15.3	71	34.5(5.6)	16.3	64	20.5(5.8)	28.4
300-400만원 미만	155	29.2(4.3)	14.6	66	33.9(6.4)	18.8	89	25.1(5.1)	20.3
400-500만원 미만	110	30.1(4.6)	15.3	53	34.3(6.5)	19.1	57	24.5(6.2)	25.2
500-600만원 미만	51	28.4(7.8)	27.4	25	41.7(9.9)	23.8	26	11.6(6.3)	54.6
600만원 이상	137	39.8(5.5)	14.0	65	42.8(7.1)	16.6	72	36.1(6.8)	18.9

주 : 1) 중등도 이상 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 33〉 걷기 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	915	49.4(2.3)	4.6	404	54.6(3.0)	5.6	511	44.0(2.4)	5.5
연령									
19-29	86	59.4(6.1)	10.3	41	61.5(7.3)	11.8	45	56.9(7.7)	13.6
30-39	142	44.9(4.1)	9.1	61	48.1(5.8)	12.1	81	41.6(5.4)	13.0
40-49	237	39.9(4.0)	10.1	113	47.0(4.5)	9.7	124	32.0(5.0)	15.5
50-59	188	54.9(3.6)	6.5	83	61.1(5.5)	9.0	105	48.0(4.9)	10.2
60-69	121	59.9(5.6)	9.3	56	62.7(7.0)	11.2	65	57.1(6.8)	11.9
70 이상	141	44.4(4.0)	9.1	50	53.6(7.1)	13.2	91	38.8(5.1)	13.1
19-64	715	49.5(2.5)	5.1	328	54.5(3.2)	6.0	387	44.0(2.7)	6.2
65 이상	200	48.8(3.4)	7.0	76	56.0(5.7)	10.2	124	43.7(4.5)	10.4
교육수준 ²⁾									
무학	84	35.8(5.1)	14.2	14	-(-)	-	70	36.2(5.5)	15.1
초등학교	111	54.5(5.0)	9.1	36	69.9(7.0)	10.0	75	46.6(6.1)	13.0
중학교	90	57.8(5.9)	10.2	33	55.4(9.2)	16.6	57	59.5(7.0)	11.8
고등학교	333	52.2(3.1)	5.9	170	62.0(3.9)	6.3	163	39.2(4.0)	10.3
대학교 이상	290	45.8(3.7)	8.2	149	45.7(4.6)	10.0	141	45.8(4.5)	9.8
직업									
전문행정관리	123	42.6(5.0)	11.8	69	42.7(6.9)	16.2	54	42.3(6.0)	14.3
사무직	78	43.3(5.0)	11.6	42	49.5(8.0)	16.2	36	34.7(8.3)	23.9
판매·서비스직	109	52.7(5.6)	10.6	28	61.8(11.1)	17.9	81	48.5(5.5)	11.3
농림어업	48	84.8(6.1)	7.2	23	79.5(9.5)	11.9	25	91.9(5.1)	5.5
기능단순노무직	190	58.9(3.4)	5.8	156	61.3(3.7)	6.1	34	42.9(8.1)	18.9
기타 ³⁾	367	43.0(2.8)	6.6	86	46.9(5.6)	12.0	281	41.6(3.3)	8.0
월 가구소득									
50만원 미만	98	34.6(5.5)	16.0	23	39.6(10.5)	26.5	75	32.7(6.2)	18.9
50-100만원 미만	92	60.3(5.1)	8.4	36	61.5(8.3)	13.4	56	59.4(5.8)	9.7
100-200만원 미만	97	53.6(5.4)	10.1	45	60.3(7.7)	12.8	52	46.5(6.5)	14.0
200-300만원 미만	135	55.6(5.1)	9.1	71	63.1(7.5)	11.9	64	45.0(6.8)	15.2
300-400만원 미만	157	37.9(4.3)	11.5	66	38.3(5.9)	15.4	91	37.5(5.1)	13.7
400-500만원 미만	110	53.7(5.5)	10.2	53	60.7(7.4)	12.1	57	44.6(6.6)	14.7
500-600만원 미만	51	39.7(7.3)	18.3	25	41.8(9.9)	23.7	26	37.1(9.0)	24.1
600만원 이상	137	51.7(5.7)	11.1	65	52.6(6.9)	13.2	72	50.6(6.2)	12.3

주 : 1) 걷기 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 걷기를 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 34〉 지역사회 내 운동프로그램 참여율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	916	8.5(1.2)	13.8	405	3.2(0.9)	28.7	511	14.0(2.1)	14.9
연령									
19-29	86	6.8(2.6)	38.6	41	2.0(2.0)	100.0	45	12.8(5.2)	40.3
30-39	142	9.8(3.2)	32.9	61	1.7(1.7)	100.7	81	18.3(5.3)	28.9
40-49	237	6.8(1.7)	24.8	113	2.0(1.1)	58.1	124	12.2(3.4)	27.9
50-59	189	9.1(2.4)	26.6	84	2.3(1.7)	71.9	105	16.7(4.0)	23.8
60-69	121	9.3(3.0)	31.7	56	8.2(3.1)	38.1	65	10.4(4.5)	42.9
70 이상	141	10.6(3.1)	28.8	50	9.7(4.2)	43.3	91	11.2(3.3)	29.0
19-64	716	8.0(1.3)	16.5	329	2.1(0.8)	39.1	387	14.6(2.5)	17.0
65 이상	200	11.3(2.4)	21.6	76	11.1(3.5)	31.6	124	11.5(2.7)	23.6
교육수준 ²⁾									
무학	84	6.5(2.9)	44.1	14	-(-)	-	70	6.5(2.7)	40.8
초등학교	112	8.0(2.4)	29.6	37	4.1(2.8)	68.8	75	10.0(3.3)	32.6
중학교	90	15.0(4.2)	28.0	33	6.4(4.5)	71.0	57	21.0(6.1)	28.9
고등학교	333	8.5(1.3)	15.5	170	2.5(1.1)	42.9	163	16.5(2.8)	17.1
대학교 이상	290	7.4(2.2)	30.0	149	3.2(1.4)	45.2	141	12.9(4.2)	33.0
직업									
전문행정관리	123	7.3(2.5)	33.8	69	2.3(1.7)	72.8	54	14.1(5.4)	38.2
사무직	78	3.7(2.7)	72.6	42	2.9(2.8)	94.7	36	4.7(3.3)	69.9
판매·서비스직	109	6.1(2.4)	39.0	28	5.5(3.9)	70.8	81	6.4(3.1)	48.7
농림어업	48	6.1(3.4)	54.6	23	4.9(5.2)	104.5	25	7.7(5.6)	72.2
기능단순노무직	190	2.7(0.8)	28.2	156	0.7(0.5)	72.4	34	15.9(4.8)	29.9
기타 ³⁾	368	15.1(2.2)	14.6	87	7.8(2.7)	34.5	281	17.9(2.8)	15.5
월 가구소득									
50만원 미만	98	16.7(3.6)	21.5	23	8.2(5.0)	60.7	75	20.0(4.1)	20.3
50-100만원 미만	92	13.4(4.1)	30.4	36	11.4(4.8)	42.4	56	15.0(5.5)	36.6
100-200만원 미만	97	9.0(3.4)	37.6	45	5.6(4.0)	71.6	52	12.6(4.7)	37.1
200-300만원 미만	135	8.0(3.4)	43.0	71	2.7(2.0)	72.6	64	15.4(6.2)	40.5
300-400만원 미만	157	8.7(2.7)	31.7	66	2.0(1.4)	70.9	91	14.2(4.8)	33.6
400-500만원 미만	111	8.0(2.5)	31.3	54	0.0(0.0)	.	57	18.6(5.8)	31.0
500-600만원 미만	51	7.9(4.1)	51.1	25	4.5(4.3)	96.2	26	12.3(5.8)	47.2
600만원 이상	137	5.0(2.2)	45.1	65	1.6(1.2)	72.3	72	9.0(4.7)	52.4

주 : 1) 지역사회 내 운동프로그램 참여율 : (최근 1년(365일) 동안 본인이 거주하고 있는 지역의 동사무소, 보건소, 구청, 시청 등의 지방자치단체 운동 프로그램에 참여한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 35〉 저염선택율¹⁾

(단위 : %)

구분	N	Type I		Type II		Type III	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	916	41.8(1.9)	4.5	29.0(1.6)	5.6	13.8(1.2)	8.8
성							
남자	405	45.3(2.6)	5.7	24.2(2.6)	10.6	11.5(1.5)	12.9
여자	511	38.1(2.5)	6.5	34.0(1.9)	5.7	16.2(1.4)	8.9
연령							
19-29	86	50.6(5.7)	11.3	19.4(4.4)	22.5	10.8(3.2)	29.5
30-39	142	40.7(4.6)	11.2	33.8(3.9)	11.6	11.1(2.5)	22.5
40-49	237	40.8(3.5)	8.5	29.8(3.0)	10.0	12.2(2.1)	17.2
50-59	189	39.9(4.4)	10.9	28.0(3.2)	11.3	21.5(3.4)	15.8
60-69	121	41.9(5.1)	12.1	28.7(3.8)	13.2	14.5(3.5)	24.3
70 이상	141	36.1(3.8)	10.5	35.3(4.6)	13.1	11.8(3.2)	27.1
19-64	716	42.2(2.2)	5.2	28.0(1.7)	6.2	14.6(1.3)	9.2
65 이상	200	39.3(3.2)	8.1	34.8(3.7)	10.7	9.6(2.3)	23.9
교육수준 ²⁾							
무학	84	38.0(5.2)	13.6	39.1(6.4)	16.3	9.4(3.2)	34.5
초등학교	112	38.4(4.9)	12.8	31.1(4.6)	14.6	12.6(3.1)	24.3
중학교	90	41.6(5.5)	13.3	28.7(4.7)	16.4	23.5(4.9)	20.9
고등학교	333	41.8(2.8)	6.7	27.4(2.4)	8.8	15.8(2.0)	12.9
대학교 이상	290	42.8(3.3)	7.8	28.5(3.0)	10.6	11.0(2.0)	18.0
직업							
전문행정관리	123	41.6(4.8)	11.6	28.3(4.7)	16.7	14.4(2.5)	17.5
사무직	78	42.1(7.1)	16.9	21.6(4.9)	22.9	17.8(5.1)	28.5
판매·서비스직	109	39.0(6.1)	15.7	34.3(5.0)	14.5	15.6(3.2)	20.2
농림어업	48	27.9(9.0)	32.4	46.5(7.7)	16.6	17.7(7.7)	43.7
기능단순노무직	190	45.0(3.5)	7.8	25.1(3.3)	13.2	10.7(2.4)	22.7
기타 ³⁾	368	42.1(2.7)	6.5	30.4(2.3)	7.5	13.6(2.0)	14.4
월 가구소득							
50만원 미만	98	36.9(5.4)	14.6	29.8(3.8)	12.8	14.8(4.1)	28.0
50-100만원 미만	92	36.8(4.9)	13.2	36.5(5.4)	14.8	12.4(3.8)	30.5
100-200만원 미만	97	39.3(6.2)	15.8	29.3(4.7)	16.1	12.0(4.0)	33.0
200-300만원 미만	135	44.3(5.0)	11.4	30.3(3.6)	11.9	11.9(3.1)	25.9
300-400만원 미만	157	47.0(4.3)	9.1	18.0(3.0)	16.6	15.3(2.4)	15.9
400-500만원 미만	111	57.8(6.0)	10.3	29.5(4.9)	16.8	9.4(2.6)	27.2
500-600만원 미만	51	19.6(6.1)	31.1	39.1(5.8)	14.9	12.0(3.7)	31.1
600만원 이상	137	35.2(5.2)	14.7	29.6(5.6)	18.9	20.3(4.8)	23.6

주 : 1) 저염선택율 : 3문항 중 「한 가지만 선택한 경우 Type I, 두 가지를 선택한 경우 Type II, 세 가지 모두 선택 시 Type III」

- ① 평소 음식을 먹을 때 “약간 싱겁게 먹는다” 또는 “아주 싱겁게 먹는다”에 응답한 사람의 수 또는,
 ② 조리된 음식을 먹을 때 소금이나 간장을 “전혀 더 넣지 않는다”에 응답한 사람의 수 또는,
 ③ 전, 부침, 튀김 등을 먹을 때 간장에 “짜여 먹지 않는다”에 응답한 사람의 수

/ 조사대상 응답자 수 × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 36〉 영양표시 활용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	179	89.8(2.4)	2.7	36	84.3(6.7)	8.0	143	91.8(2.1)	2.3
연령									
19-29	22	92.2(7.5)	8.1	4	-(-)	-	18	-(-)	-
30-39	43	91.8(4.1)	4.4	6	-(-)	-	37	89.8(4.9)	5.5
40-49	70	87.5(4.1)	4.7	19	-(-)	-	51	92.3(3.7)	4.0
50-59	37	93.1(3.8)	4.1	4	-(-)	-	33	91.8(4.5)	4.9
60-69	5	-(-)	-	1	-(-)	-	4	-(-)	-
70 이상	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-

주 : 1) 영양표시 활용률 : (영양표시 내용이 가공식품을 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수 / 가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수) × 100

〈표 37〉 식품 안정성 확보율¹⁾

(단위 : %)

구분	우리 가족 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다		우리 가족 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다		경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다		경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다		식품안전성확보율 ¹⁾	
	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수
전체	59.6(2.0)	3.4	35.1(2.0)	5.6	5.0(1.0)	20.9	0.3(0.2)	70.6	94.7(1.0)	1.1
월 가구소득										
50만원 미만	12.9(3.4)	26.8	62.0(5.0)	8.1	25.1(5.1)	20.3	0.0(0.0)	.	74.9(5.1)	6.8
50-100만원 미만	45.2(5.8)	12.8	40.2(5.6)	14.0	11.5(4.2)	36.6	3.1(2.1)	68.0	85.4(4.5)	5.2
100-200만원 미만	63.0(6.3)	10.1	34.8(6.3)	18.1	2.1(2.1)	99.3	0.0(0.0)	.	97.9(2.1)	2.2
200-300만원 미만	50.7(5.3)	10.5	49.3(5.3)	10.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0
300-400만원 미만	76.2(4.4)	5.8	23.8(4.4)	18.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0
400-500만원 미만	75.2(5.4)	7.2	24.8(5.4)	21.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0
500-600만원 미만	85.4(7.1)	8.3	14.6(7.1)	48.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0
600만원 이상	83.5(4.1)	4.9	16.5(4.1)	24.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0

주 : 1) 식품 안정성 확보율 : (“우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다” 또는 “우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 가구 수) × 100

〈표 38〉 영양교육 및 상담수혜율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	916	1.7(0.4)	26.4	405	1.0(0.6)	60.2	511	2.4(0.8)	33.1
연령									
19-29	86	2.5(1.8)	72.3	41	4.6(3.3)	72.3	45	0.0(0.0)	.
30-39	142	1.2(0.8)	68.2	61	0.0(0.0)	.	81	2.4(1.7)	69.9
40-49	237	2.7(1.1)	41.2	113	0.8(0.8)	101.2	124	4.9(2.3)	47.4
50-59	189	1.0(0.7)	71.3	84	0.0(0.0)	.	105	2.2(1.5)	70.8
60-69	121	0.8(0.8)	99.4	56	0.0(0.0)	.	65	1.6(1.6)	100.1
70 이상	141	0.8(0.8)	98.7	50	0.0(0.0)	.	91	1.2(1.2)	96.8
19-64	716	1.9(0.5)	26.3	329	1.1(0.7)	60.2	387	2.7(0.9)	33.3
65 이상	200	0.5(0.5)	99.6	76	0.0(0.0)	.	124	0.9(0.9)	98.2
교육수준 ²⁾									
무학	84	0.0(0.0)	.	14	-(-)	-	70	0.0(0.0)	.
초등학교	112	0.9(0.9)	100.5	37	0.0(0.0)	.	75	1.4(1.4)	100.8
중학교	90	1.1(1.1)	100.3	33	0.0(0.0)	.	57	1.9(1.9)	99.3
고등학교	333	1.3(0.6)	41.5	170	0.4(0.4)	99.5	163	2.5(1.3)	52.5
대학교 이상	290	2.6(0.9)	35.2	149	1.9(1.4)	70.4	141	3.4(1.6)	46.0
직업									
전문행정관리	123	2.2(1.4)	61.0	69	1.1(1.1)	98.9	54	3.8(2.9)	76.3
사무직	78	0.0(0.0)	.	42	0.0(0.0)	.	36	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	109	1.7(1.7)	99.4	28	5.4(5.3)	97.4	81	0.0(0.0)	.
농림어업	48	0.0(0.0)	.	23	0.0(0.0)	.	25	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	190	0.9(0.9)	101.1	156	1.1(1.1)	100.9	34	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	368	2.5(0.9)	37.2	87	0.0(0.0)	.	281	3.5(1.3)	36.3
월 가구소득									
50만원 미만	98	3.2(2.2)	69.9	23	0.0(0.0)	.	75	4.4(3.0)	67.7
50-100만원 미만	92	0.0(0.0)	.	36	0.0(0.0)	.	56	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	97	1.3(1.2)	98.2	45	0.0(0.0)	.	52	2.6(2.6)	99.2
200-300만원 미만	135	1.2(0.9)	70.7	71	0.0(0.0)	.	64	2.9(2.1)	70.7
300-400만원 미만	157	2.8(1.5)	53.8	66	2.2(2.1)	97.5	91	3.3(2.1)	63.8
400-500만원 미만	111	2.9(1.8)	63.0	54	4.1(3.1)	76.5	57	1.4(1.4)	100.0
500-600만원 미만	51	0.0(0.0)	.	25	0.0(0.0)	.	26	0.0(0.0)	.
600만원 이상	137	1.1(0.8)	69.3	65	0.0(0.0)	.	72	2.5(1.7)	67.8

주 : 1) 영양교육 및 상담수혜율 : (최근 1년(365일) 동안 영양교육 및 상담을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 39〉 비만도 분포 및 비만을

(단위 : %, 평균)

구분	N	비만도 분포 ¹⁾						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율) ²⁾		평균(표준오차)	변동계수
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수		
전체	891	4.5(0.8)	17.2	72.0(1.6)	2.2	23.5(1.5)	6.5	23.2(0.1)	0.5
성									
남자	402	2.6(1.0)	38.4	68.8(2.4)	3.5	28.6(2.4)	8.5	23.9(0.2)	0.7
여자	489	6.6(1.3)	19.8	75.4(2.3)	3.0	18.0(1.8)	10.0	22.5(0.1)	0.6
연령									
19-29	84	10.0(2.8)	27.7	76.6(4.1)	5.3	13.3(3.0)	22.7	22.4(0.3)	1.5
30-39	140	4.2(1.7)	40.9	68.4(4.7)	6.8	27.5(4.6)	16.7	23.4(0.3)	1.1
40-49	236	2.5(0.9)	36.5	70.6(2.9)	4.1	26.9(2.8)	10.6	23.5(0.2)	0.9
50-59	188	1.4(0.8)	60.5	74.7(3.0)	4.0	23.9(3.2)	13.2	23.5(0.2)	0.9
60-69	121	1.5(1.0)	66.0	70.1(3.9)	5.6	28.5(3.7)	13.2	24.0(0.2)	0.9
70 이상	122	11.7(2.7)	23.3	71.2(3.9)	5.4	17.1(3.7)	21.3	22.4(0.3)	1.5
19-64	710	3.8(0.9)	22.2	72.0(1.8)	2.4	24.1(1.7)	6.9	23.3(0.1)	0.6
65 이상	181	8.7(2.0)	23.1	71.8(3.5)	4.9	19.5(3.3)	16.8	22.8(0.3)	1.1
교육수준 ³⁾									
무학	70	10.5(4.2)	39.8	73.7(5.2)	7.1	15.8(4.0)	25.5	22.3(0.4)	1.7
초등학교	106	4.5(1.8)	39.8	70.3(4.6)	6.6	25.3(4.5)	17.7	23.3(0.3)	1.3
중학교	90	0.7(0.1)	11.3	65.8(5.3)	8.1	33.6(5.3)	15.9	23.9(0.3)	1.3
고등학교	331	5.4(1.4)	26.3	71.7(2.6)	3.7	22.9(2.4)	10.6	23.3(0.2)	0.8
대학교 이상	287	3.7(1.1)	28.9	73.5(2.5)	3.5	22.8(2.5)	10.8	23.2(0.2)	0.8
직업									
전문행정관리	121	4.2(1.7)	39.3	75.2(3.7)	4.9	20.6(3.5)	16.9	23.0(0.2)	1.0
사무직	77	1.7(1.2)	69.7	76.2(5.3)	7.0	22.1(5.1)	23.0	23.1(0.4)	1.7
판매·서비스직	108	7.4(3.3)	44.1	71.0(4.8)	6.8	21.6(4.2)	19.6	23.0(0.3)	1.3
농림어업	48	1.5(1.4)	96.2	63.9(7.5)	11.8	34.7(6.4)	18.6	23.8(0.2)	0.8
기능단순노무직	189	2.3(1.3)	54.5	67.3(4.0)	5.9	30.4(3.9)	12.7	24.0(0.3)	1.2
기타 ⁴⁾	348	6.4(1.5)	22.9	73.8(2.3)	3.1	19.8(2.2)	11.2	22.9(0.2)	0.9
월 가구소득									
50만원 미만	87	10.7(3.9)	36.2	73.3(4.9)	6.6	15.9(3.4)	21.2	22.3(0.3)	1.3
50-100만원 미만	87	2.6(1.4)	53.9	67.0(5.8)	8.7	30.4(6.0)	19.8	23.7(0.4)	1.6
100-200만원 미만	97	2.7(1.6)	60.1	55.4(5.0)	9.0	41.9(5.0)	11.9	24.3(0.4)	1.7
200-300만원 미만	134	4.1(1.7)	42.3	67.3(3.6)	5.3	28.6(3.5)	12.3	23.7(0.3)	1.1
300-400만원 미만	153	3.6(1.7)	47.8	72.8(3.5)	4.9	23.6(3.4)	14.4	23.1(0.3)	1.1
400-500만원 미만	110	6.0(3.0)	50.2	76.4(4.5)	5.9	17.6(3.5)	20.1	22.9(0.3)	1.5
500-600만원 미만	51	0.0(0.0)	.	81.2(4.8)	6.0	18.8(4.8)	25.8	23.3(0.2)	1.0
600만원 이상	135	4.7(1.8)	37.1	79.0(4.3)	5.5	16.3(3.3)	20.3	23.0(0.3)	1.2

주 : 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만율 : (체질량지수(kg/m²) 25 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 40〉 주관적 비만인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	916	36.7(1.7)	4.5	405	33.4(2.2)	6.7	511	40.2(2.1)	5.1
연령									
19-29	86	34.3(4.9)	14.2	41	29.7(7.0)	23.7	45	40.0(6.7)	16.7
30-39	142	49.8(5.1)	10.3	61	42.4(7.2)	16.9	81	57.6(6.0)	10.5
40-49	237	44.3(2.9)	6.6	113	44.1(4.1)	9.4	124	44.7(4.1)	9.3
50-59	189	26.7(3.5)	13.0	84	24.1(5.0)	20.7	105	29.7(4.4)	14.7
60-69	121	39.1(4.0)	10.3	56	27.8(6.5)	23.4	65	50.3(4.8)	9.6
70 이상	141	15.5(3.3)	21.4	50	16.4(5.6)	34.0	91	14.9(3.8)	25.2
19-64	716	39.6(1.9)	4.7	329	35.4(2.5)	7.1	387	44.3(2.4)	5.5
65 이상	200	20.5(2.9)	14.3	76	19.0(4.7)	25.0	124	21.6(3.5)	16.4
교육수준 ²⁾									
무학	84	15.5(4.3)	27.9	14	-(-)	-	70	17.8(5.1)	28.5
초등학교	112	27.9(4.3)	15.4	37	28.7(6.6)	23.1	75	27.5(4.7)	17.2
중학교	90	48.3(5.6)	11.6	33	44.9(9.6)	21.5	57	50.7(6.0)	11.9
고등학교	333	39.5(2.7)	6.9	170	30.7(3.1)	10.0	163	51.2(4.2)	8.2
대학교 이상	290	37.6(2.5)	6.5	149	37.2(3.9)	10.4	141	38.1(3.5)	9.1
직업									
전문행정관리	123	36.0(4.9)	13.5	69	33.4(6.3)	18.7	54	39.5(7.1)	18.0
사무직	78	41.9(6.3)	15.0	42	50.6(8.5)	16.7	36	29.8(7.6)	25.6
판매·서비스직	109	41.3(5.0)	12.2	28	37.8(9.1)	24.1	81	43.0(5.6)	13.0
농림어업	48	29.3(4.8)	16.4	23	28.2(8.1)	28.7	25	30.8(6.4)	20.7
기능단순노무직	190	35.0(3.2)	9.2	156	35.5(3.4)	9.5	34	31.8(8.0)	25.3
기타 ³⁾	368	36.3(2.8)	7.7	87	19.2(4.0)	20.8	281	42.9(3.4)	7.9
월 가구소득									
50만원 미만	98	30.2(4.4)	14.7	23	22.2(10.1)	45.5	75	33.2(5.3)	16.0
50-100만원 미만	92	33.4(5.3)	15.9	36	37.6(9.1)	24.3	56	30.2(6.6)	22.0
100-200만원 미만	97	40.7(5.0)	12.4	45	36.8(7.0)	19.1	52	44.9(8.0)	17.8
200-300만원 미만	135	44.3(4.0)	9.1	71	42.2(5.5)	13.0	64	47.2(7.4)	15.7
300-400만원 미만	157	43.0(4.3)	10.0	66	35.0(5.8)	16.7	91	49.6(5.1)	10.2
400-500만원 미만	111	32.9(4.5)	13.8	54	25.0(5.9)	23.5	57	43.3(7.8)	18.0
500-600만원 미만	51	31.1(5.9)	19.0	25	33.3(7.9)	23.7	26	28.3(7.5)	26.5
600만원 이상	137	35.4(3.7)	10.3	65	32.4(5.1)	15.9	72	39.0(5.9)	15.1

주 : 1) 주관적 비만인지율 : (“약간 비만임” 또는 “매우 비만임”이라고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 41〉 체중조절 시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	916	52.5(1.8)	3.4	405	43.3(2.9)	6.7	511	62.1(2.4)	3.8
연령									
19-29	86	61.1(5.1)	8.3	41	45.0(8.9)	19.8	45	81.1(5.1)	6.3
30-39	142	66.7(4.2)	6.3	61	52.8(7.1)	13.5	81	81.3(4.5)	5.6
40-49	237	56.0(3.6)	6.4	113	42.4(5.1)	12.0	124	71.1(4.4)	6.2
50-59	189	51.3(3.6)	7.1	84	45.1(5.8)	12.9	105	58.4(5.1)	8.7
60-69	121	44.9(5.3)	11.8	56	38.7(7.4)	19.0	65	51.1(6.5)	12.7
70 이상	141	13.1(3.0)	23.3	50	18.7(5.7)	30.5	91	9.7(3.1)	32.4
19-64	716	58.0(2.0)	3.4	329	46.3(3.3)	7.0	387	71.1(2.5)	3.6
65 이상	200	21.0(2.9)	13.8	76	20.9(4.6)	22.1	124	21.0(3.1)	15.0
교육수준 ²⁾									
무학	84	8.0(3.3)	41.2	14	-(-)	-	70	8.5(3.6)	41.7
초등학교	112	26.2(3.8)	14.5	37	19.4(6.0)	30.8	75	29.8(4.7)	15.6
중학교	90	51.0(5.2)	10.2	33	34.7(8.8)	25.4	57	62.6(6.0)	9.6
고등학교	333	54.3(2.9)	5.3	170	41.9(4.4)	10.5	163	70.6(4.0)	5.6
대학교 이상	290	64.7(2.8)	4.3	149	51.9(4.2)	8.1	141	81.1(3.6)	4.5
직업									
전문행정관리	123	63.1(4.3)	6.8	69	46.9(5.4)	11.5	54	85.7(4.5)	5.2
사무직	78	59.6(5.1)	8.6	42	51.8(8.5)	16.5	36	70.5(8.2)	11.6
판매·서비스직	109	60.1(5.4)	8.9	28	42.8(11.2)	26.3	81	67.9(5.1)	7.5
농림어업	48	21.0(5.6)	26.5	23	13.6(5.4)	39.7	25	30.7(8.1)	26.4
기능단순노무직	190	47.5(4.5)	9.5	156	45.8(4.9)	10.6	34	58.9(8.3)	14.1
기타 ³⁾	368	50.1(2.6)	5.1	87	36.6(5.7)	15.6	281	55.4(3.3)	5.9
월 가구소득									
50만원 미만	98	22.8(5.0)	21.9	23	25.0(9.6)	38.5	75	22.0(5.8)	26.5
50-100만원 미만	92	31.7(5.8)	18.4	36	25.7(8.0)	31.2	56	36.2(6.6)	18.1
100-200만원 미만	97	42.0(5.3)	12.7	45	27.7(7.4)	26.7	52	57.3(7.5)	13.1
200-300만원 미만	135	55.1(4.5)	8.2	71	44.7(5.7)	12.8	64	69.9(6.5)	9.3
300-400만원 미만	157	58.8(3.7)	6.3	66	42.3(6.0)	14.1	91	72.7(4.8)	6.6
400-500만원 미만	111	60.7(3.6)	5.9	54	45.4(6.3)	14.0	57	81.0(4.9)	6.1
500-600만원 미만	51	65.9(6.1)	9.2	25	52.4(9.0)	17.2	26	82.9(5.1)	6.2
600만원 이상	137	63.1(4.3)	6.8	65	59.0(6.1)	10.3	72	68.1(8.0)	11.8

주 : 1) 체중조절 시도율 : (최근 1년(365일) 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 42〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	916	34.7(1.7)	5.0	405	36.4(2.4)	6.6	511	32.9(2.2)	6.8
연령									
19-29	86	14.7(4.2)	28.2	41	21.1(7.2)	33.9	45	6.8(3.8)	56.3
30-39	142	29.3(4.0)	13.6	61	27.9(5.1)	18.4	81	30.8(5.1)	16.7
40-49	237	34.7(3.4)	9.6	113	36.4(4.9)	13.4	124	32.9(4.5)	13.6
50-59	189	36.1(3.8)	10.4	84	41.6(6.1)	14.7	105	29.8(4.5)	15.2
60-69	121	47.1(5.0)	10.7	56	51.5(7.1)	13.9	65	42.7(7.1)	16.7
70 이상	141	61.5(4.3)	7.0	50	59.7(6.6)	11.1	91	62.6(5.3)	8.4
19-64	716	30.7(1.9)	6.1	329	33.5(2.8)	8.2	387	27.5(2.3)	8.5
65 이상	200	57.7(4.0)	6.9	76	57.6(5.9)	10.2	124	57.8(4.8)	8.3
교육수준 ²⁾									
무학	84	60.9(5.4)	8.8	14	-(-)	-	70	58.6(5.4)	9.2
초등학교	112	54.0(4.5)	8.3	37	54.3(8.0)	14.7	75	53.9(6.1)	11.4
중학교	90	35.6(4.8)	13.4	33	41.7(9.1)	21.8	57	31.3(6.3)	20.3
고등학교	333	30.6(2.3)	7.7	170	33.8(3.3)	9.9	163	26.5(3.2)	12.1
대학교 이상	290	30.0(2.9)	9.7	149	33.8(4.1)	12.2	141	25.1(3.5)	13.9
직업									
전문행정관리	123	34.7(3.8)	11.0	69	37.3(5.5)	14.8	54	31.1(6.7)	21.5
사무직	78	34.9(6.8)	19.6	42	42.7(8.4)	19.7	36	24.2(8.7)	36.1
판매·서비스직	109	26.5(4.4)	16.7	28	25.2(8.2)	32.5	81	27.1(4.9)	18.2
농림어업	48	47.9(5.4)	11.3	23	50.4(9.7)	19.3	25	44.5(7.1)	16.0
기능단순노무직	190	36.2(3.4)	9.4	156	34.5(3.6)	10.4	34	47.7(8.9)	18.6
기타 ³⁾	368	34.7(2.9)	8.3	87	36.6(4.8)	13.1	281	34.0(3.0)	8.8
월 가구소득									
50만원 미만	98	48.7(5.8)	11.9	23	42.8(11.3)	26.3	75	50.9(6.4)	12.5
50-100만원 미만	92	51.6(5.2)	10.2	36	56.5(9.1)	16.1	56	47.8(6.7)	14.0
100-200만원 미만	97	44.5(5.4)	12.1	45	47.8(8.0)	16.8	52	41.0(6.7)	16.3
200-300만원 미만	135	34.8(4.2)	12.0	71	37.6(5.6)	14.9	64	30.7(5.2)	16.9
300-400만원 미만	157	38.1(4.2)	11.0	66	36.4(5.6)	15.4	91	39.6(4.7)	12.0
400-500만원 미만	111	23.7(3.6)	15.1	54	27.2(6.1)	22.3	57	19.1(5.0)	25.9
500-600만원 미만	51	35.7(7.7)	21.5	25	39.3(11.8)	30.0	26	31.0(10.0)	32.4
600만원 이상	137	22.5(3.5)	15.6	65	27.9(6.6)	23.8	72	16.1(4.3)	27.0

주 : 1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 : (“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 43〉 저작불편호소율 : 65세 이상¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	200	46.3(4.0)	8.7	76	49.9(6.1)	12.3	124	43.8(4.3)	9.8
교육수준 ²⁾									
무학	78	52.8(5.5)	10.3	13	—(—)	—	65	48.8(5.3)	10.9
초등학교	67	48.0(6.5)	13.5	27	47.8(9.8)	20.5	40	48.2(7.3)	15.1
중학교	20	17.7(8.2)	46.0	9	—(—)	—	11	—(—)	—
고등학교	31	47.6(8.6)	18.0	23	55.8(11.1)	19.8	8	—(—)	—
대학교 이상	3	—(—)	—	3	—(—)	—	0	—(—)	—
월 가구소득									
50만원 미만	74	52.3(7.5)	14.3	17	—(—)	—	57	53.3(8.0)	14.9
50-100만원 미만	63	42.5(5.9)	13.9	28	49.7(8.2)	16.5	35	35.7(6.5)	18.1
100-200만원 미만	26	35.9(9.1)	25.3	14	—(—)	—	12	—(—)	—
200-300만원 미만	8	—(—)	—	4	—(—)	—	4	—(—)	—
300-400만원 미만	12	—(—)	—	4	—(—)	—	8	—(—)	—
400-500만원 미만	4	—(—)	—	2	—(—)	—	2	—(—)	—
500-600만원 미만	1	—(—)	—	1	—(—)	—	0	—(—)	—
600만원 이상	6	—(—)	—	2	—(—)	—	4	—(—)	—

주 : 1) 저작불편호소율 : (“매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

〈표 44〉 틀니 이용 행태 : 50세 이상¹⁾

(단위 : %)

구분	N	위아래 둘 다 있음		위쪽만 있음		아래쪽만 있음		아니오	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	451	19.8(1.8)	9.3	9.6(1.3)	14.0	2.1(0.8)	39.6	68.5(2.3)	3.3
성									
남자	190	14.1(2.2)	15.9	11.6(2.1)	18.5	1.7(1.4)	79.4	72.6(2.8)	3.9
여자	261	25.2(2.9)	11.4	7.7(1.6)	20.4	2.5(1.0)	39.9	64.6(3.4)	5.3
교육수준 ²⁾									
무학	83	55.6(4.6)	8.3	13.4(4.5)	33.6	5.3(2.2)	42.1	25.7(5.4)	21.0
초등학교	111	32.4(4.1)	12.6	13.3(2.6)	19.8	2.9(1.6)	55.5	51.4(4.3)	8.3
중학교	79	10.5(2.9)	27.4	7.5(2.7)	36.0	0.9(0.9)	102.1	81.1(4.2)	5.2
고등학교	122	9.4(2.8)	29.3	8.6(2.6)	30.4	2.0(1.6)	80.0	80.0(3.9)	4.8
대학교 이상	49	0.8(0.8)	100.6	6.2(4.2)	67.6	0.0(0.0)	.	93.0(4.2)	4.5
월 가구소득									
50만원 미만	91	40.6(5.1)	12.6	11.8(3.2)	27.1	3.2(1.6)	51.8	44.5(5.6)	12.6
50-100만원 미만	84	37.6(4.7)	12.4	10.2(3.8)	37.0	2.6(1.5)	58.5	49.5(5.5)	11.1
100-200만원 미만	59	21.2(5.0)	23.5	11.6(4.2)	36.7	1.2(1.2)	99.8	66.0(6.9)	10.4
200-300만원 미만	45	12.0(5.1)	42.9	16.8(5.7)	34.2	1.7(1.7)	99.5	69.5(6.6)	9.6
300-400만원 미만	46	11.4(4.7)	41.2	8.2(3.7)	45.3	2.3(2.1)	92.2	78.1(6.5)	8.3
400-500만원 미만	35	2.1(2.0)	94.9	6.9(3.6)	52.2	2.1(2.1)	99.8	88.9(4.3)	4.8
500-600만원 미만	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
600만원 이상	58	5.1(2.5)	49.3	4.0(2.9)	72.6	0.0(0.0)	.	90.9(4.5)	5.0

주 : 1) 틀니 이용 행태 : (틀니 이용 행태별 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

〈표 45〉어제 하루 치솔질 실천율

(단위 : %)

구분	아침식사 후 치솔질 실천율 ¹⁾			점심식사 후 치솔질 실천율 ²⁾			저녁식사 후 치솔질 실천율 ³⁾			잠자기 전 치솔질 실천율 ⁴⁾		
	N	%(표준오차)	변동 계수	N	%(표준오차)	변동 계수	N	%(표준오차)	변동 계수	N	%(표준오차)	변동 계수
전체	789	89.8(1.2)	1.4	912	57.0(2.0)	3.5	911	71.8(1.8)	2.6	912	60.1(2.1)	3.5
성												
남자	342	86.8(1.9)	2.2	404	56.2(2.6)	4.6	402	70.8(2.4)	3.3	402	57.3(2.8)	4.9
여자	447	92.8(1.6)	1.7	508	57.8(2.4)	4.2	509	72.7(2.2)	3.1	510	63.0(2.5)	4.0
연령												
19-29	58	82.4(4.9)	6.0	85	75.6(4.8)	6.3	86	73.1(4.8)	6.6	85	60.2(4.6)	7.6
30-39	111	87.3(3.6)	4.2	142	56.3(4.3)	7.7	140	70.8(4.0)	5.7	141	72.6(4.1)	5.6
40-49	190	92.0(1.9)	2.1	235	59.0(3.0)	5.1	235	72.5(3.5)	4.9	235	65.1(3.5)	5.4
50-59	174	93.5(2.2)	2.4	188	57.1(3.8)	6.6	188	74.3(4.1)	5.5	189	56.3(4.5)	8.1
60-69	117	93.1(2.6)	2.8	121	42.6(4.5)	10.5	121	78.8(3.6)	4.6	121	48.3(4.9)	10.1
70 이상	139	87.5(3.3)	3.8	141	38.1(5.6)	14.8	141	57.8(5.4)	9.4	141	43.9(4.5)	10.1
19-64	591	89.9(1.4)	1.5	712	60.2(2.1)	3.5	711	73.0(2.0)	2.7	712	63.1(2.4)	3.7
65 이상	198	89.3(2.6)	2.9	200	38.5(4.7)	12.2	200	64.8(4.2)	6.5	200	43.6(3.7)	8.6
교육수준 ⁵⁾												
무학	84	82.8(4.8)	5.8	84	29.9(7.2)	24.2	84	53.1(6.8)	12.7	84	53.8(5.8)	10.7
초등학교	110	93.1(2.4)	2.6	112	43.8(5.1)	11.6	112	71.2(4.1)	5.7	112	39.0(4.0)	10.2
중학교	83	94.4(2.8)	3.0	88	43.2(4.9)	11.4	90	75.3(5.2)	6.9	90	42.4(5.3)	12.5
고등학교	270	87.1(2.3)	2.6	332	58.8(3.3)	5.7	330	73.0(2.8)	3.9	331	60.8(3.6)	5.9
대학교 이상	236	92.2(1.7)	1.9	289	65.5(2.9)	4.4	288	72.8(2.7)	3.7	288	69.3(2.9)	4.1
직업												
전문행정관리	98	94.7(2.6)	2.7	122	72.4(4.1)	5.6	121	73.4(4.2)	5.7	122	75.0(3.7)	4.9
사무직	65	88.7(4.7)	5.3	78	76.0(5.8)	7.6	77	78.7(4.4)	5.5	78	64.9(5.8)	8.9
판매·서비스직	92	91.6(3.1)	3.4	108	69.0(4.7)	6.8	109	78.2(4.6)	5.8	109	61.4(4.3)	7.1
농림어업	47	89.2(5.9)	6.7	48	32.2(7.2)	22.3	48	72.3(4.9)	6.7	48	39.1(4.8)	12.4
기능단순노무직	154	89.3(2.8)	3.1	188	49.5(4.1)	8.3	189	73.4(3.5)	4.8	187	56.6(3.8)	6.6
기타 ⁶⁾	333	88.0(2.3)	2.7	368	48.9(3.5)	7.1	367	66.0(3.3)	4.9	368	56.4(3.2)	5.7
월 가구소득												
50만원 미만	95	88.5(3.7)	4.1	98	31.7(5.9)	18.5	98	53.3(5.8)	10.9	98	56.8(6.0)	10.6
50-100만원 미만	89	90.4(3.4)	3.7	92	50.1(7.4)	14.7	92	73.2(6.1)	8.3	92	39.9(6.0)	15.1
100-200만원 미만	85	87.3(3.9)	4.5	96	40.1(5.3)	13.2	96	77.6(4.8)	6.2	96	52.3(6.2)	11.8
200-300만원 미만	111	85.4(3.8)	4.5	133	51.8(4.9)	9.5	134	67.3(4.8)	7.2	134	58.6(4.8)	8.1
300-400만원 미만	129	91.6(2.4)	2.6	157	58.3(4.0)	6.8	155	73.6(4.4)	5.9	157	69.0(4.3)	6.2
400-500만원 미만	90	94.6(2.4)	2.5	111	68.3(5.3)	7.8	111	70.1(5.0)	7.1	111	62.1(7.5)	12.0
500-600만원 미만	42	85.3(6.1)	7.1	51	60.8(7.3)	12.0	51	74.4(8.1)	10.8	50	66.0(6.8)	10.3
600만원 이상	114	92.0(2.9)	3.1	136	68.4(5.3)	7.8	136	77.6(4.5)	5.8	136	64.0(4.8)	7.5

주 : 1) 아침식사 후 치솔질 실천율 : (아침식사 후 치솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 아침

2) 점심식사 후 치솔질 실천율 : (점심식사 후 치솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 점심식사 한 사람의 수) × 100

3) 저녁식사 후 치솔질 실천율 : (저녁식사 후 치솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 저녁식사 한 사람의 수) × 100

4) 잠자기 전 치솔질 실천율 : (잠자기 전 치솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 잠을 잔 사람의 수) × 100

5) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

6) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 46〉 구강검진 수진율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	915	28.2(1.9)	6.7	404	31.4(2.6)	8.2	511	25.0(2.4)	9.5
연령									
19-29	86	31.7(5.6)	17.8	41	24.6(6.2)	25.1	45	40.4(7.3)	18.1
30-39	142	33.7(4.2)	12.4	61	42.0(6.4)	15.2	81	24.9(4.6)	18.5
40-49	236	34.9(3.6)	10.3	112	39.0(4.6)	11.7	124	30.4(4.8)	15.9
50-59	189	25.3(4.0)	15.7	84	29.9(5.7)	19.0	105	20.0(4.1)	20.7
60-69	121	25.6(4.0)	15.5	56	27.3(5.7)	20.8	65	24.0(5.5)	22.9
70 이상	141	5.1(2.1)	40.8	50	4.1(2.9)	70.8	91	5.7(2.2)	39.0
19-64	715	31.1(2.2)	7.1	328	33.8(2.9)	8.5	387	28.2(2.8)	10.0
65 이상	200	11.6(2.1)	18.4	76	13.8(3.1)	22.3	124	10.1(2.7)	27.1
교육수준 ²⁾									
무학	84	4.9(1.9)	38.9	14	-(-)	-	70	6.1(2.3)	38.4
초등학교	112	4.3(1.5)	35.0	37	2.2(2.2)	99.9	75	5.3(1.7)	32.7
중학교	90	28.9(4.1)	14.1	33	30.4(7.4)	24.2	57	27.8(5.0)	18.1
고등학교	332	31.1(2.9)	9.3	169	29.7(3.8)	12.8	163	33.0(4.3)	12.9
대학교 이상	290	34.4(3.7)	10.7	149	39.4(4.3)	10.9	141	28.0(5.0)	17.9
직업									
전문행정관리	123	44.8(5.2)	11.7	69	46.7(6.4)	13.8	54	42.1(8.6)	20.5
사무직	78	31.9(6.0)	18.7	42	37.7(8.5)	22.5	36	23.7(7.6)	31.9
판매·서비스직	109	17.0(4.3)	25.5	28	12.0(7.0)	58.3	81	19.3(5.5)	28.6
농림어업	48	20.4(7.1)	35.0	23	14.3(7.1)	49.9	25	28.5(9.7)	34.2
기능단순노무직	189	35.6(3.9)	11.0	155	35.8(4.2)	11.7	34	34.6(9.2)	26.6
기타 ³⁾	368	19.4(2.0)	10.1	87	15.1(3.9)	25.6	281	21.1(2.4)	11.3
월 가구소득									
50만원 미만	98	11.8(3.3)	27.9	23	16.3(9.4)	57.4	75	10.0(3.7)	37.4
50-100만원 미만	92	18.9(3.6)	18.8	36	18.9(5.3)	27.9	56	19.0(5.5)	29.1
100-200만원 미만	97	20.8(6.0)	28.9	45	22.5(7.3)	32.6	52	19.0(6.0)	31.4
200-300만원 미만	134	28.5(4.6)	16.2	70	32.0(5.9)	18.4	64	23.7(6.0)	25.2
300-400만원 미만	157	27.9(3.6)	13.0	66	34.8(5.4)	15.4	91	22.2(4.3)	19.6
400-500만원 미만	111	27.4(4.6)	16.7	54	27.8(6.0)	21.6	57	26.9(7.9)	29.2
500-600만원 미만	51	41.1(7.0)	16.9	25	42.3(7.9)	18.6	26	39.7(9.1)	23.0
600만원 이상	137	41.0(6.1)	14.8	65	43.2(7.4)	17.0	72	38.5(7.4)	19.3

주 : 1) 구강검진 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 구강검진을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 47〉 연간 스케일링 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	916	33.9(1.8)	5.2	405	33.3(2.0)	6.0	511	34.6(2.9)	8.5
연령									
19-29	86	36.0(6.1)	16.8	41	21.8(7.3)	33.5	45	53.6(7.3)	13.6
30-39	142	36.5(4.6)	12.6	61	30.6(5.5)	18.1	81	42.7(5.8)	13.7
40-49	237	34.1(3.1)	9.0	113	37.0(4.6)	12.4	124	30.9(4.5)	14.7
50-59	189	43.7(3.6)	8.3	84	45.7(4.5)	9.8	105	41.4(5.5)	13.4
60-69	121	31.6(4.3)	13.5	56	38.3(5.5)	14.4	65	24.8(5.2)	20.8
70 이상	141	8.8(2.5)	28.6	50	13.4(4.7)	34.8	91	6.0(2.2)	37.3
19-64	716	37.5(2.0)	5.4	329	35.6(2.2)	6.2	387	39.7(3.5)	8.7
65 이상	200	13.4(2.5)	18.6	76	16.3(3.3)	20.6	124	11.4(3.0)	26.1
교육수준 ²⁾									
무학	84	5.1(2.7)	52.2	14	-(-)	-	70	4.8(2.8)	59.1
초등학교	112	17.1(4.3)	25.2	37	8.6(5.2)	60.6	75	21.6(5.6)	25.9
중학교	90	37.7(5.2)	13.8	33	37.1(8.4)	22.7	57	38.1(6.3)	16.4
고등학교	333	35.9(2.8)	7.9	170	34.0(3.8)	11.2	163	38.5(4.4)	11.5
대학교 이상	290	39.5(3.2)	8.2	149	37.2(3.7)	9.8	141	42.4(4.7)	11.0
직업									
전문행정관리	123	49.4(5.2)	10.5	69	43.9(5.9)	13.5	54	57.0(7.8)	13.6
사무직	78	34.2(5.5)	16.2	42	36.1(7.5)	20.8	36	31.6(8.7)	27.4
판매·서비스직	109	32.6(5.3)	16.4	28	22.8(7.5)	32.8	81	37.1(6.9)	18.7
농림어업	48	25.1(8.2)	32.8	23	23.6(10.3)	43.5	25	27.1(7.7)	28.3
기능단순노무직	190	35.3(3.8)	10.9	156	35.7(4.1)	11.4	34	32.8(7.2)	21.9
기타 ³⁾	368	27.5(2.3)	8.4	87	22.7(5.4)	24.0	281	29.3(3.2)	11.0
월 가구소득									
50만원 미만	98	17.6(4.2)	23.8	23	35.8(11.8)	32.9	75	10.6(3.5)	33.1
50-100만원 미만	92	16.6(4.4)	26.9	36	13.4(5.0)	37.3	56	18.9(5.8)	30.8
100-200만원 미만	97	30.3(7.1)	23.4	45	33.9(8.2)	24.2	52	26.6(6.9)	26.1
200-300만원 미만	135	29.3(4.0)	13.7	71	28.5(5.2)	18.3	64	30.4(6.4)	21.1
300-400만원 미만	157	36.6(3.4)	9.4	66	35.8(5.4)	15.1	91	37.2(4.7)	12.5
400-500만원 미만	111	42.8(6.1)	14.2	54	43.1(8.4)	19.4	57	42.3(8.0)	19.0
500-600만원 미만	51	45.8(7.5)	16.4	25	35.8(8.7)	24.4	26	58.4(9.9)	17.0
600만원 이상	137	41.2(5.6)	13.5	65	36.0(5.0)	13.8	72	47.3(8.5)	18.0

주 : 1) 연간 스케일링 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 스케일링을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 48〉 스트레스 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	915	27.3(1.9)	7.0	405	28.6(2.5)	8.7	510	26.0(2.3)	8.8
연령									
19-29	86	32.3(6.0)	18.7	41	32.6(7.5)	23.1	45	31.9(7.4)	23.2
30-39	142	29.6(4.7)	15.7	61	30.7(5.9)	19.2	81	28.5(5.6)	19.6
40-49	237	32.3(3.1)	9.5	113	35.9(4.3)	11.9	124	28.2(4.4)	15.6
50-59	189	22.7(3.1)	13.6	84	27.6(5.1)	18.5	105	17.0(3.3)	19.5
60-69	121	18.5(3.4)	18.2	56	11.2(4.1)	36.9	65	25.8(4.9)	19.0
70 이상	140	20.8(3.2)	15.3	50	14.4(5.3)	36.6	90	24.8(4.3)	17.5
19-64	716	28.8(2.2)	7.6	329	30.6(2.8)	9.1	387	26.8(2.6)	9.9
65 이상	199	18.7(2.2)	11.6	76	13.9(4.2)	30.4	123	22.1(3.2)	14.4
교육수준 ²⁾									
무학	83	25.2(4.5)	18.0	14	-(-)	-	69	24.0(4.5)	19.0
초등학교	112	19.2(3.7)	19.5	37	13.1(4.9)	37.3	75	22.5(4.9)	21.9
중학교	90	21.4(4.4)	20.4	33	23.7(7.9)	33.2	57	19.8(4.7)	23.7
고등학교	333	25.6(3.0)	11.9	170	25.4(3.9)	15.3	163	25.9(3.5)	13.5
대학교 이상	290	32.5(3.1)	9.6	149	34.6(3.9)	11.4	141	29.8(3.9)	13.2
직업									
전문행정관리	123	35.1(4.5)	12.8	69	40.7(6.0)	14.7	54	27.3(6.3)	23.2
사무직	78	39.7(5.6)	14.2	42	38.3(7.7)	20.2	36	41.6(8.7)	20.9
판매·서비스직	109	27.5(5.1)	18.4	28	23.4(9.4)	40.4	81	29.4(5.9)	20.1
농림어업	48	17.5(5.3)	30.1	23	6.5(4.4)	68.0	25	32.2(8.3)	25.7
기능단순노무직	190	26.7(3.7)	13.9	156	29.1(4.2)	14.4	34	10.7(4.2)	39.2
기타 ³⁾	367	21.9(2.5)	11.6	87	17.7(5.1)	29.0	280	23.6(2.6)	11.2
월 가구소득									
50만원 미만	97	24.4(4.1)	16.8	23	23.9(9.5)	39.9	74	24.6(5.2)	21.1
50-100만원 미만	92	25.9(5.5)	21.2	36	20.4(8.3)	40.8	56	30.1(5.9)	19.7
100-200만원 미만	97	29.0(5.6)	19.4	45	19.8(5.8)	29.3	52	38.8(7.6)	19.6
200-300만원 미만	135	30.2(4.1)	13.5	71	28.5(4.8)	17.0	64	32.5(5.7)	17.4
300-400만원 미만	157	26.1(4.3)	16.6	66	32.1(6.2)	19.4	91	21.0(4.5)	21.4
400-500만원 미만	111	29.6(5.0)	17.0	54	35.1(7.6)	21.5	57	22.4(5.9)	26.3
500-600만원 미만	51	36.3(5.4)	15.0	25	41.6(9.7)	23.3	26	29.6(8.4)	28.5
600만원 이상	137	25.9(4.9)	18.8	65	28.1(6.1)	21.6	72	23.2(5.6)	24.1

주 : 1) 스트레스 인지율 : (평균 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 49〉 우울감 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	916	4.8(0.8)	15.8	405	4.3(1.1)	26.9	511	5.3(0.9)	17.3
연령									
19-29	86	4.9(2.3)	47.8	41	3.4(3.4)	99.1	45	6.6(3.5)	52.9
30-39	142	3.2(1.3)	41.5	61	3.3(2.3)	67.5	81	3.1(1.7)	55.4
40-49	237	5.7(1.4)	24.6	113	4.7(1.9)	40.6	124	6.8(2.1)	30.8
50-59	189	3.5(1.6)	46.9	84	3.3(2.5)	77.0	105	3.7(1.9)	52.3
60-69	121	5.6(2.1)	37.6	56	7.2(3.4)	47.3	65	4.0(2.5)	61.9
70 이상	141	7.2(2.4)	32.9	50	6.0(3.3)	54.9	91	7.9(3.4)	43.4
19-64	716	4.6(0.8)	16.6	329	4.1(1.2)	28.1	387	5.2(1.0)	19.8
65 이상	200	5.6(1.7)	31.2	76	5.3(2.3)	44.0	124	5.8(2.5)	43.2
교육수준 ²⁾									
무학	84	7.5(3.1)	40.5	14	-(-)	-	70	5.9(3.3)	55.5
초등학교	112	5.5(2.1)	38.8	37	4.5(2.7)	61.6	75	6.0(3.0)	50.0
중학교	90	3.8(2.8)	73.8	33	6.4(4.4)	69.3	57	1.9(1.9)	99.7
고등학교	333	5.0(1.3)	25.2	170	4.1(1.6)	38.9	163	6.2(1.7)	27.6
대학교 이상	290	4.2(1.1)	27.0	149	3.6(1.8)	49.3	141	5.1(1.6)	31.8
직업									
전문행정관리	123	2.4(1.4)	58.3	69	2.1(1.5)	70.6	54	2.9(2.8)	96.7
사무직	78	8.0(3.8)	48.1	42	8.3(5.9)	71.0	36	7.5(4.4)	58.8
판매·서비스직	109	1.4(0.2)	10.8	28	0.0(0.0)	.	81	2.1(0.2)	11.1
농림어업	48	6.4(3.4)	52.9	23	8.1(5.5)	67.7	25	4.2(4.1)	98.5
기능단순노무직	190	3.3(1.5)	44.7	156	3.5(1.6)	45.6	34	1.9(1.9)	99.3
기타 ³⁾	368	6.8(1.4)	20.1	87	6.2(2.5)	40.1	281	7.1(1.5)	20.8
월 가구소득									
50만원 미만	98	8.1(2.8)	34.3	23	7.8(5.4)	69.8	75	8.2(3.5)	42.1
50-100만원 미만	92	5.1(2.3)	45.4	36	5.1(3.8)	74.1	56	5.2(2.8)	54.8
100-200만원 미만	97	7.7(3.0)	38.5	45	9.6(3.9)	40.8	52	5.6(3.1)	56.3
200-300만원 미만	135	5.3(1.5)	28.9	71	5.3(2.5)	46.0	64	5.1(1.9)	37.1
300-400만원 미만	157	4.4(1.5)	33.8	66	2.3(1.6)	68.4	91	6.2(2.5)	40.1
400-500만원 미만	111	3.7(1.9)	50.3	54	2.3(1.6)	71.8	57	5.6(3.9)	69.3
500-600만원 미만	51	2.2(2.2)	101.0	25	0.0(0.0)	.	26	5.0(4.9)	98.8
600만원 이상	137	4.8(2.1)	44.7	65	5.8(3.6)	62.1	72	3.5(2.2)	63.1

주 : 1) 우울감 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 연속적으로 2주(14일) 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 경험한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 50〉 자살생각률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	916	6.6(1.0)	15.2	405	3.6(1.0)	26.6	511	9.8(1.6)	16.4
연령									
19-29	86	2.1(1.5)	70.1	41	0.0(0.0)	.	45	4.7(3.3)	70.3
30-39	142	5.6(2.0)	36.9	61	3.3(2.3)	67.5	81	7.9(3.4)	43.3
40-49	237	8.7(1.9)	22.3	113	4.6(1.8)	39.8	124	13.3(3.3)	25.1
50-59	189	5.3(1.8)	33.3	84	5.3(2.8)	53.0	105	5.3(2.1)	39.5
60-69	121	5.9(2.4)	41.0	56	1.7(1.7)	99.0	65	10.2(3.8)	37.0
70 이상	141	14.3(3.6)	25.0	50	6.9(4.1)	59.9	91	18.7(5.1)	27.0
19-64	716	5.7(1.1)	18.4	329	3.3(1.0)	29.9	387	8.5(1.8)	21.4
65 이상	200	11.8(2.8)	23.8	76	5.7(2.9)	50.8	124	16.0(4.0)	25.1
교육수준 ²⁾									
무학	84	17.6(4.3)	24.4	14	-(-)	-	70	20.0(4.8)	23.8
초등학교	112	12.1(3.7)	30.5	37	8.9(4.8)	54.3	75	13.9(4.3)	31.0
중학교	90	6.1(3.1)	51.3	33	9.3(5.2)	56.0	57	3.8(2.7)	70.0
고등학교	333	7.2(1.4)	19.5	170	4.0(1.6)	39.4	163	11.4(2.7)	23.7
대학교 이상	290	3.1(1.0)	33.4	149	1.4(1.0)	70.6	141	5.3(1.8)	34.6
직업									
전문행정관리	123	3.7(1.8)	48.0	69	0.0(0.0)	.	54	8.8(4.1)	47.0
사무직	78	6.1(2.6)	41.9	42	2.2(2.2)	99.6	36	11.5(5.4)	46.5
판매·서비스직	109	4.2(2.0)	48.4	28	2.7(2.7)	100.0	81	4.9(2.7)	55.8
농림어업	48	1.8(1.8)	98.6	23	0.0(0.0)	.	25	4.2(4.1)	98.5
기능단순노무직	190	4.7(1.5)	33.2	156	4.3(1.7)	40.7	34	7.4(5.2)	70.4
기타 ³⁾	368	10.7(2.0)	18.9	87	7.5(3.0)	40.8	281	11.9(2.1)	17.6
월 가구소득									
50만원 미만	98	22.3(4.7)	21.2	23	17.4(8.5)	48.5	75	24.2(6.1)	25.0
50-100만원 미만	92	8.9(3.4)	38.5	36	5.7(4.1)	71.8	56	11.3(4.3)	38.0
100-200만원 미만	97	9.3(3.0)	31.9	45	7.2(3.4)	47.1	52	11.6(4.0)	34.9
200-300만원 미만	135	7.6(2.1)	27.8	71	4.8(2.3)	48.2	64	11.5(4.4)	38.0
300-400만원 미만	157	7.6(2.2)	29.5	66	4.5(2.6)	57.0	91	10.1(3.3)	32.1
400-500만원 미만	111	2.0(1.4)	72.4	54	0.0(0.0)	.	57	4.5(3.3)	73.4
500-600만원 미만	51	5.3(3.8)	71.3	25	0.0(0.0)	.	26	12.0(8.0)	66.8
600만원 이상	137	1.8(1.2)	68.4	65	1.7(1.7)	100.1	72	1.8(1.7)	94.8

주 : 1) 자살생각률 : (최근 1년(365일) 동안 자살을 생각해 본 적이 있는 사람의 수/ 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 51〉 자살시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	916	0.5(0.3)	61.3	405	0.8(0.6)	81.1	511	0.3(0.2)	70.8
연령									
19-29	86	1.9(1.9)	98.5	41	3.4(3.4)	99.1	45	0.0(0.0)	.
30-39	142	0.4(0.4)	99.3	61	0.0(0.0)	.	81	0.8(0.8)	97.7
40-49	237	0.0(0.0)	.	113	0.0(0.0)	.	124	0.0(0.0)	.
50-59	189	0.5(0.4)	98.2	84	0.9(0.8)	98.8	105	0.0(0.0)	.
60-69	121	0.0(0.0)	.	56	0.0(0.0)	.	65	0.0(0.0)	.
70 이상	141	0.7(0.7)	97.8	50	0.0(0.0)	.	91	1.1(1.1)	97.4
19-64	716	0.6(0.4)	68.8	329	0.9(0.7)	81.0	387	0.2(0.2)	99.3
65 이상	200	0.5(0.5)	98.6	76	0.0(0.0)	.	124	0.8(0.8)	98.0
교육수준 ²⁾									
무학	84	0.0(0.0)	.	14	-(-)	-	70	0.0(0.0)	.
초등학교	112	0.8(0.8)	98.4	37	0.0(0.0)	.	75	1.3(1.2)	96.3
중학교	90	1.2(1.2)	100.0	33	2.9(2.9)	99.8	57	0.0(0.0)	.
고등학교	333	0.2(0.2)	99.5	170	0.0(0.0)	.	163	0.5(0.5)	99.2
대학교 이상	290	0.8(0.8)	99.2	149	1.4(1.4)	100.8	141	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	123	0.0(0.0)	.	69	0.0(0.0)	.	54	0.0(0.0)	.
사무직	78	3.1(3.1)	100.0	42	5.4(5.3)	98.2	36	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	109	0.0(0.0)	.	28	0.0(0.0)	.	81	0.0(0.0)	.
농림어업	48	0.0(0.0)	.	23	0.0(0.0)	.	25	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	190	0.0(0.0)	.	156	0.0(0.0)	.	34	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	368	0.7(0.4)	58.0	87	0.9(0.9)	99.8	281	0.6(0.4)	71.0
월 가구소득									
50만원 미만	98	1.0(0.9)	96.3	23	0.0(0.0)	.	75	1.3(1.3)	96.0
50-100만원 미만	92	1.3(1.3)	102.8	36	3.0(3.0)	102.8	56	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	97	0.9(0.9)	97.6	45	0.0(0.0)	.	52	1.9(1.9)	97.7
200-300만원 미만	135	0.0(0.0)	.	71	0.0(0.0)	.	64	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	157	0.0(0.0)	.	66	0.0(0.0)	.	91	0.0(0.0)	.
400-500만원 미만	111	0.0(0.0)	.	54	0.0(0.0)	.	57	0.0(0.0)	.
500-600만원 미만	51	0.0(0.0)	.	25	0.0(0.0)	.	26	0.0(0.0)	.
600만원 이상	137	1.7(1.7)	97.5	65	3.2(3.2)	100.9	72	0.0(0.0)	.

주 : 1) 자살시도율 : (최근 1년(365일) 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있는 사람의 수/ 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 52〉 자살생각으로 인한 정신상담률

(단위 : %)

구분	자살생각으로 인한 정신상담률 ³⁾		
	N	% (표준오차)	변동계수
전체	67	15.9(6.1)	38.3
성			
남자	17	-()	-
여자	50	17.9(6.3)	35.1
연령			
19-29	2	-()	-
30-39	7	-()	-
40-49	21	19.8(9.7)	48.9
50-59	11	-()	-
60-69	7	-()	-
70 이상	19	-()	-
19-64	45	19.0(8.4)	44.4
65 이상	22	7.4(1.3)	17.8
교육수준 ⁵⁾			
무학	14	-()	-
초등학교	13	-()	-
중학교	5	-()	-
고등학교	25	18.5(9.3)	50.2
대학교 이상	9	-()	-
직업			
전문행정관리	4	-()	-
사무직	6	-()	-
판매·서비스직	3	-()	-
농림어업	1	-()	-
기능단순노무직	9	-()	-
기타 ⁶⁾	44	22.7(8.7)	38.0
월 가구소득			
50만원 미만	20	7.9(1.6)	19.6
50-100만원 미만	8	-()	-
100-200만원 미만	9	-()	-
200-300만원 미만	10	-()	-
300-400만원 미만	14	-()	-
400-500만원 미만	2	-()	-
500-600만원 미만	2	-()	-
600만원 이상	2	-()	-

주 : 1) 자살생각으로 인한 정신상담률 : (자살생각으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일)동안 자살생각을 한 적이 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 53〉 스트레스원인¹⁾

(단위: %)

구분	N	경제적인 문제		질병문제		가족문제		진로문제		대인관계		기타	
		% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
전체	237	23.2(3.1)	13.5	8.2(1.7)	21.0	14.2(2.2)	15.3	4.0(1.5)	38.3	22.6(3.7)	16.4	27.8(3.6)	13.1
성													
남자	108	26.7(4.2)	15.7	6.4(2.1)	32.8	2.4(1.5)	59.6	6.3(2.7)	42.5	25.5(5.0)	19.7	32.7(4.7)	14.4
여자	129	19.3(3.7)	19.0	10.3(2.3)	22.7	27.7(4.1)	14.7	1.4(1.4)	97.4	19.2(3.5)	18.1	22.1(4.7)	21.4
연령													
19-29	27	16.1(6.4)	39.8	0.0(0.0)	.	2.9(3.0)	102.1	18.0(6.8)	37.8	45.6(11.2)	24.5	17.5(8.6)	49.0
30-39	43	33.3(7.4)	22.2	5.1(3.7)	72.1	13.8(6.9)	49.9	2.9(2.9)	100.6	8.0(3.8)	48.0	37.0(8.8)	23.9
40-49	74	28.7(6.1)	21.4	2.1(1.5)	72.9	11.4(3.3)	28.9	0.0(0.0)	.	20.1(4.8)	23.8	37.8(6.3)	16.8
50-59	42	18.6(7.0)	37.6	8.3(4.3)	52.2	21.6(6.3)	29.0	0.0(0.0)	.	28.7(7.2)	25.0	22.9(9.1)	39.8
60-69	23	27.4(7.2)	26.3	19.1(7.5)	39.2	27.9(9.0)	32.3	0.0(0.0)	.	6.8(5.1)	75.4	18.8(6.2)	33.1
70 이상	28	0.0(0.0)	.	49.9(8.5)	17.1	25.5(7.2)	28.1	0.0(0.0)	.	15.3(6.3)	41.3	9.3(5.8)	62.9
19-64	201	25.4(3.6)	14.0	4.4(1.6)	34.9	13.1(2.4)	18.1	4.5(1.7)	38.2	23.5(3.8)	16.3	29.0(4.0)	13.9
65 이상	36	4.0(0.5)	13.3	41.2(7.1)	17.1	23.6(5.4)	22.9	0.0(0.0)	.	14.6(5.1)	35.0	16.6(3.5)	21.0
교육수준 ³⁾													
무학	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	22	4.5(4.4)	98.0	32.4(9.8)	30.1	32.2(8.5)	26.4	0.0(0.0)	.	8.4(5.9)	70.0	22.5(9.7)	43.1
중학교	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	83	29.1(5.3)	18.2	1.6(1.1)	68.3	15.3(4.3)	28.1	5.4(2.9)	54.3	29.3(5.1)	17.3	19.4(4.6)	23.7
대학교 이상	92	22.4(4.9)	21.7	5.0(2.6)	51.5	9.3(3.2)	34.2	4.5(2.5)	54.6	22.2(6.5)	29.0	36.5(6.4)	17.5
직업													
전문행정관리	39	25.5(7.3)	28.4	0.0(0.0)	.	5.9(3.5)	59.5	6.9(4.5)	65.0	28.8(7.3)	25.5	32.8(6.8)	20.9
사무직	29	14.5(6.8)	46.7	3.4(3.3)	98.0	6.6(3.6)	54.3	0.0(0.0)	.	27.5(9.3)	33.7	48.0(9.9)	20.6
판매·서비스직	27	39.4(10.8)	27.5	5.5(4.0)	72.9	4.9(3.4)	68.7	5.5(5.4)	98.8	8.1(4.6)	56.5	36.6(10.5)	28.8
농림어업	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	51	25.6(7.1)	27.7	5.9(3.4)	57.8	5.1(3.0)	59.4	2.4(2.3)	96.4	40.3(7.8)	19.4	20.8(5.7)	27.4
기타 ⁴⁾	82	17.5(4.4)	25.2	20.0(3.5)	17.5	32.0(4.7)	14.8	5.0(3.3)	66.5	9.1(2.9)	32.3	16.4(4.3)	26.3
월 가구소득													
50만원 미만	24	9.0(5.8)	64.9	43.3(8.3)	19.1	22.8(5.9)	25.8	0.0(0.0)	.	4.4(4.4)	100.0	20.5(5.1)	24.7
50-100만원 미만	21	17.0(8.0)	46.7	21.3(9.7)	45.6	33.7(8.3)	24.7	11.0(9.1)	82.0	13.8(8.2)	59.6	3.1(0.8)	25.1
100-200만원 미만	30	8.7(4.8)	55.0	7.7(4.3)	55.8	35.6(12.6)	35.2	0.0(0.0)	.	17.4(8.1)	46.8	30.6(8.3)	27.0
200-300만원 미만	40	31.3(8.5)	27.2	2.6(2.6)	99.5	10.1(4.1)	40.4	7.0(4.6)	66.1	17.4(5.2)	29.9	31.6(8.9)	28.3
300-400만원 미만	40	26.2(7.2)	27.4	2.4(2.4)	98.1	17.3(5.1)	29.5	4.2(4.1)	96.0	23.6(5.3)	22.5	26.2(7.3)	27.8
400-500만원 미만	30	35.1(9.3)	26.4	5.2(5.0)	96.9	4.7(3.0)	63.1	0.0(0.0)	.	33.4(8.1)	24.2	21.5(7.0)	32.7
500-600만원 미만	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
600만원 이상	32	10.9(5.4)	49.3	5.4(5.3)	99.3	7.5(3.8)	50.4	4.0(3.4)	83.4	39.8(12.8)	32.3	32.4(12.3)	37.9

주 : 1) 스트레스 원인 : (응답보기별 응답자 수 / 평소 일상생활 중 스트레스를 "대단히 많이 느낀다" 또는 "많이 느끼는 편이다"는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 54〉 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	916	10.0(1.2)	11.7	405	11.8(1.8)	15.0	511	8.1(1.6)	19.4
연령									
19-29	86	24.3(4.7)	19.5	41	25.3(6.7)	26.6	45	23.0(7.1)	30.9
30-39	142	15.6(3.0)	19.1	61	21.0(4.9)	23.4	81	10.0(3.2)	31.8
40-49	237	8.9(1.9)	20.8	113	9.1(2.6)	28.5	124	8.8(2.6)	29.6
50-59	189	4.0(1.7)	41.6	84	4.4(2.7)	61.3	105	3.5(2.1)	59.8
60-69	121	0.8(0.8)	101.4	56	1.6(1.6)	100.2	65	0.0(0.0)	.
70 이상	141	0.0(0.0)	.	50	0.0(0.0)	.	91	0.0(0.0)	.
19-64	716	11.7(1.4)	11.7	329	13.3(2.0)	15.0	387	9.8(1.9)	19.3
65 이상	200	0.5(0.5)	99.3	76	1.3(1.3)	99.9	124	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	84	0.0(0.0)	.	14	-(-)	-	70	0.0(0.0)	.
초등학교	112	2.1(1.5)	70.9	37	3.2(3.3)	101.7	75	1.5(1.5)	98.8
중학교	90	0.8(0.8)	99.3	33	0.0(0.0)	.	57	1.3(1.3)	100.0
고등학교	333	12.0(2.2)	18.2	170	13.3(2.9)	21.8	163	10.2(2.8)	27.5
대학교 이상	290	13.1(2.0)	15.1	149	14.0(2.9)	21.1	141	12.1(3.4)	28.2
직업									
전문행정관리	123	8.5(3.4)	40.0	69	6.9(3.1)	45.0	54	10.8(6.3)	58.8
사무직	78	16.0(5.2)	32.7	42	21.0(7.9)	37.7	36	9.0(5.8)	64.4
판매·서비스직	109	11.2(3.2)	28.5	28	4.8(4.8)	99.0	81	14.1(4.1)	28.9
농림어업	48	0.0(0.0)	.	23	0.0(0.0)	.	25	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	190	13.5(3.0)	22.2	156	14.3(3.0)	21.2	34	8.0(5.5)	68.0
기타 ³⁾	368	7.4(2.1)	28.1	87	11.1(5.1)	46.3	281	6.0(2.2)	36.0
월 가구소득									
50만원 미만	98	1.1(1.1)	99.3	23	0.0(0.0)	.	75	1.6(1.5)	98.3
50-100만원 미만	92	2.7(1.9)	72.0	36	2.6(2.6)	99.8	56	2.8(2.8)	100.0
100-200만원 미만	97	5.9(3.2)	54.1	45	6.2(4.3)	69.5	52	5.5(3.2)	58.1
200-300만원 미만	135	11.7(2.9)	24.6	71	15.5(4.4)	28.3	64	6.2(3.0)	48.1
300-400만원 미만	157	9.7(2.5)	25.6	66	9.9(3.9)	39.0	91	9.5(3.4)	35.3
400-500만원 미만	111	11.4(3.8)	33.6	54	15.2(5.2)	34.2	57	6.5(3.4)	53.1
500-600만원 미만	51	10.5(4.1)	38.9	25	7.9(4.7)	58.9	26	13.7(6.8)	49.2
600만원 이상	137	15.7(3.5)	22.4	65	14.8(5.1)	34.6	72	16.8(5.3)	31.4

주 : 1) 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률 : (주위 사람들로부터 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 너무 많이 한다고 “항상” 또는 “대체로” 지적받는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 55〉 연간 인플루엔자 예방접종률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	915	33.5(1.9)	5.6	405	27.7(2.3)	8.3	510	39.5(2.5)	6.3
연령									
19-29	86	16.8(5.3)	31.3	41	12.9(6.1)	47.3	45	21.7(6.9)	31.7
30-39	142	24.7(3.9)	15.8	61	16.2(4.5)	28.0	81	33.8(5.2)	15.4
40-49	237	21.1(3.1)	14.6	113	18.4(3.9)	21.2	124	24.2(4.0)	16.8
50-59	189	33.3(3.7)	11.1	84	29.0(4.9)	17.0	105	38.3(4.8)	12.6
60-69	121	59.3(4.0)	6.8	56	53.8(6.6)	12.2	65	64.7(4.8)	7.5
70 이상	140	81.3(3.1)	3.8	50	85.8(4.2)	4.9	90	78.5(4.2)	5.4
19-64	716	25.8(2.1)	8.3	329	20.7(2.6)	12.4	387	31.5(2.8)	8.9
65 이상	199	77.5(2.8)	3.6	76	79.0(4.6)	5.8	123	76.5(3.9)	5.1
교육수준 ²⁾									
무학	83	75.8(4.5)	5.9	14	-(-)	-	69	74.7(5.0)	6.7
초등학교	112	64.4(4.8)	7.5	37	67.4(7.6)	11.2	75	62.8(5.8)	9.3
중학교	90	55.3(5.4)	9.8	33	49.6(9.1)	18.4	57	59.4(5.9)	9.9
고등학교	333	28.5(3.0)	10.6	170	27.6(3.7)	13.3	163	29.6(3.8)	12.8
대학교 이상	290	21.2(2.8)	13.3	149	16.5(2.9)	17.6	141	27.3(4.0)	14.7
직업									
전문행정관리	123	25.9(4.0)	15.5	69	23.7(4.7)	19.8	54	28.9(6.4)	22.3
사무직	78	19.2(4.0)	20.9	42	17.0(6.2)	36.7	36	22.3(5.7)	25.4
판매·서비스직	109	29.0(3.9)	13.3	28	22.6(7.5)	33.1	81	31.9(4.5)	14.0
농림어업	48	51.8(6.9)	13.3	23	42.6(9.2)	21.6	25	64.0(7.7)	12.0
기능단순노무직	190	20.6(3.1)	15.2	156	20.1(3.1)	15.6	34	24.5(6.6)	26.9
기타 ³⁾	367	48.5(2.9)	5.9	87	51.6(5.6)	10.8	280	47.3(3.3)	7.0
월 가구소득									
50만원 미만	97	72.8(4.2)	5.8	23	69.9(10.9)	15.5	74	73.9(4.5)	6.1
50-100만원 미만	92	64.8(5.6)	8.7	36	65.3(8.3)	12.8	56	64.4(7.0)	10.9
100-200만원 미만	97	36.6(6.8)	18.6	45	33.6(7.8)	23.1	52	39.8(7.1)	17.9
200-300만원 미만	135	16.1(3.8)	23.9	71	11.8(3.8)	32.2	64	22.1(5.3)	23.9
300-400만원 미만	157	28.5(3.8)	13.3	66	15.7(3.5)	22.4	91	39.2(6.0)	15.2
400-500만원 미만	111	27.0(5.1)	18.9	54	25.1(7.3)	28.9	57	29.5(6.1)	20.7
500-600만원 미만	51	31.1(7.6)	24.5	25	31.1(9.4)	30.3	26	31.0(9.5)	30.5
600만원 이상	137	31.8(4.4)	13.8	65	31.3(5.7)	18.3	72	32.3(5.8)	18.1

주 : 1) 연간 인플루엔자 예방접종률 : (최근 1년(365일) 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 56〉 건강검진 수진율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	915	65.2(1.6)	2.4	405	68.7(2.6)	3.7	510	61.5(2.3)	3.7
연령									
19-29	86	37.9(5.3)	13.9	41	41.2(7.4)	17.9	45	33.9(7.3)	21.6
30-39	142	55.0(4.1)	7.4	61	67.4(5.6)	8.3	81	41.9(5.3)	12.6
40-49	237	72.6(3.0)	4.2	113	73.1(4.3)	5.9	124	72.0(3.8)	5.2
50-59	189	81.9(3.2)	3.9	84	82.0(3.9)	4.8	105	81.7(3.7)	4.5
60-69	121	78.7(3.5)	4.4	56	78.3(5.2)	6.7	65	79.1(4.7)	5.9
70 이상	140	63.8(4.1)	6.4	50	71.5(7.4)	10.4	90	59.1(5.3)	8.9
19-64	716	64.6(1.8)	2.7	329	68.0(2.7)	4.0	387	60.9(2.5)	4.1
65 이상	199	68.1(3.3)	4.9	76	73.6(5.9)	8.1	123	64.2(4.6)	7.2
교육수준 ²⁾									
무학	83	63.9(4.2)	6.6	14	-(-)	-	69	60.8(6.0)	9.9
초등학교	112	72.7(4.2)	5.8	37	67.6(8.0)	11.9	75	75.3(4.3)	5.7
중학교	90	78.5(4.0)	5.1	33	78.7(6.6)	8.4	57	78.4(5.1)	6.5
고등학교	333	61.6(3.1)	5.0	170	61.9(4.2)	6.7	163	61.1(3.5)	5.7
대학교 이상	290	65.0(2.9)	4.5	149	74.4(3.7)	4.9	141	52.9(4.6)	8.8
직업									
전문행정관리	123	72.6(4.2)	5.8	69	80.3(4.6)	5.7	54	61.8(7.2)	11.7
사무직	78	74.1(5.3)	7.1	42	76.6(6.7)	8.8	36	70.6(8.3)	11.8
판매·서비스직	109	62.0(4.9)	7.9	28	56.9(10.4)	18.3	81	64.2(5.5)	8.6
농림어업	48	78.7(5.5)	7.0	23	78.7(6.3)	8.0	25	78.8(7.6)	9.6
기능단순노무직	190	72.0(3.9)	5.5	156	71.6(4.3)	6.0	34	74.8(6.4)	8.6
기타 ³⁾	367	54.5(2.4)	4.3	87	49.4(5.9)	12.0	280	56.4(3.1)	5.4
월 가구소득									
50만원 미만	97	66.9(4.8)	7.2	23	62.5(11.8)	18.9	74	68.6(5.5)	8.0
50-100만원 미만	92	67.8(4.9)	7.2	36	63.3(9.0)	14.3	56	71.2(5.9)	8.3
100-200만원 미만	97	60.5(5.2)	8.5	45	70.5(6.5)	9.2	52	49.8(7.8)	15.7
200-300만원 미만	135	59.5(4.7)	7.9	71	61.5(6.6)	10.7	64	56.6(6.2)	10.9
300-400만원 미만	157	64.2(4.6)	7.1	66	73.2(5.7)	7.8	91	56.6(5.5)	9.8
400-500만원 미만	111	57.7(5.4)	9.4	54	58.7(7.8)	13.3	57	56.4(5.9)	10.5
500-600만원 미만	51	73.7(7.3)	9.9	25	76.3(8.9)	11.7	26	70.4(9.4)	13.3
600만원 이상	137	75.1(3.5)	4.7	65	81.4(3.7)	4.5	72	67.5(6.1)	9.0

주 : 1) 건강검진 수진율 : (최근 2년 동안 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 57〉 암 검진율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	914	43.8(1.6)	3.8	405	37.5(2.4)	6.4	509	50.3(2.3)	4.5
연령									
19-29	86	5.3(2.1)	39.2	41	2.5(2.5)	99.6	45	8.8(4.5)	50.9
30-39	142	35.6(4.8)	13.6	61	21.9(5.7)	26.0	81	50.0(6.2)	12.5
40-49	237	52.4(3.4)	6.4	113	43.6(5.5)	12.7	124	62.3(4.2)	6.8
50-59	189	62.6(4.1)	6.5	84	58.7(5.3)	9.0	105	67.0(4.5)	6.7
60-69	120	65.1(4.3)	6.6	56	65.4(6.3)	9.6	64	64.8(6.2)	9.6
70 이상	140	41.8(4.6)	11.0	50	44.5(7.8)	17.4	90	40.2(5.6)	14.0
19-64	715	43.0(1.8)	4.2	329	35.4(2.6)	7.3	386	51.6(2.4)	4.7
65 이상	199	48.2(3.9)	8.2	76	53.5(6.4)	11.9	123	44.4(5.3)	11.9
교육수준 ²⁾									
무학	83	40.4(5.9)	14.6	14	-(-)	-	69	40.0(5.7)	14.2
초등학교	111	51.2(4.3)	8.4	37	48.8(8.2)	16.9	74	52.5(5.5)	10.4
중학교	90	68.5(4.3)	6.3	33	61.8(7.6)	12.3	57	73.3(5.1)	7.0
고등학교	333	40.9(2.9)	7.2	170	33.6(4.0)	11.9	163	50.4(3.9)	7.8
대학교 이상	290	40.5(2.9)	7.1	149	36.1(3.8)	10.5	141	46.1(4.2)	9.0
직업									
전문행정관리	123	46.2(4.5)	9.8	69	48.3(5.3)	10.9	54	43.2(7.0)	16.1
사무직	78	45.3(6.0)	13.1	42	41.7(8.1)	19.5	36	50.3(8.4)	16.8
판매·서비스직	109	57.2(4.8)	8.4	28	35.9(9.2)	25.7	81	66.8(5.1)	7.6
농림어업	48	71.4(8.6)	12.1	23	65.8(9.8)	14.9	25	78.8(7.6)	9.6
기능단순노무직	190	35.3(3.5)	9.8	156	33.0(3.9)	11.8	34	51.6(8.0)	15.5
기타 ³⁾	366	40.7(2.5)	6.3	87	29.0(4.4)	15.3	279	45.3(3.5)	7.7
월 가구소득									
50만원 미만	96	44.0(5.9)	13.3	23	51.8(10.2)	19.6	73	41.0(6.9)	16.9
50-100만원 미만	92	55.0(6.0)	10.8	36	51.6(7.7)	15.0	56	57.6(7.7)	13.4
100-200만원 미만	97	49.2(5.3)	10.8	45	45.8(7.1)	15.5	52	52.8(7.6)	14.3
200-300만원 미만	135	31.6(4.5)	14.3	71	22.8(5.2)	22.7	64	44.0(6.5)	14.9
300-400만원 미만	157	46.1(4.1)	8.9	66	43.3(5.6)	13.0	91	48.4(5.7)	11.8
400-500만원 미만	111	39.5(4.7)	11.8	54	29.7(5.6)	18.9	57	52.4(6.3)	12.1
500-600만원 미만	51	49.9(6.9)	13.8	25	43.7(8.6)	19.6	26	57.8(7.9)	13.6
600만원 이상	137	46.3(4.3)	9.3	65	40.6(5.9)	14.6	72	53.1(4.7)	8.9

주 : 1) 암 검진율 : (최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 58〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	915	5.1(0.8)	16.5	405	2.7(0.8)	31.4	510	7.7(1.3)	16.4
연령									
19-29	86	3.0(1.7)	57.8	41	0.0(0.0)	.	45	6.6(3.7)	56.4
30-39	142	6.4(2.7)	42.0	61	4.9(2.7)	55.4	81	7.9(3.1)	39.5
40-49	237	2.2(0.9)	39.9	113	1.7(1.1)	69.0	124	2.8(1.2)	43.3
50-59	189	4.8(1.6)	33.5	84	2.4(1.3)	55.8	105	7.5(3.0)	39.5
60-69	120	7.0(2.5)	36.3	56	5.1(3.8)	75.4	64	9.0(3.3)	37.2
70 이상	141	11.9(3.1)	25.6	50	4.2(2.6)	62.1	91	16.6(4.4)	26.2
19-64	716	4.4(1.0)	21.6	329	2.5(0.9)	37.3	387	6.5(1.4)	22.2
65 이상	199	9.2(2.3)	24.4	76	3.8(2.0)	52.2	123	13.1(3.3)	25.4
교육수준 ²⁾									
무학	84	14.9(4.4)	29.4	14	-(-)	-	70	17.2(5.3)	30.7
초등학교	112	6.6(2.6)	39.9	37	0.0(0.0)	.	75	10.0(3.9)	38.5
중학교	90	4.1(2.0)	48.2	33	2.6(2.6)	98.8	57	5.2(2.9)	56.4
고등학교	332	4.1(1.0)	25.2	170	3.4(1.4)	40.7	162	4.9(1.7)	35.3
대학교 이상	290	4.3(1.6)	36.3	149	2.1(1.2)	57.2	141	7.1(2.4)	34.2
직업									
전문행정관리	123	5.2(2.3)	45.0	69	1.1(1.2)	101.7	54	10.8(4.2)	38.6
사무직	78	2.4(1.7)	68.7	42	2.3(2.3)	98.6	36	2.6(2.5)	93.7
판매·서비스직	109	2.8(1.8)	66.0	28	0.0(0.0)	.	81	4.0(2.7)	66.4
농림어업	48	6.5(5.9)	91.2	23	8.3(7.8)	93.5	25	4.1(3.7)	89.9
기능단순노무직	190	4.0(1.4)	35.4	156	3.5(1.5)	42.6	34	7.4(5.2)	70.4
기타 ³⁾	367	7.1(1.3)	18.7	87	2.3(1.2)	52.6	280	9.0(1.7)	19.2
월 가구소득									
50만원 미만	98	15.9(4.0)	25.2	23	8.2(5.0)	61.0	75	18.8(5.0)	26.6
50-100만원 미만	92	4.9(2.3)	47.5	36	2.1(2.1)	97.9	56	7.1(3.2)	45.8
100-200만원 미만	96	1.3(1.3)	98.4	45	2.4(2.4)	98.6	51	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	135	5.6(2.0)	36.1	71	3.3(2.0)	59.0	64	8.9(3.0)	34.1
300-400만원 미만	157	4.1(1.9)	46.2	66	3.2(2.2)	70.1	91	4.9(2.4)	49.9
400-500만원 미만	111	4.6(2.4)	52.2	54	3.6(2.5)	70.0	57	5.9(3.4)	58.2
500-600만원 미만	51	1.1(1.1)	99.6	25	0.0(0.0)	.	26	2.6(2.7)	104.6
600만원 이상	137	5.6(2.2)	38.5	65	1.7(1.7)	99.6	72	10.3(3.4)	33.0

주 : 1) 만성·급성질환 및 사고중독 경험률 : (최근 2주(14일) 동안 만성·급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직일 수의 총 합 / 만성·급성질환 및 사고중독 경험자 수

〈표 59〉 고혈압 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
고혈압 평생 의사진단 경험률									
전체 ¹⁾	916	17.9(1.3)	7.2	405	18.0(2.0)	10.9	511	17.9(1.9)	10.4
30세 이상 ²⁾	830	20.8(1.6)	7.5	364	20.6(2.3)	11.2	466	21.0(2.1)	10.1
연령									
19-29	86	3.2(2.3)	70.9	41	5.8(4.2)	72.2	45	0.0(0.0)	.
30-39	142	2.9(1.4)	49.3	61	4.6(2.5)	55.1	81	1.0(1.1)	100.4
40-49	237	9.9(2.1)	20.9	113	11.8(3.6)	30.2	124	7.8(2.5)	31.4
50-59	189	21.5(3.5)	16.1	84	21.5(5.1)	23.7	105	21.4(4.9)	22.7
60-69	121	43.6(4.9)	11.1	56	47.5(6.7)	14.1	65	39.7(7.2)	18.2
70 이상	141	57.1(3.7)	6.5	50	53.7(6.3)	11.8	91	59.3(4.6)	7.7

주 : 1) 고혈압 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 60〉 고혈압 약물치료율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	203	86.6(2.7)	3.2	92	85.0(4.6)	5.4	111	88.2(2.6)	3.0
30세 이상 ²⁾	201	89.1(2.1)	2.3	90	90.1(3.1)	3.4	111	88.2(2.6)	3.0
연령									
19-29	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	4	-(-)	-	3	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	25	69.9(8.2)	11.8	15	-(-)	-	10	-(-)	-
50-59	40	83.7(5.4)	6.4	18	-(-)	-	22	81.8(5.1)	6.3
60-69	52	94.6(2.1)	2.2	27	95.0(3.6)	3.8	25	94.2(1.2)	1.3
70 이상	80	97.6(1.7)	1.7	27	96.9(3.1)	3.2	53	98.1(1.9)	2.0

주 : 1) 고혈압 약물치료율 : (현재 혈압조절약을 한 달(30일)에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 약물치료율(≥30) : (현재 혈압조절약을 한 달(30일)에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 61〉 당뇨병 평생 의사진단 경험률 및 현재치료를

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
당뇨병 평생 의사진단 경험률									
전체 ¹⁾	916	8.1(0.8)	10.2	405	9.3(1.4)	15.0	511	6.8(1.0)	15.3
30세 이상 ²⁾	830	9.6(1.0)	10.0	364	11.2(1.6)	14.5	466	8.0(1.2)	15.4
연령									
19-29	86	0.0(0.0)	.	41	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.
30-39	142	0.9(0.9)	100.0	61	1.8(1.8)	99.7	81	0.0(0.0)	.
40-49	237	4.4(1.1)	24.7	113	7.3(2.0)	27.7	124	1.1(0.8)	73.7
50-59	189	10.7(2.0)	19.0	84	13.0(3.5)	26.8	105	8.0(2.3)	28.5
60-69	121	23.0(4.1)	17.8	56	25.8(5.2)	20.3	65	20.3(5.7)	28.3
70 이상	141	23.5(3.0)	12.6	50	25.0(6.0)	23.8	91	22.6(4.3)	18.9

주 : 1) 당뇨병 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 62〉 당뇨병 치료율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	93	85.8(4.4)	5.1	46	87.6(5.0)	5.7	47	83.3(6.6)	7.9
30세 이상 ²⁾	93	85.8(4.4)	5.1	46	87.6(5.0)	5.7	47	83.3(6.6)	7.9
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	10	-(-)	-	8	-(-)	-	2	-(-)	-
50-59	21	76.5(9.3)	12.2	11	-(-)	-	10	-(-)	-
60-69	28	97.0(3.0)	3.1	15	-(-)	-	13	-(-)	-
70 이상	33	85.2(7.1)	8.4	11	-(-)	-	22	-(-)	14.4

주 : 1) 당뇨병 치료율 : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당 강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 치료율(≥30) : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당 강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 63〉 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 및 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율

(단위 : %)

구분	당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 ¹⁾			당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	93	30.0(5.2)	17.3	93	36.0(5.2)	14.5
성						
남자	46	35.8(6.6)	18.5	46	39.6(6.7)	17.0
여자	47	21.5(6.5)	30.0	47	30.8(7.0)	22.7
30세 이상 ^{3), 4)}	93	30.0(5.2)	17.3	93	36.0(5.2)	14.5
연령						
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	10	-(-)	-	10	-(-)	-
50-59	21	29.6(11.0)	37.4	21	48.3(11.4)	23.6
60-69	28	21.4(7.2)	33.4	28	29.2(8.8)	30.2
70 이상	33	24.3(8.4)	34.6	33	20.6(8.1)	39.1

주 : 1) 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30세) : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30세) : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 64〉 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	916	8.9(0.9)	9.7	405	8.0(1.3)	16.2	511	9.8(1.2)	12.4
30세 이상 ²⁾	830	10.6(1.0)	9.7	364	9.7(1.6)	16.5	466	11.5(1.4)	12.0
연령									
19-29	86	0.0(0.0)	.	41	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.
30-39	142	2.8(1.3)	46.9	61	3.5(2.2)	63.7	81	2.0(1.4)	71.1
40-49	237	9.7(2.0)	21.1	113	10.3(2.9)	28.1	124	9.0(2.6)	29.0
50-59	189	13.2(2.4)	18.4	84	9.9(3.3)	33.2	105	16.9(3.6)	21.2
60-69	121	21.1(3.6)	17.0	56	20.7(4.9)	23.9	65	21.6(5.3)	24.4
70 이상	141	12.8(2.3)	18.0	50	9.4(3.9)	41.5	91	14.8(3.1)	20.6

주 : 1) 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 65〉 관절염 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
관절염 평생 의사진단 경험률									
전체 ¹⁾	916	8.0(0.9)	11.2	405	3.1(0.9)	28.3	511	13.2(1.5)	11.7
30세 이상 ²⁾	451	18.1(2.0)	11.0	190	7.0(2.0)	28.1	261	28.6(3.2)	11.2
연령									
19-29	86	0.0(0.0)	.	41	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.
30-39	142	0.0(0.0)	.	61	0.0(0.0)	.	81	0.0(0.0)	.
40-49	237	3.2(1.1)	34.1	113	1.7(1.2)	70.4	124	4.8(1.6)	33.9
50-59	189	9.4(2.0)	21.7	84	3.6(2.6)	70.8	105	16.0(3.6)	22.4
60-69	121	25.5(5.0)	19.4	56	10.8(4.1)	37.7	65	40.4(7.8)	19.3
70 이상	141	28.1(3.6)	12.6	50	11.7(4.5)	38.5	91	38.2(4.8)	12.5

주 : 1) 관절염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 관절염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50) : (의사에게 관절염을 진단받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 66〉 고혈압 관리교육 장소 및 고혈압 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	고혈압 관리교육 장소 ¹⁾						고혈압 관리교육 이수율 ²⁾	
	병의원		한방병의원		보건소(보건의료원), 보건지소, 보건지료소			
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	53.4(3.9)	7.3	0.6(0.5)	70.5	1.8(0.9)	48.3	55.3(3.8)	6.9
성								
남자	55.7(5.7)	10.3	1.3(0.9)	70.6	1.6(1.1)	69.6	58.5(5.7)	9.7
여자	50.9(4.5)	8.8	0.0(0.0)	.	2.0(1.4)	68.3	51.9(4.6)	8.9
30세 이상 ^{3), 4)}	54.9(3.7)	6.7	0.7(0.5)	70.5	1.8(0.9)	48.3	56.9(3.6)	6.3
연령								
19-29	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	62.8(9.4)	15.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	62.8(9.4)	15.0
50-59	69.8(7.2)	10.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	69.8(7.2)	10.4
60-69	47.8(7.1)	14.9	1.5(1.6)	100.6	0.0(0.0)	.	49.3(7.0)	14.3
70 이상	43.4(5.8)	13.3	0.9(0.9)	100.7	5.5(2.6)	47.9	48.0(6.0)	12.5

주 : 1) 고혈압 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 관리교육 이수율 : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 고혈압 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 고혈압 관리교육 이수율(≥30) : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 67〉 당뇨병 관리교육 장소 및 당뇨병 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	당뇨병 관리교육 장소 ¹⁾						당뇨병 관리교육 이수율 ²⁾	
	병의원		한방병의원		보건소(보건의료원), 보건지소, 보건지료소			
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	57.4(5.0)	8.6	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	101.0	58.3(5.0)	8.6
성								
남자	57.6(7.2)	12.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	57.6(7.2)	12.5
여자	57.1(7.8)	13.7	0.0(0.0)	.	2.2(2.2)	101.0	59.3(8.1)	13.7
30세 이상 ^{3), 4)}	57.4(5.0)	8.6	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	101.0	58.3(5.0)	8.6
연령								
19-29	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	70.0(9.5)	13.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	70.0(9.5)	13.6
60-69	63.8(10.6)	16.6	0.0(0.0)	.	3.2(3.2)	100.0	67.0(10.8)	16.2
70 이상	38.0(8.7)	23.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	38.0(8.7)	23.0

주 : 1) 당뇨병 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 관리교육 이수율 : (당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 당뇨병 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 당뇨병 관리교육 이수율(≥30) : (당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 68〉 관절염 관리교육 장소 및 관절염 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	관절염 관리교육 장소 ¹⁾						관절염 관리교육 이수율 ²⁾	
	병의원		한방병의원		보건소(보건의료원), 보건지소, 보건지료소			
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	59.3(3.6)	6.1	0.9(0.9)	100.7	1.0(1.0)	99.2	61.1(3.5)	5.8
성								
남자	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
여자	58.3(3.7)	6.3	1.1(1.1)	100.2	1.2(1.2)	99.0	60.6(3.7)	6.0
50세 이상 ^{3), 4)}	57.0(3.5)	6.1	1.0(1.0)	100.7	1.1(0.1)	5.7	59.1(3.4)	5.8
연령								
19-29	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	65.3(10.0)	15.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	65.3(10.0)	15.2
60-69	63.4(6.5)	10.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	63.4(6.5)	10.2
70 이상	46.1(7.1)	15.3	2.5(2.5)	99.9	2.7(2.6)	95.7	51.3(6.5)	12.7

주 : 1) 관절염 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 관절염 관리교육 이수율 : (관절염 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 관절염 관리교육 장소(≥50) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

4) 관절염 관리교육 이수율(≥50) : (관절염 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

〈표 69〉 대사중후군 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	916	24.8(1.7)	6.7	405	22.8(2.2)	9.7	511	27.0(2.1)	7.8
연령									
19-29	86	22.2(4.9)	22.2	41	23.2(7.0)	29.9	45	21.0(5.6)	26.9
30-39	142	21.0(3.1)	14.7	61	15.1(4.4)	29.0	81	27.2(4.9)	17.9
40-49	237	36.0(2.9)	7.9	113	28.1(4.3)	15.4	124	44.8(3.9)	8.8
50-59	189	30.1(3.8)	12.7	84	25.4(4.8)	18.9	105	35.4(5.1)	14.5
60-69	121	18.7(3.0)	15.9	56	29.0(4.7)	16.4	65	8.3(2.0)	24.4
70 이상	141	5.3(1.5)	28.5	50	9.2(3.5)	38.2	91	3.0(1.2)	41.4

주 : 1) 대사중후군 인지율 : (대사중후군에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 70〉 평생 치매 선별검사 수검율 : 60세 이상¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	262	12.6(2.3)	18.3	106	7.2(2.4)	33.4	156	16.7(3.3)	19.6
교육수준 ²⁾									
무학	83	22.3(6.7)	30.0	14	—(—)	—	69	22.4(6.3)	28.1
초등학교	85	13.2(4.0)	30.1	32	5.2(3.6)	68.6	53	18.2(5.7)	31.3
중학교	38	4.6(3.1)	68.2	18	—(—)	—	20	3.6(3.6)	98.1
고등학교	45	3.8(2.7)	69.8	32	3.2(3.1)	98.4	13	—(—)	—
대학교 이상	10	—(—)	—	9	—(—)	—	1	—(—)	—
월 가구소득									
50만원 미만	85	17.9(3.9)	21.7	19	—(—)	—	66	18.7(4.3)	22.8
50-100만원 미만	73	14.8(6.2)	41.5	32	8.8(4.8)	55.1	41	20.0(7.8)	39.1
100-200만원 미만	38	5.2(3.6)	70.2	19	—(—)	—	19	—(—)	—
200-300만원 미만	15	—(—)	—	10	—(—)	—	5	—(—)	—
300-400만원 미만	20	7.3(7.0)	95.9	7	—(—)	—	13	—(—)	—
400-500만원 미만	6	—(—)	—	3	—(—)	—	3	—(—)	—
500-600만원 미만	1	—(—)	—	1	—(—)	—	0	—(—)	—
600만원 이상	13	—(—)	—	7	—(—)	—	6	—(—)	—

주 : 1) 평생 치매 선별검사 수검율(≥60) : (평생동안 치매 선별검사를 받은 적이 있는 사람의 수 / 60세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

〈표 71〉 필요의료서비스 미치료를 및 필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료를

(단위 : %)

구분	필요의료서비스 미치료율 ¹⁾			필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	916	11.1(1.1)	10.2	99	22.3(3.9)	17.4
성						
남자	405	9.9(1.7)	17.1	37	22.0(5.7)	26.1
여자	511	12.4(1.4)	11.3	62	22.6(5.3)	23.6
연령						
19-29	86	13.6(4.5)	32.8	11	-()	-
30-39	142	15.2(3.1)	20.2	21	14.0(8.2)	58.6
40-49	237	11.9(1.9)	15.8	31	21.2(7.0)	32.9
50-59	189	7.3(2.2)	30.6	15	-()	-
60-69	121	8.7(3.1)	36.3	10	-()	-
70 이상	141	7.5(2.0)	26.5	11	-()	-
19-64	716	11.8(1.3)	10.9	84	20.1(3.9)	19.5
65 이상	200	7.4(1.5)	20.0	15	-()	-
교육수준 ³⁾						
무학	84	11.3(2.9)	25.8	10	-()	-
초등학교	112	10.5(3.0)	28.7	12	-()	-
중학교	90	10.3(4.4)	43.2	8	-()	-
고등학교	333	10.7(1.7)	16.2	34	17.2(6.6)	38.2
대학교 이상	290	11.9(2.2)	18.6	34	19.2(4.6)	24.1
직업						
전문행정관리	123	12.8(3.7)	28.6	14	-()	-
사무직	78	11.0(3.0)	27.5	11	-()	-
판매·서비스직	109	14.2(3.6)	25.6	15	-()	-
농림어업	48	3.0(1.8)	59.8	2	-()	-
기능단순노무직	190	13.0(2.4)	18.7	24	14.6(6.1)	41.9
기타 ⁴⁾	368	9.1(2.0)	21.6	33	38.1(9.3)	24.3
월 가구소득						
50만원 미만	98	13.6(3.9)	28.4	13	-()	-
50-100만원 미만	92	9.2(3.1)	33.4	8	-()	-
100-200만원 미만	97	13.1(4.2)	31.9	12	-()	-
200-300만원 미만	135	12.0(2.8)	23.1	17	-()	-
300-400만원 미만	157	17.7(3.2)	17.8	27	2.8(2.8)	98.9
400-500만원 미만	111	6.5(3.5)	53.6	6	-()	-
500-600만원 미만	51	9.7(4.8)	49.8	4	-()	-
600만원 이상	137	7.9(2.9)	37.2	10	-()	-

주 : 1) 필요의료서비스 미치료를 : (최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료를 : (경제적 이유로 치료를 받지 못한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 72〉 연간 사고중독 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	916	2.8(0.5)	19.4	405	3.3(0.9)	28.2	511	2.4(0.7)	28.0
연령									
19-29	86	3.3(1.8)	54.9	41	4.4(3.0)	67.6	45	2.0(2.0)	98.6
30-39	142	3.1(1.5)	48.8	61	5.1(2.8)	55.5	81	1.0(1.1)	100.4
40-49	237	3.1(1.2)	38.5	113	2.9(1.7)	59.1	124	3.3(1.9)	58.1
50-59	189	2.2(1.2)	53.6	84	2.8(2.0)	71.4	105	1.4(1.0)	71.5
60-69	121	2.6(1.3)	50.6	56	0.0(0.0)	.	65	5.2(2.6)	51.2
70 이상	141	2.4(1.5)	60.7	50	2.9(3.0)	103.8	91	2.2(1.5)	67.8
19-64	716	2.9(0.6)	21.8	329	3.5(1.0)	29.5	387	2.2(0.8)	34.1
65 이상	200	2.5(1.1)	45.7	76	1.8(1.8)	101.1	124	2.9(1.4)	48.9
교육수준 ²⁾									
무학	84	1.0(1.0)	99.0	14	-(-)	-	70	1.2(1.2)	98.7
초등학교	112	4.3(1.9)	43.3	37	3.8(3.7)	97.1	75	4.5(2.2)	49.2
중학교	90	0.8(0.8)	100.5	33	0.0(0.0)	.	57	1.3(1.3)	99.7
고등학교	333	3.0(0.9)	29.8	170	3.2(1.2)	39.2	163	2.7(1.4)	51.6
대학교 이상	290	3.1(1.0)	32.6	149	4.0(1.7)	43.0	141	1.9(1.1)	57.5
직업									
전문행정관리	123	3.2(1.6)	50.9	69	3.0(2.2)	73.0	54	3.6(2.6)	71.1
사무직	78	3.4(2.4)	71.3	42	3.0(3.0)	100.8	36	4.0(4.0)	99.8
판매·서비스직	109	4.5(2.3)	50.5	28	10.2(7.0)	68.2	81	1.9(1.3)	70.4
농림어업	48	1.5(1.4)	88.9	23	0.0(0.0)	.	25	3.6(3.0)	84.5
기능단순노무직	190	3.3(1.4)	43.3	156	3.7(1.6)	43.0	34	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	368	1.8(0.7)	36.9	87	1.1(1.1)	101.1	281	2.1(0.8)	38.8
월 가구소득									
50만원 미만	98	4.8(2.3)	49.2	23	0.0(0.0)	.	75	6.6(3.1)	47.8
50-100만원 미만	92	0.8(0.8)	100.1	36	0.0(0.0)	.	56	1.5(1.5)	100.1
100-200만원 미만	97	2.8(1.6)	58.9	45	2.4(2.4)	98.6	52	3.2(2.3)	71.3
200-300만원 미만	135	2.0(1.3)	61.8	71	1.2(1.2)	99.7	64	3.2(2.5)	77.7
300-400만원 미만	157	4.0(1.7)	42.4	66	6.2(3.4)	54.6	91	2.2(1.5)	70.4
400-500만원 미만	111	4.8(2.2)	44.7	54	7.2(3.6)	50.6	57	1.7(1.7)	99.7
500-600만원 미만	51	0.0(0.0)	.	25	0.0(0.0)	.	26	0.0(0.0)	.
600만원 이상	137	2.5(1.5)	60.0	65	3.9(2.7)	70.3	72	1.0(1.0)	101.9

주 : 1) 연간 사고중독 경험률 : (연간 사고중독 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 73〉 양호한 주관적 건강수준 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	916	42.0(2.0)	4.8	405	45.5(2.7)	5.9	511	38.3(2.6)	6.8
연령									
19-29	86	60.9(7.1)	11.6	41	66.4(8.4)	12.6	45	54.2(7.7)	14.2
30-39	142	42.7(4.4)	10.3	61	39.6(5.7)	14.4	81	46.1(6.4)	14.0
40-49	237	46.3(3.1)	6.6	113	40.6(4.5)	11.1	124	52.6(4.4)	8.4
50-59	189	41.2(4.4)	10.7	84	50.4(5.8)	11.5	105	30.8(5.3)	17.1
60-69	121	25.2(3.7)	14.7	56	34.9(6.2)	17.7	65	15.4(4.2)	27.1
70 이상	141	18.5(3.2)	17.2	50	29.6(6.3)	21.3	91	11.8(3.9)	33.0
19-64	716	45.8(2.2)	4.8	329	47.6(2.8)	5.9	387	43.8(3.0)	6.7
65 이상	200	20.4(2.9)	14.4	76	30.5(5.4)	17.9	124	13.3(3.5)	25.9
교육수준 ²⁾									
무학	84	18.0(3.7)	20.8	14	-(-)	-	70	16.8(4.5)	27.0
초등학교	112	20.2(4.0)	19.8	37	28.3(8.1)	28.6	75	15.9(4.7)	29.9
중학교	90	26.9(4.3)	15.9	33	37.4(8.1)	21.8	57	19.5(4.9)	25.0
고등학교	333	46.1(3.1)	6.7	170	48.8(4.3)	8.8	163	42.5(3.9)	9.1
대학교 이상	290	49.8(3.5)	7.0	149	46.8(4.7)	10.1	141	53.7(4.6)	8.6
직업									
전문행정관리	123	50.0(5.4)	10.9	69	53.3(7.8)	14.6	54	45.3(6.5)	14.4
사무직	78	48.8(6.3)	13.0	42	38.4(7.6)	19.9	36	63.3(7.7)	12.1
판매·서비스직	109	54.6(4.8)	8.7	28	63.8(8.8)	13.7	81	50.4(5.6)	11.1
농림어업	48	20.8(2.8)	13.3	23	24.6(7.1)	28.7	25	15.8(7.3)	46.4
기능단순노무직	190	41.7(3.4)	8.2	156	43.4(3.8)	8.7	34	29.9(8.2)	27.5
기타 ³⁾	368	35.3(3.0)	8.5	87	45.0(5.8)	13.0	281	31.6(3.1)	9.9
월 가구소득									
50만원 미만	98	20.1(3.7)	18.6	23	23.6(6.9)	29.3	75	18.8(4.7)	25.1
50-100만원 미만	92	20.6(4.4)	21.2	36	32.1(8.4)	26.2	56	11.8(4.8)	40.4
100-200만원 미만	97	30.2(4.3)	14.3	45	36.3(7.1)	19.6	52	23.7(5.9)	25.1
200-300만원 미만	135	43.0(5.0)	11.7	71	46.6(6.5)	14.0	64	37.8(5.8)	15.3
300-400만원 미만	157	43.9(4.2)	9.6	66	40.4(6.0)	14.7	91	46.8(5.7)	12.1
400-500만원 미만	111	52.3(4.9)	9.5	54	53.7(6.0)	11.2	57	50.4(8.6)	17.1
500-600만원 미만	51	44.8(7.3)	16.3	25	48.2(10.9)	22.6	26	40.5(7.7)	19.0
600만원 이상	137	53.5(5.4)	10.0	65	57.6(6.5)	11.3	72	48.7(5.7)	11.7

주 : 1) 양호한 주관적 건강수준 인지율 : (주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 74〉 보건기관 이용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	916	21.5(1.5)	7.1	405	17.4(1.8)	10.3	511	25.8(2.0)	7.9
연령									
19-29	86	20.0(4.5)	22.6	41	20.6(5.7)	27.8	45	19.2(5.9)	30.5
30-39	142	9.2(3.0)	32.4	61	3.4(2.4)	70.1	81	15.2(4.2)	27.8
40-49	237	13.3(2.1)	15.5	113	8.6(2.7)	31.6	124	18.6(3.1)	16.8
50-59	189	15.6(2.7)	17.2	84	10.8(3.1)	28.5	105	21.0(3.7)	17.6
60-69	121	38.4(4.3)	11.1	56	39.1(5.6)	14.3	65	37.7(5.6)	14.9
70 이상	141	61.9(4.2)	6.8	50	65.4(6.4)	9.8	91	59.8(5.4)	9.1
19-64	716	14.7(1.5)	10.3	329	11.1(1.8)	16.0	387	18.7(2.0)	10.5
65 이상	200	60.3(3.6)	5.9	76	63.1(4.9)	7.7	124	58.3(4.7)	8.0
교육수준 ²⁾									
무학	84	55.8(5.8)	10.3	14	-(-)	-	70	51.9(6.0)	11.6
초등학교	112	43.4(5.3)	12.3	37	45.0(7.1)	15.8	75	42.6(6.8)	15.9
중학교	90	32.7(5.1)	15.4	33	28.5(7.5)	26.3	57	35.7(5.5)	15.4
고등학교	333	17.6(2.5)	14.1	170	15.7(2.7)	17.1	163	20.1(3.7)	18.6
대학교 이상	290	12.8(2.0)	15.8	149	10.9(2.6)	24.1	141	15.2(2.8)	18.4
직업									
전문행정관리	123	13.9(2.9)	20.8	69	12.7(4.1)	32.1	54	15.6(5.0)	31.9
사무직	78	5.9(2.9)	48.9	42	5.5(3.2)	57.9	36	6.4(3.8)	59.6
판매·서비스직	109	30.2(5.1)	16.8	28	24.9(8.9)	35.8	81	32.7(5.4)	16.5
농림어업	48	34.9(6.7)	19.1	23	25.3(6.2)	24.6	25	47.6(11.0)	23.0
기능단순노무직	190	8.9(2.2)	25.2	156	7.8(2.1)	27.0	34	16.1(7.4)	45.9
기타 ³⁾	368	33.2(2.5)	7.7	87	43.8(5.5)	12.6	281	29.1(2.9)	9.8
월 가구소득									
50만원 미만	98	50.6(6.1)	12.1	23	51.0(10.3)	20.1	75	50.5(6.7)	13.4
50-100만원 미만	92	55.8(5.5)	9.8	36	54.7(7.5)	13.6	56	56.6(7.4)	13.0
100-200만원 미만	97	30.8(5.2)	17.0	45	28.2(7.2)	25.5	52	33.6(6.5)	19.2
200-300만원 미만	135	16.0(4.1)	25.6	71	13.6(4.8)	35.5	64	19.3(5.5)	28.2
300-400만원 미만	157	13.4(2.5)	19.0	66	7.0(2.9)	41.7	91	18.8(3.8)	20.0
400-500만원 미만	111	17.7(4.2)	23.9	54	12.9(4.8)	37.6	57	24.0(7.2)	29.9
500-600만원 미만	51	5.6(2.6)	47.4	25	3.7(2.7)	71.7	26	7.9(4.2)	52.7
600만원 이상	137	9.9(2.5)	24.9	65	10.5(3.3)	31.1	72	9.2(3.0)	32.4

주 : 1) 보건기관 이용률:(최근 1년(365일) 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수)×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직



Community Health Survey

제4부 부록

- I. 개인조사표
- II. 가구조사표
- III. 지표정의
- IV. 2008-2014 산출지표

제 4 부

부록

I. 개인조사표

CHS

Community Health Survey

다음은 2014년 지역사회건강조사 개인조사표(울산권역)입니다. →

 승인 번호 제11775호	 지역사회건강조사 Community Health Survey	이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.	울산
---	---	---	-----------

안녕하십니까?


질병관리본부에서는 「지역보건법」 제4조(지역보건의료계획의 내용), 「지역보건법 시행령」 제4조(지역보건의료계획의 수립방법 등), 제5조(지역보건의료계획의 수립 시기 등)에 의거하여 지역 건강통계를 생산하여 근거 중심의 보건사업 수행 기반을 마련하고자 매년 「지역사회건강조사」를 실시하오니 적극적인 협조 부탁드립니다.

지역사회건강조사는 전국 253개 보건소에서 매년 8월에서 10월까지 실시하며, 만 19세 이상 성인을 대상으로 흡연, 음주, 신체활동 등의 건강행태, 의료이용, 삶의 질 등을 조사합니다.

조사 자료는 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며, 통계작성 외의 목적으로는 사용하지 않습니다. 정확한 응답을 위하여 반드시 본인이 조사에 응하여 주시기 바랍니다.

※ 통계법 제33조(비밀의 보호)

- ① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
- ② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.



관리번호 :

[illegible]

2014년 지역사회건강조사 참여 동의서

본인은 「지역사회건강조사」 내용을 충분히 이해하고 자의(自意)에 의해
건강면접조사에 참여합니다.

『지역사회건강조사』는 지역주민의 건강수준을 파악하여 주민들에게 알맞은 보건사업 계획을 수립하고자 하는 목적으로 수행하며, 수집된 자료는 보건사업 계획수립을 위한 통계 분석용으로만 활용합니다. 조사대상자는 조사문항에 따라 응답을 거부할 수 있으며, 응답거부에 따른 불이익은 없습니다. 본 조사에서 수집하는 개인정보는 아래와 같으며 개인정보 이용목적 외의 이유로 외부로 발표되거나 공개되지 않으니 동의하여 주시고 조사에 성실히 응답하여 주시기 바랍니다.

- 수집 개인정보 범위 : 성명, 성별, 생년월일, 전화번호
- 개인정보 보유기간 : 조사 수행일부터 2015년 2월 28일까지
※2015년 3월 1일, 수집된 개인정보 파기
- 개인정보 이용목적 : 조사의 진실성 검증을 위한 전화 확인 조사

※ 개인정보 이용에 대한 자세한 내용은 지역사회건강조사 홈페이지(<http://chs.cdc.go.kr/>)에서 확인하실 수 있습니다.

2014년 월 일

참여자 성명 : _____ (인) 또는 서명

조사원 성명 : (인) 또는 서명

 승인 번호 제11775호	2014년 지역사회건강조사	이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.
---	----------------	---

※ 조사대상자 번호를 정확히 기입하십시오.

시도 번호	보건소번호			표본지점번호				가구번호				가구원번호	

조 사 대 상 자		
성명		주민등록 생년월일
성별	① 남자 ② 여자	
		년 월 일 가구명부의 주민등록상 생년월일과 동일한지 확인하십시오. 다른 경우 가구명부를 수정합니다.

씨 뿌리는 건강조사, 꽃 피우는 지역건강

1. 평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

흡연

1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 5번 문항으로)



1-1. 처음으로 담배 한 대를 다 피운 시기는 언제입니까?

 세

만 세 888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음)

888. 비해당

2. 현재 담배를 피웁니까?

8. 비해당

① 매일 피움 ⇒ 하루 평균 흡연량 개비 (⇒ 3번 문항으로)

888. 비해당(문항1/②, 문항2/①, ③: 현재 담배를 가끔 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

 개비

888. 비해당

② 가끔 피움 ⇒ 지난 1달간 흡연일 수 일

 일

⇒ 흡연하는 날 하루 평균 흡연량 개비 (⇒ 3번 문항으로)

88 888. 비해당(문항1/②, 문항2/①, ③: 현재 담배를 매일 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

 개비

88. 비해당

888. 비해당

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음

⇒ 과거흡연 기간 년 개월

 년 월

⇒ 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량 개비

 개비

⇒ 금연기간 년 개월 (⇒ 5번 문항으로)

 년 월

88 88 888 88 88. 비해당(문항1/②, 문항2/①, ②: 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움)

88 88. 비해당

888. 비해당

88 88. 비해당

⑧ 비해당(문항 1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음)

3. 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

8. 비해당

① 최근 1년간 금연한 적이 있다

② 과거에는 있었지만, 최근 1년간 없다

③ 금연한 적이 없다

⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/③: 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

4. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까?

8. 비해당

① 1개월 안에 금연할 계획이 있다

② 6개월 안에 금연할 계획이 있다

③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다

④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다

⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/③: 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

※ 5-6번은 간접흡연에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

5. 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (➡ 6번 문항으로)

☐


5-1. 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항5/②: 가정실내에서 일상적으로 담배를 피우는 사람이 없음)

☐

8. 비해당

6. 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예
② 아니오
③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)

☐

7. 지금까지 살아오는 동안 전자담배를 피워본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (➡ 8번 문항으로)

☐


7-1. 현재 전자담배를 피웁니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항7/②: 평생 전자담배를 피우지 않음)

☐

8. 비해당

8. (지역)최근 1년 동안 공공장소(버스/택시 정거장, 길거리, 음식점, 유흥업소, PC방 등)에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

9. (지역) 최근 1년 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

10. (지역) 금연구역이 지정되어 있다는 것을 알고 있습니까?

- ① 지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다
② 지정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다 (➡ 「음주」 1번 문항으로)
③ 지정된 것을 모른다 (➡ 「음주」 1번 문항으로)

☐


10-1. (지역) 금연구역 내에서 흡연한 적이 있습니까?

- ① 금연구역 내에서 항상 흡연한다
② 금연구역 내에서 가끔 흡연한다
③ 금연구역 내에서 흡연을 하지 않는다
④ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항2/③: 과거흡연자
문항 10/②③ 지정구역 모름)

☐

8. 비해당

씨 뿌리는 건강조사, 꽃 피우는 지역건강

음주

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다.

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 3번 문항으로)

☐


1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?

만 세 888. 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음)

 세
888. 비해당

2. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 3번 문항으로)
③ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당



2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까?

- ① 한 달에 1번 미만
② 한 달에 1번 정도
③ 한 달에 2~4번 정도
④ 일주일에 2~3번 정도
⑤ 일주일에 4번 이상
⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?

(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다)

- ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-3. 최근 1년 동안 절주(음주량을 줄임)나 금주를 시도한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

3. 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

4. (지역) 지금까지 살아오면서 음주예방에 대한 교육을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

씨 뿌리는 건강조사, 꽃 피우는 지역건강

【오토바이 운전】

6. **오토바이** 운전을 합니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 7번 문항으로)

--	--

6-1. 오토바이를 운전할 때 헬멧을 착용합니까?

- ① 전혀 착용하지 않는다
- ② 거의 착용하지 않는 편이다
- ③ 가끔 착용하는 편이다
- ④ 대체로 착용하는 편이다
- ⑤ 항상 착용한다
- ⑧ 비 해당 (문항6/②: 오토바이 운전을 하지 않음)

--	--

8. 비해당

6-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까?

- ⑧ 비례당(문항6/②: 오토바이 운전을 하지 않음, 「음주」문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음)

--	--

8. 비해당

【자전거 운전】

7. 자전거를 탑니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「운동 및 신체활동」 1번 문항으로)

--	--

7-1. 자전거를 탈 때 헬멧을 착용합니까?

- ① 전혀 착용하지 않는다
- ② 거의 착용하지 않는 편이다
- ③ 가끔 착용하는 편이다
- ④ 대체로 착용하는 편이다
- ⑤ 항상 착용한다
- ⑥ 비해당 (문항7/②: 자전거를 타지 않음)

--	--

8. 비혜당

7-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거를 운전한 적이 있습니까?

- ⑧ 비해당(문항7/②: 자전거를 타지 않음, 「음주」문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음)

--	--

8. 비해당

운동 및 신체활동

1. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까? 일

10

※ 격렬한(고강도) 신체활동

달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 □□시간 □□분 88 88. 비해당(문항1/0일: 격렬한 신체활동 없음)

인 분

88 88. 티해당

2. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다.) 일

10

※ 중등도(중강도) 신체활동

천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

2-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 □□시간 □□분 88 88. 비해당(문항2/0일: 중등도 신체활동 없음)

시 분

88 88. 비해당

3. 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까? 일

10

※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.

3-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까?

하루에 시간 분 88 88. 비해당(문항3/0일: 전기운동 없음)

시 분

88 88. 비해당

4. 최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 쉽게 찾을 수 있었습니까?

--	--

- ① 매우 쉬웠다
② 쉬운 편이었다
③ 어려운 편이었다
④ 매우 어려웠다

5. (지역) 최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역의 등사무소, 보건소, 구청, 시청 등의 지방자치단체에서 운영하는 운동프로그램에 참여해 본 적이 있습니까?

--	--

- ① 예 ② 아니오

씨 뿌리는 건강조사, 꽃 피우는 지역건강

식생활

1. 최근 1주일 동안 아침식사를 한 날은 며칠입니까? ☐ 일
2. 평상시 음식을 먹을 때, 다음 중 본인은 어디에 해당합니까? ☐
 - ① 아주 짜게 먹는다
 - ② 약간 짜게 먹는다
 - ③ 보통으로 먹는다
 - ④ 약간 싱겁게 먹는다
 - ⑤ 아주 싱겁게 먹는다
3. 식탁이나 상에 차려진 음식을 먹을 때, 소금이나 간장을 더 넣어 먹습니까? ☐
 - ① 항상 더 넣는다
 - ② 자주 더 넣는다
 - ③ 거의 더 넣지 않는다
 - ④ 전혀 더 넣지 않는다
4. 전, 부침, 튀김을 먹을 때, 간장에 찍어 먹습니까? ☐
 - ① 항상 찍어 먹는다
 - ② 가끔 찍어 먹는다
 - ③ 찍어 먹지 않는다
5. '영양표시'를 알고 있습니까? ☐
 - ① 예
 - ② 아니오 (→ 6번 문항으로)
- 5-1. 가공식품을 사거나 고를 때, '영양표시'를 읽습니까? ☐
 - ① 예
 - ② 아니오 (→ 6번 문항으로)
 - ③ 비해당(문항5/②: 영양표시를 모름)
- 5-1-1. 영양표시 내용이 가공식품을 고르는데 영향을 미칩니까? ☐
 - ① 예
 - ② 아니오
 - ③ 비해당(문항5/②: 영양표시를 모름,
문항5-1/②: 영양표시를 읽지 않음)
6. (지역) 최근 1년 동안 보건소, 구청, 동사무소, 복지시설, 학교, 병원 등에서 실시된 영양교육 및 상담을 받은 적이 있습니까? ☐
 - ① 예
 - ② 아니오

비만 및 체중조절

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까?

- ① 매우 마른 편임
② 약간 마른 편임
③ 보통임
④ 약간 비만임
⑤ 매우 비만임

☐

2. 최근 1년 동안 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다
② 몸무게를 유지하려고 노력했다
③ 몸무게를 늘리려고 노력했다
④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해 본 적 없다

☐

2-1. 최근 1년 동안 몸무게를 줄이거나 유지하기 위해 사용한 방법은 무엇인지 모두 응답해 주십시오.

운동	① 예 ② 아니오
단식(24시간 이상)	① 예 ② 아니오
식사량감소 또는 식단조절	① 예 ② 아니오
의사처방 없이 임의로 살 빼는 약 복용	① 예 ② 아니오
의사 처방을 받아서 살 빼는 약 복용	① 예 ② 아니오
한약 복용	① 예 ② 아니오
건강기능식품	① 예 ② 아니오
원푸드 다이어트(포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만을 먹는 다이어트 방법)	① 예 ② 아니오

- ☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당

88888888. 비해당(문항2/③, ④: 몸무게를 늘리려고 노력했거나 조절하기 위해 노력해본 적이 없음)

88888888. 비해당

3. 현재 본인의 키는 얼마입니까?

. cm

. cm

4. 현재 본인의 몸무게는 얼마입니까?

. kg

. kg

씨 뿌리는 건강조사, 꽃 피우는 지역건강

구강건강

1. 스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

☐

2. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?
(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.)

☐

- ① 매우 불편하다
② 불편하다
③ 그저 그렇다
④ 별로 불편하지 않다
⑤ 전혀 불편하지 않다

3. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 명확히 발음을 하는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?
(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.)

☐

- ① 매우 불편하다
② 불편하다
③ 그저 그렇다
④ 별로 불편하지 않다
⑤ 전혀 불편하지 않다

4. (만 50세 이상 응답해 주십시오.) 현재 끼었다 뺏다 할 수 있는 틀니를 하고 있습니까?

☐

- ① 위아래 둘 다 있음
② 위쪽만 있음
③ 아래쪽만 있음
④ 아니오
⑤ 비해당(나이 : 만 50세 미만)

8. 비해당

5. 어제 하루 동안 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까?

아침식사 후에	① 예	② 아니오	③ 어제 아침식사 하지 않음
점심식사 후에	① 예	② 아니오	③ 어제 점심식사 하지 않음
저녁식사 후에	① 예	② 아니오	③ 어제 저녁식사 하지 않음
잠자기 전에	① 예	② 아니오	③ 어제 잠자지 않음

☐☐☐☐

6. 최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 치료를 받지 못한 적이 있습니까?

☐

- ① 예 ② 아니오 (→ 7번 문항으로)

씨 뿌리는 건강조사, 꽃 피우는 지역건강



6-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까?(한 가지만 선택)

- ① 경제적인 이유로
- ② 치과병원(또는 보건소, 보건지소 등)이 너무 멀어서
- ③ 직장이나 학교를 비울 수 없어서
- ④ 거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에
- ⑤ 아이를 봐줄 사람이 없어서
- ⑥ 다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서
- ⑦ 치과진료를 받기가 무서워서
- ⑧ 기타()

88. 비헤당(문항7/②: 진료를 받지 못한 적이 없음)

☐ ☐

88. 비헤당

7. 최근 1년 동안 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까? ※ 학교·사업장 구강검진, 국민건강보험공단 구강검진 포함

- ① 예
- ② 아니오

☐

8. 최근 1년 동안 스케일링(치석제거)을 받은 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

☐

씨 뿌리는 건강조사, 꽃 피우는 지역건강

정신건강

1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까? 시간 시간
2. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?
 - ① 대단히 많이 느낀다
 - ② 많이 느끼는 편이다] (→ 2-1번 문항으로)
 - ③ 조금 느끼는 편이다] (→ 3번 문항으로)
 - ④ 거의 느끼지 않는다
- 2-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까? 8. 비해당
 - ① 예
 - ② 아니오
 - ③ 비해당(문항2/③, ④: 평소 스트레스를 조금 느끼거나 거의 느끼지 않음)
3. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?
 - ① 예
 - ② 아니오 (→ 4번 문항으로)
- 3-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까? 8. 비해당
 - ① 예
 - ② 아니오
 - ③ 비해당(문항3/②: 2주 이상 슬프거나 절망감을 느낀 적이 없음)
4. (지역) 스트레스를 느끼는 가장 큰 원인은 무엇입니까? 8. 비해당
 - ① 경제적인 문제
 - ② 질병문제
 - ③ 가족문제
 - ④ 진로문제
 - ⑤ 대인관계(친척, 동료, 친구, 이웃 등)
 - ⑥ 기타()
 - ③ 비해당(문항2/③, ④: 평소 스트레스를 조금 느끼거나 거의 느끼지 않음)
5. (지역) 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까?
 - ① 예
 - ② 아니오 (→ 5번 문항으로)
- 5-1. (지역) 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까? 8. 비해당
 - ① 예
 - ② 아니오
 - ③ 비해당(문항4/②: 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 없음)
6. (지역) 최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?
 - ① 예
 - ② 아니오
7. (지역) 주위 사람들로부터 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 너무 많이 한다고 지적을 받는 편입니까?
 - ① 전혀 그렇지 않다
 - ② 거의 그렇지 않다
 - ③ 대체로 그렇다
 - ④ 항상 그렇다

씨 뿌리는 건강조사, 꽃 피우는 지역건강

3-2. (여성분만 응답해 주십시오.) 다음 중 어떤 종류의 암 검진을 받았습니까? 모두 응답해 주십시오.

위암	① 예 ② 아니오
간암	① 예 ② 아니오
대장암	① 예 ② 아니오
갑상선암	① 예 ② 아니오
유방암	① 예 ② 아니오
자궁경부암	① 예 ② 아니오
그 외 암	① 예 ② 아니오

8888888. 비해당(남자, 문항3/②): 암 검진을 받은 적이 없음)

3-3. 암 검진 후 검진결과에 대해 병원, 보건소 등에서 상담을 받은 적이 있습니까?

- ① 예] (→ 「이환」 1번 문항으로)
 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항3/②: 암 검진을 받은 적이 없음)

3-4. 암 검진을 받지 않은 이유는 무엇입니까?

- ① 검진비용이 비싸서
 ② 검진을 받을 시간이 없어서
 ③ 검진기관 위치를 몰라서
 ④ 필요성을 느끼지 못해서
 ⑤ 기타()
 ⑧ 비해당(문항3/①: 암 검진을 받은 적이 있음)

☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
8888888. 비해당

☐
 8. 비해당

☐
 기
 타
 8. 비해당

이환

1. 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까?

① 예 → 일

② 아니오

 일

2 00. 아니오

※ 지금부터 우리나라 국민들이 많이 걸리는 질병에 대해서 질문하도록 하겠습니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용을 응답해 주시기 바랍니다.

【고혈압】

1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?

① 예

② 아니오 (⇒ 2번 문항으로)

1-1. 본인의 혈압은 잘 조절되고 있습니까?

① 예

② 아니오

8 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1-2. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예

② 아니오 (⇒ 1-3번 문항으로)

8 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1-2-1. 혈압을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

혈압약 복용	① 예 ⇒ 한 달에 일 ② 아니오
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오

8 88 8. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항1-2/②: 현재 치료를 받지 않음)

1-3. 고혈압을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분미만으로 대화한 진료상담은 제외).

병의원	① 예 ② 아니오
한방병원	① 예 ② 아니오
보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2. 본인의 혈압수치를 알고 있습니까?

① 예

② 아니오

씨 뿌리는 건강조사, 꽃 피우는 지역건강

【당뇨병】

1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 (→ 2번 문항으로)

1-1. 본인의 혈당은 잘 조절되고 있습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1-2. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예 ② 아니오 (→ 1-3번 문항으로)

⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1-2-1. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모든 응답해 주십시오.

인슐린 주사	① 예 ② 아니오
당뇨병약(경구 혈당강하제)	① 예 ② 아니오
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항1/②): 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항1-2/
②: 현재 치료를 받지 않음)

1-3. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까?
모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분미만으로 대
화한 진료상담은 제외).

병의원	① 예 ② 아니오
한방병원	① 예 ② 아니오
보건소(보건지소), 보건지소, 보건진료소	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1-4. 당화혈색소에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 (→ 1-5번 문항으로)

⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1-4-1. 최근 1년 동안 당화혈색소 검사를 몇 번이나 했습니까?

① 4회 이상

② 3회

③ 2회

④ 1호]

⑤ 측정 안함

⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항1-4/②
당화혈색소에 대해 내용을 보거나 들어본 적이 없음)

씨 뿌리는 건강조사, 꽃 피우는 지역건강

1-5. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈검사(안저검사)를 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

1-6. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 스팩 검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

2. 본인의 혈당수치를 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

【이상지질혈증(고지혈증 포함)】

1. 의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 2번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오(⇒ 2번 문항으로)
 ③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

1-1-1. 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

이상지질혈증 약 복용	① 예 ⇒ 한 달에 일 ② 아니오
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오

☐

한 달에 일

2 00. 아니오

8 88. 비해당

☐

8. 비해당

8 88 8. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항 1-1/②: 현재 치료를 받지 않음)

2. 본인의 총 콜레스테롤 수치를 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

【뇌졸중(중풍)】

1. 의사에게 뇌졸중(중풍)을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「심근경색증, 협심증」 1번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

씨 뿌리는 건강조사, 꽃 피우는 지역건강

1-2. 뇌졸중(중풍)으로 인한 후유증을 알고 있습니까?

- ① 후유증을 앓고 있다
② 후유증이 있었지만 지금은 회복되었다
③ 특별한 후유증이 없었다
④ 비혜당(문항1/②): 의사에게 진단받은 적이 없음

8. 비해당

【심그경새증, 협심증】

1. 의사에게 심근경색증 또는 협심증을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「관절염」 1번 문항으로)

1



1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비혜당(문항1/②): 의사에게 진단받은 적이 없음

8. 비해당

【관절염】

1. 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「지역-대사증후군」 1번 문항으로)



1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
- ⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1

8. 비해당

1-2. 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외).

병의원	① 예 ② 아니오
한방병원	① 예 ② 아니오
보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

□

8. 비해당

1

8. 비해당

【지역선택문항-대사증후군】

1. (지역) 대사중후군에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까?

- ② 아니오 (→ 만 60세 미만 「의료이용」 1번 문항으로, 만 60세 이상 「지역-치매」 1번 문항으로)

1

【지역선택문항-치매】

1. (지역) (만 60세 이상만 응답해 주십시오.) 지금까지 살아오면서 치매선별검사를 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니요
⑧ 비혜당(나이 : 60세 미만)

□

8. 비해당

의료이용

1. 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 미포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까?

① 예

② 아니오 (→ 「사고 및 중독」 1번 문항으로)

1



1-1. 그런 적이 있다면, 다음 중 어떤 이유로 본인이 원하는 때 병원에 가지 못했습니까?

(한 가지만 선택)

① 경제적인 이유로

② 병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서

③ 교통편이 불편해서

④ 내가 갈 수 있는 시간에 병의원 등이 문을 열지 않아서

⑤ 병의원 등에서 오래 기다리기 싫어서

⑥ 증상이 가벼워서

⑦ 기타()

⑧ 비해당(문항1/②: 병의원(치과 미포함)에 가지 못한 적이 없음)

1

8. 비혜당

씨 뿌리는 건강조사, 꽃 피우는 지역건강

사고 및 중독

1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까?

※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외

① 예 → ☐ 회

② 아니오 (→ 「활동제한 및 삶의 질」 1번 문항으로)

☐ ☐ 회

2 0. 아니오

※ 여러 번 발생했다면, 각각의 손상 및 사고중독에 대해 2~5번 문항을 반복합니다.

2. 이 사고 또는 중독은 언제 발생했습니까?

20 년 월

3. 이 사고 또는 중독은 어떻게 발생했습니까?

- ① 운수사고
- ② 추락(미끄러짐 포함)
- ③ 부딪힘(충돌 포함)
- ④ 자상 및 관통상(찔림 포함)
- ⑤ 화상(전기, 열, 불로 인한)
- ⑥ 익수
- ⑦ 질식
- ⑧ 중독
- ⑨ 동물에게 물림
- ⑩ 감전
- ⑪ 기타()

4. 이 사고 또는 중독으로 입은 손상을 어디에서 치료를 받았습니까?

- ① 응급실
- ② 병의원 외래 이용
- ③ 병의원 병실입원
- ④ 기타()

5. 이 사고 또는 중독은 비의도적 사고였습니까? 아니면 본인이나 타인에 의해 의도적으로 발생한 것입니까?

- ① 비의도적 사고(불의의 사고)
- ② 의도적 자해
- ③ 다른 사람의 폭력

사고 및 중독 응답표

1회	2회	3회	4회	5회
2 0 월	2 0 월	2 0 월	2 0 월	2 0 월
 기 타	 기 타	 기 타	 기 타	 기 타
 기 타	 기 타	 기 타	 기 타	 기 타
 기 타	 기 타	 기 타	 기 타	 기 타

활동제한 및 삶의 질

※ 아래의 각 문항에서 오늘 귀하의 건강상태를 가장 잘 설명해주는 하나의 항목에 표시해 주십시오.

1-1. 운동능력

- ① 나는 걷는데 지장이 없다
- ② 나는 걷는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 종일 누워 있어야 한다

☐

1-2. 자기관리

- ① 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다
- ② 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다

☐

1-3. 일상 활동(예: 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가활동)

- ① 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다
- ② 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 일상 활동을 할 수가 없다

☐

1-4. 통증/불편

- ① 나는 통증이나 불편감이 없다
- ② 나는 다소 통증이나 불편감이 있다
- ③ 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다

☐

1-5. 불안/우울

- ① 나는 불안하거나 우울하지 않다
- ② 나는 다소 불안하거나 우울하다
- ③ 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다

☐

씨 뿌리는 건강조사, 꽃 피우는 지역건강

보건기관 이용

1. 최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있습니까?

- ① 예
② 아니오

☐

사회 물리적 환경

1. 현재 살고 있는 광역 시·도에서 얼마나 오래 살았습니까?

- ① 5년 미만
② 5-10년 미만
③ 10-15년 미만
④ 15-20년 미만
⑤ 20년 이상

☐

2. 현재 살고 있는 시·군·구에서 얼마나 오래 살았습니까?

- ① 5년 미만
② 5-10년 미만
③ 10-15년 미만
④ 15-20년 미만
⑤ 20년 이상

☐

심정지

1. 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「교육 및 경제활동」 1번 문항으로)

☐


1-1. 심폐소생술 교육을 받은 경험이 있습니까?

- ① 최근 2년간 교육을 받은 적이 있다 (⇒ 1-1-1번 문항으로)
② 과거에는 있었지만, 최근 2년간 없다 (⇒ 2번 문항으로)
③ 교육을 받은 적이 없다 (⇒ 2번 문항으로)
④ 비해당(문항1/②: 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음)

☐

8. 비해당



1-1-1. 최근 2년 동안 마네킹을 이용한 심폐소생술 실습을 한 경험이 있습니까?

- ① 예
② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음, 문항1-1/②: 과거에는 있었지만, 최근 2년간 없음, 문항1-1/③: 교육을 받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

2. 심장마비(심정지) 환자를 목격한 경우 심폐소생술을 시행할 수 있습니까?

- ① 정확하게 시행할 수 있다
② 대략 시행할 수 있다
③ 시행할 수 없다
④ 비해당(문항 1/②: 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음)

☐

8. 비해당

교육 및 경제활동

1. 귀하께서는 최근 1주일 동안 수입을 목적으로 1시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급 가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태도 일을 하신 경우에 포함 됩니다.

① 예 ② 아니오

2. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해주십시오.
(예를 들면, 은행에서 출납 일을 함, 건설현장에서 교통정리를 함, 벽지 도배, 내과질환진료 및 치료 등)

일의 종류	
직 업 분 류	① 관리자 ② 전문가 및 관련종사자
	③ 사무종사자 ④ 서비스종사자
	⑤ 판매종사자 ⑥ 농·림·어업종사자
	⑦ 기능원 및 관련기능종사자 ⑧ 장치, 기계조작 및 조립종사자
	⑨ 단순노무종사자 ⑩ 군인(직업군인)
	⑪ 학생/재수생 ⑫ 주부 ⑬ 무직

- 2-1. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?
(※ 문항 2번 응답보기 ①~⑩에 응답하신 분만 응답해 주십시오.)

① 고용주 및 자영업자(내 사업을 한다)
② 임금근로자(타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다)
③ 무급가족종사자(가족, 친척의 일을 돈을 받지 않고 돕는다)
④ 비해당(문항2/①, ②, ③: 학생/재수생, 주부, 무직)

3. 귀하는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

① 무학 (= 4번 문항으로) ② 서당/한학 (= 4번 문항으로) ③ 초등학교
④ 중학교 ⑤ 고등학교 ⑥ 2년/3년제 대학
⑦ 4년제 대학 ⑧ 대학원 이상

- 3-1. 귀하는 그 학교를 졸업하셨습니까? 졸업여부를 말씀해 주십시오.

① 졸업 ② 수료 ③ 중퇴 ④ 재학/휴학 중
⑤ 비해당(문항3/①, ②: 무학, 서당/한학)

4. 귀하의 현재 혼인상태(사실혼 포함)는 다음 중 무엇에 해당합니까?

① 배우자 있음(같이 살고 있음)
② 이혼
③ 사별
④ 별거
⑤ 미혼

씨 뿌리는 건강조사, 꽃 피우는 지역건강

설문에 응해주셔서 감사합니다.

답례품 수령 확인

설문을 마친 후 조사원으로부터 답례품을 받았습니다.

2014년 월 일

성명

서명 또는 날인

※ 개인조사는 마쳤습니다. 가구대표 1명이 가구조사에 참여하여 주십시오.

최 종 점 검 자			
입 력 완 료 일			
재 조 사 일			
재 조사 완료일			

Memo



지역사회건강조사
Community Health Survey



지역사회건강조사
Community Health Survey

제 4 부

부록

Ⅱ. 가구조사표

CHS

Community Health Survey

다음은 2014년 지역사회건강조사 가구조사표(울산권역)입니다. →

2014년 지역사회건강조사 가구명부

[illegible]

가구현황

주소	(표본지점 주소)			총 방문횟수	() 회					
	(이하 상세주소)	집전화	☎ () -		방문일	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1차</td> <td style="width: 80%;">2014. . .</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2차</td> <td>2014. . .</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3차</td> <td>2014. . .</td> </tr> </table>	1차	2014. . .	2차	2014. . .
1차	2014. . .									
2차	2014. . .									
3차	2014. . .									

가구구분	☐ 본표본가구 ☐ 예비표본가구 (본표본가구 번호:)	가구대체 발생시 본표본 가구번호를 기입합니다.
성인거주여부	☐ 성인거주 ☐ 성인미거주 ☐ 모름	성인기준: 주민등록상 생일로 1995. 7. 31 이전 출생자
조사적합여부	☐ 적합 ➡ 가구원정보 기입 ☐ 부적합 ➡ 조사종료 & 가구대체 (사유:)	

가구원현황

'가구조사' 기입란은 가구조사를 한 대표 가구원 1인만 ☒ 하십시오.

가구원 번호	가구원 성명	성별	주민등록상 생년월일	가구주와의 관계	휴대전화	조사수행 여부	미수행 사유	가구 조사
01		남 / 여			- -	Y / N		☐
02		남 / 여			- -	Y / N		☐
03		남 / 여			- -	Y / N		☐
04		남 / 여			- -	Y / N		☐
05		남 / 여			- -	Y / N		☐
06		남 / 여			- -	Y / N		☐
07		남 / 여			- -	Y / N		☐
08		남 / 여			- -	Y / N		☐
09		남 / 여			- -	Y / N		☐
10		남 / 여			- -	Y / N		☐
11		남 / 여			- -	Y / N		☐
12		남 / 여			- -	Y / N		☐

조사원 성명: _____

가구완료

조 사 인 원 : 만 19세 이상 성인 ()명 중 ()명 조사
조 사 환 료 : 만 19세 이상 성인을 모두 조사하였습니까? ☐예 ☐아니오
가 구 조 사 : 가구 대표1명만 가구조사를 실시하였습니까? ☐예 ☐아니오
답 례 품 전 달 : 조사인원 수만큼 답례품을 제공하였습니까? ☐예 ☐아니오
가구선택통지문 : 이 가구는 가구선택통지문을 받았습니까? ☐예 ☐아니오

가구조사

※ 가구대표 1명만 가구조사에 참여해 주시기 바랍니다.

1. 세대 유형은 다음 중 무엇에 해당합니까?

1 세 대	☐ 1. 1인 가구	☐ 2. 응답자+미혼형제자매	☐ 7. 기타 : 상기를 제외한 모든 1세대 가구
	☐ 3. 부부(응답자+배우자)	☐ 4. 부부+기타 친인척	
	☐ 5. 부부+미혼형제자매	☐ 6. 응답자+기타 친인척	
2 세 대	☐ 8. 부부+미혼자녀	☐ 9. 부부+양친	☐ 10. 조부모 부부+미혼 손자녀
	☐ 11. 편부+미혼자녀	☐ 12. 부부+편부모	☐ 13. 편조부/편조모+미혼 손자녀
	☐ 14. 편모+미혼자녀	☐ 15. 부부+자녀+부부의 형제 또는 자매	☐ 16. 기타 : 상기를 제외한 모든 2세대 가구
3 세 대	☐ 17. 부부+미혼자녀+양친		
	☐ 18. 부부+미혼자녀+편부모		
	☐ 19. 기타 상기를 제외한 모든 3세대 이상 가구		

2. 귀 가구는 현재 기초생활 수급자(구. 생활보호대상자 혹은 영세민)입니까?

- ① 그렇다
② 지금은 아니지만, 과거에 수급자였던 적이 있다
③ 아니다

3. 임금, 부동산 소득, 연금, 이자, 정부 보조금, 친척이나 자녀들의 용돈 등 모든 수입을 합쳐 최근 1년 동안 가구의 월 평균 소득은 대략 얼마입니까?

- ① 50만원 미만
- ② 50~100만원 미만
- ③ 100~200만원 미만
- ④ 200~300만원 미만
- ⑤ 300~400만원 미만
- ⑥ 400~500만원 미만
- ⑦ 500~600만원 미만
- ⑧ 600만원 이상

4. 귀 가구는 현재 치매환자와 함께 거주하고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

5. 다음 중 최근 1년 동안 귀하의 식생활 행편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?

- ① 우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다
- ② 우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다
- ③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다
- ④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다

제 4 부

부록

Ⅲ. 지표정의

지표정의

1. 건강행태

가. 흡연

(1) 현재흡연율

지표정의		평생 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 하루 평균 흡연량 □□□개비 ② 가끔 피움 지난 1달간 흡연일 수 □□일 흡연하는 날 하루 평균 흡연량 □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 과거흡연기간 □□년□□개월 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량 □□□개비 금연기간 □□년 □□개월
산출식	분자	평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

(2) 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량

지표정의		평생 담배 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 매일 흡연하는 사람의 하루 평균 흡연량
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 하루 평균 흡연량 □□□개비 ② 가끔 피움 지난 1달간 흡연일 수 □□일 흡연하는 날 하루 평균 흡연량 □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 과거흡연기간 □□년□□개월 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량 □□□개비 금연기간 □□년 □□개월
산출식	분자	평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 매일 흡연자의 하루 평균 흡연개비수의 총 합
	분모	평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일 흡연자 수
단위		개비

(3) 현재흡연자의 금연시도율

지표정의		현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 하루 평균 흡연량 □□□개비 ② 가끔 피움 지난 1달간 흡연일 수 □□일 흡연하는 날 하루 평균 흡연량 □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 과거흡연기간 □□년□□개월 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량 □□□개비 금연기간 □□년 □□개월
산출식	분자	최근 1년 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수×100
	분모	현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수
단위		%

(4) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률

지표정의		현재흡연자 중 1개월 내에 금연할 계획이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 하루 평균 흡연량 □□□개비 ② 가끔 피움 지난 1달간 흡연일 수 □□일 흡연하는 날 하루 평균 흡연량 □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 과거흡연기간 □□년□□개월 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량 □□□개비 금연기간 □□년 □□개월
		3. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까? ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다 ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다 ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다 ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다
산출식	분자	현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 중 1개월 내 금연계획이 있는 사람의 수×100
	분모	현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수
단위		%

(5) 남자 현재흡연율

지표정의		평생 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 남자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 하루 평균 흡연량 □□□개비 ② 가끔 피움 지난 1달간 흡연일 수 □□일 흡연하는 날 하루 평균 흡연량 □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 과거흡연기간 □□년□□개월 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량 □□□개비 금연기간 □□년 □□개월
산출식	분자	평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수×100
	분모	남자 조사대상 응답자 수
단위		%

(6) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률

지표정의		현재비흡연자(과거흡연자 포함)중 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 맡은 적이 있는 사람의 비율
관련문항		1. 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적 있는 사람의 수×100
	분모	현재비흡연자(과거흡연자 포함)수
단위		%

(7) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률

지표정의		일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)중 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 비율
관련문항		1. 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)
산출식	분자	최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수×100
	분모	일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수
단위		%

나. 음주

(1) 월간음주율

지표정의		최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 음주한 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2-4번 ④ 일주일에 2-3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상
산출식	분자	최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

(2) 고위험음주율

지표정의		최근 1년 동안 음주한 사람 중에서 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 주 2회 이상 마시는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2~4번 정도 ④ 일주일에 2~3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상
		1-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다) ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
산출식	분자	최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔)이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수×100
	분모	최근 1년 동안 음주한 사람의 수
단위		%

(3) 연간 음주폐해 경험률

지표정의	최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전사고 등을 경험한 적이 있는 사람의 분율
관련문항	1. 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전사고 등을 경험한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자: 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전사고 등을 경험한 적이 있는 사람의 수×100 분모: 조사대상 응답자 수
단위	%

다. 안전의식

(1) 운전 시 안전벨트 착용률

지표정의	자동차 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항	1. 자동차 운전을 합니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까? ① 전혀 매지 않는다 ② 거의 매지 않는 편이다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 맨다
산출식	분자: 자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100 분모: 자동차 운전자 수
단위	%

(2) 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률

지표정의	승용차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항	1. 다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 맵니까? ① 앞좌석에 타지 않는다 ② 전혀 매지 않는다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 맨다
산출식	분자: 승용차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100 분모: 동승차량 앞좌석 탑승자 수
단위	%

(3) 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률

지표정의		승용차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항		1. 다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 맵니까? ① 뒷좌석에 타지 않는다 ② 전혀 매지 않는다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 맨다
산출식	분자	승용차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	동승차량 뒷좌석 탑승자 수
단위		%

(4) 연간 음주음전 경험률(자동차 또는 오토바이)

지표정의		최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 오토바이 또는 자동차를 운전한 사람의 분율
관련문항		1. 자동차 운전을 합니까? ① 예 ② 아니오 1-1. <u>최근 1년 동안</u> 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 2. 오토바이 운전을 합니까? ① 예 ② 아니오 2-1. <u>최근 1년 동안</u> 조금이라도 술을 마신 후 오토바이를 운전한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 수×100
	분모	자동차 또는 오토바이 운전자 수
단위		%

라. 운동 및 신체활동

(1) 격렬한 신체활동 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1주일 동안</u> 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(※격렬한(고강도) 신체활동: 달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동) □일 1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 □□시간 □□분
산출식	분자	최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

(2) 중등도 신체활동 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1주일 동안</u> 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다)(※중등도(중강도) 신체활동: 천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업활동 및 체육활동, 단 걷기는 제외) □일 1-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 □□시간 □□분
산출식	분자	최근 1주일 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

(3) 중등도 이상 신체활동 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 1일 20분 이상 주 3일 이상 또는 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(※격렬한(고강도) 신체활동: 달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동) ☐ 일
		1-1.이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 ☐ ☐ 시간 ☐ ☐ 분
		2. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다)(※중등도(중강도) 신체활동: 천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업활동 및 체육활동, 단 걷기는 제외) ☐ 일
		2-1.이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 ☐ ☐ 시간 ☐ ☐ 분
산출식	분자	최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

(4) 걷기 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까? ※출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오. ☐ 일
		1-1.이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까? 하루에 ☐ ☐ 시간 ☐ ☐ 분
산출식	분자	최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

마. 식생활

(1) 아침식사 섭취빈도

지표정의		최근 1주일 동안 아침식사빈도
관련문항		1. 최근 1주일 동안 아침식사를 한 날은 며칠입니까? □일
산출식	분자	최근 1주일 동안 아침식사한 날
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

(2) 영양표시 활용률

지표정의	영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 분율	
관련문항	1. ‘영양표시’를 알고 있습니까? ① 예 ② 아니오	
	1-1. 가공식품을 사거나 고를 때 ‘영양표시’를 읽습니까? ① 예 ② 아니오	
	1-2. 영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고르는데 영향을 미칩니까? ① 예 ② 아니오	
산출식	분자	영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수×100
	분모	가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수
단위	%	

바. 비만 및 체중조절

(1) 비만율

지표정의		체질량지수
관련문항		1. 현재 본인의 키는 얼마입니까? □□□.□cm
		2. 현재 본인의 몸무게는 얼마입니까? □□□.□kg
산출식	분자	체질량지수(kg/m ²)가 25 이상인 사람의 수×100 - 저체중 =BMI <18.5 인 사람의 수×100 - 정상 = 18.5≤BMI<25 인 사람의 수×100 - 비만(비만인구율) = BMI≥25 인 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

(2) 주관적 비만인지율

지표정의		주관적으로 “약간 비만” 또는 “매우 비만”이라고 생각하는 사람의 분율
관련문항		1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까? ① 매우 마른 편임 ② 약간 마른 편임 ③ 보통임 ④ 약간 비만임 ⑤ 매우 비만임
산출식	분자	“약간 비만임” 또는 “매우 비만임”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

(3) 체중조절 시도율

지표정의		최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까? ① 몸무게를 줄이려고 노력했다 ② 몸무게를 유지하려고 노력했다 ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다 ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다
산출식	분자	최근 1년 동안 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 했던 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

사. 구강건강

(1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

지표정의		주관적으로 구강건강이 나쁘다고 인식하는 사람의 분율
관련문항		1. 스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨
산출식	분자	“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

(2) 저작불편호소율(65세 이상)

지표정의		현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 65세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느끼니까?(※ 틀니를 사용하는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오) ① 매우 불편하다 ② 불편하다 ③ 그저 그렇다 ④ 별로 불편하지 않다 ⑤ 전혀 불편하지 않다
산출식	분자	“매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	65세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%

(3) 구강검진 수진율

지표정의		최근 1년 동안 치료목적이 아닌 순수검진 목적으로 구강검진을 받은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강 검진을 받은 적이 있습니까? ※학교 사업장 구강검진, 국민건강보험공단 구강검진 포함 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 구강검진을 받은 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

(4) 아침식사 후 칫솔질 실천율

지표정의		아침식사 후 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. 어제 하루 동안 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? - 아침 식사 후에 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 아침식사 하지 않음
산출식	분자	아침식사 후 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	어제 하루 동안 아침식사 한 사람의 수
단위		%

(5) 점심식사 후 칫솔질 실천율

지표정의		점심식사 후 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. 어제 하루 동안 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? - 점심 식사 후에 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 점심식사 하지 않음
산출식	분자	점심식사 후 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	어제 하루 동안 점심식사 한 사람의 수
단위		%

(6) 저녁식사 후 칫솔질 실천율

지표정의		저녁식사 후 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. 어제 하루 동안 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? - 저녁 식사 후 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 저녁식사 하지 않음
산출식	분자	저녁식사 후 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	어제 하루 동안 저녁식사 한 사람의 수
단위		%

(7) 잠자기 전 칫솔질 실천율

지표정의		잠자기 전 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. 어제 하루 동안 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? - 잠자기 전에 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	잠자기 전 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	어제 하루 동안 잠을 잔 사람의 수
단위		%

아. 정신건강

(1) 스트레스 인지율

지표정의		평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이” 또는 “많이” 느끼는 사람의 분율
관련문항		1. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까? ① 대단히 많이 느낀다 ② 많이 느끼는 편이다 ③ 조금 느끼는 편이다 ④ 거의 느끼지 않는다
산출식	분자	평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

(2) 우울감 경험률

지표정의		최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 경험한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

2. 예방접종 및 검진

(1) 연간 인플루엔자 예방접종률

지표정의		최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

(2) 건강검진 수진율

지표정의		최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 사람의 분율
관련문항		1. 최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으나 건강상태를 알아보기 위해 건강검진(암검진 제외)받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 2년 동안 건강검진(암검진 제외)을 받은 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

(3) 암 검진율

지표정의		최근 2년간 암 검진을 받은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으나 건강상태를 알아보기 위해 암 검진을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 2년간 암 검진을 받은 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

3. 이환

(1) 만성·급성질환 및 사고중독 경험률

지표정의		최근 2주 동안 만성, 급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 2주 동안 만성, 급성질환 및 사고, 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까? ① 예→□□일 ② 아니오
산출식	분자	최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

(2) 연간 평균 혈압 측정횟수

지표정의		최근 1년 동안 혈압을 측정한 횟수
관련문항		1. 최근 1년 동안 혈압을 몇 번이나 잤습니까? ① 하루에 → □□□회 ② 일주일에 → □□□회 ③ 한 달에 → □□□회 ④ 일 년에 → □□□회 ⑤ 전혀 안 함 → □□□회
산출식	분자	(하루 측정 횟수×365일)+(일주일 측정 횟수×52주)+(한 달 측정 횟수×12개월)+(일년 측정 횟수)
	분모	조사대상 응답자 수
단위		회

(3) 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)

지표정의		의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	의사에게 고혈압을 진단 받은 사람의 수×100
	분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%

(4) 고혈압 약물치료율(≥30)

지표정의		의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람으로 현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용한 분율
관련문항		1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-1. 현재 치료를 받고 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-2. 혈압을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오. 혈압약 복용 ① 예→한 달에 □□일 ② 아니오 비약물요법 (운동, 식사요법) ① 예 ② 아니오
산출식	분자	현재 혈압조절약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%

(5) 고혈압 관리교육 이수율(≥30)

지표정의		의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람으로 고혈압 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 고혈압을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) 병의원 ① 예 ② 아니오 한방병원 ① 예 ② 아니오 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%

(6) 연간 평균 혈당 측정횟수

지표정의		최근 1년 동안 평균혈당을 측정한 횟수
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 혈당을 몇 번이나 잤습니까? ① 하루에 ➡ □□□회 ② 일주일애 ➡ □□□회 ③ 한 달에 ➡ □□□회 ④ 일 년에 ➡ □□□회 ⑤ 전혀 안 함 ➡ □□□회
산출식	분자	(하루 측정 횟수×365일)+(일주일 측정 횟수×52주)+(한 달 측정 횟수×12개월)+(일년 측정 횟수)
	분모	조사대상 응답자 수
단위		회

(7) 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥ 30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	의사에게 당뇨병을 진단 받은 사람의 수×100
	분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%

(8) 당뇨병 치료율(≥ 30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람으로 혈당을 관리하기 위해 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구혈당강하제)를 치료 받고 사람의 분율	
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	
		1-2. 현재 치료를 받고 있습니까? ① 예 ② 아니오	
		1-3. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까?(모두 응답해 주십시오) 인슐린 주사 ① 예 ② 아니오 당뇨병 약(경구 혈당강하제) 복용 ① 예 ② 아니오 비약물요법(운동, 식사요법) ① 예 ② 아니오	
산출식	분자	현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수×100	
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수	
단위		%	

(9) 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람으로 당뇨병을 관리하는 방법에 대해 병의원 또는 한방병의원 또는 보건소에서 교육을 받은 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 2. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) 병의원 ① 예 ② 아니오 한방병의원 ① 예 ② 아니오 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%

(10) 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년 동안 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-2. <u>최근 1년 동안</u> 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈 검사(안저 검사)를 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저 검사)를 받은 적이 있는 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%

(11) 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년 동안 스틱검사를 제외한 정밀 소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-2. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생요부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%

(12) 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)

지표정의		의사에게 관절염을 진단받은 50세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	의사에게 관절염을 진단 받은 사람의 수×100
	분모	50세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%

(13) 관절염 관리교육 이수율(≥50)

지표정의		의사에게 관절염을 진단받은 50세 이상 사람 중 관절염 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-2. 관절염을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) 병의원 ① 예 ② 아니오 한방병의원 ① 예 ② 아니오 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	관절염 관리교육을 받은 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수
단위		%

(14) 이상지질혈증(고지혈증 포함) 평생 의사진단 경험률(≥ 30)

지표정의		의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 30세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단 받은 사람의 수 $\times 100$
	분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%

4. 의료이용

(1) 필요의료서비스 미치료율

지표정의		최근 1년 동안 필요한 의료서비스를 받지 못한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 본인이 병원(치과 미포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수 $\times 100$
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

5. 사고 및 중독

(1) 연간 사고중독 경험률

지표정의		최근 1년 동안 병원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 병원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외 ① 예 → ☐ 회 ② 아니오
산출식	분자	연간 사고중독 경험자 수 $\times 100$
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

(2) 연간 사고중독 원인

지표정의		최근 1년 동안 경험한 사고중독의 원인별 분포
관련문항		1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외 ① 예 → □회 ② 아니오
		1-2. 이 사고 또는 중독은 어떻게 발생했습니까? ① 운수사고 ② 추락(미끄러짐 포함) ③ 부딪힘(충돌 포함) ④ 자상 및 관통상(찔림 포함) ⑤ 화상(전기, 열, 불로 인한) ⑥ 익수 ⑦ 질식 ⑧ 중독 ⑨ 동물에게 물림 ⑩ 감전 ⑪ 기타()
산출식	분자	원인별 사고중독 건수×100
	분모	사고중독 건수
단위		%

6. 활동제한 및 삶의 질

(1) 양호한 주관적 건강수준 인지율

지표정의		주관적 건강수준을 “매우 좋음” 혹은 “좋음”이라고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. 평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨
산출식	분자	주관적 건강수준을 “매우 좋음” 혹은 “좋음”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

7. 보건기관 이용

(1) 보건기관 이용률

지표정의		최근 1년 동안 보건기관을 이용한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

8. 심정지

(1) 심폐소생술 인지율

지표정의		심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 분율
관련문항		1. 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

(2) 심폐소생술 교육경험률

지표정의		최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 사람의 분율
관련문항		1. 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-1. 심폐소생술 교육을 받은 경험이 있습니까? ① 최근 2년간 교육을 받은 적이 있다 ② 과거에는 있었지만, 최근 2년간 없다 ③ 교육을 받은 적이 없다
산출식	분자	최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%

제 4 부

부록

IV. 2008-2014 산출지표

2008-2014 산출지표

1. 흡연

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
평생흡연율	-	-	-	-	-	-	○
흡연시작연령 ¹⁾	○	○	○	○	○	○	○
현재흡연율	○	○	○	○	○	○	○
매일흡연자의 하루 평균 흡연량	-	○	○	○	○	○	○
현재흡연자의 1개월 내 금연계획률	○	○	○	○	○	○	○
현재흡연자의 금연시도율	○	○	○	○	○	○	○
가정실내 간접흡연 노출률 ²⁾	○	○	○	○	-	○	○
직장실내 간접흡연 노출률	-	○	○	○	-	○	○
평생 전자담배 흡연율	-	-	-	-	-	-	○
현재 전자담배 흡연율	-	-	-	-	-	-	○
과거흡연자의 평균 금연기간	-	-	-	-	-	-	○
총계	5	7	7	7	5	7	11

2. 음주

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
평생음주율	○	○	○	○	○	○	○
음주시작연령 ³⁾	○	○	○	○	○	○	○
연간음주율	-	○	○	○	○	○	○
월간음주율	○	○	○	○	○	○	○
고위험음주율	○	○	○	○	○	○	○
연간 음주폐해 경험률	-	-	-	-	-	-	○
연간 절주 또는 금주시도율	-	-	-	-	-	-	○
총계	4	5	5	5	5	5	7

1) '08년 지표명: 처음 흡연경험연령

2) '08년 지표명: 가정 내 간접흡연 노출률

3) '08년 지표명: 처음 음주경험연령

3. 안전의식

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
운전 시 안전벨트 착용률	○	○	○	○	○	○	○
동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	○	○	○	○	○	○	○
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	-	-	-	-	-	-	○
버스 안전벨트 착용률	-	-	-	-	-	-	○
연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이) ⁴⁾	○	○	○	○	○	○	○
연간 자동차 음주운전차량 동승경험률 ⁵⁾	-	-	○	○	○	○	○
오토바이 헬멧 착용률	-	-	○	○	-	○	○
자전거 헬멧 착용률 ⁶⁾	-	○	○	○	-	○	○
연간 자전거 음주운전 경험률	-	-	-	-	-	-	○
총계	3	4	6	6	4	6	9

4. 운동 및 신체활동

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
격렬한 신체활동 실천율	-	○	○	○	○	○	○
중등도 신체활동 실천율	-	○	○	○	○	○	○
중등도 이상 신체활동 실천율	○	○	○	○	○	○	○
걷기 실천율 ⁷⁾	○	○	○	○	○	○	○
지역사회 내 운동시설 접근율	○	○	○	-	○	-	○
총계	3	5	5	4	5	4	5

5. 식생활

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
아침식사 섭취빈도	-	-	-	○	○	○	○
아침결식예방 인구비율	-	-	-	○	○	○	○
저염선택율	○	○	○	○	○	○	○
영양표시 인지율	-	-	-	-	-	-	○
영양표시 독해율 ⁸⁾	-	○	○	○	○	○	○
영양표시 활용률	-	-	-	-	-	-	○
총계	1	2	2	4	4	4	6

4) '08년 지표명: 연간 음주운전 경험률(자동차, 오토바이)

5) '09-'13년 지표명: 연간 음주운전차량 동승률

6) '09년 지표명: 자전거 보호 장구(헬멧, 무릎보호대)착용률

7) '08년 지표명: 걷기운동 실천율

8) '09-'13년 지표명: 가공식품 선택 시 영양표시 이용률

6. 비만 및 체중조절

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
비만율 ⁹⁾	○	○	○	○	○	○	○
체질량지수(BMI)	○	○	○	○	○	○	○
비만도 분포	○	○	○	○	○	○	○
주관적 비만인지율	○	○	○	○	○	○	○
체중조절 시도율	○	○	○	○	○	○	○
체중조절 시도방법	○	○	○	-	○	-	○
총계	6	6	6	5	6	5	6

7. 구강건강

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	○	○	○	○	○	○	○
저작불편호소율 : 65세 이상	○	○	○	○	○	○	○
발음불편호소율 : 65세 이상	○	○	○	○	○	○	○
틀니 이용 행태 : 50세 이상	-	-	-	-	-	-	○
아침식사 후 칫솔질 실천율	-	-	-	-	-	-	○
점심식사 후 칫솔질 실천율	-	○	○	○	○	○	○
저녁식사 후 칫솔질 실천율	-	-	-	-	-	-	○
잠자기 전 칫솔질 실천율	-	-	-	-	-	-	○
구강검진 수진율	○	○	○	○	○	○	○
연간 스케일링 경험률	○	○	○	○	○	○	○
치과진료 미치료율	○	○	-	○	○	○	○
치과진료 미치료자의 미치료 이유 ¹⁰⁾	○	○	-	○	○	○	○
총계	7	8	6	8	8	8	12

9) '08년 지표명: 비만인구율

10) '08-'09년, '11년 지표명: 치과진료 미치료 이유

8. 정신건강

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
하루 평균 수면시간	○	○	○	○	○	○	○
스트레스 인지율 ¹¹⁾	○	○	○	○	○	○	○
스트레스로 인한 정신상담률	-	○	○	○	○	○	○
우울감 경험률	○	○	○	○	○	○	○
우울증상으로 인한 정신상담률	-	○	○	○	○	○	○
총계	3	5	5	5	5	5	5

9. 예방접종 및 검진

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
연간 인플루엔자 예방접종률	○	○	○	○	○	○	○
건강검진 수진율	○	○	○	-	○	-	○
건강검진 미수진 이유	-	○	○	-	○	-	○
암 검진율	○	○	○	-	○	-	○
암 검진 미수검 이유	-	○	○	-	○	-	○
최근 2년간 수검 암 검진 종류	-	-	○	-	○	-	○
건강검진 사후 관리 상담률	-	○	○	-	○	-	○
암 검진 사후 관리 상담률	-	○	○	-	○	-	○
총계	3	7	8	1	8	1	8

11) '08년 지표명: 주관적 스트레스 인지율

10. 이환

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
[이환]							
만성·급성질환 및 사고중독 경험률 ¹²⁾	○	○	○	○	○	○	○
만성·급성질환 및 사고중독 경험일수 ¹³⁾	○	○	○	○	○	○	○
[고혈압]							
고혈압 평생 의사진단 경험률 ¹⁴⁾	○	○	○	○	○	○	○
본인 인지 혈압조절률	-	-	○	○	○	○	○
고혈압 현재치료율	○	○	○	○	○	○	○
고혈압 약물치료율 ¹⁵⁾	○	○	○	○	○	○	○
고혈압 관리교육 이수율	○	○	○	○	○	○	○
고혈압 관리교육 장소	○	○	○	○	○	○	○
혈압 인지율	-	-	-	○	-	○	○
[당뇨병]							
당뇨병 평생 의사진단 경험률 ¹⁶⁾	○	○	○	○	○	○	○
본인 인지 혈당 조절률	-	-	○	○	○	○	○
당뇨병 현재치료율	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 치료율 ¹⁷⁾	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 관리교육 이수율	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 관리교육 장소	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 안질환 합병증검사 수진율	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율	○	○	○	○	○	○	○
혈당 인지율	-	-	-	○	-	○	○
당화혈색소 인지율	-	-	-	-	-	-	○
당화혈색소 검사 횟수	-	-	-	-	-	-	○
[이상지질혈증]							
이상지질혈증(고지혈증 포함) 평생 의사진단 경험률 ¹⁸⁾	○	○	○	○	○	○	○
이상지질혈증(고지혈증 포함) 현재치료율	-	-	-	-	-	-	○
이상지질혈증(고지혈증 포함) 약물치료율	-	-	-	-	-	-	○
총 콜레스테롤 인지율	-	-	-	○	-	○	○

12) '08-'10년 영역: 활동제한 삶의 질

13) '08-'10년 영역: 활동제한 삶의 질

14) '08년 지표명: 고혈압 평생 의사진단 유병률

15) '08년 지표명: 혈압조절약의 정기적 복용률

16) '08년 지표명: 당뇨병 평생 의사진단 유병률

17) '08년 지표명: 당뇨병 관리형태(혈당관리방법)

18) '08년 지표명: 고지혈증 평생 의사진단 유병률, '09-'10년 지표명: 고지혈증 평생 의사진단 경험률

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
[뇌졸중(중풍)]							
뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률 ¹⁹⁾	○	○	○	○	○	○	○
뇌졸중(중풍) 현재치료율	-	-	-	-	-	-	○
뇌졸중(중풍) 후유증 이환율	-	-	-	-	-	-	○
[심근경색증 또는 협심증]							
심근경색증 또는 협심증 평생 의사진단 경험률	-	-	-	-	-	-	○
심근경색증 또는 협심증 현재치료율	-	-	-	-	-	-	○
[관절염]							
관절염 평생 의사진단 경험률 ²⁰⁾	○	○	○	○	○	○	○
관절염 현재치료율	○	○	○	○	○	○	○
관절염 관리교육 이수율	○	○	○	○	○	○	○
관절염 관리교육 장소	○	○	○	○	○	○	○
총계	20	20	22	25	22	25	33

11. 의료이용

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
필요의료서비스 미치료율 ²¹⁾	○	○	○	○	○	○	○
필요의료서비스 미치료 이유	-	-	-	○	○	○	○
필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율 ²²⁾	○	○	○	○	○	○	○
총계	2	2	2	3	3	3	3

19) '08년 지표명: 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 유병률

20) '08년 지표명: 골관절염 평생 의사진단 유병률

21) '10년 치과포함 미치료율

22) '08-'10년 지표명: 경제적 이유로 인한 미치료율

12. 사고 및 중독(손상)

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
연간 사고중독 경험률 ²³⁾	○	○	○	○	○	○	○
연간 사고중독 건수율 ²⁴⁾	○	○	○	○	○	○	○
연간 사고중독 원인 ²⁵⁾	○	○	○	-	-	-	○
계절별 사고중독 경험률 ²⁶⁾	○	○	○	-	-	-	○
의도성 및 비의도성 사고 분포	-	○	○	-	-	-	○
주 치료처별 분포 ²⁷⁾	○	○	○	-	-	-	○
총계	5	6	6	2	2	2	6

13. 활동제한 및 삶의 질

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
양호한 주관적 건강수준 인지율 ²⁸⁾	○	○	○	○	○	○	○
삶의 질 지수(EQ-5D Index)	○	○	○	○	○	○	○
총계	2	2	2	2	2	2	2

14. 보건기관 이용

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
보건기관 이용률	-	○	○	○	○	○	○
총계	-	1	1	1	1	1	1

23) '08년 지표명: 사고중독 발생률

24) '08년 지표명: 연간 사고중독발생 건수율

25) '08-'10년 지표명: 원인별 사고중독 건수율

26) '08-'10년 지표명: 계절별 사고중독 건수율

27) '08년 지표명: 연간 사고중독 치료 의료기관

28) '09-'11년 지표명: 주관적 건강수준 인지율

15. 심정지

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
심폐소생술 인지율	-	-	-	-	○	-	○
심폐소생술 교육 경험률	-	-	-	-	○	-	○
심폐소생술 마네킹 실습 경험률	-	-	-	-	○	-	○
심폐소생술 시행률	-	-	-	-	○	-	○
총계	-	-	-	-	4	-	4

16. 가구조사

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
식품 안정성 확보율 ²⁹⁾	-	○	○	○	○	○	○
총계	-	1	1	1	1	1	1

29) '14년 가구조사문항으로 변경('08-'13년 개인조사문항으로 조사)

참고문헌

1. 질병관리본부, 삶의 질 조사도구(EQ-5D)의 질 가중치 추정 연구 보고서. 2007
2. 보건복지부, 질병관리본부. 2013 국민건강통계, 국민건강영양조사 제6기 1차년도(2013). 2014.
3. 보건복지부, 질병관리본부. 2012 국민건강통계, 국민건강영양조사 제5기 3차년도(2012). 2013.
4. Brownson, R. C. (2011). Evidence-based public health(2nd ed). Oxford ; New York: Oxford University Press.

참여연구진

총괄책임교수	박노례	인제대학교
지역책임교수	이중정	계명대학교
지역부책임교수	정인성	계명대학교
지역담당연구원	최영철	계명대학교
지역담당연구보조원	최정예	계명대학교
	최정인	계명대학교
	김미정	계명대학교
	제순경	울주군보건소
조사관리담당관	이원주	울주군보건소
	박은경	울주군보건소
	박현주	울주군보건소
	이채빈	울주군보건소

2014년 울산광역시 울주군 지역사회 건강통계

발 행 : 2015. 3.

발 행 인 : 신 장 열 (울산광역시 울주군수)

편 집 인 : 이 중 정 (계명대학교)

발 행 처 : 기 관 명 울산광역시 울주군보건소

홈페이지 <http://health.ulju.ulsan.kr/main/main.asp>

주 소 (689-812) 울산광역시 울주군 삼남면 서향교1길 67-12

전화번호 (052) 229-8048

팩 스 (052) 229-8049

이 책은 울산광역시 울주군보건소에 소유권이 있습니다. 울산광역시 울주군보건소
승인 없이 상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.