

발 간 등 록 번 호

11-1352477-000174-10

ISSN 2092-2876
통계승인번호 제 11775호

울산광역시 울주군

2008 > 2009 > 2010 > 2011 > 2012 > 2013 > 2014

지역사회 건강통계 2015



Community Health Survey



발간사



안녕하십니까?

울주군 보건소장 김홍식입니다.

건강하고 행복한 삶을 누리고자 하는 것은 모든 국민의 기본적인 욕구이나 우리국민의 사망원인 1, 2위인 암, 심뇌혈관 질환 그리고 고혈압, 당뇨병과 같은 만성질환이 늘어나고 있는 실정입니다.

또한 지난해는 신종감염병인 ‘메르스’ 폭풍으로 전국민의 안전을 위협하기도 했습니다. 다행히 우리군은 발빠른 대응으로 메르스 청정지역을 유지할 수 있었으나 국민의 보건을 위협하는 질병의 대상이 날이 갈수록 다양해지고 있습니다.

질병에 걸렸을 때 지속적인 치료도 중요하지만 자신의 신체에 대한 정확한 검진과 관리를 통해 질병에 걸리지 않도록 하는게 더욱 중요한 시점이므로 보건소에서는 사전 예방적 기능 중심의 건강증진사업을 지속적으로 추진해나갈 것입니다.

이번 지역사회 건강통계를 통해 지난 8년간 축적된 결과를 비교분석하여 우리 군민의 건강행태, 질병의 이환상태와 삶의 질에 대한 사실에 근거한 자료를 중심으로 군민의 욕구와 필요를 충족시킬 수 있도록 군민의 건강문제에 보다 적극적으로 대응하고 수준 높은 보건의료사업을 펼쳐나가도록 하겠습니다.

이 조사를 위해 협력해 주신 계명대학교 관계자분들과 조사원 그리고 성실하게 조사에 참여해 주신 관계자들께 심심한 감사를 드립니다.

감사합니다.

2016. 3.

울산광역시 울주군보건소장 김 홍 식



발간에 즈음하여

2008년을 기점으로 시작한 『지역사회 건강조사』가 어느덧 여덟 번째 조사가 완료되었습니다. 2015년에도 울산광역시 울주군 주민들의 건강조사결과 통계집을 발간하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다.

지역사회건강조사는 지역주민의 건강수준, 흡연율, 음주율 등 건강관련통계를 매년 생산하고 있습니다.

이 소중한 정보를 활용하여 전국 혹은 타 시, 군과 결과를 비교분석, 우리 지역보건사업의 우선순위를 결정하는 데에도 활용할 수 있을 것입니다. 또한 우리 울주군이 그 기간 동안의 변화를 바탕으로 보건사업을 새로이 시작할지, 확대할지, 축소하여도 좋을지 등의 판단도 가능할 것으로 생각합니다.

선진국에서는 정책의 윤리성을 강조합니다. 이는 지역주민의 세금으로 운영되는 모든 지역사업의 계획과 평가는 사실과 근거를 바탕으로 하여 수행하여야 한다는 의미일 것입니다. 주민의 건강행태, 질병의 이환상태와 삶의 질에 대한 사실에 근거한 계획과 보건사업의 평가만이 탁상공론과 선심성 의사결정에 의한 낮은 지역보건사업의 수준을 극복하고, 매해 실제 주민들을 대상으로 파악한 현황 및 요구를 바탕으로 하여 지역 주민의 요구와 필요를 충족시킴으로써, 주민의 건강문제를 해결 할 수 있는 높은 수준의 보건사업을 펼칠 수 있을 것입니다.

지역사회건강조사 결과가 주민들에게 더욱 홍보되고 건강에 대한 지역사회의 관심을 고취시켜 울주군이 더욱 건강하고 행복한 지역사회가 되기 위한 초석이 되기를 바랍니다.

소중한 자료의 수집을 위하여 여러 어려움에도 불구하고, 묵묵히 성공적인 조사를 함께 수행한 울산 울주군 조사원 여러분과 조사에 응해 주신 울주군 구민 여러분께 감사드립니다.

그리고 어려운 조사에 격려를 아끼지 않으시고 아낌없는 행정적인 지원을 해주신 울주군 보건소장님 이하 계장님, 사업 담당자 여러분들께 깊은 감사를 드립니다. 마지막으로 통계집이 나올 수 있도록 애써주신 계명대학교 연구진 들께도 감사드립니다.



2016. 3.

계명대학교 의과대학 책임교수 이 중 정

이용자를 위하여



- ❖ 본 통계집은 2015. 8. 31. - 2015. 11. 8. 울산광역시 울주군에서 실시된 지역사회건강조사 결과를 수록한 자료입니다.
- ❖ 본 통계집에 제시된 추정치는 가중치를 적용한 결과(조율)이며, 가중치는 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율, 개인응답률, 당해 연도 모집단 성·연령별 인구 구성비를 반영하여 산출하였습니다.
- ❖ 2부 주요통계결과에서 2011-2015년 비교 가능한 지표(표준화율)에 대해서 당해 연도의 전체·성·연령별 그래프와 함께 울주군 및 울산광역시의 연도별 추이 그래프를 제시하였으며, 증감 현황을 기술하였습니다. 지표정의가 변경된 경우 변경내용을 각주로 표시하였으며, 해당 연도 통계치는 연도별 추이 그래프에서 제외하였습니다. 조사문항 변경내용은 제4부 부록 <연도별 문항비교표>에서 확인하실 수 있습니다.
- ❖ 제3부 통계표에서는 당해 연도에 선정된 주요지표의 상세분석결과를 제시하였으며, 주요지표를 포함한 모든 산출지표의 통계표는 엑셀파일 형태로 지역사회건강조사 홈페이지(<http://chs.cdc.go.kr>) 자료실에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
- ❖ 본 자료 중 2008-2014년 수치는 응답의 이상치와 논리적 오류를 수정하여 산출된 결과로 기 발간된 보고서의 수치와 일부 다를 수 있습니다.
- ❖ 분석대상자 수(N)가 20명 미만인 경우 제2부 주요통계결과에서 제시하지 않았으며 제3부 통계표에서 해당 값을 하이픈(-)으로 처리하였습니다. 변동계수(또는 상대표준오차, Coefficient of Variation, CV)가 30%이상인 경우 추정치의 신뢰도가 낮다는 것을 의미하므로, 변동계수가 30% 이상인 경우에 결과해석 시 주의를 바랍니다.
- ❖ 통계표에 수록된 숫자는 소수점 두 번째 자리에서 반올림되었으며, 반올림된 수치의 총계가 일치하지 않을 수 있으나 이는 통계표의 오류가 아닙니다.
- ❖ 본 통계집 및 조사표, 지침서 등 기타 지역사회건강조사 관련 자료는 지역사회건강조사 홈페이지 「자료실」에서 다운로드 받으실 수 있으며, 2008년부터 2014년까지의 지역사회건강조사 원시자료는 홈페이지를 통한 신청 및 승인절차를 통해 제공하고 있습니다.
- ❖ 수록된 자료 및 지역사회건강조사에 관한 문의는 울주군보건소(☎052-229-8048), 계명대학교(☎053-580-3896)로 해주시기 바랍니다.



용어정의

1 통계

Community Health Survey

① 모집단(Population)

조사대상이 되는 집단 전체

② 표본(Sample)

모집단 중 조사를 위해 추출된 일부 집단

③ 표본오차(Sampling Error)

모집단 중 일부를 표본으로 선정하여 조사함에 따라 발생하는 오차로서 표본조사의 정확성을 나타내는 척도

④ 비표본오차(Non-Sampling Error)

표본추출을 제외한 조사 설계, 조사 수행, 자료 집계 및 분석 과정에서 발생하는 오차로서 불명확한 조사개념, 조사문항의 객관성 결여, 조사지 구성의 논리적 오류, 면접방법, 조사원의 자질, 조사원을 감독하는 관리자의 태도, 조사대상자의 무응답, 자료 코딩 등이 비표본오차의 주요 발생 원인에 해당

⑤ 조율(Crude Rate)

총 발생건수를 전체 모집단으로 나눈 값으로, 모집단의 성·연령별 등의 인구 집단 특성을 보정하지 않은 통계치

⑥ 표준화율(Standardized Rate)

비교하고자 하는 집단 간 인구 구조 차이를 보정한 통계치



⑦ 표준오차 (Standard Error, SE)

각 표본들의 평균이 모집단의 평균과 얼마만큼의 차이가 있는지 나타내는 값

⑧ 변동계수 (Coefficient of Variation, CV)

표준오차를 평균으로 나눈 값(표준오차/추정치 $\times 100$)으로 통계치의 신뢰도를 나타내는 척도이며, 변동계수와 통계치의 신뢰도는 반비례 관계

⑨ 가중치 (Weight)

전체집단에서 개별 구성요소가 차지하는 비중이나 중요도를 수치로 나타내는 값

2 조사

Community Health Survey

① CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

컴퓨터를 이용하여 조사 자료를 수집하는 방식으로, 조사원이 전자조사표가 설치된 노트북으로 면접조사를 수행 시, 조사현장에서 직접 자료입력, 수정, 저장 및 전송 가능

② 순환조사체계

타당도, 활용성 및 수행 가능성을 고려하여 조사항목의 조사주기를 1년, 2년, 4년으로 구분하여 조사하는 체계

③ 지역보건지표뱅크

지역사회에서 보건사업 추진 시 활용 가능한 조사문항 및 산출지표를 수집·정리한 것으로 지표별 조사문항 및 응답보기, 지표정의, 산출식, 조사주기 등 상세정보 포함

CONTENTS



발간사	
발간에 즈음하여	
이용자를 위하여	
용어정의	
2015년 울주군 주요 건강지표 요약	2
우리 지역사회의 주요 건강이슈	4

제1부 조사체계

I. 조사개요	9
1. 조사목적	10
2. 조사방법	10
3. 조사내용	10
4. 표본설계	12
5. 조사체계	12
6. 자료관리	13
7. 조사현황	14
II. 통계 추정방법	17
1. 가중치의 사용	18
2. 자료처리	19
3. 분산추정	20

제2부 주요통계결과

I. 건강행태	23
1. 흡연	24
2. 음주	38
3. 안전의식	42
4. 운동 및 신체활동	44
5. 식생활	48
6. 비만 및 체중조절	52
7. 구강건강	56
8. 정신건강	62
II. 예방접종 및 검진	67
1. 예방접종	68
2. 검진	68
III. 이환 및 의료이용	71
1. 만성·급성질환 및 사고중독 경험률	72
2. 주요 질환별 평생 의사진단 경험률 및 관리행태	74
3. 의료이용	84
IV. 사고 및 중독	87
1. 연간 사고중독 경험률	88
2. 연간 낙상 경험률	88

● ● Community Health Survey

V. 활동제한 및 삶의 질 91

1. 양호한 주관적 건강수준 인지율 92

VI. 보건기관 이용 95

1. 보건기관 서비스 만족도 96

VII. 여성건강 99

1. 출산 경험률 100

2. 모유수유 경험률 100

제3부 통계표

I. 통계표 105

제4부 부록

I. 개인조사표 177

II. 가구조사표 215

III. 지표정의 219

IV. 2008-2015 산출지표 251

참여연구진 260

CONTENTS



〈표목차〉

〈표 1〉 2015년 지역사회건강조사 주요지표 결과	2
〈표 2〉 2015년 전국공통 조사항목	10
〈표 3〉 2015년 울산광역시 지역선택 조사항목	11
〈표 4〉 동/읍·면별 표본지점 분포	12
〈표 5〉 조사현황	14
〈표 6〉 가구당 조사인원 수	14
〈표 7〉 2015년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성	15
〈표 8〉 2015년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성	16
〈표 9〉 가구가중치 산출 예	18
〈표 10〉 개인가중치 산출 예	19
〈표 11〉 보정가중치 산출 예	19
〈표 12〉 교육수준분류	20
〈표 13〉 직업분류	20

● ● Community Health Survey

〈그림목차〉

〈그림 1〉 2015년 주요지표 결과 비교 - 긍정적 지표	5	〈그림 25〉 금연클리닉 또는 금연상담전화 인지를	37
〈그림 2〉 2015년 주요지표 결과 비교 - 부정적 지표	5	〈그림 26〉 월간음주율	39
〈그림 3〉 표본선정과정	12	〈그림 27〉 음주시작연령	39
〈그림 4〉 수행체계	13	〈그림 28〉 고위험음주율	39
〈그림 5〉 수행과정	13	〈그림 29〉 연간 음주문제로 인한 상담 경험률	41
〈그림 6〉 전화점검 절차	13	〈그림 30〉 평생 음주예방 교육 경험률	41
〈그림 7〉 가중치 산출 과정	18	〈그림 31〉 운전 시 안전벨트 착용률	43
〈그림 8〉 현재흡연율	25	〈그림 32〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 ·	43
〈그림 9〉 흡연시작연령	25	〈그림 33〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)	43
〈그림 10〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량 ·	25	〈그림 34〉 격렬한 신체활동 실천율	45
〈그림 11〉 현재흡연자의 금연시도를	27	〈그림 35〉 중등도 신체활동 실천율	45
〈그림 12〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률	27	〈그림 36〉 중등도 이상 신체활동 실천율	45
〈그림 13〉 연간 금연교육 경험률	27	〈그림 37〉 걷기 실천율	47
〈그림 14〉 연간 금연캠페인 경험률	29	〈그림 38〉 월간 규칙적 운동실천율	47
〈그림 15〉 금연구역 인지를	29	〈그림 39〉 저염선택율(2015)	49
〈그림 16〉 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률	29	〈그림 40〉 저염선택율(연도비교)	49
〈그림 17〉 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률	31	〈그림 41〉 영양표시 활용률	49
〈그림 18〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률	31	〈그림 42〉 식품 안정성 확보율	51
〈그림 19〉 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률	31	〈그림 43〉 저염식 실천 노력 경험률	51
〈그림 20〉 현재흡연자의 의료인 금연권고 경험률	33	〈그림 44〉 연간 영양교육 및 상담 수혜율 ·	51
〈그림 21〉 담뱃값 인상 영향 경험률	33	〈그림 45〉 비만을	53
〈그림 22〉 담뱃값 인상 영향 유형	33	〈그림 46〉 주관적 비만인지를	53
〈그림 23〉 금연정책 강화 필요 영역	35	〈그림 47〉 연간 체중조절 시도율	55
〈그림 24〉 금연구역 법률 인지를	35	〈그림 48〉 체중조절 시도방법	55
		〈그림 49〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	57
		〈그림 50〉 저작불편호소율(65세 이상)	57
		〈그림 51〉 틀니이용행태(50세 이상) (2015) ·	57
		〈그림 52〉 치솔질 실천율	59

CONTENTS



〈그림목차〉

〈그림 53〉 연간 구강검진 수진율	61	〈그림 75〉 연간 평균 혈압 측정횟수	83
〈그림 54〉 연간 스케일링 경험률	61	〈그림 76〉 연간 평균 혈당 측정횟수	83
〈그림 55〉 스트레스 인지율	63	〈그림 77〉 혈당인지율	83
〈그림 56〉 우울감 경험률	63	〈그림 78〉 연간 필요의료서비스 미치료율	85
〈그림 57〉 자살생각률	65	〈그림 79〉 연간 사고중독 경험률	89
〈그림 58〉 자살생각으로 인한 정신상담률	65	〈그림 80〉 연간 낙상 경험률	89
〈그림 59〉 자살시도율	65	〈그림 81〉 양호한 주관적 건강수준 인지율	93
〈그림 60〉 연간 인플루엔자 예방접종률	69	〈그림 82〉 보건기관 서비스 만족도	97
〈그림 61〉 건강검진 수진율	69	〈그림 83〉 출산 경험률	101
〈그림 62〉 암 검진율	69	〈그림 84〉 모유수유 경험률	101
〈그림 63〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률	73		
〈그림 64〉 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)	75		
〈그림 65〉 고혈압 약물치료율(≥30)	75		
〈그림 66〉 고혈압 관리교육 이수율(≥30)	75		
〈그림 67〉 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)	77		
〈그림 68〉 당뇨병 치료율(≥30)	77		
〈그림 69〉 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)	77		
〈그림 70〉 연간 당뇨병 안정한 합병증 검사 수진율(≥30)	79		
〈그림 71〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사 수진율(≥30)	79		
〈그림 72〉 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)	81		
〈그림 73〉 관절염 관리교육 이수율(≥50)	81		
〈그림 74〉 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30)	81		

●● Community Health Survey

〈통계표목차〉

〈표 1〉 현재흡연을	106	〈표 25〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 ..	130
〈표 2〉 흡연시작연령	107	〈표 26〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는	
〈표 3〉 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량 ..	108	오토바이)	131
〈표 4〉 현재흡연자의 금연시도율	109	〈표 27〉 격렬한 신체활동 실천율	132
〈표 5〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률 ..	110	〈표 28〉 중등도 신체활동 실천율	133
〈표 6〉 연간 금연교육 경험률	111	〈표 29〉 중등도 이상 신체활동 실천율	134
〈표 7〉 연간 금연캠페인 경험률	112	〈표 30〉 걷기 실천율	135
〈표 8〉 금연구역 인지율	113	〈표 31〉 월간 규칙적 운동실천율	136
〈표 9〉 현재흡연자의 금연구역 내 흡연		〈표 32〉 저염선호율	137
경험률	114	〈표 33〉 영양표시 활용률	138
〈표 10〉 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연		〈표 34〉 식품안전성 확보율	139
노출률	115	〈표 35〉 저염식 실천 노력 경험률	140
〈표 11〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연		〈표 36〉 연간 영양교육 및 상담 수혜율	141
노출률	116	〈표 37〉 비만도 분포 및 비만율	142
〈표 12〉 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연		〈표 38〉 주관적 비만인지율	143
노출률	117	〈표 39〉 연간 체중조절 시도율	144
〈표 13〉 현재흡연자의 의료인 금연권고		〈표 40〉 체중조절 시도방법	145
경험률	118	〈표 41〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	146
〈표 14〉 담뱃값 인상 영향 경험률	119	〈표 42〉 저작불편호소율 : 65세 이상	147
〈표 15〉 담뱃값 인상 영향 유형	120	〈표 43〉 틀니 이용 행태 : 50세 이상	148
〈표 16〉 금연정책 강화 필요 영역	121	〈표 44〉 치솔질 실천율	149
〈표 17〉 금연구역 법률 인지율	122	〈표 45〉 연간 구강검진 수진율	150
〈표 18〉 금연클리닉 또는 금연상담전화		〈표 46〉 연간 스케일링 경험률	151
인지율	123	〈표 47〉 스트레스 인지율	152
〈표 19〉 월간 음주율	124	〈표 48〉 우울감 경험률	153
〈표 20〉 음주시작연령	125	〈표 49〉 자살생각률	154
〈표 21〉 고위험 음주율	126	〈표 50〉 자살생각으로 인한 정신상담률	155
〈표 22〉 연간 음주문제로 인한 상담경험률 ..	127	〈표 51〉 자살시도율	156
〈표 23〉 평생 음주예방 교육 경험률	128	〈표 52〉 연간 인플루엔자 예방접종률	157
〈표 24〉 운전 시 안전벨트 착용률	129		


CONTENTS



〈통계표목차〉

〈표 53〉 건강검진 수진률	158
〈표 54〉 암 검진율	159
〈표 55〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률	160
〈표 56〉 고혈압 평생 의사진단 경험률	161
〈표 57〉 고혈압 약물치료를	161
〈표 58〉 당뇨병 평생 의사진단 경험률	162
〈표 59〉 당뇨병 치료를	162
〈표 60〉 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사 수진율 및 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사 수진율	163
〈표 61〉 관절염 평생의사진단 경험률	163
〈표 62〉 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률	164
〈표 63〉 고혈압 관리교육 장소 및 고혈압 관리교육 이수율	165
〈표 64〉 당뇨병 관리교육 장소 및 당뇨병 관리교육 이수율	165
〈표 65〉 관절염 관리교육 장소 및 관절염 관리교육 이수율	166
〈표 66〉 연간 평균 혈압 및 혈당 측정횟수 ..	167
〈표 67〉 혈당 인지율	168
〈표 68〉 필요의료서비스 미치료를 및 필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료를	169
〈표 69〉 연간 사고중독 경험률	170
〈표 70〉 연간 낙상 경험률	171
〈표 71〉 양호한 주관적 건강수준 인지율	172
〈표 72〉 보건기관 서비스 만족도	173
〈표 73〉 출산 경험률 및 모유수유 경험률 ..	174

요약



2015년 울주군 주요 건강지표 요약

2015년 울산광역시 울주군 지역사회건강조사 주요지표 추이 및 울산광역시와 전국 보건소중위수(2사분위수)와 비교한 결과는 <표 1>과 같다.

<표 1> 2015년 지역사회건강조사 주요지표 결과

(단위 : %, 조율(표준오차))

분류	영역	산출지표	지역사회건강조사				울산	전국
			2012	2013	2014	2015		
I. 건강행태	흡연	현재흡연율	24.3(1.3)	21.9(1.2)	22.2(1.4)	23.0(1.4)	21.4(0.7)	20.9
		남자 현재흡연율	45.4(2.5)	41.8(2.1)	41.5(2.8)	41.6(2.3)	39.4(1.1)	38.8
		현재흡연자의 1개월 내 금연계획률	4.6(1.3)	6.8(1.8)	4.2(1.6)	5.2(1.7)	8.4(1.0)	7.7
		현재흡연자의 금연시도율	18.1(2.8)	15.7(3.0)	15.1(3.1)	30.8(3.3)	37.7(1.8)	33.7
		연간 금연캠페인 경험률	66.4(1.8)	77.8(2.4)	—*****	87.5(1.1)	87.6(0.5)	87.6
		연간 금연교육 경험률	3.3(0.6)	8.6(1.1)	—*****	9.7(1.0)	10.4(0.5)	6.3
	음주	월간음주율	50.2(1.6)	53.1(2.0)	57.9(1.8)	56.5(1.6)	63.6(0.8)	57.4
		고위험음주율	15.0(1.8)	21.8(1.8)	20.2(1.6)	20.2(1.6)	19.1(0.7)	19.4
	안전의식	운전 시 안전벨트 착용률	77.4(2.1)	85.9(1.3)	78.5(2.0)	77.5(1.9)	82.7(0.8)	80.5
		동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	76.7(1.6)	88.5(2.0)	70.7(2.1)	73.9(1.9)	76.3(0.8)	72.9
	신체활동	중등도 이상 신체활동 실천율	21.8(1.6)	20.9(1.8)	29.3(2.2)	23.8(1.6)	22.7(0.7)	22.1
		걷기 실천율	41.3(1.7)	50.4(3.6)	49.4(2.3)	52.8(2.3)	44.4(0.9)	40.3
	비만 및 체중조절	비만율	23.7(1.4)	26.4(1.4)	23.5(1.5)	25.8(1.5)	25.7(0.7)	26.5
		주관적 비만인지율	31.8(1.7)	31.5(1.8)	36.7(1.7)	36.8(1.8)	42.1(0.9)	38.1
		체중조절 시도율	35.1(1.8)	58.0(2.2)	52.5(1.8)	54.8(1.6)	60.4(0.8)	57.3
	구강건강	저작불편호소율(≥65)	48.6(5.4)	46.6(3.9)	46.3(4.0)	42.2(3.7)	43.1(2.1)	46.4
	정신건강	스트레스 인지율	33.9(1.7)	21.8(2.4)	27.3(1.9)	23.8(1.8)	22.9(0.7)	26.7
		우울감 경험률	3.8(0.8)	3.8(0.7)	4.8(0.8)	3.3(0.7)	4.8(0.3)	6.1
II. 예방접종 및 검진		연간 인플루엔자 접종률	41.0(1.9)	37.4(1.7)	33.5(1.9)	36.2(1.9)	38.7(0.9)	40.1
		건강검진 수검률	66.6(1.6)	—*****	65.2(1.6)	64.8(2.0)	69.8(0.8)	67.5
		암 검진율	36.0(1.7)	—*****	43.8(1.6)	49.7(2.0)	51.0(0.9)	54.9
III. 이환 및 의료이용		고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)	17.4(1.1)	19.9(1.6)	20.8(1.6)	22.7(1.7)	20.1(0.7)	24.8
		고혈압 약물치료율(≥30)	89.5(3.8)	84.1(3.6)	89.1(2.1)	83.0(3.0)	82.7(1.4)	89.5
		당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)	8.0(0.8)	7.9(1.0)	9.6(1.0)	10.0(1.1)	8.3(0.5)	10.0
		당뇨병 치료율(≥30)	81.2(5.3)	91.9(2.7)	85.8(4.4)	85.7(4.2)	87.6(1.8)	87.6
		당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)	39.6(5.8)	37.1(5.0)	30.0(5.2)	45.8(4.4)	35.4(2.6)	34.1
		당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)	51.0(5.7)	31.0(4.8)	36.0(5.2)	37.1(7.5)	36.1(3.0)	39.4

분류	영역	산출지표	지역사회건강조사				울산	전국
			2012	2013	2014	2015		
		관절염 평생 의사진단 경험률(≥ 50)	11.7(1.5)	20.8(1.8)	18.1(2.0)	12.7(1.3)	12.5(0.7)	20.1
		연간 필요의료서비스 미치료율	8.7(1.1)	7.2(1.5)	11.1(1.1)	6.0(0.9)	7.7(0.5)	11.8
IV. 사고 및 중독(손상)		연간 사고중독 경험률	7.6(0.9)	4.5(1.0)	2.8(0.5)	7.4(0.8)	7.4(0.4)	8.1
V. 삶의 질		양호한 주관적 건강수준 인지율	49.8(2.1)	51.0(3.2)	42.0(2.0)	48.0(1.8)	42.4(0.8)	40.6

-* : 문항 다름, -** : 산출식 다름, -*** : 문항 및 산출식 다름, -**** : 조사방법 다름, -***** : 산출 안함, -***** : 조사 안함

우리 지역사회의 주요 건강이슈

1. 주요지표 비교분석


주요 지표에 대하여 울산광역시 울주군의 표준화율을 전국 보건소의 표준화율 중앙값과 비교하였다. <그림 1>과 <그림 2>은 각각 긍정적 지표와 부정적 지표에 대하여 울산 울주군과 전국의 결과를 비교한 차트이다. 긍정적 지표는 높은 값을 긍정적으로 해석할 수 있는 지표이며, 부정적 지표는 낮은 값이 긍정적인 지표이다. 각 지표의 전국 중앙값을 1로 환산하였을 때 울산광역시 울주군의 상대적인 지표값을 표시한 그래프이다.

가. 건강행태


- 흡연: 현재흡연율(1.05)은 전국 중앙값과 유사한 반면 흡연자의 금연시도율(0.88)과 흡연자의 1개월 내 금연계획률은 0.58로 전국 중앙값에 비해 낮게 나타났다.
- 음주: 월간 음주율과 고위험음주율은 각각 0.95로 전국 중앙값과 비슷하게 나타났다.
- 안전의식: 운전자의 안전벨트 착용률(0.94)은 전국 중앙값에 비해 낮게 나타났으며 동승 차량 앞좌석 안전벨트 착용률(1.02)은 전국 중앙값과 유사했다.
- 운동 및 신체활동: 격렬한 신체활동을 포함한 중등도 이상의 신체활동 실천율(1.06)과 걷기 실천율(1.32)은 모두 전국 중앙값보다 높았다.
- 비만 및 체중조절: 비만율(0.95)은 전국 중앙값과 유사하였으며 주관적 비만인지율(0.94)은 전국 중앙값에 비해 낮은 수준을 보였다.
- 구강건강: 65세 이상 인구의 저작불편 호소율은 0.85로 전국 중앙값보다 낮게 나타났으며, 점심식사 후 칫솔질 실천율은 1.07로 전국 중앙값에 비해 높았다.
- 정신건강: 스트레스 인지율(0.88)과 우울감 경험률(0.60)은 모두 전국 중앙값에 비해 낮게 나타났다.
- 연간 인플루엔자 예방접종률은 0.96으로 전국 중앙값과 비슷하게 나타났다.

나. 이환의료이용, 사고·중독

- 이환의료이용: 30세 이상의 고혈압 평생 의사진단 경험률(1.03)과 30세 이상의 고혈압 약물치료율(0.97)은 전국 중앙값과 유사하였다. 30세 이상의 당뇨병 평생 의사진단 경험률(1.1)은 전국 중앙값에 비해 높게 나타났으며 당뇨병치료율(0.97)은 전국 중앙값과 비슷하게 나타났다. 당뇨병 안질환 합병증 검사 수진율은 1.32로 전국 중앙값에 비해 높았고, 당뇨병 신장질환 합병증 수진율은 0.93으로 전국 중앙값보다 낮았다.
- 사고·중독: 연간 사고중독 경험률은 0.94로 전국 중앙값에 비해 낮게 나타났다.



〈그림 1〉 2015년 주요지표 결과 비교 - 긍정적 지표



〈그림 2〉 2015년 주요지표 결과 비교 - 부정적 지표

제1부 조사체계

I. 조사개요


II. 통계 추정방법



제 1 부 조사체계

I. 조사개요

1. 조사목적
2. 조사방법
3. 조사내용
4. 표본설계
5. 조사체계
6. 자료관리
7. 조사현황



I. 조사개요

1. 조사목적

1995년 지방자치단체의 보건사업계획 수립을 의무화하는 지역보건법이 제정되었으나 시·군·구 단위의 대표성과 신뢰성 있는 통계가 부재한 상황이었다. 이에 질병관리본부에서는 지역보건법 제4조(지역사회 건강실태조사) 및 동법시행령 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)에 의거, 지역보건의료계획 수립 및 보건사업수행에 필요한 건강통계를 생산하기 위하여 2008년 이후 매년 시·군·구에서 지역사회건강조사를 수행하고 있다. 생산된 통계자료는 지역보건의료계획 수립 및 보건사업의 성과를 평가하는 자료로 활용되고 있다.

2. 조사방법

가. 조사대상

조사시점 표본가구에 거주하는 만 19세 이상 가구원(1996년 7월 31일 이전 출생자)

나. 조사시기

2015년 8월 31일 - 11월 8일

다. 조사방법

조사원이 표본가구를 방문하여 노트북에 탑재된 전자조사표를 이용해 조사대상자와 1:1 면접 조사하는 방법

3. 조사내용

지역사회건강조사에서는 2010년부터 4년 주기의 순환조사체계를 도입하여 지표의 중요도와 활용성, 표본의 크기 등을 고려하여 각각의 조사항목을 1년, 2년, 4년 주기로 구분하여 조사하고 있다.

2014년부터 제3기 순환조사가 시작되었으며, 전국의 모든 시·군·구에서 조사하는 전국공통문항 외에 각 시·도별로 지역선택문항을 선정하여 조사하였다.

가. 전국공통 조사항목

총 19개 영역, 총 198개 문항으로 구성된 전국공통조사표는 가구원 대표 1인이 참여하는 가구조사와 만 19세 이상 가구원이 참여하는 개인조사로 구성하였다.

개인조사 영역에는 건강행태(흡연, 음주, 안전의식, 운동 및 신체활동, 식생활, 비만 및 체중조절, 구강건강, 정신건강), 예방접종 및 검진, 이환, 의료이용, 사고 및 중독, 활동제한 및 삶의 질, 보건기관 이용, 사회 물리적 환경, 개인위생, 여성건강, 교육 및 경제활동이 포함되었다.

〈표 2〉 2015년 전국공통 조사항목

영역		조사항목
가구조사		세대유형, 기초생활수급자, 소득, 치매환자 동거여부, 가구식품안정성, 다문화가구
개 인 조 사	흡연	평생흡연, 현재흡연, 흡연시작연령, 금연기간, 금연 시도 및 금연계획, 금연이유 및 방법, 간접흡연, 금연캠페인 및 금연교육, 금연구역, 금연권고, 담뭍값 인상 영향, 금연정책, 전자담배 사용, 다른 담배 제품 사용

영역	조사항목
음주	평생음주, 음주시작연령, 음주빈도, 음주량, 음주폐해, 절주 및 금주시도
안전의식	안전벨트 착용, 음주운전, 음주운전자량 동승, 스쿨존 과속운전
운동 및 신체활동	격렬한 신체활동, 중등도 신체활동, 걷기, 유연성 운동, 근력 운동, 앉아서 보내는 시간
식생활	아침식사, 저염선택, 영양표시
비만 및 체중조절	키, 몸무게, 본인인지체형, 체중조절
구강건강	주관적 구강건강, 저작불편, 치솔질, 구강 검진, 스케일링, 치과진료, 잇몸 건강
정신건강	수면시간, 스트레스, 우울감
검진	건강검진, 암 검진
예방접종	인플루엔자 예방접종
이환	만성·급성질환 및 사고중독 경험, 만성질환별 이환 및 관리행태 *고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 관절염, 천식, 알레르기비염, 아토피피부염
의료이용	의료서비스 미수진 경험, 미수진 이유
사고 및 중독	사고중독 경험, 낙상 경험
활동제한 및 삶의 질	주관적 건강수준, 삶의 질 지수(EQ-5D)
보건기관 이용	보건기관 이용
사회 물리적 환경	사회 물리적 환경, 사회적 연결망, 사회적 활동, 광역시·도 및 시·군·구 거주기간
개인위생	손 씻기 감염병 예방인지, 손 씻기 실천, 비누 혹은 세정제 사용 여부, 올바른 손 씻기 교육 및 홍보 경험
여성건강	현재 가임기 여부
교육 및 경제활동	직업, 학력, 혼인상태

개
인
조
사

나. 지역선택 조사항목

〈표 3〉 2015년 울산광역시 지역선택 조사항목

영역	조사항목
흡연	금연클리닉·금연상담전화 인지율, 전자담배 사용 기간
음주	음주문제로 인한 상담경험률, 평생 음주예방 교육 경험률
운동 및 신체활동	월간 규칙적 운동실천율
식생활	저염식 실천 노력 경험률, 영양교육 및 상담 수혜율
비만 및 체중조절	체중조절 방법
정신건강	자살생각률, 자살생각으로 인한 정신상담률, 자살시도율
이환	연간 평균 혈압 측정횟수, 연간 평균 혈당 측정횟수, 혈당인지율
보건기관 이용	보건기관 서비스 만족도
여성건강	출산경험률, 모유수유 경험률

4. 표본설계

가. 모집단

(1) 목표 모집단은 2015년 7월 기준으로 시·군·구에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.

(2) 조사 모집단은 시·군·구의 동·읍·면 내 통·반·리의 표본지점을 1차 추출단위로 하며, 선정된 통·반·리의 표본지점 내 주거용 주택(아파트, 일반주택)에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.


나. 표본추출

(1) 1차 추출(표본지점)

통·반·리 내 주택유형별 가구 수를 기준으로 주민등록인구자료와 주택자료를 연계하여 작성된 표본추출틀에서 각 동·읍·면 별로 할당된 표본지점을 추출하는데, 이때 통·반·리를 명칭기준으로 정렬한 후 가구 수 크기를 고려하여 추출확률이 비례하도록 추출하였다.

(2) 2차 추출(표본가구)

표본가구는 표본지점으로 선정된 통·반·리의 가구 수를 파악하여 계통추출법으로 선정하였다. 이 때 통·반·리의 규모가 커서 2개 이상의 표본지점이 할당된 경우 표본오차를 최소화하기 위해 표본가구가 가능한 고르게 분포하도록 하였다. 최종적으로 표본지점별로 평균 5개 가구를 표본가구로 선정하였다.



〈그림 3〉 표본선정과정

〈표 4〉 동·읍·면별 표본지점 분포


동·읍·면	전체 가구 수			표본지점 수		
	아파트	일반	합계	아파트	일반	합계
읍·면지역	39,431	34,488	3,919	43	45	88
두동면	-	1,440	1,440	-	3	3
두서면	-	1,377	1,377	-	3	3
범서읍	19,179	3,430	22,609	21	3	24
삼남면	3,285	3,257	6,542	4	4	8
삼동면	-	777	777	-	2	2
상북면	1,078	2,087	3,165	1	3	4
서생면	282	2,948	3,230	-	5	5
연양읍	4,634	4,548	9,182	6	5	11
온산읍	2,392	6,149	8,541	3	7	10
온양읍	4,977	3,816	8,793	6	4	10
웅촌면	1,173	2,027	3,200	1	3	4
청량면	2,431	2,632	5,063	1	3	4
합계	39,431	34,488	73,919	43	45	88

5. 조사체계

가. 수행체계

질병관리본부는 지역사회건강조사 사업계획을 수립하여 시·도에 배포하고, 표본설계, 조사문항 및 지침표준화, 교육 및 홍보물 개발 등의 사업수행과 관련한 기술지원을 하였다. 사업 관련 주요 현안에 대한 검토 및 심의는 시·도 및 책임대학교 위원회, 전문분과위원회로 구성된 운영위원회를 통해 이루어졌다.


시·도는 권역대표대학교를 지정하여 지역사회건강조사 수행을 위한 지역 거점센터를 운영하고, 중앙정부로부터 사업예산을 받아 시·군·구 보건소로 배정하는 역할을 담당하여 수행하였다. 시·군·구 보건소는 책임대학교와 협약을 체결하고, 조사수행 관련한 행정지원을 하였다.



〈그림 4〉 수행체계

나. 수행과정

질병관리본부에서 설문지 개발 및 표본추출을 담당하였고, 책임대학교에서 조사원 교육을 실시하였다. 조사원은 가구선정통지서 발송 1-2주 후 표본 가구를 방문하여 면접조사를 진행하여 조사자료를 중앙서버로 전송하였다. 이후 질병관리본부의 조사 자료 확인 및 책임대학교의 자료분석 절차를 거쳐 통계집을 발간하였다.



〈그림 5〉 수행과정

6. 자료관리


가. 콜센터 운영

2015년 지역사회건강조사에서는 조사원에게 표준화된 조사수행 및 조사문항지침을 전달하고자 책임대학교 단위의 콜센터를 운영하였다.

콜센터에서는 표본가구 및 가구원 선정, 가구대체, 조사문항, 노트북 관련 질의사항을 처리하고, 담당자는 질의사항에 대한 조치내역을 질병보건통합관리시스템에 일단위로 등록하였다.

나. 자료검증

2015년 지역사회건강조사에서는 조사완료자 중 10%를 무작위로 추출하여 제3기관을 통해 전화 점검을 실시하였다. 전화점검은 조사완료 후 평균 11일 이내 실시하였으며, 책임대학교에서 전화점검 결과에 대해 확인 후 최종적으로 조사자료의 사용 여부를 결정하였다.



〈그림 6〉 전화점검 절차

7. 조사현황

가. 조사현황

조사현황은 <표 5>와 같다. 총 조사가구 수는 494가구였고, 조사완료자 수는 913명이었다. 가구당 평균 1.8명이 조사되었다.

<표 5> 조사현황

동/읍·면	조사가구 수			조사완료자 수(명)		
	아파트	일반	합계	아파트	일반	합계
읍·면지역	250	244	494	464	449	913
두동면	0	15	15	0	30	30
두서면	0	15	15	0	26	26
범서읍	115	22	137	210	44	254
삼남면	20	22	42	42	38	80
삼동면	0	10	10	0	20	20
상북면	7	15	22	9	29	38
서생면	0	29	29	0	54	54
언양읍	38	25	63	72	39	111
온산읍	19	37	56	31	63	94
온양읍	30	20	50	60	40	100
웅촌면	5	17	22	7	32	39
청량면	16	17	33	33	34	67
합계	250	244	494	464	449	913

<표 6> 가구당 조사인원 수

	아파트	일반	계
읍·면지역	1.9	1.8	1.8
계	1.9	1.8	1.8

나. 조사가구 및 인구 특성

2015년 지역사회건강조사 대상자의 가구원수는 2명인 경우가 가장 많았고 32.6%, 평균은 2.4명이었다. 조사자의 기초생활수급 여부는 미수급자가 98.0%로 가장 높았고, 월 가구소득은 200~300만원 미만이 19.9%로 가장 많았으며, 다음이 300~400만원 미만 14.8%의 순이었다.

성별분포는 남자가 45.9%, 여자가 54.1%이었다. 연령은 50대가 23.9%로 가장 높았고, 다음이 40대 22.3%의 순이었다. 대상자의 평균연령은 51.3세였다. 결혼은 유배우가 72.6%이고, 교육수준은 고등학교 졸업이 41.9%로 가장 많았고, 다음이 대학교 이상 28.5% 순이었다.

〈표 7〉 2015년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성

(단위 : 명, %)

조사대상 가구특성 (N=494)		
	N	(%)
가구원 수		
1명	135	27.3
2명	161	32.6
3명	77	15.6
4명	92	18.6
5명	26	5.3
6명	3	0.6
7명 이상		
평균(명)	2.4	.
세대유형		
1세대	280	56.7
2세대	197	39.9
3세대	17	3.4
기초생활수급자 여부		
현재 수급자	7	1.4
과거 수급자	3	0.6
미수급자	484	98.0
월 가구소득		
50만원 미만	71	14.4
50-100만원 미만	55	11.2
100-200만원 미만	65	13.2
200-300만원 미만	98	19.9
300-400만원 미만	73	14.8
400-500만원 미만	56	11.4
500-600만원 미만	27	5.5
600만원 이상	47	9.6
치매환자 동거가구		
다문화 가구	3	0.6
거주유형		
읍·면	494	100.0

〈표 8〉 2015년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성

(단위 : 명, %)

조사대상 인구특성 (N=913)		
	N	(%)
성별		
남자	419	45.9
여자	494	54.1
연령(10세 간격)		
19-29세	91	10.0
30-39세	132	14.5
40-49세	204	22.3
50-59세	218	23.9
60-69세	111	12.2
70세 이상	157	17.2
평균(세)	51.3	.
결혼상태		
미혼	130	14.2
유배우	663	72.6
사별, 이혼, 별거	120	13.1
교육수준 ¹⁾		
무학	57	6.3
초등학교	125	13.7
중학교	88	9.7
고등학교	381	41.9
대학교 이상	259	28.5
직업		
전문행정관리직	108	11.8
사무직	85	9.3
판매·서비스직	117	12.8
농림어업	42	4.6
기능단순노무직	220	24.1
기타 ²⁾	341	37.3


1) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

2) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

제 1 부 조사체계

Ⅱ. 통계 추정방법

1. 가중치의 사용
2. 자료처리
3. 분산추정



II. 통계 추정방법

1. 가중치의 사용

가. 소개

2015년 지역사회건강조사는 표본설계를 통하여 추출한 표본을 조사하여 설계 구조를 바탕으로 가중치를 부여함으로써 모집단의 건강수준 등을 추정하였다. 가중치는 가구단위 분석을 위한 가구 가중치와 개인단위 분석을 위한 개인가중치로 분류하였다.

나. 가중치 산출 과정

가구가중치는 가구추출률과 조사적격 가구율을 반영하였고, 개인가중치는 가구가중치에 개인 응답률을 반영하였다. 추정에 쓰이는 보정가중치는 개인가중치를 성별, 연령별 인구구조(2015년 7월 주민등록인구)와 같도록 보정하여 산출하였다.

설계가중치		벤치마킹 가중치
가구가중치	→	개인가중치 → 보정가중치
· 가구추출률 · 조사적격가구율 · 주택유형별 가구 비율	· 개인 응답률	· 성별·연령별 인구보정 - 성별 : 남, 여 - 연령별 : 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+ - 주민등록인구 기준 (2015. 07)

〈그림 7〉 가중치 산출 과정

(1) 가구가중치

- 표본설계의 표본추출과정을 고려한 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율을 반영한 가중치

$$W_{hi} = \frac{M_{hi}}{n_{hi}} = \frac{e_{hi} \cdot N_{hi}}{n_{hi}}$$

- N_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 가구 수
- M_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 적격가구 수
- n_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사가구 수
- e_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사적격 가구율

〈표 9〉 가구가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 가구 수(③)	(2,620)
①, ②의 조사된 가구 수(④)	(7)
①, ②의 조사접촉 가구 수(⑤)	(9)
①, ②의 조사적격 가구 수(⑥)	(8)
가구가중치(⑦) = ③ ÷ ④ × ⑥ ÷ ⑤	(332.698 = 2620/7 × 8/9)
전체 가구가중치 합(⑧)	(8569.456)
전체 ②의 가구 수 합(⑨)	(10,356)
가구가중치 보정(⑩) = ⑦ × (⑨/⑧)	(402.0583 = 332.698 × 10,356 / 8569.456)

(2) 개인가중치

- 가구가중치에 개인 응답률을 반영한 가중치

$$W_{hjl} = W_{hjk} \times \frac{P_{hjk}}{p_{hjk}}$$

- h : 읍·면/동, j : 표본지점
- k : 가구, l : 가구원
- P_{hjk} : 가구내 만 19세 이상 가구원수
- p_{hjk} : 가구내 만 19세 이상 조사 가구원수

〈표 10〉 개인가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 가구가중치(③)	(402.0583)
만 19세 이상 가구원수(④)	(4)
만 19세 이상 조사 가구원수(⑤)	(3)
개인가중치(⑥=③×④/⑤)	(536.0777=402.0583×4/3)

(3) 보정가중치

- 2015년 7월 주민등록인구 기준으로 성별, 연령별 인구구조를 보정한 가중치

$$- W'_{ijkl} = BF_d \cdot W_{ijkl}$$

$$- BF_d = \frac{d(\text{성별} \cdot \text{연령대별}) \text{ 주민등록인구수}}{\sum_k \sum_i \sum_{jkl} W_{ijkl} I_{d \in \text{성별} \cdot \text{연령대별}}}$$

〈표 11〉 보정가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 개인가중치(③)	(536.0777)
주민등록인구(④)	(14,693)
성·연령별 개인가중치 합(⑤)	(12,157.23)
성·연령별 보정비(⑥=④/⑤)	(1.208=14,693/12,157.23)
보정가중치(⑦=③×⑥)	(647.89=536.0777×1.208)

(4) 가중치의 이상치 제거

특정 조사대상자의 개인가중치가 다른 조사대상자의 개인가중치보다 월등히 클 경우, 해당 조사대상자의 응답값에 의해 조사결과에 바이어스(bias, 편향성)가 생길 수 있으므로 보정가중치의 이상치를 Raking Ratio 방법으로 제거하여 재보정 하였다.

$Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 보다 큰 가중치는 이상치로 정의하였으며, $Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 로 변경하였다.

$$- IQR: Q_3(W') - Q_1(W')$$

- $Q_1(W')$: 가중치 중 1사분위수

- $Q_3(W')$: 가중치 중 3사분위수

2. 자료처리

가. 무응답처리

무응답은 대체하지 않았으며 지표 산출 시 제외하였다. 무응답은 개체 무응답과 항목 무응답으로 구분하는데 개체 무응답은 조사에 참여하지 않음으로써 모든 문항에 대해 발생한 결측치를 의미하고, 항목 무응답은 조사에 참여한 대상자가 일부항목에 응답하지 않아 발생한 결측치이다.

나. 사회경제적 특성분류

(1) 연령

연령은 2015년 8월 1일 기준으로 만 연령을 정의하였다. 연령분류는 10세 단위로 “19-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60-69세, 70세 이상”으로 분류하였고, 생애주기별 특성을 알아보기 위해 “19-64세, 65세 이상”의 연령구분을 추가하였다.

(2) 교육수준

교육수준은 <교육 및 경제활동> 영역에서 교육 정도와 졸업여부 2개 문항으로 조사하고 있으며 최종 교육수준은 두 문항을 조합하여 “무학, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 이상”으로 구분하였다. 졸업여부가 ‘졸업’인 경우만 해당 교육수준을 의미하며 졸업여부가 ‘수료, 중퇴, 재학/휴학’인 경우에는 이전 정도의 교육수준으로 분류하였다.

〈표 12〉 교육수준분류

교육수준	졸업여부	분류
무학	-	무학
서당/한학	-	
초등학교	졸업	초등학교
중학교	졸업	중학교
고등학교	졸업	고등학교
2년/3년제 대학	졸업	대학교 이상
4년제 대학	졸업	
대학원 이상	전체	

(3) 직업

직업분류는 통계청 한국표준직업분류(KSCO, 제6차 개정)의 대분류 직업군에서 유사한 직업분류를 묶어서 6개 직업군으로 분류하였다.

〈표 13〉 직업분류

제6차 한국표준직업분류	직업분류 재구분
관리자	전문행정관리
전문가 및 관련 종사자	
사무 종사자	사무직
서비스 종사자	판매·서비스직
판매 종사자	
농업, 임업 및 어업숙련 종사자	농림어업
기능원 및 관련 기능 종사자	기능단순노무직
장치, 기계조작 및 조립 종사자	
단순노무 종사자	
군인	기타
학생	
주부	
무직	

(4) 가구소득

소득수준은 월 단위로 “50만원 미만, 50-100만원 미만, 100-200만원 미만, 200-300만원 미만, 400-500만원 미만, 500-600만원 미만, 600만원 이상”의 7개 그룹으로 분류하였다.

(5) 거주유형

거주유형은 “동”과 “읍·면”으로 구분하였다.

3. 분산추정

지역사회건강조사에서는 모집단의 특성을 추정하기 위해 가중치를 적용한 표본가중평균을 제시하였다.

표본조사로 모집단의 특성을 추정할 때 일반적으로 표본오차(sampling error) 및 비표본오차(non-sampling error)가 수반된다. 표본오차는 표본이 모집단의 특성과 어긋나는 정도를 나타내며, 비표본오차는 표본추출과정을 제외한 자료수집 과정이나 분석 과정에서 발생하는 오류를 말한다. 표준오차(standard error)로 표현되는 표본오차는 추정치의 신뢰도에 대한 척도가 되며 분산추정에 의해 측정할 수 있다. 울산광역시 울주군 지역사회건강조사는 SAS 9.3을 활용하여 분산을 추정하였다.

• 표본가중평균

$$\hat{Y} = \frac{\left(\sum_h \sum_j \sum_k \sum_l W_{h j k l} y_{h j k l} \right)}{W_{....}}$$

- h : 동/읍·면, j : 표본지점
- k : 가구, l : 가구원
- $W_{....} = \sum_{h=1} \sum_{j=1} \sum_{k=1} \sum_{l=1} W_{h j k l}$: 가중치 계
- $y_{h j k l}$: 해당 문항의 응답값

• 표본오차

$$SE(\hat{Y}) = \sqrt{\sum_{h=1} \sum_{j=1} \frac{n_{hj}(1-f_{hj})}{n_{hj}-1} \sum_{k=1}^{n_{hj}} (e_{hjk} - \bar{e}_{hj.})^2}$$

$$\text{여기서 } e_{hjk} = \frac{\left(\sum_{l=1} W_{h j k l} (y_{h j k l} - \hat{Y}) \right)}{W_{....}} \text{이고,}$$


$$\bar{e}_{hj.} = \left(\sum_{k=1} e_{hjk} \right) / n_{hj} \text{이다.}$$

• 변동계수

$$cv(\hat{Y}) = \frac{SE(\hat{Y})}{\hat{Y}}$$

제2부 주요통계결과


- I. 건강행태
- II. 예방접종 및 검진
- III. 이환 및 의료이용
- IV. 사고 및 중독
- V. 활동제한 및 삶의 질
- VI. 보건기관 이용
- VII. 사회 물리적 환경
- VIII. 개인위생



제 2 부 주요통계결과

I. 건강행태

1. 흡연
2. 음주
3. 안전의식
4. 운동 및 신체활동
5. 식생활
6. 비만 및 체중조절
7. 구강건강
8. 정신건강



I. 건강행태

1. 흡연

가. 현재흡연율

- 현재흡연율은 평생 5갑(100개비)이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자 (“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--

- 전체 현재흡연율은 23.0%이며 남자는 41.6%, 여자는 3.3%로 조사되었다. 연령별로는 40대의 현재흡연율이 30.3%로 가장 높았으며 30대가 27.5%, 20대가 24.6%로 그 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도와 21.6%보다 1.6%p 증가하였다. 최근 5개년간의 현재흡연율은 증감을 반복하였다. 울산광역시의 현재흡연율 21.1%보다 높았다.

나. 흡연시작연령

- 흡연시작연령은 처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이로 정의한다.

$\frac{\text{처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이의 총 합}}{\text{평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자 수}}$
--


- 전체 흡연시작연령은 20.3세로 나타났고, 성별로는 남자 20.0세로 나타났다. 표준화율을 이용한 5개년 간의 흡연시작 연령 비교에서 큰 변동을 보이지 않았으며 울산광역시 전체의 흡연시작연령과 크게 차이나지 않았다.

다. 매일흡연자의 하루 평균 흡연량


- 매일흡연자의 하루 평균 흡연량은 평생 담배 5갑(100개비)이상 흡연한 사람으로서 매일 흡연하는 사람의 하루 평균 흡연량으로 정의한다.

$\frac{\text{평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 매일흡연자의 하루 평균 흡연개비 수의 총 합}}{\text{평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일 흡연자의 수}}$
--


- 매일흡연자의 하루 평균 흡연량은 전체 15.0개비, 남자에서 15.2개비로 나타났다. 연령별로는 50대 매일 흡연자의 흡연량이 가장 높았고, 40대, 60대 순이었다.



〈그림 8〉 현재흡연율



〈그림 9〉 흡연시작연령



〈그림 10〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량

라. 금연

(1) 현재흡연자의 금연시도율

- 현재흡연자의 금연시도율은 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)중 최근 1년(365일) 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년(365일) 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수} \times 100}{\text{현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수}}$$

- 현재흡연자의 금연시도율은 전체 30.8%, 남자 흡연자의 금연시도율은 31.4%로 나타났다. 연령군별로는 40대가 34.6%로 가장 높았으며 30대, 50대가 31.5%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 울주군의 금연시도율은 30.4%로 울산광역시 전체의 38.1% 보다 낮았으며 전년도에 비해 금연시도율보다 높아졌다.

(2) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률

- 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률은 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 중 1개월(30일) 내 금연계획이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 중 1개월(30일) 내 금연계획이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수}}$$


- 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률은 2015년 전체 5.2%였으며 남자에서도 5.6%로 나타났다. 연령별로는 40대에서 12.0%로 가장 높았다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도 금연계획률인 4.4%와 크게 차이 나지 않았으며 울산광역시 전체의 8.4%보다 낮게 나타났다.

(3) 연간 금연교육 경험률


- 연간 금연교육 경험률은 최근 1년(365일) 동안 흡연예방 및 금연교육을 받은 경험이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년(365일) 동안 흡연예방 및 금연에 대한 교육을 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$


- 연간 금연교육 경험률은 전체 9.7%이며 남자 12.8%, 여자 6.4%로 남자에서 높게 나타났다. 연령별로는 20대가 19.9%로 가장 높게 나타났으며 연령군이 높아질수록 금연교육 경험률은 낮아졌다. 조율을 이용한 연도간 추세 분석에서 금연교육 경험률은 전년도의 7.7% 보다 2.0%p 높아졌다.



〈그림 11〉 현재흡연자의 금연시도율



〈그림 12〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률



〈그림 13〉 연간 금연교육 경험률

(4) 연간 금연캠페인 경험률

- 연간 금연캠페인 경험률은 최근 1년(365일) 동안 금연에 대한 공익 광고(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365)일 동안 금연에 대한 공익광고(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적이 있다고 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 연간 금연캠페인 경험률은 전체 87.5%이며 남자 89.9%, 여자 85.0%로 남자에서 높게 나타났다. 연령별로는 30대가 95.3%로 가장 높게 나타났으며 50대가 91.6%, 20대가 90.5%로 그 뒤를 이었다.

(5) 금연구역 인지율

- 금연구역 인지율은 금연구역이 “지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다” 또는 “지정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다”에 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

금연구역이 “지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다” 또는 “지정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 전체 금연구역 인지율은 92.3%이며 남자 95.9%, 여자 88.5%로 남자에서 높게 나타났다. 연령별로는 40대가 99.6%로 가장 높게 나타났으며 30대가 98.8%로 그 뒤를 이었다. 조율을 이용한 연도간 추세분석에서 금연구역 인지율은 전년도에 90.1%보다 2.2%p 높아졌다.

(6) 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률


- 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률은 금연구역 내에서 “항상 흡연한다” 또는 “가끔 흡연한다”에 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

금연구역 내에서 “항상 흡연한다” 또는 “가끔 흡연한다”에 응답한 사람의 수×100
금연구역이 지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있는 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수


- 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률은 전체 26.4%, 남자 흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률은 27.9%로 나타났다. 조율을 이용한 비교에서 울주군 흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률은 26.4%로 전년도에 25.0%보다 높아졌다.



〈그림 14〉연간 금연캠페인 경험률



〈그림 15〉금연구역 인지도



〈그림 16〉현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률

마. 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률

- 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률은 최근 1주일(7일) 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있다고 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1주일(7일) 동안 가정의 실내에서 다른사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수}}$$

- 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률은 전체 5.9%였으며 남자에서 2.0%, 여자에서 8.3%로 여자에서 높게 나타났다. 연령별로는 20대가 7.8%로 가장 높았다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도의 5.8%보다 0.7%p 증가했으며 울산광역시 전체의 5.5%보다 높게 나타났다.

바. 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률

- 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률은 최근 1주일(7일) 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있다고 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1주일(7일) 동안 직장의 실내에서 다른사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{일을 하고 있는 현재 비흡연자(과거흡연자 포함)의 수}}$$

- 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률은 전체 23.8%였으며 남자에서 32.5%, 여자에서 15.5%를 보였다. 연령별로는 40대가 27.1%로 가장 높았으며 20대가 26.1%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도의 32.0%보다 9.8%p 감소했으며 울산광역시 전체의 28.2%보다 낮게 나타났다.


사. 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률¹⁾

- 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률은 공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기로 인한 간접흡연 경험이 있다고 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.


$$\frac{\text{공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기로 인한 간접흡연 경험이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수}}$$

- 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률은 전체 89.7%로 남자 91.6%, 여자 88.6%로 나타났다. 연령군별로는 30대가 97.2%로 가장 높았으며 20대가 92.9%, 50대가 91.2%로 그 뒤를 이었다.


1) 2013년 지표정의 : 공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있는 사람의 수*100 / 조사대상 응답자 수



〈그림 17〉 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률



〈그림 18〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률



〈그림 19〉 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률

아. 현재흡연자의 의료인 금연권고 경험률

- 현재흡연자의 의료인 금연권고 경험률은 최근 1년 동안 의사, 치과 의사, 한의사, 간호사로부터 담배를 끊으라는 말을 들은 경험이 있다고 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 의사, 치과 의사, 한의사, 간호사로부터
담배를 끊으라는 말을 들은 적이 있는 사람의 수×100

현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수

- 현재흡연자의 의료인 금연권고 경험률은 전체 25.1%였으며 남자에서만 26.1%를 보였다. 연령군별로는 60대가 35.2%로 가장 높았으며 40대가 34.0%, 50대가 32.1%로 그 뒤를 이었다.

자. 담뱃값 인상 영향 경험률

- 담뱃값 인상 영향 경험률은 담뱃값 인상으로 현재 흡연에 영향을 받았다고 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

담뱃값 인상으로 현재 흡연에 영향을 받은
사람의 수×100

현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수

- 담뱃값 인상 영향 경험률은 전체 37.7%였으며 남자에서만 36.6%를 보였다. 연령군별로는 30대가 41.8%로 가장 높았으며 60대가 36.6%, 40대가 35.2%로 그 뒤를 이었다.


차. 담뱃값 인상 영향 유형

- 담뱃값 인상 영향 유형은 담뱃값 인상으로 흡연에 영향을 받은 현재흡연자 및 과거흡연자 중 “담배를 끊었다”, “담배를 더 적게 피운다”, “가격이 저렴한 담배를 피운다”, “전자담배를 사용한다”, “일반담배(궐련)이나 전자담배가 아닌 다른 담배 제품을 사용한다”, “기타”로 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.


응답보기별 응답자 수×100

담뱃값 인상으로 흡연에 영향을 받은
현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 및
과거흡연자(금연기간 1년 미만)의 수


- 담뱃값 인상 영향 유형에서 담배를 더 적게 피운다에 응답한 사람이 71.1%로 가장 높았으며 저렴한 담배를 피운다(13.2%), 담배를 끊었다(10.8%), 전자담배를 사용한다(9.6%), 전자담배가 아닌 다른 담배 제품을 사용한다(1.2%) 순으로 나타났다.



〈그림 20〉 현재흡연자의 의료인 금연권고 경험률



〈그림 21〉 담뭍값 인상 영향 경험률



〈그림 22〉 담뭍값 인상 영향 유형

카. 금연정책 강화 필요 영역

- 금연정책 강화 필요 영역은 각 영역별(“금연구역 확대”, “금연구역 내 흡연단속(과태료 인상)”, “금연클리닉확대 운영”, “금연 교육 및 홍보 강화”, “더 강화할 정책이 없다”) 응답자 수의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{응답보기별 응답자 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$


- 금연정책 강화 필요 영역에서 금연구역 내 흡연단속이 27.6%로 가장 높았으며 금연구역 확대(25.4%), 금연 교육 및 홍보 강화(23.0%), 금연클리닉 확대 운영(16.4%), 더 강화할 정책이 없다(7.6%) 순으로 나타났다.

타. 금연구역 법률 인지율


- 금연구역 법률 인지율은 ‘지정된 금연구역에서 흡연하면 일정액 이하의 과태료를 내야한다’와 ‘금연구역에서 전자담배를 사용하는 것은 불법이다’에 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{‘지정된 금연구역에서 흡연하면 일정액 이하의 과태료를 내야한다’와 ‘금연구역에서 전자담배를 사용하는 것은 불법이다’에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 금연구역 법률 인지율은 전체 61.5%이며 남자 65.9%, 여자 56.3%로 나타났다. 연령별로는 40대가 69.8%로 가장 높았으며 20대와 50대가 그 뒤를 이었다.



〈그림 23〉 금연정책 강화 필요 영역



〈그림 24〉 금연구역 법률 인지도


【울산 선택지표】

파. 금연클리닉 또는 금연상담전화 인지율

- 금연클리닉 또는 금연상담전화 인지율은 금연클리닉 또는 금연상담전화가 있다는 것을 알고 있는 응답자 수의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{금연클리닉 또는 금연상담전화가 있다는 것을 알고 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 금연클리닉 또는 금연상담전화 인지율은 전체 57.2%이며 남자 62.6%, 여자 51.4%로 나타났다. 연령군별로는 30대가 70.9%로 가장 높게 나타났으며 50대가 64.2%로 뒤를 이었다.



〈그림 25〉 금연클리닉 또는 금연상담전화 인지도

2. 음주

가. 월간음주율

- 월간음주율은 최근 1년(365일) 동안 한 달(30일)에 1회 이상 음주한 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 한 달(30일)에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 2015년 월간음주율은 56.5%였으며 남자에서 72.5%, 여자에서 39.6%를 보였다. 연령별로는 40대가 68.0%로 가장 높았고, 20대(66.4%), 30대(63.6%) 순으로 나타났다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도의 59.3%보다 낮은 58.4%의 월간음주율을 보였으며 울산광역시 전체의 63.7%보다 낮았다.

나. 음주시작연령

- 음주시작연령은 처음으로 술 1잔을 모두 마신 적이 있는 사람의 만 나이로 정의한다.

처음으로 술 1잔을 모두 마신 만 나이의 총 합
지금까지 살아오면서 1잔이상의 술을 마신 음주자수

- 남자의 음주시작연령은 19.4세, 여자의 경우 24.1세로 나타났다. 음주시작 연령은 최근 5년간 큰 변동 없이 유지되었으며 울산광역시 전체의 결과와도 유사하였다.


다. 고위험음주율²⁾

- 고위험음주율은 최근 1년(365일) 동안 음주한 사람 중에서 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상, 여자는 5잔 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.


최근 1년(365일) 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수×100
최근 1년(365일) 동안 음주한 사람의 수

- 고위험음주율은 남자(29.4%)에서 여자(6.7%)보다 높게 나타났으며 연령군별로는 40대가 29.6%로 가장 높았으며 50대와 30대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 울주군의 고위험음주율은 17.9%로 전년도 보다 감소하였으며 울산광역시 전체와 유사하였다.


2) 2008년 지표정의 : 한 번의 술좌석에서 남자는 7잔 또는 맥주 5캔(여자의 경우 5잔 또는 맥주 3캔 정도) 이상을 한 달(30일) 동안 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 사람의 수*100 / 조사대상자 중 최근 1년간 음주한 사람의 수



〈그림 26〉 월간음주율



〈그림 27〉 음주시작연령



〈그림 28〉 고위험음주율

【울산 선택지표】

라. 연간 음주문제로 인한 상담 경험률

- 연간 음주문제로 인한 상담 경험률은 최근 1년(365일) 동안 음주문제로 상담을 받아본 경험이 있는 응답자 수의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 음주문제로 상담을 받아본 적이 있는 사람의 수×100
최근 1년(365일) 동안 음주한 사람의 수


- 연간 음주문제로 인한 상담 경험률은 2015년 전체 0.5%였으며 남자에서 0.6%, 여자 0.5%를 보였다. 조율을 이용한 비교에서 13년도의 0.4%와 유사한 0.5%의 음주문제로 인한 상담 경험률을 보였다.

마. 평생 음주예방 교육 경험률


- 평생 음주예방 교육 경험률은 음주예방에 대한 교육을 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

음주예방에 대한 교육을 받은 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 2015년 평생 음주예방 교육 경험률은 7.4%였으며 남자에서 11.3%, 여자에서 3.3%를 보였다. 연령별로는 20대가 17.1%로 가장 높았고, 30대(9.6%), 40대(6.1%) 순으로 나타났다.



〈그림 29〉 연간 음주문제로 인한 상담 경험률



〈그림 30〉 평생 음주예방 교육 경험률

3. 안전의식

가. 운전 시 안전벨트 착용률

- 자동차 운전 시 안전벨트 착용률은 자동차 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
자동차 운전자 수

- 자동차 운전 시 안전벨트 착용률은 2015년 전체 77.5%이며 성별로는 남자 74.0%, 여자 83.1%로 조사되었다. 연령별로는 60대의 안전벨트 착용률이 88.5%로 가장 높았고 50대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도의 77.0%에 비해 낮은 74.9%의 안전벨트 착용률을 보였으며 울산광역시 전체의 80.8%보다 낮았다.

나. 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률

- 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률은 다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
동승차량 앞좌석 탑승자 수


- 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률은 73.9%이며, 남자에서 68.4%, 여자에서 80.2%를 보였다. 연령별로는 60대가 88.5%로 가장 높았고 70세 이상 순이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도의 69.1%보다 높은 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률을 보였으며 울산광역시 전체의 75.0%보다 낮게 나타났다.

다. 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)


- 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)은 최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 수×100
자동차 또는 오토바이 운전자 수


- 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)은 12.2%였으며 남자의 경우 16.5%, 여자의 경우 5.3%로 조사되었다. 연령별로는 20대에서 18.3%로 가장 높았고 50대가 15.6%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서는 전년도의 17.6%보다 낮은 13.0%를 기록했으며 울산광역시 전체의 14.4%보다 낮은 음주운전 경험률을 나타냈다.



〈그림 31〉 운전 시 안전벨트 착용률



〈그림 32〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률



〈그림 33〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)

4. 운동 및 신체활동

가. 신체활동 실천율

(1) 격렬한 신체활동 실천율

- 격렬한 신체활동 실천율은 최근 1주일(7일) 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람의 수×100

조사대상 응답자 수

- 격렬한 신체활동 실천율은 14.6%였으며 남자는 20.6%, 여자는 8.2%로 차이를 보였다. 연령별로는 20대(20.8%)에서 격렬한 신체활동을 가장 많이 하는 것으로 나타났고 40대와 30대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도의 14.8%에서 15.2%로 실천율이 증가하였으며 울산광역시 전체의 16.6%에 비해 낮았다.

(2) 중등도 신체활동 실천율

- 중등도 신체활동 실천율은 최근 1주일(7일) 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100

조사대상 응답자 수

- 중등도 신체활동 실천율은 11.5%이고 남자에서 13.0%, 여자에서 9.9%로 차이를 보였다. 연령별로는 70세 이상(17.8%)의 실천율이 가장 높았으며 30대와 60대가 그 다음으로 높았다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도 실

천율(20.2%)보다 감소하였으며 울산광역시 전체의 9.3%에 비해 높았다.

(3) 중등도 이상 신체활동 실천율³⁾


- 중등도 이상 신체활동 실천율은 최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람 또는 최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100


조사대상 응답자 수

- 중등도 이상 신체활동 실천율은 23.8%로 조사되었으며 남자에서 30.7%, 여자에서 16.5%였다. 연령별로는 30대(28.4%), 40대(24.4%), 20대(23.7%)순서로 높았다. 표준화율을 이용한 추세비교에서는 전년도의 30.1%에서 23.8%로 실천율이 감소하였으며 울산광역시 전체의 22.6%보다 높았다.


3) 2008년 지표정의 : 최근 1주일 동안 신체활동을 1회 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람 수×100 / 조사대상 인구 수



〈그림 34〉 격렬한 신체활동 실천율



〈그림 35〉 중등도 신체활동 실천율



〈그림 36〉 중등도 이상 신체활동 실천율

나. 걷기 실천율

- 걷기 실천율은 최근 1주일(7일) 동안 걷기를 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1주일(7일) 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 울주군의 걷기 실천율은 52.8%로 조사되었으며 남자에서 58.4%, 여자에서 46.9%로 나타났다. 연령별로는 60대(62.5%)에서 걷기 실천율이 높았다. 표준화 실천율은 53.7%로 전년도의 49.7%보다 증가했으며 울산광역시 전체 실천율인 44.4%보다 높았다.


【울산 선택지표】

다. 월간 규칙적 운동실천율


- 월간 규칙적 운동실천율은 최근 1달(30일) 동안 규칙적으로 운동을 한 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1달(30일) 동안 규칙적으로 운동을 하고 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 울주군의 월간 규칙적 운동실천율은 전체 36.6%로 조사되었으며 남자에서 42.2%, 여자에서 30.7%였다. 연령별로는 40대의 규칙적 운동 실천율이 43.3%로 가장 높았으며, 50대와 30대가 그 다음으로 높았다.



〈그림 37〉 걷기 실천율



〈그림 38〉 월간 규칙적 운동실천율

5. 식생활

가. 저염선호율

- 저염선호율은 평소 식습관, 조리음식 등에서 저염식을 선호하는 사람의 분율(%)로 정의한다. 저염선호율은 제시된 3가지의 문항 중 한 가지만 선택한 경우를 Type I, 두 가지를 선택한 경우를 Type II, 그리고 세 가지 모두를 선택한 경우를 Type III로 구분한다.

- ① 평소 음식을 먹을 때 “약간 싱겁게 먹는다” 또는 “아주 싱겁게 먹는다”에 응답한 사람의 수 또는,
- ② 조리된 음식을 먹을 때 소금이나 간장을 “전혀 더 넣지 않는다”에 응답한 사람의 수 또는,
- ③ 전, 부침, 튀김 등을 먹을 때 간장에 “찍어 먹지 않는다”에 응답한 사람의 수×100

조사대상 응답자 수

- 저염선호율은 Type I이 42.5%, Type II가 27.8%, Type III가 13.4%로 나타났다. Type I은 남자는 49.1%, 여자는 35.4%를 보였으며, Type II는 남자는 22.9%, 여자는 33.0%, Type III는 남자는 9.6%, 여자는 17.3%로 나타났다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 Type I은 전년도 42.5%에서 증가한 42.9%를 보였고 Type II는 전년도 28.7%보다 감소한 27.8%, Type III 역시 전년도 13.2%에서 12.5%로 감소추세를 보였다.


나. 영양표시 활용률

- 영양표시 활용률은 영양표시 내용이 가공식품 선택 시 영향을 미친다고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.


영양표시 내용이 가공식품을 고를 때
영향을 미친다고 응답한 사람의 수×100

가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수


- 가공식품 선택 시 영양표시 활용률은 81.5%였고 남자의 경우 69.5%, 여자의 경우 85.0%로 나타났다. 연령별로는 40대(91.3%), 50대(80.1%), 30대(76.4%)의 순서로 활용률이 높았다.



〈그림 39〉 저압선호율(2015)



〈그림 40〉 저압선호율(연도비교)



〈그림 41〉 영양표시 활용률

다. 식품 안정성 확보율

- 식품 안정성 확보율은 최근 1년(365일) 동안 가구 식생활 형편을 물었을 때 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었거나 혹은 충분한 양이지만 다양하지 못한 음식을 먹은 사람의 비율(%)로 정의한다.

“우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다” 또는 “우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 가구 수

- 식품 안정성 확보율은 95.0%로 높게 나타났으며 남자에서는 95.4% 여자에서는 94.8%로 나타났다. 5년간 추세도 꾸준히 높은 식품 안정성 확보율을 보이고 있다.

【울산 선택지표】

라. 저염식 실천 노력 경험률

- 저염식 실천 노력 경험률은 평소 덜 짜게 먹으려고 “항상 노력한다” 또는 “대체로 노력한다”에 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

평소 덜 짜게 먹으려고 “항상 노력한다” 또는 “대체로 노력한다”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 저염식 실천 노력 경험률은 전체 66.3%이며, 남자에서는 60.1%, 여자에서는 72.9%로 여자에게서 높게 나타났다. 연령별로는 50대(75.3%)가 가장 높은 경험률을 보였다.

마. 연간 영양교육 및 상담 수혜율


- 연간 영양교육 및 상담 수혜율은 최근 1년(365일) 동안 영양교육이나 상담을 받아 본 경험이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 영양교육 및 상담을 받은 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 연간 영양교육 및 상담 수혜율은 4.4%이며, 남자에서는 2.8%, 여자에서는 6.0%로 나타났다. 연령별로는 20대(7.9%)가 가장 높은 수혜율을 보였다. 조율을 이용한 추세비교에서 울주군의 영양교육 및 상담 수혜율은 전년도(1.7%)보다 증가하였다.



〈그림 42〉 식품 안정성 확보율



〈그림 43〉 저염식 실천 노력 경험률



〈그림 44〉 연간 영양교육 및 상담 수혜율

6. 비만 및 체중조절

가. 비만율

- 비만율은 체질량지수(체중(kg)/신장²(m²)) 25 이상인 사람의 비율(%)로 정의한다.

체질량지수(kg/m ²) 25 이상인 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 울주군의 비만율은 25.8%이고 남자의 35.2%, 여자의 15.6%가 비만인 것으로 나타났다. 연령별로는 60대의 비만율(31.3%)이 가장 높았으며 50대와 30대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도(22.7%)보다 증가하였으며, 울산광역시 전체의 비만율(25.1%)과 유사하게 나타났다.

나. 주관적 비만인지율


- 주관적 비만인지율은 주관적으로 “약간 비만” 또는 “매우 비만”이라고 생각하는 사람의 비율(%)로 정의한다.

“약간 비만임” 또는 “매우 비만임”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 주관적 비만인지율은 36.8%였으며 남자는 34.3%, 여자는 39.5%였다. 50대의 주관적 비만인지율이 가장 높았으며(44.2%) 30대와 40대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 주관적 비만인지율(37.5%)은 전년도(38.4%)보다 감소하였으며, 울산광역시 전체의 42.1%보다 낮았다.



〈그림 45〉 비만율



〈그림 46〉 주관적 비만인지율

다. 연간 체중조절 시도율

- 연간 체중조절 시도율은 최근 1년(365일) 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 연간 체중조절 시도율은 전체 54.8%였으며 남자 50.4%, 여자 59.4%로 차이를 보였다. 연령별로는 40대가 66.0%로 가장 높았으며 20대와 30대의 순서로 높은 시도율을 보였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도 시도율(55.3%)보다 증가하였으며 울산광역시 전체의 61.2%보다 낮은 시도율을 보였다.


【울산 선택지표】

라. 체중조절 시도방법


- 체중조절 시도방법은 각 체중조절 방법(“운동”, “단식(24시간 이상)”, “식사량 감소 또는 식단 조절”, “의사처방 없이 임의로 살 빼는 약 복용”, “의사처방을 받아서 살 빼는 약 복용”, “한약 복용”, “건강기능식품”, “원 푸드 다이어트”)을 시도해 본 사람의 분율(%)로 정의한다.

각 체중조절 시도방법×100
체중을 “줄이거나” 또는 “유지” 하려고 노력했던 사람의 수

- 체중조절 시도방법에서 운동이 전체 76.4% (남자 81.6%, 여자 71.7%)로 가장 높게 나타났으며 식사량 감소 또는 식단 조절이 63.4%로 그 뒤를 이었다. 건강기능식품(8.9%), 단식(6.3%), 원 푸드 다이어트(3.7%), 한약 복용(3.1%), 의사처방을 받아서 살 빼는 약 복용(2.3%), 의사처방 없이 임의로 살 빼는 약 복용(1.8%)의 순서로 높았다.



〈그림 47〉 연간 체중조절 시도율



〈그림 48〉 체중조절 시도방법

7. 구강건강

가. 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

- 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 주관적으로 구강건강이 나쁘다고 인식하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 32.3%로 나타났으며 남자는 30.1%, 여자는 34.7%로 조사되었다. 70세 이상의 연령군에서 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율이 60.4%로 가장 높았으며 60대도 56.0%로 높았다. 표준화율에 의한 비교에서 전년도(32.1%)에 비해 2015년 분율이 낮아졌으며 울산광역시의 29.4%와 유사하였다.

다. 틀니 이용 행태(50세 이상)

- 틀니 이용 행태(50세 이상)는 50세 이상 의 틀니 이용 행태별 분율(%)로 정의한다.

틀니 이용 행태별 사람의 수×100
50세 이상 조사대상 응답자 수


- 50세 이상의 틀니 이용 행태는 위아래 둘 다 있는 경우가 20.6%, 위쪽만 있는 경우가 6.5%, 아래쪽만 있는 경우가 2.4%, 아니오로 응답한 경우가 70.4%로 나타났다. 위아래 둘 다 있는 경우 남자는 19.3%, 여자는 21.9%였으며, 위쪽만 있는 경우 남자는 6.3%, 여자는 6.7%, 아래쪽만 있는 경우 남자는 1.2%, 여자는 3.6%, 아니오로 응답한 경우 남자는 73.2%, 여자는 67.8%를 보였다.

나. 저작불편호소율(65세 이상)


- 65세 이상 노인의 저작불편호소율은 65세 이상 노인의 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

“매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 수×100
65세 이상 조사대상 응답자 수


- 65세 이상 노인의 저작불편호소율은 42.2%였으며 65세 이상 남성의 44.9%, 여성의 39.8%에서 저작불편을 호소하였다. 표준화율에 의한 저작불편 호소율은 38.4%로 전년도 저작불편호소율(41.6%)보다 낮아졌으며 울산광역시 전체의 41.9%보다 낮았다.



〈그림 49〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 비율



〈그림 50〉 저작불편호소율 (65세 이상)



〈그림 51〉 틀니이용행태 (50세 이상) (2015)

라. 치솔질 실천율

(1) 어제 아침식사 후 치솔질 실천율

- 어제 아침식사 후 치솔질 실천율은 아침식사 후 치솔질 한 사람의 비율(%)로 정의한다.

아침식사 후 치솔질 한 사람의 수×100
어제 하루 동안 아침식사 한 사람의 수

- 어제 아침식사 후 치솔질 실천율은 93.8%였으며 남자의 경우 91.5%, 여자의 경우 96.1%로 나타났다.

(2) 어제 점심식사 후 치솔질 실천율

- 어제 점심식사 후 치솔질 실천율은 점심식사 후 치솔질 한 사람의 비율(%)로 정의한다.

점심식사 후 치솔질 한 사람의 수×100
어제 하루 동안 점심식사 한 사람의 수

- 어제 점심식사 후 치솔질 실천율은 56.5%였으며 남자의 경우 51.6%, 여자의 경우 61.6%로 나타났다.

(3) 어제 저녁식사 후 치솔질 실천율

- 어제 저녁식사 후 치솔질 실천율은 저녁식사 후 치솔질 한 사람의 비율(%)로 정의한다.

저녁식사 후 치솔질 한 사람의 수×100
어제 하루 동안 저녁식사 한 사람의 수


- 어제 저녁식사 후 치솔질 실천율은 62.2%였으며 남자의 경우 60.8%, 여자의 경우 63.6%로 나타났다.

(4) 어제 잠자기 전 치솔질 실천율

- 어제 잠자기 전 치솔질 실천율은 잠자기 전 치솔질 한 사람의 비율(%)로 정의한다.

잠자기 전 치솔질 한 사람의 수×100
어제 하루 동안 잠을 잔 사람의 수

- 어제 잠자기 전 치솔질 실천율은 61.0%였으며 남자의 경우 60.8%, 여자의 경우 61.3%로 나타났다.



〈그림 52〉 칫솔질 실천율

마. 연간 구강검진 수진율

- 연간 구강검진 수진율은 최근 1년(365일) 동안 치료목적이 아닌 순수검진 목적으로 구강검진을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 구강검진을 받은 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 울주군의 연간 구강검진 수진율은 38.7%였으며 남자는 42.0%, 여자는 35.1%를 보였다. 연령별로는 50대가 48.6%로 가장 높았으며 20대와 40대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 구강검진 수진율은 전년도 29.5%보다 증가한 39.2%로 나타났으며, 울산광역시 전체 수진율인 47.6%보다 낮았다.

바. 연간 스케일링 경험률


- 연간 스케일링 경험률은 최근 1년(365일) 동안 스케일링을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 스케일링을 받은 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 연간 스케일링 경험률은 42.6%였으며 남자는 43.5%, 여자는 41.7%로 나타났다. 50대의 스케일링 경험률이 50.7%로 가장 높았으며 20대와 40대가 그 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 스케일링 경험률은 전년도의 34.5%보다 높은 41.8%로 나타났으며 울산광역시 전체의 41.2%보다 높았다.



〈그림 53〉 연간 구강검진 수진율



〈그림 54〉 연간 스텝일링 경험률

8. 정신건강

가. 스트레스 인지율

- 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이” 또는 “많이” 느끼는 사람의 비율(%)로 정의한다.

평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다”
또는 “많이 느낀다”에 응답한 사람의 수×100

조사대상 응답자 수

- 스트레스 인지율은 23.8%였으며 남자와 여자는 각각 23.9%, 23.6%로 나타났다. 연령별로는 30대의 스트레스 인지율이 가장 높은 30.3%를 기록했으며 20대가 26.8%, 40대가 25.5%로 나타났다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 28.1%보다 감소한 24.8%의 스트레스 인지율을 보였으며 울산광역시 전체의 23.8%보다 높았다.


나. 우울감 경험률

- 우울감 경험률은 최근 1년(365일) 동안 연속적으로 2주(14일) 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 비율(%)로 정의한다.


최근 1년(365일) 동안 연속적으로 2주(14일) 이상
일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을
경험한 사람의 수×100

조사대상 응답자 수

- 우울감 경험률은 3.3%로 조사되었고 남자와 여자의 비율은 각각 1.5%와 5.2%였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 4.7%보다 감소한 3.6%의 우울감 경험률을 보였으며 울산광역시 전체의 4.8%보다 낮은 수치를 기록하였다.



〈그림 55〉 스트레스 인지율



〈그림 56〉 우울감 경험률

【울산 선택지표】

다. 자살생각률

- 자살생각률은 최근 1년(365일) 동안 자살을 생각해 본 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 자살을 생각해 본 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 자살생각률은 3.2%로 조사되었고 남자와 여자의 분율은 각각 1.3%와 5.3%였다. 조울을 이용한 추세비교에서 전년도의 6.6%보다 감소한 3.2%의 자살생각률을 보였다.

마. 자살시도율

- 자살시도율은 최근 1년(365일) 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 자살시도율은 0.4%로 조사되었고 남자와 여자의 분율은 각각 0.2%와 0.6%였다. 조울을 이용한 추세비교에서 전년도의 0.5%와 유사한 0.4%의 자살시도율을 보였다.

라. 자살생각으로 인한 정신상담률


- 자살생각으로 인한 정신상담률은 자살생각으로 전문가의 상담(의료기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

자살생각으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담 기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수 ×100
최근 1년(365일) 동안 자살을 생각해 본 적이 있는 사람의 수


- 자살생각으로 인한 정신상담률은 25.9%로 조사되었고 여자의 분율은 20.8%로 나타났다. 조울을 이용한 추세비교에서 전년도의 15.9%보다 증가한 25.9%의 정신상담률을 보였다.



〈그림 57〉 자살생각률



〈그림 58〉 자살생각으로 인한 정신상담률




〈그림 59〉 자살시도율

제 2 부 주요통계결과

Ⅱ. 예방접종 및 검진

1. 예방접종
2. 검진



II. 예방접종 및 검진

1. 예방접종

가. 연간 인플루엔자 예방접종률

- 연간 인플루엔자 예방접종률은 최근 1년(365일) 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 1년(365일) 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 연간 인플루엔자 예방접종률은 36.2%였으며 남자와 여자는 각각 29.6%, 43.2%로 나타났다. 70세 이상 연령군의 접종률이 88.3%로 가장 높았으며 60대가 57.5%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 인플루엔자 예방접종률은 전년도의 31.1%보다 증가한 33.5%로 조사되었으며 울산광역시 전체의 38.3%보다 낮은 접종률이었다.

2. 검진

가. 건강검진 수진율

- 건강검진 수진율은 최근 2년 동안 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 2년 동안 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--


- 건강검진 수진율은 64.8%였으며 남자와 여자는 각각 67.6%, 62.0%로 나타났다. 연령별로는 60대가 82.2%로 가장 높았으며 50대가 78.7%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 건강검진 수진율은 전년도와 같은 61.8%로 조사되었으며 울산광역시 전체의 67.1%보다 낮은 수진율이었다.

나. 암 검진율


- 암 검진율은 최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$


- 암 검진율은 49.7%였으며 남자와 여자는 각각 47.3%, 52.3%로 나타났다. 연령별로는 60대가 72.8%로 가장 높았으며 50대가 72.6%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 암 검진율은 전년도의 39.9%보다 증가한 45.3%로 조사되었으며 울산광역시 전체의 47.1%보다 낮은 검진율이었다.



〈그림 60〉 연간 인플루엔자 예방접종률



〈그림 61〉 건강검진 수진율




〈그림 62〉 암 검진율

제 2 부 주요통계결과

Ⅲ. 이환 및 의료이용

1. 만성·급성질환 및
사고중독 경험률
2. 주요 질환별 평생
의사진단 경험률 및
관리행태
3. 의료이용



Ⅲ. 이환 및 의료이용


1. 만성·급성질환 및 사고중독 경험률

- 만성·급성질환 및 사고중독 경험률은 최근 2주(14일) 동안 만성·급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 2주(14일) 동안 만성·급성질환 및
사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을
느꼈던 적이 있는 사람의 수×100

조사대상 응답자 수

- 만성·급성질환 및 사고중독 경험률은 4.4%이며 남자는 2.9%, 여자는 5.9%로 나타났다. 연령별로는 70세 이상 연령군에서 11.5%로 가장 높은 경험률을 보였으며 30대와 50대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도 경험률 5.0%보다 감소한 4.0%로 울산광역시 전체 값 5.4%보다 낮았다.



〈그림 63〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률

2. 주요 질환별 평생 의사진단 경험률 및 관리행태

가. 고혈압

(1) 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥ 30)

- 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥ 30)은 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람의 분율(%)로 정의한다.

의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 $\times 100$
30세 이상 조사대상 응답자 수

- 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥ 30)은 22.7% (남자 24.7%, 여자 20.7%)였으며 연령별로는 70세 이상이 51.8%로 가장 높았다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 고혈압 평생 의사진단경험률(≥ 30)은 전년도의 18.6%보다 증가한 19.9%로 나타났으며 울산광역시 전체 값과 크게 차이나지 않았다.

(2) 고혈압 약물치료율(≥ 30)

- 고혈압 약물치료율(≥ 30)은 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람 중 현재 혈압조절약을 “한 달(30일)에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

현재 혈압조절약을 한 달(30일)에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 $\times 100$
의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수


- 고혈압 약물치료율(≥ 30)은 83.0% (남자 79.9%, 여자 86.9%)였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 88.4%보다 감소한 85.1%의 고혈압 약물치료율을 보였으며, 울산광역시 전체의 83.5%보다 높은 치료율을 보였다.

(3) 고혈압 관리교육 이수율(≥ 30)


- 고혈압 관리교육 이수율(≥ 30)은 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람 중 고혈압 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 $\times 100$
의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수


- 고혈압 관리교육 이수율(≥ 30)은 36.4% (남자 38.5%, 여자 33.8%)로 조사되었다. 50대 관리교육 이수율이 41.1%로 가장 높은 이수를 보였다.



〈그림 64〉 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)



〈그림 65〉 고혈압 약물치료율(≥30)



〈그림 66〉 고혈압 관리교육 이수율(≥30)

나. 당뇨병

(1) 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥ 30)

- 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥ 30)은 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 분율(%)로 정의한다.

의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 $\times 100$
30세 이상 조사대상 응답자 수

- 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥ 30)은 10.0% (남자 10.4%, 여자 9.5%)였으며 70세 이상 연령군에서 25.2%로 가장 높았다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥ 30)은 전년도의 8.6%보다 증가한 8.7%로 나타났으며 울산광역시 전체의 7.9%보다 높았다.

(2) 당뇨병 치료율(≥ 30)

- 당뇨병 치료율(≥ 30)은 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 $\times 100$
의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수


- 당뇨병 치료율(≥ 30)은 85.7% (남자 81.3%, 여자 90.6%)였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 85.3%보다 감소한 82.1%의 당뇨병 치료율을 보였으며 울산광역시 전체의 87.3%보다 낮은 치료율을 보였다.

(3) 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)


- 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)은 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 당뇨병 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 $\times 100$
의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수

- 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)은 42.8% (남자 41.2%, 여자 44.7%)로 조사되었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 60.7%보다 감소한 42.4%의 관리교육 이수율 보였으며 울산광역시 전체의 25.6%보다 높은 이수율을 보였다.



〈그림 67〉 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)



〈그림 68〉 당뇨병 치료율(≥30)



〈그림 69〉 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)

(4) 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥ 30)

- 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥ 30)은 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년(365일) 동안 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 $\times 100$
의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수

- 연간 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥ 30)은 45.8%(남자 31.6%, 여자 61.9%)였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 29.6%보다 증가한 44.6%의 수진율을 보였으며 울산광역시 전체의 35.1%보다 높았다.


(5) 연간 당뇨병 신장합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥ 30)⁴⁾

- 연간 당뇨병 신장합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥ 30)은 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년(365일) 동안 스틱 검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.


최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 $\times 100$
의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수

- 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥ 30)은 37.1%(남자 37.2%, 여자 36.9%)로 나타났다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 36.1%보다 감소한 35.5%의 수진율을 보였으며 울산광역시 전체의 35.7%와 유사하였다.

4) 2009년 지표정의 : 최근 1년 동안 미세단백뇨검사를 받은 적이 있는 사람의 수 $\times 100$ / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
2010년 지표정의 : 최근 1년 동안 소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 $\times 100$ / 의사진단을 받은 30세 이상인 사람의 수



〈그림 70〉 연간 당뇨병 안정환 합병증 검사 수진율(≥30)



〈그림 71〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사 수진율(≥30)

다. 관절염

(1) 관절염 평생 의사진단 경험률(≥ 50)

- 관절염 평생 의사진단 경험률(≥ 50)은 의사에게 관절염을 진단받은 50세 이상 사람의 분율(%)로 정의한다.

의사에게 관절염을 진단받은 사람의 수 $\times 100$
50세 이상 조사대상 응답자 수

- 관절염 평생 의사진단 경험률(≥ 50)은 12.7% (남자 5.7%, 여자 19.4%)였으며 70세 이상 연령군에서 21.0%로 가장 높은 경험률을 보였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 19.5%보다 감소한 13.4%의 관절염 평생 진단율을 보였으며 울산광역시 전체의 14.6%보다 낮았다.

(2) 관절염 관리교육 이수율(≥ 50)

- 관절염 관리교육 이수율(≥ 50)은 의사에게 관절염을 진단받은 50세 이상 사람 중 관절염 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

관절염 관리 교육을 받은 사람의 수 $\times 100$
의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수

- 관절염 관리교육 이수율(≥ 50)은 34.8%였으며 여자는 39.0%로 나타났다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 58.7%보다 감소한 33.1%의 관절염 관리교육 이수율을 보였으며 울산광역시 전체의 16.3%보다 높았다.


라. 이상지질혈증(고지혈증 포함)

(1) 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥ 30)


- 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥ 30)은 의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 30세 이상 사람의 분율(%)로 정의한다.

의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수 $\times 100$
30세 이상 조사대상 응답자 수


- 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥ 30)은 10.5% (남자 9.5%, 여자 11.5%)였으며 연령별로는 60대가 19.0%로 가장 높았고 50대에서도 15.7%로 높게 조사되었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 10.0%와 유사한 10.1%의 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률을 보였으며 울산광역시 전체의 11.7%보다 낮았다.



〈그림 72〉 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)



〈그림 73〉 관절염 관리교육 이수율(≥50)



〈그림 74〉 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30)

【울산 선택지표】

마. 연간 평균 혈압 측정횟수

- 연간 평균 혈압측정 횟수는 최근1년 동안혈압 측정 횟수로 정의한다.

$$\frac{(\text{하루 측정횟수} \times 365\text{일}) + (\text{일주일 측정횟수} \times 52\text{주}) + (\text{한 달 측정횟수} \times 12\text{개월}) + (\text{일 년 측정횟수})}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 연간 평균 혈압측정 횟수는 18.6%였으며 남자와 여자는 각각 22.5%와 14.5%였다. 조율을 이용한 추세비교에서 13년도의 7.5%보다 증가한 18.6%의 평균 혈압측정 횟수를 보였다.

바. 연간 평균 혈당 측정횟수

- 연간 평균 혈당측정 횟수는 최근1년 동안혈당 측정 횟수로 정의한다.

$$\frac{(\text{하루 측정횟수} \times 365\text{일}) + (\text{일주일 측정횟수} \times 52\text{주}) + (\text{한 달 측정횟수} \times 12\text{개월}) + (\text{일 년 측정횟수})}{\text{조사대상 응답자 수}}$$


- 연간 평균 혈당측정 횟수는 7.2%였으며 남자와 여자는 각각 8.2%와 6.1%였다. 조율을 이용한 추세비교에서 13년도의 3.6%보다 증가한 7.2%의 평균 혈당측정 횟수를 보였다.

사. 혈당인지율


- 혈당인지율은 본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$


- 혈당인지율은 전체 9.4%였으며 남자와 여자의 비율 또한 9.4%로 나타났다. 조율을 이용한 추세비교에서 전년도의 11.7%보다 감소한 9.4%의 혈당인지율을 보였다.



〈그림 75〉 연간 평균 혈압 측정횟수



〈그림 76〉 연간 평균 혈당 측정횟수



〈그림 77〉 혈당인지율

3. 의료이용

가. 연간 필요의료서비스 미치료율⁵⁾

- 연간 필요의료서비스 미치료율은 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 비율(%)로 정의한다.


$\frac{\text{최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 연간 필요의료서비스 미치료율은 6.0%(남자 4.7%, 여자 7.4%)였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 11.7% 보다 감소한 6.6%를 보였으며 울산광역시 전체의 8.0% 보다 낮은 미치료율을 보였다.

5) 2008년 지표정의 : 최근 1년간 필요한 의료서비스를 받지 못한 사람 수×100 / 조사대상 인구 수

2009년 지표정의 : 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수

2010년 지표정의 : 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 포함)를 받지 못한 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수




〈그림 78〉 연간 필요의료서비스 미치료율

제 2 부 주요통계결과

IV. 사고 및 중독

1. 연간 사고중독 경험률
2. 연간 낙상 경험률



IV. 사고 및 중독

1. 연간 사고중독 경험률

- 연간 사고중독 경험률은 최근 1년(365일) 동안 병의원이나 응급실 등의 의료기관을 방문한 사고중독을 경험한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{연간 사고중독 경험자 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$


- 연간 사고중독 경험률은 7.4%(남자 7.0%, 여자 7.7%)로 조사되었다. 연령별로는 70세 이상이 9.4%로 가장 높았으며 30대와 40대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도 연간 사고중독 경험률 2.9%보다 증가하였으며 울산광역시 전체 경험률 7.4%와 유사하게 나타났다.

2. 연간 낙상 경험률


- 연간 낙상 경험률은 최근 1년(365일) 동안 낙상을 경험한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{연간 낙상 경험자 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 연간 낙상 경험률은 9.5%이며 남자는 7.7%, 여자는 11.4%로 조사되었다. 연령별로는 70세 이상의 낙상 경험률이 17.0%로 가장 높았고 그 다음으로는 20대, 60대 순이었다.



〈그림 79〉 연간 사고중독 경험률




〈그림 81〉 연간 낙상 경험률

제 2 부 주요통계결과

V. 활동제한 및 삶의 질

1. 양호한 주관적
건강수준 인지율



V. 활동제한 및 삶의 질


1. 양호한 주관적 건강수준 인지율

- 양호한 주관적 건강수준 인지율은 주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음” 이라고 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”이라고
응답한 사람의 수×100

조사대상 응답자 수

- 양호한 주관적 건강수준 인지율은 48.0%(남자 53.5%, 여자 42.1%)였다. 20대가 69.8%로 가장 높은 인지율을 보였으며 30대와 40대가 그 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 양호한 주관적 건강수준 인지율 43.7%보다 증가하였으며 울산광역시 전체의 43.6%보다 높았다.




〈그림 82〉 양호한 주관적 건강수준 인지도

제 2 부 주요통계결과

Ⅵ. 보건기관 이용

1. 보건기관 서비스 만족도



VI. 보건기관 이용

【울산 선택지표】


1. 보건기관 서비스 만족도

- 보건기관 서비스 만족도는 최근 1년(365일) 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 사람이 “대단히 만족한다” 또는 “만족한 편이다”에 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

“대단히 만족한다” 또는 “만족한 편이다”에
응답한 사람의 수 × 100

최근 1년(365일) 동안 보건소(보건의료원),
보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수

- 보건기관 서비스 만족도는 71.4%(남자 78.6%, 여자 66.8%)로 나타났다. 연령별로는 50대에서 80.4%로 가장 높았으며 70세 이상(75.1%), 40대(70.9%)의 순서였다.




〈그림 83〉 보건기관 서비스 만족도

제 2 부 주요통계결과

VII. 여성건강

1. 출산 경험률
2. 모유수유 경험률



VII. 여성건강

【출산 선택지표】

1. 출산 경험률

- 출산 경험률은 출산경험이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

출산경험이 있는 사람의 수×100
여자 조사대상 응답자 수


- 출산 경험률은 전체 80.4%였다. 연령별로는 70세 이상이 98.9%로 가장 높았으며 50대(93.3%), 40대(90.8%), 60대(89.9%), 30대(84.1%), 20대(17.6%)순으로 나타났다.

2. 모유수유 경험률


- 모유수유 경험률은 한 달 이상 모유수유 한 경험이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

한 달 이상 모유수유 한 경험이 있는 사람의 수×100
출산경험이 있는 사람의 수

- 모유수유 경험률은 전체 86.0%였다. 연령별로는 60대가 100.0%로 가장 높았으며 70세 이상(98.7%), 30대(86.5%), 50대(80.8%), 40대(77.2%)순으로 나타났다.



〈그림 84〉 출산 경험률



〈그림 85〉 모유수유 경험률


제3부 통계표

I. 통계표



제 3 부 통계표

I. 통계표



〈표 1〉 현재흡연율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	913	23.0(1.4)	6.1	419	41.6(2.3)	5.4	494	3.3(1.3)	39.5
연령									
19-29	91	24.6(4.2)	17.1	45	41.8(6.3)	15.1	46	2.2(2.2)	100.3
30-39	132	27.5(4.0)	14.7	64	47.8(6.3)	13.1	68	5.7(3.8)	67.1
40-49	204	30.3(2.8)	9.3	91	54.4(4.1)	7.6	113	4.1(2.1)	51.0
50-59	218	21.4(2.9)	13.5	103	38.2(5.2)	13.5	115	2.2(1.3)	58.1
60-69	111	18.2(3.1)	17.0	53	31.0(5.0)	16.0	58	6.4(3.2)	49.9
70 이상	157	5.9(1.6)	26.4	63	14.0(3.9)	27.6	94	0.0(0.0)	.
19-64	717	25.6(1.6)	6.3	333	45.2(2.5)	5.5	384	3.9(1.6)	40.4
65 이상	196	8.8(1.7)	19.1	86	18.5(3.5)	19.0	110	0.6(0.6)	101.5
교육수준 ²⁾									
무학	57	3.9(2.6)	66.9	4	—(—)	—	53	2.0(1.9)	97.3
초등학교	125	11.6(3.2)	27.9	47	23.5(7.1)	30.2	78	3.9(2.1)	53.6
중학교	88	22.5(4.5)	20.1	36	47.5(8.9)	18.7	52	5.4(3.0)	56.3
고등학교	381	30.0(2.3)	7.7	204	47.7(3.5)	7.4	177	4.6(2.1)	45.2
대학교 이상	259	19.0(2.6)	13.4	127	34.8(4.2)	12.2	132	1.3(1.0)	79.2
직업									
전문행정관리	108	23.4(4.5)	19.2	59	39.4(6.7)	16.9	49	0.0(0.0)	.
사무직	85	23.6(5.2)	22.1	48	39.1(7.6)	19.3	37	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	117	22.1(3.9)	17.9	35	47.0(7.9)	16.7	82	7.4(3.4)	45.9
농림어업	42	14.6(7.0)	48.0	24	20.2(10.3)	50.8	18	—(—)	—
기능단순노무직	220	40.5(3.5)	8.7	160	50.5(4.3)	8.5	60	4.4(2.5)	57.5
기타 ³⁾	341	9.7(1.6)	16.7	93	26.6(4.2)	15.7	248	2.8(1.5)	54.7
월 가구소득									
50만원 미만	97	11.7(3.7)	31.4	33	25.1(7.5)	30.0	64	3.7(2.3)	60.8
50-100만원 미만	84	23.9(5.5)	22.9	34	48.3(8.9)	18.5	50	2.3(2.3)	99.2
100-200만원 미만	106	18.4(3.3)	18.0	47	36.5(6.5)	17.8	59	2.7(2.7)	99.8
200-300만원 미만	179	29.6(3.5)	11.9	83	49.3(5.1)	10.4	96	8.3(4.4)	53.0
300-400만원 미만	143	22.0(3.7)	16.8	72	37.0(5.5)	15.0	71	3.3(1.9)	59.3
400-500만원 미만	123	23.3(3.3)	14.1	58	44.1(6.3)	14.3	65	0.9(0.9)	97.9
500-600만원 미만	66	27.2(5.0)	18.4	36	42.5(8.6)	20.2	30	3.1(2.9)	95.0
600만원 이상	111	21.4(4.6)	21.6	54	39.8(8.2)	20.5	57	0.0(0.0)	.

주 : 1) 현재흡연율 : (평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수 / 조사대상 응답자 수 × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 2〉 흡연시작연령¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	346	20.3(0.2)	0.9	328	20.0(0.2)	0.9	18	-(-)	-
연령									
19-29	22	17.9(0.5)	2.5	21	17.9(0.5)	2.6	1	-(-)	-
30-39	51	19.2(0.4)	1.8	47	19.3(0.4)	1.9	4	-(-)	-
40-49	80	20.6(0.4)	1.9	76	20.3(0.4)	1.8	4	-(-)	-
50-59	90	20.6(0.4)	1.8	87	20.3(0.3)	1.6	3	-(-)	-
60-69	48	22.1(0.9)	4.1	43	20.5(0.6)	2.8	5	-(-)	-
70 이상	55	21.6(0.6)	2.9	54	21.4(0.6)	2.8	1	-(-)	-
19-64	271	20.0(0.2)	0.9	256	19.8(0.2)	0.9	15	-(-)	-
65 이상	75	21.9(0.6)	2.7	72	21.3(0.5)	2.5	3	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	5	-(-)	-	4	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	44	21.5(0.9)	4.4	40	20.6(0.9)	4.2	4	-(-)	-
중학교	36	23.9(1.0)	4.2	32	22.5(0.8)	3.5	4	-(-)	-
고등학교	167	19.7(0.2)	1.2	161	19.6(0.2)	1.2	6	-(-)	-
대학교 이상	93	20.0(0.2)	1.0	90	20.0(0.2)	1.1	3	-(-)	-
직업									
전문행정관리	48	20.7(0.4)	1.9	48	20.7(0.4)	1.9	0	-(-)	-
사무직	37	20.2(0.6)	3.1	37	20.2(0.6)	3.1	0	-(-)	-
판매·서비스직	30	21.3(0.8)	3.6	24	19.7(0.6)	3.2	6	-(-)	-
농림어업	19	-(-)	-	18	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	134	19.7(0.2)	1.3	130	19.6(0.2)	1.2	4	-(-)	-
기타 ³⁾	78	20.4(0.6)	2.9	71	20.0(0.5)	2.7	7	-(-)	-
월 가구소득									
50만원 미만	32	21.4(1.1)	5.3	29	20.6(1.1)	5.3	3	-(-)	-
50-100만원 미만	27	19.1(0.4)	2.1	26	19.0(0.4)	2.0	1	-(-)	-
100-200만원 미만	37	20.0(0.6)	2.9	36	20.2(0.6)	3.1	1	-(-)	-
200-300만원 미만	74	20.1(0.5)	2.2	69	20.0(0.5)	2.4	5	-(-)	-
300-400만원 미만	56	20.4(0.6)	2.7	52	19.8(0.5)	2.5	4	-(-)	-
400-500만원 미만	46	20.1(0.4)	1.8	44	19.9(0.3)	1.5	2	-(-)	-
500-600만원 미만	30	20.1(0.4)	2.1	29	19.9(0.3)	1.3	1	-(-)	-
600만원 이상	42	20.4(0.5)	2.3	42	20.4(0.5)	2.3	0	-(-)	-

주 : 1) 흡연시작연령 : 처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 3〉 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량¹⁾

(단위 : %, 개비)

구분	N	10개비 미만		10-19개비		20-39개비		40개비 이상		평균	
		%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	개비 (표준오차)	변동 계수
전체	163	15.2(3.3)	21.7	35.7(4.2)	11.6	48.4(4.9)	10.1	0.7(0.5)	71.8	15.0(0.6)	4.3
성											
남자	149	14.7(3.4)	23.3	35.3(4.3)	12.1	49.3(4.9)	10.0	0.7(0.5)	71.6	15.2(0.6)	4.3
여자	14	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
연령											
19-29	18	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
30-39	27	17.2(8.1)	47.1	57.7(9.5)	16.5	25.2(8.4)	33.6	0.0(0.0)	.	11.9(1.1)	9.1
40-49	48	7.7(3.7)	47.6	28.1(7.4)	26.2	64.2(7.6)	11.9	0.0(0.0)	.	16.9(0.9)	5.3
50-59	39	6.6(3.7)	55.9	25.8(6.3)	24.5	66.0(6.6)	10.0	1.5(1.6)	100.9	18.1(0.9)	5.1
60-69	22	33.1(8.3)	25.1	26.9(8.4)	31.2	34.8(10.2)	29.3	5.3(5.2)	98.5	13.9(1.8)	12.9
70 이상	9	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
19-64	145	13.7(3.5)	25.6	35.8(4.4)	12.4	50.2(5.1)	10.1	0.3(0.3)	100.8	15.1(0.7)	4.4
65 이상	18	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
교육수준 ²⁾											
무학	2	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
초등학교	13	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
중학교	19	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
고등학교	92	12.7(4.0)	31.6	41.5(5.7)	13.7	45.7(6.2)	13.6	0.0(0.0)	.	14.5(0.7)	5.1
대학교 이상	36	16.0(7.4)	46.3	28.2(7.7)	27.5	54.6(9.4)	17.3	1.3(1.3)	102.7	16.0(1.4)	8.6
직업											
전문행정관리	17	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
사무직	17	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
판매·서비스직	19	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
농림어업	6	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
기능단순노무직	75	7.1(3.8)	53.7	38.2(6.2)	16.2	53.9(6.5)	12.0	0.8(0.8)	100.0	16.3(0.9)	5.3
기타 ³⁾	29	26.8(8.8)	33.0	43.7(9.5)	21.7	29.5(8.6)	29.1	0.0(0.0)	.	11.5(1.2)	10.0
월 가구소득											
50만원미만	11	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
50-100만원미만	16	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
100-200만원 미만	16	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
200-300만원 미만	39	8.3(4.5)	54.7	41.0(7.7)	18.8	50.8(8.5)	16.7	0.0(0.0)	.	15.2(1.0)	6.6
300-400만원 미만	27	22.7(8.0)	35.3	33.5(9.8)	29.2	43.8(9.6)	21.8	0.0(0.0)	.	13.9(1.3)	9.2
400-500만원 미만	20	19.7(11.0)	55.6	36.5(12.1)	33.2	43.8(12.6)	28.9	0.0(0.0)	.	14.1(1.7)	11.8
500-600만원 미만	16	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
600만원이상	17	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—

주 : 1) 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량 : 평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 매일 흡연자의 하루 평균 흡연개비 수의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일 흡연자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 4〉 현재흡연자의 금연시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	176	30.8(3.3)	10.6	162	31.4(3.4)	10.9	14	-(-)	-
연령									
19-29	19	-(-)	-	18	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	31	31.5(7.2)	23.0	29	34.9(8.5)	24.4	2	-(-)	-
40-49	53	34.6(6.5)	18.8	49	35.4(6.8)	19.2	4	-(-)	-
50-59	42	31.5(7.2)	22.8	39	31.1(7.2)	23.0	3	-(-)	-
60-69	22	21.1(9.0)	42.8	18	-(-)	-	4	-(-)	-
70 이상	9	-(-)	-	9	-(-)	-	0	-(-)	-
19-64	158	32.4(3.4)	10.5	145	33.1(3.6)	10.8	13	-(-)	-
65 이상	18	-(-)	-	17	-(-)	-	1	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	13	-(-)	-	10	-(-)	-	3	-(-)	-
중학교	20	32.1(8.6)	26.8	17	-(-)	-	3	-(-)	-
고등학교	96	29.6(4.2)	14.2	91	30.8(4.6)	14.8	5	-(-)	-
대학교 이상	44	37.1(7.2)	19.4	42	38.3(7.3)	19.2	2	-(-)	-
직업									
전문행정관리	22	35.9(10.1)	28.3	22	35.9(10.1)	28.3	0	-(-)	-
사무직	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
판매·서비스직	22	26.6(9.9)	37.3	17	-(-)	-	5	-(-)	-
농림어업	6	-(-)	-	5	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	79	31.5(5.2)	16.4	76	30.5(5.3)	17.2	3	-(-)	-
기타 ³⁾	30	9.2(5.7)	61.9	25	11.6(6.9)	59.8	5	-(-)	-
월 가구소득									
50만원 미만	11	-(-)	-	8	-(-)	-	3	-(-)	-
50-100만원 미만	16	-(-)	-	15	-(-)	-	1	-(-)	-
100-200만원 미만	16	-(-)	-	15	-(-)	-	1	-(-)	-
200-300만원 미만	42	30.2(6.4)	21.1	38	34.9(7.3)	20.8	4	-(-)	-
300-400만원 미만	28	42.7(10.1)	23.7	25	40.2(10.6)	26.4	3	-(-)	-
400-500만원 미만	25	30.6(9.4)	30.5	24	31.2(9.5)	30.5	1	-(-)	-
500-600만원 미만	17	-(-)	-	16	-(-)	-	1	-(-)	-
600만원 이상	20	27.7(7.8)	28.2	20	27.7(7.8)	28.2	0	-(-)	-

주 : 1) 현재흡연자의 금연시도율 : (최근 1년(365일) 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수 / 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 5〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	176	5.2(1.7)	32.5	162	5.6(1.8)	32.0	14	-()	-
연령									
19-29	19	-()	-	18	-()	-	1	-()	-
30-39	31	2.6(2.6)	99.2	29	2.9(2.8)	98.8	2	-()	-
40-49	53	12.0(4.5)	37.6	49	12.8(4.7)	36.9	4	-()	-
50-59	42	3.1(1.8)	58.0	39	3.2(1.9)	57.9	3	-()	-
60-69	22	4.3(4.2)	97.7	18	-()	-	4	-()	-
70 이상	9	-()	-	9	-()	-	0	-()	-
19-64	158	5.6(1.8)	32.6	145	6.0(1.9)	32.1	13	-()	-
65 이상	18	-()	-	17	-()	-	1	-()	-
교육수준 ²⁾									
무학	2	-()	-	1	-()	-	1	-()	-
초등학교	13	-()	-	10	-()	-	3	-()	-
중학교	20	3.9(3.7)	93.8	17	-()	-	3	-()	-
고등학교	96	3.7(1.8)	48.3	91	3.9(1.9)	47.8	5	-()	-
대학교 이상	44	10.2(4.6)	44.5	42	10.6(4.7)	44.4	2	-()	-
직업									
전문행정관리	22	15.6(7.7)	49.6	22	15.6(7.7)	49.6	0	-()	-
사무직	17	-()	-	17	-()	-	0	-()	-
판매·서비스직	22	9.7(6.5)	66.8	17	-()	-	5	-()	-
농림어업	6	-()	-	5	-()	-	1	-()	-
기능단순노무직	79	4.0(2.1)	52.3	76	4.1(2.1)	52.1	3	-()	-
기타 ³⁾	30	0.0(0.0)	.	25	0.0(0.0)	.	5	-()	-
월 가구소득									
50만원 미만	11	-()	-	8	-()	-	3	-()	-
50-100만원 미만	16	-()	-	15	-()	-	1	-()	-
100-200만원 미만	16	-()	-	15	-()	-	1	-()	-
200-300만원 미만	42	3.4(2.5)	73.0	38	3.9(2.8)	72.3	4	-()	-
300-400만원 미만	28	0.0(0.0)	.	25	0.0(0.0)	.	3	-()	-
400-500만원 미만	25	5.7(4.4)	76.7	24	5.8(4.4)	76.6	1	-()	-
500-600만원 미만	17	-()	-	16	-()	-	1	-()	-
600만원 이상	20	12.1(7.3)	60.7	20	12.1(7.3)	60.7	0	-()	-

주 : 1) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률 : 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 중 (1개월(30일) 내 금연계획이 있는 사람의 수 / 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 6〉 연간 금연교육 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	913	9.7(1.0)	10.3	419	12.8(1.5)	11.9	494	6.4(1.2)	19.1
연령									
19-29	91	19.9(4.2)	20.9	45	23.2(5.6)	24.1	46	15.7(5.7)	36.4
30-39	132	12.2(2.5)	20.6	64	15.9(4.4)	27.5	68	8.3(2.8)	33.3
40-49	204	9.4(2.4)	25.9	91	12.5(3.8)	30.1	113	5.9(2.4)	40.5
50-59	218	7.9(1.8)	22.7	103	10.2(2.6)	25.7	115	5.2(1.9)	36.5
60-69	111	2.3(1.4)	60.2	53	2.5(1.8)	71.0	58	2.0(2.0)	99.5
70 이상	157	1.2(0.8)	69.6	63	2.9(2.0)	68.6	94	0.0(0.0)	.
19-64	717	11.3(1.2)	10.3	333	14.5(1.7)	11.7	384	7.7(1.5)	19.4
65 이상	196	1.0(0.7)	69.8	86	2.1(1.5)	69.4	110	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	57	0.0(0.0)	.	4	-(-)	-	53	0.0(0.0)	.
초등학교	125	2.3(1.3)	57.2	47	3.3(2.3)	69.8	78	1.6(1.6)	98.8
중학교	88	2.6(1.9)	75.3	36	0.0(0.0)	.	52	4.3(3.3)	75.0
고등학교	381	11.1(1.9)	16.8	204	14.7(2.6)	17.8	177	5.9(1.9)	32.9
대학교 이상	259	13.0(2.1)	16.0	127	14.6(2.8)	19.1	132	11.2(2.6)	23.1
직업									
전문행정관리	108	12.8(3.2)	25.1	59	12.2(4.2)	34.7	49	13.6(4.8)	35.4
사무직	85	5.5(2.5)	45.1	48	7.6(3.6)	47.8	37	2.2(2.3)	101.3
판매·서비스직	117	11.3(3.9)	34.3	35	16.6(6.6)	40.0	82	8.3(3.4)	40.7
농림어업	42	0.0(0.0)	.	24	0.0(0.0)	.	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	11.5(1.9)	16.7	160	13.3(2.4)	17.8	60	4.7(2.8)	59.7
기타 ³⁾	341	8.7(1.7)	19.2	93	16.3(4.6)	28.0	248	5.6(1.7)	30.5
월 가구소득									
50만원 미만	97	5.4(3.4)	61.5	33	8.1(7.0)	86.4	64	3.9(3.0)	77.8
50-100만원 미만	84	8.0(3.0)	37.8	34	14.4(5.6)	39.3	50	2.3(2.3)	99.2
100-200만원 미만	106	5.3(3.3)	62.0	47	6.3(3.8)	59.4	59	4.5(3.1)	69.1
200-300만원 미만	179	14.7(2.6)	17.7	83	16.5(4.3)	26.0	96	12.6(3.4)	26.8
300-400만원 미만	143	10.5(2.5)	23.6	72	11.3(3.9)	34.0	71	9.5(3.6)	38.0
400-500만원 미만	123	10.8(2.5)	22.9	58	15.5(4.1)	26.1	65	5.6(3.0)	53.8
500-600만원 미만	66	7.0(3.0)	42.0	36	8.1(3.5)	42.8	30	5.3(5.1)	95.9
600만원 이상	111	8.8(3.2)	36.1	54	15.2(5.5)	36.4	57	1.3(1.3)	100.2

주 : 1) 연간 금연교육 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 흡연예방 및 금연교육을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 7〉 연간 금연캠페인 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	87.5(1.1)	1.3	418	89.9(1.5)	1.6	491	85.0(1.4)	1.6
연령									
19-29	91	90.5(2.9)	3.2	45	88.6(4.6)	5.2	46	93.0(3.2)	3.5
30-39	132	95.3(1.7)	1.7	64	98.6(1.4)	1.4	68	91.9(3.0)	3.2
40-49	204	89.7(2.2)	2.4	91	90.8(3.2)	3.5	113	88.5(3.0)	3.3
50-59	218	91.6(2.3)	2.5	103	91.4(3.0)	3.3	115	91.8(2.7)	2.9
60-69	111	81.0(4.6)	5.7	53	85.4(5.4)	6.3	58	77.0(5.7)	7.4
70 이상	153	65.0(3.8)	5.8	62	74.6(4.8)	6.4	91	57.8(4.8)	8.3
19-64	717	91.1(1.3)	1.4	333	92.1(1.6)	1.8	384	90.0(1.5)	1.6
65 이상	192	67.2(3.1)	4.6	85	75.9(3.5)	4.6	107	59.8(4.3)	7.2
교육수준 ²⁾									
무학	54	51.7(6.1)	11.8	4	—(—)	—	50	49.8(5.9)	11.8
초등학교	124	69.2(4.7)	6.8	46	77.4(6.8)	8.8	78	63.8(5.9)	9.2
중학교	88	89.9(2.8)	3.1	36	90.5(4.4)	4.8	52	89.5(3.7)	4.2
고등학교	381	90.7(1.8)	1.9	204	90.1(2.3)	2.6	177	91.6(2.2)	2.4
대학교 이상	259	92.2(1.5)	1.6	127	92.5(2.1)	2.3	132	91.9(2.1)	2.3
직업									
전문행정관리	108	94.0(1.9)	2.0	59	96.4(2.4)	2.5	49	90.6(3.4)	3.8
사무직	85	88.7(3.7)	4.2	48	92.5(3.9)	4.2	37	83.0(6.5)	7.8
판매·서비스직	117	92.1(2.9)	3.2	35	91.0(5.2)	5.8	82	92.7(2.8)	3.0
농림어업	42	69.1(9.1)	13.1	24	74.7(8.7)	11.7	18	—(—)	—
기능단순노무직	220	91.9(2.1)	2.3	160	92.5(2.1)	2.3	60	89.7(4.3)	4.8
기타 ³⁾	337	80.7(1.9)	2.4	92	79.2(3.8)	4.7	245	81.3(2.0)	2.5
월 가구소득									
50만원 미만	95	53.3(4.2)	7.8	33	57.5(6.2)	10.8	62	50.6(4.9)	9.6
50-100만원 미만	84	77.5(4.7)	6.0	34	82.4(6.1)	7.4	50	73.2(5.8)	7.9
100-200만원 미만	104	91.2(2.5)	2.7	46	91.3(3.8)	4.2	58	91.2(3.6)	3.9
200-300만원 미만	179	93.7(1.8)	1.9	83	97.0(1.6)	1.6	96	90.1(2.7)	3.0
300-400만원 미만	143	89.7(2.8)	3.1	72	89.6(3.9)	4.3	71	89.8(3.6)	4.0
400-500만원 미만	123	92.2(2.1)	2.3	58	95.1(2.4)	2.5	65	89.2(3.5)	3.9
500-600만원 미만	66	91.5(3.8)	4.2	36	88.8(6.5)	7.3	30	95.9(4.2)	4.3
600만원 이상	111	89.2(3.7)	4.1	54	90.5(4.5)	5.0	57	87.8(3.6)	4.1

주 : 1) 연간 금연캠페인 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 금연에 대한 공익광고(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 8〉 금연구역 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	913	92.3(0.8)	0.9	419	95.9(0.8)	0.8	494	88.5(1.3)	1.4
연령									
19-29	91	95.9(1.7)	1.7	45	94.9(2.2)	2.3	46	97.1(2.7)	2.7
30-39	132	98.8(0.9)	0.9	64	98.6(1.4)	1.4	68	98.9(1.1)	1.1
40-49	204	99.6(0.4)	0.4	91	100.0(0.0)	0.0	113	99.2(0.8)	0.8
50-59	218	97.4(1.2)	1.2	103	99.1(0.1)	0.1	115	95.5(2.4)	2.5
60-69	111	87.9(2.8)	3.2	53	91.1(3.9)	4.3	58	85.1(4.5)	5.3
70 이상	157	58.2(4.2)	7.1	63	79.8(4.7)	5.8	94	42.6(5.1)	12.0
19-64	717	97.5(0.5)	0.5	333	97.7(0.6)	0.6	384	97.3(0.9)	0.9
65 이상	196	63.7(3.5)	5.5	86	84.3(3.6)	4.3	110	46.3(4.7)	10.2
교육수준 ²⁾									
무학	57	36.6(6.8)	18.5	4	-(-)	-	53	33.7(6.0)	17.8
초등학교	125	71.6(3.3)	4.6	47	82.1(5.4)	6.6	78	64.7(4.9)	7.5
중학교	88	91.0(3.2)	3.6	36	94.4(3.3)	3.5	52	88.7(4.5)	5.0
고등학교	381	96.9(0.8)	0.8	204	96.1(1.0)	1.1	177	98.0(1.2)	1.3
대학교 이상	259	99.6(0.4)	0.4	127	99.2(0.8)	0.8	132	100.0(0.0)	0.0
직업									
전문행정관리	108	98.6(1.1)	1.1	59	97.6(1.8)	1.8	49	100.0(0.0)	0.0
사무직	85	100.0(0.0)	0.0	48	100.0(0.0)	0.0	37	100.0(0.0)	0.0
판매·서비스직	117	99.2(0.8)	0.8	35	100.0(0.0)	0.0	82	98.8(1.2)	1.2
농림어업	42	72.0(7.1)	9.9	24	80.6(10.4)	12.9	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	98.6(0.6)	0.6	160	98.3(0.8)	0.8	60	100.0(0.0)	0.0
기타 ³⁾	341	81.0(2.2)	2.7	93	87.0(3.1)	3.6	248	78.6(2.6)	3.2
월 가구소득									
50만원 미만	97	61.4(5.5)	8.9	33	79.7(7.0)	8.7	64	50.4(5.9)	11.6
50-100만원 미만	84	79.3(4.2)	5.3	34	91.0(5.0)	5.5	50	69.0(7.0)	10.2
100-200만원 미만	106	93.5(2.4)	2.5	47	94.7(2.3)	2.4	59	92.5(3.3)	3.6
200-300만원 미만	179	95.0(1.5)	1.6	83	98.4(1.0)	1.0	96	91.4(2.8)	3.1
300-400만원 미만	143	95.2(1.2)	1.3	72	95.1(1.6)	1.7	71	95.3(1.9)	2.0
400-500만원 미만	123	98.0(1.2)	1.2	58	97.3(1.9)	2.0	65	98.6(1.3)	1.4
500-600만원 미만	66	100.0(0.0)	0.0	36	100.0(0.0)	0.0	30	100.0(0.0)	0.0
600만원 이상	111	97.6(1.6)	1.7	54	98.4(1.6)	1.7	57	96.8(2.7)	2.8

주 : 1) 금연구역 인지율 : (금연구역이 “지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다” 또는 “지정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 9〉 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	75	26.4(5.6)	21.1	70	27.9(5.8)	20.8	5	—(—)	—
연령									
19-29	10	—(—)	—	9	—(—)	—	1	—(—)	—
30-39	13	—(—)	—	13	—(—)	—	0	—(—)	—
40-49	23	15.4(7.4)	47.8	22	16.5(7.7)	46.7	1	—(—)	—
50-59	19	—(—)	—	17	—(—)	—	2	—(—)	—
60-69	9	—(—)	—	8	—(—)	—	1	—(—)	—
70 이상	1	—(—)	—	1	—(—)	—	0	—(—)	—
19-64	68	26.1(5.7)	21.8	64	27.5(5.9)	21.5	4	—(—)	—
65 이상	7	—(—)	—	6	—(—)	—	1	—(—)	—
교육수준 ²⁾									
무학	0	—(—)	—	0	—(—)	—	0	—(—)	—
초등학교	5	—(—)	—	3	—(—)	—	2	—(—)	—
중학교	5	—(—)	—	5	—(—)	—	0	—(—)	—
고등학교	46	29.8(6.5)	21.8	45	30.7(6.7)	21.8	1	—(—)	—
대학교 이상	18	—(—)	—	16	—(—)	—	2	—(—)	—
직업									
전문행정관리	9	—(—)	—	9	—(—)	—	0	—(—)	—
사무직	8	—(—)	—	8	—(—)	—	0	—(—)	—
판매·서비스직	13	—(—)	—	10	—(—)	—	3	—(—)	—
농림어업	2	—(—)	—	2	—(—)	—	0	—(—)	—
기능단순노무직	34	36.6(9.6)	26.2	34	36.6(9.6)	26.2	0	—(—)	—
기타 ³⁾	9	—(—)	—	7	—(—)	—	2	—(—)	—
월 가구소득									
50만원 미만	6	—(—)	—	4	—(—)	—	2	—(—)	—
50-100만원 미만	8	—(—)	—	8	—(—)	—	0	—(—)	—
100-200만원 미만	6	—(—)	—	5	—(—)	—	1	—(—)	—
200-300만원 미만	23	43.1(8.6)	20.1	22	46.1(9.0)	19.5	1	—(—)	—
300-400만원 미만	9	—(—)	—	8	—(—)	—	1	—(—)	—
400-500만원 미만	8	—(—)	—	8	—(—)	—	0	—(—)	—
500-600만원 미만	9	—(—)	—	9	—(—)	—	0	—(—)	—
600만원 이상	5	—(—)	—	5	—(—)	—	0	—(—)	—

주 : 1) 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률 : (금연구역 내에서 “항상 흡연한다” 또는 “가끔 흡연한다”에 응답한 사람의 수 / 금연구역이 지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있는 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 10〉 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	737	5.9(0.8)	14.3	257	2.0(0.9)	44.4	480	8.3(1.2)	14.7
연령									
19-29	72	7.8(3.1)	39.0	27	5.1(3.8)	74.9	45	9.9(4.4)	44.7
30-39	101	6.1(2.0)	33.5	35	0.0(0.0)	.	66	9.7(3.1)	31.9
40-49	151	5.2(1.8)	35.1	42	2.4(2.4)	98.7	109	6.6(2.5)	37.6
50-59	176	6.6(1.5)	22.8	64	1.5(0.2)	12.6	112	10.3(2.5)	24.6
60-69	89	3.7(2.3)	61.9	35	0.0(0.0)	.	54	6.2(3.8)	60.6
70 이상	148	4.8(1.8)	38.7	54	1.8(1.8)	100.8	94	6.6(2.6)	38.6
19-64	559	6.2(0.9)	15.1	188	2.1(1.0)	48.8	371	8.7(1.4)	15.6
65 이상	178	4.4(1.6)	36.6	69	1.4(1.4)	100.7	109	6.5(2.4)	36.5
교육수준 ²⁾									
무학	55	7.6(3.2)	42.0	3	-(-)	-	52	8.1(3.4)	41.5
초등학교	112	6.3(2.5)	40.2	37	2.8(2.8)	101.2	75	8.1(3.7)	45.4
중학교	68	9.0(3.7)	41.0	19	-(-)	-	49	12.5(4.9)	39.2
고등학교	285	7.7(1.6)	20.2	113	3.6(1.8)	48.4	172	10.9(2.4)	21.8
대학교 이상	215	2.3(0.9)	37.5	85	0.0(0.0)	.	130	4.0(1.4)	35.6
직업									
전문행정관리	86	2.4(1.2)	51.7	37	0.0(0.0)	.	49	4.4(2.4)	54.5
사무직	68	6.7(3.1)	46.6	31	3.4(3.4)	98.4	37	9.7(4.9)	50.5
판매·서비스직	95	8.7(2.2)	25.9	18	-(-)	-	77	11.6(3.2)	27.2
농림어업	36	9.1(5.9)	64.7	19	-(-)	-	17	-(-)	-
기능단순노무직	141	4.0(1.6)	38.6	84	1.0(0.1)	10.9	57	9.8(4.3)	43.7
기타 ³⁾	311	6.5(1.6)	24.0	68	4.0(3.0)	74.8	243	7.3(1.9)	25.8
월 가구소득									
50만원 미만	86	4.4(2.2)	49.2	25	0.0(0.0)	.	61	6.4(3.3)	51.4
50-100만원 미만	68	5.5(2.1)	39.0	19	-(-)	-	49	8.0(3.1)	38.3
100-200만원 미만	90	5.9(2.3)	38.5	32	0.0(0.0)	.	58	9.3(3.5)	38.0
200-300만원 미만	137	8.6(2.6)	29.9	45	1.5(1.5)	99.7	92	12.9(3.7)	28.4
300-400만원 미만	115	6.4(2.6)	40.4	47	6.9(4.0)	58.5	68	6.0(3.0)	50.3
400-500만원 미만	98	3.7(2.1)	56.5	34	2.2(0.4)	19.0	64	4.7(3.3)	69.9
500-600만원 미만	49	7.7(4.4)	57.6	20	0.0(0.0)	.	29	14.8(8.1)	54.4
600만원 이상	91	3.7(1.9)	51.3	34	0.0(0.0)	.	57	6.3(2.9)	45.7

주 : 1) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 : (최근 1주일(7일) 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 현재비흡연자(과거 흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 11〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	425	23.8(2.4)	9.9	189	32.5(3.9)	12.1	236	15.5(2.6)	16.9
연령									
19-29	44	26.1(6.1)	23.4	15	-()	-	29	9.0(4.2)	46.6
30-39	74	23.1(4.8)	20.8	34	27.8(6.6)	23.8	40	18.4(6.4)	35.1
40-49	116	27.1(5.2)	19.3	42	40.3(8.2)	20.4	74	16.6(5.4)	32.6
50-59	113	25.2(4.7)	18.7	55	32.6(6.2)	19.1	58	16.5(7.2)	43.3
60-69	51	13.4(4.6)	34.3	27	10.0(5.9)	59.4	24	17.1(7.5)	43.7
70 이상	27	11.8(5.8)	48.6	16	-()	-	11	-()	-
19-64	384	24.6(2.6)	10.4	164	34.2(4.2)	12.3	220	15.9(2.8)	17.5
65 이상	41	12.6(5.3)	42.1	25	15.2(7.7)	50.4	16	-()	-
교육수준 ²⁾									
무학	5	-()	-	0	-()	-	5	-()	-
초등학교	39	12.2(5.2)	42.5	16	-()	-	23	16.6(8.0)	48.1
중학교	37	15.4(6.1)	39.2	10	-()	-	27	9.4(5.4)	57.3
고등학교	179	24.8(4.2)	17.0	84	29.6(5.8)	19.6	95	19.8(4.7)	23.6
대학교 이상	165	26.0(2.8)	10.6	79	38.3(5.1)	13.5	86	12.9(4.0)	31.2
직업									
전문행정관리	86	22.1(5.4)	24.2	37	35.0(8.1)	23.2	49	10.8(4.4)	40.4
사무직	68	32.9(5.3)	16.1	31	41.6(8.4)	20.3	37	24.9(6.5)	25.9
판매·서비스직	95	14.3(4.0)	28.0	18	-()	-	77	10.0(4.4)	43.8
농림어업	35	10.4(6.1)	59.2	19	-()	-	16	-()	-
기능단순노무직	141	28.5(4.5)	15.8	84	31.8(5.4)	16.9	57	22.4(6.3)	28.1
기타 ³⁾	0	-()	-	0	-()	-	0	-()	-
월 가구소득									
50만원 미만	5	-()	-	2	-()	-	3	-()	-
50-100만원 미만	32	10.0(4.7)	47.2	10	-()	-	22	9.7(6.0)	61.9
100-200만원 미만	44	29.1(6.9)	23.6	19	-()	-	25	29.1(10.4)	35.8
200-300만원 미만	89	13.5(3.9)	29.1	39	17.6(6.7)	38.3	50	9.4(4.6)	48.4
300-400만원 미만	78	36.0(6.0)	16.6	39	52.2(7.8)	14.8	39	16.9(6.6)	38.9
400-500만원 미만	68	27.1(5.0)	18.6	32	35.8(7.7)	21.6	36	17.6(6.4)	36.2
500-600만원 미만	37	7.6(4.2)	55.0	16	-()	-	21	15.9(7.5)	47.1
600만원 이상	70	29.6(6.4)	21.5	31	48.0(11.2)	23.3	39	14.3(6.3)	44.3

주 : 1) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 : (최근 1주일(7일) 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 일을 하고 있는 현재 비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 12〉 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	737	89.7(1.0)	1.1	257	91.6(1.8)	1.9	480	88.6(1.2)	1.3
연령									
19-29	72	92.9(2.2)	2.4	27	92.0(4.3)	4.7	45	93.6(2.3)	2.5
30-39	101	97.2(1.4)	1.5	35	97.0(3.0)	3.1	66	97.3(1.3)	1.4
40-49	151	89.4(2.6)	2.9	42	95.8(2.9)	3.0	109	86.1(3.6)	4.2
50-59	176	91.2(2.1)	2.3	64	92.1(3.1)	3.3	112	90.6(2.9)	3.2
60-69	89	89.0(2.9)	3.3	35	84.8(5.5)	6.5	54	91.9(3.4)	3.7
70 이상	148	76.8(2.9)	3.7	54	83.2(4.2)	5.0	94	72.8(4.1)	5.6
19-64	559	92.2(1.0)	1.1	188	93.4(1.8)	1.9	371	91.4(1.2)	1.3
65 이상	178	78.7(2.5)	3.2	69	83.9(3.6)	4.3	109	75.2(3.5)	4.7
교육수준 ²⁾									
무학	55	78.5(5.2)	6.6	3	-(-)	-	52	77.1(5.4)	7.0
초등학교	112	80.7(2.9)	3.6	37	81.1(5.2)	6.4	75	80.5(3.4)	4.2
중학교	68	85.0(3.7)	4.4	19	-(-)	-	49	88.3(4.1)	4.6
고등학교	285	90.6(1.7)	1.9	113	91.8(2.6)	2.8	172	89.7(2.3)	2.6
대학교 이상	215	94.4(1.4)	1.5	85	95.9(2.0)	2.1	130	93.2(1.6)	1.7
직업									
전문행정관리	86	93.1(2.5)	2.7	37	98.0(2.0)	2.0	49	88.7(3.5)	3.9
사무직	68	90.7(3.5)	3.8	31	96.6(3.4)	3.5	37	85.3(5.8)	6.8
판매·서비스직	95	89.7(3.5)	3.9	18	-(-)	-	77	87.6(4.2)	4.9
농림어업	36	97.8(2.3)	2.4	19	-(-)	-	17	-(-)	-
기능단순노무직	141	91.2(2.6)	2.8	84	90.9(3.3)	3.7	57	91.7(3.4)	3.7
기타 ³⁾	311	86.9(1.3)	1.5	68	82.6(3.2)	3.9	243	88.2(1.7)	1.9
월 가구소득									
50만원 미만	86	68.8(4.8)	7.0	25	67.8(8.0)	11.8	61	69.3(6.6)	9.5
50-100만원 미만	68	82.3(5.8)	7.0	19	-(-)	-	49	75.7(7.3)	9.6
100-200만원 미만	90	87.2(3.5)	4.0	32	86.4(4.8)	5.6	58	87.6(4.7)	5.3
200-300만원 미만	137	94.1(1.8)	1.9	45	95.3(3.3)	3.5	92	93.4(2.3)	2.4
300-400만원 미만	115	92.0(3.3)	3.6	47	87.1(5.4)	6.2	68	96.0(2.0)	2.0
400-500만원 미만	98	95.1(2.0)	2.1	34	97.7(2.3)	2.3	64	93.5(2.8)	3.0
500-600만원 미만	49	90.9(4.5)	4.9	20	90.9(8.6)	9.5	29	90.9(6.1)	6.7
600만원 이상	91	93.3(2.7)	2.9	34	100.0(0.0)	0.0	57	88.6(3.8)	4.3

주 : 1) 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률 : (공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 13〉 현재흡연자의 의료인 금연권고 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	176	25.1(3.1)	12.5	162	26.1(3.2)	12.4	14	-()	-
연령									
19-29	19	-()	-	18	-()	-	1	-()	-
30-39	31	22.2(8.2)	37.1	29	24.6(8.8)	35.6	2	-()	-
40-49	53	34.0(6.1)	17.9	49	35.4(6.2)	17.5	4	-()	-
50-59	42	32.1(6.7)	20.9	39	33.7(7.1)	21.0	3	-()	-
60-69	22	35.2(11.1)	31.6	18	-()	-	4	-()	-
70 이상	9	-()	-	9	-()	-	0	-()	-
19-64	158	24.4(3.2)	13.2	145	25.7(3.3)	13.0	13	-()	-
65 이상	18	-()	-	17	-()	-	1	-()	-
교육수준 ²⁾									
무학	2	-()	-	1	-()	-	1	-()	-
초등학교	13	-()	-	10	-()	-	3	-()	-
중학교	20	20.6(9.5)	46.0	17	-()	-	3	-()	-
고등학교	96	29.4(4.4)	15.0	91	30.9(4.5)	14.7	5	-()	-
대학교 이상	44	19.5(5.9)	30.3	42	20.2(6.1)	30.2	2	-()	-
직업									
전문행정관리	22	33.7(10.3)	30.4	22	33.7(10.3)	30.4	0	-()	-
사무직	17	-()	-	17	-()	-	0	-()	-
판매·서비스직	22	3.6(3.5)	99.0	17	-()	-	5	-()	-
농림어업	6	-()	-	5	-()	-	1	-()	-
기능단순노무직	79	32.0(4.9)	15.2	76	32.1(5.0)	15.7	3	-()	-
기타 ³⁾	30	21.2(6.8)	32.2	25	22.5(7.8)	34.5	5	-()	-
월 가구소득									
50만원 미만	11	-()	-	8	-()	-	3	-()	-
50-100만원 미만	16	-()	-	15	-()	-	1	-()	-
100-200만원 미만	16	-()	-	15	-()	-	1	-()	-
200-300만원 미만	42	24.6(6.7)	27.1	38	28.5(7.3)	25.8	4	-()	-
300-400만원 미만	28	17.2(8.7)	50.3	25	16.9(9.4)	55.8	3	-()	-
400-500만원 미만	25	32.5(9.4)	28.9	24	31.2(9.7)	31.1	1	-()	-
500-600만원 미만	17	-()	-	16	-()	-	1	-()	-
600만원 이상	20	22.8(7.3)	32.1	20	22.8(7.3)	32.1	0	-()	-

주 : 1) 현재흡연자의 의료인 금연권고 경험률 : (최근 1년 동안 의사, 치과의사, 한의사, 간호사로부터 담배를 끊으라는 말을 들은 적이 있는 사람의 수 / 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 14〉 담뱃값 인상 영향 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	176	37.7(4.0)	10.6	162	36.6(4.3)	11.7	14	-(-)	-
연령									
19-29	19	-(-)	-	18	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	31	41.8(9.0)	21.5	29	35.4(9.2)	26.1	2	-(-)	-
40-49	53	35.2(6.3)	18.0	49	36.6(6.9)	18.8	4	-(-)	-
50-59	42	34.2(7.9)	23.2	39	32.9(7.9)	24.0	3	-(-)	-
60-69	22	36.6(10.9)	29.9	18	-(-)	-	4	-(-)	-
70 이상	9	-(-)	-	9	-(-)	-	0	-(-)	-
19-64	158	36.7(4.1)	11.2	145	35.7(4.4)	12.4	13	-(-)	-
65 이상	18	-(-)	-	17	-(-)	-	1	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	13	-(-)	-	10	-(-)	-	3	-(-)	-
중학교	20	34.8(12.5)	35.8	17	-(-)	-	3	-(-)	-
고등학교	96	40.7(4.7)	11.6	91	39.0(4.9)	12.6	5	-(-)	-
대학교 이상	44	26.7(7.3)	27.2	42	26.8(7.5)	28.1	2	-(-)	-
직업									
전문행정관리	22	31.7(10.6)	33.6	22	31.7(10.6)	33.6	0	-(-)	-
사무직	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
판매·서비스직	22	28.6(10.4)	36.4	17	-(-)	-	5	-(-)	-
농림어업	6	-(-)	-	5	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	79	35.0(6.0)	17.1	76	34.3(5.9)	17.2	3	-(-)	-
기타 ³⁾	30	65.2(8.7)	13.3	25	58.4(9.3)	15.9	5	-(-)	-
월 가구소득									
50만원 미만	11	-(-)	-	8	-(-)	-	3	-(-)	-
50-100만원 미만	16	-(-)	-	15	-(-)	-	1	-(-)	-
100-200만원 미만	16	-(-)	-	15	-(-)	-	1	-(-)	-
200-300만원 미만	42	41.8(8.5)	20.3	38	38.5(9.3)	24.2	4	-(-)	-
300-400만원 미만	28	36.5(10.8)	29.6	25	39.1(11.7)	29.8	3	-(-)	-
400-500만원 미만	25	46.8(10.3)	21.9	24	45.8(10.5)	22.9	1	-(-)	-
500-600만원 미만	17	-(-)	-	16	-(-)	-	1	-(-)	-
600만원 이상	20	4.9(4.8)	97.3	20	4.9(4.8)	97.3	0	-(-)	-

주 : 1) 담뱃값 인상 영향 경험률 : (담뱃값 인상으로 현재 흡연에 영향을 받은 사람의 수 / 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 15〉 담뭇값 인상 영향 유형¹⁾

(단위 : %)

구분	담뭇을 끊었다		담뭇을 더 적게 피운다		가격이 저렴한 담뭇을 피운다		전자담뭇을 사용한다		일반 담뭇(궐련)이나 전자담뭇이 아닌 다른 담뭇제품을 사용한다		기타	
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	10.8(3.7)	34.1	71.1(5.0)	7.0	13.2(4.2)	32.1	9.6(4.1)	42.6	1.2(0.9)	71.4	0.0(0.0)	.
성												
남자	11.8(4.0)	34.2	68.9(5.4)	7.8	10.8(3.5)	31.9	7.7(3.5)	44.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
여자	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
연령												
19-29	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	12.2(7.7)	63.4	82.3(7.7)	9.4	11.0(6.5)	59.4	3.8(3.6)	96.2	2.4(2.4)	99.6	0.0(0.0)	.
50-59	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
60-69	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
70 이상	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
19-64	10.6(3.9)	37.0	72.4(5.5)	7.6	13.8(4.6)	33.1	10.5(4.5)	42.9	1.3(0.9)	70.5	0.0(0.0)	.
65 이상	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
교육수준 ²⁾												
무학	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	10.2(4.7)	45.6	69.0(6.2)	8.9	14.0(5.2)	36.9	13.2(6.1)	46.0	1.1(1.1)	98.1	0.0(0.0)	.
대학교 이상	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
직업												
전문행정관리	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
사무직	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
농림어업	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	8.6(5.0)	58.3	67.7(7.9)	11.6	10.5(6.2)	58.7	8.1(6.0)	73.8	1.7(1.7)	97.5	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
월 가구소득												
50만원 미만	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-100만원 미만	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
300-400만원 미만	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
400-500만원 미만	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
500-600만원 미만	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
600만원 이상	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-

주 : 1) 담뭇값 인상 영향 유형 : (응답보기별 응답자 수 / 담뭇값 인상으로 흡연에 영향을 받은 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 및 과거흡연자(금연기간 1년 미만)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 16〉 금연정책 강화 필요 영역¹⁾

(단위 : %)

구분	N	금연구역 확대		금연구역 내 흡연 단속 (과태료 인상)		금연클리닉 확대 운영		금연 교육 및 홍보 강화		더 강화할 정책이 없다	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	892	25.4(1.9)	7.6	27.6(1.8)	6.6	16.4(1.4)	8.8	23.0(1.8)	7.7	7.6(1.0)	13.1
성											
남	406	22.2(2.1)	9.3	23.5(2.0)	8.7	18.1(1.9)	10.7	24.3(2.4)	9.8	12.0(1.7)	14.6
여	486	28.8(2.9)	9.9	32.0(2.4)	7.4	14.6(2.0)	13.7	21.8(2.2)	10.2	2.9(0.7)	25.5
연령											
19-29	91	20.0(4.2)	21.0	42.7(5.8)	13.6	9.3(3.1)	33.9	16.6(4.0)	23.8	11.3(3.2)	28.6
30-39	131	25.6(4.5)	17.5	38.3(4.4)	11.5	16.3(3.4)	20.6	13.4(3.3)	24.2	6.5(1.9)	30.1
40-49	203	25.6(2.8)	11.1	22.0(2.7)	12.4	24.5(3.5)	14.1	21.5(3.6)	16.7	6.4(1.9)	29.1
50-59	214	23.9(3.4)	14.4	19.7(3.4)	17.0	15.5(2.6)	17.0	32.0(3.4)	10.6	8.9(2.2)	24.3
60-69	107	35.9(5.1)	14.1	17.9(4.1)	23.0	15.3(4.1)	26.7	26.2(4.5)	17.2	4.8(2.2)	46.3
70 이상	146	27.5(3.4)	12.2	21.6(4.4)	20.4	12.1(3.0)	24.9	32.8(3.5)	10.8	6.0(2.3)	38.8
19-64	710	24.6(2.1)	8.7	28.9(2.1)	7.3	17.0(1.6)	9.6	21.6(2.0)	9.1	7.9(1.1)	13.6
65 이상	182	29.9(3.4)	11.5	20.1(3.9)	19.7	12.8(3.0)	23.2	31.8(3.3)	10.4	5.4(2.0)	36.7
교육수준 ²⁾											
무학	52	35.3(6.5)	18.5	13.2(4.4)	33.2	11.0(4.8)	44.1	35.0(5.8)	16.5	5.6(3.1)	56.1
초등학교	121	25.0(4.7)	18.7	23.7(4.9)	20.5	13.7(3.6)	26.3	32.9(4.6)	14.1	4.7(2.2)	45.9
중학교	85	34.1(6.7)	19.6	20.2(5.5)	27.0	9.4(2.7)	29.3	22.8(4.9)	21.5	13.5(3.9)	28.8
고등학교	374	22.5(2.5)	11.0	24.6(2.6)	10.7	19.5(2.4)	12.2	25.6(2.6)	10.2	7.9(1.6)	19.9
대학교 이상	257	26.5(3.3)	12.5	36.4(3.1)	8.5	15.2(2.1)	14.0	15.3(2.2)	14.4	6.6(1.5)	23.5
직업											
전문행정관리	106	27.1(4.5)	16.7	36.7(4.6)	12.6	13.1(3.3)	25.4	19.5(4.4)	22.5	3.6(1.9)	54.0
사무직	85	25.4(4.6)	18.1	29.9(4.4)	14.6	15.7(4.1)	26.4	20.3(4.4)	21.6	8.6(3.2)	36.7
판매·서비스직	116	26.9(4.7)	17.5	27.3(5.0)	18.4	14.5(3.1)	21.1	22.9(4.4)	19.3	8.4(2.9)	34.3
농림어업	40	28.2(8.7)	30.8	31.4(9.2)	29.4	2.6(2.5)	95.1	23.7(6.8)	28.7	14.1(4.9)	35.0
기능단순노무직	216	22.2(2.8)	12.5	18.7(3.0)	15.8	22.5(3.1)	13.9	24.4(3.4)	14.0	12.3(2.5)	20.4
기타 ³⁾	329	26.5(2.8)	10.4	30.1(3.2)	10.5	15.0(2.6)	17.3	24.3(2.6)	10.7	4.1(1.0)	25.2
월 가구소득											
50만원 미만	87	16.4(5.0)	30.2	20.6(5.5)	26.9	23.4(3.5)	15.1	31.5(5.1)	16.3	8.0(3.4)	42.4
50-100만원 미만	79	19.2(4.0)	21.0	24.5(5.9)	24.0	18.8(5.4)	28.9	29.2(5.6)	19.1	8.5(2.3)	26.9
100-200만원 미만	105	31.2(4.9)	15.6	25.9(3.6)	14.0	16.4(3.3)	20.1	22.8(4.3)	19.0	3.8(1.9)	49.2
200-300만원 미만	178	26.4(4.0)	15.0	24.6(3.6)	14.6	22.2(4.3)	19.4	20.5(3.3)	16.2	6.3(2.2)	35.0
300-400만원 미만	141	19.3(3.6)	18.7	31.4(5.6)	17.9	12.9(2.8)	21.7	28.6(4.0)	14.0	7.8(2.6)	32.5
400-500만원 미만	122	26.2(4.9)	18.7	35.3(5.4)	15.4	12.6(3.1)	24.3	17.9(4.6)	25.6	8.1(2.7)	33.6
500-600만원 미만	65	25.5(5.4)	21.1	21.0(5.7)	27.2	21.6(4.0)	18.7	22.8(6.1)	26.9	9.0(3.5)	38.8
600만원 이상	111	34.3(7.5)	22.0	28.5(4.8)	16.8	9.6(2.9)	30.3	18.2(5.1)	27.9	9.4(3.3)	34.5

주 : 1) 금연정책 강화 필요 영역 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 17〉 금연구역 법률 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	789	61.5(2.1)	3.5	384	65.9(2.6)	3.9	405	56.3(2.8)	4.9
연령									
19-29	84	64.0(5.7)	8.8	41	70.9(6.9)	9.7	43	55.3(8.0)	14.5
30-39	128	56.0(4.3)	7.7	62	54.6(6.3)	11.6	66	57.4(5.5)	9.6
40-49	198	69.8(3.1)	4.4	90	77.5(4.3)	5.6	108	61.0(4.5)	7.3
50-59	203	63.8(4.0)	6.3	97	69.2(5.4)	7.9	106	57.4(5.2)	9.1
60-69	92	57.6(5.6)	9.7	47	61.1(7.7)	12.5	45	53.9(7.8)	14.5
70 이상	84	39.5(5.0)	12.7	47	41.1(5.5)	13.3	37	37.3(7.4)	19.8
19-64	672	63.9(2.3)	3.6	315	68.9(2.8)	4.1	357	58.1(3.0)	5.1
65 이상	117	41.2(4.0)	9.7	69	43.3(4.4)	10.2	48	37.9(6.3)	16.6
교육수준 ²⁾									
무학	20	30.6(12.2)	39.7	3	—(—)	—	17	—(—)	—
초등학교	81	56.0(6.0)	10.7	36	56.3(8.8)	15.6	45	55.7(7.6)	13.6
중학교	78	45.7(6.5)	14.2	33	40.9(8.4)	20.6	45	49.4(7.3)	14.8
고등학교	360	63.3(3.2)	5.1	192	66.4(3.8)	5.7	168	58.9(4.3)	7.3
대학교 이상	248	65.1(3.1)	4.8	119	71.6(3.7)	5.1	129	57.8(4.8)	8.3
직업									
전문행정관리	103	63.7(5.0)	7.8	56	62.9(6.6)	10.5	47	64.9(7.8)	12.0
사무직	82	69.7(4.5)	6.5	45	76.2(6.5)	8.6	37	60.3(9.1)	15.1
판매·서비스직	113	67.9(4.2)	6.2	34	78.8(6.7)	8.5	79	61.3(6.0)	9.7
농림어업	28	48.6(10.1)	20.7	17	—(—)	—	11	—(—)	—
기능단순노무직	213	64.2(4.1)	6.5	154	68.1(4.6)	6.8	59	50.4(8.4)	16.6
기타 ³⁾	250	51.9(3.4)	6.6	78	50.6(5.6)	11.0	172	52.4(4.4)	8.3
월 가구소득									
50만원 미만	55	52.2(7.5)	14.4	26	55.8(11.9)	21.2	29	48.4(8.1)	16.8
50-100만원 미만	56	54.6(8.0)	14.8	29	42.8(9.0)	21.1	27	70.0(8.6)	12.3
100-200만원 미만	96	58.6(5.5)	9.3	43	62.3(6.3)	10.2	53	55.3(7.9)	14.3
200-300만원 미만	158	65.4(4.5)	6.8	76	70.6(5.7)	8.1	82	59.0(5.5)	9.4
300-400만원 미만	131	68.0(4.7)	6.9	66	76.8(5.6)	7.3	65	57.0(6.4)	11.2
400-500만원 미만	118	53.5(6.0)	11.2	55	57.4(7.3)	12.8	63	49.4(7.8)	15.7
500-600만원 미만	66	77.5(5.5)	7.1	36	81.0(6.6)	8.1	30	71.9(6.7)	9.4
600만원 이상	107	57.5(4.2)	7.3	51	62.6(5.2)	8.3	56	51.6(6.4)	12.3

주 : 1) 금연구역 법률 인지율 : ('지정된 금연구역에서 흡연하면 일정액 이하의 과태료를 내야한다'와 '금연구역에서 전자담배를 사용하는 것은 불법이다'에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 18〉 금연클리닉 또는 금연상담전화 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	910	57.2(1.8)	3.1	417	62.6(2.4)	3.8	493	51.4(2.3)	4.4
연령									
19-29	91	54.9(4.4)	8.0	45	55.1(6.7)	12.2	46	54.7(6.1)	11.1
30-39	132	70.9(3.6)	5.1	64	79.4(4.7)	5.9	68	61.8(5.7)	9.2
40-49	204	58.3(3.9)	6.6	91	61.8(5.2)	8.5	113	54.5(4.5)	8.2
50-59	218	64.2(3.8)	5.9	103	67.9(4.5)	6.7	115	60.0(4.9)	8.2
60-69	111	49.7(5.5)	11.1	53	56.3(7.8)	13.9	58	43.6(6.1)	14.0
70 이상	154	30.6(4.0)	13.1	61	40.2(5.4)	13.3	93	23.7(5.7)	24.0
19-64	717	61.4(1.9)	3.1	333	65.5(2.6)	4.0	384	56.9(2.4)	4.2
65 이상	193	33.6(3.4)	10.1	84	44.1(4.6)	10.5	109	24.8(5.0)	20.1
교육수준 ²⁾									
무학	56	18.4(5.6)	30.3	4	—(—)	—	52	17.4(4.7)	27.0
초등학교	123	34.4(4.7)	13.7	45	44.4(7.4)	16.6	78	28.1(5.4)	19.3
중학교	88	61.3(5.3)	8.7	36	50.9(7.8)	15.3	52	68.4(6.2)	9.0
고등학교	381	61.2(2.7)	4.4	204	64.7(3.4)	5.3	177	56.2(4.2)	7.4
대학교 이상	259	62.2(3.1)	5.0	127	66.1(3.9)	5.8	132	57.8(4.3)	7.5
직업									
전문행정관리	108	66.8(4.5)	6.8	59	73.0(5.9)	8.1	49	57.8(6.5)	11.2
사무직	85	64.4(4.9)	7.6	48	65.7(7.0)	10.6	37	62.5(7.8)	12.5
판매·서비스직	117	63.5(4.5)	7.0	35	71.8(7.9)	11.0	82	58.7(5.6)	9.5
농림어업	42	43.5(7.5)	17.3	24	47.5(7.6)	16.0	18	—(—)	—
기능단순노무직	220	66.6(3.8)	5.7	160	66.8(4.2)	6.3	60	66.0(7.2)	10.9
기타 ³⁾	338	41.8(2.9)	6.9	91	40.3(5.3)	13.3	247	42.4(3.2)	7.6
월 가구소득									
50만원 미만	96	26.4(4.3)	16.3	33	31.0(7.3)	23.7	63	23.6(4.2)	18.0
50-100만원 미만	83	46.0(5.5)	11.9	33	54.0(9.7)	17.9	50	39.1(7.9)	20.2
100-200만원 미만	105	53.8(4.5)	8.3	46	52.5(6.6)	12.6	59	55.0(6.1)	11.2
200-300만원 미만	179	59.6(4.0)	6.6	83	67.0(6.2)	9.2	96	51.6(5.0)	9.7
300-400만원 미만	143	64.7(4.2)	6.5	72	66.8(4.9)	7.3	71	62.2(6.6)	10.6
400-500만원 미만	123	65.4(3.7)	5.7	58	73.5(5.4)	7.4	65	56.8(6.0)	10.5
500-600만원 미만	66	56.4(7.6)	13.5	36	53.1(8.3)	15.6	30	61.6(9.4)	15.3
600만원 이상	111	60.0(5.8)	9.6	54	67.8(5.7)	8.4	57	51.0(7.7)	15.1

주 : 1) 금연클리닉 또는 금연상담전화 인지율 : (금연클리닉 또는 금연상담전화가 있다는 것을 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 19〉 월간음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	912	56.5(1.6)	2.7	418	72.5(2.0)	2.8	494	39.6(2.4)	6.0
연령									
19-29	91	66.4(4.7)	7.1	45	73.2(5.7)	7.8	46	57.7(7.3)	12.7
30-39	132	63.6(4.4)	6.9	64	79.0(4.6)	5.8	68	47.0(6.7)	14.3
40-49	203	68.0(3.4)	5.0	90	81.5(4.1)	5.0	113	53.5(4.7)	8.9
50-59	218	54.7(3.2)	5.9	103	74.6(4.4)	5.8	115	32.0(3.5)	11.1
60-69	111	44.8(4.9)	11.0	53	63.6(6.5)	10.1	58	27.5(5.9)	21.5
70 이상	157	21.5(3.1)	14.3	63	40.7(6.3)	15.5	94	7.7(2.6)	33.8
19-64	716	62.0(1.7)	2.7	332	76.6(1.8)	2.4	384	45.9(2.8)	6.1
65 이상	196	26.2(3.2)	12.1	86	46.6(6.1)	13.1	110	9.0(2.6)	29.2
교육수준 ²⁾									
무학	57	12.9(4.3)	33.0	4	-(-)	-	53	8.0(3.8)	47.0
초등학교	125	31.0(4.2)	13.6	47	49.7(7.7)	15.5	78	18.7(4.7)	25.1
중학교	88	43.5(5.8)	13.3	36	66.1(7.5)	11.4	52	27.9(6.9)	24.6
고등학교	380	64.6(2.3)	3.6	203	72.1(3.1)	4.3	177	54.1(3.7)	6.9
대학교 이상	259	61.3(2.5)	4.0	127	79.1(3.3)	4.2	132	41.3(4.0)	9.8
직업									
전문행정관리	108	61.5(4.4)	7.2	59	76.5(5.6)	7.4	49	39.8(5.9)	14.7
사무직	85	72.7(5.3)	7.3	48	81.3(5.7)	7.0	37	59.7(8.4)	14.0
판매·서비스직	117	59.3(4.6)	7.7	35	74.8(7.7)	10.2	82	50.3(5.7)	11.3
농림어업	42	45.9(8.0)	17.4	24	60.6(8.5)	14.0	18	-(-)	-
기능단순노무직	219	71.6(3.1)	4.3	159	78.3(3.4)	4.3	60	47.3(7.3)	15.3
기타 ³⁾	341	36.8(2.8)	7.7	93	51.5(5.5)	10.7	248	30.8(3.3)	10.6
월 가구소득									
50만원 미만	97	22.0(6.2)	28.1	33	45.0(12.2)	27.0	64	8.2(3.3)	40.0
50-100만원 미만	84	32.8(5.7)	17.5	34	51.1(8.7)	17.0	50	16.5(5.9)	35.8
100-200만원 미만	106	61.5(4.4)	7.2	47	82.6(4.3)	5.2	59	43.2(7.3)	16.8
200-300만원 미만	178	52.7(4.3)	8.1	82	67.1(5.3)	8.0	96	37.3(5.1)	13.5
300-400만원 미만	143	63.9(4.3)	6.7	72	73.6(4.3)	5.8	71	51.9(6.6)	12.7
400-500만원 미만	123	62.6(4.0)	6.4	58	84.6(4.1)	4.9	65	39.0(6.5)	16.7
500-600만원 미만	66	63.6(7.5)	11.8	36	70.1(7.6)	10.8	30	53.2(11.6)	21.8
600만원 이상	111	69.3(5.2)	7.5	54	79.8(5.9)	7.4	57	57.1(7.4)	12.9

주 : 1) 월간음주율 : (최근 1년(365일) 동안 한 달(30일)에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 20〉 음주시작연령¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	738	21.5(0.2)	1.0	383	19.4(0.2)	0.9	355	24.1(0.5)	1.9
연령									
19-29	87	18.5(0.2)	0.9	41	17.9(0.3)	1.5	46	19.2(0.3)	1.3
30-39	123	19.3(0.2)	1.1	61	18.8(0.3)	1.6	62	19.9(0.3)	1.6
40-49	181	20.6(0.3)	1.5	85	19.1(0.4)	2.2	96	22.4(0.4)	2.0
50-59	176	22.9(0.5)	2.2	98	20.3(0.4)	2.2	78	27.0(0.9)	3.5
60-69	83	27.2(1.1)	4.2	47	20.9(0.6)	3.0	36	35.7(1.8)	5.1
70 이상	88	27.7(1.2)	4.4	51	21.4(0.7)	3.1	37	37.3(2.4)	6.5
19-64	618	20.8(0.2)	0.9	311	19.2(0.2)	1.0	307	22.8(0.4)	1.7
65 이상	120	27.2(1.0)	3.6	72	21.3(0.6)	2.6	48	36.9(1.9)	5.2
교육수준 ²⁾									
무학	25	36.3(2.4)	6.7	3	-(-)	-	22	38.6(2.2)	5.8
초등학교	85	28.7(1.4)	4.8	40	20.3(0.9)	4.4	45	36.9(1.9)	5.2
중학교	63	25.3(0.9)	3.7	30	21.4(0.8)	3.7	33	28.9(1.7)	5.9
고등학교	327	20.5(0.2)	1.2	189	19.3(0.3)	1.4	138	22.5(0.4)	1.9
대학교 이상	235	19.6(0.2)	0.8	120	19.1(0.2)	1.1	115	20.2(0.2)	1.1
직업									
전문행정관리	97	20.1(0.3)	1.7	57	20.1(0.5)	2.5	40	20.0(0.3)	1.6
사무직	78	19.7(0.4)	1.9	45	19.3(0.5)	2.6	33	20.3(0.6)	2.9
판매·서비스직	100	21.7(0.6)	2.8	33	19.3(0.3)	1.8	67	23.3(0.9)	3.9
농림어업	34	25.3(1.8)	6.9	23	21.4(1.5)	7.1	11	-(-)	-
기능단순노무직	196	20.2(0.3)	1.4	151	19.0(0.2)	1.2	45	25.7(1.3)	4.9
기타 ³⁾	233	23.8(0.6)	2.5	74	19.7(0.6)	3.1	159	25.6(0.8)	3.0
월 가구소득									
50만원 미만	51	28.1(2.1)	7.4	24	20.1(1.2)	5.8	27	36.6(1.5)	4.2
50-100만원 미만	55	23.4(1.2)	5.0	29	19.5(0.5)	2.4	26	29.5(2.4)	8.3
100-200만원 미만	90	21.8(0.6)	2.8	47	19.0(0.5)	2.7	43	25.0(1.2)	4.9
200-300만원 미만	149	21.4(0.5)	2.5	77	19.9(0.5)	2.7	72	23.3(1.1)	4.7
300-400만원 미만	124	20.6(0.4)	2.1	66	19.0(0.3)	1.5	58	22.8(0.9)	3.8
400-500만원 미만	113	20.8(0.4)	2.1	56	19.0(0.2)	1.3	57	22.9(0.9)	3.9
500-600만원 미만	60	20.4(0.5)	2.4	34	19.5(0.7)	3.3	26	21.8(1.0)	4.4
600만원 이상	93	20.6(0.3)	1.7	48	19.5(0.5)	2.6	45	22.0(0.6)	2.7

주 : 1) 음주시작연령 : 처음으로 술 1잔을 모두 마신 만 나이의 총 합 / 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 음주자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 21〉 고위험 음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	607	20.2(1.6)	7.7	336	29.4(2.4)	8.3	271	6.7(1.3)	19.5
연령									
19-29	80	7.7(2.8)	37.1	41	13.1(5.0)	38.2	39	0.0(0.0)	.
30-39	106	19.0(3.8)	20.1	55	25.4(5.6)	21.8	51	10.9(4.1)	37.2
40-49	162	29.6(3.7)	12.5	81	47.1(6.1)	13.0	81	6.2(2.5)	40.9
50-59	148	23.9(3.8)	16.0	87	32.1(4.7)	14.6	61	9.2(4.2)	45.8
60-69	62	17.6(4.7)	26.8	40	19.5(5.8)	30.0	22	14.2(7.7)	54.0
70 이상	49	14.1(4.1)	28.8	32	20.5(6.0)	29.4	17	-(-)	-
19-64	535	20.6(1.7)	8.4	287	30.1(2.7)	9.1	248	7.1(1.4)	19.3
65 이상	72	15.7(3.9)	25.0	49	22.4(5.7)	25.3	23	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	12	-(-)	-	3	-(-)	-	9	-(-)	-
초등학교	57	17.5(5.5)	31.3	29	27.9(8.8)	31.5	28	4.7(4.7)	100.0
중학교	43	21.5(6.3)	29.1	24	28.2(9.3)	33.0	19	-(-)	-
고등학교	292	23.2(2.3)	9.9	170	31.4(3.4)	10.9	122	10.0(2.3)	23.4
대학교 이상	200	16.1(3.0)	18.5	109	26.6(4.8)	18.2	91	1.2(1.2)	99.4
직업									
전문행정관리	88	15.3(4.5)	29.2	53	21.7(6.6)	30.5	35	3.3(3.3)	100.0
사무직	70	27.7(6.4)	23.2	40	43.9(10.0)	22.8	30	2.7(2.7)	101.1
판매·서비스직	87	12.4(3.7)	29.5	30	20.1(7.2)	36.1	57	6.8(3.2)	46.9
농림어업	24	25.6(9.9)	38.5	17	-(-)	-	7	-(-)	-
기능단순노무직	176	31.8(3.7)	11.5	140	34.0(3.9)	11.3	36	20.1(7.2)	35.6
기타 ³⁾	162	9.4(1.8)	19.6	56	18.5(4.6)	24.6	106	4.6(1.8)	39.6
월 가구소득									
50만원 미만	25	16.7(6.8)	41.0	14	-(-)	-	11	-(-)	-
50-100만원 미만	39	29.8(8.6)	28.8	22	34.0(10.9)	32.1	17	-(-)	-
100-200만원 미만	73	24.1(4.6)	19.3	41	31.7(7.2)	22.7	32	13.9(6.0)	43.1
200-300만원 미만	119	14.6(3.3)	22.7	67	21.8(5.1)	23.6	52	3.2(2.2)	69.0
300-400만원 미만	106	18.3(3.9)	21.3	59	26.7(5.8)	21.7	47	5.6(2.4)	43.5
400-500만원 미만	99	18.9(3.6)	19.2	54	32.2(6.7)	20.9	45	1.1(1.1)	101.5
500-600만원 미만	55	25.8(6.1)	23.5	31	34.6(7.7)	22.3	24	11.9(6.2)	52.1
600만원 이상	88	21.5(5.1)	23.8	46	34.3(8.1)	23.6	42	4.1(2.9)	71.6

주 : 1) 고위험 음주율 : (최근 1년(365일) 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 22〉 연간 음주문제로 인한 상담경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	608	0.5(0.3)	51.9	337	0.6(0.3)	59.2	271	0.5(0.5)	99.5
연령									
19-29	80	0.0(0.0)	.	41	0.0(0.0)	.	39	0.0(0.0)	.
30-39	106	0.9(0.9)	99.7	55	0.0(0.0)	.	51	2.1(2.0)	98.9
40-49	163	0.7(0.7)	100.7	82	1.3(1.3)	101.0	81	0.0(0.0)	.
50-59	148	0.7(0.1)	8.6	87	1.1(0.1)	10.1	61	0.0(0.0)	.
60-69	62	0.0(0.0)	.	40	0.0(0.0)	.	22	0.0(0.0)	.
70 이상	49	0.0(0.0)	.	32	0.0(0.0)	.	17	-(-)	-
19-64	536	0.6(0.3)	51.8	288	0.6(0.4)	59.1	248	0.5(0.5)	99.4
65 이상	72	0.0(0.0)	.	49	0.0(0.0)	.	23	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	12	-(-)	-	3	-(-)	-	9	-(-)	-
초등학교	57	0.0(0.0)	.	29	0.0(0.0)	.	28	0.0(0.0)	.
중학교	43	0.0(0.0)	.	24	0.0(0.0)	.	19	-(-)	-
고등학교	293	0.6(0.4)	57.4	171	0.4(0.0)	6.0	122	1.0(1.0)	100.0
대학교 이상	200	0.6(0.6)	100.4	109	1.0(1.0)	100.6	91	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	88	1.3(1.3)	100.4	53	2.0(2.1)	101.1	35	0.0(0.0)	.
사무직	70	0.0(0.0)	.	40	0.0(0.0)	.	30	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	87	0.0(0.0)	.	30	0.0(0.0)	.	57	0.0(0.0)	.
농림어업	24	0.0(0.0)	.	17	-(-)	-	7	-(-)	-
기능단순노무직	177	0.6(0.6)	99.9	141	0.0(0.0)	.	36	4.0(4.0)	101.1
기타 ³⁾	162	0.6(0.0)	7.9	56	1.6(0.2)	12.7	106	0.0(0.0)	.
월 가구소득									
50만원 미만	25	0.0(0.0)	.	14	-(-)	-	11	-(-)	-
50-100만원 미만	39	0.0(0.0)	.	22	0.0(0.0)	.	17	-(-)	-
100-200만원 미만	73	3.1(1.7)	55.5	41	2.3(0.3)	14.3	32	4.2(3.8)	91.3
200-300만원 미만	120	1.1(1.0)	97.5	68	1.7(1.7)	98.3	52	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	106	0.0(0.0)	.	59	0.0(0.0)	.	47	0.0(0.0)	.
400-500만원 미만	99	0.0(0.0)	.	54	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.
500-600만원 미만	55	0.0(0.0)	.	31	0.0(0.0)	.	24	0.0(0.0)	.
600만원 이상	88	0.0(0.0)	.	46	0.0(0.0)	.	42	0.0(0.0)	.

주 : 1) 연간 음주문제로 인한 상담 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 음주문제로 상담을 받아본 적이 있는 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 23〉 평생 음주예방 교육 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	913	7.4(1.0)	13.9	419	11.3(1.8)	15.5	494	3.3(1.0)	29.3
연령									
19-29	91	17.1(3.6)	21.4	45	23.5(6.1)	26.1	46	8.8(4.1)	46.1
30-39	132	9.6(2.8)	28.9	64	13.4(4.5)	33.5	68	5.5(2.8)	49.8
40-49	204	6.1(1.6)	26.2	91	10.2(2.7)	26.9	113	1.5(1.0)	66.0
50-59	218	5.7(1.7)	30.0	103	7.9(2.5)	31.5	115	3.1(1.8)	57.7
60-69	111	1.8(1.3)	69.0	53	3.8(2.6)	68.0	58	0.0(0.0)	.
70 이상	157	0.7(0.7)	100.3	63	1.8(1.8)	99.6	94	0.0(0.0)	.
19-64	717	8.6(1.2)	14.3	333	12.7(2.0)	15.9	384	4.0(1.2)	29.4
65 이상	196	1.2(0.8)	69.6	86	2.5(1.7)	68.5	110	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	57	0.0(0.0)	.	4	-(-)	-	53	0.0(0.0)	.
초등학교	125	1.0(1.0)	100.0	47	2.5(2.5)	100.2	78	0.0(0.0)	.
중학교	88	5.6(2.8)	48.8	36	6.9(4.9)	71.8	52	4.8(3.5)	72.0
고등학교	381	9.4(1.9)	19.6	204	13.4(2.7)	20.3	177	3.7(1.7)	44.4
대학교 이상	259	7.9(1.8)	22.7	127	11.0(2.8)	25.3	132	4.4(1.8)	41.2
직업									
전문행정관리	108	8.2(3.0)	36.6	59	8.3(3.6)	43.4	49	8.1(4.2)	52.1
사무직	85	6.8(2.9)	42.3	48	8.9(4.2)	47.1	37	3.6(3.5)	97.5
판매·서비스직	117	8.2(2.7)	32.3	35	16.2(5.7)	35.2	82	3.5(2.4)	69.0
농림어업	42	0.0(0.0)	.	24	0.0(0.0)	.	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	10.7(2.2)	20.7	160	12.5(2.7)	21.2	60	4.1(2.8)	69.7
기타 ³⁾	341	5.0(1.5)	30.7	93	12.4(4.3)	35.1	248	2.0(1.0)	52.2
월 가구소득									
50만원 미만	97	4.8(3.3)	68.7	33	8.1(7.0)	86.4	64	2.9(2.8)	98.6
50-100만원 미만	84	6.1(4.2)	69.3	34	13.0(8.3)	63.9	50	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	106	2.2(1.6)	73.1	47	3.0(2.9)	97.1	59	1.4(1.4)	101.4
200-300만원 미만	179	12.3(2.7)	22.0	83	18.6(4.5)	24.3	96	5.6(2.6)	47.4
300-400만원 미만	143	3.8(1.8)	46.1	72	6.9(3.1)	45.2	71	0.0(0.0)	.
400-500만원 미만	123	12.9(2.9)	22.7	58	20.5(5.7)	27.9	65	4.9(2.9)	59.9
500-600만원 미만	66	4.2(3.1)	74.5	36	5.2(5.1)	97.1	30	2.5(2.2)	89.3
600만원 이상	111	6.7(2.3)	34.8	54	7.0(3.8)	53.7	57	6.3(3.2)	50.6

주 : 1) 평생 음주예방 교육 경험률 : (음주예방에 대한 교육을 받은 적이있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 24〉 운전 시 안전벨트 착용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	589	77.5(1.9)	2.4	341	74.0(2.3)	3.2	248	83.1(2.7)	3.2
연령									
19-29	54	61.9(6.2)	9.9	31	59.1(7.5)	12.7	23	67.0(10.4)	15.6
30-39	117	74.1(4.3)	5.8	62	75.2(5.3)	7.0	55	72.9(6.1)	8.3
40-49	175	78.7(3.3)	4.2	88	70.6(5.0)	7.2	87	90.0(2.8)	3.1
50-59	162	85.4(3.1)	3.6	96	81.9(4.0)	4.9	66	91.6(4.1)	4.5
60-69	56	88.5(3.4)	3.9	42	84.3(4.4)	5.2	14	-(-)	-
70 이상	25	85.1(6.3)	7.3	22	83.0(6.8)	8.2	3	-(-)	-
19-64	546	76.9(1.9)	2.5	303	73.0(2.5)	3.4	243	82.8(2.7)	3.2
65 이상	43	89.4(4.3)	4.8	38	87.8(4.6)	5.3	5	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
초등학교	26	88.5(6.4)	7.2	19	-(-)	-	7	-(-)	-
중학교	49	80.6(5.6)	6.9	24	81.7(6.4)	7.8	25	79.7(8.8)	11.0
고등학교	281	75.7(2.6)	3.4	175	72.0(3.3)	4.6	106	82.9(4.1)	4.9
대학교 이상	231	78.4(2.7)	3.5	122	74.8(3.7)	5.0	109	83.2(3.8)	4.5
직업									
전문행정관리	94	81.5(4.0)	4.8	55	86.0(4.6)	5.4	39	73.7(6.8)	9.3
사무직	77	84.4(4.7)	5.5	47	82.3(5.9)	7.1	30	88.4(6.6)	7.4
판매·서비스직	87	70.1(5.6)	8.0	32	56.2(8.1)	14.4	55	80.5(5.4)	6.7
농림어업	16	-(-)	-	14	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	181	73.5(3.4)	4.6	149	71.9(3.7)	5.1	32	83.6(6.7)	8.0
기타 ³⁾	134	81.3(3.9)	4.8	44	70.8(6.4)	9.0	90	86.3(4.4)	5.1
월 가구소득									
50만원 미만	16	-(-)	-	12	-(-)	-	4	-(-)	-
50-100만원 미만	30	73.9(7.4)	10.0	18	-(-)	-	12	-(-)	-
100-200만원 미만	56	75.6(5.4)	7.1	34	69.1(8.3)	12.0	22	85.3(8.8)	10.3
200-300만원 미만	127	78.5(4.6)	5.9	73	73.5(5.1)	6.9	54	86.1(5.8)	6.7
300-400만원 미만	111	78.1(4.0)	5.1	67	78.7(4.9)	6.3	44	77.0(6.5)	8.4
400-500만원 미만	97	79.0(4.4)	5.5	51	74.2(5.7)	7.7	46	85.1(5.6)	6.6
500-600만원 미만	56	69.3(4.9)	7.0	32	63.5(6.4)	10.1	24	79.5(8.5)	10.7
600만원 이상	92	80.6(4.2)	5.3	52	79.0(5.1)	6.4	40	83.2(6.3)	7.6

주 : 1) 운전 시 안전벨트 착용률 : (자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 / 자동차 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 25〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	854	73.9(1.9)	2.6	407	68.4(2.7)	3.9	447	80.2(2.2)	2.7
연령									
19-29	90	62.2(5.9)	9.6	45	61.9(7.8)	12.6	45	62.5(7.6)	12.2
30-39	124	65.6(4.5)	6.9	60	63.5(6.6)	10.4	64	68.0(5.5)	8.2
40-49	200	71.6(3.5)	4.9	90	60.2(4.9)	8.1	110	84.1(3.4)	4.1
50-59	213	81.3(3.0)	3.7	101	71.8(5.0)	7.0	112	92.4(2.4)	2.7
60-69	104	88.5(3.2)	3.6	53	86.3(4.0)	4.7	51	90.8(5.1)	5.6
70 이상	123	86.3(3.6)	4.1	58	87.9(3.9)	4.4	65	84.7(5.0)	5.9
19-64	696	71.7(2.2)	3.0	326	65.0(3.0)	4.7	370	79.3(2.5)	3.2
65 이상	158	88.2(3.0)	3.4	81	90.0(3.1)	3.4	77	86.1(4.4)	5.1
교육수준 ²⁾									
무학	38	87.3(4.5)	5.2	4	—(—)	—	34	85.6(5.0)	5.8
초등학교	107	87.4(4.4)	5.1	45	82.8(7.8)	9.5	62	91.2(3.6)	3.9
중학교	84	82.9(4.0)	4.8	34	78.1(6.2)	7.9	50	86.4(5.0)	5.8
고등학교	369	69.7(2.8)	4.1	199	64.8(3.6)	5.5	170	76.9(3.6)	4.7
대학교 이상	253	72.9(3.3)	4.6	124	68.4(5.0)	7.3	129	78.0(3.8)	4.9
직업									
전문행정관리	104	74.7(4.6)	6.1	56	79.7(6.0)	7.5	48	67.8(6.2)	9.1
사무직	84	70.1(5.9)	8.5	47	73.7(7.7)	10.5	37	64.7(8.6)	13.2
판매·서비스직	115	68.5(5.6)	8.2	35	48.7(8.6)	17.6	80	80.4(5.5)	6.8
농림어업	38	84.9(7.1)	8.4	22	78.2(10.5)	13.5	16	—(—)	—
기능단순노무직	216	68.8(3.2)	4.7	157	65.8(3.5)	5.4	59	79.6(6.2)	7.8
기타 ³⁾	297	81.0(2.6)	3.2	90	70.1(5.1)	7.3	207	86.3(2.4)	2.8
월 가구소득									
50만원 미만	75	78.9(5.6)	7.1	31	74.2(7.4)	9.9	44	82.9(5.6)	6.8
50-100만원 미만	76	73.0(6.2)	8.5	33	58.6(10.1)	17.2	43	87.6(5.5)	6.3
100-200만원 미만	98	72.5(4.9)	6.8	44	66.0(7.4)	11.3	54	78.3(7.2)	9.2
200-300만원 미만	169	76.0(3.8)	5.0	82	73.5(4.7)	6.4	87	79.1(5.0)	6.4
300-400만원 미만	136	75.0(4.2)	5.5	69	75.4(5.8)	7.7	67	74.4(5.3)	7.2
400-500만원 미만	120	72.8(4.7)	6.4	57	61.5(7.1)	11.5	63	85.2(5.3)	6.2
500-600만원 미만	65	66.3(7.0)	10.5	35	66.9(9.7)	14.5	30	65.5(7.8)	11.9
600만원 이상	111	73.8(4.8)	6.5	54	64.4(7.6)	11.8	57	84.8(5.4)	6.4

주 : 1) 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 : (승용차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 / 동승차량 앞좌석 탑승자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 26〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	605	12.2(1.7)	13.7	353	16.5(2.4)	14.6	252	5.3(1.4)	25.7
연령									
19-29	54	18.3(5.1)	28.0	31	24.5(7.6)	31.2	23	7.3(5.3)	72.6
30-39	117	7.8(2.2)	27.6	62	10.0(3.4)	34.4	55	5.0(2.5)	49.4
40-49	175	11.6(3.1)	27.0	88	16.2(4.8)	29.9	87	5.4(2.4)	45.3
50-59	164	15.6(3.2)	20.5	97	21.0(4.4)	21.1	67	5.9(3.1)	53.1
60-69	61	9.7(3.2)	33.2	46	13.0(4.3)	33.4	15	-(-)	-
70 이상	34	5.6(2.5)	44.5	29	6.5(2.9)	44.2	5	-(-)	-
19-64	549	12.7(1.8)	14.2	304	17.4(2.6)	15.1	245	5.4(1.4)	25.9
65 이상	56	5.7(2.2)	38.8	49	6.6(2.5)	38.3	7	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	3	-(-)	-	1	-(-)	-	2	-(-)	-
초등학교	34	7.7(4.3)	55.5	25	10.3(5.6)	54.4	9	-(-)	-
중학교	51	12.8(4.7)	36.5	26	24.6(8.0)	32.6	25	2.1(2.1)	101.4
고등학교	284	14.6(2.4)	16.4	178	18.2(3.2)	17.5	106	7.4(2.6)	35.1
대학교 이상	231	9.5(2.2)	23.2	122	13.9(3.5)	25.2	109	3.7(1.7)	44.7
직업									
전문행정관리	95	12.7(4.2)	32.8	56	17.4(6.2)	35.9	39	4.4(2.9)	65.8
사무직	77	14.3(4.6)	32.0	47	17.4(6.4)	36.7	30	8.7(5.9)	67.2
판매·서비스직	87	8.5(2.5)	30.1	32	7.1(4.0)	55.4	55	9.4(3.5)	37.0
농림어업	21	19.4(9.1)	47.1	18	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	182	17.8(3.4)	19.4	150	19.2(3.8)	19.6	32	9.0(5.2)	58.2
기타 ³⁾	143	4.2(1.7)	40.8	50	11.6(4.9)	42.2	93	0.5(0.5)	98.6
월 가구소득									
50만원 미만	20	27.1(11.9)	43.7	14	-(-)	-	6	-(-)	-
50-100만원 미만	37	7.0(4.6)	65.8	24	3.8(2.6)	69.8	13	-(-)	-
100-200만원 미만	59	10.5(4.1)	38.8	36	17.4(6.4)	36.8	23	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	128	10.6(3.4)	31.8	74	13.0(4.8)	36.8	54	6.9(3.1)	44.6
300-400만원 미만	112	14.5(3.6)	24.9	68	17.5(5.2)	29.5	44	9.0(3.5)	39.1
400-500만원 미만	97	13.1(3.1)	23.4	51	22.7(5.6)	24.8	46	0.9(0.9)	101.2
500-600만원 미만	56	17.3(7.3)	42.1	32	20.4(9.4)	46.3	24	11.8(7.2)	61.0
600만원 이상	92	8.8(3.5)	40.2	52	13.5(5.0)	36.9	40	1.1(1.1)	99.2

주 : 1) 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이) : (최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 수 / 자동차 또는 오토바이 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 27〉 격렬한 신체활동 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	14.6(1.3)	8.7	418	20.6(2.1)	10.2	494	8.2(1.4)	17.5
연령									
19-29	91	20.8(3.9)	18.7	45	33.2(6.3)	18.9	46	4.7(2.8)	58.4
30-39	131	16.4(3.1)	19.1	63	20.7(4.7)	22.9	68	11.9(3.9)	32.6
40-49	204	18.5(2.8)	15.1	91	23.5(4.4)	18.6	113	13.0(3.3)	25.2
50-59	218	13.0(2.8)	21.8	103	17.7(4.2)	23.7	115	7.6(2.3)	29.9
60-69	111	8.8(3.4)	38.7	53	12.1(4.3)	35.5	58	5.8(4.2)	72.6
70 이상	157	2.4(1.2)	48.6	63	4.1(2.4)	59.5	94	1.3(1.2)	99.5
19-64	716	16.6(1.5)	9.0	332	23.0(2.5)	10.8	384	9.6(1.7)	17.5
65 이상	196	3.3(1.1)	32.9	86	5.9(2.0)	34.7	110	1.1(1.1)	99.5
교육수준 ²⁾									
무학	57	2.1(2.0)	96.8	4	-(-)	-	53	0.0(0.0)	.
초등학교	125	2.5(1.4)	57.1	47	1.4(1.4)	98.9	78	3.2(2.1)	67.7
중학교	88	7.5(2.6)	35.0	36	15.8(6.5)	41.5	52	1.9(1.8)	99.2
고등학교	380	14.7(2.2)	15.0	203	18.5(3.2)	17.3	177	9.2(2.1)	22.7
대학교 이상	259	21.3(2.7)	12.5	127	28.9(3.9)	13.6	132	12.8(3.3)	26.0
직업									
전문행정관리	108	21.2(3.9)	18.6	59	23.1(5.3)	23.0	49	18.4(6.8)	36.8
사무직	85	15.7(3.5)	22.6	48	21.5(5.5)	25.4	37	6.7(3.7)	54.7
판매·서비스직	116	17.3(3.6)	20.9	34	31.7(9.3)	29.2	82	9.1(3.2)	34.7
농림어업	42	4.1(2.9)	69.2	24	7.1(4.6)	65.6	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	17.7(2.9)	16.3	160	21.8(3.5)	16.0	60	2.9(2.0)	69.2
기타 ³⁾	341	8.8(2.0)	22.2	93	12.2(4.2)	34.3	248	7.4(1.8)	24.1
월 가구소득									
50만원 미만	97	5.0(2.0)	40.5	33	6.9(3.8)	55.0	64	3.8(2.6)	67.6
50-100만원 미만	84	4.0(2.3)	58.7	34	3.8(1.9)	50.8	50	4.2(4.1)	97.4
100-200만원 미만	106	15.3(3.2)	21.1	47	22.0(6.4)	28.9	59	9.5(3.1)	33.3
200-300만원 미만	179	14.8(3.0)	20.5	83	21.1(4.7)	22.4	96	8.0(2.9)	36.1
300-400만원 미만	143	8.9(2.5)	28.2	72	10.8(3.6)	33.6	71	6.6(3.1)	46.7
400-500만원 미만	122	23.5(3.4)	14.7	57	33.3(6.7)	20.0	65	13.2(4.6)	34.9
500-600만원 미만	66	16.3(6.5)	39.9	36	16.2(5.8)	35.6	30	16.5(9.0)	54.3
600만원 이상	111	20.8(4.4)	21.0	54	34.2(6.7)	19.4	57	5.1(2.6)	50.3

주 : 1) 격렬한 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 28〉 중등도 신체활동 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	11.5(1.4)	11.8	418	13.0(1.9)	14.5	494	9.9(1.3)	13.4
연령									
19-29	91	3.8(2.2)	57.2	45	6.7(3.8)	56.5	46	0.0(0.0)	.
30-39	131	17.0(2.7)	16.1	63	17.4(4.1)	23.8	68	16.6(4.1)	24.5
40-49	204	10.0(2.8)	27.5	91	10.1(4.3)	42.7	113	9.9(2.5)	25.3
50-59	218	9.6(2.7)	28.5	103	10.8(4.1)	37.7	115	8.2(3.2)	38.4
60-69	111	14.7(3.4)	23.2	53	14.9(4.1)	27.5	58	14.4(4.6)	31.7
70 이상	157	17.8(3.4)	18.9	63	26.8(5.9)	22.2	94	11.3(4.0)	35.5
19-64	716	10.7(1.4)	12.9	332	11.5(2.0)	17.4	384	9.8(1.4)	13.9
65 이상	196	16.3(2.9)	17.9	86	22.8(4.8)	21.0	110	10.8(3.6)	33.1
교육수준 ²⁾									
무학	57	8.6(4.0)	46.1	4	-(-)	-	53	9.3(4.2)	45.2
초등학교	125	23.0(4.3)	18.6	47	30.2(8.1)	26.7	78	18.3(4.3)	23.6
중학교	88	14.1(3.6)	25.7	36	18.7(6.7)	35.8	52	10.9(4.3)	39.4
고등학교	380	11.3(2.1)	18.3	203	12.8(2.9)	22.9	177	9.3(1.8)	19.7
대학교 이상	259	8.4(1.6)	19.6	127	9.1(2.3)	24.9	132	7.6(2.5)	32.8
직업									
전문행정관리	108	11.1(3.2)	29.3	59	13.2(4.9)	37.5	49	8.0(4.4)	54.7
사무직	85	3.7(2.2)	58.2	48	4.6(3.2)	70.6	37	2.5(2.5)	100.5
판매·서비스직	116	10.8(2.9)	26.8	34	14.8(6.4)	43.5	82	8.6(3.1)	35.8
농림어업	42	38.5(7.2)	18.7	24	47.3(10.5)	22.1	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	14.5(2.9)	19.7	160	12.6(2.9)	23.0	60	21.4(5.9)	27.6
기타 ³⁾	341	9.8(1.6)	16.3	93	12.7(4.0)	31.4	248	8.7(1.8)	20.3
월 가구소득									
50만원 미만	97	13.5(4.9)	36.2	33	15.1(8.2)	54.1	64	12.5(5.0)	39.9
50-100만원 미만	84	13.6(3.6)	26.6	34	17.8(5.4)	30.3	50	9.8(4.5)	46.0
100-200만원 미만	106	6.6(3.1)	46.3	47	7.1(3.7)	52.1	59	6.2(3.0)	47.5
200-300만원 미만	179	13.3(2.6)	19.2	83	18.2(4.2)	23.3	96	8.0(2.6)	32.1
300-400만원 미만	143	12.9(3.0)	23.4	72	10.8(3.9)	36.1	71	15.6(4.9)	31.7
400-500만원 미만	122	9.5(2.8)	29.0	57	9.4(4.0)	43.0	65	9.6(4.0)	41.2
500-600만원 미만	66	20.0(6.3)	31.6	36	22.1(7.1)	32.2	30	16.7(8.9)	53.5
600만원 이상	111	6.1(3.0)	48.4	54	6.9(4.1)	59.7	57	5.1(2.9)	57.1

주 : 1) 중등도 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 29〉 중등도 이상 신체활동 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	912	23.8(1.6)	6.8	418	30.7(2.4)	7.7	494	16.5(1.8)	11.2
연령									
19-29	91	23.7(4.1)	17.5	45	38.3(6.6)	17.2	46	4.7(2.8)	58.4
30-39	131	28.4(3.6)	12.6	63	32.3(5.3)	16.4	68	24.2(4.9)	20.4
40-49	204	24.4(3.6)	14.7	91	28.9(5.4)	18.6	113	19.4(4.2)	21.4
50-59	218	21.6(3.7)	17.1	103	26.7(5.2)	19.6	115	15.8(3.7)	23.1
60-69	111	22.8(4.0)	17.5	53	25.7(4.9)	19.2	58	20.2(6.0)	29.5
70 이상	157	20.3(3.4)	16.7	63	30.9(6.3)	20.6	94	12.6(4.1)	33.0
19-64	716	24.6(1.8)	7.5	332	31.0(2.7)	8.8	384	17.5(2.1)	11.7
65 이상	196	19.6(3.0)	15.1	86	28.8(5.0)	17.4	110	11.9(3.7)	31.0
교육수준 ²⁾									
무학	57	10.7(4.3)	40.6	4	—(—)	—	53	9.3(4.2)	45.2
초등학교	125	25.5(4.4)	17.1	47	31.6(8.0)	25.4	78	21.5(4.6)	21.5
중학교	88	20.5(3.8)	18.4	36	31.8(7.9)	24.9	52	12.7(4.6)	36.3
고등학교	380	24.0(2.7)	11.1	203	29.0(3.6)	12.5	177	16.9(2.9)	16.9
대학교 이상	259	25.7(2.7)	10.4	127	33.2(3.7)	11.1	132	17.3(3.7)	21.5
직업									
전문행정관리	108	25.6(4.3)	16.6	59	30.6(6.3)	20.5	49	18.4(6.8)	36.8
사무직	85	18.0(3.7)	20.8	48	23.8(5.5)	23.2	37	9.2(4.4)	48.0
판매·서비스직	116	24.2(3.6)	15.0	34	40.4(9.7)	23.9	82	15.1(3.8)	25.1
농림어업	42	40.7(6.8)	16.8	24	51.1(9.4)	18.5	18	—(—)	—
기능단순노무직	220	30.0(3.5)	11.7	160	31.6(3.9)	12.3	60	24.4(5.9)	24.2
기타 ³⁾	341	18.2(2.4)	13.3	93	24.9(5.5)	22.2	248	15.5(2.5)	16.2
월 가구소득									
50만원 미만	97	18.5(5.0)	27.2	33	22.0(8.2)	37.1	64	16.3(5.4)	33.3
50-100만원 미만	84	17.6(4.3)	24.3	34	21.6(5.8)	26.9	50	14.0(5.9)	42.0
100-200만원 미만	106	21.9(4.0)	18.4	47	29.1(6.8)	23.2	59	15.7(4.5)	28.4
200-300만원 미만	179	23.9(3.9)	16.2	83	32.9(5.8)	17.6	96	14.1(3.5)	24.7
300-400만원 미만	143	19.3(3.8)	19.7	72	18.0(5.0)	27.9	71	20.9(5.5)	26.5
400-500만원 미만	122	29.5(3.4)	11.5	57	39.0(6.7)	17.2	65	19.5(5.3)	27.0
500-600만원 미만	66	31.6(9.1)	28.7	36	33.3(9.9)	29.8	30	29.1(10.7)	36.9
600만원 이상	111	26.0(5.1)	19.7	54	41.2(6.9)	16.9	57	8.3(3.9)	46.8

주 : 1) 중등도 이상 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 30〉 걷기 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	913	52.8(2.3)	4.3	419	58.4(3.0)	5.2	494	46.9(2.3)	5.0
연령									
19-29	91	60.6(4.9)	8.2	45	70.3(6.2)	8.8	46	48.0(7.0)	14.6
30-39	132	51.5(4.5)	8.8	64	60.7(6.4)	10.5	68	41.5(6.3)	15.1
40-49	204	53.2(3.7)	6.9	91	55.2(5.0)	9.1	113	51.0(4.3)	8.3
50-59	218	46.9(3.9)	8.4	103	53.4(5.3)	9.9	115	39.5(5.0)	12.6
60-69	111	62.5(4.8)	7.7	53	54.0(7.5)	13.8	58	70.3(5.3)	7.6
70 이상	157	47.0(5.2)	11.0	63	54.7(6.0)	11.0	94	41.5(6.4)	15.6
19-64	717	53.9(2.4)	4.5	333	59.2(3.2)	5.5	384	48.0(2.5)	5.3
65 이상	196	47.0(4.8)	10.2	86	53.2(5.7)	10.6	110	41.8(5.8)	14.0
교육수준 ²⁾									
무학	57	49.6(8.5)	17.1	4	-(-)	-	53	47.8(8.4)	17.5
초등학교	125	51.1(5.4)	10.6	47	55.1(7.5)	13.7	78	48.5(6.0)	12.4
중학교	88	53.2(5.3)	10.0	36	48.6(9.0)	18.6	52	56.3(6.3)	11.2
고등학교	381	51.9(3.4)	6.6	204	55.8(4.0)	7.2	177	46.2(4.6)	10.0
대학교 이상	259	55.4(3.6)	6.5	127	64.9(4.7)	7.3	132	44.7(4.1)	9.1
직업									
전문행정관리	108	56.1(4.9)	8.7	59	60.9(6.4)	10.6	49	49.0(7.0)	14.3
사무직	85	61.7(5.9)	9.6	48	72.3(6.8)	9.5	37	45.7(8.5)	18.5
판매·서비스직	117	40.6(5.6)	13.8	35	48.0(9.1)	18.9	82	36.3(6.3)	17.3
농림어업	42	79.5(6.1)	7.7	24	74.3(10.6)	14.3	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	55.4(3.9)	7.0	160	57.1(4.7)	8.3	60	49.6(6.5)	13.1
기타 ³⁾	341	49.1(3.5)	7.2	93	52.3(5.6)	10.7	248	47.8(3.7)	7.7
월 가구소득									
50만원 미만	97	42.0(5.8)	13.8	33	45.0(8.2)	18.2	64	40.2(6.9)	17.2
50-100만원 미만	84	43.4(6.2)	14.3	34	43.9(9.3)	21.1	50	43.1(7.3)	17.0
100-200만원 미만	106	50.4(5.5)	10.9	47	53.8(8.1)	15.0	59	47.5(8.0)	16.7
200-300만원 미만	179	50.2(3.7)	7.3	83	59.8(5.9)	9.9	96	39.8(5.1)	12.9
300-400만원 미만	143	58.9(5.2)	8.9	72	61.7(5.9)	9.6	71	55.5(6.6)	12.0
400-500만원 미만	123	52.5(4.7)	9.0	58	61.7(5.9)	9.5	65	42.8(7.3)	17.2
500-600만원 미만	66	45.4(9.4)	20.7	36	45.6(12.2)	26.7	30	45.0(9.7)	21.5
600만원 이상	111	66.8(6.0)	9.0	54	71.6(7.9)	11.0	57	61.2(5.4)	8.8

주 : 1) 걷기 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 걷기를 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 31〉 월간 규칙적 운동실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	913	36.6(1.8)	4.8	419	42.2(2.6)	6.2	494	30.7(1.9)	6.3
연령									
19-29	91	34.9(5.3)	15.1	45	48.9(6.9)	14.1	46	16.7(5.0)	29.8
30-39	132	39.7(4.3)	10.8	64	41.4(6.6)	16.0	68	37.8(6.2)	16.5
40-49	204	43.3(3.4)	7.8	91	45.1(5.0)	11.0	113	41.3(4.6)	11.1
50-59	218	40.7(3.9)	9.5	103	46.1(5.8)	12.6	115	34.5(4.5)	13.0
60-69	111	24.9(4.4)	17.8	53	18.9(5.1)	26.9	58	30.4(6.3)	20.9
70 이상	157	22.6(3.7)	16.4	63	34.8(6.0)	17.2	94	13.8(3.8)	27.9
19-64	717	39.4(2.1)	5.4	333	43.9(3.1)	7.0	384	34.4(2.3)	6.8
65 이상	196	21.4(3.1)	14.7	86	31.6(4.7)	14.9	110	12.9(3.5)	26.9
교육수준 ²⁾									
무학	57	14.7(6.2)	42.2	4	-(-)	-	53	11.3(4.7)	41.5
초등학교	125	17.3(3.5)	20.5	47	20.6(5.4)	26.0	78	15.1(3.9)	25.9
중학교	88	35.8(5.2)	14.4	36	36.3(8.1)	22.2	52	35.4(7.5)	21.2
고등학교	381	36.9(2.9)	8.0	204	38.3(3.9)	10.2	177	34.9(3.9)	11.1
대학교 이상	259	45.2(2.9)	6.4	127	54.0(4.2)	7.7	132	35.3(4.4)	12.5
직업									
전문행정관리	108	47.9(4.1)	8.6	59	51.4(6.3)	12.2	49	42.8(7.0)	16.3
사무직	85	41.1(4.5)	10.8	48	50.6(6.8)	13.4	37	26.6(5.5)	20.7
판매·서비스직	117	40.5(3.8)	9.4	35	54.1(8.9)	16.5	82	32.5(5.0)	15.4
농림어업	42	11.1(5.0)	45.1	24	12.8(7.1)	55.5	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	37.7(3.3)	8.7	160	39.6(4.0)	10.1	60	30.9(6.4)	20.9
기타 ³⁾	341	30.3(3.2)	10.7	93	33.5(6.2)	18.6	248	29.0(2.9)	10.1
월 가구소득									
50만원 미만	97	24.8(4.7)	19.0	33	28.5(7.4)	26.1	64	22.6(4.9)	21.8
50-100만원 미만	84	16.4(4.6)	28.0	34	24.7(8.9)	36.0	50	9.0(3.3)	36.7
100-200만원 미만	106	33.0(4.3)	12.9	47	31.4(7.4)	23.5	59	34.3(4.8)	13.9
200-300만원 미만	179	37.5(4.5)	12.0	83	38.3(5.9)	15.5	96	36.6(5.3)	14.6
300-400만원 미만	143	34.3(5.1)	14.9	72	36.0(5.9)	16.4	71	32.1(6.0)	18.8
400-500만원 미만	123	40.4(4.1)	10.1	58	53.9(7.4)	13.8	65	26.0(5.1)	19.6
500-600만원 미만	66	33.8(6.7)	19.8	36	37.1(7.7)	20.9	30	28.6(8.4)	29.3
600만원 이상	111	56.2(5.2)	9.3	54	67.0(6.9)	10.3	57	43.5(6.5)	14.9

주 : 1) 월간 규칙적 운동실천율 : (최근 1달(30일) 동안 규칙적으로 운동을 하고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 32〉 저염선택율¹⁾

(단위 : %)

구분	N	Type I		Type II		Type III	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	913	42.5(1.9)	4.6	27.8(1.4)	5.2	13.4(1.2)	9.3
성							
남자	419	49.1(2.7)	5.5	22.9(2.1)	9.2	9.6(1.5)	16.0
여자	494	35.4(2.4)	6.8	33.0(2.1)	6.3	17.3(1.7)	10.1
연령							
19-29	91	50.2(4.9)	9.7	26.7(4.4)	16.5	3.8(2.4)	61.3
30-39	132	44.7(4.5)	10.2	26.5(4.0)	15.0	11.4(2.8)	24.6
40-49	204	42.5(3.7)	8.6	25.1(2.9)	11.5	14.6(2.6)	17.9
50-59	218	39.9(3.3)	8.3	34.3(3.4)	10.0	14.8(2.3)	15.7
60-69	111	34.0(4.8)	14.2	30.3(4.7)	15.4	20.9(3.8)	18.4
70 이상	157	38.9(4.3)	11.0	24.1(3.3)	13.6	19.0(3.1)	16.3
19-64	717	43.3(2.0)	4.7	28.4(1.6)	5.6	12.1(1.3)	10.7
65 이상	196	37.8(4.0)	10.5	24.6(3.0)	12.1	20.2(2.9)	14.2
교육수준 ²⁾							
무학	57	36.2(5.9)	16.2	25.4(6.5)	25.5	16.4(4.3)	26.5
초등학교	125	32.2(5.0)	15.7	35.2(5.1)	14.4	17.8(4.1)	22.8
중학교	88	46.8(5.4)	11.5	20.4(4.0)	19.6	25.7(4.8)	18.5
고등학교	381	43.7(2.6)	6.0	28.3(2.1)	7.3	10.8(1.8)	16.3
대학교 이상	259	43.3(3.5)	8.1	27.2(2.4)	8.9	12.2(1.7)	13.5
직업							
전문행정관리	108	41.5(5.2)	12.6	21.5(3.8)	17.7	16.9(4.0)	23.6
사무직	85	47.8(5.8)	12.0	28.6(5.2)	18.1	10.1(2.9)	29.1
판매·서비스직	117	34.1(5.1)	15.1	26.9(4.5)	16.6	17.1(4.2)	24.7
농림어업	42	46.3(7.1)	15.4	26.5(8.7)	32.8	11.5(5.9)	51.0
기능단순노무직	220	51.9(3.2)	6.3	26.2(2.4)	9.3	8.4(2.0)	23.4
기타 ³⁾	341	36.6(2.9)	8.0	32.0(2.9)	9.0	15.7(2.0)	12.8
월 가구소득							
50만원 미만	97	26.6(4.9)	18.2	24.5(4.0)	16.4	26.2(4.3)	16.3
50-100만원 미만	84	36.3(5.1)	14.1	28.9(5.1)	17.6	10.1(2.6)	25.3
100-200만원 미만	106	53.1(5.8)	10.9	14.7(3.3)	22.3	17.0(4.1)	24.2
200-300만원 미만	179	38.4(3.6)	9.3	31.2(3.6)	11.6	12.7(3.1)	24.4
300-400만원 미만	143	37.7(4.6)	12.2	31.2(4.2)	13.3	10.9(2.4)	22.2
400-500만원 미만	123	50.9(4.5)	8.9	23.2(4.6)	19.7	12.8(3.6)	28.0
500-600만원 미만	66	45.4(7.5)	16.5	31.2(7.4)	23.7	11.8(2.8)	23.9
600만원 이상	111	47.1(5.0)	10.7	33.6(4.4)	13.1	9.8(4.2)	42.7

주 : 1) 저염선택율 : 3문항 중 「한 가지만 선택한 경우 Type I, 두 가지를 선택한 경우 Type II, 세 가지 모두 선택 시 Type III」

- ① 평소 음식을 먹을 때 “약간 싱겁게 먹는다” 또는 “아주 싱겁게 먹는다”에 응답한 사람의 수 또는,
 ② 조리된 음식을 먹을 때 소금이나 간장을 “전혀 더 넣지 않는다”에 응답한 사람의 수 또는,
 ③ 전, 부침, 튀김 등을 먹을 때 간장에 “짜여 먹지 않는다”에 응답한 사람의 수

/ 조사대상 응답자 수 × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 33〉 영양표시 활용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	193	81.5(3.6)	4.4	31	69.5(10.5)	15.1	162	85.0(2.5)	2.9
연령									
19-29	26	71.0(11.3)	16.0	10	-(-)	-	16	-(-)	-
30-39	44	76.4(7.1)	9.3	4	-(-)	-	40	77.0(6.8)	8.8
40-49	74	91.3(3.2)	3.5	12	-(-)	-	62	92.8(3.2)	3.5
50-59	37	80.1(4.3)	5.4	4	-(-)	-	33	79.2(4.7)	5.9
60-69	11	-(-)	-	1	-(-)	-	10	-(-)	-
70 이상	1	-(-)	-	0	-(-)	-	1	-(-)	-

주 : 1) 영양표시 활용률 : (영양표시 내용이 가공식품을 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수 / 가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수) × 100

〈표 34〉 식품 안정성 확보율¹⁾

(단위 : %)

구분	우리 가족 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다		우리 가족 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다		경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다		경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다		식품안전성확보율 ¹⁾	
	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수
전체	64.9(2.3)	3.5	30.1(1.9)	6.5	4.4(0.9)	21.3	0.6(0.4)	57.7	95.0(1.0)	1.1
월 가구소득										
50만원 미만	16.6(3.7)	22.4	51.3(5.3)	10.4	27.5(5.5)	20.0	4.6(2.5)	53.9	67.9(5.7)	8.3
50-100만원 미만	45.7(6.6)	14.4	49.4(6.5)	13.2	4.9(4.0)	80.4	0.0(0.0)	.	95.1(4.0)	4.2
100-200만원 미만	43.7(5.9)	13.6	55.1(6.1)	11.1	1.3(1.3)	100.7	0.0(0.0)	.	98.7(1.3)	1.3
200-300만원 미만	79.2(5.0)	6.3	20.8(5.0)	24.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0
300-400만원 미만	82.8(4.4)	5.4	17.2(4.4)	25.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0
400-500만원 미만	84.9(3.6)	4.3	15.1(3.6)	24.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0
500-600만원 미만	88.6(6.1)	6.9	11.4(6.1)	53.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0
600만원 이상	87.8(3.9)	4.4	12.2(3.9)	31.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0

주 : 1) 식품 안정성 확보율 : (“우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다” 또는 “우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 가구 수) × 100

〈표 35〉 저염식 실천 노력 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	913	66.3(1.8)	2.8	419	60.1(2.7)	4.6	494	72.9(2.0)	2.8
연령									
19-29	91	49.1(5.7)	11.5	45	47.6(7.4)	15.5	46	51.0(8.2)	16.0
30-39	132	60.3(4.2)	6.9	64	50.2(6.9)	13.7	68	71.2(5.2)	7.3
40-49	204	71.7(3.4)	4.7	91	65.3(4.5)	6.9	113	78.7(4.3)	5.4
50-59	218	75.3(3.4)	4.6	103	69.3(4.8)	6.9	115	82.2(3.9)	4.7
60-69	111	71.4(4.6)	6.4	53	58.1(6.8)	11.7	58	83.7(4.9)	5.8
70 이상	157	69.3(4.0)	5.8	63	70.7(5.4)	7.7	94	68.3(5.6)	8.1
19-64	717	65.8(2.0)	3.1	333	58.8(2.9)	5.0	384	73.5(2.3)	3.2
65 이상	196	69.0(3.5)	5.0	86	68.1(4.5)	6.7	110	69.8(4.5)	6.5
교육수준 ²⁾									
무학	57	73.3(5.4)	7.3	4	—(—)	—	53	71.1(5.9)	8.3
초등학교	125	69.0(4.7)	6.8	47	65.7(7.6)	11.6	78	71.2(4.8)	6.8
중학교	88	72.9(4.8)	6.6	36	64.5(8.1)	12.5	52	78.7(6.2)	7.9
고등학교	381	64.5(2.5)	3.9	204	58.8(3.5)	6.0	177	72.7(3.3)	4.6
대학교 이상	259	65.3(3.4)	5.2	127	59.1(4.8)	8.1	132	72.3(4.1)	5.7
직업									
전문행정관리	108	71.7(4.3)	6.0	59	71.7(5.5)	7.7	49	71.8(6.9)	9.6
사무직	85	67.5(5.2)	7.7	48	67.0(6.8)	10.1	37	68.2(7.5)	11.0
판매·서비스직	117	74.2(4.4)	6.0	35	58.6(9.1)	15.5	82	83.3(3.7)	4.5
농림어업	42	58.1(9.1)	15.6	24	57.6(11.5)	19.9	18	—(—)	—
기능단순노무직	220	57.8(4.8)	8.2	160	54.6(5.3)	9.6	60	69.2(7.1)	10.3
기타 ³⁾	341	68.1(3.3)	4.8	93	58.9(6.3)	10.7	248	71.8(3.6)	5.0
월 가구소득									
50만원 미만	97	68.7(5.9)	8.6	33	59.6(13.2)	22.2	64	74.2(4.4)	6.0
50-100만원 미만	84	59.1(4.8)	8.1	34	45.0(9.5)	21.1	50	71.6(6.3)	8.8
100-200만원 미만	106	68.6(4.9)	7.2	47	63.6(6.4)	10.0	59	72.9(6.4)	8.8
200-300만원 미만	179	65.3(4.2)	6.4	83	66.4(5.9)	8.8	96	64.2(5.0)	7.7
300-400만원 미만	143	61.9(4.7)	7.6	72	53.9(6.5)	12.0	71	71.8(5.3)	7.4
400-500만원 미만	123	66.7(4.1)	6.1	58	62.0(6.5)	10.5	65	71.7(6.6)	9.2
500-600만원 미만	66	59.1(8.6)	14.6	36	48.0(13.1)	27.3	30	76.6(8.3)	10.8
600만원 이상	111	77.4(3.8)	5.0	54	70.1(5.7)	8.1	57	85.8(4.2)	4.9

주 : 1) 저염식 실천 노력 경험률 : (평소 덜 짜게 먹으려고 "항상 노력한다" 또는 "대체로 노력한다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 36〉 연간 영양교육 및 상담 수혜율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	913	4.4(0.7)	15.2	419	2.8(0.9)	33.3	494	6.0(1.1)	18.1
연령									
19-29	91	7.9(2.8)	35.3	45	9.1(3.9)	43.4	46	6.3(3.6)	57.7
30-39	132	3.5(1.9)	53.5	64	4.1(3.1)	76.7	68	2.8(1.9)	68.5
40-49	204	4.9(1.6)	32.2	91	0.0(0.0)	.	113	10.2(3.3)	32.4
50-59	218	3.9(1.7)	43.2	103	0.0(0.0)	.	115	8.3(3.5)	42.4
60-69	111	3.6(1.8)	50.0	53	1.4(1.4)	101.5	58	5.6(3.1)	56.1
70 이상	157	1.4(1.0)	71.1	63	3.4(2.3)	69.0	94	0.0(0.0)	.
19-64	717	5.0(0.8)	16.0	333	2.9(1.1)	38.0	384	7.2(1.3)	17.6
65 이상	196	1.1(0.8)	70.9	86	2.5(1.7)	70.1	110	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	57	0.0(0.0)	.	4	-(-)	-	53	0.0(0.0)	.
초등학교	125	1.9(1.3)	70.6	47	4.7(3.2)	67.5	78	0.0(0.0)	.
중학교	88	6.5(2.7)	40.6	36	0.0(0.0)	.	52	11.0(4.3)	38.6
고등학교	381	3.9(1.0)	25.9	204	3.8(1.6)	43.5	177	4.1(1.4)	33.0
대학교 이상	259	5.8(1.5)	25.3	127	1.6(1.1)	71.7	132	10.6(2.8)	26.2
직업									
전문행정관리	108	5.1(1.9)	37.0	59	1.3(1.3)	99.5	49	10.6(4.3)	40.6
사무직	85	0.9(0.9)	98.3	48	0.0(0.0)	.	37	2.2(2.1)	95.5
판매·서비스직	117	6.3(3.0)	47.0	35	3.6(3.5)	97.5	82	7.8(4.1)	51.8
농림어업	42	0.0(0.0)	.	24	0.0(0.0)	.	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	4.5(1.7)	38.9	160	3.3(1.9)	57.1	60	8.6(3.8)	44.5
기타 ³⁾	341	4.8(1.2)	26.0	93	5.2(2.5)	48.9	248	4.6(1.4)	30.3
월 가구소득									
50만원 미만	97	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	64	0.0(0.0)	.
50-100만원 미만	84	5.4(4.1)	76.2	34	11.6(8.3)	71.7	50	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	106	4.8(2.4)	50.3	47	1.9(1.9)	98.5	59	7.2(4.1)	56.8
200-300만원 미만	179	5.2(1.6)	31.3	83	1.2(0.9)	74.2	96	9.6(3.2)	33.5
300-400만원 미만	143	4.0(1.4)	34.2	72	3.9(1.9)	49.1	71	4.1(1.8)	43.9
400-500만원 미만	123	4.2(1.7)	40.8	58	0.0(0.0)	.	65	8.6(3.5)	40.6
500-600만원 미만	66	6.0(3.2)	52.9	36	5.2(5.1)	97.1	30	7.2(4.4)	61.4
600만원 이상	111	4.6(2.7)	58.5	54	3.1(3.1)	99.7	57	6.3(4.2)	66.0

주 : 1) 연간 영양교육 및 상담 수혜율 : (최근 1년(365일) 동안 영양교육 및 상담을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 37〉 비만도 분포 및 비만율

(단위 : %, 평균)

구분	N	비만도 분포 ¹⁾						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율) ²⁾			
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	평균(표준오차)	변동계수
전체	894	6.6(0.9)	13.8	67.6(1.7)	2.5	25.8(1.5)	5.9	23.1(0.1)	0.5
성									
남자	417	2.5(0.8)	31.0	62.3(2.0)	3.2	35.2(1.9)	5.5	23.9(0.1)	0.5
여자	477	11.0(1.6)	15.0	73.4(2.3)	3.1	15.6(1.9)	12.0	22.3(0.1)	0.6
연령									
19-29	91	13.4(3.0)	22.2	69.5(4.3)	6.2	17.1(4.1)	24.1	22.4(0.3)	1.4
30-39	131	9.3(2.4)	25.9	61.1(3.8)	6.2	29.5(3.7)	12.5	22.8(0.3)	1.1
40-49	203	4.4(1.4)	32.8	69.1(3.3)	4.7	26.5(3.1)	11.9	23.4(0.2)	0.9
50-59	216	2.0(0.7)	34.5	67.8(3.4)	5.1	30.2(3.4)	11.4	23.8(0.2)	0.8
60-69	111	1.8(1.3)	69.7	66.9(5.0)	7.5	31.3(4.7)	15.1	23.6(0.3)	1.2
70 이상	142	8.5(2.2)	25.4	72.3(3.3)	4.5	19.2(2.8)	14.8	22.5(0.2)	0.9
19-64	713	6.4(1.0)	15.9	67.1(1.8)	2.7	26.5(1.7)	6.4	23.2(0.1)	0.5
65 이상	181	7.8(1.8)	23.7	70.5(3.4)	4.8	21.7(2.9)	13.4	22.7(0.2)	0.7
교육수준 ³⁾									
무학	48	10.5(4.4)	41.9	62.2(6.5)	10.5	27.3(6.2)	22.6	23.1(0.5)	2.0
초등학교	119	5.2(2.4)	45.9	73.5(4.7)	6.3	21.3(3.9)	18.6	22.8(0.2)	0.9
중학교	87	2.0(1.4)	69.4	78.5(4.5)	5.7	19.5(4.0)	20.5	23.4(0.2)	0.9
고등학교	380	6.4(1.5)	23.1	66.0(2.6)	4.0	27.6(2.4)	8.7	23.3(0.2)	0.7
대학교 이상	257	7.9(1.5)	19.7	66.3(2.5)	3.7	25.8(2.4)	9.2	22.9(0.2)	0.7
직업									
전문행정관리	108	2.9(1.6)	55.7	68.4(5.0)	7.3	28.7(4.8)	16.6	23.4(0.3)	1.4
사무직	84	10.0(3.2)	32.2	58.1(5.6)	9.6	31.9(5.2)	16.1	23.3(0.3)	1.5
판매·서비스직	117	3.9(1.9)	48.6	78.9(3.3)	4.2	17.2(3.2)	18.9	22.7(0.3)	1.1
농림어업	41	1.9(1.9)	102.3	64.7(7.1)	11.0	33.4(7.2)	21.6	23.5(0.5)	1.9
기능단순노무직	220	2.0(1.0)	47.4	60.5(3.2)	5.3	37.4(3.2)	8.6	24.0(0.2)	0.8
기타 ⁴⁾	324	12.4(2.2)	18.2	71.8(2.7)	3.8	15.8(2.2)	13.8	22.3(0.2)	0.9
월 가구소득									
50만원 미만	85	11.3(3.2)	28.2	68.6(4.6)	6.6	20.1(4.1)	20.2	22.6(0.3)	1.5
50-100만원 미만	81	7.2(3.2)	44.1	66.8(5.1)	7.6	26.0(4.7)	18.1	23.1(0.3)	1.3
100-200만원 미만	104	4.9(2.0)	39.9	72.6(4.1)	5.6	22.5(3.8)	17.1	23.3(0.2)	1.0
200-300만원 미만	177	6.5(2.2)	33.4	57.7(3.9)	6.8	35.8(3.8)	10.7	23.6(0.3)	1.1
300-400만원 미만	143	3.5(1.6)	46.2	75.2(3.7)	5.0	21.3(3.3)	15.5	23.2(0.2)	0.9
400-500만원 미만	123	9.1(3.3)	36.6	67.7(4.9)	7.3	23.2(4.1)	17.6	22.7(0.3)	1.4
500-600만원 미만	66	6.3(3.5)	55.7	66.2(5.0)	7.6	27.5(5.7)	20.9	23.0(0.4)	1.6
600만원 이상	111	6.5(2.1)	32.5	69.3(4.1)	6.0	24.1(4.8)	19.7	23.0(0.4)	1.5

주 : 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만율 : (체질량지수(kg/m²) 25 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 38〉 주관적 비만인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	913	36.8(1.8)	4.9	419	34.3(2.2)	6.5	494	39.5(2.4)	6.0
연령									
19-29	91	37.3(5.3)	14.1	45	38.9(6.3)	16.1	46	35.2(7.2)	20.5
30-39	132	39.1(3.9)	10.1	64	37.3(5.7)	15.1	68	41.0(5.9)	14.3
40-49	204	39.0(3.4)	8.8	91	32.2(4.1)	12.8	113	46.3(4.7)	10.2
50-59	218	44.2(3.3)	7.4	103	37.3(4.8)	13.0	115	52.2(5.2)	10.0
60-69	111	36.5(4.2)	11.6	53	34.7(7.1)	20.5	58	38.2(6.9)	18.0
70 이상	157	16.6(2.8)	16.9	63	18.6(4.8)	26.0	94	15.2(3.7)	24.5
19-64	717	39.9(2.0)	5.0	333	35.9(2.5)	6.9	384	44.2(2.6)	5.9
65 이상	196	20.1(2.6)	12.9	86	23.8(4.6)	19.1	110	16.9(3.4)	20.1
교육수준 ²⁾									
무학	57	22.2(5.3)	23.7	4	-(-)	-	53	18.2(5.8)	31.7
초등학교	125	25.1(3.7)	14.6	47	22.9(5.8)	25.4	78	26.5(5.3)	19.9
중학교	88	30.6(4.5)	14.7	36	25.6(7.4)	28.9	52	34.0(5.9)	17.5
고등학교	381	40.1(2.7)	6.8	204	35.0(3.1)	8.8	177	47.5(4.2)	8.8
대학교 이상	259	39.0(3.0)	7.6	127	36.5(4.1)	11.3	132	41.8(4.5)	10.7
직업									
전문행정관리	108	42.2(5.9)	13.9	59	45.7(7.2)	15.8	49	37.1(7.3)	19.7
사무직	85	40.9(5.0)	12.2	48	43.5(6.6)	15.3	37	37.1(7.5)	20.3
판매·서비스직	117	35.7(4.6)	12.8	35	25.0(7.5)	30.1	82	41.9(5.1)	12.1
농림어업	42	26.5(8.0)	30.4	24	30.2(9.8)	32.4	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	40.1(3.4)	8.5	160	35.5(3.6)	10.1	60	56.9(6.6)	11.6
기타 ³⁾	341	32.1(3.0)	9.5	93	21.4(4.0)	18.8	248	36.4(3.8)	10.5
월 가구소득									
50만원 미만	97	19.0(3.8)	20.1	33	23.7(8.0)	33.9	64	16.2(4.5)	27.9
50-100만원 미만	84	33.3(5.2)	15.7	34	34.3(8.4)	24.4	50	32.5(6.8)	21.0
100-200만원 미만	106	32.8(4.7)	14.4	47	20.6(6.5)	31.7	59	43.3(6.6)	15.2
200-300만원 미만	179	38.8(3.5)	9.0	83	43.6(6.3)	14.4	96	33.6(4.7)	14.0
300-400만원 미만	143	40.0(4.5)	11.3	72	34.8(5.7)	16.3	71	46.5(6.4)	13.8
400-500만원 미만	123	42.0(5.2)	12.5	58	37.5(7.0)	18.7	65	46.8(6.4)	13.8
500-600만원 미만	66	37.6(5.5)	14.7	36	31.0(6.8)	21.8	30	48.1(9.9)	20.6
600만원 이상	111	38.2(6.0)	15.7	54	33.1(6.8)	20.5	57	44.2(7.4)	16.7

주 : 1) 주관적 비만인지율 : (“약간 비만임” 또는 “매우 비만임”이라고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 39〉 연간 체중조절 시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	913	54.8(1.6)	2.9	419	50.4(2.5)	5.0	494	59.4(2.0)	3.4
연령									
19-29	91	64.8(4.4)	6.9	45	65.1(6.7)	10.4	46	64.4(6.7)	10.4
30-39	132	64.2(4.0)	6.2	64	53.1(5.5)	10.3	68	76.3(5.2)	6.8
40-49	204	66.0(3.0)	4.5	91	57.0(4.9)	8.6	113	75.7(4.0)	5.3
50-59	218	57.3(3.2)	5.5	103	52.9(4.3)	8.2	115	62.3(4.8)	7.7
60-69	111	36.4(4.2)	11.5	53	24.9(6.3)	25.5	58	47.0(6.6)	14.1
70 이상	157	13.9(2.9)	20.9	63	18.0(5.0)	27.9	94	11.0(3.1)	28.2
19-64	717	61.6(1.6)	2.6	333	55.0(2.5)	4.6	384	68.8(2.3)	3.3
65 이상	196	17.3(2.8)	16.1	86	21.5(4.4)	20.5	110	13.8(3.1)	22.2
교육수준 ²⁾									
무학	57	15.4(3.8)	24.5	4	-(-)	-	53	14.2(4.4)	31.1
초등학교	125	22.2(3.3)	14.7	47	22.2(6.3)	28.4	78	22.2(4.6)	20.6
중학교	88	41.3(5.0)	12.1	36	25.9(7.9)	30.6	52	51.8(6.1)	11.7
고등학교	381	58.2(2.3)	4.0	204	51.5(3.4)	6.7	177	67.7(3.7)	5.5
대학교 이상	259	67.8(3.1)	4.6	127	59.8(4.5)	7.6	132	76.8(3.3)	4.3
직업									
전문행정관리	108	71.4(4.7)	6.6	59	63.7(6.1)	9.6	49	82.7(4.9)	6.0
사무직	85	64.6(6.3)	9.7	48	69.2(7.3)	10.6	37	57.5(7.7)	13.3
판매·서비스직	117	60.0(4.5)	7.5	35	42.3(7.4)	17.6	82	70.3(5.0)	7.2
농림어업	42	16.8(4.6)	27.7	24	18.3(6.9)	37.5	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	53.7(2.8)	5.2	160	51.1(3.3)	6.6	60	63.2(4.8)	7.7
기타 ³⁾	341	46.9(2.9)	6.2	93	35.0(5.9)	16.8	248	51.7(3.0)	5.7
월 가구소득									
50만원 미만	97	16.1(2.9)	18.2	33	19.3(6.9)	35.8	64	14.2(3.5)	24.6
50-100만원 미만	84	36.2(5.5)	15.3	34	35.3(8.5)	24.0	50	37.0(7.1)	19.1
100-200만원 미만	106	46.6(4.4)	9.4	47	26.6(6.5)	24.4	59	63.9(5.9)	9.2
200-300만원 미만	179	60.2(4.2)	7.0	83	56.5(5.4)	9.5	96	64.1(5.2)	8.1
300-400만원 미만	143	66.0(3.8)	5.8	72	61.0(6.6)	10.8	71	72.2(4.5)	6.2
400-500만원 미만	123	64.5(4.6)	7.1	58	63.0(6.6)	10.5	65	66.1(5.2)	7.8
500-600만원 미만	66	45.5(7.1)	15.7	36	39.5(6.6)	16.8	30	55.1(11.3)	20.5
600만원 이상	111	64.6(4.0)	6.2	54	57.2(6.7)	11.7	57	73.2(6.0)	8.2

주 : 1) 연간 체중조절 시도율 : (최근 1년(365일) 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 40〉 체중조절 시도방법¹⁾

(단위 : %)

구분	N ²⁾	운동		단식 (24시간 이상)		식사량 감소 또는 식단 조절		의사처방 없이 임의로 살 빼는 약 복용		의사처방을 받아서 살 빼는 약 복용		한약 복용		건강기능 식품		원푸드 다이어트	
		%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수
전체	465	76.4(2.1)	2.8	6.3(1.4)	21.5	63.4(2.4)	3.8	1.8(0.7)	36.9	2.3(0.7)	29.2	3.1(1.0)	33.8	8.9(1.6)	18.1	3.7(1.3)	35.3
성																	
남	189	81.6(2.8)	3.4	2.8(1.3)	46.0	53.8(3.2)	6.0	0.0(0.0)	.	1.0(0.3)	30.2	1.4(1.0)	71.1	3.3(1.6)	49.1	2.4(1.6)	64.0
여	276	71.7(2.8)	3.9	9.4(2.0)	21.1	72.0(3.0)	4.2	3.4(1.2)	36.5	3.4(1.2)	36.2	4.6(1.4)	30.5	13.9(2.4)	17.1	4.9(1.5)	31.4
연령																	
19-29	59	76.5(5.0)	6.5	10.2(4.4)	43.6	68.8(5.2)	7.5	4.0(2.2)	56.4	4.7(2.0)	43.2	3.4(3.3)	99.2	10.4(4.1)	39.5	7.1(3.9)	54.5
30-39	87	73.2(5.5)	7.5	8.7(3.6)	41.5	64.0(5.2)	8.1	0.8(0.8)	102.0	2.0(1.1)	54.3	4.1(1.9)	45.6	13.0(3.9)	30.2	6.5(2.6)	40.1
40-49	134	82.1(3.0)	3.7	6.5(2.2)	33.7	56.5(4.2)	7.3	2.9(1.6)	54.6	2.7(1.2)	43.1	4.9(1.9)	37.9	10.0(2.6)	25.9	2.5(0.9)	34.7
50-59	126	75.0(3.9)	5.2	2.6(1.0)	37.1	65.0(5.0)	7.7	0.0(0.0)	.	0.7(0.7)	100.6	0.5(0.5)	99.8	4.0(2.8)	71.0	1.1(1.1)	98.5
60-69	39	69.6(7.3)	10.4	0.0(0.0)	.	75.3(7.5)	9.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	5.8(4.0)	69.6	0.0(0.0)	.
70 이상	20	66.4(10.5)	15.9	0.0(0.0)	.	57.0(10.9)	19.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
19-64	434	77.3(2.2)	2.8	6.6(1.4)	21.2	63.3(2.6)	4.1	1.9(0.7)	36.8	2.4(0.7)	29.1	3.2(1.1)	33.8	9.3(1.7)	18.1	3.9(1.4)	35.2
65 이상	31	58.6(7.3)	12.5	0.0(0.0)	.	65.4(8.0)	12.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
교육수준 ³⁾																	
무학	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	28	71.2(6.5)	9.2	0.0(0.0)	.	83.0(7.5)	9.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
중학교	37	76.9(6.3)	8.3	1.6(1.6)	102.4	68.3(7.6)	11.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	5.5(3.7)	68.0	0.0(0.0)	.
고등학교	219	76.0(3.3)	4.3	6.5(1.9)	29.7	61.9(3.7)	5.9	2.0(1.0)	50.9	3.5(1.3)	36.4	2.6(1.1)	44.4	8.2(2.5)	30.4	4.0(1.8)	44.3
대학교 이상	171	77.6(3.2)	4.2	7.5(2.2)	29.9	63.0(3.7)	5.9	1.9(1.0)	51.7	1.4(0.7)	48.1	4.5(1.6)	36.1	11.3(2.5)	22.0	4.4(1.8)	39.6
직업																	
전문행정관리	75	71.2(5.3)	7.4	5.9(2.5)	42.6	54.2(5.8)	10.6	0.9(0.9)	99.0	0.0(0.0)	.	0.7(0.7)	98.8	7.9(2.7)	34.1	4.9(2.6)	52.6
사무직	53	76.5(4.9)	6.5	5.5(2.4)	44.2	58.8(5.9)	10.1	3.8(2.8)	74.4	3.9(2.3)	59.2	2.7(1.9)	71.7	2.7(1.9)	71.7	6.1(3.2)	52.2
판매·서비스직	71	74.0(4.7)	6.4	10.8(3.5)	32.5	67.2(5.1)	7.6	4.4(2.8)	62.2	5.0(2.1)	41.8	5.0(2.1)	41.8	29.5(6.2)	20.8	6.5(3.1)	47.7
농림어업	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	114	80.3(3.4)	4.2	3.7(2.1)	57.8	60.9(4.0)	6.6	0.0(0.0)	.	0.5(0.5)	100.9	3.0(1.9)	62.2	5.1(2.6)	50.6	2.0(1.5)	79.1
기타 ⁴⁾	145	78.0(4.1)	5.2	7.2(2.8)	39.2	70.9(5.5)	7.8	1.6(1.2)	71.1	3.2(1.4)	43.5	3.8(1.8)	47.0	5.1(2.3)	44.5	2.3(1.3)	59.5
월 가구소득																	
50만원 미만	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-100만원 미만	26	78.5(6.7)	8.6	3.4(3.2)	92.8	82.2(8.4)	10.2	3.4(3.2)	92.8	0.0(0.0)	.	3.4(3.2)	92.8	3.4(3.2)	92.8	3.4(3.2)	92.8
100-200만원 미만	49	71.3(7.0)	9.8	2.7(2.7)	100.2	81.2(5.8)	7.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	5.8(4.3)	74.3	6.4(3.8)	59.6	5.4(2.9)	54.0
200-300만원 미만	102	74.1(4.3)	5.8	12.5(3.9)	31.5	66.9(5.4)	8.0	2.5(1.8)	72.2	3.7(1.8)	48.6	4.9(3.2)	64.5	11.4(3.6)	31.7	4.3(3.2)	73.6
300-400만원 미만	90	77.3(5.2)	6.8	5.0(2.2)	43.2	57.5(5.5)	9.5	0.9(0.8)	93.2	4.3(1.2)	28.2	2.5(0.9)	37.5	5.2(1.6)	31.4	2.6(1.8)	67.3
400-500만원 미만	77	79.7(4.6)	5.8	5.9(3.3)	56.6	63.0(5.7)	9.0	1.5(1.5)	97.4	2.5(1.7)	68.8	2.4(1.7)	69.7	16.2(5.4)	33.6	6.5(2.8)	43.2
500-600만원 미만	32	74.8(10.2)	13.6	4.5(4.5)	100.5	78.8(6.0)	7.6	2.6(2.3)	89.3	0.0(0.0)	.	1.7(1.7)	99.5	6.7(3.3)	50.1	0.0(0.0)	.
600만원 이상	71	77.9(6.0)	7.7	4.7(2.4)	51.1	45.9(4.2)	9.2	2.8(2.0)	71.1	0.8(0.8)	100.5	1.6(1.6)	100.5	6.9(3.8)	55.4	2.5(1.7)	65.4

주 : 1) 체중조절 시도방법 : (각 체중조절 시도방법 / 체중을 "줄이거나" 또는 "유지"하려고 노력했던 사람의 수) × 100

2) 체중을 "줄이거나" 또는 "유지"하려고 노력했던 사람의 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 41〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	913	32.3(1.5)	4.5	419	30.1(2.5)	8.2	494	34.7(2.1)	6.0
연령									
19-29	91	16.4(4.4)	26.7	45	20.3(6.5)	31.9	46	11.2(4.6)	41.4
30-39	132	17.6(3.5)	19.9	64	12.9(4.1)	31.6	68	22.6(5.2)	23.1
40-49	204	27.9(3.3)	12.0	91	25.1(5.0)	20.1	113	31.0(4.4)	14.1
50-59	218	36.9(3.6)	9.6	103	33.3(4.9)	14.7	115	41.0(5.6)	13.7
60-69	111	56.0(4.9)	8.7	53	52.4(8.5)	16.3	58	59.3(6.0)	10.1
70 이상	157	60.4(4.2)	6.9	63	67.5(6.6)	9.8	94	55.3(5.0)	9.1
19-64	717	27.3(1.7)	6.1	333	24.3(2.6)	10.7	384	30.5(2.6)	8.4
65 이상	196	60.3(3.3)	5.5	86	66.9(5.3)	8.0	110	54.7(4.4)	8.1
교육수준 ²⁾									
무학	57	59.4(6.3)	10.6	4	-(-)	-	53	57.2(6.3)	11.0
초등학교	125	67.6(4.0)	6.0	47	74.5(6.4)	8.6	78	63.1(5.6)	8.8
중학교	88	45.8(6.4)	13.9	36	37.9(8.3)	21.8	52	51.1(7.4)	14.5
고등학교	381	28.9(2.3)	7.9	204	28.6(3.5)	12.3	177	29.2(3.7)	12.7
대학교 이상	259	20.2(2.1)	10.4	127	20.2(3.0)	14.7	132	20.3(3.5)	17.1
직업									
전문행정관리	108	20.4(3.7)	18.3	59	18.7(4.8)	25.8	49	22.9(6.4)	27.8
사무직	85	23.0(4.0)	17.5	48	24.6(5.3)	21.4	37	20.4(6.4)	31.5
판매·서비스직	117	26.9(5.0)	18.4	35	18.1(6.9)	38.0	82	32.1(6.1)	19.1
농림어업	42	53.2(11.4)	21.5	24	54.7(11.9)	21.8	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	31.9(3.1)	9.9	160	30.7(3.5)	11.2	60	36.1(7.4)	20.6
기타 ³⁾	341	41.0(2.2)	5.4	93	44.0(5.5)	12.6	248	39.8(2.7)	6.7
월 가구소득									
50만원 미만	97	68.6(4.8)	7.0	33	70.1(7.5)	10.7	64	67.7(5.8)	8.6
50-100만원 미만	84	49.8(5.3)	10.6	34	51.9(8.6)	16.6	50	47.9(6.6)	13.7
100-200만원 미만	106	36.6(4.0)	10.9	47	30.6(5.5)	17.9	59	41.7(7.1)	17.1
200-300만원 미만	179	30.9(3.8)	12.4	83	28.8(5.1)	17.7	96	33.2(4.6)	13.7
300-400만원 미만	143	25.1(4.1)	16.3	72	20.2(5.2)	25.9	71	31.1(6.1)	19.5
400-500만원 미만	123	26.3(5.0)	19.1	58	28.9(7.8)	27.0	65	23.5(5.1)	21.6
500-600만원 미만	66	24.9(5.1)	20.5	36	28.0(6.0)	21.4	30	19.9(6.0)	30.2
600만원 이상	111	20.7(3.4)	16.2	54	19.9(4.1)	20.8	57	21.7(6.4)	29.2

주 : 1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 : (“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 42〉 저작불편호소율 : 65세 이상¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	196	42.2(3.7)	8.7	86	44.9(5.7)	12.6	110	39.8(4.3)	10.7
교육수준 ²⁾									
무학	55	45.5(6.1)	13.5	4	—(—)	—	51	42.1(6.3)	15.1
초등학교	83	42.2(5.2)	12.4	39	47.0(8.3)	17.7	44	37.8(6.6)	17.4
중학교	22	48.0(12.1)	25.2	16	—(—)	—	6	—(—)	—
고등학교	28	39.0(11.4)	29.1	20	38.4(10.4)	27.0	8	—(—)	—
대학교 이상	8	—(—)	—	7	—(—)	—	1	—(—)	—
월 가구소득									
50만원 미만	80	48.3(5.7)	11.8	28	50.5(9.2)	18.2	52	46.9(6.5)	13.8
50~100만원 미만	44	39.7(8.1)	20.3	20	47.8(12.7)	26.6	24	32.2(9.6)	29.8
100~200만원 미만	29	33.5(9.0)	26.8	17	—(—)	—	12	—(—)	—
200~300만원 미만	16	—(—)	—	6	—(—)	—	10	—(—)	—
300~400만원 미만	10	—(—)	—	5	—(—)	—	5	—(—)	—
400~500만원 미만	8	—(—)	—	3	—(—)	—	5	—(—)	—
500~600만원 미만	5	—(—)	—	4	—(—)	—	1	—(—)	—
600만원 이상	2	—(—)	—	2	—(—)	—	0	—(—)	—

주 : 1) 저작불편호소율 : (“매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

〈표 43〉 틀니 이용 행태 : 50세 이상¹⁾

(단위 : %)

구분	N	위아래 둘 다 있음		위쪽만 있음		아래쪽만 있음		아니오	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	486	20.6(1.7)	8.3	6.5(1.2)	18.9	2.4(0.7)	30.2	70.4(2.0)	2.9
성									
남자	219	19.3(2.6)	13.4	6.3(1.5)	23.1	1.2(0.7)	60.2	73.2(2.9)	3.9
여자	267	21.9(2.4)	10.8	6.7(1.6)	23.9	3.6(1.3)	36.5	67.8(2.9)	4.3
교육수준 ²⁾									
무학	57	48.7(5.5)	11.2	13.6(4.3)	31.8	2.2(2.1)	96.3	35.4(6.5)	18.4
초등학교	124	45.1(4.7)	10.4	7.3(2.4)	33.1	6.0(2.0)	33.5	41.5(4.2)	10.1
중학교	79	13.7(3.6)	26.6	13.5(4.3)	31.6	0.0(0.0)	.	72.8(5.1)	7.0
고등학교	170	6.0(1.7)	27.7	2.9(1.1)	40.1	2.2(1.3)	60.5	89.0(2.0)	2.2
대학교 이상	53	5.3(2.7)	50.6	1.3(1.3)	98.1	0.0(0.0)	.	93.4(2.9)	3.2
월 가구소득									
50만원 미만	94	43.9(4.5)	10.3	14.5(3.9)	26.6	3.3(1.8)	55.7	38.4(4.3)	11.1
50-100만원 미만	71	30.0(5.1)	17.0	3.2(2.3)	71.7	5.8(2.7)	47.2	61.0(5.5)	9.0
100-200만원 미만	68	14.7(3.5)	23.9	14.1(4.7)	33.4	4.8(2.7)	55.4	66.4(5.8)	8.7
200-300만원 미만	86	15.0(4.5)	29.6	5.0(3.0)	59.3	0.0(0.0)	.	80.0(5.1)	6.4
300-400만원 미만	57	15.7(4.2)	26.7	3.0(2.1)	68.0	3.6(3.4)	95.2	77.7(5.2)	6.7
400-500만원 미만	37	5.5(3.6)	65.0	2.4(2.4)	97.9	0.0(0.0)	.	92.1(4.1)	4.5
500-600만원 미만	30	16.9(7.5)	44.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	83.1(7.5)	9.1
600만원 이상	39	4.8(3.5)	72.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	95.2(3.5)	3.7

주 : 1) 틀니 이용 행태 : (틀니 이용 행태별 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

〈표 44〉 칫솔질 실천율

(단위 : %)

구분	아침식사 후 칫솔질실천율 ¹⁾			점심식사 후 칫솔질실천율 ²⁾			저녁식사 후 칫솔질실천율 ³⁾			잠자기 전 칫솔질실천율 ⁴⁾		
	N	%(표준오차)	변동 계수	N	%(표준오차)	변동 계수	N	%(표준오차)	변동 계수	N	%(표준오차)	변동 계수
전체	818	93.8(1.0)	1.1	898	56.5(1.7)	3.0	912	62.2(2.2)	3.5	911	61.0(2.1)	3.5
성												
남자	373	91.5(1.7)	1.8	411	51.6(2.3)	4.4	418	60.8(3.1)	5.1	418	60.8(2.8)	4.6
여자	445	96.1(1.0)	1.0	487	61.6(2.3)	3.7	494	63.6(2.3)	3.6	493	61.3(2.2)	3.6
연령												
19-29	62	89.1(4.8)	5.4	88	70.0(4.4)	6.3	91	68.9(5.3)	7.6	91	69.4(4.8)	6.9
30-39	107	91.8(2.8)	3.1	128	59.3(4.2)	7.0	131	66.8(4.7)	7.0	130	73.0(4.1)	5.6
40-49	177	95.3(1.5)	1.6	202	65.3(3.8)	5.7	204	57.3(3.6)	6.3	204	63.0(3.8)	6.0
50-59	206	96.8(1.0)	1.1	214	54.1(3.2)	6.0	218	65.5(3.3)	5.0	218	53.8(3.9)	7.3
60-69	109	97.6(1.4)	1.5	110	42.0(5.3)	12.7	111	56.8(6.1)	10.8	111	51.4(6.2)	12.1
70 이상	157	90.3(2.2)	2.4	156	31.9(3.7)	11.5	157	54.0(4.3)	8.0	157	47.1(4.3)	9.2
19-64	622	94.2(1.0)	1.1	704	60.6(1.7)	2.8	716	63.4(2.4)	3.9	715	63.9(2.1)	3.3
65 이상	196	91.6(2.1)	2.3	194	34.3(3.8)	11.2	196	55.1(4.5)	8.2	196	45.5(4.1)	9.0
교육수준 ⁵⁾												
무학	57	87.1(4.3)	4.9	57	24.5(5.3)	21.7	57	54.2(6.9)	12.8	57	34.3(6.8)	19.9
초등학교	125	94.6(1.9)	2.0	124	37.9(4.7)	12.5	125	54.7(5.5)	10.1	125	49.7(5.5)	11.1
중학교	81	97.6(1.8)	1.8	85	48.6(5.5)	11.4	88	54.8(5.4)	9.8	88	57.9(5.9)	10.1
고등학교	329	92.7(1.8)	2.0	375	55.4(2.7)	4.9	381	63.2(3.2)	5.1	380	62.0(3.1)	5.0
대학교 이상	223	95.0(1.5)	1.6	254	69.9(2.5)	3.5	258	65.8(3.6)	5.4	258	67.0(3.0)	4.5
직업												
전문행정관리	92	92.8(2.8)	3.0	107	73.7(4.7)	6.4	107	70.0(4.7)	6.7	107	56.5(5.1)	9.0
사무직	68	96.1(2.2)	2.3	85	74.9(4.5)	6.0	85	63.4(6.6)	10.4	85	59.9(6.4)	10.6
판매·서비스직	107	96.2(2.0)	2.1	112	58.8(5.2)	8.9	117	60.9(5.8)	9.6	117	66.6(4.4)	6.6
농림어업	42	96.1(2.9)	3.1	41	25.4(7.5)	29.4	42	54.5(6.3)	11.6	42	56.8(8.9)	15.8
기능단순노무직	189	90.0(2.2)	2.5	214	54.1(3.5)	6.5	220	65.7(3.4)	5.1	220	61.7(3.9)	6.4
기타 ⁶⁾	320	95.0(1.6)	1.7	339	47.2(2.7)	5.6	341	57.0(3.3)	5.8	340	60.8(3.2)	5.3
월 가구소득												
50만원 미만	95	89.5(2.7)	3.0	97	29.5(5.2)	17.5	97	47.2(6.6)	14.0	97	51.3(6.6)	12.8
50-100만원 미만	79	94.5(2.5)	2.7	83	48.8(6.3)	12.9	84	54.6(6.3)	11.6	84	54.5(6.7)	12.2
100-200만원 미만	99	94.6(2.6)	2.7	104	55.6(5.3)	9.6	106	64.0(3.9)	6.1	105	49.8(6.0)	12.0
200-300만원 미만	157	90.6(2.2)	2.4	173	56.3(4.0)	7.2	178	57.0(4.3)	7.6	178	71.7(3.1)	4.3
300-400만원 미만	128	95.1(2.1)	2.2	142	57.3(4.5)	7.9	143	64.6(4.4)	6.8	143	64.7(4.4)	6.8
400-500만원 미만	104	96.7(2.4)	2.5	121	60.9(5.4)	8.9	123	72.2(4.5)	6.2	123	57.9(5.8)	10.0
500-600만원 미만	53	94.4(3.7)	3.9	65	67.0(6.4)	9.6	66	67.6(7.2)	10.7	66	69.0(7.2)	10.4
600만원 이상	99	94.2(3.1)	3.3	109	66.3(4.4)	6.6	111	63.9(5.9)	9.3	111	57.8(5.0)	8.7

주 : 1) 아침식사 후 칫솔질 실천율 : (아침식사 후 칫솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 아침

2) 점심식사 후 칫솔질 실천율 : (점심식사 후 칫솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 점심식사 한 사람의 수) × 100

3) 저녁식사 후 칫솔질 실천율 : (저녁식사 후 칫솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 저녁식사 한 사람의 수) × 100

4) 잠자기 전 칫솔질 실천율 : (잠자기 전 칫솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 잠을 잔 사람의 수) × 100

5) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

6) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 45〉 연간 구강검진 수진율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	913	38.7(1.7)	4.5	419	42.0(2.6)	6.2	494	35.1(2.1)	6.0
연령									
19-29	91	42.0(5.7)	13.7	45	45.7(8.0)	17.5	46	37.2(7.0)	18.7
30-39	132	39.3(3.7)	9.5	64	44.4(5.5)	12.4	68	33.7(6.0)	17.7
40-49	204	40.9(4.0)	9.8	91	40.5(5.1)	12.5	113	41.4(5.1)	12.3
50-59	218	48.6(3.8)	7.8	103	51.0(5.0)	9.8	115	45.8(4.8)	10.5
60-69	111	35.1(4.3)	12.1	53	39.1(6.8)	17.5	58	31.5(5.5)	17.4
70 이상	157	15.1(2.9)	19.0	63	18.3(4.6)	25.2	94	12.8(3.3)	25.5
19-64	717	42.7(2.0)	4.6	333	45.5(2.9)	6.3	384	39.6(2.5)	6.4
65 이상	196	16.6(3.0)	17.9	86	20.2(4.9)	24.4	110	13.5(3.1)	23.2
교육수준 ²⁾									
무학	57	8.2(3.5)	42.2	4	-(-)	-	53	6.6(3.2)	48.6
초등학교	125	17.0(3.6)	21.1	47	14.6(6.6)	45.5	78	18.6(3.7)	20.1
중학교	88	26.7(5.2)	19.4	36	28.3(7.6)	27.0	52	25.6(6.0)	23.4
고등학교	381	41.8(2.7)	6.4	204	43.1(3.2)	7.3	177	39.9(4.0)	9.9
대학교 이상	259	47.2(2.8)	5.9	127	48.8(4.8)	9.7	132	45.3(3.6)	7.9
직업									
전문행정관리	108	52.2(4.2)	8.1	59	47.0(6.4)	13.7	49	59.8(7.4)	12.3
사무직	85	51.2(5.7)	11.1	48	55.8(7.7)	13.8	37	44.3(7.2)	16.3
판매·서비스직	117	32.3(4.3)	13.2	35	32.3(8.1)	25.0	82	32.3(4.4)	13.6
농림어업	42	18.8(5.6)	30.0	24	23.4(8.4)	35.9	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	48.6(3.6)	7.4	160	48.8(3.9)	7.9	60	47.9(7.0)	14.7
기타 ³⁾	341	25.5(2.2)	8.5	93	22.3(5.1)	22.7	248	26.8(2.6)	9.5
월 가구소득									
50만원 미만	97	19.3(2.8)	14.8	33	26.3(6.6)	25.1	64	15.0(3.4)	22.3
50-100만원 미만	84	27.0(4.9)	18.1	34	25.0(9.6)	38.3	50	28.7(7.0)	24.3
100-200만원 미만	106	31.7(5.3)	16.7	47	28.8(6.5)	22.7	59	34.2(6.4)	18.7
200-300만원 미만	179	37.4(3.9)	10.5	83	42.3(5.6)	13.3	96	32.1(4.9)	15.4
300-400만원 미만	143	39.3(4.4)	11.1	72	38.1(5.4)	14.2	71	40.8(7.1)	17.5
400-500만원 미만	123	44.0(5.3)	12.0	58	50.8(7.5)	14.7	65	36.7(5.8)	15.7
500-600만원 미만	66	40.2(5.3)	13.2	36	40.2(7.5)	18.6	30	40.3(7.7)	19.1
600만원 이상	111	55.0(5.6)	10.2	54	60.7(7.9)	13.0	57	48.4(5.8)	11.9

주 : 1) 연간 구강검진 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 구강검진을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 46〉 연간 스케일링 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	802	42.6(2.0)	4.7	371	43.5(2.8)	6.4	431	41.7(2.7)	6.4
연령									
19-29	91	43.9(5.7)	12.9	45	42.6(7.5)	17.6	46	45.6(7.9)	17.3
30-39	132	41.1(4.6)	11.3	64	40.2(6.4)	15.8	68	42.0(7.2)	17.0
40-49	204	41.7(3.6)	8.6	91	45.0(5.6)	12.6	113	38.1(3.8)	10.0
50-59	210	50.7(3.5)	6.8	98	48.3(4.9)	10.2	112	53.4(5.0)	9.3
60-69	89	35.3(5.1)	14.5	44	43.5(8.6)	19.8	45	27.7(7.1)	25.6
70 이상	76	29.7(6.1)	20.6	29	32.4(7.9)	24.3	47	28.0(6.6)	23.6
19-64	699	44.1(2.2)	4.9	325	44.7(3.1)	6.8	374	43.4(2.8)	6.5
65 이상	103	27.9(5.2)	18.6	46	29.6(6.1)	20.5	57	26.4(5.8)	21.9
교육수준 ²⁾									
무학	29	9.5(3.6)	38.1	2	-(-)	-	27	10.1(3.8)	37.9
초등학교	69	19.6(4.5)	23.0	23	5.8(5.7)	97.3	46	27.0(6.4)	23.7
중학교	76	42.9(5.6)	13.2	27	36.5(10.1)	27.7	49	46.5(6.8)	14.7
고등학교	370	44.3(3.0)	6.8	195	42.7(3.8)	9.0	175	46.6(4.2)	9.0
대학교 이상	256	46.0(3.4)	7.5	124	50.1(4.4)	8.8	132	41.4(4.8)	11.7
직업									
전문행정관리	106	45.6(5.2)	11.4	57	45.8(6.5)	14.3	49	45.3(6.7)	14.9
사무직	84	41.0(5.7)	13.8	47	36.6(8.0)	21.9	37	47.6(7.8)	16.4
판매·서비스직	116	39.4(5.2)	13.2	34	39.2(9.3)	23.8	82	39.5(5.8)	14.8
농림어업	25	49.7(11.7)	23.5	15	-(-)	-	10	-(-)	-
기능단순노무직	205	50.1(3.7)	7.3	148	49.1(4.0)	8.2	57	53.9(7.8)	14.5
기타 ³⁾	266	36.0(3.2)	8.8	70	34.1(5.5)	16.2	196	36.8(4.0)	10.9
월 가구소득									
50만원 미만	55	25.8(6.4)	24.9	19	-(-)	-	36	21.4(7.1)	33.2
50-100만원 미만	60	40.1(6.2)	15.6	23	52.5(10.3)	19.5	37	29.0(8.3)	28.5
100-200만원 미만	95	41.1(5.3)	12.9	41	41.3(7.6)	18.3	54	40.9(6.4)	15.6
200-300만원 미만	166	41.6(4.7)	11.3	78	45.7(6.6)	14.4	88	37.2(5.3)	14.3
300-400만원 미만	133	45.0(4.7)	10.4	66	37.8(5.6)	14.9	67	54.0(5.6)	10.5
400-500만원 미만	121	42.7(4.7)	11.0	58	48.0(6.0)	12.5	63	36.9(7.1)	19.3
500-600만원 미만	61	48.1(6.3)	13.1	34	44.5(9.0)	20.3	27	54.0(9.5)	17.6
600만원 이상	109	45.8(5.5)	11.9	52	42.4(7.7)	18.1	57	49.7(6.4)	12.9

주 : 1) 연간 스케일링 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 스케일링을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 47〉 스트레스 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	913	23.8(1.8)	7.7	419	23.9(2.6)	10.8	494	23.6(1.9)	8.2
연령									
19-29	91	26.8(5.5)	20.5	45	24.8(6.5)	26.2	46	29.5(7.2)	24.4
30-39	132	30.3(4.1)	13.6	64	32.7(6.0)	18.3	68	27.8(5.3)	18.9
40-49	204	25.5(2.8)	11.1	91	29.1(3.8)	13.1	113	21.5(3.9)	18.1
50-59	218	21.1(3.0)	14.4	103	21.4(3.9)	18.2	115	20.7(3.8)	18.3
60-69	111	15.8(3.8)	24.1	53	8.3(4.1)	48.9	58	22.8(5.8)	25.4
70 이상	157	16.6(2.6)	15.9	63	11.5(3.4)	29.4	94	20.3(3.7)	18.1
19-64	717	25.4(2.1)	8.3	333	26.0(2.9)	11.2	384	24.8(2.3)	9.3
65 이상	196	14.7(2.4)	16.6	86	10.8(2.8)	25.5	110	18.0(3.3)	18.3
교육수준 ²⁾									
무학	57	19.1(7.2)	37.9	4	-(-)	-	53	18.3(6.1)	33.6
초등학교	125	19.3(4.4)	22.9	47	12.9(6.9)	53.2	78	23.5(5.2)	21.9
중학교	88	15.5(4.6)	29.9	36	10.8(4.9)	45.0	52	18.7(7.0)	37.7
고등학교	381	24.0(2.6)	11.0	204	22.2(3.1)	13.7	177	26.4(4.0)	15.3
대학교 이상	259	27.6(3.2)	11.7	127	31.3(4.7)	15.0	132	23.3(3.1)	13.3
직업									
전문행정관리	108	28.3(5.3)	18.8	59	30.8(7.6)	24.7	49	24.7(5.3)	21.3
사무직	85	33.0(6.1)	18.5	48	38.8(8.0)	20.7	37	24.2(7.8)	32.1
판매·서비스직	117	27.3(4.9)	18.0	35	27.1(7.8)	28.8	82	27.5(5.3)	19.4
농림어업	42	13.0(4.5)	34.8	24	19.2(6.4)	33.1	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	19.8(2.9)	14.8	160	20.1(3.4)	17.0	60	18.8(5.4)	28.6
기타 ³⁾	341	21.6(2.4)	11.3	93	15.7(4.0)	25.8	248	24.1(2.9)	11.9
월 가구소득									
50만원 미만	97	22.2(4.8)	21.7	33	22.4(6.0)	26.8	64	22.0(5.9)	26.7
50-100만원 미만	84	18.4(5.0)	27.3	34	16.6(8.9)	53.5	50	19.9(5.7)	28.7
100-200만원 미만	106	20.8(3.4)	16.4	47	21.6(5.3)	24.5	59	20.1(5.3)	26.1
200-300만원 미만	179	28.7(3.7)	12.9	83	25.6(5.3)	20.6	96	32.0(4.9)	15.2
300-400만원 미만	143	25.0(4.0)	16.1	72	27.4(5.4)	19.6	71	22.1(4.7)	21.4
400-500만원 미만	123	25.4(4.3)	17.0	58	27.4(6.9)	25.2	65	23.3(5.7)	24.3
500-600만원 미만	66	11.2(4.3)	38.4	36	5.2(3.8)	73.0	30	20.7(8.7)	42.1
600만원 이상	111	26.9(5.3)	19.8	54	31.2(8.1)	26.1	57	21.9(4.5)	20.4

주 : 1) 스트레스 인지율 : (평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 48〉 우울감 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	913	3.3(0.7)	20.2	419	1.5(0.7)	49.5	494	5.2(1.0)	20.0
연령									
19-29	91	3.9(2.0)	51.6	45	2.2(2.2)	100.2	46	6.2(3.6)	59.1
30-39	132	4.0(1.9)	48.6	64	3.1(3.0)	96.6	68	4.9(2.4)	48.7
40-49	204	2.7(0.9)	33.6	91	0.9(0.9)	100.9	113	4.6(1.6)	35.4
50-59	218	3.7(1.3)	34.3	103	0.7(0.7)	100.8	115	7.2(2.6)	36.8
60-69	111	4.2(1.8)	42.8	53	2.0(2.0)	97.8	58	6.3(3.0)	48.4
70 이상	157	1.4(1.0)	70.0	63	0.0(0.0)	.	94	2.4(1.7)	69.8
19-64	717	3.6(0.7)	20.5	333	1.5(0.8)	54.2	384	5.8(1.2)	20.2
65 이상	196	2.0(1.2)	62.3	86	1.2(1.1)	97.9	110	2.6(1.5)	58.5
교육수준 ²⁾									
무학	57	4.0(2.7)	66.4	4	-(-)	-	53	4.4(2.9)	67.2
초등학교	125	3.2(1.5)	47.9	47	0.0(0.0)	.	78	5.2(2.4)	46.2
중학교	88	5.1(2.5)	49.2	36	2.6(2.6)	97.3	52	6.7(4.0)	58.9
고등학교	381	3.4(1.0)	29.8	204	2.3(1.3)	58.9	177	5.0(1.6)	31.5
대학교 이상	259	2.8(1.1)	38.2	127	0.5(0.5)	100.5	132	5.4(2.1)	38.6
직업									
전문행정관리	108	3.1(1.5)	49.9	59	0.0(0.0)	.	49	7.6(3.8)	50.8
사무직	85	1.6(1.1)	72.0	48	1.2(1.2)	99.9	37	2.1(2.1)	100.9
판매·서비스직	117	5.4(2.1)	39.4	35	0.0(0.0)	.	82	8.5(3.2)	37.2
농림어업	42	0.0(0.0)	.	24	0.0(0.0)	.	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	2.5(1.3)	52.9	160	1.8(1.5)	81.0	60	5.2(3.0)	57.7
기타 ³⁾	341	4.0(1.1)	27.0	93	3.3(2.2)	67.2	248	4.3(1.3)	30.4
월 가구소득									
50만원 미만	97	3.0(1.7)	57.5	33	0.0(0.0)	.	64	4.8(2.7)	56.1
50-100만원 미만	84	11.6(4.9)	42.4	34	14.0(8.1)	57.9	50	9.5(5.4)	56.8
100-200만원 미만	106	3.3(2.0)	59.5	47	0.0(0.0)	.	59	6.2(3.7)	59.4
200-300만원 미만	179	2.4(1.1)	46.5	83	0.0(0.0)	.	96	5.1(2.4)	46.7
300-400만원 미만	143	4.4(1.8)	40.2	72	3.0(2.2)	75.1	71	6.3(2.7)	43.0
400-500만원 미만	123	3.5(1.2)	35.3	58	0.0(0.0)	.	65	7.1(2.6)	35.7
500-600만원 미만	66	0.0(0.0)	.	36	0.0(0.0)	.	30	0.0(0.0)	.
600만원 이상	111	0.6(0.6)	97.1	54	0.0(0.0)	.	57	1.3(1.3)	100.2

주 : 1) 우울감 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 연속적으로 2주(14일) 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 경험한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 49〉 자살생각률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	913	3.2(0.7)	20.9	419	1.3(0.6)	45.8	494	5.3(1.0)	19.3
연령									
19-29	91	2.5(1.5)	60.9	45	0.0(0.0)	.	46	5.8(3.4)	59.1
30-39	132	6.3(2.2)	35.0	64	5.0(2.8)	55.8	68	7.7(2.6)	34.3
40-49	204	3.4(1.3)	38.6	91	0.9(0.9)	100.9	113	6.1(2.1)	34.6
50-59	218	0.8(0.5)	70.5	103	0.0(0.0)	.	115	1.6(1.1)	70.4
60-69	111	4.2(1.7)	41.2	53	2.0(2.0)	97.8	58	6.2(2.9)	46.8
70 이상	157	2.7(1.3)	49.4	63	0.0(0.0)	.	94	4.7(2.3)	49.4
19-64	717	3.3(0.7)	21.8	333	1.3(0.7)	49.9	384	5.4(1.1)	20.0
65 이상	196	3.0(1.4)	47.4	86	1.2(1.1)	97.9	110	4.6(2.1)	45.2
교육수준 ²⁾									
무학	57	7.7(3.6)	46.5	4	-(-)	-	53	8.4(3.9)	46.8
초등학교	125	3.2(1.5)	47.9	47	0.0(0.0)	.	78	5.2(2.4)	46.2
중학교	88	1.1(1.1)	100.0	36	2.6(2.6)	97.3	52	0.0(0.0)	.
고등학교	381	2.8(1.0)	35.1	204	1.6(0.9)	58.2	177	4.5(1.7)	36.9
대학교 이상	259	3.7(1.2)	31.1	127	0.9(0.9)	100.7	132	6.9(2.2)	32.0
직업									
전문행정관리	108	4.6(2.0)	43.5	59	3.8(2.6)	67.7	49	5.6(3.1)	55.4
사무직	85	1.8(1.3)	71.6	48	0.0(0.0)	.	37	4.6(3.2)	70.7
판매·서비스직	117	3.3(1.6)	48.8	35	0.0(0.0)	.	82	5.2(2.4)	47.3
농림어업	42	0.0(0.0)	.	24	0.0(0.0)	.	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	2.2(1.0)	46.6	160	1.2(0.9)	74.1	60	5.5(3.4)	60.8
기타 ³⁾	341	4.3(1.3)	30.6	93	1.1(1.1)	99.1	248	5.5(1.8)	31.9
월 가구소득									
50만원 미만	97	5.2(2.2)	43.0	33	0.0(0.0)	.	64	8.3(3.5)	42.0
50-100만원 미만	84	4.2(2.0)	47.7	34	5.4(3.5)	65.0	50	3.2(2.2)	69.4
100-200만원 미만	106	5.1(2.2)	44.3	47	0.0(0.0)	.	59	9.4(3.9)	41.5
200-300만원 미만	179	2.8(1.1)	40.6	83	1.5(1.5)	98.8	96	4.2(1.8)	42.8
300-400만원 미만	143	2.8(1.3)	48.2	72	0.0(0.0)	.	71	6.2(3.0)	47.4
400-500만원 미만	123	5.4(2.2)	41.2	58	3.9(2.8)	71.0	65	7.1(2.7)	38.0
500-600만원 미만	66	1.2(1.1)	94.6	36	0.0(0.0)	.	30	3.0(2.7)	89.3
600만원 이상	111	0.0(0.0)	.	54	0.0(0.0)	.	57	0.0(0.0)	.

주 : 1) 자살생각률 : (최근 1년(365일) 동안 자살을 생각해 본 적이 있는 사람의 수/ 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 50〉 자살생각으로 인한 정신상담률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	31	25.9(7.3)	28.2	5	-(-)	-	26	20.8(6.8)	32.8
연령									
19-29	3	-(-)	-	0	-(-)	-	3	-(-)	-
30-39	9	-(-)	-	3	-(-)	-	6	-(-)	-
40-49	8	-(-)	-	1	-(-)	-	7	-(-)	-
50-59	2	-(-)	-	0	-(-)	-	2	-(-)	-
60-69	5	-(-)	-	1	-(-)	-	4	-(-)	-
70 이상	4	-(-)	-	0	-(-)	-	4	-(-)	-
19-64	25	28.4(8.6)	30.1	4	-(-)	-	21	22.1(7.9)	35.7
65 이상	6	-(-)	-	1	-(-)	-	5	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	4	-(-)	-	0	-(-)	-	4	-(-)	-
초등학교	4	-(-)	-	0	-(-)	-	4	-(-)	-
중학교	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
고등학교	12	-(-)	-	3	-(-)	-	9	-(-)	-
대학교 이상	10	-(-)	-	1	-(-)	-	9	-(-)	-
직업									
전문행정관리	5	-(-)	-	2	-(-)	-	3	-(-)	-
사무직	2	-(-)	-	0	-(-)	-	2	-(-)	-
판매·서비스직	4	-(-)	-	0	-(-)	-	4	-(-)	-
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	5	-(-)	-	2	-(-)	-	3	-(-)	-
기타 ³⁾	15	-(-)	-	1	-(-)	-	14	-(-)	-
월 가구소득									
50만원 미만	5	-(-)	-	0	-(-)	-	5	-(-)	-
50-100만원 미만	4	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-
100-200만원 미만	4	-(-)	-	0	-(-)	-	4	-(-)	-
200-300만원 미만	5	-(-)	-	1	-(-)	-	4	-(-)	-
300-400만원 미만	5	-(-)	-	0	-(-)	-	5	-(-)	-
400-500만원 미만	7	-(-)	-	2	-(-)	-	5	-(-)	-
500-600만원 미만	1	-(-)	-	0	-(-)	-	1	-(-)	-
600만원 이상	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-

주 : 1) 자살생각으로 인한 정신상담률 : (자살생각으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년 (365일)동안 자살생각을 한 적이 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 51〉 자살시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	913	0.4(0.2)	52.6	419	0.2(0.2)	100.3	494	0.6(0.4)	62.1
연령									
19-29	91	1.0(1.0)	101.1	45	0.0(0.0)	.	46	2.4(2.4)	99.7
30-39	132	0.7(0.7)	100.1	64	0.0(0.0)	.	68	1.6(1.6)	99.9
40-49	204	0.4(0.4)	100.6	91	0.9(0.9)	100.9	113	0.0(0.0)	.
50-59	218	0.0(0.0)	.	103	0.0(0.0)	.	115	0.0(0.0)	.
60-69	111	0.0(0.0)	.	53	0.0(0.0)	.	58	0.0(0.0)	.
70 이상	157	0.0(0.0)	.	63	0.0(0.0)	.	94	0.0(0.0)	.
19-64	717	0.5(0.3)	52.8	333	0.2(0.2)	100.3	384	0.8(0.5)	62.2
65 이상	196	0.0(0.0)	.	86	0.0(0.0)	.	110	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	57	0.0(0.0)	.	4	-(-)	-	53	0.0(0.0)	.
초등학교	125	0.0(0.0)	.	47	0.0(0.0)	.	78	0.0(0.0)	.
중학교	88	0.0(0.0)	.	36	0.0(0.0)	.	52	0.0(0.0)	.
고등학교	381	0.5(0.4)	70.9	204	0.4(0.4)	99.8	177	0.7(0.7)	100.2
대학교 이상	259	0.5(0.5)	99.9	127	0.0(0.0)	.	132	1.1(1.1)	100.6
직업									
전문행정관리	108	0.0(0.0)	.	59	0.0(0.0)	.	49	0.0(0.0)	.
사무직	85	0.0(0.0)	.	48	0.0(0.0)	.	37	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	117	0.0(0.0)	.	35	0.0(0.0)	.	82	0.0(0.0)	.
농림어업	42	0.0(0.0)	.	24	0.0(0.0)	.	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	0.5(0.5)	100.3	160	0.0(0.0)	.	60	2.4(2.5)	101.8
기타 ³⁾	341	0.8(0.6)	72.3	93	1.1(1.1)	99.1	248	0.7(0.7)	99.6
월 가구소득									
50만원 미만	97	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	64	0.0(0.0)	.
50-100만원 미만	84	1.4(1.4)	94.6	34	3.1(2.8)	91.9	50	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	106	2.9(1.7)	57.0	47	0.0(0.0)	.	59	5.4(2.9)	54.2
200-300만원 미만	179	0.0(0.0)	.	83	0.0(0.0)	.	96	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	143	0.0(0.0)	.	72	0.0(0.0)	.	71	0.0(0.0)	.
400-500만원 미만	123	0.0(0.0)	.	58	0.0(0.0)	.	65	0.0(0.0)	.
500-600만원 미만	66	0.0(0.0)	.	36	0.0(0.0)	.	30	0.0(0.0)	.
600만원 이상	111	0.0(0.0)	.	54	0.0(0.0)	.	57	0.0(0.0)	.

주 : 1) 자살시도율 : (최근 1년(365일) 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있는 사람의 수/ 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 52〉 연간 인플루엔자 예방접종률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	913	36.2(1.9)	5.4	419	29.6(2.6)	8.9	494	43.2(2.4)	5.5
연령									
19-29	91	22.4(4.5)	20.1	45	20.5(6.3)	30.9	46	24.8(6.1)	24.6
30-39	132	29.0(3.6)	12.3	64	20.2(4.9)	24.3	68	38.6(5.7)	14.7
40-49	204	21.6(3.4)	15.6	91	19.7(4.3)	21.5	113	23.6(3.9)	16.4
50-59	218	30.7(3.5)	11.2	103	25.4(4.7)	18.3	115	36.7(4.9)	13.5
60-69	111	57.5(6.6)	11.5	53	48.4(9.4)	19.5	58	65.8(6.1)	9.3
70 이상	157	88.3(2.3)	2.6	63	81.1(4.3)	5.3	94	93.4(2.4)	2.5
19-64	717	27.0(1.8)	6.8	333	21.6(2.6)	11.9	384	32.9(2.4)	7.4
65 이상	196	87.1(2.8)	3.2	86	80.3(5.0)	6.2	110	92.8(2.3)	2.5
교육수준 ²⁾									
무학	57	96.0(2.9)	3.0	4	-(-)	-	53	95.6(3.0)	3.2
초등학교	125	75.9(4.6)	6.1	47	74.3(7.1)	9.6	78	76.9(4.4)	5.7
중학교	88	52.9(5.8)	10.9	36	47.1(8.9)	19.0	52	56.9(7.6)	13.3
고등학교	381	25.2(2.4)	9.4	204	24.7(3.2)	13.1	177	25.9(3.1)	11.9
대학교 이상	259	28.6(2.8)	9.8	127	23.4(4.0)	17.1	132	34.4(4.0)	11.7
직업									
전문행정관리	108	26.7(4.2)	15.8	59	25.6(5.4)	21.3	49	28.1(6.3)	22.5
사무직	85	18.0(4.2)	23.2	48	15.8(5.0)	31.7	37	21.3(7.5)	35.3
판매·서비스직	117	25.6(5.0)	19.6	35	22.2(7.2)	32.3	82	27.5(5.4)	19.4
농림어업	42	61.8(6.9)	11.2	24	52.3(9.5)	18.2	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	29.1(3.5)	12.1	160	27.1(4.2)	15.7	60	36.5(6.9)	19.0
기타 ³⁾	341	54.0(3.2)	6.0	93	47.7(5.2)	11.0	248	56.5(3.3)	5.9
월 가구소득									
50만원 미만	97	77.4(5.8)	7.5	33	62.0(9.6)	15.5	64	86.6(5.6)	6.5
50-100만원 미만	84	52.3(5.9)	11.2	34	39.6(9.3)	23.4	50	63.6(7.1)	11.2
100-200만원 미만	106	43.6(4.6)	10.6	47	42.2(7.3)	17.3	59	44.8(4.9)	11.0
200-300만원 미만	179	31.5(4.0)	12.6	83	28.2(5.1)	18.0	96	34.9(5.4)	15.4
300-400만원 미만	143	27.4(4.1)	14.9	72	16.9(4.4)	25.9	71	40.4(6.1)	15.1
400-500만원 미만	123	32.3(4.0)	12.5	58	25.4(6.0)	23.5	65	39.7(8.1)	20.4
500-600만원 미만	66	38.9(11.4)	29.3	36	40.6(13.6)	33.4	30	36.0(12.1)	33.5
600만원 이상	111	19.6(3.9)	20.0	54	19.4(5.7)	29.3	57	19.7(4.8)	24.3

주 : 1) 연간 인플루엔자 예방접종률 : (최근 1년(365일) 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 53〉 건강검진 수진율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	913	64.8(2.0)	3.1	419	67.6(2.6)	3.9	494	62.0(2.2)	3.5
연령									
19-29	91	36.1(5.0)	13.9	45	40.8(7.4)	18.2	46	30.1(7.6)	25.4
30-39	132	59.7(4.5)	7.5	64	68.6(5.8)	8.5	68	50.1(6.0)	12.1
40-49	204	69.6(4.2)	6.0	91	66.3(5.2)	7.9	113	73.1(4.7)	6.5
50-59	218	78.7(3.1)	3.9	103	84.3(3.4)	4.0	115	72.4(4.9)	6.8
60-69	111	82.2(3.6)	4.4	53	83.5(6.2)	7.4	58	81.0(5.0)	6.2
70 이상	157	66.7(4.4)	6.6	63	69.3(6.0)	8.6	94	64.9(5.4)	8.4
19-64	717	64.1(2.4)	3.7	333	67.0(3.0)	4.5	384	61.0(2.6)	4.2
65 이상	196	68.8(4.6)	6.7	86	71.1(6.3)	8.9	110	66.8(5.0)	7.5
교육수준 ²⁾									
무학	57	57.6(6.6)	11.5	4	—(—)	—	53	56.5(6.4)	11.2
초등학교	125	77.2(4.8)	6.2	47	74.3(6.3)	8.5	78	79.1(5.5)	7.0
중학교	88	71.7(4.6)	6.4	36	71.6(7.5)	10.4	52	71.7(5.8)	8.1
고등학교	381	63.4(3.1)	4.9	204	65.3(4.0)	6.1	177	60.6(3.4)	5.7
대학교 이상	259	62.5(3.6)	5.7	127	68.8(4.5)	6.6	132	55.5(4.2)	7.6
직업									
전문행정관리	108	64.2(4.7)	7.3	59	71.6(6.3)	8.8	49	53.4(6.5)	12.1
사무직	85	77.9(4.9)	6.3	48	80.9(5.9)	7.3	37	73.5(7.6)	10.4
판매·서비스직	117	47.6(6.2)	13.0	35	38.1(8.9)	23.4	82	53.2(6.8)	12.8
농림어업	42	74.9(7.5)	10.0	24	61.9(9.4)	15.2	18	—(—)	—
기능단순노무직	220	77.2(3.4)	4.3	160	75.7(3.6)	4.7	60	82.8(5.3)	6.4
기타 ³⁾	341	57.1(3.0)	5.2	93	54.0(5.3)	9.9	248	58.3(3.2)	5.5
월 가구소득									
50만원 미만	97	60.0(4.9)	8.2	33	58.0(7.8)	13.4	64	61.1(5.5)	9.1
50-100만원 미만	84	68.4(5.7)	8.3	34	62.9(10.7)	17.0	50	73.2(6.3)	8.6
100-200만원 미만	106	63.6(4.7)	7.4	47	66.1(6.6)	9.9	59	61.3(7.2)	11.7
200-300만원 미만	179	57.4(4.2)	7.3	83	60.5(5.3)	8.8	96	54.1(5.2)	9.6
300-400만원 미만	143	65.9(4.8)	7.3	72	68.0(5.7)	8.3	71	63.3(6.8)	10.8
400-500만원 미만	123	64.6(4.1)	6.4	58	73.3(5.9)	8.0	65	55.3(5.0)	9.0
500-600만원 미만	66	66.2(6.8)	10.3	36	67.3(8.2)	12.2	30	64.3(8.7)	13.5
600만원 이상	111	75.3(4.6)	6.1	54	78.0(5.5)	7.1	57	72.2(6.6)	9.2

주 : 1) 건강검진 수진율 : (최근 2년 동안 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 54〉 암 검진율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	49.7(2.0)	3.9	419	47.3(2.7)	5.8	493	52.3(2.5)	4.8
연령									
19-29	91	9.1(2.6)	28.4	45	5.9(3.4)	57.9	46	13.3(4.4)	32.9
30-39	132	37.5(4.6)	12.3	64	29.8(5.7)	19.2	68	45.8(7.2)	15.8
40-49	204	58.6(4.3)	7.4	91	51.7(5.4)	10.5	113	66.2(4.9)	7.4
50-59	218	72.6(3.4)	4.7	103	75.3(4.7)	6.3	115	69.5(4.9)	7.1
60-69	111	72.8(3.8)	5.2	53	76.2(6.9)	9.0	58	69.6(5.1)	7.3
70 이상	156	50.9(4.3)	8.5	63	61.1(6.2)	10.2	93	43.3(4.9)	11.3
19-64	717	48.8(2.2)	4.6	333	44.8(3.1)	6.9	384	53.2(2.7)	5.2
65 이상	195	54.6(4.6)	8.5	86	62.6(6.6)	10.5	109	47.8(4.8)	10.0
교육수준 ²⁾									
무학	56	38.2(5.5)	14.3	4	-(-)	-	52	35.4(5.2)	14.6
초등학교	125	59.6(5.3)	9.0	47	60.4(7.6)	12.5	78	59.0(5.9)	9.9
중학교	88	64.7(4.7)	7.2	36	57.4(9.1)	15.9	52	69.6(5.6)	8.1
고등학교	381	51.6(3.4)	6.6	204	47.8(4.3)	9.0	177	57.2(3.6)	6.3
대학교 이상	259	41.9(3.5)	8.3	127	41.2(4.6)	11.2	132	42.7(4.5)	10.6
직업									
전문행정관리	108	42.0(4.3)	10.1	59	46.2(6.0)	13.0	49	35.9(7.0)	19.5
사무직	85	50.2(5.3)	10.5	48	49.3(8.3)	16.8	37	51.5(7.2)	13.9
판매·서비스직	117	42.3(5.6)	13.3	35	31.9(8.0)	25.2	82	48.5(6.8)	13.9
농림어업	42	65.0(7.4)	11.4	24	58.9(9.5)	16.2	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	58.4(3.5)	6.0	160	53.0(3.9)	7.3	60	78.1(5.9)	7.6
기타 ³⁾	340	47.4(2.8)	6.0	93	40.3(5.1)	12.6	247	50.3(3.1)	6.1
월 가구소득									
50만원 미만	96	46.0(5.1)	11.2	33	41.8(8.7)	20.7	63	48.6(5.7)	11.7
50-100만원 미만	84	55.1(5.8)	10.5	34	52.9(10.5)	19.9	50	57.0(7.3)	12.9
100-200만원 미만	106	51.0(5.5)	10.8	47	57.1(7.6)	13.2	59	45.7(7.4)	16.3
200-300만원 미만	179	49.9(3.7)	7.5	83	47.7(5.1)	10.8	96	52.2(5.0)	9.6
300-400만원 미만	143	47.1(4.8)	10.3	72	39.0(6.0)	15.3	71	57.2(6.4)	11.2
400-500만원 미만	123	47.8(3.9)	8.3	58	45.4(6.0)	13.2	65	50.3(5.4)	10.7
500-600만원 미만	66	46.7(5.1)	10.8	36	42.7(6.1)	14.3	30	52.9(7.4)	14.1
600만원 이상	111	54.3(5.2)	9.5	54	55.2(6.3)	11.4	57	53.3(8.6)	16.1

주 : 1) 암 검진율 : (최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 55〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	913	4.4(0.6)	14.6	419	2.9(0.8)	26.8	494	5.9(0.9)	16.2
연령									
19-29	91	3.0(1.8)	59.8	45	2.2(2.2)	100.2	46	4.0(2.9)	72.3
30-39	132	4.2(2.3)	54.1	64	4.1(2.4)	59.4	68	4.2(2.4)	57.7
40-49	204	3.2(1.4)	43.1	91	3.3(1.8)	55.0	113	3.0(1.7)	57.8
50-59	218	3.6(1.0)	28.2	103	1.4(0.1)	8.9	115	6.0(2.2)	36.8
60-69	111	2.4(1.0)	42.6	53	0.0(0.0)	.	58	4.5(1.9)	42.4
70 이상	157	11.5(2.4)	20.9	63	6.7(3.0)	45.2	94	15.0(3.7)	24.6
19-64	717	3.4(0.8)	21.9	333	2.6(0.9)	32.5	384	4.3(1.1)	24.9
65 이상	196	9.5(2.0)	20.7	86	4.9(2.3)	46.4	110	13.4(3.3)	24.6
교육수준 ²⁾									
무학	57	14.0(4.2)	30.2	4	-(-)	-	53	15.2(4.5)	29.3
초등학교	125	7.5(2.2)	29.9	47	3.5(2.6)	72.5	78	10.1(3.5)	34.9
중학교	88	1.8(1.3)	72.7	36	1.7(1.7)	99.8	52	1.8(1.8)	99.9
고등학교	381	3.2(0.8)	25.4	204	2.9(1.1)	38.9	177	3.5(1.3)	37.7
대학교 이상	259	4.4(1.5)	33.0	127	3.1(1.5)	48.8	132	5.9(2.3)	38.5
직업									
전문행정관리	108	5.8(2.5)	43.7	59	5.6(2.9)	52.0	49	6.1(3.4)	55.5
사무직	85	0.9(0.9)	100.4	48	0.0(0.0)	.	37	2.2(2.3)	101.3
판매·서비스직	117	5.4(2.5)	46.0	35	3.0(2.9)	99.6	82	6.8(2.8)	41.6
농림어업	42	4.3(4.4)	102.9	24	7.3(7.3)	99.7	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	0.9(0.4)	38.3	160	1.2(0.5)	38.5	60	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	341	7.2(1.2)	16.4	93	5.8(2.7)	46.6	248	7.8(1.5)	18.7
월 가구소득									
50만원 미만	97	13.3(2.4)	17.9	33	1.9(1.9)	100.6	64	20.2(4.3)	21.5
50-100만원 미만	84	6.9(2.7)	38.8	34	2.0(2.0)	99.8	50	11.3(4.5)	40.1
100-200만원 미만	106	6.8(2.8)	41.4	47	8.2(3.8)	46.7	59	5.6(3.4)	60.7
200-300만원 미만	179	4.4(1.4)	32.8	83	4.4(1.9)	44.0	96	4.5(2.4)	53.0
300-400만원 미만	143	1.9(1.3)	66.9	72	2.6(2.1)	83.1	71	1.1(1.1)	99.5
400-500만원 미만	123	4.1(2.4)	57.5	58	3.6(2.5)	68.8	65	4.7(2.5)	52.7
500-600만원 미만	66	0.0(0.0)	.	36	0.0(0.0)	.	30	0.0(0.0)	.
600만원 이상	111	1.9(1.3)	68.2	54	0.0(0.0)	.	57	4.1(2.9)	71.7

주 : 1) 만성·급성질환 및 사고중독 경험률 : (최근 2주(14일) 동안 만성·급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직일 수의 총 합 / 만성·급성질환 및 사고중독 경험자 수

〈표 56〉 고혈압 평생 의사진단 경험률

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
고혈압 평생 의사진단 경험률									
전체 ¹⁾	913	19.0(1.5)	8.1	419	20.2(1.9)	9.3	494	17.7(1.9)	10.8
30세 이상 ²⁾	822	22.7(1.7)	7.5	374	24.7(2.2)	8.8	448	20.7(2.1)	10.2
연령									
19-29	91	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.	46	0.0(0.0)	.
30-39	132	7.3(2.3)	32.3	64	10.0(4.0)	39.6	68	4.3(2.3)	54.2
40-49	204	12.5(2.4)	19.6	91	15.1(3.8)	25.4	113	9.6(3.4)	35.0
50-59	218	25.9(3.5)	13.7	103	30.7(4.4)	14.3	115	20.3(4.0)	19.6
60-69	111	35.5(5.2)	14.7	53	43.8(7.6)	17.4	58	27.9(6.5)	23.3
70 이상	157	51.8(3.5)	6.7	63	47.4(4.8)	10.2	94	55.0(5.2)	9.5

주 : 1) 고혈압 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 57〉 고혈압 약물치료율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체 ¹⁾	209	83.0(3.0)	3.6	102	79.9(4.7)	5.9	107	86.9(2.9)	3.4
30세 이상 ²⁾	209	83.0(3.0)	3.6	102	79.9(4.7)	5.9	107	86.9(2.9)	3.4
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	9	-(-)	-	6	-(-)	-	3	-(-)	-
40-49	24	53.4(10.1)	18.9	13	-(-)	-	11	-(-)	-
50-59	55	91.8(3.7)	4.0	29	90.3(5.1)	5.7	26	94.5(4.1)	4.4
60-69	40	94.2(3.5)	3.7	24	94.8(4.7)	5.0	16	-(-)	-
70 이상	81	91.8(3.7)	4.0	30	91.8(5.3)	5.8	51	91.8(3.9)	4.3

주 : 1) 고혈압 약물치료율 : (현재 혈압조절약을 한 달(30일)에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 약물치료율(≥30) : (현재 혈압조절약을 한 달(30일)에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 58〉 당뇨병 평생 의사진단 경험률

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
당뇨병 평생 의사진단 경험률									
전체 ¹⁾	913	8.5(0.9)	11.1	419	8.9(1.2)	13.0	494	8.1(1.1)	13.9
30세 이상 ²⁾	822	10.0(1.1)	11.3	374	10.4(1.4)	13.4	448	9.5(1.3)	13.9
연령									
19-29	91	1.2(0.1)	10.6	45	2.1(0.3)	12.7	46	0.0(0.0)	.
30-39	132	0.0(0.0)	.	64	0.0(0.0)	.	68	0.0(0.0)	.
40-49	204	4.9(1.4)	28.3	91	5.5(2.3)	42.7	113	4.4(1.6)	35.9
50-59	218	10.0(2.1)	21.3	103	11.2(2.9)	26.1	115	8.7(2.8)	32.2
60-69	111	23.7(3.7)	15.8	53	27.3(5.7)	20.8	58	20.3(4.3)	21.2
70 이상	157	25.2(3.6)	14.5	63	26.8(4.4)	16.4	94	24.1(4.4)	18.4

주 : 1) 당뇨병 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 59〉 당뇨병 치료율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체 ¹⁾	99	86.0(4.1)	4.8	51	82.0(7.1)	8.7	48	90.6(3.9)	4.3
30세 이상 ²⁾	98	85.7(4.2)	4.9	50	81.3(7.4)	9.1	48	90.6(3.9)	4.3
연령									
19-29	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	11	-(-)	-	5	-(-)	-	6	-(-)	-
50-59	21	81.4(8.7)	10.7	12	-(-)	-	9	-(-)	-
60-69	27	92.2(5.0)	5.5	15	-(-)	-	12	-(-)	-
70 이상	39	91.0(5.1)	5.7	18	-(-)	-	21	89.9(7.1)	7.9

주 : 1) 당뇨병 치료율 : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당 강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 치료율(≥30) : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당 강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 60〉 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사 수진율 및 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사 수진율

(단위 : %)

구분	당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 ¹⁾			당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	98	47.0(4.2)	9.0	98	36.2(7.4)	20.4
성						
남자	51	34.5(6.0)	17.5	51	35.6(8.5)	23.9
여자	47	61.9(5.4)	8.7	47	36.9(8.7)	23.5
30세 이상 ^{3),4)}	97	45.8(4.4)	9.5	97	37.1(7.5)	20.3
연령						
19-29	1	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	0	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	11	-(-)	-	11	-(-)	-
50-59	21	30.6(9.6)	31.2	21	32.1(14.6)	45.6
60-69	27	58.4(9.6)	16.4	27	38.8(10.1)	26.0
70 이상	38	52.8(8.7)	16.4	38	41.5(9.2)	22.1

주 : 1) 연간 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 연간 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30세) : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30세) : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 61〉 관절염 평생 의사진단 경험률

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
관절염 평생 의사진단 경험률									
전체 ¹⁾	913	5.2(0.6)	11.7	419	2.2(0.7)	31.7	494	8.4(1.0)	11.7
50세 이상 ²⁾	486	12.7(1.3)	10.5	219	5.7(1.7)	30.5	267	19.4(2.1)	10.8
연령									
19-29	91	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.	46	0.0(0.0)	.
30-39	132	0.0(0.0)	.	64	0.0(0.0)	.	68	0.0(0.0)	.
40-49	204	0.0(0.0)	.	91	0.0(0.0)	.	113	0.0(0.0)	.
50-59	218	6.0(1.6)	27.5	103	5.1(2.6)	50.8	115	7.0(2.4)	34.6
60-69	111	16.7(3.8)	22.8	53	8.9(4.4)	49.6	58	23.7(5.3)	22.2
70 이상	157	21.0(2.9)	14.0	63	4.3(2.5)	58.7	94	33.1(4.9)	15.0

주 : 1) 관절염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 관절염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50) : (의사에게 관절염을 진단받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 62〉 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체 ¹⁾	913	9.1(0.9)	10.3	419	8.4(1.2)	14.8	494	9.8(1.2)	12.5
30세 이상 ²⁾	822	10.5(1.1)	10.6	374	9.5(1.5)	15.5	448	11.5(1.4)	12.4
연령									
19-29	91	1.8(0.2)	10.6	45	3.2(0.4)	12.7	46	0.0(0.0)	.
30-39	132	6.3(2.3)	36.2	64	9.6(3.6)	37.7	68	2.8(1.8)	65.2
40-49	204	6.4(1.7)	26.7	91	3.5(1.9)	53.5	113	9.6(3.0)	31.5
50-59	218	15.7(3.2)	20.2	103	15.7(4.3)	27.5	115	15.8(3.6)	22.8
60-69	111	19.0(3.7)	19.4	53	12.1(4.9)	40.3	58	25.5(5.9)	23.1
70 이상	157	10.2(2.6)	24.9	63	8.9(2.7)	30.5	94	11.2(3.4)	30.2

주 : 1) 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 63〉 고혈압 관리교육 장소 및 고혈압 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	N ⁵⁾	고혈압 관리교육 장소 ¹⁾						고혈압 관리교육 이수율 ²⁾	
		병의원		한방병의원		보건소(보건의료원), 보건지소, 보건지료소			
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	209	35. 6(3. 9)	11. 0	0. 0(0. 0)	.	0. 8(0. 3)	35. 8	36. 4(3. 9)	10. 7
성									
남자	102	37. 5(5. 4)	14. 4	0. 0(0. 0)	.	1. 0(0. 1)	8. 2	38. 5(5. 4)	14. 0
여자	107	33. 1(4. 5)	13. 4	0. 0(0. 0)	.	0. 6(0. 6)	99. 9	33. 8(4. 4)	13. 2
30세 이상 ^{3), 4)}	209	35. 6(3. 9)	11. 0	0. 0(0. 0)	.	0. 8(0. 3)	35. 8	36. 4(3. 9)	10. 7
연령									
19-29	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	24	32. 4(11. 1)	34. 4	0. 0(0. 0)	.	0. 0(0. 0)	.	32. 4(11. 1)	34. 4
50-59	55	39. 2(7. 9)	20. 1	0. 0(0. 0)	.	1. 9(0. 3)	14. 7	41. 1(7. 8)	19. 0
60-69	40	31. 4(6. 7)	21. 2	0. 0(0. 0)	.	0. 0(0. 0)	.	31. 4(6. 7)	21. 2
70 이상	81	35. 8(5. 9)	16. 4	0. 0(0. 0)	.	0. 9(0. 9)	99. 0	36. 7(5. 9)	16. 1

주 : 1) 고혈압 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 관리교육 이수율 : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 고혈압 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 고혈압 관리교육 이수율(≥30) : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

5) 고혈압 평생 의사진단을 받은 사람의 수

〈표 64〉 당뇨병 관리교육 장소 및 당뇨병 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	N ⁵⁾	당뇨병 관리교육 장소 ¹⁾						당뇨병 관리교육 이수율 ²⁾	
		병의원		한방병의원		보건소(보건의료원), 보건지소, 보건지료소			
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	99	44. 1(4. 8)	10. 8	0. 7(0. 7)	100. 9	0. 0(0. 0)	.	44. 1(4. 8)	10. 8
성									
남자	51	43. 7(7. 1)	16. 2	1. 2(1. 2)	101. 6	0. 0(0. 0)	.	43. 7(7. 1)	16. 2
여자	48	44. 7(6. 7)	14. 9	0. 0(0. 0)	.	0. 0(0. 0)	.	44. 7(6. 7)	14. 9
30세 이상 ^{3), 4)}	98	42. 8(4. 9)	11. 5	0. 7(0. 7)	100. 9	0. 0(0. 0)	.	42. 8(4. 9)	11. 5
연령									
19-29	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	21	66. 0(9. 8)	14. 9	0. 0(0. 0)	.	0. 0(0. 0)	.	66. 0(9. 8)	14. 9
60-69	27	41. 8(7. 5)	18. 0	2. 8(2. 8)	102. 0	0. 0(0. 0)	.	41. 8(7. 5)	18. 0
70 이상	39	27. 8(8. 7)	31. 3	0. 0(0. 0)	.	0. 0(0. 0)	.	27. 8(8. 7)	31. 3

주 : 1) 당뇨병 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 관리교육 이수율 : (당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 당뇨병 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 당뇨병 관리교육 이수율(≥30) : (당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

5) 당뇨병 평생 의사진단을 받은 사람의 수

〈표 65〉 관절염 관리교육 장소 및 관절염 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	N ⁵⁾	관절염 관리교육 장소 ¹⁾						관절염 관리교육 이수율 ²⁾	
		병의원		한방병원		보건소(보건의료원), 보건지소, 보건지료소			
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	65	34. 8(4. 1)	11. 8	0. 0(0. 0)	.	0. 0(0. 0)	.	34. 8(4. 1)	11. 8
성									
남자	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
여자	54	39. 0(4. 9)	12. 5	0. 0(0. 0)	.	0. 0(0. 0)	.	39. 0(4. 9)	12. 5
50세 이상 ^{3), 4)}	65	34. 8(4. 1)	11. 8	0. 0(0. 0)	.	0. 0(0. 0)	.	34. 8(4. 1)	11. 8
연령									
19-29	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
60-69	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
70 이상	34	41. 3(8. 9)	21. 5	0. 0(0. 0)	.	0. 0(0. 0)	.	41. 3(8. 9)	21. 5

주 : 1) 관절염 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 관절염 관리교육 이수율 : (관절염 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 관절염 관리교육 장소(≥50) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

4) 관절염 관리교육 이수율(≥50) : (관절염 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

5) 관절염 평생 의사진단을 받은 사람의 수

〈표 66〉 연간 평균 혈압 및 혈당 측정횟수

(단위 : %)

구분	연간 평균 혈압 측정횟수 ¹⁾			연간 평균 혈당 측정횟수 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	18.6(1.9)	10.0	913	7.2(1.1)	15.8
성						
남자	419	22.5(3.2)	14.4	419	8.2(1.8)	21.9
여자	493	14.5(1.7)	11.8	494	6.1(1.3)	21.6
연령						
19-29	91	4.5(0.9)	19.5	91	2.5(0.3)	12.4
30-39	132	10.5(3.4)	32.1	132	0.9(0.1)	17.4
40-49	203	17.5(3.3)	18.8	204	3.2(0.9)	28.5
50-59	218	27.2(5.1)	18.7	218	6.8(2.6)	38.3
60-69	111	22.2(4.3)	19.5	111	24.3(8.0)	33.0
70 이상	157	34.7(5.7)	16.4	157	19.4(5.2)	26.7
19-64	716	15.9(1.8)	11.3	717	4.1(0.8)	18.4
65 이상	196	33.3(4.9)	14.6	196	24.0(5.9)	24.4
교육수준 ³⁾						
무학	57	29.8(9.6)	32.3	57	6.1(1.5)	24.5
초등학교	125	23.7(5.1)	21.5	125	20.1(7.3)	36.2
중학교	88	30.1(7.7)	25.6	88	17.1(6.2)	35.9
고등학교	380	20.1(3.2)	16.1	381	6.5(1.7)	25.3
대학교 이상	259	10.8(2.6)	23.8	259	2.2(0.7)	31.4
직업						
전문행정관리	108	13.4(3.1)	23.0	108	3.7(1.2)	31.8
사무직	85	16.5(5.1)	30.9	85	5.0(3.6)	72.9
판매·서비스직	117	12.0(4.1)	33.9	117	1.5(0.5)	34.2
농림어업	42	20.0(6.0)	29.9	42	17.3(7.8)	45.2
기능단순노무직	220	16.7(3.8)	22.7	220	5.3(2.5)	47.0
기타 ⁴⁾	340	25.5(3.7)	14.4	341	12.3(2.4)	19.8
월 가구소득						
50만원 미만	97	24.3(6.4)	26.3	97	14.1(3.6)	25.5
50-100만원 미만	84	31.3(9.6)	30.7	84	7.0(2.3)	32.6
100-200만원 미만	106	19.6(5.1)	26.1	106	6.1(2.5)	40.1
200-300만원 미만	179	17.5(4.5)	25.9	179	7.2(3.8)	52.2
300-400만원 미만	143	23.0(4.3)	18.8	143	10.3(3.1)	30.0
400-500만원 미만	123	9.9(2.3)	23.4	123	6.7(3.0)	44.1
500-600만원 미만	66	18.8(7.1)	38.1	66	3.8(2.7)	69.7
600만원 이상	110	13.6(4.4)	32.5	111	2.5(0.7)	28.9

주 : 1) 연간 평균 혈압 측정횟수 : ((하루 측정횟수×365일)+(일주일 측정횟수×52주)+(한 달 측정횟수×12개월)+(일 년 측정횟수)) / 조사대상 응답자 수

2) 연간 평균 혈당 측정횟수 : ((하루 측정횟수×365일)+(일주일 측정횟수×52주)+(한 달 측정횟수×12개월)+(일 년 측정횟수)) / 조사대상 응답자 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 67〉 혈당 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	혈당 인지율		
	N	% (표준오차)	변동계수
전체	913	9.4(1.0)	10.3
성			
남자	419	9.4(1.2)	12.8
여자	494	9.4(1.3)	14.1
연령			
19-29	91	1.0(1.0)	101.1
30-39	132	4.1(1.5)	35.9
40-49	204	11.7(2.1)	17.8
50-59	218	10.8(2.1)	19.8
60-69	111	22.2(4.0)	18.1
70 이상	157	12.6(3.0)	23.8
19-64	717	8.4(1.0)	12.0
65 이상	196	14.8(2.7)	18.2
교육수준 ²⁾			
무학	57	4.1(2.9)	69.9
초등학교	125	15.5(3.2)	20.4
중학교	88	19.6(4.7)	23.9
고등학교	381	7.7(1.2)	15.8
대학교 이상	259	8.4(1.7)	20.0
직업			
전문행정관리	108	11.6(2.9)	25.3
사무직	85	6.7(2.4)	36.7
판매·서비스직	117	6.0(2.2)	37.2
농림어업	42	13.8(5.1)	36.7
기능단순노무직	220	8.4(1.8)	22.1
기타 ³⁾	341	11.2(1.7)	15.1
월 가구소득			
50만원 미만	97	14.3(3.5)	24.5
50-100만원 미만	84	13.3(3.7)	27.6
100-200만원 미만	106	8.9(2.5)	28.5
200-300만원 미만	179	7.7(1.8)	23.8
300-400만원 미만	143	4.9(1.6)	32.8
400-500만원 미만	123	12.9(2.6)	19.9
500-600만원 미만	66	11.2(4.0)	35.9
600만원 이상	111	7.3(2.3)	31.1

주 : 1) 혈당 인지율 : (본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 68〉 필요의료서비스 미치료를 및 필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료를

(단위 : %)

구분	필요의료서비스 미치료율 ¹⁾			필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	913	6.0(0.9)	15.6	913	0.9(0.3)	36.1
연령						
19-29	91	6.8(2.5)	37.2	91	0.9(0.9)	101.0
30-39	132	10.3(2.6)	25.4	132	0.7(0.7)	99.6
40-49	204	7.7(1.8)	23.7	204	1.5(0.9)	58.3
50-59	218	2.8(1.0)	37.9	218	0.5(0.5)	99.5
60-69	111	1.8(1.2)	69.9	111	0.8(0.8)	100.2
70 이상	157	3.9(1.9)	48.1	157	0.6(0.6)	98.6
19-64	717	6.5(1.0)	15.8	717	1.0(0.4)	38.0
65 이상	196	3.7(1.7)	47.3	196	0.5(0.5)	98.2
교육수준 ³⁾						
무학	57	7.1(3.5)	49.1	57	1.8(1.8)	97.2
초등학교	125	0.0(0.0)	.	125	0.0(0.0)	.
중학교	88	1.1(1.1)	100.0	88	0.0(0.0)	.
고등학교	381	6.9(1.3)	19.5	381	1.1(0.5)	50.4
대학교 이상	259	7.7(1.5)	20.1	259	1.0(0.6)	60.5
직업						
전문행정관리	108	5.0(1.8)	36.4	108	0.0(0.0)	.
사무직	85	7.7(2.8)	36.9	85	1.0(1.0)	99.7
판매·서비스직	117	8.4(2.8)	34.0	117	1.1(1.1)	99.8
농림어업	42	4.3(4.4)	102.9	42	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	220	7.4(1.9)	25.3	220	1.2(0.7)	60.8
기타 ⁴⁾	341	4.0(1.4)	35.5	341	1.0(0.6)	58.4
월 가구소득						
50만원 미만	97	5.1(2.8)	53.8	97	1.1(1.0)	94.5
50-100만원 미만	84	1.1(1.1)	101.7	84	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	106	9.8(3.7)	37.7	106	1.5(1.5)	101.0
200-300만원 미만	179	9.4(2.3)	24.8	179	1.6(0.9)	57.9
300-400만원 미만	143	7.5(2.0)	27.3	143	2.1(1.2)	57.2
400-500만원 미만	123	6.8(2.5)	36.4	123	0.0(0.0)	.
500-600만원 미만	66	1.2(1.1)	94.6	66	0.0(0.0)	.
600만원 이상	111	1.7(1.2)	68.4	111	0.0(0.0)	.

주 : 1) 필요의료서비스 미치료율 : (최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율 : (경제적 이유로 치료를 받지 못한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 69〉 연간 사고중독 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	913	7.4(0.8)	11.5	419	7.0(1.3)	18.9	494	7.7(1.3)	16.3
연령									
19-29	91	7.1(2.9)	40.5	45	9.4(4.4)	46.8	46	4.0(2.9)	72.3
30-39	132	7.7(2.4)	31.2	64	9.4(3.9)	41.2	68	5.8(2.8)	48.2
40-49	204	7.3(1.6)	21.6	91	5.7(2.1)	36.4	113	9.1(2.7)	29.5
50-59	218	6.3(1.6)	25.4	103	3.7(1.8)	48.5	115	9.2(2.8)	31.1
60-69	111	7.0(2.4)	34.7	53	4.4(3.1)	71.7	58	9.5(3.9)	41.3
70 이상	157	9.4(1.7)	18.3	63	10.5(4.0)	38.1	94	8.6(1.8)	20.8
19-64	717	7.2(1.0)	13.6	333	6.7(1.5)	21.8	384	7.6(1.4)	18.8
65 이상	196	8.6(1.6)	18.3	86	9.1(3.2)	34.8	110	8.1(1.8)	22.0
교육수준 ²⁾									
무학	57	10.7(2.7)	25.6	4	-(-)	-	53	11.6(3.0)	26.2
초등학교	125	9.3(2.6)	28.0	47	11.3(5.1)	44.9	78	8.0(3.1)	38.4
중학교	88	9.7(3.5)	35.8	36	10.3(5.4)	51.9	52	9.3(4.7)	49.8
고등학교	381	7.7(1.4)	18.3	204	8.8(2.2)	25.4	177	6.1(1.7)	27.3
대학교 이상	259	5.4(1.3)	24.4	127	3.0(1.6)	53.6	132	8.2(2.3)	28.6
직업									
전문행정관리	108	7.5(2.5)	33.8	59	5.6(3.2)	57.0	49	10.4(4.5)	43.6
사무직	85	4.0(1.8)	45.4	48	1.7(1.6)	99.0	37	7.5(4.1)	54.6
판매·서비스직	117	8.1(2.9)	35.4	35	12.4(5.3)	43.1	82	5.6(2.7)	48.5
농림어업	42	14.8(6.4)	43.5	24	17.0(9.1)	53.6	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	5.3(1.7)	32.3	160	4.0(1.9)	46.5	60	9.9(4.1)	41.8
기타 ³⁾	341	9.2(1.5)	16.7	93	14.0(3.8)	27.3	248	7.2(1.5)	20.4
월 가구소득									
50만원 미만	97	13.9(2.9)	21.0	33	15.6(7.3)	46.9	64	12.8(3.1)	24.4
50-100만원 미만	84	15.9(4.8)	30.4	34	16.9(8.4)	49.9	50	15.1(4.8)	31.9
100-200만원 미만	106	11.1(3.4)	30.3	47	14.3(5.7)	40.0	59	8.3(4.2)	51.0
200-300만원 미만	179	6.1(1.7)	27.3	83	4.2(2.1)	48.8	96	8.1(3.1)	38.5
300-400만원 미만	143	5.9(2.4)	40.2	72	7.2(4.3)	58.9	71	4.3(2.1)	47.4
400-500만원 미만	123	6.9(2.8)	40.1	58	4.7(2.7)	57.7	65	9.1(4.0)	43.6
500-600만원 미만	66	3.2(2.0)	62.4	36	3.2(2.8)	85.6	30	3.2(3.0)	94.4
600만원 이상	111	3.1(1.9)	62.1	54	3.1(3.1)	99.7	57	3.0(2.1)	69.8

주 : 1) 연간 사고중독 경험률 : (연간 사고중독 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 70〉 연간 낙상 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	913	9.5(0.8)	8.9	419	7.7(1.3)	16.4	494	11.4(1.4)	12.0
65세 이상 ²⁾	196	14.7(2.1)	14.2	86	6.4(2.4)	37.3	110	21.8(3.9)	17.8
연령									
19-29	91	15.5(3.4)	22.1	45	20.4(5.3)	25.8	46	9.3(4.4)	47.4
30-39	132	5.9(2.1)	36.4	64	5.9(2.8)	46.7	68	5.8(2.8)	48.9
40-49	204	7.0(1.6)	22.2	91	5.4(2.2)	41.2	113	8.8(2.3)	26.0
50-59	218	7.0(1.9)	27.2	103	3.1(1.8)	57.7	115	11.4(3.0)	26.5
60-69	111	7.6(2.2)	29.0	53	1.0(1.0)	101.2	58	13.6(4.3)	31.5
70 이상	157	17.0(2.3)	13.7	63	8.6(3.1)	35.6	94	23.1(3.9)	17.0
19-64	717	8.5(1.0)	11.2	333	7.9(1.4)	17.8	384	9.2(1.4)	15.1
65 이상	196	14.7(2.1)	14.2	86	6.4(2.4)	37.3	110	21.8(3.9)	17.8
교육수준 ³⁾									
무학	57	25.2(5.4)	21.4	4	-(-)	-	53	27.4(5.7)	20.9
초등학교	125	12.9(2.7)	21.0	47	5.0(2.8)	56.9	78	18.0(4.4)	24.4
중학교	88	7.8(3.2)	41.0	36	3.4(3.3)	98.1	52	10.8(4.8)	44.5
고등학교	381	8.7(1.3)	15.0	204	8.6(1.7)	19.5	177	8.8(2.5)	27.9
대학교 이상	259	7.9(1.6)	20.0	127	7.8(2.4)	30.6	132	8.1(2.1)	26.2
직업									
전문행정관리	108	9.1(3.0)	32.9	59	8.2(4.0)	48.6	49	10.3(3.5)	34.2
사무직	85	5.1(2.6)	50.4	48	3.7(2.6)	69.8	37	7.2(4.9)	67.2
판매·서비스직	117	8.9(2.8)	31.4	35	10.6(6.0)	56.4	82	7.9(3.1)	38.9
농림어업	42	11.5(3.9)	34.3	24	11.3(7.2)	63.9	18	-(-)	-
기능단순노무직	220	8.8(2.1)	23.7	160	7.9(2.5)	32.4	60	12.1(4.6)	38.2
기타 ⁴⁾	341	11.7(1.5)	12.8	93	7.4(2.2)	28.9	248	13.5(2.0)	15.2
월 가구소득									
50만원 미만	97	17.6(4.1)	23.2	33	3.2(3.1)	98.7	64	26.3(6.4)	24.2
50-100만원 미만	84	14.0(2.8)	20.1	34	11.1(2.5)	22.7	50	16.5(4.7)	28.6
100-200만원 미만	106	14.5(3.5)	24.4	47	14.1(6.1)	43.3	59	14.8(4.2)	28.6
200-300만원 미만	179	5.5(1.5)	28.1	83	5.2(2.2)	43.5	96	5.8(1.9)	32.7
300-400만원 미만	143	8.1(2.3)	28.5	72	10.3(3.3)	31.6	71	5.3(2.3)	44.3
400-500만원 미만	123	13.2(3.4)	26.0	58	13.9(4.6)	33.5	65	12.5(4.7)	37.2
500-600만원 미만	66	5.0(2.3)	46.3	36	0.0(0.0)	.	30	13.0(6.4)	49.2
600만원 이상	111	4.6(1.8)	39.5	54	2.0(1.8)	94.3	57	7.8(3.8)	48.9

주 : 1) 연간 낙상 경험률 : (연간 낙상 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 연간 낙상 경험률(≥65) : (연간 낙상 경험자 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 71〉 양호한 주관적 건강수준 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	913	48.0(1.8)	3.7	419	53.5(2.5)	4.7	494	42.1(1.8)	4.3
연령									
19-29	91	69.8(4.5)	6.4	45	74.4(6.3)	8.5	46	63.7(6.4)	10.1
30-39	132	59.6(4.6)	7.8	64	64.8(6.1)	9.4	68	54.0(5.7)	10.5
40-49	204	51.6(3.1)	6.0	91	60.7(4.3)	7.0	113	41.8(4.3)	10.4
50-59	218	36.8(3.7)	10.1	103	35.3(5.4)	15.2	115	38.5(4.6)	11.9
60-69	111	32.3(4.6)	14.4	53	41.2(7.7)	18.7	58	24.0(5.1)	21.4
70 이상	157	23.6(3.8)	16.2	63	25.5(5.4)	21.2	94	22.3(4.4)	19.7
19-64	717	52.3(2.1)	3.9	333	57.7(2.7)	4.7	384	46.2(2.2)	4.8
65 이상	196	24.3(3.4)	14.1	86	26.7(4.7)	17.6	110	22.2(4.3)	19.6
교육수준 ²⁾									
무학	57	24.6(6.9)	28.1	4	—(—)	—	53	23.2(6.4)	27.5
초등학교	125	28.2(3.5)	12.5	47	34.9(7.1)	20.2	78	23.8(4.8)	20.2
중학교	88	29.4(4.7)	16.0	36	35.4(8.1)	22.7	52	25.2(5.9)	23.5
고등학교	381	48.3(2.7)	5.6	204	49.8(3.6)	7.3	177	46.2(3.8)	8.3
대학교 이상	259	60.8(3.6)	5.8	127	67.0(4.4)	6.5	132	53.8(4.3)	8.0
직업									
전문행정관리	108	58.4(5.0)	8.6	59	62.0(6.6)	10.6	49	53.0(6.5)	12.2
사무직	85	50.8(5.6)	11.0	48	56.8(7.7)	13.6	37	41.6(7.6)	18.3
판매·서비스직	117	56.5(4.9)	8.7	35	63.6(8.0)	12.5	82	52.3(5.2)	9.9
농림어업	42	23.9(6.3)	26.3	24	23.0(8.6)	37.3	18	—(—)	—
기능단순노무직	220	49.5(3.3)	6.7	160	53.9(4.1)	7.7	60	33.6(6.3)	18.6
기타 ³⁾	341	40.1(3.1)	7.6	93	43.3(5.0)	11.4	248	38.8(3.3)	8.4
월 가구소득									
50만원 미만	97	22.5(5.1)	22.7	33	31.9(8.9)	27.9	64	16.8(5.1)	30.1
50-100만원 미만	84	30.4(4.9)	16.0	34	37.2(7.5)	20.2	50	24.4(4.8)	19.9
100-200만원 미만	106	35.0(4.6)	13.2	47	37.0(6.7)	18.2	59	33.2(7.0)	21.1
200-300만원 미만	179	54.9(4.5)	8.3	83	59.3(6.0)	10.1	96	50.2(5.0)	9.9
300-400만원 미만	143	58.3(4.6)	7.9	72	60.4(5.4)	9.0	71	55.7(5.7)	10.2
400-500만원 미만	123	48.0(5.0)	10.5	58	50.8(6.3)	12.4	65	45.0(6.2)	13.8
500-600만원 미만	66	61.4(8.3)	13.6	36	69.1(8.7)	12.6	30	49.3(10.5)	21.3
600만원 이상	111	51.9(6.2)	11.9	54	57.9(8.5)	14.6	57	44.8(4.9)	10.9

주 : 1) 양호한 주관적 건강수준 인지율 : (주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 72〉 보건기관 서비스 만족도¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	297	71.4(3.3)	4.6	107	78.6(4.6)	5.8	190	66.8(3.9)	5.8
연령									
19-29	21	65.8(9.0)	13.7	8	-()	-	13	-()	-
30-39	24	62.8(9.8)	15.7	7	-()	-	17	-()	-
40-49	37	70.9(7.8)	11.0	14	-()	-	23	70.3(9.3)	13.3
50-59	48	80.4(5.7)	7.1	14	-()	-	34	83.3(6.0)	7.2
60-69	55	67.5(7.5)	11.2	23	77.1(11.3)	14.6	32	61.2(8.9)	14.6
70 이상	112	75.1(4.5)	6.0	41	82.0(5.9)	7.1	71	70.5(4.9)	7.0
19-64	159	70.4(4.1)	5.8	51	76.7(5.9)	7.7	108	66.7(5.0)	7.6
65 이상	138	73.2(4.3)	5.9	56	81.3(6.0)	7.4	82	66.9(4.8)	7.2
교육수준 ²⁾									
무학	44	74.1(6.1)	8.2	2	-()	-	42	72.9(6.2)	8.5
초등학교	78	69.3(6.4)	9.2	32	77.4(8.2)	10.7	46	63.2(6.5)	10.4
중학교	38	78.6(7.5)	9.5	15	-()	-	23	74.7(10.1)	13.5
고등학교	93	73.9(5.4)	7.3	47	77.2(6.6)	8.6	46	69.9(7.2)	10.2
대학교 이상	44	62.6(7.2)	11.5	11	-()	-	33	56.8(9.0)	15.8
직업									
전문행정관리	13	-()	-	5	-()	-	8	-()	-
사무직	9	-()	-	2	-()	-	7	-()	-
판매·서비스직	38	61.0(9.0)	14.7	10	-()	-	28	58.6(9.8)	16.8
농림어업	23	66.8(8.8)	13.1	13	-()	-	10	-()	-
기능단순노무직	50	85.5(4.6)	5.4	31	85.7(5.8)	6.8	19	-()	-
기타 ³⁾	164	71.5(4.1)	5.8	46	81.2(5.5)	6.7	118	67.3(4.5)	6.7
월 가구소득									
50만원 미만	66	74.3(5.7)	7.7	18	-()	-	48	76.5(5.4)	7.0
50-100만원 미만	46	65.9(7.8)	11.8	19	-()	-	27	61.6(9.6)	15.5
100-200만원 미만	38	81.5(9.1)	11.2	18	-()	-	20	72.0(14.8)	20.5
200-300만원 미만	48	62.2(8.3)	13.3	19	-()	-	29	51.6(10.3)	20.0
300-400만원 미만	42	62.6(8.7)	13.9	13	-()	-	29	65.3(9.1)	13.9
400-500만원 미만	27	74.1(9.8)	13.2	9	-()	-	18	-()	-
500-600만원 미만	13	-()	-	5	-()	-	8	-()	-
600만원 이상	15	-()	-	5	-()	-	10	-()	-

주 : 1) 보건기관 서비스 만족도 : (“대단히 만족한다” 또는 “만족한 편이다”에 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 73〉 출산 경험률 및 모유수유 경험률

(단위 : %)

구분	출산 경험률 ¹⁾			모유수유 경험률 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	493	80.4(2.1)	2.6	419	86.0(1.9)	2.3
연령						
19-29	46	17.6(5.6)	32.0	8	-(-)	-
30-39	67	84.1(4.4)	5.2	55	86.5(4.4)	5.1
40-49	113	90.8(2.4)	2.6	102	77.2(4.4)	5.7
50-59	115	93.3(2.9)	3.2	109	80.8(3.8)	4.7
60-69	58	89.9(4.9)	5.4	52	100.0(0.0)	0.0
70 이상	94	98.9(1.1)	1.1	93	98.7(1.3)	1.3
19-64	383	77.0(2.4)	3.1	312	82.6(2.5)	3.0
65 이상	110	97.0(2.2)	2.2	107	98.9(1.1)	1.1
교육수준 ³⁾						
무학	53	100.0(0.0)	0.0	53	97.8(2.1)	2.2
초등학교	78	95.8(3.1)	3.2	75	100.0(0.0)	0.0
중학교	52	87.1(4.7)	5.4	46	92.8(4.7)	5.1
고등학교	176	79.0(3.4)	4.3	148	73.5(3.7)	5.0
대학교 이상	132	69.6(4.0)	5.7	96	88.9(3.1)	3.5
직업						
전문행정관리	49	53.1(7.3)	13.8	28	88.3(5.6)	6.4
사무직	37	61.9(7.5)	12.1	25	79.2(8.0)	10.1
판매·서비스직	82	77.4(5.5)	7.1	67	83.8(3.9)	4.6
농림어업	18	-(-)	-	18	-(-)	-
기능단순노무직	60	93.2(3.9)	4.2	56	72.8(7.4)	10.1
기타 ⁴⁾	247	87.3(2.6)	2.9	225	89.8(2.3)	2.5
월 가구소득						
50만원 미만	64	94.3(4.8)	5.1	60	100.0(0.0)	0.0
50-100만원 미만	50	82.5(6.2)	7.5	43	93.7(2.8)	2.9
100-200만원 미만	59	90.1(3.9)	4.3	55	85.1(5.4)	6.4
200-300만원 미만	96	83.3(4.0)	4.8	83	79.4(5.1)	6.4
300-400만원 미만	70	79.0(5.3)	6.7	58	79.2(5.5)	6.9
400-500만원 미만	65	75.4(4.8)	6.3	53	90.7(3.9)	4.3
500-600만원 미만	30	74.9(10.1)	13.5	24	87.8(7.0)	8.0
600만원 이상	57	68.4(6.7)	9.8	43	80.6(5.8)	7.2

주 : 1) 출산 경험률 : (출산경험이 있는 사람의 수 / 여자 조사대상 응답자 수) × 100

2) 모유수유 경험률 : (한 달 이상 모유수유 한 경험이 있는 사람의 수 / 출산경험이 있는 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직


제4부 부록

- I. 개인조사표
- II. 가구조사표
- III. 지표정의
- IV. 2008-2015 산출지표



제 4 부 부록

I. 개인조사표



CHS

Community Health Survey

다음은 2015년 지역사회건강조사 개인조사표(울산권역)입니다. ➔

 승인 번호 제11775호	 지역사회건강조사 Community Health Survey	이 조사표에 기재 된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.	울산
---	--	---	-----------

안녕하십니까?

질병관리본부에서는 「지역보건법」 제4조(지역보건의료계획의 내용), 「지역보건법 시행령」 제4조(지역보건의료계획의 수립방법 등), 제5조(지역보건의료계획의 수립 시기 등)에 의거하여 지역 건강통계를 생산하여 근거 중심의 보건사업 수행 기반을 마련하고자 매년 「지역사회건강조사」를 실시하오니 적극적인 협조 부탁드립니다.

지역사회건강조사는 전국 254개 보건소에서 매년 8월에서 10월까지 실시하며, 만 19세 이상 성인을 대상으로 흡연, 음주, 신체활동 등의 건강행태, 의료이용, 삶의 질 등을 조사합니다.

조사 자료는 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며, 통계작성 외의 목적으로는 사용하지 않습니다. 정확한 응답을 위하여 반드시 조사대상자 본인이 성실하게 조사에 응답하여 주시기 바랍니다.

※ 통계법 제32조(통계응답자의 성실응답의무)

통계응답자는 통계의 작성에 관한 사무에 종사하는 자로부터 통계의 작성을 목적으로 질문 또는 자료제출 등의 요구를 받은 때에는 신뢰성 있는 통계가 작성될 수 있도록 조사사항에 대하여 성실하게 응답하여야 한다.

※ 통계법 제33조(비밀의 보호)

- ① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
- ② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.



보건복지부



질병관리본부

관리번호 :

2015년 지역사회건강조사 참여 동의서

본인은 『지역사회건강조사』 내용을 충분히 이해하고 건강면접조사에
참여합니다.

『지역사회건강조사』는 지역주민의 건강수준을 파악하여 주민들에게 알맞은 보건사업계획을 수립하고자 하는 목적으로 수행하며, 수집된 자료는 보건사업 계획수립을 위한 통계분석용으로만 활용합니다. 조사대상자는 조사문항에 따라 응답을 거부할 수 있으며, 응답거부에 따른 불이익은 없습니다. 본 조사에서 수집하는 개인정보는 아래와 같으며 개인정보 이용목적 외의 이유로 외부로 발표되거나 공개되지 않으니 조사에 성실히 임하여 주시기 바랍니다.

- 수집 개인정보 범위 : 성명, 성별, 생년월일, 전화번호
○ 개인정보 보유기간 : 조사 수행일부터 2016년 2월 29일까지
※ 수집된 개인정보는 2016년 3월 1일 파기
○ 개인정보 이용목적 : 조사의 진실성 검증을 위한 전화 확인 조사

※ 개인정보 이용에 대한 내용은 지역사회건강조사 홈페이지(<http://chs.cdc.go.kr>)에서
확인하실 수 있습니다.

2015년 월 일

참여자 성명 : _____(인) 또는 서명
조사원 성명 : _____(인) 또는 서명

 승인 번호 제11775호	2015년 지역사회건강조사	이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.
---	----------------	---

※ 조사대상자 번호를 정확히 기입하십시오.

시도 번호	보건소번호			표본지점번호					가구번호				가구원번호	

조 사 대 상 자		
성명		주민등록 생년월일
성별	① 남자 ② 여자	
		년 월 일 가구명부의 주민등록상 생년월일과 동일인지 확인하십시오. 다른 경우 가구명부를 수정합니다.

건강조사 제대로, 지역건강 대대로

1. 평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

흡연

1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 9번 문항으로)

1-1. 처음으로 담배 한 대를 다 피운 시기는 언제입니까?

 세

만 세 888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음)

888. 비해당

2. 현재 담배를 피웁니까?

8. 비해당

① 매일 피움 ⇒ 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? 개비 (⇒ 3번 문항으로)

888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/②, ③: 현재 담배를 가끔 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

 개비

888. 비해당

② 가끔 피움 ⇒ 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? 일

 일

⇒ 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? 개비 (⇒ 3번 문항으로)

 개비

88 888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/①, ③: 현재 담배를 매일 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

88. 비해당

888. 비해당

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음

⇒ 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? 년 개월

⇒ 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? 개비

88 88 888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/①, ②: 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움)

 년 월

 개비

⇒ 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? (⇒ 4번 문항으로)

- ① 1년 미만
② 1년-5년 미만
③ 5년-10년 미만
④ 10년-15년 미만
⑤ 15년-20년 미만
⑥ 20년 이상

⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/①, ②: 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움)

88. 88. 비해당

888. 비해당

8. 비해당

3. 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

- ① 최근 1년간 금연한 적이 있다 (⇒ 4번 문항으로)
② 과거에는 있었지만, 최근 1년간 없다 (⇒ 4번 문항으로)
③ 금연한 적이 없다 (⇒ 5번 문항으로)

⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/③: 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

8. 비해당

건강조사 제대로, 지역건강 대대로

4. 담배를 끊기 위해 사용했던 방법들은 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

4-1. 특별한 방법 없이 자신의 의지로 참았음	① 예 ② 아니오
4-2. 니코틴 대체용품(금연패치, 금연껌, 금연사탕)	① 예 ② 아니오
4-3. 금연초	① 예 ② 아니오
4-4. 보건소 금연클리닉	① 예 ② 아니오
4-5. 금연상담센터(금연콜센터)	① 예 ② 아니오
4-6. 의사 처방에 의한 금연 치료(약물치료 또는 상담)	① 예 ② 아니오
4-7. 금연칩	① 예 ② 아니오
4-8. 기타()	① 예 ② 아니오

8888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항3/③: 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 없음)

5. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까?

- ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
 ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
 ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
 ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다 (→ 7번 문항으로)
 ⑤ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/③: 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

6. 담배를 끊었거나 끊으려는 주된 이유는 무엇입니까? 한 가지만 응답해 주십시오.

- ① 건강이 나빠져서
 ② 현재 건강은 이상 없지만 향후 건강에 대한 염려로
 ③ 가족의 건강을 위해
 ④ 주위 사람들에게 피해를 주지 않기 위해(간접흡연)
 ⑤ 주위 사람들의 권유로
 ⑥ 담뱃값이 부담 돼서
 ⑦ 금연공익광고(TV, 라디오), 담뱃갑의 경계 문구를 보고
 ⑧ 사회생활이 불편해서(흡연 장소가 없어서)
 ⑨ 기타()

88. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항3/③: 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 없음, 문항 5/④: 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없음)

7. 최근 1년 동안 의사, 치과의사, 한의사, 간호사로부터 담배를 끊으라는 말을 들은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/③: 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

8. 2015년 1월 담뱃값 인상으로 현재 흡연에 영향을 받았습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 9번 문항으로)
 ③ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항 2-3-3/②~⑥: 1년 이상 금연자)

☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당

☐
 8. 비해당

☐
 기
 타
 88. 비해당

☐
 8. 비해당

☐
 8. 비해당

건강조사 제대로, 지역건강 대대로

8-1. 담뭇값 인상으로 현재 흡연에 어떤 영향을 받았습니까? 모두 응답해 주십시오.

8-1-1. 담배를 끊었다 (→ 8-1-4번 문항으로) ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/①, ②: 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움, 문항8/②: 담뭇값 인상으로 흡연에 영향을 받지 않음, 문항2-3-3/②~⑥: 1년 이상 금연자)	① 예 ② 아니오
8-1-2. 담배를 더 적게 피운다 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/③: 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음, 문항8/②: 담뭇값 인상으로 흡연에 영향을 받지 않음)	① 예 ② 아니오
8-1-3. 가격이 저렴한 담배를 피운다 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/③: 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음, 문항8/②: 담뭇값 인상으로 흡연에 영향을 받지 않음)	① 예 ② 아니오
8-1-4. 전자담배를 사용한다 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2-3-3/②~⑥: 1년 이상 금연자, 문항8/②: 담뭇값 인상으로 흡연에 영향을 받지 않음)	① 예 ② 아니오
8-1-5. 일반 담배(필련)나 전자담배가 아닌 다른 담배 제품을 사용한다 ※다른 담배 제품: 썬담배, 머금음 담배(스누스), 파이프 담배, 시가(엽필련), 각련(롤링타바코), 물담배, 냄새 맡는 담배 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2-3-3/②~⑥: 1년 이상 금연자, 문항8/②: 담뭇값 인상으로 흡연에 영향을 받지 않음)	① 예 ② 아니오
8-1-6. 기타() ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2-3-3/②~⑥: 1년 이상 금연자, 문항8/②: 담뭇값 인상으로 흡연에 영향을 받지 않음)	① 예 ② 아니오

※ 9-11번은 간접흡연에 대한 질문입니다. 질문에 응답해 주십시오.

9. 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까?

① 예 ② 아니오 (→ 10번 문항으로)

9-1. 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항9/②: 가정실내에서 일상적으로 담배를 피우는 사람이 없음)

8. 비해당

건강조사 제대로, 지역건강 대대로

10. 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예
② 아니오
③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)

☐11. 최근 1년 동안 공공장소(버스/택시 정거장, 길거리, 음식점, 유흥업소, PC방 등)에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐12. 최근 1년 동안 금연에 대한 공익광고(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐13. 최근 1년 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

※ 14-16번은 금연관련 법률 및 정책에 대한 질문입니다. 질문에 응답해 주십시오.

14. 금연구역이 지정되어 있다는 것을 알고 있습니까?

- ① 지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다
② 지정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다 (→ 15번 문항으로)
③ 지정된 것을 모른다 (→ 16번 문항으로)

☐

14-1. 금연구역 내에서 흡연한 적이 있습니까?

- ① 금연구역 내에서 항상 흡연한다
② 금연구역 내에서 가끔 흡연한다
③ 금연구역 내에서 흡연을 하지 않는다
④ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/③: 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음, 문항 14/②, ③ 지정구역 모름)

☐

8. 비해당

15. 다음은 금연구역 관련 법률에 대한 내용입니다. 내용이 맞으면 “예”, 틀리면 “아니오”로 응답하여 주십시오.

15-1. 지정된 금연구역에서 흡연하면 일정액 이하의 과태료를 내야한다.	① 예 ② 아니오
15-2. 금연구역에서 전자담배를 사용하는 것은 불법이다.	① 예 ② 아니오

☐☐

④ 비해당(문항14/③: 금연구역이 지정된 것을 모름)

16. 현재 살고 있는 시·군·구에서 강화해야 할 금연정책은 무엇인지 한 가지만 선택하여 주십시오.

- ① 금연구역 확대
② 금연구역 내 흡연 단속(과태료 인상)
③ 금연클리닉 확대 운영
④ 금연 교육 및 홍보 강화
⑤ 더 강화할 정책이 없다

☐

건강조사 제대로, 지역건강 대대로

※ 17-18번은 전자담배 및 다른 담배 제품에 대한 질문입니다. 질문에 응답해 주십시오.

17. 지금까지 살아오는 동안 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 18번 문항으로)

☐


17-1. 최근 1달 동안 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항17/②: 평생 전자담배를 사용하지 않음)

☐

8. 비해당

18. 지금까지 살아오는 동안 일반 담배(궐련)와 전자담배를 제외하고 다른 담배 제품을 사용한 적이 있습니까?

※다른 담배 제품: 씹는담배, 머금는 담배(스누스), 파이프 담배, 시가(엽궐련), 각련(롤링타바코), 물담배, 냄새 맡는 담배

- ① 예 ② 아니오 (→ 19번 문항으로)

☐


18-1. 최근 1달 동안 일반 담배(궐련)와 전자담배를 제외하고 다른 담배 제품을 사용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항18/②: 평생 다른 담배 제품을 사용하지 않음)

☐

8. 비해당

19. (지역) 흡연자의 금연을 돕기 위한 금연클리닉 또는 금연상담전화가 있다는 것을 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

20. (지역) 전자담배를 사용한지 얼마나 되었습니까?

- ① 1년 미만
② 1년 이상 2년 미만
③ 2년 이상 3년 미만
④ 3년 이상
⑤ 비해당(문항17/②: 평생 전자담배를 사용하지 않음)

☐

8. 비해당

음주

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다.

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (➡ 3번 문항으로)

☐

1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?

만 세 888. 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음)세

888. 비해당

1-2. 처음 술을 마신 이유(동기)는 무엇입니까?

- ① 주위 사람(가족, 친척, 친구, 동료, 선후배 등)이 권해서
 ② 호기심으로
 ③ 친목도모를 위해
 ④ 축하할 일이 있어서
 ⑤ 스트레스를 풀기 위해
 ⑥ 광고, TV, 영화에 멋있게 보여서
 ⑦ 기타()
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

2. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (➡ 3번 문항으로)
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당



2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까?

- ① 한 달에 1번 미만
 ② 한 달에 1번 정도
 ③ 한 달에 2~4번 정도
 ④ 일주일에 2~3번 정도
 ⑤ 일주일에 4번 이상
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음, 문항2/②: 최근 1년 동안 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?

(* 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다)

- ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음, 문항2/②: 최근 1년 동안 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-3. 최근 1년 동안 절주(음주량을 줄임)나 금주를 시도한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음, 문항2/②: 최근 1년 동안 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

건강조사 제대로, 지역건강 대대로

3. 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

☐

4. (지역) 최근 1년 동안 음주문제로 의료기관, 보건소, 알코올 상담센터, 정신보건센터 등에서 상담을 받아본 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

③ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음, 문항2/②: 최근 1년 동안 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

5. (지역) 지금까지 살아오면서 음주예방에 대한 교육을 받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

☐

건강조사 제대로, 지역건강 대대로

4. 버스(광역 시내버스, 시외버스, 전세버스)를 탈 때 안전벨트를 맵니까?

- ① 버스를 타지 않는다
- ② 전혀 매지 않는다
- ③ 가끔 매는 편이다
- ④ 대체로 매는 편이다
- ⑤ 항상 매다

--	--

5. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 탄 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

--	--

【오토바이 운전】

6. 오토바이 운전을 합니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 7번 문항으로)

--	--

- 6-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

⑧ 비혜당(문항6/②: 오토바이 운전을 하지 않음, 「음주」문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음, 문항2/②: 최근 1년 동안 술을 마신 적이 없음)

--	--

8. 비혜당

【자전거 운전】

7. 자전거 운전을 합니까?

- ① 예 ② 아니오 (→「운동 및 신체활동」1번 문항으로)

--	--

- 7-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거를 운전한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항7/②: 자전거 운전을 하지 않음, 「음주」문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음, 문항2/②: 최근 1년 동안 술을 마신 적이 없음)

--	--

8. 비해당

운동 및 신체활동

1. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까? ☐ 일

※ 격렬한(고강도) 신체활동

달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 시간 분 88 88. 비해당(문항1/0일: 격렬한 신체활동 없음)

시 분

88 88. 비해당

2. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다.) ☐ 일

※ 중등도(중강도) 신체활동

천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

2-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 시간 분 88 88. 비해당(문항2/0일: 중등도 신체활동 없음)

시 분

88 88. 비해당

3. 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까? ☐ 일

※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.

3-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까?

하루에 시간 분 88 88. 비해당(문항3/0일: 걷기운동 없음)

시 분

88 88. 비해당

4. 최근 1주일 동안 스트레칭, 맨손체조 등의 유연성 운동을 한 날은 며칠입니까?

- ① 전혀 하지 않음
② 1일
③ 2일
④ 3일
⑤ 4일
⑥ 5일 이상

☐

5. 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력 운동을 한 날은 며칠입니까?

- ① 전혀 하지 않음
② 1일
③ 2일
④ 3일
⑤ 4일
⑥ 5일 이상

☐

건강조사 제대로, 지역건강 대대로

6. 지난주 주중(월~금요일) 여가시간에 TV 보기, 게임, 인터넷 등으로 앉아서 보낸 시간이 하루에 보통
몇 시간 정도입니까?

- ① 하루 1시간미만
- ② 하루 1시간~2시간미만
- ③ 하루 2시간~3시간미만
- ④ 하루 3시간~4시간미만
- ⑤ 하루 4시간 이상

☐

7. 지난주 주말(토~일요일) 여가시간에 TV보기, 게임, 인터넷 등으로 앉아서 보낸 시간이 하루에 보통
몇 시간 정도입니까?

- ① 하루 1시간미만
- ② 하루 1시간~2시간미만
- ③ 하루 2시간~3시간미만
- ④ 하루 3시간~4시간미만
- ⑤ 하루 4시간 이상

☐

8. (지역) 최근 1달 동안 규칙적으로 운동을 하고 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

☐

식생활

1. 최근 1주일 동안 아침식사를 한 날은 며칠입니까? ☐ 일 ☐ 일
2. 평상시 음식을 먹을 때, 다음 중 본인은 어디에 해당합니까? ☐
- ① 아주 짜게 먹는다
② 약간 짜게 먹는다
③ 보통으로 먹는다
④ 약간 싱겁게 먹는다
⑤ 아주 싱겁게 먹는다
3. 식탁이나 상에 차려진 음식을 먹을 때, 소금이나 간장을 더 넣어 먹습니까? ☐
- ① 항상 더 넣는다
② 자주 더 넣는다
③ 거의 더 넣지 않는다
④ 전혀 더 넣지 않는다
4. 전, 부침, 튀김을 먹을 때, 간장에 찍어 먹습니까? ☐
- ① 항상 찍어 먹는다
② 가끔 찍어 먹는다
③ 찍어 먹지 않는다
5. '영양표시'를 알고 있습니까? ☐
- ① 예 ② 아니오 (⇒ 6번 문항으로)
- ↳ 5-1. 가공식품을 사거나 고를 때, '영양표시'를 읽습니까? ☐
- ① 예 ② 아니오 (⇒ 6번 문항으로) 8. 비해당
③ 비해당(문항5/②: 영양표시를 모름)
- ↳ 5-1-1. 영양표시 내용이 가공식품을 고르는데 영향을 미칩니까? ☐
- ① 예 ② 아니오 8. 비해당
③ 비해당(문항5/②: 영양표시를 모름, 문항5-1/②: 영양표시를 읽지 않음)
6. (지역) 평소 덜 짜게 먹으려고 노력합니까? ☐
- ① 전혀 노력하지 않는다
② 거의 노력하지 않는다
③ 가끔 노력한다
④ 대체로 노력한다
⑤ 항상 노력한다
7. (지역) 최근 1년 동안 보건소, 구청, 등사무소, 복지시설, 학교, 병원 등에서 실시된 영양교육 및 상담을 받은 적이 있습니까? ☐
- ① 예 ② 아니오

건강조사 제대로, 지역건강 제대로

비만 및 체중조절

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까?

- ① 매우 마른 편임
② 약간 마른 편임
③ 보통임
④ 약간 비만임
⑤ 매우 비만임

☐

2. 최근 1년 동안 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다
② 몸무게를 유지하려고 노력했다
③ 몸무게를 늘리려고 노력했다
④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해 본 적 없다

☐

3. 현재 본인의 키는 얼마입니까?

□□□.□cm

4. 현재 본인의 몸무게는 얼마입니까?

□□□.□kg

5. (지역) 최근 1년 동안 몸무게를 줄이거나 유지하기 위해 사용한 방법은 무엇인지 모두 응답해 주십시오.

5-1. 운동	① 예 ② 아니오
5-2. 단식(24시간 이상)	① 예 ② 아니오
5-3. 식사량감소 또는 식단조절	① 예 ② 아니오
5-4. 의사처방 없이 임의로 살 빼는 약 복용	① 예 ② 아니오
5-5. 의사 처방을 받아서 살 빼는 약 복용	① 예 ② 아니오
5-6. 한약 복용	① 예 ② 아니오
5-7. 건강기능식품	① 예 ② 아니오
5-8. 원푸드 다이어트(포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만을 먹는 다이어트 방법)	① 예 ② 아니오

- ☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당

88888888. 비해당(문항2/③④: 몸무게를 늘리려고 노력했거나 조절하기 위해 노력해본 적이 없음)

구강건강

1. 스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

☐2. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느끼니까?
(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.)☐

- ① 매우 불편하다
② 불편하다
③ 그저 그렇다
④ 별로 불편하지 않다
⑤ 전혀 불편하지 않다

3. (만 50세 이상만 응답해 주십시오.) 현재 끼었다 뺐다 할 수 있는 틀니를 하고 있습니까?

☐

- ① 위아래 둘 다 있음 — (⇒ 4번 문항으로)
② 위쪽만 있음 } (⇒ 3-1번 문항으로)
③ 아래쪽만 있음
④ 아니오
⑤ 비해당(나이: 만 50세 미만)

8. 비해당

3-1. 현재 틀니가 필요하다고 생각합니까?

☐

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항3/①: 위아래 둘 다 있음)

8. 비해당

4. 어제 하루 동안 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까?

4-1. 아침식사 후에	① 예	② 아니오	③ 어제 아침식사 하지 않음
4-2. 점심식사 후에	① 예	② 아니오	③ 어제 점심식사 하지 않음
4-3. 저녁식사 후에	① 예	② 아니오	③ 어제 저녁식사 하지 않음
4-4. 잠자기 전에	① 예	② 아니오	③ 어제 잠자지 않음

☐☐☐☐

5. 최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?

☐

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 6번 문항으로)

☐

5-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까?(한 가지만 선택)

☐

88. 비해당

- ① 경제적인 이유로
② 치과병의원(또는 보건소, 보건지소 등)이 너무 멀어서
③ 직장이나 학교를 비울 수 없어서
④ 거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에
⑤ 아이를 봐줄 사람이 없어서
⑥ 다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서
⑦ 치과진료를 받기가 무서워서
⑧ 기타()
88. 비해당(문항5/②: 진료를 받지 못한 적이 없음)

건강조사 제대로, 지역건강 대대로

6. 최근 1년 동안 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까? ※ 학교·사업장 구강검진, 국민건강보험공단 구강검진 포함

- ① 예 ② 아니오

☐

7. 최근 1년 동안 스케일링(치석제거)을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항3/①: 위아래 둘 다 있음)

☐

8. 비해당

8. 치주조직(잇몸)의 건강은 어느 정도라고 생각합니까?

- ① 이가 흔들린다
② 잇몸이 자주 붓는다
③ 치석이 많다
④ 잇몸에서 피가 난다
⑤ 정상이다
⑥ 비해당(문항3/①: 위아래 둘 다 있음)

☐

8. 비해당

정신건강

1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까? 시간

시간

2. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

- ① 대단히 많이 느낀다
② 많이 느끼는 편이다
③ 조금 느끼는 편이다
④ 거의 느끼지 않는다
- ➔ 2-1번 문항으로
➔ 3번 문항으로

2-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

③ 비해당(문항2/③, ④: 평소 스트레스를 조금 느끼거나 거의 느끼지 않음)

8. 비해당

3. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (➔ 4번 문항으로)

3-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

③ 비해당(문항3/②: 2주 이상 슬프거나 절망감을 느낀 적이 없음)

8. 비해당

4. (지역) 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

4-1. (지역) 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

③ 비해당(문항4/②: 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 없음)

8. 비해당

5. (지역) 최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

건강조사 제대로, 지역건강 대대로

예방접종 및 검진

1. 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오

 2. 최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으나 건강상태를 알아보기 위해 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오

 3. 최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으나 건강상태를 알아보기 위해 암 검진을 받은 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오

이환

1. 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까?

① 예 → 일

② 아니오

 일

2 00. 아니오

※ 지금부터 우리나라 국민들이 많이 걸리는 질병에 대해서 질문하도록 하겠습니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용을 응답해 주시기 바랍니다.

【고혈압】

1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?

① 예

② 아니오 (⇒ 「당뇨병」 1번 문항으로)

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예

② 아니오 (⇒ 1-2번 문항으로)

⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1-1-1. 혈압을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

1-1-1-1. 혈압약 복용	① 예 ⇒ 한 달에 일 ② 아니오
1-1-1-2. 비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오

8 88 8. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항1-1/②: 현재 치료를 받지 않음)

1-2. 고혈압을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분미만으로 대화한 진료상담은 제외).

1-2-1. 병의원	① 예 ② 아니오
1-2-2. 한방병의원	① 예 ② 아니오
1-2-3. 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

【당뇨병】

1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?

① 예

② 아니오 (⇒ 「이상지질혈증」 1번 문항으로)

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예

② 아니오 (⇒ 1-2번 문항으로)

⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

건강조사 제대로, 지역건강 대대로

1-1-1. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

1-1-1-1. 인슐린 주사	① 예 ② 아니오
1-1-1-2. 당뇨병약(경구 혈당강하제)	① 예 ② 아니오
1-1-1-3. 비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항1-1/②: 현재 치료를 받지 않음)

☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당

1-2. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(* 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분미만으로 대화한 진료상담은 제외).

1-2-1. 병원	① 예 ② 아니오
1-2-2. 한방병원	① 예 ② 아니오
1-2-3. 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당
☐ 8. 비해당

1-3. 당화혈색소를 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 1-4번 문항으로)
③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐ 8. 비해당

1-3-1. 최근 1년 동안 당화혈색소 검사를 몇 번이나 했습니까?

- ① 4회 이상
② 3회
③ 2회
④ 1회
⑤ 측정 안함

③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항1-3/②: 당화혈색소를 모름)

☐ 8. 비해당

1-4. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈검사(안저검사)를 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐ 8. 비해당

1-5. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐ 8. 비해당

【이상지질혈증(고지혈증 포함)】

1. 의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (➡ 「관절염」 1번 문항으로)

1

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「관절염」 1번 문항으로)
⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1

8. 피해당

1-1-1. 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

1-1-1-1. 이상지질혈증 약 복용	① 예 → 한 달에 일 ② 아니오
1-1-1-2. 비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오

8 88 8. 비혜당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항1-1/②: 현재 치료를 받지 않음)

한 달에 일

2 00. 아니오

88. 비해당

8. 피해당

【관절염】

1. 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 이니오 (→ 「천식」 1번 문항으로)

1

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ☐ 예 ☒ 아니오
⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1

8. 비해당

1-2. 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외).

1-2-1. 병의원	① 예 ② 아니오
1-2-2. 한방병의원	① 예 ② 아니오
1-2-3. 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

8. 비해당

8. 비해당

8. 비해당

8. 비해당

8. 비해당

【천식】

1. 의사에게 천식을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「알레르기비염」 1번 문항으로)

--	--

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- [illegible]

1

8. 비혜당

의료이용

1. 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 미포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까?

① 예

② 아니오 (➡ 「사고 및 중독」 1번 문항으로)

☐


1-1. 그런 적이 있다면, 다음 중 어떤 이유로 본인이 원하는 때 병의원에 가지 못했습니까?

(한 가지만 선택)

① 경제적인 이유로

② 병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서

③ 교통편이 불편해서

④ 내가 갈 수 있는 시간에 병의원 등이 문을 열지 않아서

⑤ 병의원 등에서 오래 기다리기 싫어서

⑥ 증상이 가벼워서

⑦ 기타()

⑧ 비해당(문항1/②: 병의원(치과 미포함)에 가지 못한 적이 없음)

☐

8. 비해당

건강조사 제대로, 지역건강 대대로

사고 및 중독

1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까?

※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외

① 예 → ☐ 회

② 아니오

☐ ☐ 회

2 0. 아니오

2. 최근 1년 동안 넘어진 적이 있습니까? ※ 미끄러짐, 헛디딤, 주저앉음, 떨어짐 포함

① 예 → ☐ 회

② 아니오 (⇒ 3번 문항으로)

☐ ☐ 회

2 0. 아니오



2-1. 넘어짐으로 인해 응급실이나 병원에서 치료를 받았습니까?

① 예

② 아니오

③ 비해당(문항2/②: 최근 1년 동안 넘어진 적이 없음)

☐

8. 비해당

3. 평소 넘어지는 것에 대한 두려움을 느낍니까?

① 전혀 두려워하지 않는다

② 약간 두려워한다

③ 많이 두려워한다

☐

활동제한 및 삶의 질

※ 다음은 귀하의 삶에 대해 얼마나 만족하고 있는지를 알아보기 위한 질문입니다. 매우 만족하는 경우를 '10'으로, 매우 불만족하는 경우를 '1'로 생각하시고 다음 질문에 응답해 주십시오.

1. 모든 사항을 고려할 때, 최근 귀하의 삶에 (대체로) 어느 정도 만족합니까?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

매우 불만족

매우 만족

☐

※ 지금부터 질병이나 손상 등으로 인해 몸이 아팠거나, 결석이나 결근 등을 해야 했던 내용에 대해서 질문하겠습니다. 질문을 잘 듣고 응답해 주십시오.

2. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 적이 있습니까?

① 예 → ☐ ☐ 일

② 아니오

☐ ☐ ☐ 일

2 00, 아니오

3. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 했던 적이 있습니까?

※ 농사/정사를 못나간 경우 결근에 해당

① 예 → ☐ ☐ 일

② 아니오

③ 학교 또는 직장을 다니고 있지 않음

☐ ☐ ☐ 일

2 00, 아니오

3 88, 학교, 직장 안다님

※ 아래의 각 문항에서 오늘 귀하의 건강상태를 가장 잘 설명해주는 하나의 항목에 표시해 주십시오.

4-1. 운동능력

- ① 나는 걷는데 지장이 없다
② 나는 걷는데 다소 지장이 있다
③ 나는 종일 누워 있어야 한다

☐

4-2. 자기관리

- ① 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다
② 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다
③ 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다

☐

4-3. 일상 활동(예: 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가활동)

- ① 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다
② 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다
③ 나는 일상 활동을 할 수가 없다

☐

4-4. 통증/불편

- ① 나는 통증이나 불편감이 없다
② 나는 다소 통증이나 불편감이 있다
③ 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다

☐

4-5. 불안/우울

- ① 나는 불안하거나 우울하지 않다
② 나는 다소 불안하거나 우울하다
③ 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다

☐

건강조사 제대로, 지역건강 대대로

보건기관 이용

1. 최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「사회 물리적 환경」 1번 문항으로)

☐


1-1. (지역) 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소의 서비스 전반에 대해 어느 정도 만족했습니까?

- ① 대단히 만족한다
② 만족한 편이다
③ 보통이다
④ 불만족한 편이다
⑤ 대단히 불만족한다
⑥ 비해당(문항1/②: 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소 이용한 적이 없음)

☐

사회 물리적 환경

1. 다음 문항에 대한 생각은 어떻습니까? 모두 응답해 주십시오.

1-1. 우리 동네 사람들은 서로 믿고 신뢰할 수 있다	① 예 ② 아니오
1-2. 이웃에 경조사가 있을 때, 주민 사이에 서로 도움을 주고받는 전통이 있다	① 예 ② 아니오
1-3. 우리 동네의 전반적 안전수준(자연재해, 교통사고, 농작업 사고, 범죄)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오
1-4. 우리 동네의 자연환경(공기질, 수질 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오
1-5. 우리 동네의 생활환경(전기, 상하수도, 쓰레기 수거, 스포츠시설 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오
1-6. 우리 동네의 대중교통 여건(버스, 택시, 지하철, 기차 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오
1-7. 우리 동네의 의료서비스 여건(보건소, 병의원, 한방병원, 약국 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오

2. 가장 많이 접촉하는 친척(가족포함)과 얼마나 자주보거나 연락합니까?

- ① 한 달에 1번 미만
 ② 한 달에 1번
 ③ 한 달에 2~3번
 ④ 일주일에 1번
 ⑤ 일주일에 2~3번
 ⑥ 일주일에 4번 이상

3. 가장 많이 접촉하는 이웃과 얼마나 자주보거나 연락합니까?

- ① 한 달에 1번 미만
 ② 한 달에 1번
 ③ 한 달에 2~3번
 ④ 일주일에 1번
 ⑤ 일주일에 2~3번
 ⑥ 일주일에 4번 이상

4. 가장 많이 접촉하는 친구(이웃제외)와 얼마나 자주보거나 연락합니까?

- ① 한 달에 1번 미만
 ② 한 달에 1번
 ③ 한 달에 2~3번
 ④ 일주일에 1번
 ⑤ 일주일에 2~3번
 ⑥ 일주일에 4번 이상

건강조사 제대로, 지역건강 대대로

5. 다음 활동에 한 달에 한 번(1회) 이상 정기적으로 참여합니까?

5-1. 종교활동	① 예 ② 아니오
5-2. 친목활동(계모임, 동창회, 노인정, 향우회, 종친회 등)	① 예 ② 아니오
5-3. 여가/레저 활동	① 예 ② 아니오
5-4. 자선단체 활동	① 예 ② 아니오

6. 현재 살고 있는 광역 시·도에서 얼마나 오래 살았습니까?

- ① 5년 미만
- ② 5-10년 미만
- ③ 10-15년 미만
- ④ 15-20년 미만
- ⑤ 20년 이상

7. 현재 살고 있는 시·군·구에서 얼마나 오래 살았습니까?

- ① 5년 미만
- ② 5-10년 미만
- ③ 10-15년 미만
- ④ 15-20년 미만
- ⑤ 20년 이상

☐
☐
☐
☐
☐
☐

개인위생

1. 손 씻기가 감염병(전염병) 예방에 어느 정도 도움이 된다고 생각합니까?

- ① 매우 도움이 된다
 ② 도움이 된다
 ③ 도움이 되지 않는다
 ④ 전혀 도움이 되지 않는다

☐

2. 최근 1주일 동안 식사하기 전 얼마나 자주 손을 씻었습니까?

- ① 항상 씻었다
 ② 자주 씻었다
 ③ 가끔 씻었다
 ④ 거의 씻지 않았다

☐

3. 최근 1주일 동안 화장실 다녀온 후 얼마나 자주 손을 씻었습니까?

- ① 항상 씻었다
 ② 자주 씻었다
 ③ 가끔 씻었다
 ④ 거의 씻지 않았다

☐

4. 최근 1주일 동안 외출 후 집에 돌아왔을 때 얼마나 자주 손을 씻었습니까?

- ① 항상 씻었다
 ② 자주 씻었다
 ③ 가끔 씻었다
 ④ 거의 씻지 않았다

☐

5. 평소 손을 씻을 때, 비누나 손 세정제를 얼마나 자주 사용합니까?

- ① 항상 사용한다
 ② 자주 사용한다
 ③ 가끔 사용한다
 ④ 거의 사용하지 않는다
 ⑤ 전혀 사용하지 않는다

☐

6. 최근 1년 동안 올바른 손 씻기에 관한 교육이나 이와 관련한 홍보물을 본 경험이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

건강조사 제대로, 지역건강 대대로

여성건강

1. (만 19세~55세 여성만 응답해 주십시오.) 현재 월경(생리, 달거리)을 하고 있습니까?

- ① 월경 중
- ② 임신 중
- ③ 출산 후 수유 중
- ④ 폐경
- ⑤ 기타()
- ⑧ 비해당(성별: 남자, 만 56세 이상 여성)

☐
8. 비해당

2. (지역) 출산경험(정상출산, 조산 등 모두포함)이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「교육 및 경제활동」 1번 문항으로)
- ⑧ 비해당(성별: 남자)

☐
8. 비해당

2-1. (지역) 최소 1달 이상 모유수유 한 경험이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
- ⑧ 비해당(문항2/②: 출산경험(정상출산, 조산 등 모두포함)이 없음)

☐
8. 비해당

교육 및 경제활동

1. 귀하께서는 최근 1주일 동안 수입을 목적으로 1시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급 가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태도 일을 하신 경우에 포함 됩니다.

① 예 ② 아니오

2. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해주십시오.
(예를 들면, 은행에서 출납 일을 함, 건설현장에서 교통정리를 함, 벽지 도배, 내과질환진료 및 치료 등)

일의 종류	
직 업 분 류	① 관리자 ② 전문가 및 관련종사자
	③ 사무종사자 ④ 서비스종사자
	⑤ 판매종사자 ⑥ 농·림·어업종사자
	⑦ 기능원 및 관련기능종사자 ⑧ 장치, 기계조작 및 조립종사자
	⑨ 단순노무종사자 ⑩ 군인(직업군인)
	⑪ 학생/재수생 ⑫ 주부 ⑬ 무직

일의
종류

- 2-1. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?

(※ 문항 2번 응답보기 ①~⑩에 응답하신 분만 응답해 주십시오.)

- ① 고용주 및 자영업자(내 사업을 한다)
② 임금근로자(타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다)
③ 무급가족종사자(가족, 친척의 일을 돈을 받지 않고 돕는다)
④ 비해당(문항2/①, ②, ③: 학생/재수생, 주부, 무직)

8. 비해당

3. 귀하는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

- ① 무학 (⇒ 4번 문항으로) ② 서당/한학 (⇒ 4번 문항으로) ③ 초등학교
④ 중학교 ⑤ 고등학교 ⑥ 2년/3년제 대학
⑦ 4년제 대학 ⑧ 대학원 이상

- 3-1. 귀하는 그 학교를 졸업하셨습니까? 졸업여부를 말씀해 주십시오.

- ① 졸업 ② 수료 ③ 중퇴 ④ 재학/휴학 중
⑤ 비해당(문항3/①, ②: 무학, 서당/한학)

8. 비해당

4. 귀하의 현재 혼인상태(사실혼 포함)는 다음 중 무엇에 해당합니까?

- ① 배우자 있음(같이 살고 있음)
② 이혼
③ 사별
④ 별거
⑤ 미혼

설문에 응해주셔서 감사합니다.

답례품 수령 확인

설문을 마친 후 조사원으로부터 답례품을 받았습니다.

2015년 월 일

성명

서명 또는 날인


※ 개인조사는 마쳤습니다. 가구대표 1명이 가구조사에 참여하여 주십시오.



지역사회건강조사
Community Health Survey

제 4 부 부록

Ⅱ. 가구조사표



CHS

Community Health Survey

다음은 2015년 지역사회건강조사 가구조사표(울산권역)입니다. ➔

2015년 지역사회건강조사 가구명부

시도 보건소 표본지점 가구

번호 :

가구현황

주소	(표본지점 주소)			총 방문횟수 ()회
	(이하 상세주소)	집전화 ☎ () -	방 1차 2015. . .	
			문 2차 2015. . .	
일 3차 2015. . .				

가구구분	☐ 본표본가구 ☐ 예비표본가구 (본표본가구 번호:)			가구대체 발생시 본표본 가구번호를 기입합니다.
성인거주여부	☐ 성인거주 ☐ 성인미거주 ☐ 모름			성인기준: 주민등록상 생일로 1996. 7.31 이전 출생자
조사적합여부	☐ 적합 ⇒ 가구원정보 기입 ☐ 부적합 ⇒ 조사종료 & 가구대체 (사유:)			

가구원현황

'가구조사' 기입란은 가구조사를 한 대표 가구원 1인만 ☒ 하십시오.

가구원 번호	가구원 성명	성별	주민등록상 생년월일	가구주와의 관계	휴대전화	조사수행 여부	미수행 사유	가구 조사
01		남 / 여			- -	Y / N		☐
02		남 / 여			- -	Y / N		☐
03		남 / 여			- -	Y / N		☐
04		남 / 여			- -	Y / N		☐
05		남 / 여			- -	Y / N		☐
06		남 / 여			- -	Y / N		☐
07		남 / 여			- -	Y / N		☐
08		남 / 여			- -	Y / N		☐
09		남 / 여			- -	Y / N		☐
10		남 / 여			- -	Y / N		☐
11		남 / 여			- -	Y / N		☐
12		남 / 여			- -	Y / N		☐

조사원 성명: _____

가구완료

조 사 인 원 : 만 19세 이상 성인 ()명 중 ()명 조사		
조 사 완 료 : 만 19세 이상 성인을 모두 조사하였습니까?	☐ 예	☐ 아니오
가 구 조 사 : 가구 대표1명만 가구조사를 실시하였습니까?	☐ 예	☐ 아니오
답 레 품 전 달 : 조사인원 수만큼 답례품을 제공하였습니까?	☐ 예	☐ 아니오
가구선정통지문 : 이 가구는 가구선정통지문을 받았습니까?	☐ 예	☐ 아니오

가구조사

※ 가구대표 1명만 가구조사에 참여해 주시기 바랍니다.

1. 세대 유형은 다음 중 무엇에 해당합니까?

1세대	☐ 1. 1인 가구	☐ 2. 응답자+미혼형제자매	☐ 7. 기타: 상기를 제외한 모든 1세대 가구
	☐ 3. 부부(응답자+배우자)	☐ 4. 부부+기타 친인척	
	☐ 5. 부부+미혼형제자매	☐ 6. 응답자+기타 친인척	
2세대	☐ 8. 부부+미혼자녀	☐ 9. 부부+양친	☐ 10. 조부모+미혼 손자녀
	☐ 11. 편부+미혼자녀	☐ 12. 부부+편부/편모	☐ 13. 편조부/편조모+미혼 손자녀
	☐ 14. 편모+미혼자녀	☐ 15. 부부+자녀+부부의 형제 또는 자매	☐ 16. 기타: 상기를 제외한 모든 2세대 가구
3세대	☐ 17. 부부+미혼자녀+양친		
	☐ 18. 부부+미혼자녀+편부/편모		
	☐ 19. 기타 상기를 제외한 모든 3세대 이상 가구		

2. 귀 가구는 현재 기초생활 수급자(구. 생활보호대상자 혹은 영세민)입니까?

- ① 그렇다
② 지금은 아니지만, 과거에 수급자였던 적이 있다
③ 아니다

3. 임금, 부동산 소득, 연금, 이자, 정부 보조금, 친척이나 자녀들의 용돈 등 모든 수입을 합쳐 최근 1년 동안 가구의 월 평균 소득은 대략 얼마입니까?

- ① 50만원 미만
- ② 50-100만원 미만
- ③ 100-200만원 미만
- ④ 200-300만원 미만
- ⑤ 300-400만원 미만
- ⑥ 400-500만원 미만
- ⑦ 500-600만원 미만
- ⑧ 600만원 이상

4. 귀 가구는 현재 치매환자와 함께 거주하고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

5. 다음 중 최근 1년 동안 귀하의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?


- ① 우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다
- ② 우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다
- ③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다
- ④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다

6. 귀 가구는 다문화 가정입니까?

- ① 예 ② 아니오

제 4 부 부록

Ⅲ. 지표정의



지표정의

1. 건강행태

가. 흡연

(1) 현재흡연율

지표정의		평생 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ② 가끔 피움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? □□년 □□개월 ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상
산출식	분자	평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 남자 현재흡연율

지표정의		평생 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 남자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오 2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ② 가끔 피움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? □□년 □□개월 ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상
산출식	분자	평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수×100
	분모	남자 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 매일흡연자의 하루 평균 흡연량

지표정의		평생 담배 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 매일 흡연하는 사람의 하루 평균 흡연량
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오 2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ② 가끔 피움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? □□년 □□개월 ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상
산출식	분자	평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 매일 흡연자의 하루 평균 흡연개비수의 총 합
	분모	평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일 흡연자 수
단위		개비
조사주기		1년

(4) 현재흡연자의 금연시도율

지표정의		현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오 2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ② 가끔 피움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? □□년 □□개월 ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상 3. 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까? ① 최근 1년간 금연한 적이 있다. ② 과거에는 있었지만, 최근 1년간 없다 ③ 금연한 적이 없다
산출식	분자	최근 1년 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수×100
	분모	현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률

지표정의		현재흡연자 중 1개월 내에 금연할 계획이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□개비 ② 가끔 피움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? □□년 □□개월 ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상
		3. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까? ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다 ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다 ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다 ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다
산출식	분자	현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 중 1개월 내 금연계획이 있는 사람의 수×100
	분모	현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수
단위		%
조사주기		1년

(6) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률

지표정의	최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 분율	
관련문항	1. <u>본인을 제외한</u> 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. <u>최근 1주일 동안</u> 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	
산출식	분자	최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적 있는 사람의 수×100
	분모	현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수
단위	%	
조사주기	2년	

(7) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률

지표정의	최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 분율	
관련문항	1. <u>최근 1주일 동안</u> 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)	
산출식	분자	최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수×100
	분모	일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수
단위	%	
조사주기	2년	

(8) 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률

지표정의	공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있는 사람의 분율	
관련문항	1. <u>최근 1년 동안</u> 공공장소(버스/택시 정거장, 길거리, 음식점, 유흥업소, PC 방 등)에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있습니까? ① 예 ② 아니오	
산출식	분자	공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있는 사람의 수×100
	분모	현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수
단위	%	
조사주기	2년	

나. 음주

(1) 월간음주율

지표정의		최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 음주한 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		2. <u>최근 1년 동안</u> 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2-4번 ④ 일주일에 2-3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상
산출식	분자	최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 고위험음주율

지표정의		최근 1년 동안 음주한 사람 중에서 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2~4번 정도 ④ 일주일에 2~3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상 1-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다) ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
산출식	분자	최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔)이상을 주 2회 이상 마신 적이 있는 사람의 수×100
	분모	최근 1년 동안 음주한 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 연간 음주폐해 경험률

지표정의		최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전사고 등을 경험한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

다. 안전의식

(1) 운전 시 안전벨트 착용률

지표정의		자동차 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항		1. 자동차를 운전을 합니까? ① 예 ② 아니오 ----- 1-1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까? ① 전혀 매지 않는다 ② 거의 매지 않는 편이다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 맨다
산출식	분자	자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	자동차 운전자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률

지표정의		승용차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항		1. 다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 맵니까? ① 앞좌석에 타지 않는다 ② 전혀 매지 않는다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 맨다
산출식	분자	다른 사람이 운전하는 승용차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	동승차량 앞좌석 탑승자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률

지표정의		승용차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항		1. 다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 맵니까? ① 뒷좌석에 타지 않는다 ② 전혀 매지 않는다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 맨다
산출식	분자	다른 사람이 운전하는 승용차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	동승차량 뒷좌석 탑승자 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 연간 음주음전 경험률(자동차 또는 오토바이)

지표정의		최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 오토바이 또는 자동차를 운전한 사람의 분율
관련문항		1. 자동차를 운전을 합니까? ① 예 ② 아니오 1-1. <u>최근 1년 동안</u> 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 2. 오토바이를 운전을 합니까? ① 예 ② 아니오 2-1. <u>최근 1년 동안</u> 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 수×100
	분모	자동차 또는 오토바이 운전자 수
단위		%
조사주기		1년

라. 운동 및 신체활동

(1) 격렬한 신체활동 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(※격렬한(고강도) 신체활동: 달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업활동 및 체육활동) □일 1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 □□시간 □□분
산출식	분자	최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 중등도 신체활동 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다)(※중등도(중강도) 신체활동: 천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업활동 및 체육활동) □일 1-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 □□시간 □□분
산출식	분자	최근 1주일 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 중등도 이상 신체활동 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 1일 20분 이상 주 3일 이상 또는 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1주일 동안</u> 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 <u>10분 이상</u> 했던 날은 며칠입니까?(※격렬한(고강도) 신체활동: 달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동) ☐ 일
		1-1.이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 ☐ ☐ 시간 ☐ ☐ 분
		2. <u>최근 1주일 동안</u> 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 <u>10분 이상</u> 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다)(※중등도(중강도) 신체활동: 천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업활동 및 체육활동) ☐ 일
		2-1.이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 ☐ ☐ 시간 ☐ ☐ 분
산출식	분자	최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 걷기 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1주일 동안</u> 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까? ※출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오. ☐ 일
		1-1.이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까? 하루에 ☐ ☐ 시간 ☐ ☐ 분
산출식	분자	최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

마. 식생활

(1) 아침식사 빈도

지표정의		최근 1주일 동안 아침식사 빈도
관련문항		1. <u>최근 1주일 동안</u> 아침식사를 한 날은 며칠입니까? ☐ 일
산출식	분자	최근 1주일 동안 아침식사한 날
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 영양표시 활용률

지표정의		영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. '영양표시'를 알고 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 가공식품을 사거나 고를 때 '영양표시'를 읽습니까? ① 예 ② 아니오 1-2. 영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고르는데 영향을 미칩니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수×100
	분모	가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

바. 비만 및 체중조절

(1) 비만을

지표정의	체질량지수
관련문항	1. 현재 본인의 키는 얼마입니까? □□□.□cm 2. 현재 본인의 몸무게는 얼마입니까? □□□.□kg
산출식	분자 체질량지수(kg/m^2)가 25 이상인 사람의 수$\times 100$ - 저체중 = $\text{BMI} < 18.5$ 인 사람의 수$\times 100$ - 정상 = $18.5 \leq \text{BMI} < 25$ 인 사람의 수$\times 100$ - 비만(비만인구율) = $\text{BMI} \geq 25$ 인 사람의 수$\times 100$ 분모 조사대상 응답자 수
단위	%
조사주기	1년

(2) 주관적 비만인지율

지표정의	주관적으로 “약간 비만” 또는 “매우 비만”이라고 생각하는 사람의 분율
관련문항	1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까? ① 매우 마른 편임 ② 약간 마른 편임 ③ 보통임 ④ 약간 비만임 ⑤ 매우 비만임
산출식	분자 “약간 비만임” 또는 “매우 비만임”에 응답한 사람의 수$\times 100$ 분모 조사대상 응답자 수
단위	%
조사주기	1년

(3) 연간 체중조절 시도율

지표정의	최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 분율
관련문항	1. 최근 1년 동안 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까? ① 몸무게를 줄이려고 노력했다 ② 몸무게를 유지하려고 노력했다 ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다 ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다
산출식	분자 최근 1년 동안 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 했던 사람의 수$\times 100$ 분모 조사대상 응답자 수
단위	%
조사주기	1년

사. 구강건강

(1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

지표정의		주관적으로 구강건강이 나쁘다고 인식하는 사람의 분율
관련문항		1. 스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨
산출식	분자	“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 저작불편호소율(65세 이상)

지표정의		현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 65세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까? (※틀니를 사용하는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오) ① 매우 불편하다 ② 불편하다 ③ 그저 그렇다 ④ 별로 불편하지 않다 ⑤ 전혀 불편하지 않다
산출식	분자	“매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	65세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 연간 구강검진 수진율

지표정의		최근 1년 동안 치료목적이 아닌 순수검진 목적으로 구강검진을 받은 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까? ※학교 사업장 구강검진, 국민건강보험공단 구강검진 포함 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 구강검진을 받은 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 어제 아침식사 후 칫솔질 실천율

지표정의		아침식사 후 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. <u>어제 하루 동안</u> 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? 아침 식사 후에 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 아침식사 하지 않음
산출식	분자	아침식사 후 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	어제 하루 동안 아침식사 한 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율

지표정의		점심식사 후 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. <u>어제 하루 동안</u> 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? 점심 식사 후에 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 점심식사 하지 않음
산출식	분자	점심식사 후 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	어제 하루 동안 점심식사 한 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(6) 어제 저녁식사 후 칫솔질 실천율

지표정의		저녁식사 후 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. <u>어제 하루 동안</u> 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? 저녁 식사 후 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 저녁식사 하지 않음
산출식	분자	저녁식사 후 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	어제 하루 동안 저녁식사 한 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(7) 어제 잠자기 전 칫솔질 실천율

지표정의		잠자기 전 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. <u>어제 하루 동안</u> 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? 잠자기 전에 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 잠자지 않음
산출식	분자	잠자기 전 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	어제 하루 동안 잠을 잔 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(8) 연간 치과진료 미치료율

지표정의		최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

아. 정신건강

(1) 스트레스 인지율

지표정의		평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이” 또는 “많이” 느끼는 사람의 분율
관련문항		1. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까? ① 대단히 많이 느낀다 ② 많이 느끼는 편이다 ③ 조금 느끼는 편이다 ④ 거의 느끼지 않는다
산출식	분자	평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느낀다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 우울감 경험률

지표정의		최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 경험한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

2. 예방접종 및 검진

(1) 연간 인플루엔자 예방접종률

지표정의		최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?</u> ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 건강검진 수진율

지표정의		최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으나 건강상태를 알아보기 위해 건강검진(암검진 제외)받은 적이 있습니까?</u> ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 2년 동안 건강검진(암검진 제외)을 받은 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 암 검진율

지표정의		최근 2년간 암 검진을 한 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으나 건강상태를 알아보기 위해 암 검진을 받은 적이 있습니까?</u> ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 2년간 암 검진을 한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

3. 이환

(1) 만성·급성질환 및 사고중독 경험률

지표정의		최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 사람의 분율
관련문항		1. 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고, 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까? ① 예→□□일 ② 아니오
산출식	분자	최근 2주(14일) 동안 만성, 급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)

지표정의		의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	의사에게 고혈압을 진단 받은 사람의 수×100
	분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 고혈압 약물치료율(≥30)

지표정의		의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람으로 현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용한 분율
관련문항		1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-1. 현재 치료를 받고 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-2. 혈압을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답 해 주십시오. 혈압약 복용 ① 예→한 달에 □□일 ② 아니오 비약물요법 (운동, 식사요법) ① 예 ② 아니오
산출식	분자	현재 혈압조절약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 고혈압 관리교육 이수율(≥30)

지표정의		의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람으로 고혈압 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 2. 고혈압을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) 병의원 ① 예 ② 아니오 한방병의원 ① 예 ② 아니오 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	의사에게 당뇨병을 진단 받은 사람의 수×100
	분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(6) 당뇨병 치료율(≥ 30)

지표정의	의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람으로 혈당을 관리하기 위해 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구혈당강하제)를 치료 받고 있는 사람의 분율
관련문항	1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-2. 현재 치료를 받고 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-3. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 인슐린 주사 ① 예 ② 아니오 당뇨병 약(경구 혈당강하제) 복용 ① 예 ② 아니오 비약물요법(운동, 식사요법) ① 예 ② 아니오
산출식	분자 현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용하고 응답한 사람의 수×100 분모 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위	%
조사주기	1년

(7) 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람으로 당뇨병을 관리하는 방법에 대해 병의원 또는 한방병의원 또는 보건소에서 교육을 받은 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 2. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모든 응답해 주십시오(※단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) 병의원 ① 예 ② 아니오 한방병원 ① 예 ② 아니오 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(8) 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년 동안 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-2. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(9) 연간 당뇨병 신장합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년 동안 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-2. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 받은 적이 있는 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(10) 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)

지표정의	관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 현재 치료받고 있는 50세 이상 사람의 분율	
관련문항	1. 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	
산출식	분자	의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단 받은 사람의 수×100
	분모	50세 이상 조사대상자 수
단위	%	
조사주기	1년	

(11) 관절염 관리교육 이수율(≥50)

지표정의	의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 50세 이상 사람 중 관절염 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율	
관련문항	1. 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-2. 관절염을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) 병의원 ① 예 ② 아니오 한방병원 ① 예 ② 아니오 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소 ① 예 ② 아니오	
산출식	분자	관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염) 관리교육을 받은 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수
단위	%	
조사주기	1년	

(12) 이상지질혈증(고지혈증 포함) 평생 의사진단 경험률(≥30)

지표정의	의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 30세 이상 사람의 분율	
관련문항	1. 의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받았습니까? ① 예 ② 아니오	
산출식	분자	의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단 받은 사람의 수×100
	분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위	%	
조사주기	1년	

4. 의료이용

(1) 연간 필요의료서비스 미치료율

지표정의		최근 1년 동안 필요한 의료서비스를 받지 못한 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 본인이 병원(치과 미포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

5. 사고 및 중독

(1) 연간 사고중독 경험률

지표정의		최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외 ① 예 → ☐ 회 ② 아니오
산출식	분자	연간 사고 및 중독 경험자 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 연간 낙상 경험률

지표정의		최근 1년 동안 넘어진 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 넘어진 적이 있습니까? ※미끄러짐, 헛디딤, 주저앉음, 떨어짐 포함 ① 예 → ☐ 회 ② 아니오
산출식	분자	연간 낙상 경험자 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		2년

6. 활동제한 및 삶의 질

(1) 양호한 주관적 건강수준 인지율

지표정의		주관적 건강수준을 “매우 좋음” 혹은 “좋음”이라고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. 평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨
산출식	분자	주관적 건강수준을 “매우 좋음” 혹은 “좋음”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

7. 보건기관 이용

(1) 연간 보건기관 이용률

지표정의		최근 1년 동안 보건기관을 이용한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

8. 사회 물리적 환경

(1) 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율

지표정의		지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적으로 응답한 사람의 분율
관련문항		1. 다음 문항에 대한 생각은 어떻습니까? 모두 응답해 주십시오. 1-1. 우리 동네 사람들은 서로 믿고 신뢰할 수 있다 ① 예 ② 아니오 1-2. 이웃에 경조사가 있을 때, 주민 사이에 서로 도움을 주고받는 전통이 있다 ① 예 ② 아니오 1-3. 우리 동네의 전반적 안전수준(자연재해, 교통사고, 농작업 사고, 범죄)에 대해 만족한다 ① 예 ② 아니오 1-4. 우리 동네의 자연환경(공기질, 수질 등)에 대해 만족한다 ① 예 ② 아니오 1-5. 우리 동네의 생활환경(전기, 상하수도, 쓰레기 수거, 스포츠시설 등)에 대해 만족한다 ① 예 ② 아니오 1-6. 우리 동네의 대중교통 여건(버스, 택시, 지하철, 기차 등)에 대해 만족한다 ① 예 ② 아니오 1-7. 우리 동네의 의료서비스 여건(보건소, 병원, 한방병원, 약국 등)에 대해 만족한다 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	지역의 사회 물리적 환경에 대해 긍정적으로 응답한 사람의 수x100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		2년

(2) 사회활동 참여율

지표정의		한 달에 한 번(1회) 이상 정기적으로 사회활동에 참여하는 사람의 분율
관련문항		1. 다음 활동에 한 달에 한 번(1회) 이상 정기적으로 참여합니까? 1-1. 종교활동 ① 예 ② 아니오 1-2. 친목활동(계모임, 동창회, 노인정, 향우회, 종친회 등) ① 예 ② 아니오 1-3. 여가/레저활동 ① 예 ② 아니오 1-4. 자선단체 활동 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	한 달에 한 번(1회) 이상 정기적으로 사회활동에 참여하는 사람의 수x100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		2년

9. 개인위생

(1) 손 씻기 감염병 예방 인지율

지표정의		손 씻기가 감염병(전염병) 예방에 “매우 도움이 된다” 또는 “도움이 된다”라고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. 손 씻기가 감염병(전염병) 예방에 어느 정도 도움이 된다고 생각합니까? ① 매우 도움이 된다 ② 도움이 된다 ③ 도움이 되지 않는다 ④ 전혀 도움이 되지 않는다
산출식	분자	“매우 도움이 된다” 또는 “도움이 된다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		2년

(2) 식사 전 손 씻기 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 식사하기 전에 “항상” 또는 “자주” 손을 씻는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1주일 동안 식사하기 전 얼마나 자주 손을 씻었습니까? ① 항상 씻었다 ② 자주 씻었다 ③ 가끔 씻었다 ④ 거의 씻지 않았다
산출식	분자	최근 1주일(7일) 동안 식사하기 전에 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		2년

(3) 화장실 다녀 온 후 손 씻기 실천율


지표정의		최근 1주일 동안 화장실 다녀온 후에 “항상” 또는 “자주” 손을 씻는 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1주일 동안 화장실 다녀온 후</u> 얼마나 자주 손을 씻었습니까? ① 항상 씻었다 ② 자주 씻었다 ③ 가끔 씻었다 ④ 거의 씻지 않았다
산출식	분자	최근 1주일(7일) 동안 화장실 다녀온 후에 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		2년

(4) 외출 후 손 씻기 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 외출 후 집에 돌아왔을 때 “항상” 또는 “자주” 손을 씻는 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1주일 동안 외출 후 집에 돌아왔을 때</u> 얼마나 자주 손을 씻었습니까? ① 항상 씻었다 ② 자주 씻었다 ③ 가끔 씻었다 ④ 거의 씻지 않았다
산출식	분자	최근 1주일 동안 외출 후 집에 돌아왔을 때 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		2년

제 4 부 부록

IV. 2008-2015 산출지표



2008-2015 산출지표

1. 흡연

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
평생흡연율	-	-	-	-	-	-	○	○
흡연시작연령 ¹⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
현재흡연율	○	○	○	○	○	○	○	○
매일흡연자의 하루 평균 흡연량	-	○	○	○	○	○	○	○
현재흡연자의 1개월 내 금연계획률	○	○	○	○	○	○	○	○
현재흡연자의 금연시도율	○	○	○	○	○	○	○	○
과거흡연자의 금연기간	-	-	-	-	-	-	○	○
현재흡연자 중 금연시도자의 금연이유	-	-	-	-	-	-	-	○
현재흡연자 중 금연시도자의 금연방법	-	-	-	-	-	-	-	○
과거흡연자의 금연이유	-	-	-	-	-	-	-	○
과거흡연자의 금연방법	-	-	-	-	-	-	-	○
현재흡연자의 의료인 금연권고 경험률	-	-	-	-	-	○	-	○
현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 ²⁾	○	○	○	○	-	○	○	○
현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 ³⁾	-	○	○	○	-	○	○	○
현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률 ⁴⁾	-	-	-	○	-	○	-	○
연간 금연캠페인 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○
연간 금연교육 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○
현재흡연자의 금연교육 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○
금연구역 인지율	-	-	-	○	-	○	-	○
현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률	-	-	-	○	-	○	-	○
담뱃값 인상 영향 경험률	-	-	-	-	-	-	-	○
담뱃값 인상 영향 유형	-	-	-	-	-	-	-	○
금연구역 관련 법률 인지율	-	-	-	-	-	-	-	○
금연정책 강화 필요영역	-	-	-	-	-	-	-	○
평생 전자담배 사용 경험률	-	-	-	-	-	-	○	○
현재 전자담배 사용 경험률	-	-	-	-	-	-	○	○
평생 다른 담배 제품 사용 경험률	-	-	-	-	-	-	-	○
현재 다른 담배 제품 사용 경험률	-	-	-	-	-	-	-	○
총계	8	10	10	13	8	14	11	28

1) '08년 지표명: 처음 흡연경험연령

2) '08년 지표명: 가정 내 간접흡연 노출률, '10-'13년 지표명: 가정실내 간접흡연 노출률

3) '09-'14년 지표명: 직장실내 간접흡연 노출률

4) '11-'13년 지표명: 공공장소 간접흡연 노출률

2. 음주

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
평생음주율	○	○	○	○	○	○	○	○
음주시작연령 ⁵⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
음주시작동기	-	-	-	-	-	○	-	○
연간음주율	-	○	○	○	○	○	○	○
월간음주율	○	○	○	○	○	○	○	○
고위험음주율	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 음주폐해 경험률	-	-	-	-	-	-	○	○
연간 절주 또는 금주시도율	-	-	-	-	-	-	○	○
총계	4	5	5	5	5	6	7	8

3. 안전의식

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
운전 시 안전벨트 착용률	○	○	○	○	○	○	○	○
동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	○	○	○	○	○	○	○	○
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	-	-	-	-	-	-	○	○
버스 안전벨트 착용률	-	-	-	-	-	-	○	○
연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이) ⁶⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 음주운전차량 동승경험률 ⁷⁾	-	-	○	○	○	○	○	○
연간 자전거 음주운전 경험률	-	-	-	-	-	-	○	○
연간 스쿨존 과속운전 경험률	-	-	-	○	-	-	-	○
총계	3	3	4	5	4	4	7	8

5) '08년 지표명: 처음 음주경험연령

6) '08년 지표명: 연간 음주운전 경험률(자동차, 오토바이)

7) '14년 지표명: 연간 자동차 음주운전차량 동승률

4. 운동 및 신체활동

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
격렬한 신체활동 실천율	-	○	○	○	○	○	○	○
중등도 신체활동 실천율	-	○	○	○	○	○	○	○
중등도 이상 신체활동 실천율	○	○	○	○	○	○	○	○
걷기 실천율 ⁸⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
근력운동 실천율	-	-	-	○	-	○	-	○
유연성운동 실천 빈도	-	-	-	○	-	○	-	○
주중 여가시간에 앉아서 보내는 시간	-	-	-	○	-	○	-	○
주말 여가시간에 앉아서 보내는 시간	-	-	-	○	-	○	-	○
총계	2	4	4	8	4	8	4	8

5. 식생활

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
아침식사빈도 ⁹⁾	-	-	-	○	○	○	○	○
아침결식 예방인구비율	-	-	-	○	○	○	○	○
저염선택율	○	○	○	○	○	○	○	○
영양표시 인지율	-	-	-	-	-	-	○	○
영양표시 독해율 ¹⁰⁾	-	○	○	○	○	○	○	○
영양표시 활용률	-	-	-	-	-	-	○	○
총계	1	2	2	4	4	4	6	6

6. 비만 및 체중조절

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
비만율 ¹¹⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
체질량지수(BMI)	○	○	○	○	○	○	○	○
비만도 분포	○	○	○	○	○	○	○	○
주관적 비만인지율	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 체중조절 시도율	○	○	○	○	○	○	○	○
체중조절 시도방법	○	○	○	-	○	-	○	○
총계	6	6	6	5	6	5	6	6

8) '08년 지표명: 걷기운동 실천율

9) '11-'14년 지표명: 아침식사 섭취빈도

10) '09-'13년 지표명: 가공식품 선택 시 영양표시 이용률

11) '08년 지표명: 비만인구율

7. 구강건강

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	○	○	○	○	○	○	○	○
저작불편호소율(65세 이상)	○	○	○	○	○	○	○	○
틀니 이용 행태(50세 이상)	○	○	○	○	○	○	○	○
주관적 틀니 필요 인지율(50세 이상)	-	-	-	○	-	○	-	○
어제 아침식사 후 칫솔질 실천율	-	-	-	-	-	-	○	○
어제 점심식사 후 칫솔질 실천율	-	○	○	○	○	○	○	○
어제 저녁식사 후 칫솔질 실천율	-	-	-	-	-	-	○	○
어제 잠자기 전 칫솔질 실천율	-	-	-	-	-	-	○	○
연간 구강검진 수진율	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 스케일링 경험률	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 치과진료 미치료율	○	○	-	○	○	○	○	○
치과진료 미치료자의 미치료 이유 ¹²⁾	○	○	-	○	○	○	○	○
주관적 잇몸 건강 인지율	-	-	-	○	-	○	-	○
총계	7	8	6	10	8	10	11	13

8. 정신건강

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
하루 평균 수면시간	○	○	○	○	○	○	○	○
스트레스 인지율 ¹³⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
스트레스로 인한 정신상담률	-	○	○	○	○	○	○	○
우울감 경험률	○	○	○	○	○	○	○	○
우울증상으로 인한 정신상담률	-	○	○	○	○	○	○	○
총계	3	5	5	5	5	5	5	5

9. 예방접종 및 검진

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
연간 인플루엔자 예방접종률	○	○	○	○	○	○	○	○
건강검진 수진율	○	○	○	-	○	-	○	○
암 검진율	○	○	○	-	○	-	○	○
총계	3	3	3	1	3	1	3	3

12) '14년 지표명: 치과진료 미치료자의 미치료 이유

13) '08년 지표명: 주관적 스트레스 인지율

10. 이환

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
[이환]								
만성·급성질환 및 사고중독 경험률 ¹⁴⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
만성·급성질환 및 사고중독 경험일수 ¹⁵⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
[고혈압]								
고혈압 평생 의사진단 경험률 ¹⁶⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
고혈압 현재치료율	○	○	○	○	○	○	○	○
고혈압 약물치료율 ¹⁷⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
고혈압 관리교육 이수율	○	○	○	○	○	○	○	○
고혈압 관리교육 장소	○	○	○	○	○	○	○	○
[당뇨병]								
당뇨병 평생 의사진단 경험률 ¹⁸⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 현재치료율	○	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 치료율 ¹⁹⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 약물치료 방법	○	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 관리교육 이수율	○	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 관리교육 장소	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 당뇨병 안질환합병증검사(안저검사) 수진율	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 당뇨병 신장합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율	○	○	○	○	○	○	○	○
당화혈색소 인지율	-	-	-	-	-	-	○	○
당화혈색소 검사 횟수	-	-	-	-	-	-	○	○
[이상지질혈증(고지혈증 포함)]								
이상지질혈증(고지혈증 포함) 평생 의사진단 경험률 ²⁰⁾	-	-	-	○	○	○	○	○
이상지질혈증(고지혈증 포함) 현재치료율	-	-	-	○	○	○	○	○
이상지질혈증(고지혈증 포함) 약물치료율	-	-	-	○	○	○	○	○
총 콜레스테롤 인지율	-	-	-	○	-	○	○	○

14) '08-'10년 영역: 활동제한 및 삶의 질

15) '08-'10년 영역: 활동제한 및 삶의 질

16) '08년 지표명: 고혈압 평생 의사진단 유병률

17) '08년 지표명: 혈압조절약의 정기적 복용률

18) '08년 지표명: 당뇨병 평생 의사진단 유병률

19) '08년 지표명: 당뇨병 관리형태(혈당관리방법)

20) '08년 지표명: 고지혈증 평생 의사진단 유병률, '09-'10년 지표명: 고지혈증 평생 의사진단 경험률

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
[관절염]								
관절염 평생 의사진단 경험률 ²¹⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
관절염 현재치료를	○	○	○	○	○	○	○	○
관절염 관리교육 이수율	○	○	○	○	○	○	○	○
관절염 관리교육 장소	○	○	○	○	○	○	○	○
[천식]								
천식 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○
천식 현재치료를	○	○	○	○	○	○	-	○
[알레르기비염]								
알레르기비염 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○
알레르기비염 현재치료를	○	○	○	○	○	○	-	○
[아토피피부염]								
아토피피부염 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○
아토피피부염 현재치료를	○	○	○	○	○	○	-	○
총계	25	25	25	29	28	29	25	31

11. 의료이용

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
연간 필요의료서비스 미치료율 ²²⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
필요의료서비스 미치료 이유	-	-	-	○	○	○	○	○
총계	1	1	1	2	2	2	2	2

21) '08년 지표명: 골관절염 평생 의사진단 유병률

22) '10년 치과포함 미치료율

12. 사고 및 중독

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
연간 사고중독 경험률 ²³⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 사고중독 건수율 ²⁴⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 낙상 경험률	-	-	-	○	-	○	-	○
연간 낙상 건수율	-	-	-	○	-	○	-	○
연간 낙상 치료 경험률	-	-	-	-	-	-	-	○
낙상에 대한 두려움	-	-	-	○	-	○	-	○
총계	2	2	2	5	2	5	2	6

13. 활동제한 및 삶의 질

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
양호한 주관적 건강수준 인지율 ²⁵⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
삶의 질 지수(EQ-5D Index)	○	○	○	○	○	○	○	○
월간 침상와병 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○
월간 침상와병 일수	○	○	○	○	○	○	-	○
월간 결근결석 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○
월간 결근결석 일수	○	○	○	○	○	○	-	○
행복감 지수	-	-	-	○	-	○	-	○
총계	6	6	6	7	6	7	2	7

14. 보건기관 이용

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
연간 보건기관 이용률	-	○	○	○	○	○	○	○
총계	-	1	1	1	1	1	1	1

23) '08년 지표명: 사고중독 발생률

24) '08년 지표명: 연간 사고중독발생 건수율

25) '09-'11년 지표명: 주관적 건강수준 인지율

15. 사회 물리적 환경

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
지역의 사회물리적 환경에 대한 긍정적 태도율	-	-	-	○	-	○	-	○
사회적 연결망(친척, 이웃, 친구)	-	-	-	○	-	○	-	○
사회활동 참여율	-	-	-	○	-	○	-	○
총계	-	-	-	3	-	3	-	3

16. 개인위생

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
손 씻기 감염병 예방 인지율	-	-	-	-	-	○	-	○
식사 전 손 씻기 실천율	-	-	-	-	-	○	-	○
화장실 다녀온 후 손 씻기 실천율	-	-	-	-	-	○	-	○
외출 후 손 씻기 실천율	-	-	-	-	-	○	-	○
비누, 손 세정제 사용률	-	-	-	-	-	○	-	○
연간 손 씻기 교육 및 홍보 경험률	-	-	-	-	-	○	-	○
총계	-	-	-	-	-	6	-	6

17. 가구조사

산출지표 \ 년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
식품 안정성 확보율 ²⁶⁾	○	○	○	○	○	○	○	○
치매환자 동거가구율	-	-	-	○	○	○	○	○
다문화 가구율	-	-	-	-	-	-	-	○
총계	1	1	1	2	2	2	2	3

26) '09-'13년 영역: 개인조사 「식생활」

참여연구진

총괄책임교수	박노례	인제대학교
지역책임교수	이중정	계명대학교
지역부책임교수	정인성	계명대학교
지역담당연구원	최영철	계명대학교
지역담당연구보조원	최정예	계명대학교
	최정인	계명대학교
	김미정	계명대학교
조사관리담당관	박은경	울주군보건소
지역조사원	김미자	울주군보건소
	박현주	울주군보건소
	이원주	울주군보건소
	이채빈	울주군보건소

2015년 울산광역시 울주군 지역사회 건강통계

발 행 : 2016. 3.

발 행 인 : 신 장 열 (울산광역시 울주군수)

편 집 인 : 이 중 정 (계명대학교)

발 행 처 : 기 관 명 울산광역시 울주군보건소

홈페이지 <http://health.ulju.ulsan.kr/main/main.asp>

주 소 (689-812) 울산광역시 울주군 삼남면 서향교1길 67-12

전화번호 (052) 229-8048

팩 스 (052) 229-8049

이 책은 울산광역시 울주군보건소에 소유권이 있습니다. 울산광역시 울주군보건소
승인 없이 상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.