

발 간 등 록 번 호

11-1352477-000174-10

ISSN 2092-2876
통계승인번호 제 117075호

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

지역사회 건강통계

울산광역시 울주군



Community Health Survey



발간사



금번에 발간하는 지역사회건강조사 결과는 질병관리본부에서 전 국민을 대상으로 시·군·구별 900여 명의 표본을 추출하여 현재의 건강행태를 조사 발표한 것으로써 건강한 미래를 설계하기 위한 중요한 기초자료로 활용됩니다. 그런 의미에서 2017년 울주군 건강통계집을 발간하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.

의료기술 발달과 안정적인 의식주가 보장되면서, 평균 수명 증가와 출산을 저조로 몇 년 후에는 우리나라도 노인인구가 총인구의 20% 이상인 초고령 사회로 진입하게 됩니다. 건강하고 행복한 생활을 위해서는 개인 스스로가 건강을 관리하는 것이 무엇보다 중요합니다.

조사된 통계자료를 기반으로 우리지역의 건강수준, 위험요인, 주요 만성질환 관리 특성 등을 파악하여 맞춤형 보건사업을 계획하고 시행, 평가하여 예방중심 건강증진사업을 확대 추진함으로써 여러분의 건강을 위한 파트너로서 끊임없이 노력하고 정진해 나가겠음을 약속드립니다.

지역사회 건강조사에 적극 참여해 주신 군민 여러분들과 건강조사를 위해 노고를 아끼지 않으신 조사원, 이장님 등과 책임 대학교인 계명대학교 이중정 교수님을 비롯한 관계자 여러분들께 진심으로 감사를 드립니다.

아무쪼록 이 책자를 접하시는 모든 분들의 가정과 직장에 건강과 행복이 충만하시길 기원드리며 발간사에 갈음합니다.

감사합니다.

2018. 3.

울산광역시 울주군보건소장 최 우 영

발간에 즈음하여

● ● ● ●
Community
Health
Survey

지역건강을 위한 지역사회건강조사가 2008년을 시작으로 2017년까지 어느덧 열 번째 조사가 완료되었습니다. 2017년에도 울산광역시 울주군 주민들의 건강 조사결과 통계집을 발간하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다.

지역사회건강조사가 매년 어렵고 힘든 문제를 당면하고 해결해 나가면서 조사의 질적인 부분에서 해를 거듭할수록 성장해 나가는 것 같습니다.

그동안 모아진 지역사회건강조사 자료들은 우리지역의 각종 보건지표를 생산하며 지역사회 주민들의 건강행태 파악 및 우리지역 보건문제의 파악과 우선 문제가 무엇인지를 도출해내는데 활용이 되어 왔습니다.

아울러 조사의 결과를 바탕으로 하여 우리 지역의 특성을 고려한 한 단계 발전된 구체적이며 체계적인 보건 문제 개선의 방향 및 계획을 선정하여, 이를 실천하기 위해 다 같이 고민하고 노력할 수 있는 기반이 되었으면 합니다.

또한 지역사회건강조사 결과가 주민들에게 더욱 홍보되어 건강에 대한 지역사회의 관심을 고취시켜 울주군이 더욱 건강하고 행복한 지역사회가 되기 위한 초석이 되기를 바랍니다.

소중한 자료의 수집을 위하여 여러 어려움에도 불구하고, 묵묵히 성공적인 조사를 함께 수행한 울산 울주군 조사원 여러분과 조사에 성실히 참여해 주신 울주군 구민 여러분께 진심 어린 감사를 드립니다.

그리고 어려운 조사에 격려를 아끼지 않으시고 아낌없는 행정적인 지원을 해주신 울주군 보건소장님 이하 사업 담당자 여러분들께 깊은 감사를 드립니다. 마지막으로 통계집이 나올 수 있도록 애써주신 계명대학교 연구진들께도 감사드립니다.



2018. 3.

계명대학교 의과대학 책임교수 이 중 정

이용자를 위하여

- ❖ 본 통계집은 2017. 8. 16. - 2017. 10. 31. 울산광역시 울주군에서 실시된 지역사회건강조사 결과를 수록한 자료입니다.
- ❖ 본 통계집에 제시된 추정치는 가중치를 적용한 결과(조율)이며, 가중치는 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율, 개인응답률, 당해 연도 모집단 성·연령별 인구 구성비를 반영하여 산출하였습니다.
- ❖ 2부 주요통계결과에서 2013-2017년 비교 가능한 지표(표준화율)에 대해서 당해 연도의 전체·성·연령별 그래프와 함께 울주군 및 울산광역시의 연도별 추이 그래프를 제시하였으며, 증감 현황을 기술하였습니다. 지표정의가 변경된 경우 변경내용을 각주로 표시하였으며, 해당 연도 통계치는 연도별 추이 그래프에서 제외하였습니다. 조사문항 변경내용은 제4부 부록 <2008-2017 산출지표>에서 확인하실 수 있습니다.
- ❖ 제3부 통계표에서는 당해 연도에 선정된 주요지표의 상세분석결과를 제시하였으며, 주요지표를 포함한 모든 산출지표의 통계표는 엑셀파일 형태로 지역사회건강조사 홈페이지(<http://chs.cdc.go.kr>) 자료실에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
- ❖ 본 자료 중 2008-2016년 수치는 응답의 이상치와 논리적 오류를 수정하여 산출된 결과로 기 발간된 보고서의 수치와 일부 다를 수 있습니다.
- ❖ 분석대상자 수(N)가 20명 미만인 경우 제2부 주요통계결과에서 제시하지 않았으며 제3부 통계표에서 해당 값을 하이픈(-)으로 처리하였습니다. 변동계수(또는 상대표준오차, Coefficient of Variation, CV)가 30%이상인 경우 추정치의 신뢰도가 낮다는 것을 의미하므로, 변동계수가 30% 이상인 경우에 결과해석 시 주의를 바랍니다.
- ❖ 통계표에 수록된 숫자는 소수점 두 번째 자리에서 반올림되었으며, 반올림된 수치의 총계가 일치하지 않을 수 있으나 이는 통계표의 오류가 아닙니다.
- ❖ 본 통계집 및 조사표, 지침서 등 기타 지역사회건강조사 관련 자료는 지역사회건강조사 홈페이지 「자료실」에서 다운로드 받으실 수 있으며, 2008년부터 2016년까지의 지역사회건강조사 원시자료는 홈페이지를 통한 신청 및 승인절차를 통해 제공하고 있습니다.
- ❖ 수록된 자료 및 지역사회건강조사에 관한 문의는 울주군보건소(☎052-204-2711), 계명대학교 (☎053-580-3896)로 해주시기 바랍니다.

용어정의

1 통계

 지역사회건강조사
Community Health Survey

① 모집단(Population)

조사대상이 되는 집단 전체

② 표본(Sample)

모집단 중 조사를 위해 추출된 일부 집단

③ 표본오차(Sampling Error)

모집단 중 일부를 표본으로 선정하여 조사함에 따라 발생하는 오차로서 표본조사의 정확성을 나타내는 척도

④ 비표본오차(Non-Sampling Error)

표본추출을 제외한 조사 설계, 조사 수행, 자료 집계 및 분석 과정에서 발생하는 오차로서 불명확한 조사개념, 조사문항의 객관성 결여, 조사지 구성의 논리적 오류, 면접방법, 조사원의 자질, 조사원을 감독하는 관리자의 태도, 조사대상자의 무응답, 자료 코딩 등이 비표본오차의 주요 발생 원인에 해당

⑤ 조율(Crude Rate)

총 발생건수를 전체 모집단으로 나눈 값으로, 모집단의 성·연령별 등의 인구 집단 특성을 보정하지 않은 통계치

⑥ 표준화율(Standardized Rate)

비교하고자 하는 집단 간 인구 구조 차이를 보정한 통계치

⑦ 표준오차 (Standard Error, SE)

각 표본들의 평균이 모집단의 평균과 얼마만큼의 차이가 있는지 나타내는 값

⑧ 변동계수 (Coefficient of Variation, CV)

표준오차를 평균으로 나눈 값(표준오차/추정치×100)으로 통계치의 신뢰도를 나타내는 척도이며, 변동계수와 통계치의 신뢰도는 반비례 관계

⑨ 가중치 (Weight)

전체집단에서 개별 구성요소가 차지하는 비중이나 중요도를 수치로 나타내는 값

2 조사

 지역사회건강조사
Community Health Survey

① CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

컴퓨터를 이용하여 조사 자료를 수집하는 방식으로, 조사원이 전자조사표가 설치된 노트북으로 면접조사를 수행 시, 조사현장에서 직접 자료입력, 수정, 저장 및 전송 가능

② 순환조사체계

타당도, 활용성 및 수행 가능성을 고려하여 조사항목의 조사주기를 1년, 2년, 4년으로 구분하여 조사하는 체계

③ 지역보건지표뱅크

지역사회에서 보건사업 추진 시 활용 가능한 조사문항 및 산출지표를 수집·정리한 것으로 지표별 조사문항 및 응답보기, 지표정의, 산출식, 조사주기 등 상세정보 포함

목차

발간사	
발간에 즈음하여	
이용자를 위하여	
용어정의	
2017년 울주군 주요 건강지표 요약	2
우리 지역사회의 주요 건강이슈	4

제1부 조사체계

I. 조사개요	9
1. 조사목적	10
2. 조사방법	10
3. 조사내용	10
4. 표본설계	12
5. 조사체계	12
6. 자료관리	13
7. 조사현황	14
II. 통계 추정방법	17
1. 가중치의 사용	18
2. 자료처리	19
3. 분산추정	20

제2부 주요통계결과

I. 건강행태	23
1. 흡연	24
2. 음주	34
3. 안전의식	36
4. 운동 및 신체활동	38
5. 식생활	42
6. 비만 및 체중조절	46
7. 구강건강	48
8. 정신건강	54
II. 예방접종 및 검진	59
1. 예방접종	60
2. 검진	60
III. 이환 및 의료이용	63
1. 만성·급성질환 및 사고중독 경험률	64
2. 주요 질환별 평생 의사진단 경험률 및 관리행태	66
3. 의료이용	80
IV. 사고 및 중독(낙상)	83
1. 연간 사고 및 중독 경험률	84
2. 연간 낙상 경험률	84



목차

Community Health Survey

V. 활동제한 및 삶의 질 87

1. 양호한 주관적 건강수준 인지율 88

VI. 보건기관 이용 91

1. 연간 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매) 홍보 및 교육 경험률 92

VII. 사회 물리적 환경 95

1. 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도를 96 2. 사회적 연결망 98

VIII. 심폐소생술 101

1. 심폐소생술 인지율 102 2. 심폐소생술 교육 경험률 102

IX. 개인위생 105

1. 손 씻기 감염병 예방 인지율 106 2. 손 씻기 실천율 108 3. 비누, 손 세정제 사용률 110 4. 연간 손 씻기 교육 및 홍보 경험률 110

제3부 통계표

I. 통계표 115

제4부 부록

I. 개인조사표 192

II. 가구조사표 228

III. 지표정의 232

IV. 2008-2017 산출지표 264

참여연구진 273

목차

〈표목차〉

〈표 1〉 2017년 지역사회건강조사	
주요지표 결과	2
〈표 2〉 2017년 전국공통 조사항목	11
〈표 3〉 2017년 울산광역시 지역선택	
조사항목	11
〈표 4〉 동/읍·면별 표본지점 분포	12
〈표 5〉 조사현황	14
〈표 6〉 가구당 조사인원 수	14
〈표 7〉 2017년 지역사회건강조사	
조사대상 가구특성	15
〈표 8〉 2017년 지역사회건강조사	
조사대상 인구특성	16
〈표 9〉 가구가중치 산출 예	18
〈표 10〉 개인가중치 산출 예	19
〈표 11〉 보정가중치 산출 예	19
〈표 12〉 교육수준분류	19
〈표 13〉 직업분류	20



〈그림목차〉

〈그림 1〉 2017 주요지표 결과 비교 - 긍정적 지표	5	〈그림 25〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)	37
〈그림 2〉 2017 주요지표 결과 비교 - 부정적 지표	5	〈그림 26〉 격렬한 신체활동 실천율	39
〈그림 3〉 표본선정과정	12	〈그림 27〉 중등도 신체활동 실천율	39
〈그림 4〉 수행체계	13	〈그림 28〉 중등도 이상 신체활동 실천율	39
〈그림 5〉 수행과정	13	〈그림 29〉 걷기 실천율	41
〈그림 6〉 전화점검 절차	13	〈그림 30〉 지역사회 내 운동시설 접근율	41
〈그림 7〉 가중치 산출 과정	18	〈그림 31〉 연간 지역사회 내 운동 프로그램 참여율	41
〈그림 8〉 흡연시작연령	25	〈그림 32〉 저염선택율	43
〈그림 9〉 현재흡연율	25	〈그림 33〉 저염선택율(연도비교)	43
〈그림 10〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량	25	〈그림 34〉 영양표시 활용률	43
〈그림 11〉 현재흡연자의 금연시도율	27	〈그림 35〉 저염식 실천 노력 경험률	45
〈그림 12〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률	27	〈그림 36〉 연간 영양교육 및 상담수혜율	45
〈그림 13〉 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률	29	〈그림 37〉 비만을	47
〈그림 14〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률	29	〈그림 38〉 주관적 비만인지를	47
〈그림 15〉 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률	31	〈그림 39〉 연간 체중조절 시도율	47
〈그림 16〉 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률	31	〈그림 40〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	49
〈그림 17〉 연간 금연 시도 횟수	33	〈그림 41〉 저작불편호소율(65세 이상)	49
〈그림 18〉 효과적인 금연 프로그램	33	〈그림 42〉 틀니 이용 행태(50세 이상)	49
〈그림 19〉 금연정책 강화 필요 영역	33	〈그림 43〉 치실실천율	51
〈그림 20〉 음주시작연령	35	〈그림 44〉 연간 구강검진 수진율	51
〈그림 21〉 월간음주율	35	〈그림 45〉 연간 스케일링 경험률	53
〈그림 22〉 연간음주자의 고위험음주율	35	〈그림 46〉 치실 및 치간솔 사용률	53
〈그림 23〉 운전자석 안전벨트 착용률	37	〈그림 47〉 연간 치과병의원 이용률	53
〈그림 24〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	37	〈그림 48〉 스트레스 인지율	55
		〈그림 49〉 우울감 경험률	55
		〈그림 50〉 자살생각률	55
		〈그림 51〉 인터넷, 게임(오락), 스마트폰 일상생활 지장 경험 빈도	57

목차

〈그림목차〉

〈그림 52〉 도박으로 인한 일상생활 지장 경험률 57	〈그림 77〉 연간 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매) 홍보 및 교육 경험률 93
〈그림 53〉 연간 인플루엔자 예방접종률 61	〈그림 78〉 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도를 97
〈그림 54〉 건강검진 수진율 61	〈그림 79〉 사회적 연결망(친척) 99
〈그림 55〉 암 검진율 61	〈그림 80〉 사회적 연결망(이웃) 99
〈그림 56〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률 65	〈그림 81〉 사회적 연결망(친구) 99
〈그림 57〉 고혈압 진단 경험률(≥30) 67	〈그림 82〉 심폐소생술 인지율 103
〈그림 58〉 고혈압 진단 경험자의 치료율 (≥30) 67	〈그림 83〉 심폐소생술 교육 경험률 103
〈그림 59〉 고혈압 관리교육 이수율(≥30) 69	〈그림 84〉 손 씻기 감염병 예방 인지율 107
〈그림 60〉 혈당수치 인지율 69	〈그림 85〉 식사 전 손 씻기 실천율 109
〈그림 61〉 당뇨병 진단 경험률(≥30) 71	〈그림 86〉 화장실 다녀온 후 손 씻기 실천율 109
〈그림 62〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율 (≥30) 71	〈그림 87〉 외출 후 손 씻기 실천율 109
〈그림 63〉 당뇨병 관리교육 이수율(≥30) 71	〈그림 88〉 비누, 손 세정제 사용률 111
〈그림 64〉 연간 당뇨병 안정한 합병증 검사 수진율(≥30) 73	〈그림 89〉 연간 손 씻기 교육 및 홍보 경험률 111
〈그림 65〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사 수진율(≥30) 73	
〈그림 66〉 혈당수치 인지율 73	
〈그림 67〉 관절염 진단 경험률(≥50) 75	
〈그림 68〉 관절염 관리교육 이수율(≥50) 75	
〈그림 69〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 77	
〈그림 70〉 심근경색증 조기증상 인지율 77	
〈그림 71〉 연간 평균 혈압 측정횟수 79	
〈그림 72〉 연간 평균 혈당 측정횟수 79	
〈그림 73〉 연간 필요의료서비스 미치료를 81	
〈그림 74〉 연간 사고 및 중독 경험률 85	
〈그림 75〉 연간 낙상 경험률 85	
〈그림 76〉 양호한 주관적 건강수준 인지율 89	



〈통계표목차〉

〈표 1〉 흡연시작연령	116	〈표 27〉 저염식 실천 노력 경험률	142
〈표 2〉 현재흡연을	117	〈표 28〉 연간 영양교육 및 상담수혜율	143
〈표 3〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량	118	〈표 29〉 비만도 분포 및 비만율	144
〈표 4〉 현재흡연자의 금연시도율	119	〈표 30〉 주관적 비만인지를	145
〈표 5〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률	120	〈표 31〉 연간 체중조절 시도율	146
〈표 6〉 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률	121	〈표 32〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	147
〈표 7〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률	122	〈표 33〉 저작불편호소율 : 65세 이상	148
〈표 8〉 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률	123	〈표 34〉 틀니 이용 행태 : 50세 이상	149
〈표 9〉 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률	124	〈표 35〉 치솔질 실천율	150
〈표 10〉 연간 금연 시도 횟수	125	〈표 36〉 연간 구강검진 수진율	151
〈표 11〉 효과적인 금연 프로그램	126	〈표 37〉 연간 스케일링 경험률	152
〈표 12〉 금연정책 강화 필요 영역	127	〈표 38〉 치실 및 치간솔 사용률	153
〈표 13〉 음주시작연령	128	〈표 39〉 연간 치과병의원 이용률	154
〈표 14〉 월간음주율	129	〈표 40〉 스트레스 인지율	155
〈표 15〉 연간음주자의 고위험음주율	130	〈표 41〉 우울감 경험률	156
〈표 16〉 운전자석 안전벨트 착용률	131	〈표 42〉 자살생각률	157
〈표 17〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	132	〈표 43〉 인터넷, 게임(오락), 스마트폰 일상생활 지장 경험 빈도	158
〈표 18〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)	133	〈표 44〉 도박으로 인한 일상생활 지장 경험률	159
〈표 19〉 격렬한 신체활동 실천율	134	〈표 45〉 연간 인플루엔자 예방접종률	160
〈표 20〉 중등도 신체활동 실천율	135	〈표 46〉 건강검진 수진율	161
〈표 21〉 중등도 이상 신체활동 실천율	136	〈표 47〉 암 검진율	162
〈표 22〉 걷기 실천율	137	〈표 48〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률	163
〈표 23〉 지역사회 내 운동시설 접근율	138	〈표 49〉 고혈압 진단 경험률	164
〈표 24〉 연간 지역사회 내 운동프로그램 참여율	139	〈표 50〉 고혈압 진단 경험자의 치료율	164
〈표 25〉 저염선호율	140	〈표 51〉 고혈압 관리교육 장소 및 고혈압 관리교육 이수율	165
〈표 26〉 영양표시 활용률	141	〈표 52〉 혈압수치 인지율	166
		〈표 53〉 당뇨병 진단 경험률	167

목차

〈통계표목차〉

〈표 54〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율	167
〈표 55〉 당뇨병 관리교육 장소 및 당뇨병 관리교육 이수율	168
〈표 56〉 연간 당뇨병성 안질환 합병증 검사 수진율 및 연간 당뇨병성 신장질환 합병증 검사 수진율	169
〈표 57〉 혈당수치 인지율	170
〈표 58〉 관절염 진단 경험률	171
〈표 59〉 관절염 관리교육 장소 및 관절염 관리교육 이수율	171
〈표 60〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	172
〈표 61〉 심근경색증 조기증상 인지율	173
〈표 62〉 연간 평균 혈압 및 혈당 측정 횟수	174
〈표 63〉 연간 필요의료서비스 미치료율	175
〈표 64〉 연간 사고 및 중독 경험률	176
〈표 65〉 연간 낙상 경험률	177
〈표 66〉 양호한 주관적 건강수준 인지율	178
〈표 67〉 연간 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매) 홍보 및 교육 경험률	179
〈표 68〉 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율	180
〈표 69〉 사회적 연결망(친척)	181
〈표 70〉 사회적 연결망(이웃)	182
〈표 71〉 사회적 연결망(친구)	183
〈표 72〉 심폐소생술 인지율	184
〈표 73〉 심폐소생술 교육 경험률	185
〈표 74〉 손 씻기 감염병 예방 인지율	186
〈표 75〉 손 씻기 실천율	187
〈표 76〉 비누, 손 세정제 사용률	188
〈표 77〉 연간 손 씻기 교육 및 홍보 경험률	189

요약



CHS

2017년 울주군 주요 건강지표 요약

2017년 울산광역시 울주군 지역사회건강조사 주요지표 추이 및 울산광역시와 전국 보건소중위수(2사분위수)와 비교한 결과는 <표 1>과 같다.

<표 1> 2017년 지역사회건강조사 주요지표 결과

(단위 : %, 조율(표준오차))

분류	영역	산출지표	지역사회건강조사				울산	전국
			2014	2015	2016	2017		
I. 건강행태	흡연	현재흡연율	22.2(1.4)	23.0(1.4)	21.9(1.7)	21.8(1.4)	20.9(0.6)	20.1
		남자 현재흡연율	41.5(2.8)	41.6(2.3)	39.9(3.1)	39.9(2.1)	37.6(1.1)	37.6
		현재흡연자의 금연시도율	15.1(3.1)	30.8(3.3)	28.8(3.9)	32.7(3.7)	31.8(1.6)	26.0
		현재흡연자의 1개월 내 금연계획률	4.2(1.6)	5.2(1.7)	7.6(1.9)	7.5(2.0)	8.6(1.1)	6.1
		현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률	5.7(0.9)	5.9(0.8)	4.6(1.3)	2.8(0.8)	3.2(0.4)	3.5
		현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률	33.7(2.3)	23.8(2.4)	19.9(2.4)	19.4(2.2)	20.9(0.9)	15.7
	음주	월간음주율	57.9(1.8)	56.5(1.6)	58.5(2.3)	59.1(1.9)	62.2(0.8)	57.3
		연간음주자의 고위험음주율	20.2(1.6)	20.2(1.6)	21.9(1.9)	23.7(1.9)	20.7(0.7)	19.6
	안전의식	운전자석 안전벨트 착용률	78.5(2.0)	77.5(1.9)	83.4(1.9)	92.9(1.0)	92.5(0.5)	86.2
		동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	70.7(2.1)	73.9(1.9)	75.6(1.6)	88.3(1.2)	86.4(0.6)	81.3
	신체활동	중등도 이상 신체활동 실천율	29.3(2.2)	23.8(1.6)	24.2(1.6)	21.9(1.7)	22.2(0.8)	21.6
		걷기 실천율	49.4(2.3)	52.8(2.3)	35.0(2.3)	41.5(1.8)	40.3(0.9)	39.5
	식생활	영양표시 활용률	89.8(2.4)	81.5(3.6)	81.1(3.0)	82.0(3.1)	82.6(1.1)	80.2
	비만 및 체중조절	비만율	23.5(1.5)	25.8(1.5)	26.8(1.8)	25.7(1.7)	26.9(0.7)	28.3
		주관적 비만인지율	36.7(1.7)	36.8(1.8)	37.6(1.6)	33.5(1.6)	39.5(0.8)	38.9
		연간 체중조절 시도율	52.5(1.8)	54.8(1.6)	53.7(2.1)	50.4(2.1)	67.5(0.7)	57.8
	구강건강	저작불편호소율(≥65)	46.3(4.0)	42.2(3.7)	48.8(3.5)	35.9(3.1)	36.3(2.0)	41.0
	정신건강	스트레스 인지율	27.3(1.9)	23.8(1.8)	27.0(1.7)	25.5(1.6)	23.3(0.6)	25.1
		우울감 경험률	4.8(0.8)	3.3(0.7)	5.2(0.8)	3.0(0.5)	4.4(0.3)	6.0
II. 예방접종 및 검진		연간 인플루엔자 예방접종률	33.5(1.9)	36.2(1.9)	35.5(1.9)	38.4(1.6)	41.5(0.9)	43.4
		건강검진 수진율	65.2(1.6)	64.8(2.0)	67.1(1.7)	72.2(1.8)	72.0(0.8)	70.9
		암 검진율	43.8(1.6)	49.7(2.0)	50.6(2.2)	63.2(1.9)	59.9(0.9)	59.5
III. 이환		고혈압 진단 경험률(≥30)	20.8(1.6)	22.7(1.7)	22.4(1.6)	21.1(1.8)	20.1(0.7)	26.2
		고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)	89.1(2.1)	83.0(3.0)	89.1(1.9)	88.8(2.3)	86.5(1.4)	90.5
		혈압수치 인지율	45.8(1.5)	—*****	43.0(2.3)	28.3(1.6)	48.5(0.9)	57.0
		당뇨병 진단 경험률(≥30)	9.6(1.0)	10.0(1.1)	9.7(1.0)	11.5(1.0)	8.6(0.5)	11.1
		당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30)	85.8(4.4)	85.7(4.2)	83.4(4.4)	89.3(3.3)	89.2(1.7)	89.4
		당뇨성 안질환 합병증검사 수진율(≥30)	30.0(5.2)	45.8(4.4)	28.1(4.5)	28.2(5.0)	32.7(2.5)	36.0

분류	영역	산출지표	지역사회건강조사				울산	전국
			2014	2015	2016	2017		
		당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)	36.0(5.2)	37.1(7.5)	35.1(5.5)	47.4(5.6)	34.8(2.6)	41.9
		혈당수치 인지율	11.7(1.3)	-*****	12.3(1.3)	9.8(0.9)	14.0(0.6)	18.6
		관절염 진단 경험률(≥50)	18.1(2.0)	12.7(1.3)	12.5(1.6)	12.1(1.3)	14.6(0.8)	21.8
IV. 의료이용		연간 필요의료서비스 미치료율	11.1(1.1)	6.0(0.9)	7.4(0.9)	5.7(1.0)	5.8(0.4)	10.3
V. 사고 및 중독(손상)		연간 사고 및 중독 경험률	2.8(0.5)	7.4(0.8)	7.9(1.0)	3.3(0.5)	5.9(0.4)	7.3
VI. 삶의 질		양호한 주관적 건강수준 인지율	42.0(2.0)	48.0(1.8)	45.3(2.1)	48.9(1.8)	44.2(0.8)	40.0

-***** : 조사 안함

우리 지역사회의 주요 건강이슈

1. 주요지표 비교분석

주요 지표에 대하여 울산광역시 울주군의 표준화율을 전국 보건소의 표준화율 중앙값과 비교하였다. <그림 1>과 <그림 2>는 각각 긍정적 지표와 부정적 지표에 대하여 울산 울주군과 전국의 결과를 비교한 차트이다. 긍정적 지표는 높은 값을 긍정적으로 해석할 수 있는 지표이며, 부정적 지표는 높은 값을 부정적으로 해석할 수 있는 지표이다. 각 지표의 전국 보건소 중앙값을 1로 환산하였을 때 울산광역시 울주군의 상대적인 지표값을 표시한 그래프이다.


가. 건강행태

- 흡연: 현재흡연율(1.01)은 전국 중앙값과 비슷하였으며, 현재흡연자의 금연시도율(1.19)은 전국보다 높았고 현재흡연자의 1개월 내 금연 계획률(0.90)은 전국보다 낮았다. 현재 비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률(0.75)은 전국 중앙값보다 낮았지만 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률(1.08)은 전국 중앙값보다 높았다.
- 음주: 월간음주율(0.97)은 전국 중앙값보다 낮았으나 연간음주자의 고위험음주율(1.19)은 전국 중앙값보다 높았다.
- 안전의식: 운전자석 안전벨트 착용률(1.05)과 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률(1.07) 모두 전국 중앙값보다 높았다.
- 운동 및 신체활동: 중등도 이상 신체활동 실천율(0.92)과 걷기 실천율(0.89) 모두 전국 중앙값보다 낮았다.


- 비만 및 체중조절: 비만율(0.96)과 주관적 비만 인지율(0.87), 연간 체중조절 시도율(0.82) 모두 전국 중앙값보다 낮았다.
- 구강건강: 65세 이상 인구의 저작불편호소율(0.94)은 전국 중앙값보다 낮았고, 어제 점심식사 후 치솔질 실천율(1.12)은 전국 중앙값보다 높았다.
- 정신건강: 스트레스 인지율(1.00)은 전국과 비슷하였으며, 우울감 경험률(0.49)은 전국 중앙값보다 낮았다.
- 연간 인플루엔자 예방접종률(0.96)은 전국 중앙값보다 낮았다.

나. 이환·의료이용, 사고·중독

- 이환·의료이용: 30세 이상 고혈압 진단 경험률(0.90)은 전국 중앙값보다 낮았고, 30세 이상 고혈압 진단 경험자의 치료율(1.00)은 전국 중앙값과 비슷하였다. 혈압수치 인지율(0.46)은 전국 중앙값보다 낮았다. 30세 이상 당뇨병 진단 경험률(1.15)은 전국 중앙값보다 높았고 30세 이상 당뇨병 진단 경험자의 치료율(1.00)은 전국 중앙값과 비슷하였다. 30세 이상 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사 수진율(0.65)과 혈당수치 인지율(0.45)은 전국 중앙값보다 낮았으나, 30세 이상 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사 수진율(1.03)은 전국 중앙값보다 높았다.
- 사고·중독: 연간 사고 및 중독 경험률(0.46)은 전국 중앙값보다 낮았다.



〈그림 1〉 2017 주요지표 결과 비교 - 긍정적 지표



〈그림 2〉 2017 주요지표 결과 비교 - 부정적 지표

제1부 조사체계

I. 조사개요

II. 통계 추정방법



CHS

제 1 부 조사체계



I. 조사개요

1. 조사목적
2. 조사방법
3. 조사내용
4. 표본설계
5. 조사체계
6. 자료관리
7. 조사현황

I. 조사개요

1. 조사목적

1995년 지방자치단체의 보건사업계획 수립을 의무화하는 지역보건법이 제정되었으나 시·군·구 단위의 대표성과 신뢰성 있는 통계가 부재한 상황이었다. 이에 질병관리본부에서는 지역보건법 제4조(지역사회 건강실태조사) 및 동법시행령 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)에 의거, 지역보건의료계획 수립 및 보건사업수행에 필요한 건강통계를 생산하기 위하여 2008년 이후 매년 시·군·구에서 지역사회건강조사를 수행하고 있다. 생산된 통계자료는 지역보건의료계획 수립 및 보건사업의 성과를 평가하는 자료로 활용되고 있다.

2. 조사방법

가. 조사대상

조사시점 표본가구에 거주하는 만 19세 이상 가구원(1998년 7월 31일 이전 출생자)

나. 조사시기

2017년 8월 16일 - 10월 31일

다. 조사방법

조사원이 표본가구를 방문하여 노트북에 탑재된 전자조사표를 이용해 조사대상자와 1:1 면접 조사하는 방법

3. 조사내용

지역사회건강조사에서는 2010년부터 4년 주기의 순환조사체계를 도입하여 지표의 중요도와 활용성, 표본의 크기 등을 고려하여 각각의 조사항목을 1년, 2년, 4년 주기로 구분하여 조사하고 있다.

2014년부터 제3기 순환조사가 시작되었으며, 전국의 모든 시·군·구에서 조사하는 전국공통문항 외에 각 시·도별로 지역선택문항을 선정하여 조사하였다.

가. 전국공통 조사항목

총 18개 영역, 총 203개 문항으로 구성된 전국 공통조사표는 가구원 대표 1인이 참여하는 가구 조사와 만 19세 이상 가구원이 참여하는 개인조사로 구성하였다.

개인조사 영역에는 건강행태(흡연, 음주, 안전의식, 운동 및 신체활동, 식생활, 비만 및 체중조절, 구강건강, 정신건강), 예방접종 및 검진, 이환, 의료이용, 사고 및 중독(낙상), 활동제한 및 삶의 질, 보건기관 이용, 사회 물리적 환경, 개인위생, 교육 및 경제 활동이 포함되었다.

〈표 2〉 2017년 전국공통 조사항목

영역	조사항목
가구조사	세대유형, 기초생활수급자 여부, 가구 월간소득, 치매환자 동거여부, 가구 식생활 형편
흡연	평생흡연, 현재흡연, 흡연시작연령, 금연기간, 금연시도, 금연계획, 간접흡연, 금연캠페인, 금연교육, 금연구역 인지, 전자담배 사용 등
음주	평생음주, 음주시작연령, 음주빈도, 음주량, 음주폐해, 절주 및 금주시도
안전의식	자동차 안전벨트 착용, 음주운전(자동차, 오토바이, 자전거), 음주운전차량 동승경험 등
운동 및 신체활동	격렬한 신체활동, 중등도 신체활동, 걷기, 근력운동, 유연성운동, 주중/주말 앉아서 보내는 시간
식생활	아침식사, 소금섭취 수준, 영양표시 인지·해독·활용
비만 및 체중조절	본인인지체형, 체중조절 경험, 키, 몸무게
구강건강	주관적 구강건강, 저작불편, 틀니이용, 치솔질, 치과진료, 구강검진, 스케일링 등
정신건강	수면시간, 스트레스 및 우울감, 정신상담, 자살생각, 자살시도, 주요 우울장애 경험 등
예방접종 및 검진	인플루엔자 예방접종 경험 및 횟수, 시기, 장소, 건강검진 및 암 검진
이환	만성·급성질환 및 사고중독 경험, 만성질환별(고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 관절염, 뇌졸중, 심근경색증, 백내장) 이환
의료이용	의료서비스 미수진 경험, 미수진 이유
사고 및 중독(낙상)	사고중독 경험 및 건수, 낙상 경험 및 치료 경험 등
활동제한 및 삶의 질	주관적 건강수준, 주관적 행복감, 외병 경험, 결근결석 경험, 삶의 질 지수
보건기관 이용	보건기관 이용
사회 물리적 환경	사회 물리적 환경, 사회적 연결망(친척, 이웃, 친구), 사회활동, 광역 시·도 및 시·군·구 거주기간
개인위생	손 씻기 감염병 예방인지, 식사 전/화장실 다녀온 후/외출 후 손 씻기 여부, 비누 혹은 세정제 사용 여부, 올바른 손 씻기 교육 및 홍보 경험
교육 및 경제활동	직업, 학력, 혼인상태

나. 지역선택 조사항목

〈표 3〉 2017년 울산광역시 지역선택 조사항목

영역	조사항목
흡연	연간 금연시도 횟수, 효과적인 금연 프로그램, 금연정책 강화 필요 영역
운동 및 신체활동	지역사회 내 운동시설 접근율, 연간 지역사회 내 운동프로그램 참여율, 월간 규칙적 운동실천율
식생활	저염식 실천 노력 경험률, 연간 영양교육 및 상담수혜율
구강건강	치실 및 치간솔 사용률, 연간 치과병의원 이용률
정신건강	우울감 원인, 도박으로 인한 일상생활 지장 경험률, 정신건강증진센터 인지율
예방접종 및 검진	암 검진 미수검 이유
이환	연간 평균 혈압 측정횟수, 연간 평균 혈당 측정횟수
보건기관 이용	연간 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매) 홍보 및 교육 경험률
심정지	심폐소생술 인지율, 심폐소생술 교육 경험률

4. 표본설계

가. 모집단

(1) 목표 모집단은 2017년 4월 기준으로 시·군·구에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.

(2) 조사 모집단은 시·군·구의 동/읍·면 내 통·반/리의 표본지점을 1차 추출단위로 하며, 선정된 통·반/리의 표본지점 내 주거용 주택(아파트, 일반주택)에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.


나. 표본추출

(1) 1차 추출(표본지점)

통·반/리 내 주택유형별 가구 수를 기준으로 주민등록인구자료와 주택자료를 연계하여 작성된 표본추출틀에서 각 동/읍·면 별로 할당된 표본지점을 추출하는데, 이때 통·반/리를 명칭기준으로 정렬한 후 가구 수 크기를 고려하여 추출확률이 비례하도록 추출하였다.

(2) 2차 추출(표본가구)

표본가구는 표본지점으로 선정된 통·반/리의 가구 수를 파악하여 계통추출법으로 선정하였다. 이 때 통·반/리의 규모가 커서 2개 이상의 표본지점이 할당된 경우 표본오차를 최소화하기 위해 표본가구가 가능한 고르게 분포하도록 하였다. 최종적으로 표본지점별로 평균 5개 가구를 표본가구로 선정하였다.



〈그림 3〉 표본선정과정

〈표 4〉 동/읍·면별 표본지점 분포


동/읍·면	전체 가구 수			표본지점 수		
	일반	아파트	합계	일반	아파트	합계
읍·면지역	36,650	41,844	78,494	46	40	86
두동면	1,552	1	1,553	3	0	3
두서면	1,416	-	1,416	2	0	2
범서읍	3,789	19,300	23,089	4	17	21
삼남면	3,529	4,113	7,642	4	5	9
삼동면	790	-	790	2	0	2
상북면	2,325	1,078	3,403	3	1	4
서생면	3,303	339	3,642	5	0	5
언양읍	4,653	4,793	9,446	5	5	10
온산읍	6,378	2,402	8,780	7	3	10
온양읍	4,169	5,051	9,220	5	5	10
웅촌면	2,047	1,210	3,257	3	1	4
청량면	2,699	3,557	6,256	3	3	6
합계	36,650	41,844	78,494	46	40	86

5. 조사체계

가. 수행체계

질병관리본부는 지역사회건강조사 사업계획을 수립하여 시·도에 배포하고, 표본설계, 조사문항 및 지침표준화, 교육 및 홍보물 개발 등의 사업수행과 관련한 기술지원을 하였다. 사업 관련 주요 현안에 대한 검토 및 심의는 시·도 및 책임대학교 위원회, 전문분과위원회로 구성된 운영위원회를 통해 이루어졌다.


시·도는 권역대표대학교를 지정하여 지역사회건강조사 수행을 위한 지역 거점센터를 운영하고, 중앙정부로부터 사업예산을 받아 시·군·구 보건소로 배정하는 역할을 담당하여 수행하였다. 시·군·구 보건소는 책임대학교와 협약을 체결하고, 조사수행 관련한 행정지원을 하였다.



〈그림 4〉 수행체계

나. 수행과정

질병관리본부에서 설문지 개발 및 표본추출을 담당하였고, 책임대학교에서 조사원 교육을 실시하였다. 조사원은 가구선정통지서 발송 1-2주 후 표본가구를 방문하여 면접조사를 진행하여 조사자료를 중앙서버로 전송하였다. 이후 질병관리본부의 조사자료 확인 및 책임대학교의 자료분석 절차를 거쳐 통계집을 발간하였다.



〈그림 5〉 수행과정

6. 자료관리


가. 콜센터 운영

2017년 지역사회건강조사에서는 조사원에게 표준화된 조사수행 및 조사문항지침을 전달하고자 책임대학교 단위의 콜센터를 운영하였다.

콜센터에서는 표본가구 및 가구원 선정, 가구대체, 조사문항, 노트북 관련 질의사항을 처리하고, 담당자는 질의사항에 대한 조치내역을 질병보건통합관리 시스템에 일단위로 등록하였다.

나. 자료검증

2017년 지역사회건강조사에서는 조사완료자 중 10%를 무작위로 추출하여 제3기관을 통해 전화점검을 실시하였다. 전화점검은 조사완료 후 평균 2일 이내 실시하였으며, 책임대학교에서 전화점검 결과에 대해 확인 후 최종적으로 조사자료의 사용여부를 결정하였다.



〈그림 6〉 전화점검 절차

7. 조사현황

가. 조사현황

조사현황은 <표 5>와 같다. 총 조사가구 수는 445가구였고, 조사완료자 수는 909명이었다. 가구당 평균 2.0명이 조사되었다.

<표 5> 조사현황

동·읍·면	조사가구 수			조사완료자 수(명)		
	일반	아파트	합계	일반	아파트	합계
읍·면지역	229	216	445	455	454	909
두동면	14	0	14	21	0	21
두서면	10	0	10	19	0	19
범서읍	19	102	121	47	202	249
삼남면	20	25	45	44	46	90
삼동면	13	0	13	25	0	25
상북면	14	5	19	28	8	36
서생면	28	0	28	56	0	56
언양읍	25	25	50	53	55	108
온산읍	34	15	49	60	36	96
온양읍	23	22	45	40	52	92
웅촌면	15	4	19	31	10	41
청량면	14	18	32	31	45	76
합계	229	216	445	455	454	909

<표 6> 가구당 조사인원 수

	일반	아파트	계
읍·면지역	2.0	2.1	2.0
계	2.0	2.1	2.0

나. 조사가구 및 인구 특성

2017년 지역사회건강조사 대상자의 가구원수는 2명인 경우가 33.3%로 가장 많았고, 평균은 2.6명이었다. 조사자의 기초생활수급자 여부는 미수급자가 98.1%로 가장 높았고, 월 가구소득은 300-400만원 미만이 24.2%로 가장 많았고, 다음이 200-300만원 미만 18.8%의 순이었다.

성별분포는 남자가 48.4%, 여자가 51.6%이었다. 연령은 50대가 21.6%로 가장 높았고, 다음이 40대 20.6%의 순이었다. 대상자의 평균연령은 50.8세였다. 결혼은 유배우가 73.8%로 가장 높았고, 교육 수준은 고등학교 졸업이 39.8%로 가장 많았고, 다음이 대학교 이상 30.7% 순이었다.

〈표 7〉 2017년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성

(단위 : 명, %)

조사대상 가구특성 (N=463)		
	N	(%)
가구원 수		
1명	87	18.8
2명	154	33.3
3명	99	21.4
4명	95	20.5
5명	23	5.0
6명	4	0.9
7명 이상	1	0.2
평균(명)	2.6	.
세대유형		
1세대	220	47.5
2세대	225	48.6
3세대	18	3.9
기초생활수급자 여부		
현재 수급자	6	1.3
과거 수급자	3	0.6
미수급자	454	98.1
월 가구소득		
50만원 미만	34	7.4
50-100만원 미만	52	11.3
100-200만원 미만	72	15.6
200-300만원 미만	87	18.8
300-400만원 미만	112	24.2
400-500만원 미만	58	12.6
500-600만원 미만	20	4.3
600만원 이상	27	5.8
치매환자 동거가구	4	0.9
거주유형		
읍·면	463	100.0

〈표 8〉 2017년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성

(단위 : 명, %)

조사대상 인구특성 (N=909)		
	N	(%)
성별		
남자	440	48.4
여자	469	51.6
연령(10세 간격)		
19-29세	114	12.5
30-39세	131	14.4
40-49세	187	20.6
50-59세	196	21.6
60-69세	138	15.2
70세 이상	143	15.7
평균(세)	50.8	.
생애주기별		
19-64세	715	78.7
65세 이상	194	21.3
결혼상태		
미혼	132	14.5
유배우	670	73.8
사별, 이혼, 별거	106	11.7
교육수준 ¹⁾		
무학	53	5.8
초등학교	115	12.7
중학교	100	11.0
고등학교	361	39.8
대학교 이상	278	30.7
직업		
전문행정관리직	74	8.1
사무직	94	10.3
판매·서비스직	106	11.7
농림어업	64	7.0
기능단순노무직	216	23.8
기타 ²⁾	355	39.1

1) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

2) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

제 1 부 조사체계



Ⅱ. 통계 추정방법

1. 가중치의 사용
2. 자료처리
3. 분산추정

II. 통계 추정방법

1. 가중치의 사용

가. 소개

2017년 지역사회건강조사는 표본설계를 통하여 추출한 표본을 조사하여 설계 구조를 바탕으로 가중치를 부여함으로써 모집단의 건강수준 등을 추정하였다. 가중치는 가구단위 분석을 위한 가구 가중치와 개인단위 분석을 위한 개인가중치로 분류하였다.

나. 가중치 산출 과정

가구가중치는 가구추출률과 조사적격 가구율을 반영하였고, 개인가중치는 가구가중치에 개인 응답률을 반영하였다. 추정에 쓰이는 보정가중치는 개인가중치를 성별, 연령별 인구구조(2017년 7월 주민등록인구)와 같도록 보정하여 산출하였다.

설계가중치		벤치마킹 가중치
가구가중치	→	개인가중치 → 보정가중치
· 가구추출률 · 조사적격가구율 · 주택유형별 가구 비율	· 개인 응답률	· 성별·연령별 인구보정 - 성별 : 남, 여 - 연령별 : 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+ - 주민등록인구 기준 (2017. 07)

〈그림 7〉 가중치 산출 과정

(1) 가구가중치

- 표본설계의 표본추출과정을 고려한 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율을 반영한 가중치

$$W_{hi} = \frac{M_{hi}}{n_{hi}} = \frac{e_{hi} \cdot N_{hi}}{n_{hi}}$$

- N_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 가구 수
- M_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 적격가구 수
- n_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사가가구 수
- e_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사적격 가구율

〈표 9〉 가구가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 가구 수(③)	(2, 620)
①, ②의 조사된 가구 수(④)	(7)
①, ②의 조사접촉 가구 수(⑤)	(9)
①, ②의 조사적격 가구 수(⑥)	(8)
가구가중치(⑦) = ③ ÷ ④ × ⑥ ÷ ⑤	(332, 698 = 2620/7 × 8/9)
전체 가구가중치 합(⑧)	(8569, 456)
전체 ②의 가구 수 합(⑨)	(10, 356)
가구가중치 보정(⑩) = ⑦ × (⑨/⑧)	(402, 0583 = 332, 698 × 10, 356/8569, 456)

(2) 개인가중치

- 가구가중치에 개인 응답률을 반영한 가중치
- $$W_{h j k l} = W_{h j k} \times \frac{P_{h j k}}{p_{h j k}}$$
 - h : 읍·면/동, j : 표본지점
 - k : 가구, l : 가구원
 - $P_{h j k}$: 가구내 만 19세 이상 가구원수
 - $p_{h j k}$: 가구내 만 19세 이상 조사 가구원수

〈표 10〉 개인가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동·읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 가구가중치(③)	(402.0583)
만 19세 이상 가구원수(④)	(4)
만 19세 이상 조사 가구원수(⑤)	(3)
개인가중치(⑥)=③×④/⑤	(536.0777=402.0583×4/3)

(3) 보정가중치

- 2017년 7월 주민등록인구 기준으로 성별, 연령별 인구구조를 보정한 가중치

$$- W'_{ijkl} = BF_d \cdot W_{ijkl}$$

$$- BF_d = \frac{d(\text{성별} \cdot \text{연령대별}) \text{ 주민등록인구수}}{\sum_h \sum_i \sum_j W_{hijl} I_{d \in \text{성별} \cdot \text{연령대별}}}$$

〈표 11〉 보정가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동·읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 개인가중치(③)	(536.0777)
주민등록인구(④)	(14,693)
성·연령별 개인가중치 합(⑤)	(12,157.23)
성·연령별 보정비(⑥)=④/⑤	(1.208=14,693/12,157.23)
보정가중치(⑦)=③×⑥	(647.89=536.0777×1.208)

(4) 가중치의 이상치 제거

특정 조사대상자의 개인가중치가 다른 조사대상자의 개인가중치보다 월등히 클 경우, 해당 조사대상자의 응답값에 의해 조사결과에 바이어스(bias, 편향성)가 생길 수 있으므로 보정가중치의 이상치를 Raking Ratio 방법으로 제거하여 재보정 하였다.

$Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 보다 큰 가중치는 이상치로 정의하였으며, $Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 로 변경하였다.

- $IQR: Q_3(W') - Q_1(W')$
- $Q_1(W')$: 가중치 중 1사분위수
- $Q_3(W')$: 가중치 중 3사분위수

2. 자료처리

가. 무응답처리

무응답은 대체하지 않았으며 지표 산출 시 제외하였다. 무응답은 개체 무응답과 항목 무응답으로 구분하는데 개체 무응답은 조사에 참여하지 않음으로써 모든 문항에 대해 발생한 결측치를 의미하고, 항목 무응답은 조사에 참여한 대상자가 일부항목에 응답하지 않아 발생한 결측치이다.

나. 사회경제적 특성분류

(1) 연령

연령은 2017년 8월 1일 기준으로 만 연령을 정의하였다. 연령분류는 10세 단위로 “19-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60-69세, 70세 이상”으로 분류하였고, 생애주기별 특성을 알아보기 위해 “19-64세, 65세 이상”의 연령구분을 추가하였다.

(2) 교육수준

교육수준은 <교육 및 경제활동> 영역에서 교육 정도와 졸업여부 2개 문항으로 조사하고 있으며 최종 교육수준은 두 문항을 조합하여 “무학, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 이상”으로 구분하였다. 졸업여부가 ‘졸업’인 경우만 해당 교육수준을 의미하며 졸업여부가 ‘수료, 중퇴, 재학/휴학’인 경우에는 이전 정도의 교육수준으로 분류하였다.

〈표 12〉 교육수준분류

교육수준	졸업여부	분류
무학	-	무학
서당/한학	-	
초등학교	졸업	초등학교
중학교	졸업	중학교
고등학교	졸업	고등학교
2년/3년제 대학	졸업	대학교 이상
4년제 대학	졸업	
대학원 이상	전체	

(3) 직업

직업분류는 통계청 한국표준직업분류(KSCO, 제 6차 개정)의 대분류 직업군에서 유사한 직업분류를 묶어서 6개 직업군으로 분류하였다.

〈표 13〉 직업분류

제6차 한국표준직업분류	직업분류 재구분
관리자	전문행정관리
전문가 및 관련 종사자	
사무 종사자	사무직
서비스 종사자	판매·서비스직
판매 종사자	
농업, 임업 및 어업숙련 종사자	농림어업
기능원 및 관련 기능 종사자	기능단순노무직
장치, 기계조작 및 조립 종사자	
단순노무 종사자	
군인	기타
학생	
주부	
무직	

(4) 가구소득

소득수준은 월 단위로 “50만원 미만, 50-100만원 미만, 100-200만원 미만, 200-300만원 미만, 400-500만원 미만, 500-600만원 미만, 600만원 이상”의 7개 그룹으로 분류하였다.

(5) 거주유형

거주유형은 “동”과 “읍·면”으로 구분하였다.

3. 분산추정

지역사회건강조사에서는 모집단의 특성을 추정하기 위해 가중치를 적용한 표본가중평균을 제시하였다.

표본조사로 모집단의 특성을 추정할 때 일반적으로 표본오차(sampling error) 및 비표본오차(non-sampling error)가 수반된다. 표본오차는 표본이 모집단의 특성과 어긋나는 정도를 나타내며, 비표본오차는 표본추출과정을 제외한 자료수집 과정이나 분석 과정에서 발생하는 오류를 말한다. 표준오차(standard error)로 표현되는 표본오차는 추정치의 신뢰도에 대한 척도가 되며 분산추정에 의해 측정할 수 있다. 울산광역시 울주군 지역사회건강조사는 SAS 9.3을 활용하여 분산을 추정하였다.

- 표본가중평균

$$\hat{Y} = \frac{\left(\sum_h \sum_j \sum_k \sum_l W_{h j k l} y_{h j k l} \right)}{W_{\dots}}$$

- h : 동/읍·면, j : 표본지점
- k : 가구, l : 가구원
- $W_{\dots} = \sum_h \sum_j \sum_k \sum_l W_{h j k l}$: 가중치 계
- $y_{h j k l}$: 해당 문항의 응답값

- 표본오차

$$SE(\hat{Y}) = \sqrt{\sum_{h=1} \sum_{j=1} \frac{n_{hj}(1-f_{hj})}{n_{hj}-1} \sum_{k=1}^{n_{hj}} (e_{hjk} - \overline{e_{hj}})^2}$$

$$\text{여기서 } e_{hjk} = \frac{\left(\sum_{l=1} W_{h j k l} (y_{h j k l} - \hat{Y}) \right)}{W_{\dots}} \text{이고,}$$

$$\overline{e_{hj}} = \left(\sum_{k=1} e_{hjk} \right) / n_{hj} \text{이다.}$$

- 변동계수

$$cv(\hat{Y}) = \frac{SE(\hat{Y})}{\hat{Y}}$$

제2부 주요통계결과

- I. 건강행태
- II. 예방접종 및 검진
- III. 이환 및 의료이용
- IV. 사고 및 중독(낙상)
- V. 활동제한 및 삶의 질
- VI. 보건기관 이용
- VII. 사회 물리적 환경
- VIII. 심폐소생술
- IX. 개인위생



CHS

제 2 부 주요통계결과



I. 건강행태

1. 흡연
2. 음주
3. 안전의식
4. 운동 및 신체활동
5. 식생활
6. 비만 및 체중조절
7. 구강건강
8. 정신건강

I. 건강행태

1. 흡연

가. 흡연시작연령

- 흡연시작연령은 처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이로 정의한다.

처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이의 총 합
평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자 수

- 전체 흡연시작연령은 20.0세였으며 남자에서만 19.7세로 나타났다. 표준화율을 이용한 5개년 간의 흡연시작연령 비교에서 큰 변동을 보이지 않았으며 울산광역시 전체의 흡연시작연령 값과 동일하였다.

나. 현재흡연율

- 현재흡연율은 평생 5갑(100개비)이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 비율(%)로 정의한다.

평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자 (“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수×100
조사대상 응답자 수


- 전체 현재흡연율은 21.8%이며 남자는 39.9%, 여자는 2.6%로 조사되었다. 연령별로는 40대의 현재흡연율이 29.2%로 가장 높았으며 30대가 26.1%, 50대가 22.1%로 그 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도(21.6%)와 값이 유사하였고 울산광역시의 현재흡연율 20.9% 보다 높았다.

다. 매일흡연자의 하루 평균 흡연량


- 매일흡연자의 하루 평균 흡연량은 평생 담배 5갑(100개비)이상 흡연한 사람으로서 매일흡연하는 사람의 하루 평균 흡연량으로 정의한다.

하루 평균 흡연개비 수의 총 합
평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일 흡연자의 수


- 매일흡연자의 하루 평균 흡연량은 전체 15.6개비였으며 남자에서만 15.9개비로 나타났다. 연령별로는 50대가 매일흡연자의 흡연량이 16.9%로 가장 높았고, 40대(16.3%), 30대(14.9%) 순이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도(14.9%)와 값이 유사하였다.



〈그림 8〉 흡연시작연령



〈그림 9〉 현재흡연율



〈그림 10〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량

라. 금연

(1) 현재흡연자의 금연시도율

- 현재흡연자의 금연시도율은 현재 흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 1년 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 수}}$
--


- 현재흡연자의 금연시도율은 전체 32.7%였으며 남자에서만 32.8%로 나타났다. 연령군별로는 20대가 41.3%로 가장 높았으며 40대가 38.1%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 울주군의 금연시도율은 34.5%로 울산광역시 전체의 33.3%보다 높았다.

(2) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률


- 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률은 현재 흡연자 중 1개월 내에 금연할 계획이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{1개월 내 금연계획이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 수}}$
--

- 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률은 2017년 전체 7.5%였으며 남자에서만 7.9%로 나타났다. 연령별로는 50대가 14.5%로 가장 높았다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도 금연계획률인 7.3%보다 0.8%p 감소했으며 울산광역시 전체의 8.6%보다 낮게 나타났다.



〈그림 11〉 현재흡연자의 금연시도율



〈그림 12〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률

마. 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률

- 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률은 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수}}$$

- 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률은 전체 2.8%였으며 남자에서 2.1%, 여자에서 3.3%로 여자에서 높게 나타났다. 연령별로는 20대가 5.8%로 가장 높았다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도의 5.6%보다 2.6%p 감소했으며 울산광역시 전체값 (3.5%)보다 낮게 나타났다.


바. 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률

- 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률은 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.


$$\frac{\text{최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수}}$$

*③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음) 대상자 제외

- 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률은 전체 19.4%였으며 남자에서 24.0%, 여자에서 14.8%를 보였다. 연령별로는 40대 가 22.2%로 가장 높았으며 30대가 21.8%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도의 19.4%보다 1.3%p 감소했으며 울산광역시 전체의 19.4%보다 낮은 18.1%로 나타났다.



〈그림 13〉 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률



〈그림 14〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률

사. 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률

- 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률은 금연구역이 지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있는 현재흡연자 중 금연구역 내에서 “항상” 또는 “가끔” 흡연하는 사람의 비율(%)로 정의한다.

금연구역 내에서 “항상” 또는 “가끔” 흡연하는 사람의 수 × 100
금연구역이 지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있는 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수


- 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률은 전체 11.8%였으며 남자에서만 12.2%로 나타났다. 연령별로는 40대에서만 3.9%로 나타났다.

아. 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률


- 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률은 공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수×100
현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수

- 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률은 전체 87.6%였으며 남자에서 84.3%, 여자에서 89.8%로 나타났다. 연령별로는 30대에서 95.6%로 가장 높았다. 표준화율을 이용한 비교에서 2015년도의 90.7%보다 1.0%p 감소했으며 울산광역시 전체값 92.9%보다 낮은 89.7%로 나타났다.



〈그림 15〉 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률



〈그림 16〉 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률

【울산 선택지표】

자. 연간 금연 시도 횟수

- 연간 금연 시도 횟수는 최근 1년 동안 평균 금연 시도 횟수로 정의한다.

최근 1년 동안 금연 시도 횟수의 총 합
최근 1년 동안 금연을 시도한 적이 있는 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”) 수

- 연간 금연 시도 횟수는 2017년 전체 2.0%였으며 남자에서만 2.1%로 나타났다.

차. 효과적인 금연 프로그램

- 효과적인 금연 프로그램은 흡연자 중 공익광고, 금연교육, 금연클리닉, 금연상담전화 중 가장 효과적인 금연 프로그램이라 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

응답보기별 응답자 수×100
평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자 수


- 효과적인 금연 프로그램으로는 금연클리닉이 전체 48.6%로 제일 높았으며 금연교육(24.4%), 공익광고(20.3%), 금연상담전화(6.7%)가 뒤를 이었다.

카. 금연정책 강화 필요 영역


- 금연정책 강화 필요 영역은 현재 살고 있는 시군구에서 강화해야 할 금연정책 분야로 정의한다.

응답보기별 응답자 수×100
조사대상 응답자 수


- 금연정책 강화 필요 영역으로는 금연구역 내 흡연이 전체 37.9%로 제일 높았으며 금연구역 확대(19.1%), 금연클리닉(17.5%), 금연 교육 및 홍보 강화(15.8%), 더 강화할 정책이 없다(9.6%)가 뒤를 이었다.



〈그림 17〉 연간 금연 시도 횟수



〈그림 18〉 효과적인 금연 프로그램



〈그림 19〉 금연정책 강화 필요 영역

2. 음주

가. 음주시작연령

- 음주시작연령은 처음으로 술 1잔을 모두 마셔 본 때의 평균 만 나이로 정의한다.

처음으로 술 1잔을 모두 마신 만 나이의 총 합
지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 음주자 수

- 남자의 음주시작연령은 19.2세, 여자의 경우 23.2세로 나타났다. 음주시작연령은 전년도의 20.8%보다 0.6%p 감소하였으며 울산광역시 전체값(20.3%)과 유사하였다.

나. 월간음주율

- 월간음주율은 최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 2017년 월간음주율은 전체 59.1%였으며 남자에서 73.8%, 여자에서 43.7%를 보였다. 연령별로는 40대가 71.4%로 가장 높았고, 30대(68.2%), 20대(63.0%) 순으로 나타났다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도의 61.6%보다 낮은 60.7%의 월간음주율을 보였으며 울산광역시 전체의 63.2%보다 낮았다.


다. 연간음주자의 고위험음주율¹⁾

- 연간음주자의 고위험음주율은 최근 1년 동안 음주한 사람 중에서 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 주 2회 이상 마시는 사람의 비율(%)로 정의한다.


최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔)이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수×100
최근 1년 동안 음주한 사람의 수

- 연간음주자의 고위험음주율은 남자 34.9%, 여자 8.6%로 나타났다. 연령군별로는 40대가 33.0%로 가장 높았으며 50대(24.4%), 70세 이상(22.0%), 30대(20.2%)가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도의 19.1%보다 2.8%p 증가했으며 울산광역시 전체의 19.9%보다 높은 21.9%로 나타났다.


1) 2008년 지표정의 : 한 번의 술좌석에서 남자는 7잔 또는 맥주 5캔(여자의 경우 5잔 또는 맥주 3캔 정도) 이상을 한 달(30일) 동안 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 사람의 수*100 / 조사대상자 중 최근 1년간 음주한 사람의 수



〈그림 20〉 음주시작연령



〈그림 21〉 월간음주율



〈그림 22〉 연간음주자의 고위험음주율

3. 안전의식

가. 운전자석 안전벨트 착용률

- 운전자석 안전벨트 착용률은 자동차 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
자동차 운전자 수

- 운전자석 안전벨트 착용률은 2017년 전체 92.9%이며 성별로는 남자 90.7%, 여자 96.5%로 조사되었다. 연령별로는 20대의 안전벨트 착용률이 95.0%로 가장 높았고 40대가 94.5%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도인 83.6%보다 높은 92.7%의 안전벨트 착용률을 보였으며 울산광역시 전체의 91.8%보다 높았다.

나. 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률

- 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률은 승용차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

다른 사람이 운전하는 승용차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
동승차량 앞좌석 탑승자 수


- 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률은 전체 88.3%이며, 남자에서 84.9%, 여자에서 92.0%를 보였다. 연령별로는 70세 이상이 94.1%로 가장 높았고 이어서 50대(91.7%), 60대(91.6%) 순이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도인 74.1%보다 높은 87.2%의 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률을 보였으며 울산광역시 전체의 85.7%보다 높았다.

다. 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)


- 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)은 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 오토바이 또는 자동차를 운전한 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 수×100
자동차 또는 오토바이 운전자 수


- 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)은 전체 5.7%였으며 남자의 경우 7.2%, 여자의 경우 3.1%로 조사되었다. 연령별로는 60대에서 15.9%로 가장 높았고 30대가 7.2%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서는 전년도인 14.1%보다 8.4%p 감소했으며 울산광역시 전체의 7.1%보다 낮은 5.7%로 나타났다.



〈그림 23〉 운전자석 안전벨트 착용률



〈그림 24〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률



〈그림 25〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)

4. 운동 및 신체활동

가. 신체활동 실천율

(1) 격렬한 신체활동 실천율

- 격렬한 신체활동 실천율은 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 격렬한 신체활동 실천율은 전체 13.2%였으며 남자에서 16.2%, 여자에서 10.0%였다. 연령별로는 50대(17.8%)에서 격렬한 신체활동을 가장 많이 하는 것으로 나타났고 20대와 40대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도 16.5%에서 12.8%로 실천율이 감소하였으며 울산광역시 전체의 16.3%보다 낮았다.

(2) 중등도 신체활동 실천율

- 중등도 신체활동 실천율은 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1주일 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 중등도 신체활동 실천율은 전체 11.1%이고 남자에서 14.3%, 여자에서 7.8%였다. 연령별로는 50대(14.3%)의 실천율이 가장 높았으며 60대와 70세 이상이 그 다음으로 높았다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도 11.0%보다 감소한 10.6%였으며 울산광역시 전체의 9.8%보다 높았다.


(3) 중등도 이상 신체활동 실천율²⁾

- 중등도 이상 신체활동 실천율은 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 또는 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 비율(%)로 정의한다.


최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 중등도 이상 신체활동 실천율은 전체 21.9%로 조사되었으며 남자에서 27.0%, 여자에서 16.4%였다. 연령별로는 50대(29.1%), 20대(22.1%), 60대(21.2%)순서로 높았다. 표준화율을 이용한 추세비교에서는 전년도의 23.4%보다 2.5%p 감소한 20.9%였으며 울산광역시 전체의 21.9%보다 낮았다.


2) 2008년 지표정의 : 최근 1주일 동안 신체활동을 1회 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람 수×100 / 조사대상 인구 수



〈그림 26〉 격렬한 신체활동 실천율



〈그림 27〉 중등도 신체활동 실천율



〈그림 28〉 중등도 이상 신체활동 실천율

나. 걷기 실천율

- 걷기 실천율은 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 울주군의 걷기 실천율은 전체 41.5%로 조사되었으며 남자에서 45.2%, 여자에서 37.6%로 나타났다. 연령별로는 20대(50.3%)에서 걷기 실천율이 높았다. 표준화 실천율은 40.5%로 전년도의 34.9%보다 증가했으며 울산광역시 전체 실천율인 40.1%보다 높았다.

【울산 선택지표】

다. 지역사회 내 운동시설 접근율

- 지역사회 내 운동시설 접근율은 최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 쉽게 찾을 수 있다고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 찾기 “매우 쉬웠다” 또는 “쉬운 편이었다”에 응답한 사람의 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 울주군의 지역사회 내 운동시설 접근율은 전체 75.8%로 조사되었으며 남자에서 75.1%, 여자에서 76.6%로 나타났다. 연령별로는 30대(78.3%)에서 지역사회 내 운동시설 접근율이 가장 높았으며, 20대가 78.0%로 그 다음으로 높았다.

라. 연간 지역사회 내 운동프로그램 참여율


- 연간 지역사회 내 운동프로그램 참여율은 최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역의 주민센터(동사무소), 보건소, 구청, 시청 등의 지방자치단체 운동프로그램 참여율로 정의한다.

최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역의 주민센터(동사무소), 보건소, 구청, 시청 등의 지방자치단체 운동프로그램에 참여한 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 울주군의 연간 지역사회 내 운동프로그램 참여율은 전체 7.0%로 조사되었으며 남자에서 3.5%, 여자에서 10.8%로 차이를 보였다. 연령별로는 40대(10.9%), 60대(10.1%), 70세 이상(9.7%) 순으로 운동프로그램 참여율이 유사하게 나타났다.



〈그림 29〉 건강 실천율



〈그림 30〉 지역사회 내 운동시설 접근율



〈그림 31〉 연간 지역사회 내 운동프로그램 참여율

5. 식생활

가. 저염선택율

- 저염선택율은 평소 식습관, 조리음식 등에서 저염선택하는 사람의 비율(%)로 정의한다. 저염선택율은 제시된 3가지의 문항 중 한 가지만 선택한 경우를 Type I, 두 가지를 선택한 경우를 Type II, 그리고 세 가지 모두를 선택한 경우를 Type III로 구분한다.

- ① 평소 음식을 먹을 때 “약간 싱겁게 먹는다” 또는 “아주 싱겁게 먹는다”에 응답한 사람의 수 혹은,
- ② 조리된 음식을 먹을 때 소금이나 간장을 “전혀 더 넣지 않는다”에 응답한 사람의 수 혹은,
- ③ 전, 부침, 튀김 등을 먹을 때 간장에 “찍어 먹지 않는다”에 응답한 사람의 수×100

조사대상 응답자 수


- 저염선택율은 Type I 이 38.9%, Type II 가 20.9%, Type III 가 5.6%로 나타났다. Type I 은 남자는 42.9%, 여자는 34.7%를 보였으며, Type II 는 남자는 15.1%, 여자는 26.9%, Type III 는 남자는 2.4%, 여자는 9.0%로 나타났다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 Type I 은 전년도의 41.4%에서 감소한 38.8%를 보였고 Type II, Type III 도 각각 전년도 22.2%에서 20.3%로 12.1%에서 5.4%로 감소추세를 보였다.

나. 영양표시 활용률


- 영양표시 활용률은 영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

영양표시 내용이 가공식품을 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수×100
가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수


- 영양표시 활용률은 전체 82.0%였고 남자의 경우 73.6%, 여자의 경우 85.5%로 차이를 보였다. 연령별로는 60대가 85.6%로 가장 높았으며 40대와 50대가 84.7%로 그 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 비교에서 전년도의 81.0%에서 80.1%로 감소하였으며 울산광역시 전체의 82.4%보다 낮았다.



〈그림 32〉 저염선택률



〈그림 33〉 저염선택률 (연도비교)



〈그림 34〉 영양표시 활용률

【울산 선택지표】

다. 저염식 실천 노력 경험률

- 저염식 실천 노력 경험률은 평소 덜 짜게 먹으려고 “항상” 또는 “대체로” 노력한다고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{평소 덜 짜게 먹으려고 “항상 노력한다” 또는 “대체로 노력한다”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$


- 저염식 실천 노력 경험률은 전체 57.8%였고 남자의 경우 47.7%, 여자의 경우 68.5%로 차이를 보였다. 연령별로는 50대(69.8%), 60대(63.0%), 40대(60.4%)의 순서로 높았다.

라. 연간 영양교육 및 상담수혜율


- 연간 영양교육 및 상담수혜율은 최근 1년 동안 영양교육이나 상담을 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 1년 동안 영양교육 및 상담을 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--

- 연간 영양교육 및 상담수혜율은 전체 5.1%였고 남자의 경우 2.3%, 여자의 경우 8.0%로 차이를 보였다. 연령별로는 20대(8.6%), 30대(7.2%), 40대(4.6%)의 순서로 활용률이 높았다. 조울을 이용한 추세비교에서 울주군의 연간 영양교육 및 상담수혜율은 전년도 3.9%보다 1.2%p 높아졌다.



〈그림 35〉 저염식 실천 노력 경험률



〈그림 36〉 연간 영양교육 및 상담수혜율

6. 비만 및 체중조절

가. 비만율

- 비만율은 체질량지수(kg/m^2) 25 이상인 사람의 비율(%)로 정의한다.

체질량지수(kg/m^2)가 25 이상인 사람의 수 $\times 100$
-저체중 = BMI<18.5 인 사람의 수 $\times 100$
-정상 = $18.5 \leq \text{BMI} < 25$ 인 사람의 수 $\times 100$
-비만(비만인구율) = $\text{BMI} \geq 25$ 인 사람의 수 $\times 100$
조사대상 응답자 수

- 울주군의 비만율은 전체 25.7%이고 남자의 31.4%, 여자의 19.7%가 비만인 것으로 나타났다. 연령별로는 30대의 비만율(33.0%)이 가장 높았으며 40대와 60대가 27.2%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도에 비만율 26.5%와 유사한 26.4%였으며, 울산광역시 전체의 비만율 26.7%보다 낮았다.

나. 주관적 비만인지율

- 주관적 비만인지율은 주관적으로 “약간 비만” 또는 “매우 비만”이라고 생각하는 사람의 비율(%)로 정의한다.

“약간 비만임” 또는 “매우 비만임”에 응답한 사람의 수 $\times 100$
조사대상 응답자 수


- 주관적 비만인지율은 전체 33.5%였으며 남자는 26.2%, 여자는 41.2%였다. 30대(42.4%)의 주관적 비만인지율이 가장 높았으며, 40대와 20대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 주관적 비만인지율 전년도 39.0%보다 감소한 35.3%였으며 울산광역시 전체의 39.9%보다 낮았다.

다. 연간 체중조절 시도율


- 연간 체중조절 시도율은 최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 했던 사람의 수 $\times 100$
조사대상 응답자 수


- 연간 체중조절 시도율은 전체 50.4%였으며 남자 42.3%, 여자 59.0%로 차이를 보였다. 연령별로는 30대가 61.0%로 가장 높았으며 40대와 20대의 순서로 높은 시도율을 보였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도 58.5%보다 감소한 52.9%였으며 울산광역시 전체의 68.2%보다 낮았다.



〈그림 37〉 비만율



〈그림 38〉 주관적 비만인지율



〈그림 39〉 연간 체중조절 시도율

7. 구강건강

가. 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

- 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 주관적으로 구강건강이 나쁘다고 인식하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--

- 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 전체 31.1%로 나타났으며 남자는 32.3%, 여자는 29.8%로 조사되었다. 70세 이상 연령군에서 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율이 55.3%로 가장 높았다. 표준화율에 의한 비교에서 전년도 30.1%에 비해 2017년 분율이 1.7%p 낮아졌으며 울산광역시 27.5%보다 높은 28.4%였다.

나. 저작불편호소율(65세 이상)

- 65세 이상 노인의 저작불편호소율은 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 65세 이상 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{“매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{65세 이상 조사대상 응답자 수}}$


- 65세 이상 노인의 저작불편호소율은 전체 35.9%였으며 65세 이상 남성의 30.2%, 여성의 40.9%에서 저작불편을 호소하였다. 표준화율에 의한 저작불편호소율은 35.0%로 전년도 저작불편호소율(46.1%)보다 감소했으며 울산광역시 전체의 36.3%보다 낮게 나타났다.

다. 틀니 이용 행태(50세 이상)


- 50세 이상의 틀니 이용 행태는 50세 이상의 틀니 이용 행태별 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{응답보기별 응답자 수} \times 100}{\text{50세 이상 조사대상 응답자 수}}$
--


- 50세 이상의 틀니 이용 행태는 위아래 둘 다 있는 경우가 19.6%, 위쪽만 있는 경우가 5.5%, 아래쪽만 있는 경우가 3.4%, 아니오로 응답한 경우가 71.5%로 나타났다. 위아래 둘 다 있는 경우 남자는 16.7%, 여자는 22.4%였으며, 위쪽만 있는 경우 남자는 5.1%, 여자는 5.9%, 아래쪽만 있는 경우 남자는 3.4%, 여자는 3.4%, 아니오로 응답한 경우 남자는 74.8%, 여자는 68.3%를 보였다.



〈그림 40〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율



〈그림 41〉 저작불편호소율(65세 이상)



〈그림 42〉 틀니 이용 행태(50세 이상)

라. 치솔질 실천율

(1) 어제 아침식사 후 치솔질 실천율

- 어제 아침식사 후 치솔질 실천율은 아침식사 후 치솔질 한 사람의 분율(%)로 정의한다.

아침식사 후 치솔질 한 사람의 수×100
어제 하루 동안 아침식사 한 사람의 수

- 어제 아침식사 후 치솔질 실천율은 94.0%였으며 남자의 경우 92.7%, 여자의 경우 95.4%로 나타났다.

(2) 어제 점심식사 후 치솔질 실천율

- 어제 점심식사 후 치솔질 실천율은 점심식사 후 치솔질 한 사람의 분율(%)로 정의한다.

점심식사 후 치솔질 한 사람의 수×100
어제 하루 동안 점심식사 한 사람의 수

- 어제 점심식사 후 치솔질 실천율은 64.9%였으며 남자의 경우 58.4%, 여자의 경우 71.8%로 나타났다.

(3) 어제 저녁식사 후 치솔질 실천율

- 어제 저녁식사 후 치솔질 실천율은 저녁식사 후 치솔질 한 사람의 분율(%)로 정의한다.

저녁식사 후 치솔질 한 사람의 수×100
어제 하루 동안 저녁식사 한 사람의 수

- 어제 저녁식사 후 치솔질 실천율은 74.5%였으며 남자의 경우 73.5%, 여자의 경우 75.7%로 나타났다.

(4) 어제 잠자기 전 치솔질 실천율

- 어제 잠자기 전 치솔질 실천율은 잠자기 전 치솔질 한 사람의 분율(%)로 정의한다.

잠자기 전 치솔질 한 사람의 수×100
어제 하루 동안 잠을 잔 사람의 수


- 어제 잠자기 전 치솔질 실천율은 59.3%였으며 남자의 경우 57.2%, 여자의 경우 61.6%로 나타났다.

마. 연간 구강검진 수진율


- 연간 구강검진 수진율은 최근 1년 동안 치료 목적이 아닌 순수검진 목적으로 구강검진을 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 구강검진을 받은 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 울주군의 연간 구강검진 수진율은 전체 44.8%였으며 남자는 49.3%, 여자는 40.0%를 보였다. 연령별로는 40대가 53.3%로 가장 높았으며 50대와 30대가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 구강검진 수진율은 전년도와 35.9%보다 7.6%p 증가하였으며, 울산광역시 전체 수진율인 46.7%보다 낮았다.



〈그림 43〉 치솔질 실천율



〈그림 44〉 연간 구강검진 수진율

바. 연간 스케일링 경험률

- 연간 스케일링 경험률은 최근 1년 동안 스케일링을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 스케일링을 받은 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 연간 스케일링 경험률은 전체 36.5%였으며 남자는 34.8%, 여자는 38.3%로 나타났다. 20대의 스케일링 경험률이 39.5%로 가장 높았으며 50대(39.3%)와 40대(38.7%)가 그 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 스케일링 경험률은 전년도의 44.6%보다 낮은 36.2%로 나타났으며 울산광역시 전체의 42.4%보다 낮았다.

아. 연간 치과병의원 이용률

- 연간 치과병의원 이용률은 최근 1년 동안 치과병의원을 이용한 적이 있다고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 치과병의원을 이용한 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자

- 울주군의 연간 치과병의원 이용률은 전체 38.0%이며 남자 37.6%, 여자 38.5%로 나타났다. 연령별로는 40대가 41.4%로 가장 높게 나타났으며 50대가 40.9%, 60대가 40.6%로 그 뒤를 이었다.


【울산 선택지표】

사. 치실 및 치간솔 사용률


- 치실(floss) 혹은 치간솔을 사용하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

치실(floss) 혹은 치간솔을 사용하는 사람의 수×100
조사대상 응답자


- 울주군의 치실 및 치간솔 사용률은 전체 28.1%이며 남자 23.8%, 여자 32.9%로 나타났다. 연령별로는 30대가 39.4%로 가장 높게 나타났으며 40대가 33.7%, 50대가 27.6%로 그 뒤를 이었다.



〈그림 45〉 연간 스케일링 경험률



〈그림 46〉 치실 및 치간솔 사용률



〈그림 47〉 연간 치과병원 이용률

8. 정신건강

가. 스트레스 인지율

- 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이” 또는 “많이” 느끼는 사람의 비율(%)로 정의한다.

평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 스트레스 인지율은 전체 25.5%였으며 남자와 여자는 각각 26.6%, 24.4%로 나타났다. 연령별로는 30대의 스트레스 인지율이 가장 높은 35.5%를 기록했으며 20대가 28.5%, 40대가 27.9%로 나타났다. 표준화율을 이용한 추세 비교에서 전년도의 28.4%보다 낮은 27.5%의 스트레스 인지율을 보였으며 울산광역시 전체의 24.4%보다 높았다.

나. 우울감 경험률

- 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 우울감 경험률은 전체 3.0%로 조사되었고 남자와 여자의 비율은 각각 1.3%와 4.8%였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 5.3%보다 낮은 3.1%의 우울감 경험률을 보였으며 울산광역시 전체의 4.4%보다 낮은 수치를 기록하였다.

다. 자살생각률


- 자살생각률은 최근 1년 동안 자살을 생각해 본 적이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 자살생각률은 전체 1.6%로 조사되었고 남자와 여자의 비율은 각각 0.8%와 2.5%였다. 조율을 이용한 추세비교에서 전년도의 3.8%보다 감소한 1.6%의 수치를 기록하였다.



〈그림 48〉 스트레스 인지율



〈그림 49〉 우울감 경험률



〈그림 50〉 자살생각률

라. 인터넷, 게임(오락), 스마트폰 일상생활 지장 경험 빈도

- 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용으로 일상생활 지장 경험 빈도는 최근 1년 동안 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 사용으로 일상생활에 지장을 받은 적이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{응답보기별 응답자 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용으로 일상생활 지장 경험 빈도는 ‘전혀 없다’가 전체 96.3%로 제일 높았으며 ‘한 달에 1번 미만’ (1.4%), ‘한달에 1번 정도’ (1.2%), ‘일주일에 1번 정도’ (0.8%), ‘거의 매일’ (0.3%)순으로 뒤를 이었다.

【울산 선택지표】


마. 도박으로 인한 일상생활 지장 경험률

- 도박으로 인한 일상생활 지장 경험률은 최근 1년 동안 도박으로 인하여 일상생활에 지장을 받은 적이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.


$\frac{\text{최근 1년 동안 도박으로 인하여 한 달에 1번 이상
일상생활에 지장을 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

조사대상 응답자 수

- 도박으로 인한 일상생활 지장 경험률은 전체 0.3%로 조사되었고 남자 0.2%, 여자 0.4%였다.



〈그림 51〉 인터넷, 게임(오락), 스마트폰 일상생활 지장 경험 빈도



〈그림 52〉 도박으로 인한 일상생활 지장 경험률

제 2 부 주요통계결과



Ⅱ. 예방접종 및 검진

1. 예방접종
2. 검진

II. 예방접종 및 검진

1. 예방접종

가. 연간 인플루엔자 예방접종률

- 연간 인플루엔자 예방접종률은 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 연간 인플루엔자 예방접종률은 전체 38.4%였으며 남자와 여자는 각각 33.4%, 43.7%로 나타났다. 70세 이상 연령군의 접종률이 84.6%로 가장 높았으며 60대가 58.5%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 인플루엔자 예방접종률은 전년도에 32.8%보다 증가한 35.8%로 조사되었으며 울산광역시 전체의 40.5%보다 낮은 접종률이었다.

2. 검진

가. 건강검진 수진율

- 건강검진 수진율은 최근 2년 동안 건강검진을 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 2년 동안 건강검진(암 검진 제외)을 받은 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 건강검진 수진율은 전체 72.2%였으며 남자와 여자는 각각 75.7%, 68.5%로 나타났다. 연령별로는 50대가 86.2%로 가장 높았으며 60대가 82.8%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 건강검진 수진율은 전년도에 62.8%보다 증가한 67.9%로 조사되었으며 울산광역시 전체의 68.9%보다 낮은 수진율이었다.

나. 암 검진율


- 암 검진율은 최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 암 검진율은 전체 63.2%였으며 남자와 여자는 각각 58.1%, 68.5%로 나타났다. 연령별로는 50대가 84.1%로 가장 높았으며 60대가 83.5%로 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 암 검진율은 전년도에 44.8%보다 증가한 56.7%로 조사되었으며 울산광역시 전체의 55.3%보다 높은 검진율이었다.



〈그림 53〉 연간 인플루엔자 예방접종률



〈그림 54〉 건강검진 수진율



〈그림 55〉 암 검진율

제 2 부 주요통계결과



Ⅲ. 이환 및 의료이용

1. 만성·급성질환 및 사고중독 경험을
2. 주요 질환별 평생 의사진단 경험을
및 관리행태
3. 의료이용

Ⅲ. 이환 및 의료이용


1. 만성·급성질환 및 사고중독 경험률

- 만성·급성질환 및 사고중독 경험률은 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 2주(14일) 동안 만성·급성질환 및
사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을
느꼈던 적이 있는 사람의 수×100

조사대상 응답자 수

- 만성·급성질환 및 사고중독 경험률은 전체 5.0%이며 남자는 3.8%, 여자는 6.3%로 나타났다. 연령별로는 70세 이상 연령군에서 12.6%로 가장 높은 경험률을 보였으며 60대(6.7%), 30대(5.4%)가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세 비교에서 전년도 경험률 8.7%보다 감소한 4.6%로 울산광역시 전체값 5.5%보다 낮았다.



〈그림 56〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률

2. 주요 질환별 평생 의사진단 경험률 및 관리행태

가. 고혈압

(1) 고혈압 진단 경험률(≥30)

- 고혈압 진단 경험률(≥30)은 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수} \times 100}{\text{30세 이상 조사대상 응답자 수}}$


- 고혈압 진단 경험률(≥30)은 전체 21.1%(남자 23.2%, 여자 19.1%)였으며 연령별로는 70세 이상이 57.1%로 가장 높았다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 고혈압 진단 경험률(≥30)은 전년도의 18.6%보다 감소한 17.7%로 나타났으며 울산광역시 전체값(18.2%)보다 낮았다.

(2) 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)


- 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)은 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람 중 현재 혈압 조절약을 한 달에 20일 이상 복용한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{현재 혈압조절약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}}$
--

- 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)은 전체 88.8%(남자 88.6%, 여자 89.1%)였으며 연령별로는 60대가 97.8%로 가장 높았다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 88.1%보다 높은 88.7%의 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)을 보였으며, 울산광역시 전체의 87.8%보다 높은 치료율을 보였다.



〈그림 57〉 고혈압 진단 경험률(≥30)



〈그림 58〉 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)

(3) 고혈압 관리교육 이수율(≥30)

- 고혈압 관리교육 이수율(≥30)은 의사에게 고혈압을 진단받은 사람 중 고혈압 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}}$
--


- 고혈압 관리교육 이수율(≥30)은 전체 8.2% (남자 12.2%, 여자 3.2%)였으며 연령별로는 50대가 12.9%로 가장 높았다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 고혈압 관리교육 이수율(≥30)은 전년도에 20.0%보다 감소한 7.5%로 나타났으며 울산광역시 전체의 6.9%보다 높은 경험률을 보였다.

(4) 혈압수치 인지율


- 혈압수치 인지율은 본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--

- 혈압수치 인지율은 전체 28.3%(남자 31.6%, 여자 24.9%)였으며 연령별로는 60대가 50.2%로 가장 높았고 50대(38.3%), 70세 이상(28.4%), 40대(24.1%) 순으로 높았다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 혈압수치 인지율은 전년도에 41.8%보다 감소한 25.6%로 나타났으며 울산광역시 전체의 45.7%보다 낮은 인지율을 보였다.



〈그림 59〉 고혈압 관리교육 이수율(≥30)



〈그림 60〉 혈압수치 인지도

나. 당뇨병

(1) 당뇨병 진단 경험률(≥ 30)

- 당뇨병 진단 경험률(≥ 30)은 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 분율(%)로 정의한다.

의사에게 당뇨병을 진단 받은 사람의 수 $\times 100$
30세 이상 조사대상 응답자 수

- 당뇨병 진단 경험률(≥ 30)은 전체 11.5%(남자 12.0%, 여자 10.9%)였으며 70세 이상 연령군에서 30.9%로 가장 높았다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 당뇨병 진단 경험률(≥ 30)은 전년도의 8.0%보다 증가한 9.2%로 나타났으며 울산광역시 전체의 7.7%보다 높았다.

(2) 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥ 30)

- 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥ 30)은 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 혈당을 관리하기 위해 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 치료 받고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 $\times 100$
의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수


- 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥ 30)은 전체 89.3%(남자 92.5%, 여자 85.6%)였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 77.7%보다 증가한 87.6%의 당뇨병 진단경험자의 치료율(≥ 30)을 보였으며 울산광역시 전체의 88.6%보다 낮은 치료율을 보였다.

(3) 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)


- 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)은 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 당뇨병 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 $\times 100$
의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수


- 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)은 전체 8.4%(남자 6.8%, 여자 10.1%)로 조사되었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도의 24.4%보다 감소한 8.2%의 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)을 보였으며 울산광역시 전체의 12.4%보다 낮은 이수율을 보였다.



〈그림 61〉 당뇨병 진단 경험률(≥30)



〈그림 62〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30)



〈그림 63〉 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)

(4) 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥ 30)

- 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥ 30)은 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년 동안 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}}$$

- 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥ 30)은 전체 28.2%(남자 28.0%, 여자 28.5%)였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도 26.9%보다 감소한 25.0%의 수진율을 보였으며 울산광역시 전체의 32.4%보다 낮았다.

(5) 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥ 30)³⁾

- 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥ 30)은 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년 동안 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수}}$$

- 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥ 30)은 전체 47.4%(남자 41.3%, 여자 54.1%)로 나타났다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도 34.9%보다 증가한 46.1%의 수진율을 보였으며 울산광역시 전체의 34.2%보다 높았다.




(6) 혈당수치 인지율

- 혈당수치 인지율은 본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 혈당수치 인지율은 전체 9.8%였으며 남자와 여자의 분율은 각각 11.0%와 8.5%였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도 11.6%보다 감소한 8.1%의 인지율을 보였으며 울산광역시 전체의 12.6%보다 낮았다.

3) 2009년 지표정의 : 최근 1년 동안 미세단백뇨검사를 받은 적이 있는 사람의 수 $\times 100$ / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
2010년 지표정의 : 최근 1년 동안 소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 $\times 100$ / 의사진단을 받은 30세 이상인 사람의 수

〈그림 64〉 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥ 30)〈그림 65〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사(미세단백뇨) 수진율(≥ 30)

〈그림 66〉 혈당수치 인지율

다. 관절염

(1) 관절염 진단 경험률(≥ 50)

- 관절염 진단 경험률(≥ 50)은 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 50세 이상 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 사람의 수} \times 100}{\text{50세 이상 조사대상 응답자 수}}$
--


- 관절염 진단 경험률(≥ 50)은 전체 12.1%(남자 4.8%, 여자 19.3%)였으며 70세 이상 연령군에서 20.1%로 가장 높은 경험률을 보였다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도 12.6%보다 증가한 12.9%의 진단율을 보였으며 울산광역시 전체의 16.5%보다 낮았다.

(2) 관절염 관리교육 이수율(≥ 50)


- 관절염 관리교육 이수율(≥ 50)은 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 50세 이상 사람 중 관절염을 관리하는 방법에 대해 병의원 또는 한방병의원 또는 보건소에서 교육을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염) 관리 교육을 받은 사람의 수} \times 100}{\text{의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수}}$

- 관절염 관리교육 이수율(≥ 50)은 전체 11.4%였으며 여자에서만 14.1%로 나타났다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도 17.8%보다 감소한 11.6%의 관절염 관리교육 이수율(≥ 50)을 보였으며 울산광역시 전체의 6.1%보다 높았다.



〈그림 67〉 관절염 진단 경험률(≥50)



〈그림 68〉 관절염 관리교육 이수율(≥50)

라. 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율

- 뇌졸중 조기증상(중풍) 인지율은 뇌졸중(중풍) 조기증상에 대해 인지하고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

응답보기별 응답자 수 × 100
조사대상 응답자 수


- 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율은 전체 66.4%(남자 64.3%, 여자 68.6%)였다. 보기별로는 ‘갑자기 말이 어눌해지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못한다’가 88.9%로 가장 높은 인지율을 보였고, ‘갑자기 한쪽 얼굴, 팔, 다리에 힘이 빠진다’(86.9%), ‘갑자기 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘들다’(85.4%)가 뒤를 이었다.

마. 심근경색증 조기증상 인지율


- 심근경색증 조기증상 인지율은 심근경색증 조기증상에 대해 인지하고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

응답보기별 응답자 수 × 100
조사대상 응답자 수

- 심근경색증 조기증상 인지율은 전체 67.1%(남자 65.3%, 여자 69.0%)였다. 보기별로는 ‘갑자기 가슴에 통증이나 압박감 또는 짓누르는 느낌이 있다’가 92.9%로 가장 높은 인지율을 보였고, ‘갑자기 숨이 찬다’(89.5%), ‘갑자기 힘이 없으며, 어지럽고, 울렁거리거나 식은땀이 난다’(85.3%)가 뒤를 이었다.



〈그림 69〉 뇌졸중(중풍) 초기증상 인지율



〈그림 70〉 심근경색증 초기증상 인지율

【울산 선택지표】

바. 연간 평균 혈압 측정횟수

- 연간 평균 혈압 측정횟수는 최근 1년 동안 혈압을 측정한 횟수로 정의한다.

$$\frac{(\text{하루 측정 횟수} \times 365\text{일}) + (\text{일주일 측정 횟수} \times 52\text{주}) + (\text{한달 측정 횟수} \times 12\text{개월}) + (\text{일년 측정 횟수})}{\text{조사대상 응답자 수}}$$


- 연간 평균 혈압 측정횟수는 전체 15.5회로 조사되었고 남자와 여자의 분율은 각각 16.4회와 14.4회였다. 60대에서 28.4회로 가장 높은 횟수를 보였고 50대(26.2회), 40대(12.5회)이 뒤를 이었다. 조율을 이용한 추세비교에서 전연도의 14.9회보다 증가한 15.5회의 진단율을 보였다.

사. 연간 평균 혈당 측정횟수


- 연간 평균 혈당 측정횟수는 최근 1년 동안 평균 혈당을 측정한 횟수로 정의한다.

$$\frac{(\text{하루 측정 횟수} \times 365\text{일}) + (\text{일주일 측정 횟수} \times 52\text{주}) + (\text{한달 측정 횟수} \times 12\text{개월}) + (\text{일년 측정 횟수})}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 연간 평균 혈당 측정횟수는 전체 5.9회로 조사되었고 남자와 여자의 분율은 각각 6.5회와 5.3회였다. 60대에서 16.8회로 가장 높은 횟수를 보였고 50대(10.7회), 70세 이상(8.1회)이 뒤를 이었다. 조율을 이용한 추세비교에서 전연도의 6.5회보다 감소한 5.9회의 진단율을 보였다.



〈그림 71〉 연간 평균 혈압 측정횟수



〈그림 72〉 연간 평균 혈당 측정횟수

3. 의료이용


가. 연간 필요의료서비스 미치료율⁴⁾

- 연간 필요의료서비스 미치료율은 최근 1년 동안 필요한 의료서비스를 받지 못한 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 1년 동안 필요한 의료서비스 (치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--

- 연간 필요의료서비스 미치료율은 전체 5.7%(남자 4.7%, 여자 6.7%)였다. 표준화율을 이용한 추세 비교에서 전년도 7.8% 보다 감소한 6.3%를 보였으며 울산광역시 전체값(6.2%)과 유사한 미치료율을 보였다.

4) 2008년 지표정의 : 최근 1년간 필요한 의료서비스를 받지 못한 사람 수×100 / 조사대상 인구 수
 2009년 지표정의 : 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수
 2010년 지표정의 : 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 포함)를 받지 못한 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수



〈그림 73〉 연간 필요의료서비스 미치료율

제 2 부 주요통계결과



IV. 사고 및 중독(낙상)

1. 연간 사고 및 중독 경험률
2. 연간 낙상 경험률

IV. 사고 및 중독(낙상)

1. 연간 사고 및 중독 경험률

- 연간 사고 및 중독 경험률은 최근 1년 동안 병원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 적이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{연간 사고 및 중독 경험자 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--


- 연간 사고 및 중독 경험률은 전체 3.3%(남자 3.4%, 여자 3.2%)로 조사되었다. 연령별로는 60대가 4.9%로 가장 높았으며 30대(4.3%)가 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도 연간 사고 및 중독 경험률 7.9%보다 감소한 3.2%였으며 울산광역시 전체 경험률 5.8%보다 낮았다.

2. 연간 낙상 경험률


- 연간 낙상 경험률은 최근 1년 동안 넘어진 적이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{연간 낙상 경험자 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 연간 낙상 경험률은 전체 9.5%(남자 7.5%, 여자 11.6%)로 조사되었다. 연령별로는 20대가 12.9%로 가장 높았으며 30대(11.2%), 60대와 70세 이상(10.8%)이 뒤를 이었다.



〈그림 74〉 연간 사고 및 중독 경험률



〈그림 75〉 연간 낙상 경험률

제 2 부 주요통계결과



V. 활동제한 및 삶의 질

1. 양호한 주관적 건강수준 인지율


V. 활동제한 및 삶의 질

1. 양호한 주관적 건강수준 인지율

- 양호한 주관적 건강수준 인지율은 주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”이라고 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”에응답한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 양호한 주관적 건강수준 인지율은 전체 48.9% (남자 53.8%, 여자 43.7%)였다. 20대가 70.6%로 가장 높은 인지율을 보였으며 30대(62.5%)와 40대(53.4%)가 그 뒤를 이었다. 표준화율을 이용한 추세비교에서 전년도에 비해 양호한 주관적 건강수준 인지율 48.3%보다 증가한 53.0%였으며 울산광역시 전체의 46.1%보다 높았다.



〈그림 76〉 양호한 주관적 건강수준 인지도

제 2 부 주요통계결과



Ⅵ. 보건기관 이용

1. 연간 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매) 홍보 및 교육 경험률

VI. 보건기관 이용

【울산 선택지표】


1. 연간 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매) 홍보 및 교육 경험률

- 연간 보건기관 질병 홍보 및 교육 경험률은 보건기관에서 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매)의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어 본 경험이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

보건기관에서 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매)의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어 본 경험이 있는 사람의 수 × 100

조사대상 응답자 수

- 연간 보건기관 질병 홍보 및 교육 경험률은 고혈압이 전체 29.1%(남자 26.7%, 여자 31.8%)로 가장 높았고 치매가 전체 28.6%(남자 26.1%, 여자 31.2%), 당뇨병 전체 28.0%(남자 26.3%, 여자 29.8%) 순으로 높았다.



〈그림 77〉 연간 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매) 홍보 및 교육 경험률

제 2 부 주요통계결과



Ⅶ. 사회 물리적 환경

1. 지역의 사회 물리적 환경에 대한
 긍정적 태도율
2. 사회적 연결망


VII. 사회 물리적 환경

1. 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율

- 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율은 지역의 사회 물리적 환경에 대해 긍정적으로 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{지역의 사회 물리적 환경에 대해 긍정적으로 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율은 ‘자연환경 만족도’가 85.1%로 제일 높았으며 ‘전반적인 안전수준’ 81.1%, ‘생활환경 만족도’ 79.3%, ‘대중교통 만족도’ 67.9%순으로 뒤를 이었다.



〈그림 78〉 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율

2. 사회적 연결망

가. 사회적 연결망(친척)

- 사회적 연결망(친척)은 가장 많이 접촉하는 친척(가족포함)과 보거나 연락하는 빈도로 정의한다.

응답보기별 응답자 수×100
조사대상 응답자 수

- 사회적 연결망(친척)은 ‘일주일에 4번 이상’이 전체 22.8%로 제일 높았으며 ‘일주일에 2~3번’ (19.4%), ‘한 달에 2~3번’ (19.1%), ‘일주일에 1번’ (13.2%)이 뒤를 이었다.

다. 사회적 연결망(친구)

- 사회적 연결망(친구)은 가장 많이 접촉하는 친구(이웃제외)와 보거나 연락하는 빈도로 정의한다.

응답보기별 응답자 수×100
조사대상 응답자 수


- 사회적 연결망(친구)은 ‘일주일에 2~3번’이 전체 23.2%로 제일 높았으며 ‘일주일에 4번 이상’ (19.2%), ‘한 달에 1번 미만’ (17.7%), ‘한달에 2~3번’ (15.8%)이 뒤를 이었다.

나. 사회적 연결망(이웃)


- 사회적 연결망(이웃)은 가장 많이 접촉하는 이웃과 보거나 연락하는 빈도로 정의한다.

응답보기별 응답자 수×100
조사대상 응답자 수


- 사회적 연결망(이웃)은 ‘한 달에 1번 미만’이 전체 50.8%로 제일 높았으며 ‘일주일에 4번 이상’ (17.9%), ‘일주일에 2~3번’ (10.6%), ‘한 달에 1번’ (8.7%)이 뒤를 이었다.



〈그림 79〉 사회적 연결망(친척)



〈그림 80〉 사회적 연결망(이웃)



〈그림 81〉 사회적 연결망(친구)

제 2 부 주요통계결과



Ⅷ. 심폐소생술

1. 심폐소생술 인지율
2. 심폐소생술 교육 경험률

VIII 심폐소생술

【울산 선택지표】

1. 심폐소생술 인지율

- 심폐소생술 인지율은 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$


- 심폐소생술 인지율은 전체 93.8%(남자 96.0%, 여자 91.4%)였다. 30대가 99.4%로 가장 높은 심폐소생술 인지율을 보였으며 40대(99.1%), 60대(97.6%), 50대(96.9%)가 그 뒤를 이었다.

2. 심폐소생술 교육 경험률


- 심폐소생술 교육 경험률은 최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 심폐소생술 교육 경험률은 전체 31.7%(남자 43.0%, 여자 19.7%)였다. 20대가 56.8%로 가장 높은 심폐소생술 교육 경험률을 보였으며 30대(39.7%), 40대(34.0%), 50대(28.1%)가 그 뒤를 이었다.



〈그림 82〉 심폐소생술 인지도



〈그림 83〉 심폐소생술 교육 경험률

제 2 부 주요통계결과



IX. 개인위생

1. 손 씻기 감염병 예방 인지도
2. 손 씻기 실천율
3. 비누, 손 세정제 사용률
4. 연간 손 씻기 교육 및 홍보 경험률


IX. 개인위생

1. 손 씻기 감염병 예방 인지율

- 손 씻기 감염병 예방 인지율은 손 씻기가 감염병(전염병) 예방에 “매우 도움이 된다” 또는 “도움이 된다”에 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{“매우 도움이 된다” 또는 “도움이 된다”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 손 씻기 감염병 예방 인지율은 전체 99.2% (남자 98.8%, 여자 99.6%)였다. 70세 이상이 100.0%로 가장 높은 손 씻기 감염병 예방 인지율을 보였으며 50대(99.6%), 40대(99.4%), 60대(99.3%)가 그 뒤를 이었다.



〈그림 84〉 손 씻기 감염병 예방 인지도

2. 손 씻기 실천율

가. 식사 전 손 씻기 실천율

- 식사 전 손 씻기 실천율은 최근 1주일 동안 식사하기 전 “항상” 또는 “자주” 손을 씻는 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1주일 동안 식사하기 전 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 식사 전 손 씻기 실천율은 전체 91.1%(남자 88.2%, 여자 94.2%)였다. 60대가 94.7%로 가장 높은 식사 전 손 씻기 실천율을 보였으며 30대(93.9%), 50대(91.8%), 40대(90.9%), 20대(89.9%)가 그 뒤를 이었다.

다. 외출 후 손 씻기 실천율

- 외출 후 손 씻기 실천율은 최근 1주일 동안 외출 후 “항상” 또는 “자주” 손을 씻는 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1주일 동안 외출 후 집에 돌아왔을 때 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 외출 후 손 씻기 실천율은 전체 92.2%(남자 89.9%, 여자 94.6%)였다. 30대가 95.1%로 가장 높은 외출 후 손 씻기 실천율을 보였으며 60대(93.4%), 50대(93.3%), 40대(91.7%)가 그 뒤를 이었다.

나. 화장실 다녀온 후 손 씻기 실천율


- 화장실 다녀온 후 손 씻기 실천율은 최근 1주일(7일) 동안 화장실 다녀온 후 “항상” 또는 “자주” 손을 씻는 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1주일 동안 화장실 다녀온 후 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 화장실 다녀온 후 손 씻기 실천율은 전체 94.8%(남자 92.1%, 여자 97.7%)였다. 20대가 97.4%로 가장 높은 화장실 다녀온 후 실천율을 보였으며 30대(96.6%), 40대(95.4%), 50대(94.9%), 60대(92.7%)가 그 뒤를 이었다.



〈그림 85〉 식사 전 손 씻기 실천율



〈그림 86〉 화장실 다녀온 후 손 씻기 실천율



〈그림 87〉 외출 후 손 씻기 실천율

3. 비누, 손 세정제 사용률

- 비누, 손 세정제 사용률은 평소 손을 씻을 때, 비누나 손 세정제를 “항상” 또는 “자주” 씻는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{평소 손을 씻을 때, 비누나 손 세정제를 “항상 사용한다” 또는 “자주 사용한다”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$


- 비누, 손 세정제 사용률은 전체 84.5%(남자 83.7%, 여자 85.3%)였다. 30대가 92.0%로 가장 높은 비누, 손 세정제 사용률을 보였으며 20대(87.5%), 40대(86.7%), 50대(82.3%)가 그 뒤를 이었다.

4. 연간 손 씻기 교육 및 홍보 경험률


- 연간 손 씻기 교육 및 홍보 경험률은 최근 1년 동안 올바른 손 씻기에 관한 교육이나 이와 관련한 홍보물을 본 경험이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 올바른 손 씻기에 관한 교육이나 이와 관련한 홍보물을 본 경험이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 연간 손 씻기 교육 및 홍보 경험률은 전체 77.2%(남자 75.8%, 여자 78.7%)였다. 20대가 87.4%로 가장 높은 연간 손 씻기 교육 및 홍보 경험률을 보였으며 30대(84.6%), 40대(83.0%), 50대(80.5%)가 그 뒤를 이었다.



〈그림 88〉 비누, 손 세정제 사용률



〈그림 89〉 연간 손 씻기 교육 및 홍보 경험률

제3부 통계표

I. 통계표



CHS

제 3 부 통계표



I. 통계표

〈표 1〉 흡연시작연령¹⁾

(단위 : 세)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	341	20.0(0.3)	1.4	323	19.7(0.3)	1.4	18	-(-)	-
연령									
19-29	26	17.4(0.5)	2.8	23	17.4(0.5)	2.9	3	-(-)	-
30-39	43	19.0(0.4)	2.0	41	18.9(0.4)	2.0	2	-(-)	-
40-49	74	19.6(0.7)	3.5	71	19.5(0.7)	3.7	3	-(-)	-
50-59	83	21.1(0.6)	2.9	76	20.3(0.5)	2.5	7	-(-)	-
60-69	53	20.6(0.7)	3.4	51	20.2(0.7)	3.3	2	-(-)	-
70 이상	62	21.4(0.7)	3.3	61	21.2(0.7)	3.3	1	-(-)	-
19-64	260	19.8(0.3)	1.5	243	19.5(0.3)	1.4	17	-(-)	-
65 이상	81	21.1(0.6)	2.7	80	20.9(0.6)	2.7	1	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	13	-(-)	-	11	-(-)	-	2	-(-)	-
초등학교	37	21.7(1.0)	4.5	36	21.3(1.0)	4.7	1	-(-)	-
중학교	42	19.9(0.9)	4.3	39	19.4(0.7)	3.8	3	-(-)	-
고등학교	154	19.7(0.5)	2.3	146	19.4(0.4)	2.2	8	-(-)	-
대학교 이상	93	19.9(0.4)	2.1	89	19.9(0.4)	2.1	4	-(-)	-
직업									
전문행정관리	29	20.5(1.0)	5.1	29	20.5(1.0)	5.1	0	-(-)	-
사무직	38	20.1(0.6)	3.2	35	19.5(0.4)	2.2	3	-(-)	-
판매·서비스직	21	19.9(1.0)	5.0	19	-(-)	-	2	-(-)	-
농림어업	36	21.8(0.9)	3.9	36	21.8(0.9)	3.9	0	-(-)	-
기능단순노무직	138	19.4(0.5)	2.5	135	19.2(0.5)	2.5	3	-(-)	-
기타 ³⁾	79	20.3(0.7)	3.5	69	19.9(0.5)	2.7	10	-(-)	-
월 가구소득									
50만원 미만	9	-(-)	-	9	-(-)	-	0	-(-)	-
50-100만원 미만	35	21.8(0.7)	3.1	34	21.5(0.7)	3.1	1	-(-)	-
100-200만원 미만	44	20.5(0.7)	3.3	43	20.3(0.6)	2.8	1	-(-)	-
200-300만원 미만	70	20.3(0.4)	2.1	63	19.7(0.4)	1.9	7	-(-)	-
300-400만원 미만	97	19.8(0.4)	2.0	92	19.5(0.3)	1.5	5	-(-)	-
400-500만원 미만	48	19.2(1.1)	5.6	47	19.2(1.1)	5.8	1	-(-)	-
500-600만원 미만	16	-(-)	-	14	-(-)	-	2	-(-)	-
600만원 이상	21	19.8(1.6)	7.9	20	19.8(1.7)	8.5	1	-(-)	-

주 : 1) 흡연시작연령 : 처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 2〉 현재흡연율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	21.8(1.4)	6.6	440	39.9(2.1)	5.4	469	2.6(0.8)	33.0
연령									
19-29	114	17.6(3.8)	21.7	61	31.5(5.5)	17.5	53	0.0(0.0)	.
30-39	131	26.1(4.2)	15.9	59	48.1(7.4)	15.4	72	2.3(2.3)	99.4
40-49	187	29.2(3.7)	12.8	91	54.1(6.6)	12.2	96	2.8(2.0)	72.8
50-59	196	22.1(2.9)	13.3	92	37.4(4.9)	13.0	104	4.5(1.9)	42.5
60-69	138	15.9(3.1)	19.1	66	31.2(5.1)	16.5	72	3.3(2.3)	69.8
70 이상	143	11.8(3.0)	25.8	71	23.8(6.4)	27.1	72	1.6(1.6)	101.2
19-64	715	23.5(1.6)	7.0	342	42.3(2.3)	5.4	373	2.8(1.0)	35.2
65 이상	194	12.3(2.5)	20.3	98	24.9(5.2)	20.8	96	1.2(1.2)	101.4
교육수준 ²⁾									
무학	53	8.6(3.6)	41.2	12	-(-)	-	41	6.1(4.1)	68.5
초등학교	115	10.9(2.8)	25.3	42	30.4(7.7)	25.5	73	1.5(1.4)	98.3
중학교	100	21.1(4.3)	20.1	46	41.9(7.5)	17.9	54	3.5(2.4)	70.1
고등학교	361	26.3(2.6)	10.0	201	42.8(3.7)	8.6	160	2.3(1.1)	49.0
대학교 이상	278	20.6(3.0)	14.4	137	37.7(4.9)	12.9	141	2.3(1.6)	70.5
직업									
전문행정관리	74	14.4(4.4)	30.5	40	24.4(6.3)	26.0	34	0.0(0.0)	.
사무직	94	27.7(4.7)	17.1	52	41.6(6.8)	16.3	42	7.5(4.5)	59.1
판매·서비스직	106	15.9(4.2)	26.2	27	46.2(9.6)	20.8	79	2.2(1.5)	70.4
농림어업	64	28.4(5.9)	20.7	39	47.1(8.1)	17.2	25	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	216	42.2(3.2)	7.6	175	49.7(3.6)	7.2	41	4.5(3.2)	70.5
기타 ³⁾	355	8.6(1.6)	19.0	107	23.6(4.3)	18.4	248	2.0(0.9)	44.2
월 가구소득									
50만원 미만	42	8.3(3.6)	42.9	11	-(-)	-	31	0.0(0.0)	.
50-100만원 미만	91	12.0(2.8)	23.2	42	23.8(6.4)	27.0	49	2.3(2.2)	98.6
100-200만원 미만	122	15.8(3.6)	22.7	62	29.5(6.1)	20.8	60	2.0(2.0)	102.1
200-300만원 미만	165	29.7(3.7)	12.4	82	49.7(5.4)	10.9	83	5.4(2.8)	51.5
300-400만원 미만	241	22.7(2.5)	10.8	119	42.2(3.9)	9.3	122	2.0(1.4)	69.5
400-500만원 미만	141	24.7(3.9)	15.8	71	43.4(5.5)	12.6	70	1.5(1.5)	98.6
500-600만원 미만	41	13.1(5.1)	39.1	21	22.9(8.4)	36.6	20	0.0(0.0)	.
600만원 이상	64	24.4(4.8)	19.9	31	43.2(7.4)	17.2	33	4.9(4.8)	97.4

주 : 1) 현재흡연율 : (평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수 / 조사대상 응답자 수 × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 3〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량¹⁾

(단위 : %, 개비)

구분	N ²⁾	10개비 미만		10-19개비		20-39개비		40개비 이상		평균	
		%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	%(표준오차)	변동 계수	개비 (표준오차)	변동 계수
전체	166	12.4(2.2)	17.4	36.1(3.9)	10.7	50.1(4.1)	8.2	1.3(0.9)	70.4	15.6(0.6)	3.7
성											
남자	157	10.5(2.2)	20.6	36.0(3.8)	10.6	52.1(4.2)	8.1	1.4(1.0)	70.2	15.9(0.6)	3.6
여자	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
연령											
19-29	20	5.0(4.6)	92.5	66.6(11.3)	16.9	28.3(9.2)	32.5	0.0(0.0)	.	13.2(0.9)	6.5
30-39	29	14.3(6.1)	42.4	34.5(9.9)	28.6	51.3(11.2)	21.8	0.0(0.0)	.	14.9(1.2)	8.2
40-49	47	8.5(3.2)	38.4	32.0(7.2)	22.3	57.3(6.8)	11.9	2.3(2.3)	102.1	16.3(1.0)	6.2
50-59	38	18.2(6.2)	34.2	29.2(7.5)	25.8	49.8(7.0)	14.1	2.8(2.7)	97.0	16.9(1.8)	10.4
60-69	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
70 이상	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
19-64	148	12.6(2.3)	18.6	36.5(4.1)	11.1	49.5(4.2)	8.6	1.4(1.0)	70.2	15.5(0.6)	3.9
65 이상	18	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
교육수준 ³⁾											
무학	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	21	6.5(4.6)	70.8	24.5(6.8)	27.7	61.8(8.8)	14.3	7.1(6.9)	96.8	19.6(2.0)	10.0
고등학교	80	16.6(4.0)	24.0	29.3(5.0)	17.2	53.0(5.6)	10.6	1.2(1.2)	99.4	15.6(0.8)	5.0
대학교 이상	51	8.0(3.2)	39.3	50.9(7.1)	13.9	41.1(6.4)	15.6	0.0(0.0)	.	14.3(0.7)	4.8
직업											
전문행정관리	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
사무직	20	0.0(0.0)	.	36.0(11.9)	32.9	64.0(11.9)	18.5	0.0(0.0)	.	16.4(1.2)	7.2
판매·서비스직	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
농림어업	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	81	11.3(3.3)	29.4	31.9(4.6)	14.5	55.4(5.4)	9.7	1.4(1.4)	100.9	16.2(0.7)	4.6
기타 ⁴⁾	28	24.5(8.3)	33.8	32.9(9.0)	27.2	42.6(7.5)	17.6	0.0(0.0)	.	13.3(1.2)	8.9
월 가구소득											
50만원미만	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-100만원미만	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	42	14.4(4.9)	33.7	29.3(7.0)	23.8	56.3(6.4)	11.4	0.0(0.0)	.	15.2(0.7)	4.7
300-400만원 미만	48	14.6(5.0)	34.2	39.3(8.3)	21.0	46.1(7.9)	17.2	0.0(0.0)	.	14.6(0.9)	6.3
400-500만원 미만	31	8.3(3.9)	47.4	43.1(8.3)	19.3	45.5(8.1)	17.9	3.1(3.1)	101.5	16.5(1.6)	10.0
500-600만원 미만	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
600만원이상	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-

주 : 1) 매일흡연자의 하루 평균 흡연량 : 하루 평균 흡연개비 수의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일흡연자 수

2) 평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일흡연자 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 4〉 현재흡연자의 금연시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	181	32.7(3.7)	11.2	169	32.8(4.0)	12.1	12	-(-)	-
연령									
19-29	20	41.3(11.4)	27.7	20	41.3(11.4)	27.7	0	-(-)	-
30-39	30	33.3(7.8)	23.3	28	32.6(8.1)	25.0	2	-(-)	-
40-49	50	38.1(6.5)	17.1	48	39.9(6.7)	16.7	2	-(-)	-
50-59	41	27.4(8.1)	29.7	36	30.3(9.0)	29.6	5	-(-)	-
60-69	21	30.7(10.6)	34.6	19	-(-)	-	2	-(-)	-
70 이상	19	-(-)	-	18	-(-)	-	1	-(-)	-
19-64	155	34.6(3.8)	11.1	144	35.1(4.1)	11.7	11	-(-)	-
65 이상	26	13.5(7.9)	58.0	25	8.8(6.1)	69.5	1	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	4	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-
초등학교	14	-(-)	-	13	-(-)	-	1	-(-)	-
중학교	21	13.5(8.3)	61.6	19	-(-)	-	2	-(-)	-
고등학교	87	32.0(5.7)	17.9	83	32.3(5.9)	18.3	4	-(-)	-
대학교 이상	54	39.4(7.0)	17.8	51	40.2(7.4)	18.3	3	-(-)	-
직업									
전문행정관리	10	-(-)	-	10	-(-)	-	0	-(-)	-
사무직	23	29.0(9.7)	33.3	20	29.6(10.5)	35.6	3	-(-)	-
판매·서비스직	14	-(-)	-	12	-(-)	-	2	-(-)	-
농림어업	16	-(-)	-	16	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	85	34.4(5.0)	14.6	83	34.1(5.1)	15.0	2	-(-)	-
기타 ³⁾	33	26.8(9.3)	34.5	28	24.1(10.1)	42.1	5	-(-)	-
월 가구소득									
50만원 미만	4	-(-)	-	4	-(-)	-	0	-(-)	-
50-100만원 미만	12	-(-)	-	11	-(-)	-	1	-(-)	-
100-200만원 미만	17	-(-)	-	16	-(-)	-	1	-(-)	-
200-300만원 미만	45	33.0(6.8)	20.7	40	34.1(7.5)	22.0	5	-(-)	-
300-400만원 미만	51	28.5(5.5)	19.2	48	28.2(5.8)	20.6	3	-(-)	-
400-500만원 미만	32	45.3(11.4)	25.2	31	46.6(12.1)	26.0	1	-(-)	-
500-600만원 미만	6	-(-)	-	6	-(-)	-	0	-(-)	-
600만원 이상	14	-(-)	-	13	-(-)	-	1	-(-)	-

주 : 1) 현재흡연자의 금연시도율 : (최근 1년 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 수 / 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 5〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	181	7.5(2.0)	26.8	169	7.9(2.1)	26.5	12	-(-)	-
연령									
19-29	20	10.0(6.5)	65.7	20	10.0(6.5)	65.7	0	-(-)	-
30-39	30	0.0(0.0)	.	28	0.0(0.0)	.	2	-(-)	-
40-49	50	8.7(4.4)	50.3	48	9.1(4.5)	49.4	2	-(-)	-
50-59	41	14.5(6.0)	41.6	36	16.0(6.7)	41.8	5	-(-)	-
60-69	21	4.1(4.1)	100.2	19	-(-)	-	2	-(-)	-
70 이상	19	-(-)	-	18	-(-)	-	1	-(-)	-
19-64	155	7.8(2.2)	28.1	144	8.3(2.3)	27.7	11	-(-)	-
65 이상	26	4.0(3.9)	99.6	25	4.2(4.2)	99.9	1	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	4	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-
초등학교	14	-(-)	-	13	-(-)	-	1	-(-)	-
중학교	21	0.0(0.0)	.	19	-(-)	-	2	-(-)	-
고등학교	87	10.2(3.2)	31.3	83	10.6(3.3)	31.0	4	-(-)	-
대학교 이상	54	6.8(3.9)	57.1	51	7.2(4.1)	56.6	3	-(-)	-
직업									
전문행정관리	10	-(-)	-	10	-(-)	-	0	-(-)	-
사무직	23	14.4(7.9)	54.7	20	16.2(8.6)	53.5	3	-(-)	-
판매·서비스직	14	-(-)	-	12	-(-)	-	2	-(-)	-
농림어업	16	-(-)	-	16	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	85	6.7(2.7)	40.6	83	6.8(2.7)	40.5	2	-(-)	-
기타 ³⁾	33	4.3(4.0)	94.6	28	5.1(4.7)	92.5	5	-(-)	-
월 가구소득									
50만원 미만	4	-(-)	-	4	-(-)	-	0	-(-)	-
50-100만원 미만	12	-(-)	-	11	-(-)	-	1	-(-)	-
100-200만원 미만	17	-(-)	-	16	-(-)	-	1	-(-)	-
200-300만원 미만	45	5.7(3.9)	69.0	40	6.2(4.3)	68.6	5	-(-)	-
300-400만원 미만	51	6.2(3.7)	59.7	48	6.5(3.8)	59.2	3	-(-)	-
400-500만원 미만	32	13.2(6.4)	48.9	31	13.5(6.5)	47.8	1	-(-)	-
500-600만원 미만	6	-(-)	-	6	-(-)	-	0	-(-)	-
600만원 이상	14	-(-)	-	13	-(-)	-	1	-(-)	-

주 : 1) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률 : 1개월 내 금연계획이 있는 사람의 수 / 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 6〉 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	728	2.8(0.8)	29.0	271	2.1(1.3)	59.7	457	3.3(1.0)	28.7
연령									
19-29	94	5.8(3.1)	52.9	41	4.7(4.6)	96.8	53	6.8(4.1)	59.8
30-39	101	1.8(1.8)	99.4	31	4.9(4.7)	94.5	70	0.0(0.0)	.
40-49	137	2.1(1.2)	55.7	43	2.4(2.2)	93.9	94	1.9(1.3)	69.0
50-59	155	2.3(1.4)	61.9	56	0.0(0.0)	.	99	4.0(2.4)	61.9
60-69	117	2.7(1.5)	55.2	47	0.0(0.0)	.	70	4.3(2.3)	52.6
70 이상	124	2.3(1.0)	44.2	53	0.0(0.0)	.	71	3.8(1.7)	43.8
19-64	560	3.0(1.0)	32.4	198	2.5(1.5)	59.8	362	3.3(1.1)	33.4
65 이상	168	2.2(0.9)	40.5	73	0.0(0.0)	.	95	3.6(1.4)	39.7
교육수준 ²⁾									
무학	49	5.8(2.5)	43.4	10	-(-)	-	39	7.1(3.0)	42.7
초등학교	101	2.4(1.7)	71.2	29	0.0(0.0)	.	72	3.2(2.3)	70.9
중학교	79	3.4(2.0)	57.1	27	0.0(0.0)	.	52	5.2(2.9)	55.8
고등학교	274	2.0(1.4)	68.7	118	2.1(2.1)	99.5	156	1.9(1.2)	59.8
대학교 이상	224	3.3(1.4)	40.8	86	3.1(2.2)	71.2	138	3.5(1.7)	49.9
직업									
전문행정관리	64	4.7(3.2)	68.1	30	9.1(6.3)	68.6	34	0.0(0.0)	.
사무직	71	2.6(1.9)	71.7	32	0.0(0.0)	.	39	5.0(3.7)	73.4
판매·서비스직	92	5.1(2.9)	56.8	15	-(-)	-	77	4.5(2.3)	50.3
농림어업	48	6.3(4.4)	69.1	23	0.0(0.0)	.	25	11.4(7.4)	64.9
기능단순노무직	131	1.0(1.0)	99.5	92	1.4(1.4)	99.6	39	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	322	2.2(1.1)	46.9	79	0.0(0.0)	.	243	3.0(1.4)	46.7
월 가구소득									
50만원 미만	38	6.6(2.5)	37.8	7	-(-)	-	31	8.2(3.1)	37.3
50-100만원 미만	79	1.4(1.4)	99.3	31	0.0(0.0)	.	48	2.3(2.3)	97.4
100-200만원 미만	105	3.4(2.6)	75.7	46	0.0(0.0)	.	59	5.8(4.3)	73.5
200-300만원 미만	120	1.0(1.0)	99.2	42	0.0(0.0)	.	78	1.6(1.6)	98.5
300-400만원 미만	190	1.3(0.8)	60.6	71	0.0(0.0)	.	119	2.2(1.3)	60.8
400-500만원 미만	109	7.5(3.8)	50.4	40	8.1(5.8)	71.7	69	7.0(3.5)	50.2
500-600만원 미만	35	4.5(4.6)	101.7	15	-(-)	-	20	0.0(0.0)	.
600만원 이상	50	0.0(0.0)	.	18	-(-)	-	32	0.0(0.0)	.

주 : 1) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 : (최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 7〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	395	19.4(2.2)	11.2	186	24.0(3.5)	14.5	209	14.8(2.3)	15.4
연령									
19-29	32	13.1(6.2)	47.5	12	-()	-	20	5.2(5.2)	100.0
30-39	62	21.8(6.1)	28.0	30	25.3(9.8)	38.7	32	17.2(6.3)	36.7
40-49	102	22.2(3.8)	17.0	42	28.9(6.2)	21.6	60	17.1(4.9)	28.5
50-59	104	19.3(4.1)	21.4	47	22.4(5.5)	24.5	57	15.7(4.8)	30.3
60-69	68	20.5(5.4)	26.5	38	22.8(6.0)	26.2	30	18.0(8.0)	44.2
70 이상	27	4.7(4.5)	97.6	17	-()	-	10	-()	-
19-64	341	19.9(2.4)	12.2	151	25.2(4.1)	16.3	190	15.0(2.4)	16.0
65 이상	54	14.0(4.9)	34.8	35	14.7(5.8)	39.2	19	-()	-
교육수준 ²⁾									
무학	8	-()	-	1	-()	-	7	-()	-
초등학교	42	18.4(6.0)	32.6	15	-()	-	27	11.1(7.0)	62.7
중학교	41	23.4(7.8)	33.3	15	-()	-	26	21.4(7.6)	35.6
고등학교	165	20.5(3.1)	15.3	82	22.6(4.6)	20.2	83	18.2(3.5)	19.4
대학교 이상	138	17.8(3.5)	19.6	72	23.2(5.8)	24.9	66	11.0(3.9)	35.7
직업									
전문행정관리	62	9.5(3.9)	41.0	28	13.2(7.5)	56.5	34	5.8(4.0)	69.5
사무직	70	22.2(5.0)	22.6	32	26.7(8.7)	32.6	38	18.1(5.5)	30.1
판매·서비스직	90	17.2(3.9)	22.8	14	-()	-	76	16.3(4.2)	25.6
농림어업	45	3.7(3.6)	94.7	22	0.0(0.0)	.	23	6.7(6.1)	90.7
기능단순노무직	128	27.6(4.2)	15.3	90	30.5(4.7)	15.4	38	19.9(6.6)	33.2
기타 ³⁾	0	-()	-	0	-()	-	0	-()	-
월 가구소득									
50만원 미만	7	-()	-	2	-()	-	5	-()	-
50-100만원 미만	16	-()	-	7	-()	-	9	-()	-
100-200만원 미만	58	19.2(6.6)	34.2	29	22.6(8.2)	36.0	29	15.8(6.8)	42.8
200-300만원 미만	74	23.7(5.7)	24.2	31	32.5(8.2)	25.2	43	16.3(5.7)	35.0
300-400만원 미만	118	16.4(3.8)	23.1	59	18.3(4.8)	26.0	59	14.2(5.0)	35.3
400-500만원 미만	68	19.4(4.8)	24.9	31	28.1(8.3)	29.4	37	10.1(5.0)	49.7
500-600만원 미만	22	30.6(11.9)	38.9	12	-()	-	10	-()	-
600만원 이상	32	15.3(5.7)	37.2	15	-()	-	17	-()	-

주 : 1) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 : (최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 8〉 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	76	11.8(4.0)	33.5	73	12.2(4.1)	33.8	3	—(—)	—
연령									
19-29	10	—(—)	—	10	—(—)	—	0	—(—)	—
30-39	17	—(—)	—	16	—(—)	—	1	—(—)	—
40-49	21	3.9(3.9)	99.9	21	3.9(3.9)	99.9	0	—(—)	—
50-59	15	—(—)	—	14	—(—)	—	1	—(—)	—
60-69	10	—(—)	—	10	—(—)	—	0	—(—)	—
70 이상	3	—(—)	—	2	—(—)	—	1	—(—)	—
19-64	69	10.5(3.9)	37.0	67	10.7(4.0)	37.2	2	—(—)	—
65 이상	7	—(—)	—	6	—(—)	—	1	—(—)	—
교육수준 ²⁾									
무학	1	—(—)	—	0	—(—)	—	1	—(—)	—
초등학교	3	—(—)	—	3	—(—)	—	0	—(—)	—
중학교	5	—(—)	—	5	—(—)	—	0	—(—)	—
고등학교	42	13.4(6.2)	46.4	41	13.7(6.3)	46.2	1	—(—)	—
대학교 이상	25	3.8(3.7)	96.7	24	3.9(3.9)	99.5	1	—(—)	—
직업									
전문행정관리	6	—(—)	—	6	—(—)	—	0	—(—)	—
사무직	11	—(—)	—	10	—(—)	—	1	—(—)	—
판매·서비스직	7	—(—)	—	6	—(—)	—	1	—(—)	—
농림어업	5	—(—)	—	5	—(—)	—	0	—(—)	—
기능단순노무직	39	3.0(2.1)	70.2	38	3.1(2.2)	70.2	1	—(—)	—
기타 ³⁾	8	—(—)	—	8	—(—)	—	0	—(—)	—
월 가구소득									
50만원 미만	1	—(—)	—	1	—(—)	—	0	—(—)	—
50-100만원 미만	3	—(—)	—	2	—(—)	—	1	—(—)	—
100-200만원 미만	6	—(—)	—	6	—(—)	—	0	—(—)	—
200-300만원 미만	21	12.2(5.9)	48.7	19	—(—)	—	2	—(—)	—
300-400만원 미만	24	2.4(2.4)	99.4	24	2.4(2.4)	99.4	0	—(—)	—
400-500만원 미만	13	—(—)	—	13	—(—)	—	0	—(—)	—
500-600만원 미만	4	—(—)	—	4	—(—)	—	0	—(—)	—
600만원 이상	4	—(—)	—	4	—(—)	—	0	—(—)	—

주 : 1) 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률 : (금연구역 내에서 “항상” 또는 “가끔” 흡연하는 사람의 수 / 금연구역이 지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있는 현재 흡연자 (“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 9〉 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	727	87.6(1.0)	1.2	271	84.3(2.1)	2.5	456	89.8(1.3)	1.4
연령									
19-29	94	93.9(2.6)	2.8	41	89.2(5.4)	6.0	53	98.1(1.8)	1.9
30-39	101	95.6(2.5)	2.6	31	88.0(6.4)	7.3	70	100.0(0.0)	0.0
40-49	137	88.3(2.8)	3.1	43	87.1(4.8)	5.5	94	88.9(3.4)	3.8
50-59	154	83.6(3.1)	3.8	56	75.8(6.3)	8.3	98	89.6(2.9)	3.3
60-69	117	87.5(2.8)	3.2	47	87.2(4.6)	5.2	70	87.7(3.8)	4.4
70 이상	124	74.9(3.7)	5.0	53	81.5(6.1)	7.4	71	70.6(4.6)	6.5
19-64	559	89.4(1.2)	1.4	198	84.5(2.5)	3.0	361	92.6(1.3)	1.4
65 이상	168	79.0(3.2)	4.1	73	83.3(4.3)	5.2	95	76.1(4.1)	5.3
교육수준 ²⁾									
무학	49	71.4(6.5)	9.1	10	—(—)	—	39	69.8(6.4)	9.2
초등학교	101	79.5(3.2)	4.1	29	84.4(4.9)	5.9	72	77.9(4.4)	5.6
중학교	79	83.7(4.2)	5.1	27	84.0(7.2)	8.5	52	83.6(5.0)	6.0
고등학교	273	89.4(1.9)	2.1	118	84.2(3.4)	4.1	155	93.9(1.9)	2.0
대학교 이상	224	91.4(2.2)	2.4	86	84.8(4.1)	4.9	138	95.9(1.9)	1.9
직업									
전문행정관리	64	89.2(3.5)	3.9	30	85.5(6.1)	7.2	34	93.1(4.2)	4.5
사무직	71	92.4(3.2)	3.4	32	86.6(6.2)	7.2	39	97.7(2.3)	2.4
판매·서비스직	92	90.5(3.3)	3.7	15	—(—)	—	77	89.5(4.1)	4.6
농림어업	48	80.3(6.8)	8.5	23	94.6(5.2)	5.5	25	68.8(12.0)	17.4
기능단순노무직	131	81.6(3.6)	4.4	92	78.7(5.1)	6.5	39	89.5(4.0)	4.5
기타 ³⁾	321	88.5(1.9)	2.2	79	85.5(4.5)	5.3	242	89.6(1.9)	2.1
월 가구소득									
50만원 미만	38	71.6(6.2)	8.7	7	—(—)	—	31	67.8(7.3)	10.8
50-100만원 미만	79	81.1(4.0)	4.9	31	88.1(5.7)	6.4	48	76.7(5.2)	6.8
100-200만원 미만	105	89.7(2.9)	3.2	46	89.1(3.5)	3.9	59	90.2(3.8)	4.2
200-300만원 미만	119	82.0(3.6)	4.4	42	74.8(5.7)	7.6	77	86.7(3.8)	4.4
300-400만원 미만	190	93.4(2.2)	2.3	71	90.9(3.3)	3.6	119	94.9(2.1)	2.2
400-500만원 미만	109	92.8(2.4)	2.6	40	89.7(4.4)	4.9	69	95.0(2.5)	2.6
500-600만원 미만	35	80.4(6.1)	7.6	15	—(—)	—	20	96.0(4.0)	4.1
600만원 이상	50	85.3(5.8)	6.8	18	—(—)	—	32	92.0(4.0)	4.3

주 : 1) 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률 : (공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 현재비흡연자 (과거흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 10〉 연간 금연 시도 횟수¹⁾

(단위 : 회)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	54	2.0(0.2)	10.0	50	2.1(0.2)	9.9	4	-(-)	-
연령									
19-29	8	-(-)	-	8	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	10	-(-)	-	9	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	19	-(-)	-	19	-(-)	-	0	-(-)	-
50-59	10	-(-)	-	10	-(-)	-	0	-(-)	-
60-69	6	-(-)	-	4	-(-)	-	2	-(-)	-
70 이상	1	-(-)	-	0	-(-)	-	1	-(-)	-
19-64	51	2.0(0.2)	10.4	48	2.0(0.2)	10.2	3	-(-)	-
65 이상	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	2	-(-)	-	0	-(-)	-	2	-(-)	-
초등학교	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
중학교	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
고등학교	26	2.3(0.3)	13.2	25	2.3(0.3)	13.4	1	-(-)	-
대학교 이상	21	1.8(0.3)	16.2	20	1.8(0.3)	16.5	1	-(-)	-
직업									
전문행정관리	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
사무직	7	-(-)	-	6	-(-)	-	1	-(-)	-
판매·서비스직	5	-(-)	-	5	-(-)	-	0	-(-)	-
농림어업	5	-(-)	-	5	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	27	2.1(0.3)	13.6	26	2.1(0.3)	13.6	1	-(-)	-
기타 ³⁾	7	-(-)	-	5	-(-)	-	2	-(-)	-
월 가구소득									
50만원 미만	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
50-100만원 미만	4	-(-)	-	3	-(-)	-	1	-(-)	-
100-200만원 미만	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
200-300만원 미만	13	-(-)	-	12	-(-)	-	1	-(-)	-
300-400만원 미만	14	-(-)	-	13	-(-)	-	1	-(-)	-
400-500만원 미만	13	-(-)	-	13	-(-)	-	0	-(-)	-
500-600만원 미만	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
600만원 이상	5	-(-)	-	5	-(-)	-	0	-(-)	-

주 : 1) 연간 금연 시도 횟수 : (최근 1년 동안 금연 시도 횟수의 총 합 / 최근 1년 동안 금연을 시도한 적이 있는 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수)

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 11〉 효과적인 금연 프로그램¹⁾

(단위 : %)

구분	N ²⁾	공익광고 (TV, 라디오, 포스터 등)		금연교육		금연클리닉		금연상담전화	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	294	20.3(2.3)	11.4	24.4(2.8)	11.5	48.6(3.2)	6.7	6.7(1.3)	19.0
연령									
19-29	24	27.8(10.4)	37.3	15.0(7.7)	51.2	53.6(12.2)	22.8	3.5(3.5)	99.3
30-39	36	13.4(5.9)	44.3	19.6(5.8)	29.4	61.0(8.6)	14.1	6.0(2.7)	45.5
40-49	69	12.5(3.9)	30.9	20.9(5.5)	26.5	63.0(6.2)	9.8	3.7(2.1)	57.8
50-59	76	26.9(4.8)	17.9	29.6(4.7)	16.0	38.5(5.0)	13.0	5.0(2.5)	51.1
60-69	39	33.3(8.4)	25.1	23.1(7.1)	30.5	36.2(9.1)	25.1	7.3(4.1)	56.3
70 이상	50	13.8(4.9)	35.8	37.9(6.8)	18.1	25.6(5.5)	21.7	22.7(5.4)	23.7
19-64	231	20.8(2.6)	12.5	22.3(3.0)	13.3	52.4(3.6)	6.9	4.5(1.2)	27.1
65 이상	63	16.8(5.5)	32.7	38.2(6.3)	16.5	23.9(4.9)	20.5	21.0(4.6)	21.7
교육수준 ³⁾									
무학	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	29	16.6(7.0)	42.2	28.9(8.3)	28.6	32.1(9.1)	28.4	22.3(7.8)	35.0
중학교	39	30.1(8.0)	26.4	24.4(6.9)	28.2	29.7(7.9)	26.5	15.8(5.7)	36.2
고등학교	129	19.9(3.5)	17.7	24.6(4.3)	17.3	50.5(4.8)	9.5	5.0(1.6)	32.1
대학교 이상	87	20.1(4.1)	20.6	21.5(4.6)	21.4	56.0(5.9)	10.5	2.4(1.7)	70.6
직업									
전문행정관리	26	12.5(6.4)	51.4	20.2(7.5)	37.1	62.9(10.9)	17.3	4.4(4.2)	95.5
사무직	33	11.6(5.3)	45.7	14.7(6.5)	44.3	73.7(8.7)	11.8	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	20	32.4(11.0)	33.9	28.1(9.4)	33.3	33.0(10.2)	30.8	6.4(1.3)	20.7
농림어업	30	29.1(7.8)	27.0	44.0(10.1)	23.0	13.5(5.9)	43.4	13.4(5.9)	44.1
기능단순노무직	121	22.5(4.3)	18.9	25.7(4.3)	16.7	46.8(4.8)	10.4	4.9(2.1)	41.8
기타 ⁴⁾	64	17.0(4.7)	27.6	21.9(5.0)	23.0	46.1(7.7)	16.6	15.1(4.7)	31.4
월 가구소득									
50만원 미만	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-100만원 미만	28	5.4(5.2)	96.4	51.6(10.5)	20.3	22.9(8.8)	38.5	20.0(7.8)	39.0
100-200만원 미만	33	34.2(9.0)	26.3	33.3(8.7)	26.1	30.5(8.3)	27.1	2.1(2.1)	100.3
200-300만원 미만	57	27.2(5.5)	20.1	15.1(4.4)	29.0	48.6(6.8)	13.9	9.1(2.7)	30.0
300-400만원 미만	92	23.1(4.0)	17.1	18.3(3.8)	20.5	51.8(5.0)	9.7	6.7(2.5)	37.1
400-500만원 미만	43	12.3(4.4)	36.2	31.2(8.4)	27.0	54.1(8.5)	15.7	2.5(2.2)	90.4
500-600만원 미만	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
600만원 이상	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-

주 : 1) 효과적인 금연 프로그램 : (응답보기별 응답자 수 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자 수) × 100

2) 평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자의 수 (추가)

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 12〉 금연정책 강화 필요 영역¹⁾

(단위 : %)

구분	금연구역 확대			금연구역 내 흡연 단속 (과태료 인상)		금연클리닉 확대 운영		금연 교육 및 홍보 강화		더 강화할 정책이 없다	
	N	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	877	19.1(1.6)	8.2	37.9(2.0)	5.2	17.5(1.5)	8.7	15.8(1.4)	8.9	9.6(1.1)	11.2
연령											
19-29	114	20.8(3.4)	16.5	52.1(4.8)	9.3	17.1(4.1)	23.9	4.8(1.9)	39.4	5.1(2.0)	39.4
30-39	127	22.9(3.5)	15.5	43.5(4.3)	9.9	14.9(2.9)	19.2	11.7(3.0)	25.5	7.0(2.7)	38.9
40-49	182	18.7(2.6)	14.0	34.6(3.5)	10.3	21.8(3.4)	15.4	19.0(3.1)	16.5	5.9(1.8)	29.6
50-59	193	21.3(3.6)	16.8	25.0(3.4)	13.8	22.8(3.1)	13.4	21.4(3.5)	16.5	9.5(2.1)	22.2
60-69	131	14.6(2.9)	19.8	40.8(5.0)	12.1	14.7(3.3)	22.2	14.9(2.9)	19.1	15.0(4.7)	31.2
70 이상	130	11.5(2.9)	25.0	37.4(4.0)	10.7	5.0(2.2)	44.1	22.3(3.2)	14.5	23.9(3.9)	16.2
19-64	698	20.4(1.8)	8.7	38.2(2.2)	5.8	19.3(1.7)	9.0	15.1(1.6)	10.3	7.0(1.0)	14.3
65 이상	179	11.7(2.6)	22.2	36.2(3.7)	10.3	6.8(2.4)	35.2	20.3(2.8)	13.9	25.0(3.5)	14.0
교육수준 ²⁾											
무학	42	11.8(5.2)	44.1	32.6(8.4)	25.7	6.0(4.2)	70.1	13.0(4.4)	34.0	36.6(8.4)	22.9
초등학교	105	11.4(2.8)	24.4	37.7(4.2)	11.1	7.5(2.3)	31.0	17.6(3.2)	18.2	25.8(4.3)	16.7
중학교	97	19.6(4.9)	25.3	34.5(5.2)	15.1	14.5(3.5)	23.8	22.5(4.2)	18.6	8.9(3.1)	34.3
고등학교	356	20.0(2.5)	12.5	35.1(2.9)	8.2	19.4(2.4)	12.1	16.6(2.3)	13.7	8.9(1.6)	17.6
대학교 이상	276	20.5(2.4)	11.6	43.1(3.5)	8.2	19.6(2.5)	12.9	13.0(2.1)	16.2	3.9(1.3)	32.3
직업											
전문행정관리	74	24.2(4.4)	18.0	39.2(4.7)	11.9	25.8(5.0)	19.5	7.8(4.0)	51.4	3.1(2.2)	70.4
사무직	93	21.4(4.2)	19.7	39.3(5.6)	14.3	14.6(4.0)	27.2	20.5(4.6)	22.7	4.3(2.1)	50.3
판매·서비스직	99	25.0(4.4)	17.5	34.8(4.9)	14.0	15.1(3.1)	20.7	13.0(3.3)	25.7	12.0(3.8)	31.9
농림어업	61	15.0(4.7)	31.5	36.2(6.3)	17.3	8.6(3.9)	45.1	20.7(5.1)	24.4	19.5(5.4)	27.9
기능단순노무직	207	14.6(2.4)	16.7	28.7(3.1)	10.8	24.4(3.4)	14.1	20.8(3.0)	14.4	11.6(2.5)	21.5
기타 ³⁾	343	18.9(2.3)	12.0	44.5(2.8)	6.2	13.8(2.1)	15.0	13.1(2.0)	15.0	9.7(1.7)	17.4
월 가구소득											
50만원 미만	37	19.1(7.2)	37.7	36.6(7.4)	20.2	8.1(5.6)	68.7	4.6(3.2)	70.7	31.6(8.6)	27.2
50-100만원 미만	82	14.6(4.4)	29.9	43.9(7.4)	16.7	4.2(2.8)	65.7	16.5(4.6)	28.1	20.8(5.3)	25.6
100-200만원 미만	113	20.6(4.1)	20.0	41.6(5.4)	13.0	8.0(2.6)	32.3	12.3(3.6)	29.7	17.4(5.0)	28.6
200-300만원 미만	161	18.2(3.6)	20.0	26.6(3.7)	14.1	20.2(3.9)	19.6	22.9(3.5)	15.3	12.2(3.0)	24.5
300-400만원 미만	239	18.4(3.2)	17.3	41.7(3.6)	8.6	21.6(3.7)	16.9	15.1(2.4)	15.7	3.2(1.1)	34.4
400-500만원 미만	140	25.8(3.6)	13.9	37.4(5.3)	14.3	18.5(3.1)	16.6	13.9(3.5)	25.4	4.5(1.9)	43.3
500-600만원 미만	41	13.8(5.8)	42.1	42.7(9.2)	21.7	21.6(7.8)	36.1	16.3(5.2)	32.1	5.6(3.6)	64.6
600만원 이상	62	15.4(4.4)	28.7	38.9(6.1)	15.7	20.4(6.1)	29.7	13.6(3.7)	27.5	11.7(4.0)	34.3

주 : 1) 금연정책 강화 필요 영역 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 13〉 음주시작연령¹⁾

(단위 : 세)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	768	20.9(0.2)	1.0	412	19.2(0.2)	0.9	356	23.2(0.4)	1.6
연령									
19-29	101	18.8(0.2)	1.0	54	18.5(0.3)	1.5	47	19.1(0.2)	0.9
30-39	121	18.6(0.2)	1.2	57	17.9(0.3)	1.6	64	19.5(0.2)	1.2
40-49	176	20.0(0.3)	1.5	90	18.7(0.2)	1.0	86	21.5(0.6)	2.6
50-59	169	21.8(0.5)	2.3	89	19.7(0.4)	2.2	80	25.0(1.0)	4.2
60-69	113	26.4(0.9)	3.4	61	21.3(0.6)	2.6	52	31.4(1.4)	4.3
70 이상	88	23.6(1.1)	4.7	61	20.5(0.6)	2.9	27	29.4(2.6)	8.9
19-64	640	20.5(0.2)	1.0	324	18.9(0.2)	0.9	316	22.4(0.4)	1.6
65 이상	128	24.2(0.8)	3.3	88	20.6(0.5)	2.3	40	30.7(1.9)	6.2
교육수준 ²⁾									
무학	21	26.7(2.8)	10.6	9	-(-)	-	12	-(-)	-
초등학교	87	27.0(1.2)	4.3	38	20.4(0.8)	4.1	49	31.3(1.6)	5.2
중학교	83	23.4(0.9)	4.0	42	19.4(0.5)	2.3	41	27.5(1.6)	5.8
고등학교	319	20.3(0.2)	1.2	189	19.2(0.2)	1.3	130	22.2(0.6)	2.8
대학교 이상	256	19.4(0.2)	0.9	132	18.9(0.3)	1.4	124	19.9(0.2)	1.0
직업									
전문행정관리	68	20.0(0.5)	2.6	38	19.6(0.8)	4.1	30	20.5(0.4)	2.0
사무직	90	19.5(0.3)	1.8	52	19.0(0.3)	1.7	38	20.3(0.6)	3.2
판매·서비스직	96	21.8(0.5)	2.4	26	18.5(0.4)	1.9	70	23.4(0.7)	2.8
농림어업	53	25.5(1.4)	5.4	37	22.1(1.1)	4.9	16	-(-)	-
기능단순노무직	200	19.9(0.3)	1.7	167	18.8(0.2)	1.2	33	26.5(1.6)	6.2
기타 ³⁾	261	21.7(0.4)	1.9	92	19.2(0.3)	1.4	169	23.0(0.6)	2.5
월 가구소득									
50만원 미만	25	28.4(2.7)	9.5	9	-(-)	-	16	-(-)	-
50-100만원 미만	65	24.2(1.4)	5.8	37	21.6(1.1)	5.0	28	27.4(2.4)	8.9
100-200만원 미만	94	22.7(0.6)	2.6	54	19.5(0.3)	1.8	40	26.7(1.3)	4.9
200-300만원 미만	140	21.0(0.5)	2.2	76	19.5(0.3)	1.4	64	23.2(1.0)	4.1
300-400만원 미만	217	20.2(0.4)	1.8	116	18.6(0.2)	1.2	101	22.1(0.7)	3.1
400-500만원 미만	127	20.1(0.4)	2.2	69	18.5(0.3)	1.6	58	22.5(0.9)	4.1
500-600만원 미만	37	20.0(0.6)	3.0	21	19.6(0.8)	4.2	16	-(-)	-
600만원 이상	62	19.0(0.7)	3.5	30	18.9(1.0)	5.5	32	19.1(0.6)	2.9

주 : 1) 음주시작연령 : 처음으로 술 1잔을 모두 마신 만 나이의 총 합 / 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 음주자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 14〉 월간음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	59.1(1.9)	3.2	440	73.8(2.6)	3.5	469	43.7(2.4)	5.5
연령									
19-29	114	63.0(5.0)	8.0	61	71.4(6.1)	8.5	53	52.3(7.3)	14.0
30-39	131	68.2(5.3)	7.8	59	81.6(6.5)	8.0	72	53.5(6.5)	12.1
40-49	187	71.4(3.1)	4.3	91	82.8(3.8)	4.6	96	59.4(4.8)	8.0
50-59	196	61.8(3.8)	6.2	92	75.8(5.2)	6.8	104	45.8(5.5)	12.1
60-69	138	42.3(4.6)	11.0	66	63.3(7.8)	12.3	72	24.9(4.9)	19.6
70 이상	143	28.0(3.1)	11.2	71	50.9(6.1)	12.0	72	8.5(3.6)	42.4
19-64	715	64.4(2.3)	3.5	342	77.0(2.8)	3.7	373	50.5(3.0)	5.9
65 이상	194	30.5(2.5)	8.3	98	53.9(4.6)	8.5	96	10.0(3.4)	33.7
교육수준 ²⁾									
무학	53	10.3(4.0)	38.6	12	—(—)	—	41	2.1(2.2)	101.8
초등학교	115	32.8(4.1)	12.5	42	58.2(8.2)	14.1	73	20.6(4.8)	23.3
중학교	100	51.6(5.7)	11.1	46	70.4(7.8)	11.0	54	35.7(6.0)	16.9
고등학교	361	63.6(3.0)	4.6	201	72.0(3.6)	5.0	160	51.6(3.9)	7.6
대학교 이상	278	68.9(3.6)	5.2	137	81.6(3.9)	4.8	141	55.3(5.4)	9.7
직업									
전문행정관리	74	67.6(6.4)	9.4	40	75.9(8.0)	10.6	34	55.8(8.3)	14.9
사무직	94	81.4(4.3)	5.3	52	87.4(5.2)	5.9	42	72.6(7.6)	10.5
판매·서비스직	106	65.4(4.7)	7.2	27	87.7(6.3)	7.2	79	55.3(5.8)	10.4
농림어업	64	53.7(7.1)	13.3	39	69.3(7.4)	10.7	25	29.8(9.7)	32.6
기능단순노무직	216	70.4(3.1)	4.4	175	76.8(3.0)	3.9	41	38.1(8.0)	20.9
기타 ³⁾	355	41.2(2.2)	5.5	107	55.5(5.2)	9.4	248	34.8(3.1)	8.8
월 가구소득									
50만원 미만	42	23.1(5.9)	25.7	11	—(—)	—	31	7.4(4.8)	64.0
50-100만원 미만	91	32.1(5.2)	16.2	42	44.2(7.5)	17.0	49	22.3(6.3)	28.2
100-200만원 미만	122	47.1(5.6)	12.0	62	60.4(7.3)	12.1	60	33.6(6.6)	19.5
200-300만원 미만	165	61.5(5.0)	8.1	82	71.4(7.5)	10.5	83	49.6(5.8)	11.6
300-400만원 미만	241	65.2(4.0)	6.2	119	80.0(4.3)	5.4	122	49.5(5.6)	11.4
400-500만원 미만	141	66.6(4.7)	7.0	71	83.1(4.2)	5.1	70	46.3(7.3)	15.8
500-600만원 미만	41	66.1(10.1)	15.3	21	76.4(11.9)	15.6	20	52.4(14.2)	27.1
600만원 이상	64	71.9(5.9)	8.3	31	80.8(7.6)	9.4	33	62.7(9.6)	15.4

주 : 1) 월간음주율 : (최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 15〉 연간음주자의 고위험음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	651	23.7(1.9)	8.1	357	34.9(2.9)	8.4	294	8.6(1.6)	18.3
연령									
19-29	91	18.6(4.0)	21.4	51	21.8(4.9)	22.3	40	14.0(5.1)	36.5
30-39	106	20.2(4.1)	20.4	53	28.3(5.3)	18.6	53	9.1(4.0)	44.2
40-49	160	33.0(3.1)	9.4	84	49.8(5.7)	11.5	76	12.6(3.7)	29.6
50-59	148	24.4(4.5)	18.5	78	39.0(6.7)	17.2	70	2.8(2.0)	71.5
60-69	88	14.2(3.4)	23.6	51	23.2(5.7)	24.5	37	3.1(3.1)	99.0
70 이상	58	22.0(4.1)	18.4	40	34.5(6.3)	18.3	18	-(-)	-
19-64	562	24.4(2.1)	8.5	296	35.8(3.1)	8.7	266	9.3(1.7)	18.5
65 이상	89	17.3(3.3)	19.3	61	27.1(5.3)	19.6	28	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	11	-(-)	-	5	-(-)	-	6	-(-)	-
초등학교	57	18.2(4.4)	24.0	25	39.8(9.1)	22.8	32	3.8(3.7)	95.9
중학교	72	22.3(5.0)	22.4	36	42.3(8.5)	20.0	36	2.0(2.0)	101.4
고등학교	283	24.9(2.7)	10.7	167	36.1(3.8)	10.6	116	6.4(2.3)	36.8
대학교 이상	226	23.5(2.8)	12.0	122	30.9(4.1)	13.3	104	14.0(3.2)	22.8
직업									
전문행정관리	63	21.4(5.0)	23.5	37	33.8(6.9)	20.4	26	0.0(0.0)	.
사무직	86	26.5(4.8)	17.9	49	37.9(7.2)	19.0	37	9.0(5.2)	57.5
판매·서비스직	85	22.3(4.1)	18.5	23	40.8(9.5)	23.2	62	12.8(3.8)	29.6
농림어업	41	37.2(8.3)	22.4	29	54.5(9.9)	18.2	12	-(-)	-
기능단순노무직	174	34.6(4.4)	12.7	150	39.4(5.1)	12.8	24	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	202	11.7(2.2)	18.8	69	14.4(3.4)	23.4	133	10.3(2.9)	28.1
월 가구소득									
50만원 미만	17	-(-)	-	7	-(-)	-	10	-(-)	-
50-100만원 미만	40	13.9(4.3)	31.0	22	27.4(7.7)	28.2	18	-(-)	-
100-200만원 미만	77	12.0(3.5)	28.9	43	21.7(6.6)	30.6	34	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	121	27.2(4.4)	16.1	66	38.5(6.5)	17.0	55	10.3(4.3)	41.3
300-400만원 미만	184	27.7(3.3)	12.0	106	39.6(4.6)	11.6	78	10.2(3.7)	36.6
400-500만원 미만	120	24.7(4.1)	16.4	65	38.2(6.1)	15.9	55	5.4(4.1)	76.0
500-600만원 미만	37	17.3(6.0)	34.4	21	22.2(9.0)	40.7	16	-(-)	-
600만원 이상	54	29.0(4.8)	16.5	27	36.4(7.8)	21.5	27	21.1(4.4)	21.0

주 : 1) 연간음주자의 고위험음주율 : (최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 16〉 운전자식 안전벨트 착용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	588	92.9(1.0)	1.1	357	90.7(1.3)	1.4	231	96.5(1.2)	1.2
연령									
19-29	52	95.0(2.7)	2.9	34	92.6(4.2)	4.5	18	-(-)	-
30-39	117	91.0(2.3)	2.5	59	89.9(3.3)	3.7	58	92.4(3.3)	3.6
40-49	159	94.5(1.8)	1.9	87	91.6(2.9)	3.1	72	98.3(1.6)	1.7
50-59	153	92.0(2.3)	2.5	87	89.3(3.3)	3.7	66	96.6(2.4)	2.5
60-69	76	92.6(2.2)	2.4	60	91.5(2.9)	3.2	16	-(-)	-
70 이상	31	91.2(4.8)	5.2	30	90.9(5.1)	5.6	1	-(-)	-
19-64	528	93.0(1.1)	1.2	302	90.8(1.5)	1.6	226	96.4(1.2)	1.3
65 이상	60	91.5(3.5)	3.8	55	90.4(3.9)	4.4	5	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	30	91.5(4.7)	5.1	21	86.4(7.1)	8.3	9	-(-)	-
중학교	52	79.0(6.3)	8.0	34	67.6(8.6)	12.8	18	-(-)	-
고등학교	264	91.5(1.8)	2.0	169	90.9(1.9)	2.1	95	92.9(2.8)	3.0
대학교 이상	238	96.7(1.2)	1.2	130	95.3(1.9)	2.0	108	98.6(1.0)	1.0
직업									
전문행정관리	64	92.6(4.4)	4.8	39	88.8(6.4)	7.2	25	100.0(0.0)	0.0
사무직	84	94.6(2.2)	2.4	50	96.6(2.4)	2.5	34	90.9(4.6)	5.0
판매·서비스직	73	98.3(1.6)	1.6	26	100.0(0.0)	0.0	47	97.2(2.7)	2.8
농림어업	36	80.3(6.6)	8.3	30	77.9(7.8)	10.0	6	-(-)	-
기능단순노무직	179	88.8(2.1)	2.3	165	88.0(2.2)	2.5	14	-(-)	-
기타 ³⁾	152	96.3(1.4)	1.5	47	94.4(3.2)	3.3	105	97.2(1.5)	1.5
월 가구소득									
50만원 미만	5	-(-)	-	4	-(-)	-	1	-(-)	-
50-100만원 미만	27	95.3(3.3)	3.4	20	93.5(4.5)	4.8	7	-(-)	-
100-200만원 미만	59	90.9(4.3)	4.7	44	89.4(5.6)	6.3	15	-(-)	-
200-300만원 미만	120	92.8(2.1)	2.2	73	89.0(3.2)	3.6	47	100.0(0.0)	0.0
300-400만원 미만	187	93.5(2.1)	2.2	106	92.3(2.7)	3.0	81	95.1(2.3)	2.4
400-500만원 미만	107	96.4(1.8)	1.9	64	95.9(2.5)	2.6	43	97.3(2.7)	2.7
500-600만원 미만	30	92.7(5.3)	5.7	17	-(-)	-	13	-(-)	-
600만원 이상	52	84.7(5.0)	6.0	28	79.6(6.9)	8.7	24	91.8(5.4)	5.9

주 : 1) 운전자식 안전벨트 착용률 : (자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 / 자동차 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 17〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	872	88.3(1.2)	1.4	429	84.9(1.6)	1.9	443	92.0(1.3)	1.4
연령									
19-29	111	85.5(4.1)	4.8	59	86.2(5.4)	6.3	52	84.6(4.7)	5.6
30-39	129	84.3(4.0)	4.7	58	80.5(5.0)	6.2	71	88.4(4.7)	5.4
40-49	183	85.8(2.8)	3.2	91	83.6(3.7)	4.4	92	88.2(3.8)	4.3
50-59	189	91.7(2.3)	2.5	87	86.8(3.9)	4.5	102	97.1(1.7)	1.8
60-69	135	91.6(2.3)	2.5	65	85.4(4.6)	5.3	70	96.8(1.8)	1.8
70 이상	125	94.1(1.9)	2.0	69	88.4(3.6)	4.1	56	100.0(0.0)	0.0
19-64	697	87.6(1.3)	1.5	333	84.9(1.7)	2.0	364	90.6(1.6)	1.7
65 이상	175	92.6(2.2)	2.4	96	85.4(4.2)	5.0	79	100.0(0.0)	0.0
교육수준 ²⁾									
무학	42	95.2(3.4)	3.6	11	—(—)	—	31	100.0(0.0)	0.0
초등학교	109	91.6(2.8)	3.1	42	87.7(4.7)	5.4	67	93.6(3.3)	3.5
중학교	97	87.0(3.5)	4.0	45	74.2(7.0)	9.5	52	98.1(1.9)	1.9
고등학교	350	88.9(1.8)	2.0	194	85.7(2.5)	2.9	156	93.7(2.2)	2.3
대학교 이상	272	86.2(2.1)	2.5	135	86.0(3.0)	3.5	137	86.3(3.0)	3.5
직업									
전문행정관리	72	86.6(3.9)	4.5	38	82.3(6.4)	7.8	34	92.5(5.2)	5.6
사무직	93	87.3(3.2)	3.7	52	85.5(4.4)	5.1	41	90.0(4.5)	5.0
판매·서비스직	102	91.8(2.8)	3.1	25	91.9(5.3)	5.8	77	91.8(3.2)	3.5
농림어업	63	91.8(3.1)	3.4	38	88.4(4.8)	5.5	25	96.8(2.9)	3.0
기능단순노무직	213	85.9(2.3)	2.7	173	83.1(2.8)	3.4	40	100.0(0.0)	0.0
기타 ³⁾	329	89.2(2.0)	2.2	103	86.1(4.1)	4.8	226	90.6(2.1)	2.3
월 가구소득									
50만원 미만	38	98.0(2.0)	2.0	11	—(—)	—	27	100.0(0.0)	0.0
50-100만원 미만	83	87.8(4.0)	4.5	39	79.0(8.2)	10.4	44	95.1(3.4)	3.6
100-200만원 미만	119	90.3(2.9)	3.2	60	85.5(5.0)	5.9	59	95.2(2.5)	2.7
200-300만원 미만	160	87.2(3.4)	4.0	80	82.8(4.7)	5.7	80	92.6(3.0)	3.3
300-400만원 미만	234	88.8(2.2)	2.5	117	86.7(3.2)	3.7	117	91.1(2.9)	3.1
400-500만원 미만	133	90.1(3.0)	3.3	69	88.9(3.2)	3.5	64	91.6(4.4)	4.8
500-600만원 미만	40	86.5(5.7)	6.5	21	89.0(7.3)	8.2	19	—(—)	—
600만원 이상	63	80.1(4.6)	5.7	31	73.4(6.8)	9.3	32	87.2(5.1)	5.9

주 : 1) 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 : (다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 / 동승차량 앞좌석 탑승자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 18〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	602	5.7(0.9)	15.5	368	7.2(1.3)	17.8	234	3.1(1.0)	34.2
연령									
19-29	52	1.9(1.8)	95.6	34	2.9(2.7)	95.8	18	-(-)	-
30-39	117	7.2(2.5)	35.0	59	8.9(3.5)	39.7	58	4.8(2.6)	54.9
40-49	159	3.8(1.6)	43.1	87	4.6(2.6)	57.2	72	2.8(1.8)	63.7
50-59	156	4.6(1.6)	34.9	89	6.1(2.4)	39.0	67	2.1(1.5)	72.0
60-69	77	15.9(3.3)	20.5	60	19.1(4.5)	23.7	17	-(-)	-
70 이상	41	4.6(3.3)	71.4	39	4.9(3.5)	71.5	2	-(-)	-
19-64	532	5.5(0.9)	16.4	304	7.0(1.3)	18.8	228	3.1(1.1)	34.4
65 이상	70	7.7(3.3)	43.2	64	8.6(3.8)	43.8	6	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	6	-(-)	-	4	-(-)	-	2	-(-)	-
초등학교	34	7.2(4.1)	56.2	25	10.9(6.2)	56.5	9	-(-)	-
중학교	58	15.8(4.9)	31.1	38	21.0(6.8)	32.5	20	5.6(5.6)	98.8
고등학교	264	4.8(1.1)	23.3	169	5.4(1.5)	27.2	95	3.6(1.9)	51.5
대학교 이상	238	4.6(1.4)	31.0	130	6.3(2.3)	36.1	108	2.5(1.3)	53.5
직업									
전문행정관리	64	12.2(4.5)	36.5	39	17.7(7.3)	41.1	25	1.3(1.4)	104.6
사무직	84	1.9(1.4)	72.0	50	0.0(0.0)	.	34	5.3(3.7)	70.3
판매·서비스직	74	5.1(2.4)	46.8	26	4.8(3.6)	74.7	48	5.2(3.1)	59.6
농림어업	39	17.8(6.0)	33.8	32	22.4(6.9)	31.0	7	-(-)	-
기능단순노무직	180	5.4(1.4)	26.9	166	5.7(1.5)	26.9	14	-(-)	-
기타 ³⁾	161	3.9(1.5)	37.0	55	7.4(3.7)	49.9	106	2.3(1.3)	58.6
월 가구소득									
50만원 미만	6	-(-)	-	5	-(-)	-	1	-(-)	-
50-100만원 미만	33	6.1(4.5)	73.3	25	8.3(6.0)	72.5	8	-(-)	-
100-200만원 미만	61	13.4(5.1)	38.3	45	16.2(7.0)	43.1	16	-(-)	-
200-300만원 미만	121	8.3(2.7)	32.4	74	10.4(3.5)	33.3	47	4.2(2.9)	69.2
300-400만원 미만	190	5.3(1.4)	26.5	108	7.1(2.1)	30.1	82	2.7(1.7)	60.7
400-500만원 미만	107	1.8(1.1)	59.9	64	2.4(1.7)	69.8	43	0.7(0.7)	101.6
500-600만원 미만	31	5.6(4.0)	71.1	18	-(-)	-	13	-(-)	-
600만원 이상	52	3.0(2.9)	95.4	28	2.4(2.3)	96.2	24	4.0(3.8)	94.8

주 : 1) 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이) : (최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 수 / 자동차 또는 오토바이 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 19〉 격렬한 신체활동 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	13.2(1.6)	11.9	440	16.2(2.3)	14.5	469	10.0(1.7)	17.5
연령									
19-29	114	15.1(3.6)	23.7	61	22.0(5.7)	26.1	53	6.4(3.6)	56.4
30-39	131	10.5(2.8)	26.9	59	12.8(4.3)	33.9	72	7.9(4.3)	54.1
40-49	187	14.3(3.3)	23.0	91	19.5(4.9)	25.4	96	8.8(3.2)	35.9
50-59	196	17.8(3.1)	17.7	92	16.0(4.4)	27.4	104	19.9(4.4)	21.9
60-69	138	9.1(2.5)	27.7	66	7.9(3.2)	40.5	72	10.1(4.3)	42.1
70 이상	143	7.4(2.7)	36.4	71	12.8(5.2)	40.3	72	2.8(2.0)	72.4
19-64	715	14.1(1.8)	12.5	342	16.8(2.7)	15.9	373	11.1(1.9)	17.4
65 이상	194	8.4(2.6)	30.7	98	12.8(4.2)	33.1	96	4.6(2.9)	63.0
교육수준 ²⁾									
무학	53	1.5(1.5)	102.7	12	-(-)	-	41	0.0(0.0)	.
초등학교	115	5.7(2.1)	37.2	42	6.7(3.7)	55.2	73	5.2(2.7)	50.9
중학교	100	11.4(3.7)	32.9	46	11.3(5.8)	51.5	54	11.5(4.9)	42.5
고등학교	361	14.5(2.3)	15.7	201	16.3(3.4)	20.9	160	11.8(2.6)	22.3
대학교 이상	278	15.4(2.7)	17.7	137	19.0(3.8)	19.8	141	11.6(3.7)	31.7
직업									
전문행정관리	74	19.7(6.7)	34.1	40	20.6(7.2)	34.7	34	18.4(9.7)	52.5
사무직	94	18.6(4.4)	23.5	52	24.3(6.0)	24.7	42	10.5(5.2)	49.5
판매·서비스직	106	12.1(3.2)	26.2	27	18.5(7.1)	38.3	79	9.2(3.4)	37.2
농림어업	64	13.4(4.8)	35.9	39	12.4(5.2)	41.6	25	15.0(7.0)	46.5
기능단순노무직	216	14.4(2.8)	19.6	175	15.2(3.3)	22.0	41	10.4(4.8)	46.1
기타 ³⁾	355	9.4(1.8)	18.7	107	11.4(3.6)	32.0	248	8.6(1.9)	21.6
월 가구소득									
50만원 미만	42	4.6(3.4)	73.7	11	-(-)	-	31	3.3(3.4)	104.6
50-100만원 미만	91	8.2(4.2)	50.9	42	13.2(7.7)	58.8	49	4.2(3.0)	72.5
100-200만원 미만	122	8.2(2.5)	30.2	62	9.9(4.1)	41.6	60	6.5(3.1)	47.7
200-300만원 미만	165	8.8(2.5)	27.9	82	10.1(3.6)	35.3	83	7.3(2.7)	37.7
300-400만원 미만	241	13.5(2.6)	19.5	119	14.9(4.1)	27.5	122	12.0(3.4)	28.1
400-500만원 미만	141	23.8(3.9)	16.3	71	32.7(5.7)	17.5	70	12.8(4.2)	32.8
500-600만원 미만	41	17.6(6.1)	34.7	21	17.4(7.0)	40.1	20	17.9(8.9)	49.6
600만원 이상	64	12.6(3.2)	25.4	31	10.7(5.2)	48.2	33	14.7(5.6)	38.0

주 : 1) 격렬한 신체활동 실천율 : (최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 20〉 중등도 신체활동 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	909	11.1(1.2)	10.7	440	14.3(2.0)	14.1	469	7.8(1.1)	14.6
연령									
19-29	114	9.7(2.7)	27.7	61	13.0(4.7)	35.7	53	5.4(3.1)	57.6
30-39	131	11.3(2.9)	25.4	59	17.8(5.0)	28.3	72	4.4(2.7)	62.4
40-49	187	7.2(2.1)	29.0	91	10.4(3.8)	36.4	96	3.8(1.8)	47.3
50-59	196	14.3(2.5)	17.8	92	15.4(3.5)	22.9	104	13.0(3.4)	26.2
60-69	138	13.5(2.5)	18.2	66	14.5(4.0)	27.6	72	12.7(3.2)	25.2
70 이상	143	12.5(2.9)	23.3	71	16.6(4.0)	23.9	72	9.0(3.5)	38.5
19-64	715	11.0(1.4)	12.6	342	14.1(2.3)	16.7	373	7.6(1.3)	17.5
65 이상	194	11.8(2.2)	18.9	98	15.2(3.4)	22.6	96	8.8(2.4)	27.6
교육수준 ²⁾									
무학	53	7.9(4.2)	53.7	12	—(—)	—	41	8.1(3.9)	48.7
초등학교	115	19.4(3.0)	15.6	42	22.7(5.1)	22.7	73	17.8(3.9)	22.0
중학교	100	8.9(3.1)	34.5	46	7.2(4.7)	65.3	54	10.3(4.2)	40.2
고등학교	361	11.8(2.1)	17.7	201	15.3(3.0)	19.8	160	6.8(2.1)	31.0
대학교 이상	278	9.1(1.6)	17.6	137	13.6(2.9)	21.0	141	4.3(1.9)	43.9
직업									
전문행정관리	74	7.6(3.2)	42.2	40	13.0(5.9)	45.3	34	0.0(0.0)	.
사무직	94	14.3(3.6)	25.5	52	20.3(5.2)	25.8	42	5.5(2.9)	52.3
판매·서비스직	106	8.0(2.7)	33.9	27	7.1(4.3)	61.0	79	8.4(3.5)	41.4
농림어업	64	26.7(6.0)	22.6	39	26.1(7.2)	27.6	25	27.6(8.5)	30.6
기능단순노무직	216	14.3(2.7)	19.1	175	15.0(3.1)	20.6	41	10.9(4.7)	43.6
기타 ³⁾	355	7.7(1.6)	21.1	107	8.9(3.4)	38.4	248	7.2(1.5)	20.3
월 가구소득									
50만원 미만	42	9.4(4.1)	43.3	11	—(—)	—	31	6.5(3.8)	58.9
50-100만원 미만	91	14.8(3.9)	26.1	42	14.1(5.0)	35.8	49	15.5(4.6)	29.6
100-200만원 미만	122	14.1(2.4)	17.3	62	15.2(4.3)	28.5	60	13.0(4.1)	31.4
200-300만원 미만	165	10.2(2.3)	22.8	82	15.0(4.1)	27.1	83	4.4(2.0)	46.1
300-400만원 미만	241	11.5(2.0)	17.7	119	15.3(3.5)	22.9	122	7.4(2.4)	32.5
400-500만원 미만	141	12.8(3.3)	25.5	71	16.3(4.8)	29.7	70	8.5(3.1)	36.4
500-600만원 미만	41	7.1(3.9)	55.2	21	8.9(5.7)	64.4	20	4.6(4.7)	100.9
600만원 이상	64	4.6(2.6)	56.9	31	6.5(4.5)	69.8	33	2.7(2.7)	99.7

주 : 1) 중등도 신체활동 실천율 : (최근 1주일 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 21〉 중등도 이상 신체활동 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	21.9(1.7)	7.6	440	27.0(2.4)	8.9	469	16.4(1.8)	10.7
연령									
19-29	114	22.1(3.8)	17.2	61	30.1(6.7)	22.1	53	11.8(4.5)	37.8
30-39	131	18.1(3.5)	19.3	59	25.7(5.8)	22.4	72	9.7(4.4)	45.1
40-49	187	19.9(3.5)	17.7	91	27.7(5.4)	19.5	96	11.6(3.5)	29.8
50-59	196	29.1(3.6)	12.3	92	28.5(5.1)	17.9	104	29.7(4.7)	16.0
60-69	138	21.2(3.3)	15.4	66	20.2(4.5)	22.1	72	22.0(5.0)	22.6
70 이상	143	18.1(3.3)	18.5	71	25.4(5.6)	22.0	72	11.8(3.8)	32.5
19-64	715	22.5(1.9)	8.6	342	27.5(2.9)	10.4	373	17.1(2.0)	11.8
65 이상	194	18.3(2.7)	14.7	98	23.9(4.7)	19.6	96	13.4(3.4)	25.3
교육수준 ²⁾									
무학	53	7.9(4.2)	53.7	12	—(—)	—	41	8.1(3.9)	48.7
초등학교	115	23.7(3.2)	13.5	42	26.9(5.6)	20.7	73	22.2(4.5)	20.3
중학교	100	18.7(4.8)	25.8	46	17.9(6.9)	38.8	54	19.3(5.9)	30.7
고등학교	361	24.0(2.6)	10.8	201	28.8(3.6)	12.6	160	16.9(3.0)	18.0
대학교 이상	278	21.3(2.9)	13.6	137	27.5(3.8)	14.0	141	14.6(3.9)	26.5
직업									
전문행정관리	74	22.6(7.7)	34.2	40	25.6(8.6)	33.4	34	18.4(9.7)	52.5
사무직	94	29.0(5.0)	17.0	52	39.4(6.6)	16.8	42	14.1(5.5)	39.2
판매·서비스직	106	18.5(4.1)	21.9	27	22.1(7.3)	33.1	79	16.9(4.4)	25.8
농림어업	64	37.6(7.2)	19.1	39	35.3(8.4)	23.9	25	41.1(9.4)	23.0
기능단순노무직	216	26.1(3.4)	13.1	175	27.6(3.9)	14.2	41	18.9(6.2)	33.1
기타 ³⁾	355	15.5(2.3)	14.5	107	18.4(4.8)	26.3	248	14.3(2.2)	15.2
월 가구소득									
50만원 미만	42	11.9(4.9)	41.4	11	—(—)	—	31	9.8(5.3)	54.1
50-100만원 미만	91	22.2(5.0)	22.4	42	25.4(8.5)	33.3	49	19.6(5.0)	25.3
100-200만원 미만	122	19.7(3.1)	15.7	62	23.1(5.8)	25.2	60	16.2(4.7)	28.8
200-300만원 미만	165	19.0(3.2)	16.7	82	25.0(4.6)	18.2	83	11.7(3.3)	28.4
300-400만원 미만	241	22.2(2.9)	13.1	119	27.0(4.6)	17.0	122	17.2(3.5)	20.3
400-500만원 미만	141	30.9(4.5)	14.6	71	40.6(7.2)	17.6	70	18.8(4.7)	24.9
500-600만원 미만	41	19.6(6.1)	31.0	21	17.4(7.0)	40.1	20	22.5(8.8)	39.1
600만원 이상	64	17.3(4.3)	25.0	31	17.2(6.2)	36.3	33	17.4(6.1)	34.9

주 : 1) 중등도 이상 신체활동 실천율 : (최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 22〉 걷기 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	41.5(1.8)	4.3	440	45.2(2.6)	5.7	469	37.6(2.2)	5.7
연령									
19-29	114	50.3(5.1)	10.1	61	58.5(6.5)	11.2	53	39.9(7.3)	18.3
30-39	131	30.3(3.7)	12.2	59	30.2(6.0)	20.0	72	30.4(5.4)	17.7
40-49	187	37.9(3.2)	8.4	91	43.0(5.1)	11.7	96	32.4(5.1)	15.8
50-59	196	45.3(4.2)	9.3	92	43.6(6.0)	13.8	104	47.1(5.8)	12.3
60-69	138	42.6(3.9)	9.2	66	41.3(6.0)	14.5	72	43.7(5.3)	12.1
70 이상	143	43.8(4.2)	9.7	71	58.2(5.7)	9.8	72	31.6(5.4)	17.1
19-64	715	41.3(1.9)	4.7	342	44.1(3.0)	6.8	373	38.2(2.3)	6.1
65 이상	194	42.7(3.9)	9.0	98	52.0(5.0)	9.6	96	34.5(4.8)	13.9
교육수준 ²⁾									
무학	53	30.2(5.4)	17.9	12	—(—)	—	41	23.0(5.9)	25.7
초등학교	115	38.9(5.4)	13.9	42	43.2(7.8)	18.1	73	36.8(5.9)	16.0
중학교	100	46.2(5.5)	11.8	46	41.2(8.1)	19.8	54	50.5(7.0)	14.0
고등학교	361	42.5(2.8)	6.5	201	44.3(3.8)	8.5	160	39.9(3.9)	9.9
대학교 이상	278	40.7(2.7)	6.7	137	46.4(4.6)	9.9	141	34.5(3.7)	10.8
직업									
전문행정관리	74	48.8(6.1)	12.5	40	46.9(8.3)	17.7	34	51.5(9.3)	18.0
사무직	94	39.3(5.1)	12.9	52	49.5(7.0)	14.1	42	24.6(6.7)	27.2
판매·서비스직	106	36.8(4.8)	13.2	27	40.8(8.4)	20.7	79	34.9(5.3)	15.3
농림어업	64	49.0(7.2)	14.6	39	48.7(7.7)	15.8	25	49.4(10.0)	20.2
기능단순노무직	216	41.1(3.8)	9.3	175	41.7(4.1)	9.8	41	37.8(7.6)	20.2
기타 ³⁾	355	41.4(2.7)	6.6	107	48.7(5.4)	11.1	248	38.1(2.9)	7.5
월 가구소득									
50만원 미만	42	34.4(9.2)	26.7	11	—(—)	—	31	31.9(9.4)	29.4
50-100만원 미만	91	43.8(5.4)	12.4	42	52.0(8.5)	16.2	49	37.1(6.5)	17.4
100-200만원 미만	122	40.2(4.3)	10.8	62	44.8(6.3)	14.1	60	35.6(5.9)	16.7
200-300만원 미만	165	44.0(4.2)	9.4	82	41.8(5.2)	12.4	83	46.7(5.5)	11.9
300-400만원 미만	241	41.4(4.1)	10.0	119	47.9(5.2)	11.0	122	34.5(4.8)	13.9
400-500만원 미만	141	44.9(4.5)	10.1	71	51.0(7.3)	14.2	70	37.5(7.7)	20.5
500-600만원 미만	41	36.8(9.0)	24.4	21	33.3(12.3)	36.9	20	41.3(11.6)	28.1
600만원 이상	64	34.6(6.1)	17.6	31	34.1(7.9)	23.2	33	35.2(8.3)	23.6

주 : 1) 걷기 실천율 : (최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 23〉 지역사회 내 운동시설 접근율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	75.8(2.1)	2.8	440	75.1(2.6)	3.5	469	76.6(2.4)	3.1
연령									
19-29	114	78.0(4.3)	5.6	61	80.0(5.4)	6.8	53	75.5(6.1)	8.1
30-39	131	78.3(3.9)	5.0	59	70.7(6.4)	9.0	72	86.6(4.3)	5.0
40-49	187	77.0(3.5)	4.6	91	77.7(4.2)	5.3	96	76.2(4.9)	6.5
50-59	196	73.4(4.3)	5.8	92	72.5(5.7)	7.9	104	74.5(4.7)	6.3
60-69	138	72.0(5.0)	7.0	66	68.6(6.0)	8.8	72	74.8(6.1)	8.2
70 이상	143	75.1(4.0)	5.4	71	80.1(4.8)	5.9	72	70.9(5.3)	7.5
19-64	715	76.0(2.2)	2.9	342	75.3(2.9)	3.8	373	76.8(2.5)	3.2
65 이상	194	74.8(4.1)	5.5	98	74.1(4.8)	6.5	96	75.4(4.5)	6.0
교육수준 ²⁾									
무학	53	69.6(8.0)	11.5	12	-(-)	-	41	68.1(8.3)	12.2
초등학교	115	66.0(5.9)	9.0	42	67.6(7.6)	11.3	73	65.2(6.3)	9.6
중학교	100	73.7(4.6)	6.2	46	75.3(6.9)	9.2	54	72.4(6.5)	9.0
고등학교	361	74.3(3.2)	4.3	201	72.3(4.1)	5.6	160	77.3(3.6)	4.6
대학교 이상	278	81.6(2.7)	3.3	137	80.1(3.3)	4.2	141	83.2(3.7)	4.5
직업									
전문행정관리	74	85.5(4.6)	5.4	40	85.2(5.2)	6.2	34	85.9(6.7)	7.8
사무직	94	77.8(4.2)	5.4	52	80.6(4.9)	6.1	42	73.7(7.3)	9.9
판매·서비스직	106	74.5(5.1)	6.8	27	87.2(7.3)	8.3	79	68.8(5.7)	8.2
농림어업	64	55.8(9.5)	17.1	39	52.9(10.0)	18.8	25	60.3(13.3)	22.1
기능단순노무직	216	73.7(3.4)	4.7	175	71.1(4.1)	5.7	41	86.6(5.9)	6.8
기타 ³⁾	355	77.5(2.6)	3.4	107	76.7(4.3)	5.6	248	77.8(2.7)	3.5
월 가구소득									
50만원 미만	42	69.1(7.1)	10.3	11	-(-)	-	31	66.9(7.6)	11.4
50-100만원 미만	91	74.2(6.8)	9.2	42	75.4(8.4)	11.1	49	73.1(6.6)	9.0
100-200만원 미만	122	68.9(4.6)	6.6	62	72.1(5.8)	8.0	60	65.7(6.1)	9.3
200-300만원 미만	165	67.5(5.2)	7.6	82	62.9(6.3)	10.0	83	73.1(6.1)	8.3
300-400만원 미만	241	83.2(3.0)	3.6	119	83.3(3.5)	4.2	122	83.1(3.8)	4.5
400-500만원 미만	141	89.0(3.7)	4.2	71	90.2(3.9)	4.3	70	87.5(4.6)	5.3
500-600만원 미만	41	65.9(10.0)	15.1	21	61.9(11.7)	18.9	20	71.3(8.6)	12.0
600만원 이상	64	61.8(5.8)	9.3	31	56.2(9.0)	16.0	33	67.7(7.3)	10.9

주 : 1) 지역사회 내 운동시설 접근율 : (최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 찾기 “매우 쉬웠다” 또는 “쉬운 편이었다”에 응답한 사람 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 24〉 연간 지역사회 내 운동프로그램 참여율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	7.0(0.9)	12.7	440	3.5(0.9)	25.3	469	10.8(1.5)	14.0
연령									
19-29	114	0.8(0.8)	99.3	61	1.5(1.5)	98.8	53	0.0(0.0)	.
30-39	131	4.9(1.6)	33.5	59	1.6(1.6)	99.8	72	8.4(2.9)	34.5
40-49	187	10.9(2.2)	19.8	91	5.3(2.3)	44.0	96	16.8(3.6)	21.6
50-59	196	6.4(1.7)	26.1	92	2.2(1.5)	71.0	104	11.2(3.1)	27.7
60-69	138	10.1(3.2)	31.2	66	4.0(2.4)	60.1	72	15.2(4.8)	31.4
70 이상	143	9.7(3.4)	35.5	71	9.0(5.2)	57.6	72	10.2(3.9)	38.4
19-64	715	6.5(0.8)	13.0	342	2.7(0.8)	29.0	373	10.6(1.5)	14.0
65 이상	194	10.2(3.1)	30.5	98	8.4(4.0)	47.4	96	11.7(3.6)	30.5
교육수준 ²⁾									
무학	53	4.7(3.2)	69.4	12	-(-)	-	41	5.8(4.0)	68.3
초등학교	115	10.9(3.2)	29.6	42	4.1(3.9)	97.4	73	14.3(4.0)	28.2
중학교	100	10.4(3.3)	32.0	46	5.9(5.6)	96.2	54	14.3(4.6)	31.8
고등학교	361	6.2(1.3)	20.7	201	3.0(1.2)	41.5	160	10.9(2.8)	25.4
대학교 이상	278	6.5(1.3)	19.9	137	3.9(1.3)	33.9	141	9.2(2.0)	22.0
직업									
전문행정관리	74	9.0(2.9)	31.9	40	7.6(3.8)	50.4	34	10.9(4.3)	39.0
사무직	94	4.0(2.0)	50.9	52	2.9(2.0)	67.5	42	5.6(3.1)	55.0
판매·서비스직	106	9.5(2.8)	29.1	27	7.9(4.6)	58.5	79	10.3(3.4)	33.1
농림어업	64	10.3(3.3)	32.2	39	5.4(2.2)	41.2	25	17.8(7.6)	42.9
기능단순노무직	216	2.0(0.9)	44.1	175	1.5(0.9)	58.4	41	4.5(3.0)	66.2
기타 ³⁾	355	9.8(1.8)	17.9	107	3.9(2.5)	63.4	248	12.4(2.1)	17.0
월 가구소득									
50만원 미만	42	15.2(6.1)	40.2	11	-(-)	-	31	20.5(8.4)	41.0
50-100만원 미만	91	7.5(4.0)	52.9	42	8.8(7.0)	79.5	49	6.4(3.7)	56.8
100-200만원 미만	122	10.9(3.1)	28.3	62	5.6(2.8)	50.0	60	16.2(4.8)	29.7
200-300만원 미만	165	5.6(1.4)	25.7	82	2.9(1.3)	43.6	83	8.9(2.9)	32.6
300-400만원 미만	241	4.7(1.5)	31.7	119	2.6(1.4)	54.2	122	6.9(2.3)	33.7
400-500만원 미만	141	8.6(2.2)	26.1	71	5.4(3.2)	59.3	70	12.4(3.7)	30.0
500-600만원 미만	41	3.6(2.6)	71.8	21	0.0(0.0)	.	20	8.3(5.9)	71.4
600만원 이상	64	8.6(2.9)	33.3	31	0.0(0.0)	.	33	17.5(6.2)	35.3

주 : 1) 연간 지역사회 내 운동프로그램 참여율 : (최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역의 주민센터(동사무소), 보건소, 구청, 시청 등의 지방자치단체 운동프로그램에 참여한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 25〉 저염선택율¹⁾

(단위 : %)

구분	N	Type I		Type II		Type III	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	909	38.9(1.8)	4.7	20.9(1.7)	8.2	5.6(0.8)	14.1
성							
남자	440	42.9(2.8)	6.5	15.1(2.0)	13.4	2.4(0.8)	31.6
여자	469	34.7(2.3)	6.6	26.9(2.4)	9.0	9.0(1.4)	15.1
연령							
19-29	114	32.2(4.7)	14.5	16.0(3.8)	23.4	0.8(0.8)	99.3
30-39	131	42.7(4.7)	10.9	17.1(3.6)	21.3	7.1(2.3)	33.0
40-49	187	45.2(3.9)	8.6	20.8(2.8)	13.6	5.5(1.6)	29.4
50-59	196	40.4(3.8)	9.5	22.9(3.1)	13.7	5.7(1.4)	23.9
60-69	138	35.4(3.4)	9.7	29.3(4.0)	13.7	9.4(2.8)	29.9
70 이상	143	31.1(4.0)	12.8	20.8(3.4)	16.4	6.6(2.5)	38.0
19-64	715	40.6(2.0)	4.8	20.2(1.9)	9.3	5.0(0.9)	17.1
65 이상	194	29.3(3.5)	12.0	24.4(3.2)	13.2	8.7(2.3)	26.5
교육수준 ²⁾							
무학	53	33.1(6.0)	18.2	17.7(4.8)	27.2	11.9(5.3)	44.9
초등학교	115	31.7(4.1)	12.9	24.2(4.4)	18.1	8.0(2.2)	27.8
중학교	100	46.7(5.2)	11.1	22.7(4.5)	19.8	6.5(2.2)	34.1
고등학교	361	39.2(2.6)	6.8	21.3(2.7)	12.9	5.0(1.3)	26.9
대학교 이상	278	39.3(2.7)	6.9	19.2(2.4)	12.5	4.7(1.3)	26.9
직업							
전문행정관리	74	31.9(6.1)	19.1	21.4(5.3)	24.8	6.4(2.4)	37.7
사무직	94	42.3(4.4)	10.5	17.8(4.2)	23.4	3.6(1.8)	49.9
판매·서비스직	106	36.8(4.8)	13.2	22.5(4.4)	19.4	6.1(2.4)	39.5
농림어업	64	43.7(6.6)	15.0	24.3(5.7)	23.6	3.8(2.6)	70.1
기능단순노무직	216	51.3(3.7)	7.2	16.2(2.8)	17.3	2.6(1.3)	50.5
기타 ³⁾	355	30.9(2.5)	8.2	23.9(2.5)	10.3	8.2(1.5)	18.0
월 가구소득							
50만원 미만	42	25.4(5.8)	22.9	15.6(5.0)	32.0	11.4(5.4)	47.0
50-100만원 미만	91	33.6(5.0)	15.0	24.3(4.5)	18.6	10.0(3.3)	32.5
100-200만원 미만	122	34.3(5.3)	15.6	18.8(4.0)	21.3	5.8(2.1)	36.6
200-300만원 미만	165	42.4(3.4)	8.0	22.2(2.9)	13.0	4.7(1.4)	29.1
300-400만원 미만	241	36.7(3.3)	9.1	17.6(2.8)	15.7	5.2(1.5)	28.9
400-500만원 미만	141	35.5(5.7)	16.2	15.4(4.3)	28.0	5.5(1.8)	33.3
500-600만원 미만	41	49.4(8.9)	18.1	24.8(6.9)	27.8	2.7(2.7)	99.8
600만원 이상	64	56.1(6.4)	11.5	39.7(6.3)	15.8	4.3(2.3)	54.5

주 : 1) 저염선택율 : 3문항 중 「한 가지만 선택한 경우 Type I, 두 가지를 선택한 경우 Type II, 세 가지 모두 선택 시 Type III」

- ① 평소 음식을 먹을 때 “약간 싱겁게 먹는다” 또는 “아주 싱겁게 먹는다”에 응답한 사람의 수
 혹은,
 ② 조리된 음식을 먹을 때 소금이나 간장을 “전혀 더 넣지 않는다”에 응답한 사람의 수
 혹은,
 ③ 전, 부침, 튀김 등을 먹을 때 간장에 “짜여 먹지 않는다”에 응답한 사람의 수 × 100

/ 조사대상 응답자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 26〉 영양표시 활용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	217	82.0(3.1)	3.8	55	73.6(6.3)	8.6	162	85.5(3.3)	3.8
연령									
19-29	29	74.8(8.4)	11.2	11	-(-)	-	18	-(-)	-
30-39	64	80.1(6.3)	7.8	13	-(-)	-	51	80.8(7.7)	9.5
40-49	49	84.7(5.4)	6.4	10	-(-)	-	39	91.2(4.9)	5.3
50-59	52	84.7(5.2)	6.1	16	-(-)	-	36	84.3(5.5)	6.5
60-69	20	85.6(8.2)	9.5	4	-(-)	-	16	-(-)	-
70 이상	3	-(-)	-	1	-(-)	-	2	-(-)	-

주 : 1) 영양표시 활용률 : (영양표시 내용이 가공식품을 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수 / 가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수) × 100

〈표 27〉 저염식 실천 노력 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	57.8(2.4)	4.1	440	47.7(3.0)	6.3	469	68.5(2.5)	3.7
연령									
19-29	114	38.3(5.5)	14.5	61	29.8(6.5)	21.8	53	49.1(7.7)	15.6
30-39	131	55.2(4.5)	8.1	59	42.5(6.1)	14.4	72	69.1(5.2)	7.6
40-49	187	60.4(4.1)	6.8	91	49.3(5.3)	10.7	96	72.1(4.8)	6.7
50-59	196	69.8(3.9)	5.6	92	61.2(5.3)	8.6	104	79.6(3.9)	4.9
60-69	138	63.0(4.5)	7.1	66	55.0(6.3)	11.5	72	69.7(6.0)	8.6
70 이상	143	57.0(4.2)	7.4	71	47.8(6.7)	13.9	72	64.8(5.5)	8.4
19-64	715	57.7(2.7)	4.6	342	47.3(3.4)	7.2	373	69.1(2.7)	3.9
65 이상	194	58.5(3.8)	6.5	98	50.2(5.7)	11.4	96	65.7(4.7)	7.1
교육수준 ²⁾									
무학	53	58.3(7.4)	12.7	12	—(—)	—	41	58.7(7.0)	11.9
초등학교	115	58.1(4.8)	8.2	42	40.4(7.2)	17.7	73	66.6(6.4)	9.7
중학교	100	65.7(5.1)	7.8	46	57.0(7.8)	13.8	54	73.1(6.4)	8.8
고등학교	361	56.7(3.6)	6.4	201	47.4(4.3)	9.1	160	70.2(4.1)	5.8
대학교 이상	278	56.7(3.3)	5.9	137	46.1(4.1)	8.9	141	68.1(4.3)	6.3
직업									
전문행정관리	74	62.0(6.7)	10.8	40	49.9(8.1)	16.2	34	79.3(7.3)	9.2
사무직	94	57.2(5.7)	10.0	52	49.1(6.7)	13.7	42	68.9(7.9)	11.4
판매·서비스직	106	62.7(4.5)	7.2	27	41.1(9.0)	21.9	79	72.4(5.2)	7.2
농림어업	64	44.4(6.7)	15.2	39	35.9(9.2)	25.7	25	57.3(9.8)	17.1
기능단순노무직	216	58.4(4.0)	6.9	175	55.8(4.6)	8.2	41	71.4(6.8)	9.5
기타 ³⁾	355	56.9(3.4)	6.0	107	36.2(5.8)	15.9	248	66.1(3.9)	5.9
월 가구소득									
50만원 미만	42	62.2(7.7)	12.3	11	—(—)	—	31	66.8(8.4)	12.6
50-100만원 미만	91	59.7(6.5)	10.8	42	51.1(10.1)	19.7	49	66.7(7.6)	11.3
100-200만원 미만	122	55.1(5.6)	10.2	62	37.1(6.8)	18.4	60	73.2(5.8)	8.0
200-300만원 미만	165	57.1(4.1)	7.3	82	50.0(5.4)	10.8	83	65.6(4.9)	7.4
300-400만원 미만	241	58.7(3.8)	6.6	119	47.3(5.3)	11.2	122	70.7(4.2)	5.9
400-500만원 미만	141	57.9(5.7)	9.9	71	52.3(6.8)	13.1	70	64.9(6.1)	9.4
500-600만원 미만	41	49.2(11.3)	22.9	21	38.6(12.1)	31.4	20	63.4(12.7)	20.1
600만원 이상	64	61.6(6.7)	10.9	31	51.2(9.3)	18.2	33	72.4(7.5)	10.4

주 : 1) 저염식 실천 노력 경험률 : (평소 덜 짜게 먹으려고 “항상 노력한다” 또는 “대체로 노력한다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 28〉 연간 영양교육 및 상담수혜율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	909	5.1(0.8)	15.3	440	2.3(0.8)	34.0	469	8.0(1.4)	17.1
연령									
19-29	114	8.6(3.2)	36.9	61	6.4(2.9)	45.5	53	11.3(4.9)	43.5
30-39	131	7.2(2.2)	30.2	59	1.6(1.6)	99.4	72	13.2(4.4)	33.1
40-49	187	4.6(1.6)	34.5	91	1.1(1.1)	99.2	96	8.4(3.1)	36.9
50-59	196	4.2(1.2)	29.3	92	1.0(1.0)	97.8	104	7.9(2.4)	30.6
60-69	138	3.3(1.6)	48.1	66	3.2(2.2)	68.5	72	3.4(2.4)	69.5
70 이상	143	1.4(1.0)	72.2	71	1.2(1.2)	99.4	72	1.6(1.6)	99.8
19-64	715	5.6(0.9)	15.5	342	2.4(0.9)	37.6	373	9.1(1.5)	16.7
65 이상	194	2.3(1.1)	48.0	98	2.1(1.4)	68.9	96	2.5(1.7)	69.2
교육수준 ²⁾									
무학	53	2.6(2.5)	98.3	12	-(-)	-	41	3.2(3.1)	97.0
초등학교	115	1.7(1.3)	72.1	42	2.0(2.0)	97.4	73	1.6(1.6)	99.9
중학교	100	4.7(2.1)	44.5	46	0.0(0.0)	.	54	8.8(3.8)	43.1
고등학교	361	3.5(1.0)	29.5	201	2.3(1.0)	46.4	160	5.3(1.8)	33.2
대학교 이상	278	8.5(1.7)	19.8	137	3.2(1.5)	46.5	141	14.1(3.0)	21.3
직업									
전문행정관리	74	8.9(3.1)	34.5	40	0.0(0.0)	.	34	21.6(6.9)	31.9
사무직	94	6.7(2.5)	37.6	52	1.2(1.2)	99.5	42	14.6(5.6)	38.1
판매·서비스직	106	6.1(2.3)	38.6	27	9.5(5.3)	55.2	79	4.5(2.3)	50.3
농림어업	64	1.3(1.3)	100.9	39	2.1(2.1)	100.5	25	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	216	1.7(0.8)	48.3	175	1.3(0.9)	68.1	41	3.9(2.7)	70.3
기타 ³⁾	355	6.2(1.5)	24.4	107	3.9(2.1)	55.0	248	7.3(1.8)	25.2
월 가구소득									
50만원 미만	42	0.0(0.0)	.	11	-(-)	-	31	0.0(0.0)	.
50-100만원 미만	91	3.5(2.0)	56.1	42	4.9(3.5)	71.8	49	2.3(2.3)	98.1
100-200만원 미만	122	7.0(2.4)	34.4	62	3.0(2.1)	72.0	60	11.1(4.2)	37.8
200-300만원 미만	165	4.7(1.8)	37.9	82	4.3(2.2)	50.6	83	5.1(2.5)	49.6
300-400만원 미만	241	5.5(1.4)	26.1	119	0.0(0.0)	.	122	11.3(2.7)	24.1
400-500만원 미만	141	5.0(1.6)	32.9	71	3.0(2.1)	69.7	70	7.4(2.8)	37.5
500-600만원 미만	41	5.4(3.7)	68.3	21	0.0(0.0)	.	20	12.4(8.0)	64.4
600만원 이상	64	6.0(3.0)	49.5	31	3.9(3.6)	92.6	33	8.2(4.9)	59.4

주 : 1) 연간 영양교육 및 상담수혜율 : (최근 1년 동안 영양교육 및 상담을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 29〉 비만도 분포¹⁾ 및 비만율²⁾

(단위 : %)

구분	N	비만도 분포 ¹⁾						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율) ²⁾		평균(표준오차)	변동계수
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수		
전체	900	5.1(0.8)	16.5	69.2(1.6)	2.4	25.7(1.7)	6.6	23.3(0.1)	0.6
성									
남자	439	1.4(0.5)	35.9	67.2(2.3)	3.4	31.4(2.4)	7.7	24.2(0.2)	0.7
여자	461	9.0(1.6)	18.2	71.4(2.2)	3.0	19.7(2.1)	10.7	22.5(0.2)	0.8
연령									
19-29	114	12.4(2.9)	23.5	63.5(4.2)	6.6	24.1(4.3)	17.9	23.0(0.5)	2.2
30-39	131	5.6(1.8)	32.1	61.5(5.1)	8.3	33.0(4.9)	14.9	23.6(0.4)	1.5
40-49	186	2.8(1.1)	40.5	70.1(3.1)	4.4	27.2(3.1)	11.3	23.5(0.2)	0.9
50-59	195	1.0(0.6)	68.0	75.3(3.3)	4.3	23.7(3.2)	13.3	23.5(0.2)	0.8
60-69	137	2.5(1.0)	41.2	70.3(3.6)	5.1	27.2(3.7)	13.5	23.4(0.2)	1.1
70 이상	137	8.7(2.3)	26.9	74.5(3.2)	4.3	16.8(3.5)	20.9	22.6(0.3)	1.2
19-64	713	4.7(1.0)	20.9	68.1(1.9)	2.7	27.2(1.9)	7.0	23.5(0.2)	0.7
65 이상	187	7.1(1.6)	22.4	75.4(3.0)	4.0	17.5(3.3)	19.0	22.7(0.2)	0.9
교육수준 ³⁾									
무학	48	13.5(5.1)	38.0	68.1(5.3)	7.7	18.4(5.3)	29.0	21.8(0.5)	2.3
초등학교	112	4.3(2.0)	46.7	75.2(4.1)	5.4	20.5(3.8)	18.7	23.2(0.2)	1.0
중학교	100	1.7(1.2)	70.5	63.1(5.4)	8.6	35.2(5.6)	15.8	24.2(0.3)	1.4
고등학교	360	5.1(1.4)	26.6	70.1(2.3)	3.3	24.8(2.4)	9.5	23.3(0.2)	0.9
대학교 이상	278	5.2(1.2)	22.0	68.1(2.7)	4.0	26.7(2.5)	9.3	23.3(0.2)	0.8
직업									
전문행정관리	74	4.3(2.4)	55.5	65.0(7.2)	11.1	30.6(6.7)	21.9	23.5(0.5)	2.3
사무직	93	1.6(1.1)	69.9	76.0(4.2)	5.5	22.4(4.0)	17.8	23.4(0.2)	1.0
판매·서비스직	103	3.1(1.8)	57.2	68.3(5.1)	7.4	28.6(4.9)	17.0	23.3(0.3)	1.3
농림어업	64	2.5(1.8)	71.3	68.0(7.0)	10.3	29.6(6.9)	23.2	23.3(0.4)	1.9
기능단순노무직	216	2.1(1.1)	51.2	68.0(3.4)	5.0	29.9(3.2)	10.8	23.9(0.2)	0.9
기타 ⁴⁾	350	9.3(1.8)	19.4	69.2(2.3)	3.3	21.4(2.2)	10.3	22.9(0.2)	1.0
월 가구소득									
50만원 미만	38	13.6(5.8)	43.0	46.7(8.8)	18.9	39.7(8.0)	20.1	23.0(0.7)	3.0
50-100만원 미만	88	8.0(2.7)	33.5	80.5(4.3)	5.4	11.5(3.7)	32.0	22.4(0.3)	1.2
100-200만원 미만	122	4.4(1.8)	40.3	73.7(3.1)	4.2	22.0(2.9)	13.4	23.2(0.3)	1.2
200-300만원 미만	164	4.0(1.0)	25.7	70.1(3.9)	5.6	25.9(3.7)	14.3	23.5(0.4)	1.6
300-400만원 미만	241	4.7(1.7)	35.8	68.7(3.4)	5.0	26.6(3.1)	11.7	23.2(0.2)	1.0
400-500만원 미만	140	7.4(2.8)	38.2	70.0(3.8)	5.5	22.6(4.1)	18.1	23.5(0.5)	2.0
500-600만원 미만	41	2.0(1.8)	89.2	66.5(7.5)	11.2	31.5(8.4)	26.8	23.9(0.6)	2.6
600만원 이상	64	1.1(1.0)	98.1	60.7(7.2)	11.8	38.2(7.0)	18.3	24.1(0.5)	1.9

주 : 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만율 : (체질량지수(kg/m²) 25 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 30〉 주관적 비만인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	33.5(1.6)	4.8	440	26.2(1.9)	7.3	469	41.2(2.4)	5.8
연령									
19-29	114	33.1(6.1)	18.3	61	34.4(5.9)	17.2	53	31.5(8.0)	25.5
30-39	131	42.4(4.7)	11.2	59	34.0(6.3)	18.5	72	51.6(5.2)	10.1
40-49	187	41.4(3.4)	8.2	91	26.2(4.8)	18.3	96	57.5(5.0)	8.8
50-59	196	30.3(3.1)	10.3	92	22.5(4.1)	18.4	104	39.2(5.6)	14.3
60-69	138	28.4(4.3)	15.1	66	24.8(4.5)	17.9	72	31.4(6.5)	20.8
70 이상	143	16.6(3.0)	18.0	71	8.2(3.2)	39.0	72	23.6(5.3)	22.5
19-64	715	36.3(1.8)	4.8	342	28.1(2.3)	8.0	373	45.3(2.6)	5.8
65 이상	194	18.0(2.5)	14.0	98	14.1(3.4)	24.4	96	21.5(4.5)	20.9
교육수준 ²⁾									
무학	53	15.6(4.4)	28.0	12	-(-)	-	41	19.6(5.4)	27.7
초등학교	115	26.5(4.5)	16.9	42	8.5(3.9)	45.8	73	35.2(6.3)	17.8
중학교	100	32.9(4.7)	14.3	46	18.8(6.5)	34.5	54	44.8(6.4)	14.3
고등학교	361	31.6(2.4)	7.7	201	25.3(3.0)	12.0	160	40.8(4.0)	9.7
대학교 이상	278	40.2(2.8)	7.0	137	33.4(3.8)	11.3	141	47.5(4.3)	8.9
직업									
전문행정관리	74	43.3(5.4)	12.4	40	43.4(7.0)	16.0	34	43.2(8.7)	20.0
사무직	94	39.3(4.7)	11.9	52	27.4(6.2)	22.6	42	56.6(9.3)	16.4
판매·서비스직	106	33.5(5.0)	14.8	27	20.4(7.3)	35.7	79	39.5(6.8)	17.3
농림어업	64	24.7(5.4)	22.0	39	14.8(5.8)	39.1	25	39.7(10.4)	26.1
기능단순노무직	216	27.4(3.4)	12.3	175	24.7(3.6)	14.5	41	41.3(7.3)	17.6
기타 ³⁾	355	34.6(2.7)	7.7	107	25.4(4.3)	16.8	248	38.7(2.9)	7.6
월 가구소득									
50만원 미만	42	25.2(6.1)	24.1	11	-(-)	-	31	25.5(7.4)	29.1
50-100만원 미만	91	12.9(3.5)	27.4	42	6.4(3.5)	54.2	49	18.2(5.4)	30.0
100-200만원 미만	122	28.9(4.0)	13.9	62	19.4(4.6)	23.5	60	38.6(6.8)	17.6
200-300만원 미만	165	30.7(3.8)	12.4	82	22.3(5.0)	22.2	83	40.8(5.6)	13.6
300-400만원 미만	241	35.5(3.8)	10.7	119	27.2(4.0)	14.8	122	44.4(5.6)	12.7
400-500만원 미만	141	36.9(4.1)	11.1	71	33.0(5.5)	16.8	70	41.8(6.3)	15.1
500-600만원 미만	41	47.5(8.8)	18.6	21	37.4(11.1)	29.6	20	60.9(10.3)	16.8
600만원 이상	64	45.8(5.8)	12.6	31	33.4(8.1)	24.3	33	58.7(6.9)	11.8

주 : 1) 주관적 비만인지율 : (“약간 비만임” 또는 “매우 비만임”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 31〉 연간 체중조절 시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	50.4(2.1)	4.1	440	42.3(2.5)	5.9	469	59.0(2.7)	4.6
연령									
19-29	114	54.6(4.0)	7.3	61	47.4(6.5)	13.7	53	63.7(6.1)	9.5
30-39	131	61.0(4.5)	7.3	59	54.9(6.5)	11.9	72	67.7(6.4)	9.4
40-49	187	58.0(3.4)	5.9	91	41.1(4.8)	11.7	96	75.9(4.0)	5.3
50-59	196	53.3(4.0)	7.6	92	41.8(5.6)	13.4	104	66.4(5.0)	7.6
60-69	138	38.9(4.9)	12.6	66	33.0(6.1)	18.5	72	43.8(6.4)	14.6
70 이상	143	20.3(4.5)	22.2	71	25.3(6.9)	27.4	72	16.0(4.6)	28.4
19-64	715	55.7(2.0)	3.7	342	45.3(2.7)	5.9	373	67.0(2.9)	4.3
65 이상	194	21.7(3.6)	16.4	98	23.5(5.6)	23.7	96	20.1(4.2)	21.1
교육수준 ²⁾									
무학	53	8.1(3.7)	46.3	12	-(-)	-	41	5.7(3.6)	62.9
초등학교	115	29.1(4.4)	15.2	42	12.0(5.6)	47.0	73	37.4(5.7)	15.2
중학교	100	45.2(5.9)	13.0	46	40.6(8.7)	21.4	54	49.0(7.0)	14.3
고등학교	361	50.1(2.8)	5.6	201	37.7(3.5)	9.4	160	68.2(3.5)	5.2
대학교 이상	278	63.5(2.9)	4.6	137	55.7(4.2)	7.5	141	71.9(4.4)	6.1
직업									
전문행정관리	74	61.5(5.2)	8.5	40	53.8(8.0)	15.0	34	72.5(8.9)	12.3
사무직	94	68.2(4.7)	6.9	52	62.0(6.4)	10.3	42	77.2(6.5)	8.4
판매·서비스직	106	59.8(5.0)	8.3	27	45.5(10.4)	22.9	79	66.3(5.6)	8.4
농림어업	64	22.3(5.4)	24.3	39	19.1(6.9)	35.8	25	27.2(10.0)	36.9
기능단순노무직	216	43.8(3.4)	7.6	175	39.8(3.4)	8.5	41	64.1(6.8)	10.7
기타 ³⁾	355	47.3(3.3)	6.9	107	34.4(4.9)	14.1	248	53.1(3.6)	6.7
월 가구소득									
50만원 미만	42	17.3(5.4)	31.3	11	-(-)	-	31	23.2(7.5)	32.1
50-100만원 미만	91	28.3(5.5)	19.5	42	21.6(8.5)	39.4	49	33.8(7.0)	20.6
100-200만원 미만	122	39.3(4.8)	12.3	62	29.8(5.7)	19.2	60	48.8(6.3)	13.0
200-300만원 미만	165	48.4(4.1)	8.4	82	39.3(5.2)	13.2	83	59.4(5.0)	8.3
300-400만원 미만	241	57.1(3.5)	6.0	119	47.2(4.7)	9.9	122	67.6(4.8)	7.1
400-500만원 미만	141	53.3(4.1)	7.7	71	48.8(6.2)	12.6	70	58.9(6.4)	10.8
500-600만원 미만	41	64.5(7.6)	11.8	21	51.7(10.5)	20.4	20	81.5(6.4)	7.9
600만원 이상	64	67.2(6.5)	9.6	31	52.8(10.9)	20.7	33	82.0(7.2)	8.8

주 : 1) 연간 체중조절 시도율 : (최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 32〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	31.1(2.0)	6.5	440	32.3(2.6)	8.1	469	29.8(2.4)	8.0
연령									
19-29	114	17.4(3.5)	20.4	61	17.7(4.3)	24.2	53	17.1(4.4)	26.0
30-39	131	25.7(4.7)	18.2	59	31.7(7.5)	23.7	72	19.2(5.7)	29.6
40-49	187	26.8(3.4)	12.6	91	24.0(4.3)	17.8	96	29.8(4.7)	15.8
50-59	196	35.7(3.4)	9.6	92	39.9(4.6)	11.6	104	30.9(4.5)	14.7
60-69	138	34.1(3.7)	10.8	66	35.4(5.3)	15.0	72	33.0(5.9)	18.0
70 이상	143	55.3(4.7)	8.5	71	58.0(5.7)	9.9	72	53.0(6.2)	11.6
19-64	715	27.2(2.1)	7.7	342	28.5(2.7)	9.4	373	25.8(2.6)	10.1
65 이상	194	52.3(3.9)	7.4	98	55.4(5.4)	9.8	96	49.5(4.9)	9.9
교육수준 ²⁾									
무학	53	60.2(7.6)	12.7	12	—(—)	—	41	59.3(7.5)	12.7
초등학교	115	52.0(5.6)	10.8	42	52.3(8.2)	15.8	73	51.8(6.8)	13.0
중학교	100	37.7(5.5)	14.6	46	47.8(8.1)	16.9	54	29.0(7.2)	24.7
고등학교	361	29.4(2.7)	9.3	201	32.3(3.2)	9.9	160	25.0(4.2)	16.9
대학교 이상	278	21.5(2.7)	12.4	137	22.6(3.8)	17.0	141	20.4(3.7)	18.3
직업									
전문행정관리	74	25.5(4.4)	17.3	40	29.1(7.4)	25.4	34	20.4(6.6)	32.4
사무직	94	12.9(3.7)	28.4	52	16.0(5.5)	34.2	42	8.4(4.7)	56.2
판매·서비스직	106	27.8(4.6)	16.5	27	33.3(8.7)	26.2	79	25.4(5.2)	20.4
농림어업	64	46.2(5.0)	10.8	39	48.6(7.5)	15.4	25	42.6(8.7)	20.4
기능단순노무직	216	33.6(3.3)	9.8	175	33.5(3.4)	10.1	41	34.1(7.4)	21.6
기타 ³⁾	355	35.5(2.9)	8.2	107	37.1(4.6)	12.5	248	34.8(3.4)	9.8
월 가구소득									
50만원 미만	42	55.7(7.1)	12.8	11	—(—)	—	31	52.2(8.1)	15.5
50-100만원 미만	91	41.7(7.5)	17.9	42	44.1(10.1)	22.9	49	39.8(7.4)	18.6
100-200만원 미만	122	39.5(5.7)	14.4	62	46.8(7.8)	16.7	60	32.1(7.0)	21.7
200-300만원 미만	165	30.5(4.0)	13.2	82	30.0(5.0)	16.6	83	31.1(5.5)	17.6
300-400만원 미만	241	24.7(3.2)	12.8	119	25.4(4.2)	16.4	122	23.9(4.0)	16.8
400-500만원 미만	141	31.1(3.9)	12.7	71	32.6(6.2)	19.1	70	29.2(6.3)	21.4
500-600만원 미만	41	40.5(6.3)	15.6	21	41.5(11.1)	26.8	20	39.2(11.0)	28.0
600만원 이상	64	15.8(3.5)	22.4	31	17.3(6.6)	38.4	33	14.3(4.6)	32.5

주 : 1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 : (“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 33〉 저작불편호소율 : 65세 이상¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	194	35.9(3.1)	8.7	98	30.2(4.5)	14.8	96	40.9(4.9)	11.9
교육수준 ²⁾									
무학	48	49.6(7.1)	14.4	11	-(-)	-	37	52.9(8.6)	16.3
초등학교	78	39.3(4.9)	12.3	34	37.2(7.8)	20.9	44	40.6(7.1)	17.5
중학교	27	16.4(7.6)	46.2	18	-(-)	-	9	-(-)	-
고등학교	34	30.5(7.5)	24.6	29	31.2(7.6)	24.2	5	-(-)	-
대학교 이상	6	-(-)	-	5	-(-)	-	1	-(-)	-
월 가구소득									
50만원 미만	38	46.2(7.6)	16.4	10	-(-)	-	28	47.9(9.9)	20.7
50-100만원 미만	64	37.0(5.9)	16.0	33	29.3(7.6)	26.0	31	44.1(9.4)	21.3
100-200만원 미만	45	34.5(6.5)	18.8	31	38.5(7.1)	18.3	14	-(-)	-
200-300만원 미만	24	18.7(7.4)	39.7	14	-(-)	-	10	-(-)	-
300-400만원 미만	15	-(-)	-	8	-(-)	-	7	-(-)	-
400-500만원 미만	5	-(-)	-	1	-(-)	-	4	-(-)	-
500-600만원 미만	1	-(-)	-	0	-(-)	-	1	-(-)	-
600만원 이상	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-

주 : 1) 저작불편호소율 : 65세 이상 : (“매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

〈표 34〉 틀니 이용 행태 : 50세 이상¹⁾

(단위 : %)

구분	N ²⁾	위아래 둘 다 있음		위쪽만 있음		아래쪽만 있음		아니오	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	477	19.6(2.1)	10.5	5.5(1.1)	19.8	3.4(0.9)	26.9	71.5(2.4)	3.3
성									
남자	229	16.7(2.4)	14.6	5.1(1.5)	28.8	3.4(1.2)	36.0	74.8(3.0)	4.0
여자	248	22.4(2.7)	11.9	5.9(1.3)	22.8	3.4(1.2)	36.5	68.3(3.0)	4.4
교육수준 ³⁾									
무학	52	55.5(6.6)	11.8	9.8(4.1)	41.4	0.0(0.0)	.	34.7(5.5)	16.0
초등학교	113	38.2(4.7)	12.4	6.1(2.1)	33.8	4.8(2.2)	45.4	50.8(4.7)	9.3
중학교	89	20.8(4.5)	21.5	4.8(1.9)	39.8	4.7(2.3)	49.3	69.8(5.0)	7.2
고등학교	166	6.1(1.8)	29.7	5.7(2.0)	34.9	3.2(1.3)	41.1	85.0(3.2)	3.8
대학교 이상	56	2.6(1.0)	38.3	0.0(0.0)	.	2.6(1.8)	67.8	94.8(2.0)	2.1
월 가구소득									
50만원 미만	40	52.5(9.0)	17.1	3.2(3.2)	99.7	0.0(0.0)	.	44.2(8.8)	20.0
50-100만원 미만	85	42.5(5.2)	12.2	11.8(2.8)	24.0	0.0(0.0)	.	45.7(5.4)	11.8
100-200만원 미만	90	23.5(4.9)	20.7	5.7(2.9)	50.7	6.9(2.4)	35.3	63.9(4.9)	7.7
200-300만원 미만	80	11.4(3.2)	28.6	6.4(2.1)	32.9	8.0(3.5)	43.9	74.3(4.6)	6.2
300-400만원 미만	88	10.7(4.2)	38.8	3.1(1.7)	54.2	2.0(1.3)	66.9	84.2(4.6)	5.5
400-500만원 미만	59	3.4(1.9)	56.6	3.7(2.5)	66.8	3.6(2.5)	70.6	89.3(4.4)	5.0
500-600만원 미만	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
600만원 이상	20	0.0(0.0)	.	3.9(3.8)	96.9	0.0(0.0)	.	96.1(3.8)	3.9

주 : 1) 틀니 이용 행태 : 50세 이상 : (응답보기별 응답자 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 50세 이상 조사대상 응답자 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

〈표 35〉 칫솔질 실천율

(단위 : %)

구분	아침식사 후 칫솔질실천율 ¹⁾			점심식사 후 칫솔질실천율 ²⁾			저녁식사 후 칫솔질실천율 ³⁾			잠자기 전 칫솔질실천율 ⁴⁾		
	N	%(표준오차)	변동 계수	N	%(표준오차)	변동 계수	N	%(표준오차)	변동 계수	N	%(표준오차)	변동 계수
전체	760	94.0(0.8)	0.9	898	64.9(2.5)	3.9	905	74.5(1.7)	2.3	907	59.3(2.0)	3.4
성												
남자	368	92.7(1.2)	1.3	435	58.4(2.9)	5.0	438	73.5(2.6)	3.5	438	57.2(2.2)	3.9
여자	392	95.4(1.1)	1.2	463	71.8(2.9)	4.1	467	75.7(2.0)	2.6	469	61.6(2.7)	4.3
연령												
19-29	64	90.8(3.1)	3.4	113	78.1(4.3)	5.6	113	73.7(3.7)	5.1	114	70.5(4.4)	6.3
30-39	101	93.5(2.2)	2.4	129	67.0(4.7)	7.0	129	69.6(4.0)	5.7	130	58.2(5.4)	9.2
40-49	145	94.7(2.0)	2.1	181	74.6(3.9)	5.2	186	73.9(3.4)	4.7	186	64.4(3.7)	5.7
50-59	176	95.3(1.5)	1.6	194	62.0(4.6)	7.4	196	81.2(2.9)	3.6	196	60.4(4.2)	6.9
60-69	133	94.7(2.3)	2.4	138	47.3(5.1)	10.8	138	79.9(3.8)	4.7	138	43.7(4.8)	11.0
70 이상	141	93.5(1.8)	2.0	143	47.4(4.7)	9.9	143	66.1(3.5)	5.3	143	48.4(4.1)	8.6
19-64	568	94.1(1.0)	1.0	704	68.0(2.7)	3.9	711	74.8(1.8)	2.5	713	62.1(2.2)	3.6
65 이상	192	94.0(1.4)	1.4	194	48.3(4.3)	9.0	194	73.0(3.0)	4.1	194	44.5(3.8)	8.5
교육수준 ⁵⁾												
무학	53	87.9(4.9)	5.6	53	44.8(6.5)	14.5	53	64.1(5.0)	7.7	53	45.2(6.6)	14.5
초등학교	112	96.0(2.0)	2.0	115	44.1(4.9)	11.1	115	71.3(4.1)	5.8	115	39.9(4.9)	12.2
중학교	91	94.4(2.0)	2.1	99	51.7(5.3)	10.3	99	73.2(4.6)	6.3	100	58.3(5.6)	9.6
고등학교	291	94.3(1.5)	1.6	360	64.5(3.3)	5.1	360	78.1(2.7)	3.5	360	57.3(3.0)	5.3
대학교 이상	211	93.9(1.5)	1.6	269	77.7(3.4)	4.4	276	72.5(2.3)	3.2	277	69.5(3.3)	4.8
직업												
전문행정관리	58	95.1(2.8)	3.0	73	75.1(6.3)	8.4	73	77.9(5.3)	6.8	73	66.7(5.7)	8.6
사무직	76	93.2(3.0)	3.2	92	77.7(5.0)	6.5	94	70.2(4.5)	6.3	94	63.8(5.4)	8.4
판매·서비스직	82	94.8(2.5)	2.7	104	77.2(4.7)	6.1	106	79.9(4.3)	5.4	106	58.5(5.0)	8.5
농림어업	64	89.6(4.1)	4.6	64	33.1(6.4)	19.5	64	65.8(6.5)	9.8	64	47.3(7.4)	15.7
기능단순노무직	180	94.5(2.0)	2.1	214	60.0(3.6)	6.0	214	77.8(3.1)	4.0	215	51.6(3.9)	7.6
기타 ⁶⁾	300	94.3(1.3)	1.4	351	62.2(3.7)	6.0	354	72.4(2.7)	3.8	355	63.3(2.8)	4.4
월 가구소득												
50만원 미만	40	91.8(4.2)	4.6	42	50.4(8.3)	16.4	42	68.6(7.6)	11.1	42	55.2(8.1)	14.7
50-100만원 미만	86	92.7(2.5)	2.7	91	51.4(5.4)	10.4	91	76.4(3.6)	4.7	91	51.1(5.3)	10.4
100-200만원 미만	110	90.2(3.2)	3.6	122	57.1(6.2)	10.9	122	78.0(4.4)	5.6	122	49.9(6.0)	12.1
200-300만원 미만	132	95.8(1.6)	1.7	163	62.8(4.4)	7.0	163	78.6(3.0)	3.9	165	50.4(4.7)	9.3
300-400만원 미만	194	96.3(1.5)	1.5	240	68.3(4.4)	6.5	240	72.3(3.7)	5.1	240	67.2(3.8)	5.7
400-500만원 미만	113	96.1(2.0)	2.1	140	77.1(4.8)	6.3	141	73.1(3.2)	4.3	140	76.1(4.2)	5.5
500-600만원 미만	33	91.7(3.9)	4.3	38	65.6(10.8)	16.4	41	72.3(7.5)	10.4	41	46.1(7.5)	16.2
600만원 이상	50	87.5(3.9)	4.5	60	62.3(4.5)	7.3	63	73.5(7.0)	9.6	64	50.2(6.2)	12.3

주 : 1) 어제 아침식사 후 칫솔질 실천율 : (아침식사 후 칫솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 아침식사 한 사람의 수) × 100

2) 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 : (점심식사 후 칫솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 점심식사 한 사람의 수) × 100

3) 어제 저녁식사 후 칫솔질 실천율 : (저녁식사 후 칫솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 저녁식사 한 사람의 수) × 100

4) 어제 잠자기 전 칫솔질 실천율 : (잠자기 전 칫솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 잠을 잔 사람의 수) × 100

5) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

6) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 36〉 연간 구강검진 수진율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	44.8(2.0)	4.5	440	49.3(2.8)	5.7	469	40.0(2.4)	6.0
연령									
19-29	114	27.9(3.9)	13.9	61	26.7(4.9)	18.2	53	29.4(6.2)	21.0
30-39	131	46.1(5.0)	10.9	59	51.0(6.3)	12.4	72	40.8(7.5)	18.4
40-49	187	53.3(4.1)	7.6	91	60.8(6.3)	10.3	96	45.2(5.5)	12.3
50-59	196	52.5(3.2)	6.0	92	54.4(4.1)	7.6	104	50.2(4.7)	9.3
60-69	138	43.6(4.4)	10.1	66	53.9(5.7)	10.5	72	35.2(5.3)	15.0
70 이상	143	37.2(4.5)	12.2	71	44.8(7.1)	15.9	72	30.8(5.3)	17.2
19-64	715	46.0(2.1)	4.7	342	49.7(3.0)	6.1	373	41.9(2.7)	6.5
65 이상	194	38.2(4.4)	11.4	98	46.7(5.9)	12.6	96	30.8(4.7)	15.2
교육수준 ²⁾									
무학	53	20.2(5.8)	28.8	12	—(—)	—	41	19.1(6.0)	31.4
초등학교	115	38.8(4.7)	12.1	42	41.4(7.6)	18.2	73	37.5(5.0)	13.4
중학교	100	37.6(5.2)	13.8	46	38.8(9.2)	23.6	54	36.6(7.2)	19.7
고등학교	361	44.8(3.1)	6.8	201	46.2(4.0)	8.6	160	42.9(3.9)	9.2
대학교 이상	278	51.5(3.2)	6.1	137	58.9(4.5)	7.6	141	43.4(4.4)	10.1
직업									
전문행정관리	74	49.7(7.7)	15.6	40	56.9(8.0)	14.0	34	39.3(12.3)	31.4
사무직	94	57.6(5.2)	9.1	52	67.0(6.7)	10.0	42	43.9(8.1)	18.4
판매·서비스직	106	39.9(4.2)	10.5	27	36.0(8.3)	23.1	79	41.7(5.4)	12.9
농림어업	64	30.8(6.7)	21.8	39	43.6(9.9)	22.8	25	11.2(5.6)	50.3
기능단순노무직	216	53.1(3.4)	6.4	175	52.5(4.0)	7.6	41	56.3(8.0)	14.3
기타 ³⁾	355	37.2(2.9)	7.9	107	34.6(4.4)	12.6	248	38.4(3.5)	9.1
월 가구소득									
50만원 미만	42	40.1(8.3)	20.6	11	—(—)	—	31	35.9(8.2)	22.8
50-100만원 미만	91	42.7(6.4)	15.1	42	47.5(9.1)	19.1	49	38.8(7.7)	20.0
100-200만원 미만	122	35.4(5.4)	15.2	62	34.3(8.1)	23.5	60	36.4(5.6)	15.3
200-300만원 미만	165	35.6(3.9)	11.0	82	43.0(6.4)	14.8	83	26.7(4.9)	18.5
300-400만원 미만	241	45.7(3.8)	8.2	119	48.5(5.0)	10.3	122	42.8(4.8)	11.2
400-500만원 미만	141	53.6(5.6)	10.4	71	60.7(5.3)	8.8	70	44.9(8.1)	18.0
500-600만원 미만	41	57.4(9.7)	16.9	21	65.2(13.7)	21.0	20	47.2(10.2)	21.6
600만원 이상	64	52.3(5.8)	11.1	31	49.6(8.4)	17.0	33	55.0(9.1)	16.6

주 : 1) 연간 구강검진 수진율 : (최근 1년 동안 구강검진을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 37〉 연간 스케일링 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	803	36.5(2.1)	5.8	393	34.8(2.3)	6.7	410	38.3(3.1)	8.0
연령									
19-29	114	39.5(5.3)	13.5	61	35.4(6.2)	17.6	53	44.7(6.9)	15.3
30-39	131	37.3(4.9)	13.0	59	34.1(5.9)	17.4	72	40.7(6.7)	16.4
40-49	187	38.7(4.0)	10.2	91	41.6(5.6)	13.4	96	35.6(5.4)	15.2
50-59	189	39.3(4.5)	11.5	90	31.4(4.7)	14.8	99	48.7(6.6)	13.5
60-69	115	32.0(4.7)	14.8	59	35.2(5.6)	15.9	56	28.8(6.0)	20.9
70 이상	67	12.5(4.4)	35.2	33	16.5(6.7)	40.6	34	9.5(5.0)	53.3
19-64	702	38.5(2.3)	6.1	339	36.1(2.5)	6.9	363	41.1(3.5)	8.4
65 이상	101	15.7(4.3)	27.1	54	20.1(6.5)	32.2	47	11.6(4.8)	41.4
교육수준 ²⁾									
무학	24	4.6(4.5)	99.1	5	-(-)	-	19	-(-)	-
초등학교	70	23.3(5.4)	23.1	24	17.0(8.1)	47.9	46	26.1(6.0)	23.0
중학교	82	31.3(5.3)	17.0	35	36.6(7.2)	19.7	47	27.4(6.8)	24.8
고등학교	349	36.1(3.1)	8.7	192	31.9(3.4)	10.5	157	42.2(5.4)	12.8
대학교 이상	276	42.2(3.4)	8.0	135	41.0(4.3)	10.4	141	43.4(4.6)	10.7
직업									
전문행정관리	74	39.8(5.0)	12.5	40	40.3(6.8)	16.9	34	39.2(8.5)	21.6
사무직	94	42.9(5.7)	13.4	52	37.7(7.1)	18.9	42	50.4(9.0)	17.8
판매·서비스직	101	39.3(4.8)	12.3	27	38.8(9.0)	23.3	74	39.5(5.9)	14.9
농림어업	44	29.3(4.8)	16.4	27	22.9(5.9)	25.8	17	-(-)	-
기능단순노무직	205	36.5(3.2)	8.9	169	37.3(3.5)	9.4	36	31.6(7.5)	23.8
기타 ³⁾	285	32.9(3.8)	11.4	78	25.0(5.3)	21.3	207	36.2(4.2)	11.7
월 가구소득									
50만원 미만	20	8.9(8.4)	94.6	4	-(-)	-	16	-(-)	-
50-100만원 미만	54	35.5(7.7)	21.7	22	27.6(7.7)	27.8	32	40.8(9.2)	22.6
100-200만원 미만	101	24.3(5.5)	22.5	53	28.1(7.3)	25.9	48	20.2(6.0)	29.8
200-300만원 미만	154	25.4(4.0)	15.6	77	25.1(4.6)	18.5	77	25.8(5.6)	21.6
300-400만원 미만	231	39.6(3.3)	8.3	114	35.2(4.1)	11.5	117	44.4(5.2)	11.7
400-500만원 미만	138	42.8(4.5)	10.4	70	44.2(6.1)	13.7	68	41.0(6.9)	16.9
500-600만원 미만	39	45.9(8.4)	18.2	21	38.4(11.9)	30.9	18	-(-)	-
600만원 이상	64	50.1(6.4)	12.7	31	42.2(9.6)	22.7	33	58.2(7.6)	13.1

주 : 1) 연간 스케일링 경험률 : (최근 1년 동안 스케일링을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 38〉 치실 및 치간솔 사용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	803	28.1(2.2)	7.7	393	23.8(2.5)	10.4	410	32.9(2.8)	8.6
연령									
19-29	114	20.2(4.0)	19.7	61	17.6(4.5)	25.5	53	23.5(5.9)	25.3
30-39	131	39.4(4.1)	10.3	59	28.3(5.3)	18.6	72	51.5(6.1)	11.9
40-49	187	33.7(3.8)	11.3	91	26.1(4.5)	17.1	96	41.9(5.4)	12.8
50-59	189	27.6(4.0)	14.4	90	26.5(5.1)	19.2	99	28.8(5.1)	17.8
60-69	115	23.8(4.3)	18.1	59	22.0(5.3)	24.2	56	25.5(5.7)	22.3
70 이상	67	4.4(2.4)	54.6	33	10.1(5.6)	55.4	34	0.0(0.0)	.
19-64	702	29.6(2.3)	7.8	339	24.1(2.7)	11.0	363	35.6(3.0)	8.4
65 이상	101	13.0(3.4)	25.8	54	19.5(6.1)	31.1	47	6.9(4.0)	57.0
교육수준 ²⁾									
무학	24	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	19	-(-)	-
초등학교	70	18.0(4.2)	23.2	24	14.0(5.9)	42.5	46	19.8(5.6)	28.1
중학교	82	17.5(4.6)	26.5	35	25.9(7.8)	30.0	47	11.2(4.6)	41.1
고등학교	349	25.4(2.9)	11.3	192	21.7(3.5)	15.9	157	30.6(3.9)	12.6
대학교 이상	276	37.5(3.2)	8.5	135	28.0(3.7)	13.1	141	47.6(4.6)	9.7
직업									
전문행정관리	74	42.2(6.0)	14.3	40	37.5(7.1)	18.8	34	48.9(10.1)	20.6
사무직	94	28.4(5.2)	18.3	52	17.6(5.9)	33.4	42	44.0(9.1)	20.8
판매·서비스직	101	26.7(4.0)	15.0	27	26.3(7.5)	28.5	74	26.9(4.4)	16.5
농림어업	44	11.5(6.0)	52.2	27	8.4(6.0)	71.2	17	-(-)	-
기능단순노무직	205	27.2(3.9)	14.3	169	27.6(4.1)	14.7	36	25.1(8.0)	31.8
기타 ³⁾	285	27.3(2.8)	10.2	78	14.8(3.7)	25.2	207	32.4(3.3)	10.2
월 가구소득									
50만원 미만	20	16.3(6.1)	37.2	4	-(-)	-	16	-(-)	-
50-100만원 미만	54	16.2(5.1)	31.6	22	4.3(3.8)	90.3	32	24.3(7.4)	30.5
100-200만원 미만	101	24.6(5.9)	24.1	53	26.5(6.8)	25.8	48	22.6(6.9)	30.5
200-300만원 미만	154	32.1(4.7)	14.6	77	30.0(5.2)	17.3	77	34.7(6.2)	17.9
300-400만원 미만	231	27.6(3.8)	13.9	114	21.0(4.2)	19.9	117	34.8(5.1)	14.7
400-500만원 미만	138	22.5(3.8)	17.0	70	22.0(5.5)	24.9	68	23.2(6.2)	26.6
500-600만원 미만	39	37.3(5.9)	15.7	21	23.1(7.7)	33.2	18	-(-)	-
600만원 이상	64	40.6(6.1)	14.9	31	30.3(7.9)	26.0	33	51.3(9.7)	18.9

주 : 1) 치실 및 치간솔 사용률 : (치실(floss) 혹은 치간솔을 사용하는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 39〉 연간 치과병의원 이용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	38.0(2.2)	5.8	440	37.6(2.9)	7.8	469	38.5(2.6)	6.7
연령									
19-29	114	38.1(4.8)	12.7	61	32.9(6.3)	19.3	53	44.7(6.3)	14.0
30-39	131	38.6(5.5)	14.2	59	36.9(6.7)	18.0	72	40.5(6.5)	16.1
40-49	187	41.4(4.2)	10.2	91	39.7(5.8)	14.6	96	43.2(5.4)	12.5
50-59	196	40.9(4.2)	10.2	92	41.3(5.7)	13.8	104	40.4(5.1)	12.7
60-69	138	40.6(4.3)	10.7	66	47.8(5.1)	10.8	72	34.6(5.5)	15.8
70 이상	143	22.4(4.2)	18.6	71	23.7(5.8)	24.5	72	21.3(5.3)	25.0
19-64	715	40.3(2.5)	6.2	342	39.0(3.3)	8.5	373	41.7(3.0)	7.1
65 이상	194	25.7(3.5)	13.6	98	29.0(4.7)	16.2	96	22.7(4.7)	20.7
교육수준 ²⁾									
무학	53	11.3(4.1)	36.7	12	-(-)	-	41	14.1(4.9)	34.9
초등학교	115	39.7(4.7)	12.0	42	46.2(7.7)	16.7	73	36.5(5.6)	15.5
중학교	100	40.5(5.3)	13.2	46	44.5(8.4)	18.8	54	37.0(6.3)	17.0
고등학교	361	36.0(3.4)	9.4	201	32.5(3.9)	12.1	160	40.9(4.7)	11.4
대학교 이상	278	42.9(3.4)	8.0	137	43.5(4.6)	10.6	141	42.3(4.3)	10.2
직업									
전문행정관리	74	45.6(5.4)	11.9	40	47.5(9.7)	20.3	34	42.8(9.0)	21.1
사무직	94	45.1(5.7)	12.7	52	44.0(6.4)	14.6	42	46.7(9.7)	20.8
판매·서비스직	106	38.7(5.3)	13.8	27	38.3(9.8)	25.5	79	38.9(6.0)	15.5
농림어업	64	35.4(5.8)	16.5	39	32.7(6.4)	19.4	25	39.4(10.6)	27.0
기능단순노무직	216	38.4(3.9)	10.3	175	39.3(4.1)	10.4	41	34.0(8.1)	23.8
기타 ³⁾	355	33.9(2.8)	8.2	107	27.1(4.9)	17.9	248	36.9(3.3)	8.8
월 가구소득									
50만원 미만	42	21.1(7.4)	34.8	11	-(-)	-	31	19.1(7.2)	37.9
50-100만원 미만	91	30.4(5.5)	18.2	42	26.4(7.2)	27.4	49	33.7(7.2)	21.4
100-200만원 미만	122	34.9(5.0)	14.4	62	41.9(8.0)	19.1	60	27.8(6.2)	22.4
200-300만원 미만	165	32.2(4.1)	12.6	82	33.6(5.2)	15.6	83	30.6(5.2)	17.2
300-400만원 미만	241	33.1(3.7)	11.2	119	28.1(4.0)	14.2	122	38.3(4.7)	12.3
400-500만원 미만	141	43.3(4.4)	10.2	71	47.0(6.5)	13.8	70	38.7(5.3)	13.6
500-600만원 미만	41	56.1(8.0)	14.3	21	41.2(10.8)	26.2	20	76.0(7.5)	9.9
600만원 이상	64	63.5(7.2)	11.3	31	62.2(9.7)	15.6	33	64.8(8.3)	12.8

주 : 1) 연간 치과병의원 이용률 : (최근 1년 동안 치과병의원을 이용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 40〉 스트레스 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	25.5(1.6)	6.5	440	26.6(2.6)	9.8	469	24.4(2.0)	8.4
연령									
19-29	114	28.5(4.2)	14.6	61	16.2(4.5)	27.7	53	44.3(6.9)	15.5
30-39	131	35.5(4.8)	13.6	59	36.9(7.2)	19.5	72	34.0(6.5)	19.1
40-49	187	27.9(3.2)	11.6	91	37.9(5.3)	14.0	96	17.2(3.7)	21.5
50-59	196	21.0(3.1)	14.6	92	28.3(5.2)	18.4	104	12.5(3.0)	24.3
60-69	138	20.2(2.8)	13.9	66	19.0(4.2)	22.0	72	21.2(4.5)	21.4
70 이상	143	16.3(3.2)	19.6	71	6.8(2.7)	39.5	72	24.3(5.4)	22.1
19-64	715	27.2(1.9)	6.9	342	29.3(2.9)	10.0	373	24.9(2.2)	9.0
65 이상	194	16.5(3.0)	18.1	98	10.0(2.7)	27.1	96	22.2(4.8)	21.6
교육수준 ²⁾									
무학	53	24.8(5.9)	23.8	12	—(—)	—	41	31.2(7.1)	22.7
초등학교	115	18.5(3.4)	18.2	42	12.3(5.7)	46.0	73	21.5(4.4)	20.5
중학교	100	19.6(3.6)	18.5	46	13.4(4.5)	33.7	54	24.8(5.5)	22.4
고등학교	361	22.8(2.4)	10.5	201	25.7(3.5)	13.5	160	18.6(2.8)	15.3
대학교 이상	278	32.5(3.0)	9.1	137	34.7(4.1)	11.9	141	30.2(4.1)	13.5
직업									
전문행정관리	74	40.9(6.3)	15.4	40	45.0(8.0)	17.7	34	34.9(8.2)	23.6
사무직	94	29.3(4.6)	15.8	52	36.4(6.7)	18.4	42	19.0(5.5)	29.0
판매·서비스직	106	28.5(4.6)	16.3	27	42.6(9.2)	21.5	79	22.1(4.3)	19.2
농림어업	64	14.7(4.5)	30.5	39	6.1(4.4)	72.5	25	27.8(8.5)	30.4
기능단순노무직	216	25.1(3.9)	15.3	175	26.4(4.3)	16.3	41	18.4(5.7)	31.1
기타 ³⁾	355	21.6(2.5)	11.6	107	12.9(3.3)	25.9	248	25.5(3.1)	12.4
월 가구소득									
50만원 미만	42	18.3(6.7)	36.9	11	—(—)	—	31	24.6(8.6)	34.9
50-100만원 미만	91	20.4(4.6)	22.7	42	9.6(3.7)	38.2	49	29.2(7.5)	25.8
100-200만원 미만	122	34.5(4.7)	13.7	62	29.8(6.7)	22.4	60	39.2(6.2)	15.9
200-300만원 미만	165	21.3(3.9)	18.5	82	22.7(5.6)	24.8	83	19.6(4.2)	21.4
300-400만원 미만	241	26.6(3.6)	13.6	119	27.8(4.5)	16.4	122	25.3(4.7)	18.4
400-500만원 미만	141	24.8(3.1)	12.4	71	31.6(4.3)	13.6	70	16.4(5.1)	31.1
500-600만원 미만	41	30.2(7.9)	26.2	21	33.5(10.6)	31.5	20	25.8(10.5)	40.6
600만원 이상	64	26.0(5.4)	20.9	31	31.9(9.1)	28.4	33	19.9(5.2)	26.0

주 : 1) 스트레스 인지율 : (평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 41〉 우울감 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	3.0(0.5)	17.8	440	1.3(0.6)	42.1	469	4.8(0.9)	17.8
연령									
19-29	114	3.4(1.8)	53.3	61	1.8(1.8)	98.4	53	5.4(3.3)	59.9
30-39	131	2.8(1.3)	48.2	59	1.7(1.7)	99.4	72	3.9(2.2)	56.3
40-49	187	3.1(1.2)	38.5	91	1.0(1.0)	100.6	96	5.3(2.2)	41.2
50-59	196	3.5(1.3)	37.1	92	0.7(0.7)	98.9	104	6.7(2.7)	39.7
60-69	138	2.4(1.0)	41.9	66	1.6(1.6)	100.5	72	3.1(1.3)	42.0
70 이상	143	2.5(1.4)	56.7	71	1.6(1.6)	98.2	72	3.2(2.2)	68.7
19-64	715	3.2(0.6)	18.7	342	1.3(0.6)	46.3	373	5.3(1.0)	18.3
65 이상	194	1.8(1.0)	56.1	98	1.2(1.2)	99.6	96	2.4(1.7)	68.3
교육수준 ²⁾									
무학	53	2.3(2.2)	98.9	12	-(-)	-	41	2.8(2.8)	99.9
초등학교	115	4.7(2.0)	41.9	42	5.5(3.2)	57.9	73	4.3(2.4)	55.4
중학교	100	5.1(2.3)	45.0	46	1.8(1.8)	98.9	54	7.8(3.8)	49.1
고등학교	361	2.1(0.7)	33.1	201	0.6(0.6)	101.5	160	4.2(1.4)	33.4
대학교 이상	278	3.4(1.2)	34.9	137	1.6(1.2)	72.3	141	5.2(2.0)	38.4
직업									
전문행정관리	74	1.4(1.4)	100.3	40	2.3(2.3)	98.8	34	0.0(0.0)	.
사무직	94	2.0(1.4)	68.9	52	0.0(0.0)	.	42	4.8(3.2)	67.3
판매·서비스직	106	4.5(2.4)	51.7	27	4.6(4.4)	95.3	79	4.5(2.7)	59.8
농림어업	64	1.6(1.6)	99.9	39	0.0(0.0)	.	25	4.0(4.0)	98.7
기능단순노무직	216	1.7(0.8)	50.0	175	0.7(0.7)	100.0	41	6.8(3.9)	56.9
기타 ³⁾	355	4.4(1.1)	25.2	107	2.1(1.1)	52.2	248	5.4(1.3)	24.8
월 가구소득									
50만원 미만	42	2.9(2.8)	96.0	11	-(-)	-	31	3.9(3.7)	93.6
50-100만원 미만	91	1.2(1.2)	99.0	42	0.0(0.0)	.	49	2.3(2.2)	98.6
100-200만원 미만	122	3.2(1.2)	38.0	62	2.9(1.9)	64.8	60	3.5(1.4)	41.5
200-300만원 미만	165	4.0(1.1)	27.4	82	0.0(0.0)	.	83	8.9(2.5)	28.7
300-400만원 미만	241	3.8(1.2)	33.0	119	1.5(1.1)	73.9	122	6.1(2.2)	36.1
400-500만원 미만	141	1.0(1.0)	95.9	71	1.8(1.7)	94.1	70	0.0(0.0)	.
500-600만원 미만	41	8.9(4.8)	53.8	21	3.7(3.5)	96.2	20	15.8(9.5)	59.9
600만원 이상	64	0.0(0.0)	.	31	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.

주 : 1) 우울감 경험률 : (최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 경험한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 42〉 자살생각률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	1.6(0.4)	23.2	440	0.8(0.4)	52.0	469	2.5(0.7)	27.5
연령									
19-29	114	1.6(1.1)	72.8	61	0.0(0.0)	.	53	3.6(2.5)	71.1
30-39	131	0.6(0.6)	101.7	59	0.0(0.0)	.	72	1.2(1.2)	100.9
40-49	187	1.9(0.8)	44.2	91	2.0(1.4)	71.4	96	1.8(0.9)	48.4
50-59	196	2.9(1.1)	36.7	92	1.1(1.1)	99.8	104	5.0(2.1)	42.6
60-69	138	1.1(0.8)	72.3	66	1.0(1.0)	98.9	72	1.2(1.2)	101.8
70 이상	143	0.7(0.7)	97.0	71	0.0(0.0)	.	72	1.4(1.3)	97.1
19-64	715	1.8(0.4)	24.1	342	0.8(0.5)	57.4	373	2.8(0.8)	28.2
65 이상	194	0.9(0.6)	71.0	98	0.7(0.7)	99.8	96	1.0(1.0)	98.3
교육수준 ²⁾									
무학	53	4.0(2.8)	68.9	12	-(-)	-	41	5.1(3.4)	66.9
초등학교	115	1.8(1.3)	72.3	42	0.0(0.0)	.	73	2.7(1.9)	70.9
중학교	100	3.9(2.1)	52.9	46	1.2(1.2)	101.9	54	6.2(3.5)	57.0
고등학교	361	1.4(0.6)	46.1	201	0.9(0.7)	71.6	160	1.9(1.1)	58.9
대학교 이상	278	1.0(0.5)	52.7	137	0.7(0.7)	100.7	141	1.4(1.0)	70.4
직업									
전문행정관리	74	2.7(1.9)	71.0	40	4.6(3.2)	69.4	34	0.0(0.0)	.
사무직	94	0.0(0.0)	.	52	0.0(0.0)	.	42	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	106	0.8(0.8)	99.5	27	0.0(0.0)	.	79	1.1(1.1)	98.6
농림어업	64	1.6(1.6)	99.9	39	0.0(0.0)	.	25	4.0(4.0)	98.7
기능단순노무직	216	1.8(0.8)	45.0	175	0.8(0.6)	77.9	41	6.9(4.1)	58.8
기타 ³⁾	355	2.0(0.8)	37.1	107	0.0(0.0)	.	248	2.9(1.1)	36.6
월 가구소득									
50만원 미만	42	2.4(2.3)	93.3	11	-(-)	-	31	3.3(3.1)	94.7
50-100만원 미만	91	0.0(0.0)	.	42	0.0(0.0)	.	49	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	122	2.8(1.5)	51.7	62	0.9(0.9)	101.3	60	4.8(2.8)	59.0
200-300만원 미만	165	2.5(0.9)	35.7	82	1.2(1.2)	100.3	83	4.0(1.2)	29.9
300-400만원 미만	241	1.5(0.9)	60.2	119	0.0(0.0)	.	122	3.0(1.8)	59.3
400-500만원 미만	141	0.0(0.0)	.	71	0.0(0.0)	.	70	0.0(0.0)	.
500-600만원 미만	41	6.4(3.0)	47.9	21	7.3(4.5)	61.8	20	5.1(5.1)	99.9
600만원 이상	64	0.0(0.0)	.	31	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.

주 : 1) 자살생각률 : (최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 사람의 수/ 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 43〉 인터넷, 게임(오락), 스마트폰 일상생활 지장 경험 빈도¹⁾

(단위 : %)

구분	전혀 없다			한 달에 1번 미만		한 달에 1번 정도		일주일에 1번 정도		거의 매일	
	N	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	821	96.3(0.8)	0.8	1.4(0.4)	31.4	1.2(0.5)	37.1	0.8(0.3)	44.9	0.3(0.2)	71.8
연령											
19-29	114	93.0(3.0)	3.2	0.9(0.9)	98.9	2.4(1.4)	56.7	1.9(1.4)	71.5	1.7(1.2)	71.6
30-39	131	90.4(2.7)	3.0	4.2(1.7)	40.1	3.7(2.2)	58.8	1.7(1.2)	68.7	0.0(0.0)	.
40-49	186	97.6(1.5)	1.5	1.4(1.0)	72.0	0.6(0.6)	100.4	0.5(0.5)	100.4	0.0(0.0)	.
50-59	192	99.5(0.5)	0.5	0.5(0.5)	99.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
60-69	119	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
70 이상	79	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
19-64	703	95.9(0.9)	0.9	1.5(0.5)	31.5	1.4(0.5)	37.3	0.8(0.4)	44.8	0.3(0.2)	72.0
65 이상	118	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾											
무학	24	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
초등학교	71	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
중학교	95	98.6(1.4)	1.4	0.0(0.0)	.	1.4(1.4)	97.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
고등학교	352	97.9(0.9)	0.9	1.0(0.6)	58.3	0.6(0.6)	100.2	0.2(0.2)	99.1	0.3(0.3)	100.0
대학교 이상	277	93.0(1.9)	2.0	2.5(1.0)	37.7	2.2(1.0)	46.1	1.8(0.9)	51.0	0.5(0.5)	101.2
직업											
전문행정관리	74	94.3(3.4)	3.6	1.6(1.7)	101.4	4.0(3.0)	73.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
사무직	94	96.7(1.8)	1.8	1.1(1.1)	99.8	1.1(1.1)	99.1	1.1(1.1)	99.3	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	101	93.4(3.1)	3.4	3.1(1.8)	58.2	2.4(2.4)	99.4	0.0(0.0)	.	1.1(1.1)	99.5
농림어업	51	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	212	98.1(0.9)	1.0	0.8(0.6)	72.7	0.5(0.5)	99.5	0.6(0.6)	98.9	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	289	95.9(1.6)	1.7	1.4(0.8)	58.2	0.9(0.6)	69.8	1.3(0.8)	58.9	0.5(0.5)	100.3
월 가구소득											
50만원 미만	20	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
50-100만원 미만	57	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	108	94.3(3.3)	3.4	1.5(1.5)	101.0	2.7(2.6)	97.1	0.0(0.0)	.	1.5(1.5)	97.6
200-300만원 미만	156	98.0(1.1)	1.1	0.6(0.6)	98.6	1.4(1.0)	70.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	234	95.9(1.4)	1.5	2.1(0.9)	45.2	0.4(0.5)	100.1	1.6(0.9)	57.5	0.0(0.0)	.
400-500만원 미만	140	97.0(1.5)	1.6	0.6(0.6)	100.8	1.7(1.2)	70.8	0.0(0.0)	.	0.7(0.7)	99.7
500-600만원 미만	40	87.8(5.7)	6.4	6.0(4.0)	66.2	4.0(3.9)	98.2	2.2(2.2)	100.2	0.0(0.0)	.
600만원 이상	64	98.2(1.7)	1.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.8(1.7)	93.7	0.0(0.0)	.

주 : 1) 인터넷, 게임(오락), 스마트폰 일상생활 지장 경험 빈도 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 44〉 도박으로 인한 일상생활 지장 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	0.3(0.2)	73.7	440	0.2(0.2)	100.3	469	0.4(0.3)	70.6
연령									
19-29	114	0.0(0.0)	.	61	0.0(0.0)	.	53	0.0(0.0)	.
30-39	131	0.0(0.0)	.	59	0.0(0.0)	.	72	0.0(0.0)	.
40-49	187	0.5(0.5)	100.4	91	0.0(0.0)	.	96	0.9(0.9)	99.8
50-59	196	0.0(0.0)	.	92	0.0(0.0)	.	104	0.0(0.0)	.
60-69	138	1.7(1.7)	99.5	66	1.7(1.7)	100.9	72	1.7(1.7)	98.9
70 이상	143	0.0(0.0)	.	71	0.0(0.0)	.	72	0.0(0.0)	.
19-64	715	0.2(0.2)	70.7	342	0.0(0.0)	.	373	0.5(0.4)	70.5
65 이상	194	0.6(0.6)	99.0	98	1.2(1.2)	98.1	96	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	53	0.0(0.0)	.	12	-(-)	-	41	0.0(0.0)	.
초등학교	115	0.0(0.0)	.	42	0.0(0.0)	.	73	0.0(0.0)	.
중학교	100	1.1(1.1)	100.5	46	0.0(0.0)	.	54	2.1(2.1)	99.4
고등학교	361	0.2(0.2)	99.1	201	0.0(0.0)	.	160	0.6(0.6)	99.2
대학교 이상	278	0.3(0.3)	100.6	137	0.5(0.5)	100.3	141	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	74	0.0(0.0)	.	40	0.0(0.0)	.	34	0.0(0.0)	.
사무직	94	0.7(0.7)	99.3	52	1.2(1.2)	99.5	42	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	106	0.0(0.0)	.	27	0.0(0.0)	.	79	0.0(0.0)	.
농림어업	64	0.0(0.0)	.	39	0.0(0.0)	.	25	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	216	0.0(0.0)	.	175	0.0(0.0)	.	41	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	355	0.6(0.4)	70.3	107	0.0(0.0)	.	248	0.8(0.6)	70.9
월 가구소득									
50만원 미만	42	0.0(0.0)	.	11	-(-)	-	31	0.0(0.0)	.
50-100만원 미만	91	0.0(0.0)	.	42	0.0(0.0)	.	49	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	122	1.7(1.7)	100.4	62	1.5(1.5)	101.3	60	1.9(1.9)	99.9
200-300만원 미만	165	0.0(0.0)	.	82	0.0(0.0)	.	83	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	241	0.4(0.4)	100.1	119	0.0(0.0)	.	122	0.7(0.7)	100.5
400-500만원 미만	141	0.0(0.0)	.	71	0.0(0.0)	.	70	0.0(0.0)	.
500-600만원 미만	41	0.0(0.0)	.	21	0.0(0.0)	.	20	0.0(0.0)	.
600만원 이상	64	0.0(0.0)	.	31	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.

주 : 1) 도박으로 인한 일상생활 지장 경험률 : (최근 1년 동안 도박으로 인하여 한 달에 1번 이상 일상생활에 지장을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 45〉 연간 인플루엔자 예방접종률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	38.4(1.6)	4.2	440	33.4(2.0)	5.9	469	43.7(2.1)	4.9
연령									
19-29	114	19.8(3.5)	17.5	61	16.4(3.9)	23.8	53	24.0(5.4)	22.6
30-39	131	40.2(4.7)	11.6	59	30.9(6.2)	20.1	72	50.4(6.6)	13.1
40-49	187	24.0(3.2)	13.4	91	18.5(4.1)	22.0	96	29.8(4.1)	13.9
50-59	196	31.3(3.8)	12.2	92	32.5(5.1)	15.7	104	30.0(4.8)	15.8
60-69	138	58.5(4.4)	7.5	66	49.8(5.8)	11.6	72	65.6(6.0)	9.2
70 이상	143	84.6(2.8)	3.3	71	86.8(3.6)	4.2	72	82.8(4.1)	4.9
19-64	715	30.3(1.8)	6.0	342	25.3(2.3)	9.1	373	35.8(2.2)	6.2
65 이상	194	82.4(3.1)	3.8	98	82.7(4.5)	5.5	96	82.2(4.1)	5.0
교육수준 ²⁾									
무학	53	80.6(4.6)	5.8	12	—(—)	—	41	80.3(6.1)	7.5
초등학교	115	72.6(4.4)	6.0	42	80.5(6.7)	8.3	73	68.9(5.2)	7.6
중학교	100	45.7(4.5)	9.8	46	33.9(7.2)	21.2	54	55.8(6.2)	11.1
고등학교	361	29.9(2.7)	9.1	201	29.4(3.1)	10.4	160	30.7(3.4)	11.2
대학교 이상	278	32.2(2.8)	8.7	137	28.5(4.0)	13.9	141	36.3(3.7)	10.2
직업									
전문행정관리	74	33.6(5.7)	16.9	40	26.2(6.2)	23.8	34	44.1(9.3)	21.2
사무직	94	23.6(4.6)	19.5	52	20.5(5.9)	28.6	42	28.0(7.6)	27.0
판매·서비스직	106	26.9(4.2)	15.8	27	19.4(7.0)	36.2	79	30.4(4.8)	15.8
농림어업	64	59.7(7.4)	12.4	39	60.3(8.8)	14.6	25	58.8(11.3)	19.2
기능단순노무직	216	33.5(2.9)	8.7	175	33.0(3.2)	9.8	41	36.2(6.7)	18.5
기타 ³⁾	355	48.4(2.6)	5.4	107	42.9(4.7)	11.0	248	50.8(3.4)	6.6
월 가구소득									
50만원 미만	42	86.4(4.8)	5.5	11	—(—)	—	31	93.6(1.5)	1.6
50-100만원 미만	91	63.7(5.8)	9.1	42	67.8(10.3)	15.2	49	60.4(6.2)	10.3
100-200만원 미만	122	48.0(5.2)	10.8	62	50.9(7.6)	15.0	60	45.2(6.5)	14.3
200-300만원 미만	165	39.3(3.9)	9.9	82	34.0(4.4)	12.9	83	45.8(5.5)	12.0
300-400만원 미만	241	35.4(3.4)	9.7	119	29.1(3.7)	12.7	122	42.1(4.7)	11.1
400-500만원 미만	141	24.0(3.3)	13.7	71	20.9(4.6)	22.0	70	28.0(5.2)	18.5
500-600만원 미만	41	26.0(8.1)	31.2	21	20.2(8.8)	43.8	20	33.7(10.4)	30.8
600만원 이상	64	25.1(6.9)	27.6	31	23.9(7.6)	31.8	33	26.3(8.1)	30.8

주 : 1) 연간 인플루엔자 예방접종률 : (최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 46〉 건강검진 수진율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	72.2(1.8)	2.5	440	75.7(2.3)	3.0	469	68.5(2.6)	3.8
연령									
19-29	114	35.6(4.6)	13.0	61	41.1(6.3)	15.2	53	28.6(6.6)	23.0
30-39	131	66.7(4.4)	6.5	59	76.1(5.7)	7.5	72	56.6(6.4)	11.3
40-49	187	82.0(2.6)	3.2	91	86.0(3.7)	4.3	96	77.7(4.1)	5.3
50-59	196	86.2(2.4)	2.8	92	88.3(3.0)	3.3	104	83.7(4.1)	4.9
60-69	138	82.8(3.4)	4.1	66	84.4(4.1)	4.8	72	81.5(4.2)	5.2
70 이상	143	76.2(3.8)	5.0	71	76.6(5.5)	7.2	72	75.8(5.3)	6.9
19-64	715	71.4(2.0)	2.8	342	75.5(2.5)	3.3	373	66.9(3.0)	4.5
65 이상	194	76.3(3.3)	4.3	98	76.3(4.4)	5.8	96	76.3(4.8)	6.2
교육수준 ²⁾									
무학	53	62.7(7.7)	12.3	12	—(—)	—	41	63.5(8.2)	12.8
초등학교	115	83.7(3.6)	4.3	42	84.3(6.1)	7.2	73	83.5(4.3)	5.1
중학교	100	77.0(4.4)	5.7	46	71.4(6.7)	9.4	54	81.7(5.2)	6.4
고등학교	361	71.0(2.5)	3.5	201	74.1(3.2)	4.3	160	66.5(4.5)	6.8
대학교 이상	278	70.5(3.3)	4.7	137	78.6(3.9)	5.0	141	61.8(4.9)	8.0
직업									
전문행정관리	74	79.1(5.5)	7.0	40	80.2(7.1)	8.8	34	77.5(8.3)	10.7
사무직	94	83.2(4.2)	5.1	52	88.0(4.8)	5.4	42	76.2(7.4)	9.8
판매·서비스직	106	69.4(4.0)	5.8	27	64.8(9.5)	14.6	79	71.5(4.5)	6.3
농림어업	64	79.7(6.8)	8.6	39	77.5(7.3)	9.5	25	82.9(7.7)	9.3
기능단순노무직	216	83.6(2.3)	2.8	175	83.8(2.8)	3.3	41	82.2(5.8)	7.1
기타 ³⁾	355	59.2(2.8)	4.7	107	53.9(5.1)	9.4	248	61.5(3.4)	5.6
월 가구소득									
50만원 미만	42	66.5(7.7)	11.6	11	—(—)	—	31	66.0(9.2)	14.0
50-100만원 미만	91	74.3(5.1)	6.8	42	69.1(8.5)	12.3	49	78.5(6.4)	8.1
100-200만원 미만	122	70.4(5.2)	7.5	62	69.0(7.3)	10.5	60	71.9(6.5)	9.0
200-300만원 미만	165	73.3(4.7)	6.4	82	80.2(4.8)	6.0	83	64.9(5.6)	8.7
300-400만원 미만	241	72.8(3.4)	4.7	119	76.5(4.1)	5.4	122	68.8(4.3)	6.2
400-500만원 미만	141	69.2(4.4)	6.3	71	73.4(5.6)	7.6	70	64.0(5.8)	9.1
500-600만원 미만	41	73.1(8.7)	11.9	21	70.7(12.8)	18.1	20	76.2(13.3)	17.5
600만원 이상	64	75.3(4.4)	5.9	31	86.8(6.7)	7.8	33	63.5(8.7)	13.7

주 : 1) 건강검진 수진율 : (최근 2년 동안 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 47〉 암 검진율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	63.2(1.9)	2.9	440	58.1(2.5)	4.3	469	68.5(2.4)	3.5
연령									
19-29	114	12.4(3.5)	28.1	61	8.2(4.1)	49.8	53	17.8(6.2)	34.7
30-39	131	48.9(4.9)	9.9	59	33.4(5.7)	16.9	72	65.7(4.9)	7.4
40-49	187	73.2(2.8)	3.9	91	70.6(4.5)	6.4	96	76.0(5.3)	7.0
50-59	196	84.1(2.9)	3.5	92	83.4(3.9)	4.6	104	84.8(4.1)	4.9
60-69	138	83.5(3.2)	3.8	66	84.4(4.2)	5.0	72	82.7(4.1)	5.0
70 이상	143	77.3(4.1)	5.2	71	77.3(5.8)	7.5	72	77.3(5.4)	7.0
19-64	715	60.5(2.1)	3.5	342	55.3(2.8)	5.1	373	66.3(2.7)	4.1
65 이상	194	77.7(3.2)	4.1	98	75.6(4.7)	6.2	96	79.5(4.3)	5.4
교육수준 ²⁾									
무학	53	65.8(6.3)	9.6	12	—(—)	—	41	65.9(7.6)	11.5
초등학교	115	84.0(3.5)	4.2	42	84.3(6.1)	7.2	73	83.9(4.1)	4.9
중학교	100	71.7(5.5)	7.7	46	60.8(8.4)	13.7	54	80.9(5.6)	6.9
고등학교	361	58.6(2.7)	4.6	201	52.1(3.8)	7.2	160	68.2(4.2)	6.2
대학교 이상	278	60.6(3.6)	5.9	137	61.5(4.5)	7.4	141	59.6(4.6)	7.7
직업									
전문행정관리	74	62.5(7.4)	11.9	40	57.1(8.6)	15.1	34	70.1(9.2)	13.1
사무직	94	76.9(4.9)	6.3	52	82.8(5.8)	7.1	42	68.4(7.4)	10.8
판매·서비스직	106	59.6(4.7)	7.8	27	34.3(8.8)	25.6	79	71.1(4.6)	6.5
농림어업	64	79.9(6.5)	8.1	39	75.4(7.7)	10.2	25	86.8(6.7)	7.8
기능단순노무직	216	63.9(2.8)	4.3	175	61.7(3.3)	5.3	41	75.1(6.8)	9.1
기타 ³⁾	355	57.3(2.7)	4.8	107	39.8(4.5)	11.3	248	65.0(3.1)	4.8
월 가구소득									
50만원 미만	42	73.4(7.7)	10.5	11	—(—)	—	31	72.6(9.3)	12.8
50-100만원 미만	91	75.8(4.7)	6.2	42	74.1(8.2)	11.1	49	77.2(5.9)	7.7
100-200만원 미만	122	62.7(5.4)	8.6	62	56.1(7.5)	13.4	60	69.4(6.4)	9.2
200-300만원 미만	165	56.0(3.7)	6.6	82	48.9(4.3)	8.9	83	64.5(5.4)	8.4
300-400만원 미만	241	67.2(3.6)	5.3	119	63.4(4.8)	7.6	122	71.1(4.4)	6.2
400-500만원 미만	141	64.4(5.2)	8.1	71	60.2(6.8)	11.3	70	69.6(5.4)	7.8
500-600만원 미만	41	45.0(8.1)	18.0	21	37.4(8.2)	22.0	20	55.1(13.0)	23.6
600만원 이상	64	57.9(5.8)	10.0	31	56.8(9.1)	16.0	33	59.1(8.6)	14.5

주 : 1) 암 검진율 : (최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 48〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	5.0(0.7)	14.9	440	3.8(0.9)	25.0	469	6.3(1.1)	18.0
연령									
19-29	114	2.4(1.6)	65.4	61	3.0(1.8)	60.8	53	1.7(1.7)	101.0
30-39	131	5.4(2.0)	36.9	59	3.3(2.3)	69.4	72	7.7(3.5)	45.9
40-49	187	2.8(1.0)	36.3	91	1.0(1.0)	98.2	96	4.7(2.0)	41.7
50-59	196	4.1(1.2)	30.2	92	2.7(1.9)	71.4	104	5.8(1.8)	30.5
60-69	138	6.7(2.2)	32.6	66	7.2(3.5)	47.7	72	6.2(3.1)	49.4
70 이상	143	12.6(2.8)	22.2	71	11.4(4.5)	39.5	72	13.6(3.8)	28.1
19-64	715	3.9(0.8)	19.5	342	2.7(0.9)	32.9	373	5.2(1.1)	21.0
65 이상	194	11.0(2.1)	18.8	98	10.6(3.6)	34.4	96	11.4(3.1)	26.8
교육수준 ²⁾									
무학	53	14.5(4.3)	30.0	12	—(—)	—	41	16.0(5.5)	34.4
초등학교	115	11.6(3.2)	27.8	42	10.0(3.4)	34.4	73	12.4(4.3)	34.8
중학교	100	7.2(2.9)	40.2	46	10.4(5.7)	54.2	54	4.4(2.0)	45.2
고등학교	361	2.7(0.7)	25.8	201	2.2(1.2)	53.7	160	3.4(1.2)	34.8
대학교 이상	278	4.3(1.3)	30.9	137	3.2(1.5)	47.5	141	5.5(2.0)	35.2
직업									
전문행정관리	74	3.6(3.5)	97.2	40	4.0(3.9)	99.5	34	3.1(3.0)	95.5
사무직	94	2.6(1.4)	54.9	52	1.6(1.6)	99.7	42	4.1(2.9)	71.0
판매·서비스직	106	2.7(1.3)	49.6	27	3.1(3.0)	95.5	79	2.5(1.5)	58.0
농림어업	64	4.3(2.4)	56.3	39	4.6(3.1)	67.9	25	3.9(4.0)	102.6
기능단순노무직	216	2.6(1.0)	40.5	175	1.7(1.0)	59.3	41	7.1(3.8)	53.8
기타 ³⁾	355	8.5(1.4)	16.2	107	9.0(2.6)	29.4	248	8.4(1.7)	19.8
월 가구소득									
50만원 미만	42	13.9(5.8)	41.9	11	—(—)	—	31	18.7(7.4)	39.7
50-100만원 미만	91	13.8(4.2)	30.4	42	16.7(7.5)	44.9	49	11.4(4.4)	38.9
100-200만원 미만	122	7.7(3.1)	40.5	62	10.3(4.8)	46.5	60	5.0(2.7)	53.3
200-300만원 미만	165	3.9(1.7)	42.8	82	1.8(1.5)	79.3	83	6.3(2.5)	39.2
300-400만원 미만	241	2.5(1.2)	47.0	119	0.9(0.9)	100.0	122	4.2(1.9)	46.1
400-500만원 미만	141	2.0(1.4)	71.5	71	1.5(1.4)	96.7	70	2.7(2.7)	100.1
500-600만원 미만	41	8.7(4.4)	51.1	21	6.3(6.4)	101.4	20	11.8(7.0)	59.2
600만원 이상	64	4.1(2.8)	68.7	31	2.9(2.9)	99.2	33	5.5(5.0)	91.1

주 : 1) 만성·급성질환 및 사고중독 경험률 : (최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있는 사람의 수 / 조사 대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직일 수의 총 합 / 만성·급성질환 및 사고중독 경험자 수

〈표 49〉 고혈압 진단 경험률

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
고혈압 진단 경험률									
전체 ¹⁾	909	17.6(1.6)	8.8	440	19.0(2.0)	10.6	469	16.2(1.9)	11.9
30세 이상 ²⁾	795	21.1(1.8)	8.5	379	23.2(2.4)	10.4	416	19.1(2.2)	11.4
연령									
19-29	114	0.0(0.0)	.	61	0.0(0.0)	.	53	0.0(0.0)	.
30-39	131	5.9(2.2)	36.9	59	10.2(4.1)	39.9	72	1.3(1.3)	98.4
40-49	187	9.2(2.6)	28.3	91	10.5(3.4)	32.5	96	7.8(3.1)	39.1
50-59	196	20.0(3.1)	15.5	92	23.6(4.4)	18.4	104	15.9(4.1)	25.8
60-69	138	32.9(4.2)	12.9	66	39.6(6.8)	17.2	72	27.4(4.7)	17.3
70 이상	143	57.1(4.7)	8.3	71	55.5(5.9)	10.6	72	58.4(6.0)	10.3

주 : 1) 고혈압 진단 경험률 : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 고혈압 진단 경험률(≥30) : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 50〉 고혈압 진단 경험자의 치료율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체 ¹⁾	183	88.8(2.3)	2.6	98	88.6(3.4)	3.9	85	89.1(4.2)	4.7
30세 이상 ²⁾	183	88.8(2.3)	2.6	98	88.6(3.4)	3.9	85	89.1(4.2)	4.7
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	7	-(-)	-	6	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	15	-(-)	-	9	-(-)	-	6	-(-)	-
50-59	37	93.2(3.4)	3.6	21	95.8(3.9)	4.1	16	-(-)	-
60-69	46	97.8(2.1)	2.2	26	96.0(3.8)	3.9	20	100.0(0.0)	0.0
70 이상	78	94.2(2.5)	2.7	36	94.1(3.9)	4.2	42	94.2(3.2)	3.4

주 : 1) 고혈압 진단 경험자의 치료율 : (현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30) : (현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 51〉 고혈압 관리교육 장소 및 고혈압 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	N ⁵⁾	고혈압 관리교육 장소 ¹⁾						고혈압 관리교육 이수율 ²⁾	
		병의원		한방병원		보건소(보건의료원), 보건지소, 보건지료소			
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	183	7. 7(2. 2)	28. 2	0. 0(0. 0)	.	0. 4(0. 4)	99. 5	8. 2(2. 4)	28. 8
성									
남자	98	12. 2(3. 3)	27. 5	0. 0(0. 0)	.	0. 0(0. 0)	.	12. 2(3. 3)	27. 5
여자	85	2. 2(1. 5)	69. 9	0. 0(0. 0)	.	1. 0(1. 0)	99. 6	3. 2(2. 3)	71. 7
30세 이상 ^{3), 4)}	183	7. 7(2. 2)	28. 2	0. 0(0. 0)	.	0. 4(0. 4)	99. 5	8. 2(2. 4)	28. 8
연령									
19-29	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	37	12. 9(6. 4)	49. 8	0. 0(0. 0)	.	0. 0(0. 0)	.	12. 9(6. 4)	49. 8
60-69	46	1. 4(1. 3)	97. 4	0. 0(0. 0)	.	0. 0(0. 0)	.	1. 4(1. 3)	97. 4
70 이상	78	4. 8(2. 9)	59. 7	0. 0(0. 0)	.	1. 2(1. 2)	98. 5	6. 0(3. 8)	63. 6

주 : 1) 고혈압 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 관리교육 이수율 : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 고혈압 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 고혈압 관리교육 이수율(≥30) : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

5) 고혈압 평생 의사진단을 받은 사람의 수

〈표 52〉 혈압수치 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	혈압수치 인지율		
	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	28.3(1.6)	5.6
성			
남자	440	31.6(2.1)	6.5
여자	469	24.9(1.9)	7.4
연령			
19-29	114	11.4(3.3)	29.0
30-39	131	23.0(4.5)	19.5
40-49	187	24.1(3.1)	12.9
50-59	196	38.3(4.3)	11.2
60-69	138	50.2(4.5)	8.9
70 이상	143	28.4(4.1)	14.6
19-64	715	27.3(1.7)	6.4
65 이상	194	34.1(3.6)	10.5
교육수준 ²⁾			
무학	53	12.3(4.2)	33.9
초등학교	115	44.8(4.6)	10.2
중학교	100	32.9(5.1)	15.4
고등학교	361	30.3(2.8)	9.4
대학교 이상	278	21.8(2.6)	11.9
직업			
전문행정관리	74	33.5(5.5)	16.3
사무직	94	29.6(4.4)	14.8
판매·서비스직	106	25.1(4.8)	19.1
농림어업	64	34.2(6.0)	17.5
기능단순노무직	216	32.1(3.2)	9.8
기타 ³⁾	355	24.5(2.3)	9.3
월 가구소득			
50만원 미만	42	19.5(7.8)	40.1
50-100만원 미만	91	34.2(5.9)	17.2
100-200만원 미만	122	39.0(6.0)	15.3
200-300만원 미만	165	33.9(4.6)	13.7
300-400만원 미만	241	19.9(3.1)	15.3
400-500만원 미만	141	19.8(5.0)	25.5
500-600만원 미만	41	34.9(9.5)	27.1
600만원 이상	64	41.1(6.5)	15.9

주 : 1) 혈압수치 인지율 : (본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 53〉 당뇨병 진단 경험률

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
당뇨병 진단 경험률									
전체 ¹⁾	909	9.7(0.9)	9.1	440	10.1(1.1)	11.0	469	9.3(1.3)	13.8
30세 이상 ²⁾	795	11.5(1.0)	9.0	379	12.0(1.4)	11.5	416	10.9(1.5)	13.7
연령									
19-29	114	0.9(0.9)	96.4	61	1.6(1.5)	96.2	53	0.0(0.0)	.
30-39	131	0.7(0.1)	10.9	59	0.0(0.0)	.	72	1.5(0.2)	13.1
40-49	187	5.2(1.7)	33.5	91	4.3(2.1)	48.2	96	6.2(2.5)	40.9
50-59	196	12.9(2.6)	20.1	92	15.4(3.7)	23.8	104	10.1(3.4)	33.1
60-69	138	17.4(3.4)	19.8	66	21.4(5.0)	23.5	72	14.2(4.7)	32.9
70 이상	143	30.9(3.7)	12.0	71	32.4(4.7)	14.6	72	29.5(4.6)	15.5

주 : 1) 당뇨병 진단 경험률 : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 당뇨병 진단 경험률(≥30) : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 54〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체 ¹⁾	106	89.4(3.3)	3.7	56	92.7(4.3)	4.7	50	85.6(5.1)	5.9
30세 이상 ²⁾	105	89.3(3.3)	3.7	55	92.5(4.4)	4.7	50	85.6(5.1)	5.9
연령									
19-29	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	0	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	10	-(-)	-	4	-(-)	-	6	-(-)	-
50-59	23	84.9(7.0)	8.2	14	-(-)	-	9	-(-)	-
60-69	26	95.0(4.9)	5.2	15	-(-)	-	11	-(-)	-
70 이상	45	85.5(4.8)	5.6	22	91.5(5.7)	6.2	23	79.9(7.3)	9.1

주 : 1) 당뇨병 진단 경험자의 치료율 : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30) : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 55〉 당뇨병 관리교육 장소 및 당뇨병 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	N ⁵⁾	당뇨병 관리교육 장소 ¹⁾						당뇨병 관리교육 이수율 ²⁾	
		병의원		한방병의원		보건소(보건의료원), 보건지소, 보건지료소			
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	106	7.5(2.1)	28.8	0.0(0.0)	.	1.8(1.0)	55.2	8.3(2.1)	26.0
성									
남자	56	6.6(2.7)	41.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	6.6(2.7)	41.2
여자	50	8.4(4.0)	47.3	0.0(0.0)	.	3.9(2.1)	52.7	10.1(4.0)	39.2
30세 이상 ^{3), 4)}	105	7.6(2.2)	28.7	0.0(0.0)	.	1.9(1.0)	55.1	8.4(2.2)	26.0
연령									
19-29	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	23	6.7(4.5)	67.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	6.7(4.5)	67.6
60-69	26	3.7(3.7)	99.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.7(3.7)	99.5
70 이상	45	7.3(3.8)	51.3	0.0(0.0)	.	5.1(2.8)	55.1	9.5(3.8)	39.7

주 : 1) 당뇨병 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 관리교육 이수율 : (당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 당뇨병 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 당뇨병 관리교육 이수율(≥30) : (당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

5) 당뇨병 평생 의사진단을 받은 사람의 수

〈표 56〉 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사 수진율 및 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사 수진율

(단위 : %)

구분	연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율 ¹⁾			연간 당뇨병 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	106	27.8(4.9)	17.8	106	48.2(5.7)	11.9
성						
남자	56	27.2(6.1)	22.5	56	43.0(7.1)	16.6
여자	50	28.5(6.1)	21.4	50	54.1(8.2)	15.1
30세 이상 ^{3), 4)}	105	28.2(5.0)	17.6	105	47.4(5.6)	11.9
연령						
19-29	1	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	10	-(-)	-	10	-(-)	-
50-59	23	22.6(9.5)	42.1	23	45.6(11.4)	24.9
60-69	26	26.2(10.5)	40.0	26	61.0(8.3)	13.6
70 이상	45	38.4(7.6)	19.7	45	46.5(7.7)	16.6

- 주 : 1) 연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율 : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
- 2) 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율 : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
- 3) 연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율(≥30) : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
- 4) 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥30) : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 57〉 혈당수치 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	혈당수치 인지율		
	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	9.8(0.9)	9.6
성			
남자	440	11.0(1.2)	11.3
여자	469	8.5(1.3)	14.8
연령			
19-29	114	0.9(0.9)	96.4
30-39	131	4.2(2.1)	49.1
40-49	187	7.7(1.9)	24.2
50-59	196	14.1(2.9)	20.3
60-69	138	21.2(3.7)	17.2
70 이상	143	15.3(3.4)	22.4
19-64	715	8.6(1.0)	11.9
65 이상	194	16.6(2.8)	16.9
교육수준 ²⁾			
무학	53	6.5(3.3)	50.9
초등학교	115	18.0(4.1)	22.9
중학교	100	14.3(4.7)	32.8
고등학교	361	11.1(1.6)	14.7
대학교 이상	278	4.9(1.3)	27.4
직업			
전문행정관리	74	9.9(2.9)	29.0
사무직	94	7.7(2.6)	33.6
판매·서비스직	106	9.6(3.0)	31.3
농림어업	64	5.9(3.5)	58.9
기능단순노무직	216	13.0(2.1)	16.2
기타 ³⁾	355	8.8(1.7)	19.2
월 가구소득			
50만원 미만	42	6.2(4.5)	71.4
50-100만원 미만	91	16.6(4.7)	28.5
100-200만원 미만	122	15.5(3.4)	22.0
200-300만원 미만	165	12.2(3.1)	25.3
300-400만원 미만	241	6.3(1.7)	27.6
400-500만원 미만	141	6.2(2.0)	31.7
500-600만원 미만	41	11.2(5.0)	44.1
600만원 이상	64	9.2(3.5)	38.4

주 : 1) 혈당수치 인지율 : (본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 58〉관절염 진단 경험률

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
관절염 진단 경험률									
전체 ¹⁾	909	6.0(0.7)	12.1	440	2.6(0.9)	33.6	469	9.6(1.1)	11.8
50세 이상 ²⁾	477	12.1(1.3)	10.8	229	4.8(1.5)	30.7	248	19.3(2.1)	10.8
연령									
19-29	114	0.0(0.0)	.	61	0.0(0.0)	.	53	0.0(0.0)	.
30-39	131	1.3(0.9)	69.8	59	0.0(0.0)	.	72	2.8(1.9)	68.4
40-49	187	1.7(1.3)	74.8	91	2.4(2.3)	97.8	96	1.0(1.0)	100.6
50-59	196	5.2(1.6)	31.0	92	2.6(1.9)	72.2	104	8.1(2.6)	32.6
60-69	138	17.2(2.5)	14.7	66	5.4(2.9)	54.6	72	27.0(4.5)	16.5
70 이상	143	20.1(3.4)	16.8	71	9.0(3.2)	36.2	72	29.6(5.1)	17.3

주 : 1) 관절염 진단 경험률 : (의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 관절염 진단 경험률(≥50) : (의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 59〉관절염 관리교육 장소 및 관절염 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	N ⁵⁾	관절염 관리교육 장소 ¹⁾						관절염 관리교육 이수율 ²⁾	
		병의원		한방병원		보건소(보건의료원), 보건지소, 보건지료소			
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	69	13.6(4.8)	35.2	1.3(1.3)	99.0	0.0(0.0)	.	14.9(5.2)	35.1
성									
남자	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
여자	55	11.5(4.1)	35.8	1.7(1.6)	98.6	0.0(0.0)	.	13.1(4.9)	37.4
50세 이상 ^{3), 4)}	64	9.9(3.3)	33.0	1.4(1.4)	98.8	0.0(0.0)	.	11.4(4.1)	35.7
연령									
19-29	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
60-69	22	3.7(3.6)	97.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.7(3.6)	97.3
70 이상	31	12.0(6.4)	53.2	3.4(3.3)	98.0	0.0(0.0)	.	15.4(8.4)	54.6

주 : 1) 관절염 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 관절염 관리교육 이수율 : (관절염 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 관절염 관리교육 장소(≥50) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

4) 관절염 관리교육 이수율(≥50) : (관절염 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

5) 관절염 평생 의사진단을 받은 사람의 수

〈표 60〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	갑자기 한쪽 얼굴, 팔, 다리에 힘이 빠진다			갑자기 말이 어눌해지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못한다		갑자기 한쪽 눈이나 시아의 반이 보이지 않거나, 물체가 두 개로 보인다		갑자기 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘들다		갑자기 이제까지 경험하지 못한 심한 두통이 생긴다		뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	
	N	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
전체	846	86.9(1.3)	1.5	88.9(1.2)	1.3	80.7(1.5)	1.9	85.4(1.6)	1.8	79.4(1.7)	2.1	66.4(2.1)	3.2
성													
남자	411	85.2(1.5)	1.8	86.8(1.6)	1.8	80.3(2.0)	2.5	83.2(2.1)	2.5	76.4(2.2)	2.8	64.3(2.4)	3.8
여자	435	88.7(1.8)	2.1	91.1(1.6)	1.8	81.1(2.3)	2.8	87.7(1.8)	2.1	82.6(2.0)	2.5	68.6(3.0)	4.4
연령													
19-29	109	81.5(4.6)	5.7	80.8(3.9)	4.8	71.8(5.2)	7.2	80.8(4.1)	5.1	76.6(4.6)	6.0	57.5(6.1)	10.6
30-39	125	80.3(3.4)	4.2	84.6(3.2)	3.8	78.9(3.2)	4.0	81.3(3.7)	4.6	78.9(3.8)	4.9	64.8(4.0)	6.2
40-49	178	83.8(3.1)	3.7	91.2(2.4)	2.6	77.4(3.7)	4.8	82.0(3.3)	4.1	74.1(4.0)	5.5	61.4(5.0)	8.1
50-59	186	93.1(1.7)	1.8	93.7(1.7)	1.9	88.4(2.8)	3.2	92.9(1.9)	2.1	84.5(2.8)	3.4	73.3(3.5)	4.8
60-69	126	94.4(1.8)	2.0	92.9(2.7)	2.9	88.2(3.3)	3.8	90.0(2.3)	2.5	86.0(3.2)	3.7	78.2(3.9)	5.0
70 이상	122	91.5(2.2)	2.4	88.9(3.0)	3.4	80.5(3.5)	4.4	85.6(2.7)	3.2	79.0(3.4)	4.3	67.2(4.7)	7.0
19-64	681	86.2(1.5)	1.7	88.8(1.3)	1.5	80.3(1.7)	2.1	85.6(1.8)	2.1	79.4(1.9)	2.3	66.0(2.4)	3.7
65 이상	165	91.1(2.1)	2.3	89.1(2.8)	3.1	82.8(2.9)	3.5	84.4(2.3)	2.7	79.8(2.7)	3.4	68.3(3.7)	5.4
교육수준 ²⁾													
무학	40	88.0(5.1)	5.8	86.7(4.9)	5.6	75.0(5.7)	7.6	79.1(5.8)	7.3	71.0(6.8)	9.5	59.2(7.4)	12.5
초등학교	104	95.3(2.0)	2.1	94.0(2.9)	3.1	86.8(4.0)	4.6	89.6(2.9)	3.2	85.6(3.2)	3.7	77.2(4.1)	5.3
중학교	91	89.9(3.4)	3.8	88.8(3.6)	4.1	84.6(3.5)	4.1	91.0(3.3)	3.6	78.6(4.5)	5.7	66.9(5.0)	7.5
고등학교	337	86.1(1.9)	2.2	87.2(1.6)	1.9	79.4(2.2)	2.8	82.5(2.5)	3.1	77.1(2.5)	3.2	62.9(3.2)	5.1
대학교 이상	272	84.7(2.4)	2.9	89.8(1.9)	2.2	80.1(2.5)	3.2	86.9(2.2)	2.6	81.6(2.4)	2.9	68.1(3.4)	5.0
직업													
전문행정관리	72	82.8(5.1)	6.1	91.4(3.9)	4.3	84.7(4.5)	5.3	87.7(4.4)	5.0	90.9(3.8)	4.2	74.9(5.6)	7.5
사무직	92	92.9(2.6)	2.8	95.8(2.1)	2.2	86.8(3.7)	4.2	88.2(3.6)	4.1	84.5(4.4)	5.2	72.7(5.4)	7.4
판매·서비스직	94	86.6(3.3)	3.8	88.7(3.2)	3.6	80.1(4.2)	5.3	88.5(3.0)	3.4	80.6(4.1)	5.1	74.6(4.4)	5.9
농림어업	59	92.4(3.9)	4.2	87.2(4.6)	5.3	76.0(4.8)	6.4	86.0(3.2)	3.7	69.7(7.4)	10.6	56.1(8.3)	14.8
기능단순노무직	204	85.7(2.2)	2.6	88.6(2.3)	2.6	81.2(2.4)	3.0	82.2(2.9)	3.5	72.3(3.3)	4.5	59.5(3.8)	6.4
기타 ³⁾	325	86.1(2.5)	2.9	86.5(2.2)	2.6	78.0(2.6)	3.3	85.0(2.1)	2.5	80.8(2.5)	3.1	65.7(3.5)	5.4
월 가구소득													
50만원 미만	36	88.5(5.4)	6.1	80.8(8.1)	10.0	74.0(8.8)	11.9	74.4(7.5)	10.0	79.8(6.9)	8.6	67.2(8.8)	13.0
50-100만원 미만	76	94.2(2.6)	2.8	95.3(2.8)	3.0	83.8(4.2)	5.0	91.7(3.0)	3.3	89.3(3.6)	4.1	73.0(6.0)	8.2
100-200만원 미만	106	94.1(3.1)	3.3	89.5(3.2)	3.6	90.5(3.1)	3.5	91.5(2.7)	2.9	86.9(3.4)	3.9	76.2(4.2)	5.5
200-300만원 미만	154	87.4(2.3)	2.6	89.1(2.4)	2.7	81.4(2.7)	3.3	83.8(2.6)	3.1	76.7(3.3)	4.3	66.8(3.6)	5.4
300-400만원 미만	234	81.3(3.2)	4.0	86.4(2.6)	3.0	77.4(3.4)	4.4	83.4(3.0)	3.6	75.2(3.7)	4.9	64.0(4.5)	7.0
400-500만원 미만	138	89.5(2.1)	2.4	91.8(2.2)	2.4	86.2(3.2)	3.8	86.7(3.9)	4.5	85.6(4.1)	4.8	73.2(5.6)	7.7
500-600만원 미만	39	86.9(4.5)	5.2	87.9(4.4)	5.0	70.4(7.5)	10.6	91.3(4.4)	4.8	71.9(8.2)	11.4	52.1(10.2)	19.6
600만원 이상	61	83.5(4.0)	4.8	88.0(3.4)	3.9	72.6(5.4)	7.5	79.1(4.5)	5.6	73.5(5.0)	6.8	49.1(5.0)	10.2

주 : 1) 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 : (증상을 모두 맞춘 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 61〉 심근경색증 조기증상 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	갑자기 턱, 목 또는 등쪽에 답답함이 있다			갑자기 힘이 없으며, 어지럽고, 울렁거리거나 식은땀이 난다			갑자기 가슴에 통증이나 압박감 또는 짓누르는 느낌이 있다			갑자기 팔 또는 어깨에 통증이나 불편감이 있다			갑자기 숨이 찬다			심근경색증 조기증상 인지율	
	N	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
전체	817	80.7(1.7)	2.2	85.3(1.6)	1.8	92.9(1.0)	1.1	75.7(1.6)	2.2	89.5(1.2)	1.4	67.1(2.1)	3.1				
성																	
남자	394	80.5(2.2)	2.8	85.2(2.0)	2.3	93.2(1.3)	1.4	75.8(2.0)	2.7	88.2(1.7)	1.9	65.3(2.6)	4.0				
여자	423	80.9(2.5)	3.1	85.4(2.2)	2.6	92.6(1.5)	1.6	75.5(2.7)	3.5	90.8(1.7)	1.9	69.0(3.0)	4.3				
연령																	
19-29	104	78.8(4.9)	6.2	82.6(4.5)	5.5	89.0(3.5)	4.0	73.8(4.5)	6.2	87.1(3.6)	4.2	63.4(5.3)	8.3				
30-39	124	82.7(3.6)	4.3	85.8(2.8)	3.3	92.2(2.1)	2.3	75.9(3.9)	5.1	89.4(2.7)	3.0	69.0(4.1)	5.9				
40-49	176	79.1(2.9)	3.6	85.4(2.8)	3.3	95.7(1.7)	1.7	76.7(3.6)	4.7	89.3(2.2)	2.5	65.3(4.0)	6.1				
50-59	179	87.2(2.8)	3.2	90.9(2.0)	2.2	95.9(1.7)	1.7	80.6(3.2)	3.9	94.6(1.8)	1.9	73.5(3.6)	4.9				
60-69	116	84.4(3.1)	3.7	87.9(2.6)	2.9	95.8(1.8)	1.8	77.9(4.0)	5.1	92.1(2.4)	2.6	72.6(4.1)	5.7				
70 이상	118	65.5(4.5)	6.8	72.9(3.8)	5.2	84.4(2.5)	2.9	62.8(4.3)	6.8	79.7(3.4)	4.3	55.2(4.9)	9.0				
19-64	655	82.4(1.8)	2.2	86.8(1.7)	1.9	93.9(1.1)	1.2	77.1(1.8)	2.3	90.8(1.2)	1.4	68.3(2.3)	3.3				
65 이상	162	69.4(3.8)	5.4	75.7(3.0)	4.0	86.9(2.0)	2.3	66.6(3.0)	4.5	81.4(3.0)	3.7	59.8(4.0)	6.6				
교육수준 ²⁾																	
무학	39	46.7(8.0)	17.1	60.0(8.1)	13.5	75.3(7.3)	9.7	49.4(8.8)	17.8	69.3(8.2)	11.9	39.7(8.0)	20.3				
초등학교	97	82.1(4.1)	5.0	80.3(4.2)	5.2	93.8(2.6)	2.8	74.2(5.0)	6.8	88.3(3.5)	4.0	66.0(5.0)	7.6				
중학교	86	76.5(4.2)	5.5	85.5(3.4)	4.0	93.4(2.4)	2.6	72.5(4.7)	6.5	89.1(3.1)	3.5	64.5(4.8)	7.4				
고등학교	325	80.2(2.7)	3.4	85.4(2.3)	2.7	93.1(1.5)	1.6	75.1(2.7)	3.6	89.8(1.7)	1.9	65.8(3.3)	5.0				
대학교 이상	269	84.9(2.4)	2.8	88.6(2.1)	2.4	94.0(1.4)	1.5	79.7(2.7)	3.3	91.2(1.8)	1.9	71.9(2.9)	4.1				
직업																	
전문행정관리	71	83.0(5.2)	6.3	92.7(3.6)	3.8	92.8(3.5)	3.8	84.4(4.8)	5.7	91.7(3.7)	4.0	77.0(5.8)	7.5				
사무직	90	85.3(3.7)	4.4	86.8(3.7)	4.3	96.3(1.9)	2.0	75.7(4.9)	6.5	96.7(1.9)	1.9	68.9(5.1)	7.4				
판매·서비스직	93	87.2(3.2)	3.7	87.2(4.0)	4.6	92.1(2.5)	2.8	81.3(3.8)	4.6	88.9(3.0)	3.4	74.5(5.1)	6.8				
농림어업	59	79.0(6.2)	7.9	83.7(5.5)	6.5	91.5(4.0)	4.4	64.3(7.8)	12.1	90.4(3.6)	4.0	57.2(7.4)	13.0				
가능단순노무직	194	78.5(3.3)	4.2	85.0(2.6)	3.1	95.9(1.3)	1.4	73.0(3.3)	4.5	88.0(2.3)	2.7	61.7(4.0)	6.4				
기타 ³⁾	310	78.1(3.1)	4.0	82.8(2.5)	3.0	90.2(1.9)	2.1	75.1(3.0)	3.9	87.5(2.2)	2.5	66.8(3.5)	5.2				
월 가구소득																	
50만원 미만	37	62.4(8.4)	13.5	63.8(9.1)	14.2	82.8(6.6)	8.0	63.0(9.2)	14.6	73.6(8.3)	11.3	54.0(9.4)	17.5				
50-100만원 미만	72	81.5(4.9)	6.0	84.5(3.8)	4.5	90.6(3.2)	3.5	78.1(4.9)	6.2	89.3(3.5)	4.0	70.5(5.8)	8.2				
100-200만원 미만	96	86.7(3.8)	4.3	91.4(2.8)	3.1	95.5(2.3)	2.4	80.7(5.1)	6.3	93.6(2.9)	3.1	72.7(6.0)	8.2				
200-300만원 미만	145	79.4(3.8)	4.7	84.0(3.1)	3.7	95.0(1.2)	1.3	76.0(4.0)	5.2	89.6(2.6)	2.9	69.6(4.2)	6.1				
300-400만원 미만	230	80.1(3.1)	3.9	84.8(2.7)	3.2	89.6(2.4)	2.7	77.7(3.6)	4.6	87.6(2.4)	2.7	70.0(3.8)	5.4				
400-500만원 미만	138	84.3(4.0)	4.7	87.4(4.5)	5.1	94.6(2.0)	2.2	77.7(4.3)	5.5	93.4(2.1)	2.3	69.1(7.1)	10.2				
500-600만원 미만	39	68.9(7.3)	10.6	81.4(7.2)	8.8	95.2(3.3)	3.5	59.9(8.1)	13.5	92.6(3.7)	4.0	48.5(8.9)	18.5				
600만원 이상	58	84.6(4.6)	5.5	88.5(3.1)	3.5	97.4(1.8)	1.9	69.7(5.3)	7.6	86.2(3.5)	4.1	54.3(6.0)	11.1				

주 : 1) 심근경색증 조기증상 인지율 : (증상을 모두 맞춘 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 62〉 연간 평균 혈압 및 혈당 측정횟수

(단위 : 회)

구분	연간 평균 혈압 측정횟수 ¹⁾			연간 평균 혈당 측정횟수 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	15.5(1.8)	11.9	908	5.9(1.2)	20.1
연령						
19-29	114	4.6(1.8)	38.6	114	0.6(0.1)	14.7
30-39	131	9.7(3.2)	33.0	131	1.4(0.2)	13.0
40-49	187	12.5(2.7)	21.4	187	1.9(0.4)	19.2
50-59	196	26.2(5.3)	20.4	195	10.7(3.5)	32.8
60-69	138	28.4(7.4)	26.1	138	16.8(6.8)	40.5
70 이상	143	12.2(1.5)	12.0	143	8.1(2.1)	25.2
19-64	715	15.5(2.2)	14.1	714	4.9(1.2)	23.8
65 이상	194	15.5(2.8)	18.4	194	11.7(4.8)	41.2
교육수준 ³⁾						
무학	53	13.8(3.2)	23.4	53	6.9(2.3)	34.0
초등학교	115	10.1(0.9)	9.3	115	17.8(7.6)	42.7
중학교	100	23.1(7.4)	32.0	100	12.4(4.4)	35.4
고등학교	361	18.6(3.1)	16.4	360	4.0(1.4)	34.0
대학교 이상	278	11.1(3.4)	30.6	278	3.2(1.5)	47.3
직업						
전문행정관리	74	15.7(7.1)	45.6	74	7.1(5.7)	80.2
사무직	94	25.6(8.3)	32.5	94	5.3(3.5)	64.9
판매·서비스직	106	20.5(6.6)	32.0	106	11.3(6.4)	56.8
농림어업	64	11.8(4.1)	34.8	64	1.7(0.3)	20.3
기능단순노무직	216	13.7(3.0)	21.9	216	5.5(1.4)	25.7
기타 ⁴⁾	355	12.2(1.9)	15.7	354	5.0(1.3)	26.6
월 가구소득						
50만원 미만	42	8.7(1.0)	12.0	42	3.3(0.9)	28.4
50-100만원 미만	91	22.1(10.2)	46.0	91	15.6(9.6)	61.6
100-200만원 미만	122	24.5(7.0)	28.5	122	7.5(3.1)	41.1
200-300만원 미만	165	11.2(1.4)	12.1	165	5.2(1.7)	32.2
300-400만원 미만	241	12.5(4.2)	33.2	241	4.4(1.6)	35.4
400-500만원 미만	141	17.2(5.8)	33.9	140	2.1(0.5)	26.2
500-600만원 미만	41	15.3(8.8)	57.4	41	9.2(7.2)	78.6
600만원 이상	64	15.9(2.6)	16.5	64	7.6(5.9)	77.5

주 : 1) 연간 평균 혈압 측정횟수 : ((하루 측정횟수×365일)+(일주일 측정횟수×52주)+(한 달 측정횟수×12개월)+(일 년 측정횟수)) / 조사대상 응답자 수

2) 연간 평균 혈당 측정횟수 : ((하루 측정횟수×365일)+(일주일 측정횟수×52주)+(한 달 측정횟수×12개월)+(일 년 측정횟수)) / 조사대상 응답자 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직일 수의 총 합 / 만성·급성질환 및 사고중독 경험자 수

〈표 63〉 연간 필요의료서비스 미치료율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	5.7(1.0)	18.5	440	4.7(1.3)	27.0	469	6.7(1.4)	21.1
연령									
19-29	114	4.9(1.9)	38.7	61	4.5(2.3)	50.1	53	5.4(2.7)	49.1
30-39	131	12.2(3.3)	26.8	59	13.1(5.8)	44.3	72	11.2(3.9)	35.2
40-49	187	3.6(1.6)	44.6	91	3.3(1.9)	56.3	96	3.8(2.3)	59.4
50-59	196	6.3(1.9)	29.8	92	2.9(1.7)	59.4	104	10.1(3.4)	33.6
60-69	138	4.8(2.1)	43.9	66	3.2(2.2)	67.9	72	6.1(2.9)	46.9
70 이상	143	1.5(1.1)	72.5	71	0.0(0.0)	.	72	2.8(2.0)	70.4
19-64	715	6.4(1.2)	19.4	342	5.5(1.5)	27.2	373	7.4(1.7)	23.0
65 이상	194	1.8(1.0)	59.3	98	0.0(0.0)	.	96	3.3(1.9)	58.5
교육수준 ²⁾									
무학	53	2.3(2.2)	94.4	12	-(-)	-	41	2.9(2.7)	93.0
초등학교	115	7.2(2.6)	36.1	42	5.5(3.8)	69.6	73	8.0(3.4)	41.9
중학교	100	7.7(3.2)	41.3	46	1.8(1.9)	102.6	54	12.7(5.4)	42.5
고등학교	361	6.1(1.7)	27.4	201	5.5(2.2)	39.2	160	6.9(2.4)	34.4
대학교 이상	278	4.7(1.4)	29.5	137	4.5(1.6)	36.8	141	4.9(1.9)	38.9
직업									
전문행정관리	74	7.4(2.5)	33.7	40	5.1(2.8)	56.0	34	10.7(5.8)	54.7
사무직	94	4.2(1.8)	44.3	52	1.8(1.8)	99.4	42	7.6(3.9)	50.9
판매·서비스직	106	7.8(3.2)	41.0	27	11.1(7.7)	69.4	79	6.2(2.7)	44.0
농림어업	64	1.4(1.5)	102.0	39	0.0(0.0)	.	25	3.6(3.7)	103.0
기능단순노무직	216	8.1(2.8)	34.3	175	5.7(2.4)	41.4	41	20.4(8.8)	42.9
기타 ³⁾	355	4.0(1.0)	25.2	107	3.7(2.1)	54.9	248	4.1(1.2)	28.1
월 가구소득									
50만원 미만	42	0.0(0.0)	.	11	-(-)	-	31	0.0(0.0)	.
50-100만원 미만	91	3.3(1.9)	57.6	42	0.0(0.0)	.	49	6.1(3.5)	56.9
100-200만원 미만	122	10.5(3.5)	33.6	62	9.4(5.2)	54.8	60	11.6(4.3)	37.5
200-300만원 미만	165	6.3(2.6)	41.7	82	5.8(3.1)	53.5	83	6.9(3.3)	46.9
300-400만원 미만	241	5.4(1.6)	29.8	119	5.5(2.2)	40.3	122	5.3(1.8)	34.3
400-500만원 미만	141	3.5(1.7)	47.6	71	1.5(1.4)	96.7	70	6.0(3.3)	56.0
500-600만원 미만	41	0.0(0.0)	.	21	0.0(0.0)	.	20	0.0(0.0)	.
600만원 이상	64	12.0(7.0)	58.0	31	9.1(5.3)	58.8	33	15.0(11.3)	75.5

주 : 1) 연간 필요의료서비스 미치료율 : (최근 1년 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직일 수의 총 합 / 만성·급성질환 및 사고중독 경험자 수

〈표 64〉 연간 사고 및 중독 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	3.3(0.5)	16.8	440	3.4(0.8)	23.8	469	3.2(0.7)	21.4
연령									
19-29	114	2.5(1.8)	71.3	61	1.6(1.5)	96.2	53	3.7(2.5)	66.8
30-39	131	4.3(1.8)	41.2	59	5.1(2.6)	50.8	72	3.6(1.8)	51.3
40-49	187	1.5(0.8)	58.4	91	2.0(1.4)	70.7	96	0.9(0.9)	101.0
50-59	196	4.0(1.3)	32.0	92	2.7(1.9)	68.8	104	5.5(1.9)	33.7
60-69	138	4.9(1.9)	38.1	66	7.0(3.1)	43.7	72	3.1(2.2)	70.9
70 이상	143	3.3(1.5)	45.4	71	4.4(2.5)	57.8	72	2.4(1.7)	72.5
19-64	715	3.3(0.7)	20.2	342	3.1(1.0)	30.8	373	3.4(0.8)	22.3
65 이상	194	3.2(1.3)	40.4	98	4.8(2.3)	48.1	96	1.8(1.3)	71.3
교육수준 ²⁾									
무학	53	4.8(3.0)	62.3	12	-(-)	-	41	4.2(3.2)	74.5
초등학교	115	3.9(1.8)	45.3	42	5.4(3.4)	63.3	73	3.1(1.9)	61.0
중학교	100	2.7(1.0)	37.0	46	0.0(0.0)	.	54	5.1(1.9)	36.7
고등학교	361	4.3(0.9)	20.5	201	4.5(1.4)	32.1	160	4.1(1.4)	32.9
대학교 이상	278	1.7(0.8)	46.3	137	2.1(1.3)	60.1	141	1.4(1.0)	71.7
직업									
전문행정관리	74	2.9(2.0)	71.6	40	2.3(2.3)	99.4	34	3.7(3.6)	99.3
사무직	94	1.6(1.2)	71.3	52	0.0(0.0)	.	42	4.0(2.8)	70.6
판매·서비스직	106	0.0(0.0)	.	27	0.0(0.0)	.	79	0.0(0.0)	.
농림어업	64	4.1(2.8)	69.3	39	0.0(0.0)	.	25	10.3(6.9)	66.5
기능단순노무직	216	3.8(1.3)	32.9	175	3.8(1.5)	40.4	41	4.1(2.9)	71.6
기타 ³⁾	355	4.4(0.9)	20.7	107	7.0(2.2)	31.6	248	3.2(0.9)	29.1
월 가구소득									
50만원 미만	42	2.4(2.6)	106.7	11	-(-)	-	31	3.3(3.4)	104.6
50-100만원 미만	91	4.9(2.1)	42.5	42	6.5(3.6)	55.4	49	3.6(2.6)	70.7
100-200만원 미만	122	6.1(2.1)	34.5	62	6.2(3.2)	52.7	60	6.0(2.7)	44.5
200-300만원 미만	165	3.9(2.1)	53.3	82	2.7(2.5)	92.4	83	5.5(2.2)	40.3
300-400만원 미만	241	2.6(1.1)	43.5	119	3.2(1.6)	51.0	122	2.0(1.1)	56.2
400-500만원 미만	141	1.6(1.0)	62.2	71	1.6(1.6)	99.9	70	1.7(1.2)	71.7
500-600만원 미만	41	3.8(2.5)	65.4	21	3.6(3.3)	91.4	20	4.0(4.0)	101.3
600만원 이상	64	1.8(1.7)	93.7	31	3.6(3.5)	97.0	33	0.0(0.0)	.

주 : 1) 연간 사고 및 중독 경험률 : (연간 사고 및 중독 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 65〉 연간 낙상 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	9.5(0.9)	9.8	440	7.5(1.2)	15.9	469	11.6(1.5)	12.8
연령									
19-29	114	12.9(2.7)	21.2	61	9.5(3.5)	36.6	53	17.1(5.0)	29.2
30-39	131	11.2(2.5)	22.6	59	13.6(4.0)	29.4	72	8.7(3.5)	39.6
40-49	187	6.3(1.7)	27.3	91	5.7(2.1)	37.7	96	7.0(2.4)	34.1
50-59	196	7.6(1.8)	24.0	92	5.3(2.2)	42.2	104	10.2(2.9)	28.6
60-69	138	10.8(2.4)	22.1	66	5.9(2.7)	46.0	72	14.8(4.0)	27.1
70 이상	143	10.8(2.6)	24.5	71	4.7(2.7)	56.3	72	16.0(4.7)	29.6
19-64	715	9.2(0.9)	10.3	342	7.8(1.3)	16.4	373	10.8(1.6)	14.6
65 이상	194	11.0(2.6)	23.8	98	5.7(2.3)	39.6	96	15.7(4.2)	27.0
교육수준 ²⁾									
무학	53	11.5(4.7)	41.0	12	—(—)	—	41	12.1(5.4)	44.4
초등학교	115	16.9(3.4)	20.4	42	5.4(3.4)	63.3	73	22.4(4.7)	20.7
중학교	100	7.5(2.2)	29.4	46	5.2(2.8)	53.7	54	9.4(3.5)	37.0
고등학교	361	9.8(1.5)	15.7	201	8.3(1.8)	22.3	160	12.1(2.8)	22.9
대학교 이상	278	7.4(1.6)	22.1	137	7.4(2.0)	27.0	141	7.5(2.2)	28.9
직업									
전문행정관리	74	9.4(3.6)	37.8	40	8.6(3.9)	45.0	34	10.5(6.0)	57.3
사무직	94	7.5(2.7)	36.4	52	1.6(1.6)	100.2	42	15.9(5.6)	35.2
판매·서비스직	106	8.0(2.7)	33.3	27	7.3(7.0)	95.1	79	8.4(2.6)	31.3
농림어업	64	10.1(3.0)	30.0	39	3.9(3.6)	92.1	25	19.5(6.6)	33.8
기능단순노무직	216	6.5(1.5)	23.0	175	6.5(1.8)	27.9	41	6.8(4.0)	58.3
기타 ³⁾	355	12.6(1.7)	13.7	107	13.7(3.3)	24.1	248	12.1(1.9)	15.4
월 가구소득									
50만원 미만	42	15.9(5.7)	35.9	11	—(—)	—	31	21.3(7.6)	35.4
50-100만원 미만	91	14.3(4.4)	30.5	42	14.1(5.7)	40.6	49	14.5(5.8)	40.0
100-200만원 미만	122	15.1(3.4)	22.5	62	12.8(5.4)	41.9	60	17.4(4.7)	26.7
200-300만원 미만	165	8.5(1.9)	21.9	82	7.2(2.5)	34.8	83	10.1(3.4)	34.0
300-400만원 미만	241	7.1(1.6)	22.9	119	4.5(1.9)	42.1	122	9.9(2.7)	27.8
400-500만원 미만	141	5.0(2.4)	48.2	71	3.8(2.1)	56.9	70	6.5(3.7)	57.4
500-600만원 미만	41	14.7(7.6)	51.8	21	16.5(8.4)	50.8	20	12.3(7.7)	62.8
600만원 이상	64	11.1(3.1)	28.0	31	9.6(5.3)	55.7	33	12.7(5.1)	40.1

주 : 1) 연간 낙상 경험률 : (연간 낙상 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 66〉 양호한 주관적 건강수준 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	48.9(1.8)	3.7	440	53.8(2.5)	4.6	469	43.7(2.4)	5.5
연령									
19-29	114	70.6(4.7)	6.7	61	78.4(5.3)	6.8	53	60.7(7.2)	11.8
30-39	131	62.5(4.2)	6.8	59	60.1(6.9)	11.5	72	65.1(5.4)	8.3
40-49	187	53.4(3.7)	6.9	91	54.5(5.0)	9.1	96	52.3(5.6)	10.6
50-59	196	43.2(3.4)	8.0	92	48.4(4.7)	9.8	104	37.2(4.6)	12.3
60-69	138	33.0(3.9)	11.8	66	42.2(6.0)	14.3	72	25.4(4.7)	18.7
70 이상	143	15.5(3.1)	20.0	71	21.2(4.3)	20.3	72	10.6(3.6)	34.0
19-64	715	54.6(1.9)	3.5	342	58.6(2.8)	4.7	373	50.2(2.5)	5.0
65 이상	194	17.6(2.8)	16.1	98	24.1(4.2)	17.3	96	11.8(3.4)	28.4
교육수준 ²⁾									
무학	53	7.3(3.8)	52.8	12	—(—)	—	41	6.8(4.2)	61.6
초등학교	115	19.6(3.7)	19.1	42	28.2(7.3)	26.0	73	15.5(4.0)	25.9
중학교	100	35.1(4.8)	13.6	46	40.9(6.5)	15.9	54	30.1(6.2)	20.5
고등학교	361	52.7(2.6)	4.9	201	57.9(3.3)	5.8	160	45.0(4.3)	9.6
대학교 이상	278	61.5(2.7)	4.5	137	58.1(3.6)	6.2	141	65.1(3.8)	5.8
직업									
전문행정관리	74	60.2(5.4)	9.0	40	45.7(6.6)	14.5	34	80.8(6.2)	7.7
사무직	94	61.6(5.5)	8.9	52	65.6(6.8)	10.4	42	55.8(8.5)	15.2
판매·서비스직	106	53.5(5.4)	10.0	27	56.8(10.4)	18.3	79	52.0(6.2)	12.0
농림어업	64	38.3(7.3)	19.0	39	44.4(8.4)	18.9	25	28.9(9.7)	33.7
기능단순노무직	216	52.6(3.0)	5.8	175	58.4(3.4)	5.9	41	23.5(6.9)	29.2
기타 ³⁾	355	39.6(2.9)	7.2	107	42.8(4.9)	11.5	248	38.2(3.1)	8.1
월 가구소득									
50만원 미만	42	10.6(5.5)	51.6	11	—(—)	—	31	5.0(3.9)	77.2
50-100만원 미만	91	21.8(5.5)	25.3	42	22.9(8.0)	35.0	49	20.9(6.0)	28.8
100-200만원 미만	122	35.5(4.9)	13.8	62	38.1(6.6)	17.4	60	32.9(6.7)	20.3
200-300만원 미만	165	49.3(3.1)	6.2	82	50.0(5.1)	10.1	83	48.6(5.1)	10.6
300-400만원 미만	241	58.0(3.2)	5.6	119	64.0(3.7)	5.8	122	51.7(4.7)	9.1
400-500만원 미만	141	59.1(5.5)	9.3	71	62.7(7.1)	11.3	70	54.7(6.9)	12.5
500-600만원 미만	41	48.5(6.9)	14.2	21	50.3(11.1)	22.0	20	46.1(14.3)	31.0
600만원 이상	64	56.9(6.6)	11.7	31	63.9(8.8)	13.7	33	49.6(8.8)	17.7

주 : 1) 양호한 주관적 건강수준 인지율 : (주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 67〉 연간 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매) 홍보 및 교육 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	보건기관 고혈압 홍보 및 교육 경험률		보건기관 당뇨병 홍보 및 교육 경험률		보건기관 관절염 홍보 및 교육 경험률		보건기관 아토피·천식 홍보 및 교육 경험률		보건기관 치매 홍보 및 교육 경험률	
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	29.1(2.4)	8.3	28.0(2.3)	8.1	20.6(2.1)	10.2	20.0(2.1)	10.4	28.6(2.5)	8.7
연령										
19-29	23.1(3.7)	16.0	20.3(3.7)	18.3	14.9(3.1)	21.0	16.6(2.9)	17.6	20.6(3.4)	16.6
30-39	18.8(3.5)	18.7	18.5(3.6)	19.3	12.4(3.0)	23.9	11.6(2.7)	23.6	16.8(3.2)	19.2
40-49	31.5(4.9)	15.7	29.6(3.8)	12.9	20.4(3.6)	17.5	22.0(3.5)	15.7	29.6(5.0)	16.9
50-59	31.1(4.4)	14.3	29.7(4.4)	14.8	23.3(3.9)	16.9	21.7(4.2)	19.1	31.7(4.7)	14.7
60-69	37.0(4.4)	11.9	38.2(4.2)	11.0	29.3(4.5)	15.3	27.8(4.5)	16.2	41.7(4.5)	10.8
70 이상	36.7(5.2)	14.1	36.8(5.2)	14.2	27.4(4.4)	16.0	22.3(4.2)	19.0	36.0(5.1)	14.1
19-64	27.9(2.6)	9.3	26.7(2.4)	8.9	19.6(2.2)	11.1	19.7(2.2)	10.9	27.2(2.6)	9.6
65 이상	36.4(4.2)	11.5	35.8(4.2)	11.7	26.2(3.8)	14.6	21.7(3.8)	17.4	36.2(4.3)	11.8
교육수준 ²⁾										
무학	36.0(7.3)	20.1	31.4(7.2)	22.9	28.1(7.0)	24.8	22.2(6.8)	30.4	32.1(7.3)	22.8
초등학교	40.9(5.5)	13.3	43.3(5.4)	12.6	33.6(5.4)	16.1	28.2(5.3)	18.9	41.7(5.3)	12.8
중학교	30.6(5.3)	17.2	29.7(5.1)	17.0	21.3(4.9)	23.2	21.5(5.0)	23.1	37.1(5.2)	14.1
고등학교	26.3(2.8)	10.8	26.0(2.6)	10.1	16.5(2.2)	13.3	16.5(2.2)	13.1	25.5(2.9)	11.4
대학교 이상	28.2(3.8)	13.4	25.4(3.5)	13.6	21.4(3.3)	15.2	21.8(3.3)	15.3	26.4(3.4)	12.9
직업										
전문행정관리	24.7(4.5)	18.3	24.6(4.5)	18.4	18.7(3.8)	20.2	17.8(4.0)	22.3	21.4(4.1)	19.2
사무직	32.2(5.8)	18.1	28.2(5.7)	20.2	25.1(5.4)	21.5	26.6(5.6)	21.2	31.9(6.0)	18.8
판매·서비스직	32.5(4.6)	14.1	29.8(4.5)	15.0	27.0(4.1)	15.3	25.3(4.3)	16.8	31.1(4.5)	14.6
농림어업	42.6(6.7)	15.6	39.7(7.0)	17.7	28.7(5.9)	20.6	23.8(5.8)	24.5	37.3(8.2)	21.9
기능단순노무직	27.4(3.5)	12.7	27.4(3.5)	12.6	16.9(2.8)	16.6	17.2(3.1)	17.8	29.2(4.1)	14.0
기타 ³⁾	27.5(3.2)	11.5	27.1(2.9)	10.8	19.1(2.6)	13.4	18.2(2.5)	13.7	26.7(2.7)	10.0
월 가구소득										
50만원 미만	38.9(7.4)	19.0	35.0(7.4)	21.1	26.2(6.4)	24.6	19.3(5.9)	30.6	31.4(7.2)	22.8
50-100만원 미만	31.3(5.8)	18.6	33.0(5.9)	17.9	26.5(5.3)	20.1	22.4(5.3)	23.8	37.0(5.7)	15.3
100-200만원 미만	34.0(5.5)	16.3	33.3(5.4)	16.3	23.7(4.3)	18.0	22.3(4.3)	19.2	27.3(4.3)	15.8
200-300만원 미만	31.6(4.2)	13.2	31.3(4.1)	13.1	26.2(4.0)	15.4	24.5(3.9)	15.7	32.5(4.3)	13.1
300-400만원 미만	28.0(4.7)	16.7	25.7(3.6)	13.9	18.5(3.1)	17.0	20.0(3.1)	15.5	27.8(3.9)	13.9
400-500만원 미만	19.6(4.3)	21.9	19.4(4.2)	21.7	13.7(3.9)	28.5	14.3(4.1)	28.7	20.1(5.1)	25.6
500-600만원 미만	27.2(5.8)	21.3	21.0(5.9)	28.0	10.7(5.3)	49.1	12.2(5.3)	43.2	27.6(7.4)	26.8
600만원 이상	35.7(5.9)	16.4	35.7(5.9)	16.4	25.1(4.9)	19.4	22.9(4.7)	20.3	34.2(6.1)	17.7

주 : 1) 연간 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매) 홍보 및 교육 경험률 : (보건기관에서 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매)의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 68〉 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율¹⁾

(단위 : %)

구분	이웃 상호 신뢰감		상호부조		전반적인 안전수준		자연환경 만족도		생활환경 만족도		대중교통 만족도		의료서비스 만족도	
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	64.9(2.2)	3.4	45.5(1.9)	4.2	81.1(1.9)	2.4	85.1(1.8)	2.1	79.3(1.8)	2.3	67.9(2.5)	3.7	63.0(2.6)	4.1
연령														
19-29	46.4(4.8)	10.3	19.3(3.1)	16.2	80.3(4.7)	5.8	84.3(3.5)	4.2	76.2(4.1)	5.3	62.9(5.4)	8.6	73.4(4.7)	6.4
30-39	57.3(5.6)	9.8	26.9(4.4)	16.5	72.5(4.6)	6.3	84.5(3.9)	4.6	78.1(4.5)	5.8	59.0(5.2)	8.8	57.1(5.1)	9.0
40-49	60.9(3.6)	5.9	44.3(3.9)	8.9	77.8(3.2)	4.2	79.9(4.2)	5.3	78.2(3.6)	4.6	68.6(4.4)	6.4	56.5(4.6)	8.2
50-59	68.0(4.6)	6.7	51.2(5.0)	9.8	81.0(3.4)	4.2	85.4(3.1)	3.6	76.3(3.5)	4.6	66.1(4.9)	7.4	61.1(4.6)	7.6
60-69	78.9(4.1)	5.2	70.0(4.4)	6.2	91.5(2.5)	2.7	89.3(3.7)	4.1	80.5(4.5)	5.6	76.9(4.1)	5.4	64.9(4.7)	7.2
70 이상	88.7(3.1)	3.5	74.6(4.3)	5.7	91.0(2.3)	2.6	92.7(2.4)	2.6	92.8(2.5)	2.7	81.1(4.2)	5.2	71.8(4.6)	6.4
19-64	60.7(2.6)	4.2	40.1(2.1)	5.4	79.4(2.2)	2.8	83.7(2.0)	2.4	77.2(2.0)	2.6	65.5(2.9)	4.4	61.2(2.8)	4.6
65 이상	87.2(3.3)	3.8	74.8(3.7)	5.0	90.8(2.4)	2.6	92.9(2.0)	2.1	91.3(2.5)	2.8	81.4(3.9)	4.8	73.2(3.9)	5.3
교육수준 ²⁾														
무학	94.9(3.6)	3.8	77.7(6.9)	8.8	93.0(4.9)	5.2	95.6(4.4)	4.6	96.0(2.9)	3.0	81.2(6.6)	8.1	71.9(7.0)	9.7
초등학교	83.7(4.3)	5.2	73.6(5.2)	7.0	88.0(3.5)	4.0	89.0(3.0)	3.3	85.4(4.1)	4.8	73.2(4.1)	5.7	69.1(4.7)	6.9
중학교	73.1(5.4)	7.4	62.9(5.1)	8.2	84.5(3.4)	4.1	77.5(5.3)	6.8	78.1(4.9)	6.2	75.9(3.9)	5.1	63.1(4.5)	7.1
고등학교	60.2(2.9)	4.8	41.1(3.1)	7.5	78.5(3.0)	3.9	82.4(3.0)	3.7	75.7(3.0)	3.9	65.5(3.6)	5.5	61.3(3.8)	6.2
대학교 이상	59.5(3.7)	6.3	34.4(3.2)	9.4	80.1(2.8)	3.5	88.0(2.1)	2.4	80.8(2.4)	3.0	66.0(4.0)	6.0	62.7(3.3)	5.3
직업														
전문행정관리	53.7(6.7)	12.4	34.9(5.9)	16.9	81.2(6.0)	7.4	88.8(4.6)	5.2	82.4(6.0)	7.3	67.8(7.6)	11.3	59.5(7.7)	12.9
사무직	58.7(5.5)	9.4	34.0(5.0)	14.8	82.0(3.6)	4.4	87.3(3.3)	3.8	81.3(3.8)	4.7	75.5(4.5)	6.0	65.6(4.6)	6.9
판매·서비스직	65.3(4.9)	7.5	46.8(5.2)	11.2	79.4(3.9)	4.9	83.6(3.6)	4.3	79.4(4.0)	5.0	64.3(4.8)	7.4	57.3(5.7)	9.9
농림어업	84.2(6.6)	7.9	98.2(1.8)	1.9	93.1(3.6)	3.9	89.3(3.8)	4.3	72.6(5.3)	7.2	62.9(9.6)	15.2	62.6(10.4)	16.5
가능단순노무직	62.8(3.6)	5.7	44.9(3.6)	8.0	75.6(3.5)	4.6	77.6(3.8)	4.9	73.3(3.4)	4.7	64.2(4.2)	6.6	63.6(4.2)	6.6
기타 ³⁾	68.1(3.6)	5.3	45.0(3.0)	6.6	83.7(2.6)	3.1	88.6(2.1)	2.4	82.9(2.0)	2.4	69.7(3.2)	4.7	64.5(3.7)	5.7
월 가구소득														
50만원 미만	85.6(5.8)	6.8	70.7(7.3)	10.4	99.0(1.0)	1.0	95.8(3.2)	3.4	95.8(3.2)	3.3	77.2(6.6)	8.6	68.4(8.3)	12.1
50-100만원 미만	77.0(6.5)	8.4	62.3(6.6)	10.6	85.0(4.6)	5.4	91.6(3.1)	3.4	88.4(4.3)	4.9	81.9(5.2)	6.3	78.2(5.1)	6.5
100-200만원 미만	68.4(5.8)	8.5	56.6(5.3)	9.3	82.2(5.4)	6.6	87.9(4.5)	5.1	78.2(5.1)	6.5	67.3(5.1)	7.5	58.0(5.1)	8.8
200-300만원 미만	65.0(4.5)	6.9	52.3(5.4)	10.2	78.1(3.9)	5.1	87.7(3.0)	3.4	76.0(3.8)	5.0	62.6(5.5)	8.8	59.1(5.0)	8.4
300-400만원 미만	64.5(4.3)	6.6	35.3(3.6)	10.1	81.4(3.6)	4.5	85.3(3.3)	3.8	82.8(2.8)	3.4	71.2(3.8)	5.3	63.0(4.4)	6.9
400-500만원 미만	60.3(5.7)	9.4	44.7(5.0)	11.1	87.9(3.0)	3.4	86.8(3.8)	4.4	85.1(4.0)	4.7	77.6(5.5)	7.1	77.3(4.6)	6.0
500-600만원 미만	60.8(9.1)	15.0	28.1(7.4)	26.2	75.8(6.9)	9.1	76.0(8.4)	11.1	64.7(11.5)	17.8	47.2(8.0)	16.9	60.3(7.9)	13.2
600만원 이상	50.2(7.4)	14.7	38.5(6.9)	18.0	61.8(6.2)	10.0	66.9(7.3)	10.9	58.3(7.3)	12.5	44.0(7.0)	15.8	32.8(5.9)	18.0

주 : 1) 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율 : (지역의 사회 물리적 환경에 대해 긍정적으로 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 69〉 사회적 연결망(친척)¹⁾

(단위 : %)

구분	한 달에 1번 미만			한 달에 1번		한 달에 2~3번		일주일에 1번		일주일에 2~3번		일주일에 4번 이상	
	N	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	909	12.7(1.2)	9.6	12.8(1.2)	9.1	19.1(1.6)	8.4	13.2(1.3)	9.8	19.4(1.2)	6.4	22.8(2.0)	8.6
연령													
19-29	114	26.5(5.2)	19.5	19.4(3.3)	17.1	15.3(3.5)	22.7	7.0(2.4)	34.2	13.7(3.5)	25.5	18.1(4.8)	26.4
30-39	131	9.0(3.1)	34.3	4.6(1.9)	41.0	26.4(4.8)	18.2	12.3(3.2)	26.4	21.2(5.0)	23.6	26.5(5.1)	19.1
40-49	187	10.5(1.8)	17.6	18.7(3.5)	18.8	21.5(3.5)	16.3	16.2(3.8)	23.3	12.0(2.3)	18.9	21.1(3.0)	14.1
50-59	196	14.6(2.7)	18.6	12.5(2.8)	22.6	15.9(3.0)	19.2	13.8(2.3)	16.5	25.5(2.9)	11.3	17.7(2.8)	15.9
60-69	138	3.5(1.6)	45.3	9.1(2.4)	26.0	15.5(3.3)	21.3	16.0(3.3)	20.4	24.0(3.7)	15.5	31.9(4.6)	14.4
70 이상	143	7.7(2.3)	29.6	7.2(2.6)	36.8	18.7(3.3)	17.7	14.1(3.6)	25.3	23.9(3.9)	16.3	28.4(4.9)	17.1
19-64	715	13.9(1.5)	10.5	13.4(1.3)	9.5	19.6(1.8)	9.4	13.2(1.5)	11.4	18.5(1.4)	7.8	21.5(2.1)	9.8
65 이상	194	6.1(1.6)	25.7	9.2(2.3)	25.2	16.2(2.8)	17.3	13.7(2.9)	20.9	24.6(3.6)	14.8	30.2(4.0)	13.4
교육수준 ²⁾													
무학	53	5.5(3.2)	57.7	12.1(4.8)	39.5	18.8(4.4)	23.3	11.9(4.8)	40.3	21.5(8.1)	37.8	30.2(7.1)	23.4
초등학교	115	6.4(2.5)	39.5	2.7(1.6)	57.5	17.8(3.8)	21.5	18.2(4.0)	21.9	24.3(4.0)	16.5	30.6(4.8)	15.8
중학교	100	10.1(3.3)	32.4	7.3(2.8)	38.0	18.7(4.2)	22.3	18.6(4.3)	23.0	18.2(4.3)	23.4	27.1(3.8)	14.2
고등학교	361	17.3(2.2)	12.7	14.7(1.8)	12.1	16.7(2.1)	12.7	11.1(2.0)	17.7	18.3(2.1)	11.5	22.0(3.1)	13.9
대학교 이상	278	10.3(1.9)	18.4	14.7(2.4)	16.2	22.7(3.2)	14.1	13.0(2.6)	20.2	19.7(2.5)	12.6	19.6(2.8)	14.4
직업													
전문행정관리	74	14.1(4.5)	32.0	13.1(3.9)	29.9	23.2(5.4)	23.4	9.9(4.3)	43.7	19.9(5.8)	29.4	19.8(6.7)	34.1
사무직	94	10.8(3.1)	28.7	14.3(4.3)	30.1	19.1(4.3)	22.4	12.6(4.1)	32.6	25.0(5.4)	21.5	18.2(4.4)	24.3
판매·서비스직	106	13.1(2.8)	21.4	12.1(3.6)	29.4	19.2(4.7)	24.5	15.2(3.0)	19.8	11.4(2.9)	25.1	29.1(5.0)	17.0
농림어업	64	4.7(2.6)	56.5	6.3(3.2)	51.2	10.8(5.2)	47.7	13.8(6.6)	48.3	32.6(7.0)	21.6	31.8(6.5)	20.5
기능단순노무직	216	15.2(2.9)	18.9	12.1(2.2)	18.2	18.2(2.7)	14.8	15.2(2.6)	16.8	18.9(2.7)	14.4	20.4(2.5)	12.4
기타 ³⁾	355	12.1(2.3)	18.6	13.7(1.9)	14.2	19.7(2.5)	12.8	12.2(1.5)	12.5	18.7(2.2)	11.6	23.6(3.0)	12.6
월 가구소득													
50만원 미만	42	11.4(5.6)	49.3	3.7(2.7)	71.1	9.9(4.8)	48.9	18.1(5.9)	32.3	21.2(7.0)	32.9	35.7(8.7)	24.3
50-100만원 미만	91	10.9(3.1)	28.1	10.6(3.5)	33.1	17.5(3.7)	20.9	18.1(4.6)	25.3	22.8(4.2)	18.6	20.1(4.9)	24.2
100-200만원 미만	122	6.0(2.2)	37.2	17.1(3.4)	19.7	12.6(3.2)	25.8	17.9(3.9)	22.0	18.0(4.0)	22.1	28.5(5.2)	18.3
200-300만원 미만	165	12.5(3.7)	29.5	8.3(2.4)	29.6	15.7(2.8)	17.9	14.3(2.8)	19.8	21.7(3.1)	14.2	27.5(4.4)	15.9
300-400만원 미만	241	13.9(2.5)	18.2	13.3(2.5)	18.4	24.2(3.8)	15.7	11.6(2.6)	22.2	19.6(3.0)	15.4	17.5(3.4)	19.8
400-500만원 미만	141	17.4(3.3)	19.0	14.6(3.7)	25.2	22.2(4.4)	19.7	8.1(3.6)	44.8	19.3(3.7)	19.2	18.4(3.5)	19.3
500-600만원 미만	41	12.6(5.0)	39.8	21.2(6.8)	32.3	25.8(7.8)	30.1	13.4(4.4)	32.9	12.3(6.0)	49.2	14.8(5.1)	34.3
600만원 이상	64	10.6(4.9)	45.9	11.5(4.3)	37.2	12.4(4.8)	38.6	13.2(3.5)	26.5	16.0(3.6)	22.7	36.2(6.2)	17.2

주 : 1) 사회적 연결망(친척) : (응답 보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 70〉 사회적 연결망(이웃)¹⁾

(단위 : %)

구분	한 달에 1번 미만			한 달에 1번		한 달에 2~3번		일주일에 1번		일주일에 2~3번		일주일에 4번 이상	
	N	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	909	50.8(2.2)	4.3	8.7(1.1)	12.7	6.2(0.9)	13.9	5.8(0.8)	13.0	10.6(1.2)	11.3	17.9(1.6)	8.7
연령													
19-29	114	79.0(4.0)	5.1	5.6(1.3)	23.9	6.8(1.9)	28.1	2.2(1.3)	59.3	3.2(2.1)	65.2	3.2(1.5)	47.4
30-39	131	60.5(4.4)	7.3	9.5(3.0)	32.1	6.6(2.1)	31.5	4.7(2.1)	43.6	9.1(2.5)	27.9	9.6(2.3)	24.1
40-49	187	51.5(4.7)	9.1	11.9(2.8)	23.8	6.4(1.7)	26.5	7.6(2.0)	26.3	9.3(2.2)	23.2	13.3(2.4)	18.4
50-59	196	45.9(4.8)	10.4	11.0(2.3)	21.0	6.4(1.7)	26.9	8.2(2.0)	24.3	11.3(2.5)	21.7	17.1(2.7)	15.7
60-69	138	30.5(4.7)	15.5	8.0(2.8)	34.4	5.3(1.9)	36.5	6.6(2.1)	31.5	14.1(3.1)	22.1	35.5(4.6)	13.0
70 이상	143	23.9(4.5)	18.9	2.5(1.1)	42.7	4.6(1.7)	37.9	3.9(1.6)	40.6	21.1(3.6)	17.0	44.0(4.6)	10.4
19-64	715	55.9(2.3)	4.2	9.7(1.3)	13.2	6.3(1.0)	15.1	6.0(0.9)	14.2	8.7(1.2)	13.6	13.4(1.3)	10.1
65 이상	194	22.9(4.0)	17.6	3.4(1.2)	36.1	5.2(1.7)	32.2	4.8(1.5)	30.9	21.0(3.3)	15.6	42.7(3.8)	9.0
교육수준 ²⁾													
무학	53	26.3(5.6)	21.3	1.7(1.6)	97.3	2.3(2.2)	98.9	3.7(1.8)	47.8	13.4(4.4)	32.8	52.6(5.9)	11.1
초등학교	115	26.9(4.4)	16.4	1.9(1.3)	70.6	5.5(2.4)	43.3	6.2(2.4)	39.0	18.5(4.2)	22.5	41.0(5.6)	13.7
중학교	100	33.1(5.9)	17.9	8.9(2.9)	33.0	8.0(3.1)	39.4	5.9(3.0)	50.6	14.6(3.3)	22.8	29.5(5.6)	19.1
고등학교	361	54.2(3.6)	6.6	8.5(1.7)	19.4	6.0(1.5)	24.6	6.6(1.4)	21.0	9.9(1.6)	16.4	14.8(2.0)	13.5
대학교 이상	278	60.9(3.2)	5.2	11.5(2.1)	18.5	6.6(1.3)	19.5	5.1(1.3)	25.5	7.9(1.7)	21.7	7.9(1.6)	20.1
직업													
전문행정관리	74	70.8(7.8)	11.1	11.6(5.5)	47.6	3.7(2.0)	52.2	1.4(1.4)	99.5	7.0(2.8)	40.2	5.4(2.7)	49.8
사무직	94	56.5(5.8)	10.3	12.1(3.1)	25.9	8.7(2.7)	31.1	10.6(3.0)	28.7	4.6(2.0)	42.6	7.4(3.1)	41.4
판매·서비스직	106	57.5(5.1)	9.0	2.0(1.2)	60.2	6.7(2.5)	37.6	3.8(1.9)	49.3	11.4(3.0)	26.4	18.6(3.4)	18.2
농림어업	64	6.4(3.4)	52.7	0.0(0.0)	.	2.7(2.0)	74.4	8.1(3.9)	47.8	22.7(6.2)	27.4	60.2(8.3)	13.8
기능단순노무직	216	52.9(4.5)	8.5	13.3(2.5)	19.1	5.7(1.9)	32.4	6.7(1.8)	26.3	8.9(1.9)	20.8	12.5(2.3)	18.4
기타 ³⁾	355	46.6(3.1)	6.7	7.2(1.3)	17.9	6.5(1.4)	22.0	5.0(1.0)	19.2	12.6(2.0)	15.9	22.1(2.7)	12.4
월 가구소득													
50만원 미만	42	22.9(7.9)	34.6	0.0(0.0)	.	2.6(2.6)	99.4	2.8(2.7)	96.2	16.6(6.6)	39.9	55.0(8.6)	15.5
50-100만원 미만	91	36.0(6.6)	18.4	2.4(1.1)	43.0	4.8(2.9)	60.3	5.8(2.4)	40.9	15.1(4.9)	32.2	35.7(6.6)	18.5
100-200만원 미만	122	51.9(5.8)	11.1	4.2(1.9)	45.4	2.2(1.2)	57.2	3.4(1.4)	41.1	15.5(3.8)	24.6	22.9(4.0)	17.6
200-300만원 미만	165	56.7(5.5)	9.8	9.2(2.4)	26.3	4.3(1.6)	37.5	2.4(1.2)	49.1	6.4(1.6)	24.9	20.9(4.4)	21.0
300-400만원 미만	241	53.2(3.6)	6.8	13.4(2.8)	20.8	8.1(2.0)	24.5	6.5(1.5)	23.8	9.6(1.7)	17.9	9.2(1.8)	19.3
400-500만원 미만	141	53.6(4.9)	9.2	8.6(2.7)	30.8	9.4(2.1)	22.2	9.2(2.2)	24.0	9.5(2.6)	26.8	9.7(2.5)	26.2
500-600만원 미만	41	55.2(8.5)	15.4	4.4(2.8)	62.9	10.0(4.1)	40.9	6.4(3.3)	51.2	7.4(4.1)	55.9	16.5(5.1)	30.9
600만원 이상	64	44.6(8.1)	18.3	10.8(3.1)	28.3	2.5(1.6)	65.9	8.8(3.9)	44.6	13.2(4.6)	34.7	20.2(4.5)	22.1

주 : 1) 사회적 연결망(이웃) : (응답 보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 71〉 사회적 연결망(친구)¹⁾

(단위 : %)

구분	한 달에 1번 미만			한 달에 1번		한 달에 2~3번		일주일에 1번		일주일에 2~3번		일주일에 4번 이상	
	N	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	909	17.7(1.3)	7.2	13.6(1.2)	8.8	15.8(1.5)	9.3	10.5(1.0)	9.2	23.2(1.7)	7.3	19.2(1.3)	7.0
연령													
19-29	114	7.4(1.8)	23.8	5.5(2.0)	35.8	14.5(2.7)	18.9	9.0(2.3)	25.0	20.7(3.3)	16.2	42.9(4.7)	11.0
30-39	131	20.8(4.1)	19.8	14.9(3.1)	21.2	24.2(4.0)	16.6	10.6(2.6)	24.6	20.5(3.2)	15.3	8.9(2.6)	29.1
40-49	187	18.3(2.8)	15.3	14.3(2.9)	20.0	16.6(2.7)	16.4	13.3(2.2)	16.7	26.6(3.3)	12.5	10.9(2.0)	18.7
50-59	196	17.0(2.4)	14.1	17.1(2.8)	16.2	12.1(2.2)	18.0	11.3(2.2)	19.1	29.2(3.4)	11.8	13.2(2.4)	18.0
60-69	138	15.2(3.0)	19.7	19.2(3.0)	15.8	19.8(3.6)	18.3	7.9(2.3)	29.4	15.3(3.0)	19.7	22.6(3.9)	17.3
70 이상	143	30.7(4.4)	14.5	10.1(2.4)	24.0	7.1(1.8)	25.8	8.1(2.5)	30.4	20.3(4.1)	20.4	23.8(4.0)	16.9
19-64	715	16.5(1.5)	9.2	13.6(1.4)	10.1	16.7(1.7)	10.0	11.0(1.0)	9.2	23.8(1.8)	7.6	18.5(1.4)	7.8
65 이상	194	24.4(3.5)	14.2	14.0(2.3)	16.6	11.0(1.8)	16.7	8.0(2.0)	25.2	20.0(3.6)	18.2	22.6(3.2)	14.2
교육수준 ²⁾													
무학	53	40.1(7.1)	17.7	9.1(3.9)	42.9	7.2(3.3)	46.3	4.0(2.3)	57.1	12.4(5.4)	43.9	27.2(6.8)	25.1
초등학교	115	23.5(4.4)	18.8	18.9(3.6)	19.2	11.1(2.8)	25.6	9.4(3.1)	33.3	19.7(4.5)	22.8	17.4(3.8)	22.2
중학교	100	17.0(3.6)	21.5	21.7(4.5)	20.5	17.1(3.4)	20.0	8.0(2.6)	32.4	18.9(4.2)	22.4	17.4(3.9)	22.5
고등학교	361	15.7(1.8)	11.4	12.1(2.0)	16.6	11.1(1.8)	16.5	11.2(1.6)	14.6	26.3(2.8)	10.7	23.7(2.1)	8.8
대학교 이상	278	16.1(2.6)	16.3	12.6(1.9)	15.3	23.9(2.8)	11.9	11.6(1.9)	16.8	23.0(2.2)	9.5	12.9(2.2)	17.2
직업													
전문행정관리	74	20.8(6.5)	31.3	12.3(3.4)	27.9	18.1(4.7)	26.1	9.7(3.0)	30.7	32.5(4.9)	15.0	6.6(3.2)	48.8
사무직	94	10.6(2.8)	26.5	14.9(3.9)	26.2	21.9(4.4)	19.9	15.3(3.6)	23.6	25.9(4.5)	17.3	11.5(3.7)	32.3
판매·서비스직	106	12.1(3.1)	25.7	9.8(3.0)	30.8	20.5(5.2)	25.5	11.6(2.9)	25.1	23.6(3.9)	16.7	22.5(4.3)	18.9
농림어업	64	18.3(5.6)	30.8	19.1(5.0)	26.2	13.7(4.8)	34.8	12.0(4.4)	37.0	12.9(5.4)	41.4	24.0(4.7)	19.7
기능단순노무직	216	14.1(2.5)	17.7	16.5(2.6)	15.6	14.5(2.4)	16.5	12.0(2.1)	17.5	26.8(3.5)	13.2	16.0(2.3)	14.5
기타 ³⁾	355	23.4(2.1)	9.1	12.1(1.5)	12.4	13.0(1.9)	14.7	7.6(1.3)	17.7	18.9(2.1)	11.0	25.0(2.5)	9.9
월 가구소득													
50만원 미만	42	30.7(7.8)	25.3	8.4(4.6)	54.4	3.4(2.4)	71.3	7.1(3.8)	54.2	22.5(6.4)	28.4	27.8(6.9)	25.0
50-100만원 미만	91	29.4(4.9)	16.7	11.2(2.9)	25.9	10.7(3.9)	36.2	6.2(2.3)	37.8	19.4(5.3)	27.3	23.1(5.7)	24.7
100-200만원 미만	122	22.0(3.5)	15.7	19.0(3.3)	17.5	11.6(2.7)	23.3	6.5(2.5)	37.9	16.9(3.7)	21.9	24.0(4.4)	18.3
200-300만원 미만	165	18.0(3.5)	19.2	13.4(3.3)	24.8	17.2(2.4)	14.2	12.2(2.4)	20.0	20.1(2.9)	14.3	19.2(3.5)	18.4
300-400만원 미만	241	14.7(2.1)	14.2	15.4(1.9)	12.6	17.5(2.4)	13.9	12.4(2.0)	16.2	25.2(3.0)	12.0	14.8(2.6)	17.2
400-500만원 미만	141	14.8(2.6)	17.9	7.5(1.9)	24.7	19.1(3.0)	15.7	7.5(1.8)	24.0	33.7(4.2)	12.3	17.5(4.0)	22.7
500-600만원 미만	41	18.8(6.4)	34.1	16.4(6.1)	37.4	16.1(6.2)	38.9	15.3(6.0)	38.8	22.7(6.4)	28.1	10.6(3.8)	35.5
600만원 이상	64	10.4(3.7)	35.4	16.6(4.5)	27.1	16.3(3.9)	23.9	13.5(3.6)	26.9	14.2(4.6)	32.2	29.1(4.4)	15.2

주 : 1) 사회적 연결망(친구) : (응답 보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 72〉 심폐소생술 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	908	93.8(0.9)	1.0	440	96.0(0.9)	1.0	468	91.4(1.3)	1.4
연령									
19-29	114	96.1(1.9)	2.0	61	95.9(2.8)	2.9	53	96.3(2.5)	2.6
30-39	131	99.4(0.6)	0.6	59	100.0(0.0)	0.0	72	98.8(1.2)	1.2
40-49	187	99.1(0.6)	0.6	91	100.0(0.0)	0.0	96	98.2(1.2)	1.3
50-59	196	96.9(1.6)	1.6	92	98.2(1.8)	1.9	104	95.5(1.8)	1.9
60-69	138	97.6(1.1)	1.2	66	98.5(1.6)	1.6	72	96.9(1.5)	1.6
70 이상	142	61.3(5.0)	8.1	71	73.1(5.9)	8.0	71	51.3(6.3)	12.3
19-64	715	97.9(0.6)	0.6	342	98.5(0.8)	0.8	373	97.2(0.8)	0.8
65 이상	193	71.0(4.2)	5.9	98	80.5(4.4)	5.5	95	62.6(5.5)	8.7
교육수준 ²⁾									
무학	53	50.0(6.1)	12.1	12	—(—)	—	41	47.7(7.0)	14.6
초등학교	114	75.2(5.0)	6.6	42	78.5(5.7)	7.3	72	73.6(6.2)	8.4
중학교	100	94.8(2.2)	2.3	46	92.8(3.0)	3.2	54	96.5(2.4)	2.5
고등학교	361	98.0(0.7)	0.7	201	98.3(0.8)	0.8	160	97.6(1.2)	1.2
대학교 이상	278	98.6(0.8)	0.8	137	98.1(1.4)	1.4	141	99.2(0.8)	0.8
직업									
전문행정관리	74	98.8(1.2)	1.3	40	97.9(2.1)	2.2	34	100.0(0.0)	0.0
사무직	94	98.1(1.9)	1.9	52	96.8(3.2)	3.3	42	100.0(0.0)	0.0
판매·서비스직	106	96.1(2.0)	2.0	27	100.0(0.0)	0.0	79	94.3(2.9)	3.1
농림어업	64	90.7(4.0)	4.4	39	90.3(4.3)	4.8	25	91.4(5.4)	5.9
기능단순노무직	216	98.6(0.7)	0.7	175	99.6(0.4)	0.4	41	93.5(3.8)	4.0
기타 ³⁾	354	87.6(1.9)	2.2	107	88.0(2.5)	2.9	247	87.4(2.4)	2.8
월 가구소득									
50만원 미만	42	53.2(8.4)	15.8	11	—(—)	—	31	48.4(9.2)	18.9
50-100만원 미만	90	79.6(4.2)	5.2	42	78.7(6.2)	7.9	48	80.3(4.3)	5.4
100-200만원 미만	122	91.2(2.5)	2.7	62	93.6(2.5)	2.7	60	88.7(4.0)	4.5
200-300만원 미만	165	98.1(1.1)	1.1	82	99.7(0.3)	0.3	83	96.1(2.3)	2.4
300-400만원 미만	241	96.8(0.9)	1.0	119	98.2(1.0)	1.1	122	95.3(1.7)	1.8
400-500만원 미만	141	95.5(1.6)	1.7	71	95.9(2.8)	2.9	70	94.9(1.8)	1.8
500-600만원 미만	41	100.0(0.0)	0.0	21	100.0(0.0)	0.0	20	100.0(0.0)	0.0
600만원 이상	64	100.0(0.0)	0.0	31	100.0(0.0)	0.0	33	100.0(0.0)	0.0

주 : 1) 심폐소생술 인지율 : (심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 73〉 심폐소생술 교육 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체		
	N	%(표준오차)	변동계수
전체	908	31.7(2.0)	6.2
연령			
19-29	114	56.8(4.8)	8.5
30-39	131	39.7(5.0)	12.6
40-49	187	34.0(3.9)	11.5
50-59	196	28.1(3.6)	12.9
60-69	138	12.2(2.7)	22.4
70 이상	142	5.2(2.5)	48.5
19-64	715	36.2(2.0)	5.6
65 이상	193	7.0(2.1)	30.3
교육수준 ²⁾			
무학	53	1.9(1.8)	98.9
초등학교	114	3.5(1.9)	56.1
중학교	100	17.5(3.6)	20.6
고등학교	361	36.0(2.7)	7.6
대학교 이상	278	41.5(3.9)	9.3
직업			
전문행정관리	74	52.1(7.4)	14.1
사무직	94	43.8(5.4)	12.4
판매·서비스직	106	24.8(4.9)	19.8
농림어업	64	7.6(3.4)	45.3
기능단순노무직	216	37.4(3.0)	8.1
기타 ³⁾	354	24.5(2.7)	11.1
월 가구소득			
50만원 미만	42	3.1(2.9)	96.6
50-100만원 미만	90	8.2(3.7)	45.5
100-200만원 미만	122	18.7(3.9)	21.0
200-300만원 미만	165	28.9(4.9)	17.0
300-400만원 미만	241	37.4(3.5)	9.4
400-500만원 미만	141	44.3(5.0)	11.3
500-600만원 미만	41	49.2(5.4)	11.1
600만원 이상	64	33.1(5.4)	16.3

주 : 1) 심폐소생술 교육 경험률 : (최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 74〉 손 씻기 감염병 예방 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	907	99.2(0.3)	0.3	438	98.8(0.6)	0.6	469	99.6(0.3)	0.3
연령									
19-29	114	99.2(0.8)	0.8	61	98.5(1.5)	1.5	53	100.0(0.0)	0.0
30-39	131	97.7(1.7)	1.7	59	96.8(3.0)	3.1	72	98.7(1.2)	1.3
40-49	186	99.4(0.6)	0.6	90	98.9(1.1)	1.1	96	100.0(0.0)	0.0
50-59	196	99.6(0.4)	0.4	92	100.0(0.0)	0.0	104	99.2(0.8)	0.8
60-69	138	99.3(0.7)	0.7	66	98.4(1.6)	1.6	72	100.0(0.0)	0.0
70 이상	142	100.0(0.0)	0.0	70	100.0(0.0)	0.0	72	100.0(0.0)	0.0
19-64	714	99.1(0.4)	0.4	341	98.8(0.7)	0.7	373	99.5(0.3)	0.3
65 이상	193	99.5(0.5)	0.5	97	98.8(1.1)	1.2	96	100.0(0.0)	0.0
교육수준 ²⁾									
무학	52	100.0(0.0)	0.0	11	—(—)	—	41	100.0(0.0)	0.0
초등학교	115	100.0(0.0)	0.0	42	100.0(0.0)	0.0	73	100.0(0.0)	0.0
중학교	100	100.0(0.0)	0.0	46	100.0(0.0)	0.0	54	100.0(0.0)	0.0
고등학교	360	99.0(0.4)	0.5	200	98.6(0.7)	0.7	160	99.5(0.5)	0.5
대학교 이상	278	98.9(0.8)	0.8	137	98.5(1.5)	1.5	141	99.4(0.6)	0.6
직업									
전문행정관리	74	98.8(1.1)	1.1	40	100.0(0.0)	0.0	34	97.1(2.4)	2.5
사무직	94	100.0(0.0)	0.0	52	100.0(0.0)	0.0	42	100.0(0.0)	0.0
판매·서비스직	106	97.7(2.3)	2.3	27	92.7(7.2)	7.7	79	100.0(0.0)	0.0
농림어업	64	100.0(0.0)	0.0	39	100.0(0.0)	0.0	25	100.0(0.0)	0.0
기능단순노무직	215	99.5(0.5)	0.5	174	99.4(0.6)	0.6	41	100.0(0.0)	0.0
기타 ³⁾	354	99.2(0.4)	0.4	106	98.1(1.4)	1.4	248	99.7(0.3)	0.3
월 가구소득									
50만원 미만	42	100.0(0.0)	0.0	11	—(—)	—	31	100.0(0.0)	0.0
50-100만원 미만	90	98.9(1.0)	1.1	41	97.6(2.3)	2.4	49	100.0(0.0)	0.0
100-200만원 미만	122	98.9(1.1)	1.2	62	97.7(2.3)	2.3	60	100.0(0.0)	0.0
200-300만원 미만	164	99.5(0.5)	0.5	81	100.0(0.0)	0.0	83	99.0(1.0)	1.0
300-400만원 미만	241	99.1(0.9)	0.9	119	98.2(1.8)	1.8	122	100.0(0.0)	0.0
400-500만원 미만	141	98.6(1.0)	1.0	71	98.5(1.4)	1.4	70	98.7(1.3)	1.3
500-600만원 미만	41	100.0(0.0)	0.0	21	100.0(0.0)	0.0	20	100.0(0.0)	0.0
600만원 이상	64	100.0(0.0)	0.0	31	100.0(0.0)	0.0	33	100.0(0.0)	0.0

주 : 1) 손 씻기 감염병 예방 인지율 : (“매우 도움이 된다” 또는 “도움이 된다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 75〉 손 씻기 실천율

(단위 : %)

구분	식사 전 손 씻기 ¹⁾			화장실 다녀온 후 손 씻기 ²⁾			외출 후 손 씻기 ³⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	91.1(1.1)	1.2	909	94.8(0.9)	1.0	909	92.2(1.2)	1.3
연령									
19-29	114	89.9(3.0)	3.3	114	97.4(1.4)	1.5	114	90.3(2.8)	3.1
30-39	131	93.9(2.2)	2.4	131	96.6(1.6)	1.7	131	95.1(2.2)	2.4
40-49	187	90.9(2.0)	2.2	187	95.4(1.5)	1.6	187	91.7(2.3)	2.5
50-59	196	91.8(2.0)	2.2	196	94.9(1.5)	1.6	196	93.3(1.9)	2.1
60-69	138	94.7(2.2)	2.3	138	92.7(2.8)	3.0	138	93.4(2.3)	2.5
70 이상	143	84.4(2.6)	3.1	143	89.4(2.0)	2.2	143	88.8(2.1)	2.3
19-64	715	91.8(1.3)	1.4	715	95.8(0.9)	0.9	715	92.6(1.4)	1.5
65 이상	194	87.3(1.9)	2.2	194	89.6(2.0)	2.2	194	90.1(1.7)	1.9
교육수준 ⁴⁾									
무학	53	81.2(4.1)	5.1	53	86.2(3.6)	4.2	53	85.4(3.4)	4.0
초등학교	115	90.6(2.7)	3.0	115	92.5(2.4)	2.6	115	92.8(2.3)	2.4
중학교	100	92.0(2.9)	3.2	100	90.3(3.4)	3.8	100	87.4(4.0)	4.6
고등학교	361	89.2(2.0)	2.2	361	94.6(1.4)	1.4	361	90.4(1.8)	2.0
대학교 이상	278	94.6(1.4)	1.5	278	98.0(0.8)	0.9	278	96.5(1.0)	1.1
직업									
전문행정관리	74	90.1(3.9)	4.4	74	95.9(2.4)	2.5	74	94.7(2.8)	2.9
사무직	94	95.3(2.0)	2.1	94	99.2(0.8)	0.8	94	97.4(1.5)	1.5
판매·서비스직	106	93.9(2.7)	2.8	106	97.5(1.7)	1.8	106	92.7(3.2)	3.4
농림어업	64	88.5(4.9)	5.5	64	88.6(6.0)	6.8	64	89.0(5.8)	6.5
기능단순노무직	216	89.3(2.3)	2.6	216	91.9(2.0)	2.2	216	89.7(2.9)	3.3
기타 ⁵⁾	355	90.7(1.4)	1.5	355	95.2(0.9)	0.9	355	92.0(1.4)	1.5
월 가구소득									
50만원 미만	42	88.7(4.1)	4.7	42	90.5(4.2)	4.7	42	87.7(4.3)	4.9
50-100만원 미만	91	86.9(3.6)	4.1	91	89.3(3.4)	3.8	91	91.3(3.3)	3.6
100-200만원 미만	122	91.3(3.3)	3.6	122	94.1(2.9)	3.1	122	93.3(3.1)	3.4
200-300만원 미만	165	89.0(2.6)	2.9	165	93.7(1.9)	2.1	165	87.1(3.2)	3.6
300-400만원 미만	241	93.9(1.8)	2.0	241	95.9(1.2)	1.3	241	94.9(1.7)	1.8
400-500만원 미만	141	92.3(3.0)	3.2	141	96.9(1.8)	1.8	141	92.4(3.3)	3.5
500-600만원 미만	41	92.4(4.4)	4.7	41	100.0(0.0)	0.0	41	97.9(2.0)	2.0
600만원 이상	64	87.4(4.1)	4.7	64	93.8(2.8)	3.0	64	91.0(3.2)	3.5

주 : 1) 식사 전 손 씻기 실천율 : (최근 1주일 동안 식사하기 전 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 화장실 다녀온 후 손 씻기 실천율 : (최근 1주일 동안 화장실 다녀온 후 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 외출 후 손 씻기 실천율 : (최근 1주일 동안 외출 후 집에 돌아왔을 때 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

4) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

5) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 76〉 비누, 손 세정제 사용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	84.5(1.5)	1.7	440	83.7(1.7)	2.0	469	85.3(2.1)	2.4
연령									
19-29	114	87.5(4.0)	4.5	61	83.7(3.8)	4.6	53	92.5(7.2)	7.8
30-39	131	92.0(2.6)	2.9	59	87.3(4.5)	5.2	72	97.1(1.7)	1.8
40-49	187	86.7(2.0)	2.3	91	89.4(2.9)	3.2	96	83.9(3.6)	4.3
50-59	196	82.3(3.4)	4.1	92	81.5(4.1)	5.0	104	83.3(4.0)	4.8
60-69	138	79.1(4.2)	5.3	66	75.7(5.8)	7.6	72	81.8(5.9)	7.2
70 이상	143	74.4(4.1)	5.5	71	77.9(4.1)	5.2	72	71.4(5.9)	8.2
19-64	715	86.5(1.5)	1.7	342	85.3(1.8)	2.1	373	87.9(2.2)	2.5
65 이상	194	73.3(4.0)	5.5	98	74.2(4.4)	6.0	96	72.6(5.6)	7.7
교육수준 ²⁾									
무학	53	66.0(7.0)	10.6	12	—(—)	—	41	64.2(8.7)	13.6
초등학교	115	80.1(4.3)	5.4	42	81.9(5.4)	6.6	73	79.3(4.6)	5.8
중학교	100	82.4(3.6)	4.4	46	81.8(4.7)	5.7	54	82.9(5.1)	6.1
고등학교	361	83.4(2.3)	2.7	201	82.3(2.9)	3.5	160	85.0(3.0)	3.5
대학교 이상	278	89.9(1.8)	2.0	137	86.9(2.6)	3.0	141	93.1(3.3)	3.6
직업									
전문행정관리	74	86.7(3.8)	4.4	40	83.4(6.1)	7.3	34	91.5(5.0)	5.4
사무직	94	90.8(3.4)	3.7	52	89.3(4.6)	5.2	42	92.9(4.5)	4.9
판매·서비스직	106	81.8(4.1)	5.0	27	81.9(8.9)	10.9	79	81.7(4.0)	5.0
농림어업	64	66.7(7.7)	11.5	39	69.1(9.1)	13.1	25	63.1(8.1)	12.8
기능단순노무직	216	89.3(2.1)	2.3	175	88.6(2.6)	2.9	41	92.6(4.4)	4.7
기타 ³⁾	355	81.8(2.9)	3.5	107	75.5(4.5)	5.9	248	84.6(3.4)	4.0
월 가구소득									
50만원 미만	42	78.1(6.8)	8.7	11	—(—)	—	31	76.6(7.8)	10.2
50-100만원 미만	91	71.6(4.7)	6.5	42	67.8(7.0)	10.3	49	74.7(6.1)	8.1
100-200만원 미만	122	82.1(3.8)	4.7	62	79.1(5.1)	6.4	60	85.1(4.2)	4.9
200-300만원 미만	165	85.3(2.8)	3.3	82	85.5(4.3)	5.0	83	84.9(3.4)	4.0
300-400만원 미만	241	88.7(2.4)	2.7	119	85.6(3.4)	4.0	122	91.9(4.1)	4.5
400-500만원 미만	141	88.8(3.1)	3.5	71	90.8(3.0)	3.4	70	86.4(4.7)	5.5
500-600만원 미만	41	80.6(6.2)	7.7	21	84.1(10.8)	12.9	20	76.0(8.0)	10.6
600만원 이상	64	82.0(4.7)	5.7	31	77.9(6.3)	8.1	33	86.2(4.1)	4.7

주 : 1) 비누, 손 세정제 사용률 : (평소 손을 씻을 때, 비누나 손 세정제를 “항상 사용한다” 또는 “자주 사용한다”에 응답한 사람의 수/ 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 77〉 연간 손 씻기 교육 및 홍보 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	77.2(1.7)	2.2	440	75.8(2.1)	2.8	469	78.7(2.3)	2.9
연령									
19-29	114	87.4(3.0)	3.5	61	89.0(3.6)	4.1	53	85.3(4.6)	5.4
30-39	131	84.6(3.2)	3.8	59	77.3(5.8)	7.5	72	92.6(2.9)	3.1
40-49	187	83.0(2.8)	3.4	91	80.1(4.4)	5.5	96	86.2(3.7)	4.3
50-59	196	80.5(3.6)	4.4	92	76.0(5.3)	6.9	104	85.5(4.0)	4.6
60-69	138	71.5(5.0)	7.0	66	77.4(5.9)	7.6	72	66.5(6.7)	10.1
70 이상	143	39.6(4.2)	10.7	71	37.7(6.7)	17.6	72	41.2(5.6)	13.7
19-64	715	82.8(1.5)	1.9	342	80.5(2.2)	2.7	373	85.3(1.9)	2.3
65 이상	194	46.5(4.4)	9.4	98	46.8(5.5)	11.8	96	46.3(5.5)	12.0
교육수준 ²⁾									
무학	53	28.7(6.2)	21.4	12	—(—)	—	41	29.9(6.6)	22.0
초등학교	115	53.4(5.1)	9.6	42	40.2(8.0)	20.0	73	59.8(5.4)	9.1
중학교	100	73.0(4.1)	5.7	46	73.6(6.0)	8.1	54	72.5(5.6)	7.7
고등학교	361	80.0(2.2)	2.8	201	77.2(3.1)	4.1	160	84.2(2.9)	3.4
대학교 이상	278	87.3(1.9)	2.1	137	82.6(3.2)	3.8	141	92.2(2.5)	2.7
직업									
전문행정관리	74	82.3(4.4)	5.3	40	78.2(6.2)	7.9	34	88.1(5.1)	5.8
사무직	94	87.5(3.0)	3.5	52	86.1(4.4)	5.1	42	89.4(4.2)	4.7
판매·서비스직	106	78.0(4.9)	6.2	27	66.3(10.5)	15.9	79	83.3(5.1)	6.2
농림어업	64	50.7(6.7)	13.2	39	53.3(8.8)	16.4	25	46.7(10.5)	22.4
기능단순노무직	216	80.3(3.1)	3.8	175	80.3(3.5)	4.4	41	80.4(7.4)	9.2
기타 ³⁾	355	73.8(2.6)	3.5	107	68.6(4.5)	6.6	248	76.1(3.1)	4.1
월 가구소득									
50만원 미만	42	27.1(6.8)	25.2	11	—(—)	—	31	30.4(8.8)	28.8
50-100만원 미만	91	53.2(6.6)	12.3	42	47.5(10.3)	21.6	49	57.8(6.5)	11.3
100-200만원 미만	122	64.9(5.3)	8.2	62	60.0(6.6)	11.0	60	70.0(6.5)	9.3
200-300만원 미만	165	79.5(3.3)	4.2	82	75.6(5.1)	6.7	83	84.2(3.1)	3.6
300-400만원 미만	241	84.1(2.6)	3.1	119	82.5(3.7)	4.5	122	85.8(3.5)	4.1
400-500만원 미만	141	86.1(2.7)	3.2	71	82.6(4.2)	5.1	70	90.3(3.4)	3.8
500-600만원 미만	41	91.0(4.3)	4.8	21	92.3(5.0)	5.4	20	89.2(5.9)	6.6
600만원 이상	64	80.9(4.6)	5.6	31	82.2(6.8)	8.3	33	79.6(7.6)	9.5

주 : 1) 연간 손 씻기 교육 및 홍보 경험률 : (최근 1년 동안 올바른 손 씻기에 관한 교육이나 이와 관련된 홍보물을 본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

제4부 부록

- I. 개인조사표
- II. 가구조사표
- III. 지표정의
- IV. 2008-2017 산출지표



CHS

제 4 부 부록



I. 개인조사표

CHS

Community Health Survey

다음은 2017년 지역사회건강조사 개인조사표(울산권역)입니다. →



승인번호
제117075호



지역사회건강조사
Community Health Survey

울산

안녕하십니까?

질병관리본부에서는 「지역보건법」 제4조(지역사회 건강실태조사), 「지역보건법 시행령」 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)에 의거하여 지역 건강통계를 생산하여 근거 중심의 보건사업 수행 기반을 마련하고자 매년 「지역사회건강조사」를 실시하오니 적극적인 협조 부탁드립니다.

지역사회건강조사는 전국 254개 보건소에서 매년 8월에서 10월까지 실시하며, 만 19세 이상 성인을 대상으로 흡연, 음주, 신체활동 등의 건강행태, 의료이용, 삶의 질 등을 조사합니다.

조사 자료는 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며, 통계작성 외의 목적으로는 사용하지 않습니다. 정확한 응답을 위하여 반드시 조사대상자 본인이 성실하게 조사에 응답하여 주시기 바랍니다.

※ 통계법 제32조(통계응답자의 성실응답의무)

통계응답자는 통계의 작성에 관한 사무에 종사하는 자로부터 통계의 작성을 목적으로 질문 또는 자료제출 등의 요구를 받은 때에는 신뢰성 있는 통계가 작성될 수 있도록 조사사항에 대하여 성실하게 응답하여야 한다.

※ 통계법 제33조(비밀의 보호)

- ① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
- ② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계 작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.



보건복지부
질병관리본부

시도 보건소 표본지점 가구 가구원

관리번호 :

2017년 지역사회건강조사 참여 동의서

본인은 『지역사회건강조사』 내용을 충분히 이해하고 건강면접조사에 참여합니다.

『지역사회건강조사』는 지역주민의 건강수준을 파악하여 주민들에게 알맞은 보건사업계획을 수립하고자 하는 목적으로 수행하며, 수집된 자료는 보건사업 계획수립을 위한 통계분석용으로만 활용합니다. 조사대상자는 조사분항에 따라 응답을 거부할 수 있으며, 응답거부에 따른 불이익은 없습니다. 본 조사에서 수집하는 개인정보는 아래와 같으며, 개인정보이용목적 외의 이유로 외부로 발표되거나 공개되지 않으니 조사에 성실히 임하여 주시기 바랍니다. 개인정보 수집 및 이용 동의 거부에 따른 불이익은 없습니다.

- 수집 개인정보 범위 : 성명, 성별, 생년월일, 전화번호
- 개인정보 보유기간 : 조사 수행일부터 2018년 2월 28일까지
※ 수집된 개인정보는 2018년 3월 1일 파기
- 개인정보 이용목적 : 조사의 진실성 검증을 위한 전화 확인 조사
※ 개인정보 이용에 대한 내용은 지역사회건강조사 홈페이지(<http://chs.cdc.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

2017년 월 일

참여자 성명 : _____(인) 또는 서명

조사원 성명 : _____(인) 또는 서명

수령증

설문을 마친 후 조사원으로부터 답례품을 받았습니다.

2017년 월 일

성명

서명



승 인 번 호
제117075호

2017년 지역사회건강조사

이 조사표에 기재된
내용은 통계법
제33조에 의하여
비밀이 보장됩니다.

※ 조사대상자 번호를 정확히 기입하십시오.

시도 번호	보건소번호			표본지점번호					가구번호				가구원번호	

조 사 대 상 자

성명		주민등록 생년월일	년 월 일	가구명부의 주민등록상 생년월일과 동일한지 확인하십시오. 다른 경우 가구명부를 수정합니다.
성별	① 남자 ② 여자			

가치 있는 건강조사, 같이 누릴 지역건강

1. 평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

☐

흡연

1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 5번 문항으로)

☐

1-1. 처음으로 담배 한 대를 다 피운 시기는 언제입니까?

만 세 888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음)

세

888. 비해당

2. 현재 담배를 피웁니까?

☐

8. 비해당

① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? 개비 (→ 3번 문항으로)

888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/②, ③: 현재 담배를 가끔 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

개비

888. 비해당

② 가끔 피움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? 일일→ 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? 개비 (→ 3번 문항으로)개비

88. 비해당

888. 비해당

88 888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/①, ③: 현재 담배를 매일 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음

→ 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? 년 개월→ 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? 개비

88 88 888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/①, ②: 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움)

년 월개비

→ 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? (→ 5번 문항으로)

- ① 1년 미만
② 1년-5년 미만
③ 5년-10년 미만
④ 10년-15년 미만
⑤ 15년-20년 미만
⑥ 20년 이상

⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/①, ②: 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움)

88. 88. 비해당

888. 비해당

☐

8. 비해당

3. 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

☐

8. 비해당

- ① 최근 1년간 금연한 적이 있다
② 과거에는 있었지만, 최근 1년간 없다
③ 금연한 적이 없다
⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/③: 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

가치 있는 건강조사. 같이 누릴 지역건강

4. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까?

- ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
 ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
 ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
 ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다
 ⑤ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/③: 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

☐

8. 비해당

※ 5-7번은 간접흡연에 대한 질문입니다. 질문에 응답해 주십시오.

5. 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 6번 문항으로)

☐5-1. 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항5/②: 가정실내에서 일상적으로 담배를 피우는 사람이 없음)

☐

8. 비해당

6. 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예
 ② 아니오
 ③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)

☐7. 최근 1년 동안 공공장소(버스/택시 정거장, 길거리, 음식점, 유흥업소, PC방 등)에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐8. 최근 1년 동안 금연에 대한 공익광고(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐9. 최근 1년 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐10. 금연구역이 지정되어 있다는 것을 알고 있습니까?

- ① 지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다(→ 10-1번 문항으로)
 ② 지정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다(→ 11번 문항으로)
 ③ 지정된 것을 모른다(→ 11번 문항으로)

☐10-1. 금연구역 내에서 흡연한 적이 있습니까?

- ① 금연구역 내에서 항상 흡연한다
 ② 금연구역 내에서 가끔 흡연한다
 ③ 금연구역 내에서 흡연을 하지 않는다
 ④ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/③: 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음, 문항 10/②, ③ 지정구역 모름)

☐

8. 비해당

가치 있는 건강조사, 같이 누릴 지역건강

※11번은 전자담배에 대한 질문입니다. 질문에 응답해 주십시오.

11. 지금까지 살아오는 동안 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 12번 문항으로)

☐

11-1. 최근 1달 동안 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항11/②: 평생 전자담배를 사용한 적이 없음)

☐

8. 비해당

12. (지역) 최근 1년 동안 몇 번 금연을 시도하셨습니다? ☐☐ 회

88. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항 2-3-3/②-⑥: 1년 이상 금연자, 문항3/②,③: 최근 1년 또는 평생 금연한 적 없음)

☐☐ 회

88. 비해당

13. (지역) 가장 효과적인 금연 프로그램은 무엇이라고 생각합니까?

- ① 공익광고(TV, 라디오, 포스터 등)
 ② 금연교육
 ③ 금연클리닉
 ④ 금연상담전화
 ⑤ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음)

☐

8. 비해당

14. (지역) 현재 살고 있는 사·군·구에서 강화해야 할 금연정책은 무엇인지 한 가지만 선택하여 주십시오.

- ① 금연구역 확대
 ② 금연구역 내 흡연 단속(과태료 인상)
 ③ 금연클리닉 확대 운영
 ④ 금연 교육 및 홍보 강화
 ⑤ 더 강화할 정책이 없다

☐

음주

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다.

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 3번 문항으로)

☐

1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?

만 세 888. 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음)세

888. 비해당

2. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 3번 문항으로)

☐

- ③ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음)

8. 비해당

2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까?

- ① 한 달에 1번 미만
 ② 한 달에 1번 정도
 ③ 한 달에 2~4번 정도
 ④ 일주일에 2~3번 정도
 ⑤ 일주일에 4번 이상
 ⑥ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음, 문항2/②: 최근 1년 동안 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-2. 한 빈에 술을 얼마나 마십니까?

(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다)

- ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
 ⑥ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음, 문항2/②: 최근 1년 동안 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-3. 최근 1년 동안 절주(음주량을 줄임)나 금주를 시도한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

- ③ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음, 문항2/②: 최근 1년 동안 술을 마신 적이 없음)

8. 비해당

3. 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

가치 있는 건강조사, 같이 누릴 지역건강

안전의식

【자동차 운전】

1. 자동차 운전을 합니까?

① 예

② 아니오 (→ 2번 문항으로)

☐


1-1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까?

① 전혀 매지 않는다

② 거의 매지 않는 편이다

③ 가끔 매는 편이다

④ 대체로 매는 편이다

⑤ 항상 맨다

⑧ 비해당(문항1/②: 자동차 운전을 하지 않음)

☐

8. 비해당

1-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까?

① 예

② 아니오

⑧ 비해당(문항1/②: 자동차 운전을 하지 않음, 「음주」문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음, 문항2/②: 최근 1년 동안 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

2. 다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 맵니까?

① 앞좌석에 타지 않는다

② 전혀 매지 않는다

③ 가끔 매는 편이다

④ 대체로 매는 편이다

⑤ 항상 맨다

☐

3. 다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 맵니까?

① 뒷좌석에 타지 않는다

② 전혀 매지 않는다

③ 가끔 매는 편이다

④ 대체로 매는 편이다

⑤ 항상 맨다

☐

4. 버스(광역 시내버스, 시외버스, 전세버스)를 탈 때 안전벨트를 맵니까?

① 버스를 타지 않는다

② 전혀 매지 않는다

③ 가끔 매는 편이다

④ 대체로 매는 편이다

⑤ 항상 맨다

☐

5. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 탄 적이 있습니까?

① 예

② 아니오

☐

【오토바이 운전】

6. 오토바이 운전을 합니까?

- ① 예 ② 아니오 (➔ 7번 문항으로)

1

6-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항6/②: 오토바이 운전을 하지 않음, 「음주」문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

1

8. 비해당

【자전거 운전】

7. 자전거 운전을 합니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「운동 및 신체활동」 1번 문항으로)

1

7-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거를 운전한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항7/②: 자전거 운전을 하지 않음, 「음주」문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

1

8. 비해당

가치 있는 건강조사, 같이 누릴 지역건강

운동 및 신체활동

1. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까? ☐ 일

※ 격렬한(고강도) 신체활동

달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동



- 1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?
하루에 시간 분 88 88. 비해당(문항1/0일: 격렬한 신체활동 없음)

일

시간 분
88 88. 비해당

2. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다.) ☐ 일

※ 중등도(중강도) 신체활동

천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동



- 2-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?
하루에 시간 분 88 88. 비해당(문항2/0일: 중등도 신체활동 없음)

일

시간 분
88 88. 비해당

3. 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까? ☐ 일

※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.



- 3-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까?
하루에 시간 분 88 88. 비해당(문항3/0일: 걷기운동 없음)

일

시간 분
88 88. 비해당

4. 최근 1주일 동안 스트레칭, 맨손체조 등의 유연성 운동을 한 날은 며칠입니까?

- ① 전혀 하지 않음
② 1일
③ 2일
④ 3일
⑤ 4일
⑥ 5일 이상

5. 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력 운동을 한 날은 며칠입니까?

- ① 전혀 하지 않음
② 1일
③ 2일
④ 3일
⑤ 4일
⑥ 5일 이상

가치 있는 건강조사. 같이 누릴 지역건강

6. 지난주 주중(월~금요일) 여가시간에 TV 보기, 게임, 인터넷 등으로 앉아서 보낸 시간이 하루에 보통 몇 시간 정도입니까?

- ① 하루 1시간 미만
 ② 하루 1시간~2시간 미만
 ③ 하루 2시간~3시간 미만
 ④ 하루 3시간~4시간 미만
 ⑤ 하루 4시간 이상

☐

7. 지난주 주말(토~일요일) 여가시간에 TV보기, 게임, 인터넷 등으로 앉아서 보낸 시간이 하루에 보통 몇 시간 정도입니까?

- ① 하루 1시간 미만
 ② 하루 1시간~2시간 미만
 ③ 하루 2시간~3시간 미만
 ④ 하루 3시간~4시간 미만
 ⑤ 하루 4시간 이상

☐

8. (지역) 최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 쉽게 찾을 수 있었습니까?

- ① 매우 쉬웠다
 ② 쉬운 편이었다
 ③ 어려운 편이었다
 ④ 매우 어려웠다

☐

9. (지역) 최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역의 주민센터(동사무소), 보건소, 구청, 시청 등의 지방자치단체에서 운영하는 운동프로그램에 참여해 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

10. (지역) 최근 1달 동안 규칙적으로 운동을 하고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

가치 있는 건강조사, 같이 누릴 지역건강

식생활

1. 최근 1주일 동안 아침식사를 한 날은 며칠입니까? ☐ 일 ☐ 일
2. 평상시 음식을 먹을 때, 다음 중 본인은 어디에 해당합니까? ☐
- ① 아주 짜게 먹는다
② 약간 짜게 먹는다
③ 보통으로 먹는다
④ 약간 싱겁게 먹는다
⑤ 아주 싱겁게 먹는다
3. 식탁이나 상에 차려진 음식을 먹을 때, 소금이나 간장을 더 넣어 먹습니까? ☐
- ① 항상 더 넣는다
② 자주 더 넣는다
③ 거의 더 넣지 않는다
④ 전혀 더 넣지 않는다
4. 전, 부침, 튀김을 먹을 때, 간장에 찍어 먹습니까? ☐
- ① 항상 찍어 먹는다
② 가끔 찍어 먹는다
③ 찍어 먹지 않는다
5. '영양표시'를 알고 있습니까? ☐
- ① 예 ② 아니오 (→ 6번 문항으로)
- ↳ 5-1. 가공식품을 사거나 고를 때, '영양표시'를 읽습니까? ☐
- ① 예 ② 아니오 (→ 6번 문항으로)
- ⑧ 비해당(문항5/②: 영양표시를 모름)
8. 비해당
- ↳ 5-1-1. 영양표시 내용이 가공식품을 고르는데 영향을 미칩니까? ☐
- ① 예 ② 아니오
- ⑧ 비해당(문항5/②: 영양표시를 모름, 문항5-1/②: 영양표시를 읽지 않음)
8. 비해당
6. (지역) 평소 덜 짜게 먹으려고 노력합니까? ☐
- ① 전혀 노력하지 않는다
② 거의 노력하지 않는다
③ 가끔 노력한다
④ 대체로 노력한다
⑤ 항상 노력한다
7. (지역) 최근 1년 동안 보건소, 구청, 주민센터(동사무소), 복지시설, 학교, 병원 등에서 실시된 영양교육 및 상담을 받은 적이 있습니까? ☐
- ① 예 ② 아니오

비만 및 체중조절

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까?

- ① 매우 마른 편임
 ② 약간 마른 편임
 ③ 보통임
 ④ 약간 비만임
 ⑤ 매우 비만임

☐

2. 최근 1년 동안 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다
 ② 몸무게를 유지하려고 노력했다
 ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다
 ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해 본 적 없다

☐

3. 현재 본인의 키는 얼마입니까?

cmcm

4. 현재 본인의 몸무게는 얼마입니까?

kgkg

가치 있는 건강조사, 같이 누릴 지역건강

구강건강

1. 스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

☐

2. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?
(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.)

☐

- ① 매우 불편하다
② 불편하다
③ 그저 그렇다
④ 별로 불편하지 않다
⑤ 전혀 불편하지 않다

3. (만 50세 이상만 응답해 주십시오.) 현재 끼었다 뺐다 할 수 있는 틀니를 하고 있습니까?

☐

- ① 위아래 둘 다 있음 — (→ 4번 문항으로)
② 위쪽만 있음
③ 아래쪽만 있음] (→ 3-1번 문항으로)
④ 아니요
⑧ 비해당(나이: 만 50세 미만)

8. 비해당



3-1. 현재 틀니가 필요하다고 생각합니까?

☐

- ① 예 ② 아니요
⑧ 비해당(문항3/①: 위아래 둘 다 있음)

8. 비해당

4. 어제 하루 동안 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까?

4-1. 아침식사 후에	① 예	② 아니요	③ 어제 아침식사 하지 않음
4-2. 점심식사 후에	① 예	② 아니요	③ 어제 점심식사 하지 않음
4-3. 저녁식사 후에	① 예	② 아니요	③ 어제 저녁식사 하지 않음
4-4. 잠자기 전에	① 예	② 아니요	③ 어제 잠자지 않음

☐
☐
☐
☐

5. 최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니요 (→ 6번 문항으로)

☐


5-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까? (한 가지만 선택)

☐
☐

- ① 경제적인 이유로
② 치과병의원(또는 보건소, 보건지소 등)이 너무 멀어서
③ 직장이나 학교를 비울 수 없어서
④ 거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에
⑤ 아이를 봐줄 사람이 없어서
⑥ 다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서
⑦ 치과진료를 받기가 무서워서
⑧ 기타()

기
타

88. 비해당(문항5/②: 진료를 받지 못한 적이 없음)

88. 비해당

가치 있는 건강조사, 같이 누릴 지역건강

6. 최근 1년 동안 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까? ※ 학교·사업장 구강검진, 국민건강보험공단 구강검진 포함

- ① 예 ② 아니오

☐

7. 최근 1년 동안 스케일링(치석제거)을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항3/①: 위아래 둘 다 있음)

☐

8. 비해당

8. 치주조직(잇몸)의 건강은 어느 정도라고 생각합니까?

- ① 이가 흔들린다
② 잇몸이 자주 붓는다
③ 치석이 많다
④ 잇몸에서 피가 난다
⑤ 정상이다
⑥ 비해당(문항3/①: 위아래 둘 다 있음)

☐

8. 비해당

9. (지역) 치약과 칫솔 이외에 치아의 건강을 위해 평소에 치실(floss) 혹은 치간솔을 사용합니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항3/①: 위아래 둘 다 있음)

☐

8. 비해당

10. (지역) 최근 1년 동안 치과병원을 이용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

정신건강

1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까? 시간 시간

2. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?
 - ① 대단히 많이 느낀다] (→ 2-1번 문항으로)
 - ② 많이 느끼는 편이다] (→ 3번 문항으로)
 - ③ 조금 느끼는 편이다] (→ 3번 문항으로)
 - ④ 거의 느끼지 않는다] (→ 3번 문항으로)

- ↳ 2-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?
 - ① 예 ② 아니오
 - ⑧ 비해당(문항2/③, ④: 평소 스트레스를 조금 느끼거나 거의 느끼지 않음)

3. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?
 - ① 예 ② 아니오 (→ 4번 문항으로)

- ↳ 3-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?
 - ① 예 ② 아니오
 - ⑧ 비해당(문항3/②: 2주 이상 슬프거나 절망감을 느낀 적이 없음)

4. 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까?
 - ① 예 ② 아니오 (→ 5번 문항으로)

- ↳ 4-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?
 - ① 예 ② 아니오
 - ⑧ 비해당(문항4/②: 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 없음)

- ↳ 4-2. 죽고 싶다는 생각을 했던 주된 이유는 무엇입니까?
 - ① 경제적 어려움 때문에
 - ② 이성 문제 때문에(실연, 파혼 등)
 - ③ 질병 또는 장애 때문에
 - ④ 직장 문제 때문에(실직, 미취업 등)
 - ⑤ 외로움, 고독 때문에
 - ⑥ 가정불화로 인해
 - ⑦ 진로 문제로 인해
 - ⑧ 기타()
 - ⑧ 비해당(문항4/②: 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 없음)

가치 있는 건강조사, 같이 누릴 지역건강

5. 최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 6번 문항으로)

☐

5-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항5/②: 자살 시도를 해 본 적이 없음)

☐

8. 비해당

6. 최근 1년 동안 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용으로 일상생활에 지장을 받은 적이 있습니까?

- ① 전혀 없다
② 한 달에 1번 미만
③ 한 달에 1번 정도
④ 일주일에 1번 정도
⑤ 거의 매일
⑥ 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 이용한 적이 없음

☐

7. 주위 사람들로부터 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 너무 많이 한다고 지적을 받는 편입니까?

- ① 전혀 그렇지 않다
② 거의 그렇지 않다
③ 대체로 그렇다
④ 항상 그렇다
⑤ 비해당(문항6/⑥: 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 이용한 적이 없음)

☐

8. 비해당

8. 지난 2주 동안 아래 나열되는 증상들에 얼마나 자주 시달렸습니까?

8-1. 일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
8-2. 가라앉은 느낌, 우울감 혹은 절망감	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
8-3. 잠들기 어렵거나 자꾸 깨어남, 혹은 너무 많이 잠	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
8-4. 피곤함, 기력이 저하됨	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
8-5. 식욕 저하 혹은 과식	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
8-6. 내 자신이 나쁜 사람이라는 느낌 혹은 내 자신을 실패자라고 느끼거나, 나 때문에 나 자신이랑 내 가족이 불행하게 되었다는 느낌	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
8-7. 신문을 읽거나 TV를 볼 때 집중하기 어려움	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
8-8. 남들이 알아챌 정도로 거동이나 말이 느림 또는 반대로 너무 초조하고 안절 부절하지 못해서 평소보다 많이 돌아다니고 서성거림	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
8-9. 나는 차라리 죽는 것이 낫겠다는 등의 생각 혹은 어떤 면에서건 당신 스스로에게 상처를 주는 생각들	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

가치 있는 건강조사, 같이 누릴 지역건강



9. 최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷을 통해 상담을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

10. (지역) 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 가장 큰 원인은 무엇입니까?

- ① 경제적인 문제
② 질병문제
③ 가족문제
④ 진로문제
⑤ 대인관계(친척, 동료, 친구, 이웃 등)
⑥ 기타()
⑧ 비해당(문항3/②: 2주 이상 슬프거나 절망감을 느낀 적이 없음)

☐

기
타

8. 비해당

11. (지역) 최근 1년 동안 도박으로 인하여 일상생활에 지장을 받은 적이 있습니까?

※도박: 카지노, 경마, 경륜, 경정, 복권, 스포츠도박, 소싸움, 사설 도박, 온라인 도박, 친목목적 도박

- ① 도박을 한 적이 없음
② 전혀 없다
③ 한 달에 1번 미만
④ 한 달에 1번 정도
⑤ 일주일에 1번 정도
⑥ 거의 매일

☐

12. (지역) 본인이 거주하고 있는 지역에 정신건강증진센터가 있다는 것을 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

예방접종 및 검진

1. 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?

① 예

② 아니오 (→ 2번 문항으로)

☐

1-1. 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 몇 번 받았습니까?

☐ 회☐ 회

8. 비해당

8. 비해당(문항1/②): 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 없음)

※ 여러 번 발생했다면, 각각의 예방접종에 대해 1-2~1-3번 문항을 반복합니다.



1-2. 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 시기는 언제입니까?

20 년 월

88 88. 비해당(문항1/②): 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 없음)



1-3. 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 장소는 어디입니까?

① 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소

② 병의원

③ 기타()

④ 비해당(문항1/②): 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 없음)

예방접종 응답표

1회	2회	3회
20 년 월 88 88. 비해당	20 년 월 88 88. 비해당	20 년 월 88 88. 비해당
☐ 기 타 8. 비해당	☐ 기 타 8. 비해당	☐ 기 타 8. 비해당

2. 최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으나 건강상태를 알아보기 위해 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 있습니까?

① 예

② 아니오

☐

3. 최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으나 건강상태를 알아보기 위해 암 검진을 받은 적이 있습니까?

① 예

② 아니오

☐

3-1. (지역) 암 검진을 받지 않은 이유는 무엇입니까?

① 검진비용이 비싸서

② 검진을 받을 시간이 없어서

③ 검진기관 위치를 몰라서

④ 필요성을 느끼지 못해서

⑤ 기타()

⑥ 비해당(문항3/①): 암 검진을 받은 적이 있음)

☐

8. 비해당

가치 있는 건강조사, 같이 누릴 지역건강

이환

1. 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까?

① 예 → ☐ ☐ 일

② 아니오

☐ ☐ ☐ 일

2 00. 아니오

※ 지금부터 우리나라 국민들이 많이 걸리는 질병에 대해서 질문하도록 하겠습니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용을 응답해 주시기 바랍니다.

【고혈압】

1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?

① 예

② 아니오 (→ 2번 문항으로)

☐☐

8. 비해당

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예

② 아니오 (→ 1-2번 문항으로)

③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1-1-1. 혈압을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

1-1-1-1. 혈압약 복용	① 예 → 한 달에 ☐ ☐ 일 ② 아니오
1-1-1-2. 비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오

☐ 한 달에 ☐ ☐ 일

2 00. 아니오

8 88. 비해당

☐ 8. 비해당

8 88 8. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항1-1/②: 현재 치료를 받지 않음)

1-2. 고혈압을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외).

1-2-1. 병의원	① 예 ② 아니오
1-2-2. 한방병원	① 예 ② 아니오
1-2-3. 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소	① 예 ② 아니오

☐ 8. 비해당☐ 8. 비해당☐ 8. 비해당

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2. 본인의 혈압수치를 알고 있습니까?

① 예

② 아니오

☐

【당뇨병】

1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?

① 예

② 아니오 (→ 2번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 1-2번 문항으로)
⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1

8. 비혜당

1-1-1. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모든 응답해 주십시오.

1-1-1-1. 인슐린 주사	① 예 ② 아니오
1-1-1-2. 당뇨병약(경구 혈당강하제)	① 예 ② 아니오
1-1-1-3. 비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항1-1/②: 현재 치료를 받지 않음)

1

8. 비해당

1

8 비혜당

1

8. 비혜당

1-2. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까?
모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한
진료상담은 제외).

1-2-1. 병의원	① 예 ② 아니오
1-2-2. 한방병의원	① 예 ② 아니오
1-2-3. 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1

8. 비해당

1

8. 비혜당

1

8 비혜당

1-3. 당화혈색소를 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 1-4번 문항으로)
⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1-3-1. 최근 1년 동안 당화혈색소 검사를 몇 번이나 했습니까?

- ① 4회 이상
② 3회
③ 2회
④ 1회
⑤ 측정 안함

⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항1-3/② 당화혈색소를 모름)

1

8. 비혜당

1

8. 비해당

1-4. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈검사(안저 검사)를 받은 적이 있습니까?

- [illegible]

1

8. 비해당

1-5. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 스틱
검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까?

- [illegible]

--	--

8. 비해당

2. 본인의 혈당수치를 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

--	--

【심근경색증】

1. 다음의 질문들은 귀하의 심근경색증(심장발작)에 대한 지식을 알아보기 위한 것입니다. 맞다고 생각하면 “예”, 아니라고 생각하면 “아니오”를 선택해 주십시오.

1-1. 갑자기 턱, 목 또는 등쪽에 통증이나 답답함이 있다	① 예 ② 아니오	☐
1-2. 갑자기 힘이 없으며, 어지럽고, 울렁거리거나 식은땀이 난다	① 예 ② 아니오	☐
1-3. 갑자기 가슴에 통증이나 압박감 또는 짓누르는 느낌이 있다	① 예 ② 아니오	☐
1-4. 갑자기 팔 또는 어깨에 통증이나 불편감이 있다	① 예 ② 아니오	☐
1-5. 갑자기 숨이 찬다	① 예 ② 아니오	☐

2. 만약 누군가가 심근경색증의 증상을 보인다면, 가장 먼저 무엇을 해야 한다고 생각합니까?

- ① 병원(한방병원 제외)으로 데려간다
 ② 한방병원으로 데려간다
 ③ 119에 전화한다(구급차를 부른다)
 ④ 가족에게 연락한다
 ⑤ 기타()

☐기
타

【관절염】

1. 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「백내장」 1번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?
 ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

1-2. 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외).

1-2-1. 병의원	① 예 ② 아니오
1-2-2. 한방병의원	① 예 ② 아니오
1-2-3. 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

【백내장】

1. 의사에게 백내장을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「지역-고혈압」 1번 문항으로)

☐

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?
 ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

가치 있는 건강조사, 같이 누릴 지역건강

【지역선택문항-고혈압】

1. (지역) 최근 1년 동안 혈압을 몇 번이나 잴습니까?

- ① 하루에
- ② 일주일에
- ③ 한 달에
- ④ 일 년에
- ⑤ 전혀 안함

→ □□□회

□ □ □ □ 회
5 000. 전혀 안함

【지역선택문항-당뇨병】

1. (지역) 최근 1년 동안 혈당을 몇 번이나 잴습니까?

- ① 하루에
- ② 일주일에
- ③ 한 달에
- ④ 일 년에
- ⑤ 전혀 안함

→ □□□회

□ □ □ □ 회
5 000. 전혀 안함

의료이용

1. 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 미포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까?

① 예

② 아니오 (➡ 「사고 및 중독(낙상)」 1번 문항으로)

☐


1-1. 그런 적이 있다면, 다음 중 어떤 이유로 본인이 원하는 때 병의원에 가지 못했습니까?
(한 가지만 선택)

① 경제적인 이유로

② 병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서

③ 교통편이 불편해서

④ 내가 갈 수 있는 시간에 병의원 등이 문을 열지 않아서

⑤ 병의원 등에서 오래 기다리기 싫어서

⑥ 증상이 가벼워서

⑦ 기타()

⑧ 비해당(문항1/②: 병의원(치과 미포함)에 가지 못한 적이 없음)

☐

기
타

8. 비해당

가치 있는 건강조사, 같이 누릴 지역건강

사고 및 중독(낙상)

1. 최근 1년 동안 넘어진 적이 있습니까?

※ 미끄러짐, 헛디딤, 주저앉음, 떨어짐 포함

① 예 → ☐ 회

② 아니오 (→ 4번 문항으로)

☐ ☐ 회

2 0. 아니오



1-1. 넘어짐으로 인해 응급실이나 병원에서 치료를 받았습니까?

① 예

② 아니오

☐

8. 비해당

⑧ 비해당(문항1/②: 최근 1년 동안 넘어진 적이 없음)

※ 여러 번 발생했다면, 각각의 낙상에 대해 2~3번 문항을 반복합니다.

2. 넘어진 장소는 어디입니까?

집안	① 화장실/욕조
	② 방
	③ 부엌
	④ 거실/마루
	⑤ 계단
	⑥ 기타 집안 지역(장소)
집밖	⑦ 농어업시설
	⑧ 운송지역
	⑨ 스포츠 또는 운동장소
	⑩ 상업 또는 서비스 시설
	⑪ 학교 및 공공행정구역
	⑫ 산업 및 건설지역
	⑬ 자연(산, 들, 강, 바다)
	⑭ 기타 집밖 지역(장소)

3. 넘어진 이유는 무엇이었습니다?

- ① 바닥이 미끄러워서
- ② 사람이나 사물에 부딪혀서
- ③ 보도나 문의 턱에 걸려
- ④ 경사가 급해서
- ⑤ 조명이 어두워서
- ⑥ 다리를 접질려서(발을 헛디뎠서)
- ⑦ 갑자기 어지러워서(갑자기 주저앉아서)
- ⑧ 기타()

4. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까?

※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외

① 예 → ☐ 회

② 아니오

☐ ☐ 회

2 0. 아니오

낙상 응답표

1회	2회	3회	4회	5회
☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
☐	☐	☐	☐	☐
기 타	기 타	기 타	기 타	기 타

활동제한 및 삶의 질

※ 다음은 귀하의 삶에 대해 얼마나 만족하고 있는지를 알아보기 위한 질문입니다. 매우 만족하는 경우를 '10'으로, 매우 불만족하는 경우를 '1'로 생각하시고 다음 질문에 응답해 주십시오.

1. 모든 사항을 고려할 때, 최근 귀하의 삶에 (대체로) 어느 정도 만족합니까?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

매우 불만족 매우 만족

※ 지금부터 질병이나 손상 등으로 인해 몸이 아팠거나, 결석이나 결근 등을 해야 했던 내용에 대해서 질문하겠습니다. 질문을 잘 듣고 응답해 주십시오.

2. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 적이 있습니까?

① 예 → 일 ② 아니오

 일
2 00. 아니오

3. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 했던 적이 있습니까?

※ 농사/장사를 못나간 경우 결근에 해당

① 예 → 일 ② 아니오 ③ 학교 또는 직장을 다니고 있지 않음

 일
2 00. 아니오
3 88. 학교, 직장 안다님

※ 아래의 각 문항에서 오늘 귀하의 건강상태를 가장 잘 설명해주는 하나의 항목에 표시해 주십시오.

4-1. 운동능력

- ① 나는 걷는데 지장이 없다
② 나는 걷는데 다소 지장이 있다
③ 나는 종일 누워 있어야 한다

4-2. 자기관리

- ① 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다
② 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다
③ 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다

4-3. 일상 활동(예: 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가활동)

- ① 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다
② 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다
③ 나는 일상 활동을 할 수가 없다

4-4. 통증/불편

- ① 나는 통증이나 불편감이 없다
② 나는 다소 통증이나 불편감이 있다
③ 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다

4-5. 불안/우울

- ① 나는 불안하거나 우울하지 않다
② 나는 다소 불안하거나 우울하다
③ 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다

가치 있는 건강조사, 같이 누릴 지역건강

보건기관 이용

1. 최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

2. (지역) 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소에서 다음 질병의 예방 및 관리를 위한 홍보(교육 포함)를 보거나 들어본 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오.

2-1. 고혈압	① 예	② 아니오
2-2. 당뇨병	① 예	② 아니오
2-3. 관절염	① 예	② 아니오
2-4. 아토피·천식	① 예	② 아니오
2-5. 치매	① 예	② 아니오

☐
☐
☐
☐
☐

사회 물리적 환경

1. 다음 문항에 대한 생각은 어떻습니까? 모두 응답해 주십시오.

1-1. 우리 동네 사람들은 서로 믿고 신뢰할 수 있다	① 예 ② 아니오
1-2. 이웃에 경조사가 있을 때, 주민 사이에 서로 도움을 주고받는 전통이 있다	① 예 ② 아니오
1-3. 우리 동네의 전반적 안전수준(자연재해, 교통사고, 농작업 사고, 범죄)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오
1-4. 우리 동네의 자연환경(공기질, 수질 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오
1-5. 우리 동네의 생활환경(전기, 상하수도, 쓰레기 수거, 스포츠시설 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오
1-6. 우리 동네의 대중교통 여건(버스, 택시, 지하철, 기차 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오
1-7. 우리 동네의 의료서비스 여건(보건소, 병원, 한방병원, 약국 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

2. 가장 많이 접촉하는 친척(가족포함)과 얼마나 자주 보거나 연락합니까?

- ① 한 달에 1번 미만
 ② 한 달에 1번
 ③ 한 달에 2~3번
 ④ 일주일에 1번
 ⑤ 일주일에 2~3번
 ⑥ 일주일에 4번 이상

☐

가치 있는 건강조사, 같이 누릴 지역건강

3. 가장 많이 접촉하는 이웃과 얼마나 자주 보거나 연락합니까?

- ① 한 달에 1번 미만
 ② 한 달에 1번
 ③ 한 달에 2~3번
 ④ 일주일에 1번
 ⑤ 일주일에 2~3번
 ⑥ 일주일에 4번 이상

☐

4. 가장 많이 접촉하는 친구(이웃제외)와 얼마나 자주 보거나 연락합니까?

- ① 한 달에 1번 미만
 ② 한 달에 1번
 ③ 한 달에 2~3번
 ④ 일주일에 1번
 ⑤ 일주일에 2~3번
 ⑥ 일주일에 4번 이상

☐

5. 다음 활동에 한 달에 한 번(1회) 이상 정기적으로 참여합니까?

5-1. 종교활동	① 예 ② 아니오
5-2. 친목활동(계모임, 동창회, 노인정, 향우회, 종친회 등)	① 예 ② 아니오
5-3. 여가/레저 활동	① 예 ② 아니오
5-4. 자선단체 활동	① 예 ② 아니오

☐☐☐☐

6. 현재 살고 있는 광역 시·도에서 얼마나 오래 살았습니까?

- ① 5년 미만
 ② 5~10년 미만
 ③ 10~15년 미만
 ④ 15~20년 미만
 ⑤ 20년 이상

☐

7. 현재 살고 있는 시·군·구에서 얼마나 오래 살았습니까?

- ① 5년 미만
 ② 5~10년 미만
 ③ 10~15년 미만
 ④ 15~20년 미만
 ⑤ 20년 이상

☐

가치 있는 건강조사, 같이 누릴 지역건강

(지역선택문항) 심폐소생술

1. (지역) 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「개인위생」 1번 문항으로)

☐


1-1. (지역) 심폐소생술 교육을 받은 경험이 있습니까?

- ① 최근 2년간 교육을 받은 적이 있다
② 과거에는 있었지만, 최근 2년간 없다
③ 교육을 받은 적이 없다
④ 비해당(문항1/②: 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음)

☐

8. 비해당

개인위생

1. 손 씻기가 감염병(전염병) 예방에 어느 정도 도움이 된다고 생각합니까?

- ① 매우 도움이 된다
 ② 도움이 된다
 ③ 도움이 되지 않는다
 ④ 전혀 도움이 되지 않는다

☐

2. 최근 1주일 동안 식사하기 전 얼마나 자주 손을 씻었습니까?

- ① 항상 씻었다
 ② 자주 씻었다
 ③ 가끔 씻었다
 ④ 거의 씻지 않았다

☐

3. 최근 1주일 동안 화장실 다녀온 후 얼마나 자주 손을 씻었습니까?

- ① 항상 씻었다
 ② 자주 씻었다
 ③ 가끔 씻었다
 ④ 거의 씻지 않았다

☐

4. 최근 1주일 동안 외출 후 집에 돌아왔을 때 얼마나 자주 손을 씻었습니까?

- ① 항상 씻었다
 ② 자주 씻었다
 ③ 가끔 씻었다
 ④ 거의 씻지 않았다

☐

5. 평소 손을 씻을 때, 비누나 손 세정제를 얼마나 자주 사용합니까?

- ① 항상 사용한다
 ② 자주 사용한다
 ③ 가끔 사용한다
 ④ 거의 사용하지 않는다
 ⑤ 전혀 사용하지 않는다

☐

6. 최근 1년 동안 올바른 손 씻기에 관한 교육이나 이와 관련한 홍보물을 본 경험이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

가치 있는 건강조사, 같이 누릴 지역건강

교육 및 경제활동

1. 귀하께서는 최근 1주일 동안 수입을 목적으로 1시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급 가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태도 일을 하신 경우에 포함 됩니다.

- ① 예 ② 아니오

2. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해주십시오.
(예를 들면, 은행에서 출납 일을 함, 건설현장에서 교통정리를 함, 벽지 도배, 내과질환진료 및 치료 등)

일의 종류	
직 업 분 류	① 관리자 ② 전문가 및 관련종사자
	③ 사무종사자 ④ 서비스종사자
	⑤ 판매종사자 ⑥ 농·림·어업종사자
	⑦ 기능원 및 관련기능종사자 ⑧ 장치, 기계조작 및 조립종사자
	⑨ 단순노무종사자 ⑩ 군인(직업군인)
	⑪ 학생/재수생 ⑫ 주부 ⑬ 무직

☐

일의
종류

☐


2-1. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?
(※ 문항 2번 응답보기 ①~⑩에 응답하신 분만 응답해 주십시오.)

- ① 고용주 및 자영업자(내 사업을 한다)
② 임금근로자(타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다)
③ 무급가족종사자(가족, 친척의 일을 돈을 받지 않고 돕는다)
④ 비해당(문항2/⑪, ⑫, ⑬: 학생/재수생, 주부, 무직)

☐

8. 비해당

3. 귀하는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

- ① 무학 (⇒ 4번 문항으로) ② 서당/한학 (⇒ 4번 문항으로) ③ 초등학교
④ 중학교 ⑤ 고등학교 ⑥ 2년/3년제 대학
⑦ 4년제 대학 ⑧ 대학원 이상

☐


3-1. 귀하는 그 학교를 졸업하셨습니다가? 졸업여부를 말씀해 주십시오.

- ① 졸업 ② 수료 ③ 중퇴 ④ 재학/휴학 중
⑤ 비해당(문항3/①, ②: 무학, 서당/한학)

☐


8. 비해당

4. 귀하의 현재 혼인상태(사실혼 포함)는 다음 중 무엇에 해당합니까?

- ① 배우자 있음(같이 살고 있음)
② 이혼
③ 사별
④ 별거
⑤ 미혼

☐

Memo




지역사회건강조사
Community Health Survey



지역사회건강조사
Community Health Survey

제 4 부 부록



Ⅱ. 가구조사표

CHS

Community Health Survey

다음은 2017년 지역사회건강조사 가구조사표(울산권역)입니다. ➔

2017년 지역사회건강조사 가구명부

[illegible]

가구현황

주소	(표본지점 주소)		총 방문횟수 ()회
	(이하 상세주소)	집전화 ☎() -	
방문일	1차	2017. . .	
	2차	2017. . .	
	3차	2017. . .	
기 구 구 분	☐ 전표본가구 ☐ 예비표본가구 (전표본가구 번호: _____)		가구대체 발생시 본표본 가구번호를 기입합니다.
성인거주여부	☐ 성인거주 ☐ 성인미거주 ☐ 모름		성인기준: 주민등록상 생일로 1998. 7. 31 이전 출생자
조사적합여부	☐ 적합 ➡ 가구원정보 기입		
	☐ 부적합 ➡ 조사종료 & 가구대체 (사유: _____)		

가구원현황

‘가구조사’ 기입란은 가구조사를 한 대표 가구원 1인만 ☒ 하십시오.

가구원 번호	가구원 성명	성별	주민등록상 생년월일	가구주와의 관계	휴대전화	조사수행 여부	미수행 사유	가구 조사
01		남 / 여			- -	Y / N		☐
02		남 / 여			- -	Y / N		☐
03		남 / 여			- -	Y / N		☐
04		남 / 여			- -	Y / N		☐
05		남 / 여			- -	Y / N		☐
06		남 / 여			- -	Y / N		☐
07		남 / 여			- -	Y / N		☐
08		남 / 여			- -	Y / N		☐
09		남 / 여			- -	Y / N		☐
10		남 / 여			- -	Y / N		☐
11		남 / 여			- -	Y / N		☐
12		남 / 여			- -	Y / N		☐

조사원 성명:

가구와료

[illegible]

가구조사

※ 가구대표 1명만 가구조사에 참여해 주시기 바랍니다.

1. 세대 유형은 다음 중 무엇에 해당합니까?

1 세대	☐ 1. 1인 가구	☐ 2. 응답자+미혼형제자매	☐ 7. 기타: 상기를 제외한 모든 1세대 가구
	☐ 3. 부부(응답자+배우자)	☐ 4. 부부+기타 친인척	
	☐ 5. 부부+미혼형제자매	☐ 6. 응답자+기타 친인척	
2 세대	☐ 8. 부부+미혼자녀	☐ 9. 부부+양친	☐ 10. 조부모+미혼 손자녀
	☐ 11. 편부+미혼자녀	☐ 12. 부부+편부/편모	☐ 13. 편조부/편조모+미혼 손자녀
	☐ 14. 편모+미혼자녀	☐ 15. 부부+자녀+부부의 형제 또는 자매	☐ 16. 기타: 상기를 제외한 모든 2세대 가구
3 세대	☐ 17. 부부+미혼자녀+양친		
	☐ 18. 부부+미혼자녀+편부/편모		
	☐ 19. 기타 상기를 제외한 모든 3세대 이상 가구		

2. 귀 가구는 현재 기초생활 수급자(구. 생활보호대상자 혹은 영세민)입니까?

- ① 그렇다
② 지금은 아니지만, 과거에 수급자였던 적이 있다
③ 아니다

3. 임금, 부동산 소득, 연금, 이자, 정부 보조금, 친척이나 자녀들의 용돈 등 모든 수입을 합쳐 최근 1년 동안 가구의 월 평균 소득은 대략 얼마입니까?

- ① 50만원 미만
- ② 50-100만원 미만
- ③ 100-200만원 미만
- ④ 200-300만원 미만
- ⑤ 300-400만원 미만
- ⑥ 400-500만원 미만
- ⑦ 500-600만원 미만
- ⑧ 600만원 이상

4. 귀 가구는 현재 의사로부터 진단받은 치매환자와 함께 거주하고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

5. 다음 중 최근 1년 동안 귀하의 식생활 행편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?

- ① 우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다
- ② 우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다
- ③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다
- ④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다

제 4 부 부록



Ⅲ. 지표정의

지표정의

1. 건강행태

가. 흡연

(1) 현재흡연율

지표정의		평생 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 파움” 또는 “가끔 파움”)의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 현재 담배를 파웁니까? ① 매일 파웁 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비 입니까? □□□개비 ② 가끔 파웁 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 파웠으나 현재 파우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 파울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비 입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? □□년 □□개월 ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상
산출식	분자	평생 5갑(100개비) 이상 파운 사람 중에서 현재흡연자(“매일 파웁” 또는 “가끔 파웁”)의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 남자 현재흡연율

지표정의		평생 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 남자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오 2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ② 가끔 피움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? □□년 □□개월 ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상
산출식	분자	평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수×100
	분모	남자 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 매일흡연자의 하루 평균 흡연량

지표정의		평생 담배 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 매일 흡연하는 사람의 하루 평균 흡연량
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비 입니까? □□□개비 ② 가끔 피움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비 입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? □□년 □□개월 ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상
산출식	분자	하루 평균 흡연개비수의 총 합
	분모	평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일 흡연자 수
단위		개비
조사주기		1년

(4) 현재흡연자의 금연시도율

지표정의		현재흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ② 가끔 피움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? □□년 □□개월 ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상
		3. 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까? ① 최근 1년간 금연한 적이 있다. ② 과거에는 있었지만, 최근 1년간 없다 ③ 금연한 적이 없다
산출식	분자	최근 1년 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 수×100
	분모	현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률

지표정의		현재흡연자 중 1개월 내에 금연할 계획이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오 2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 파움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비 입니까? □□□개비 ② 가끔 파움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비 입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? □□년 □□개월 ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상 3. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까? ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다 ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다 ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다 ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다
	산출식	분자 1개월 내 금연계획이 있는 사람의 수×100 분모 현재흡연자(“매일 파움” 또는 “가끔 파움”) 수
	단위	%
조사주기		1년

(6) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률

지표정의		최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적 있는 사람의 수×100
	분모	현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수
단위		%
조사주기		1년

(7) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률

지표정의		최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)
산출식	분자	최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수×100
	분모	일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수
단위		%
조사주기		1년

나. 음주

(1) 월간음주율

지표정의		최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 음주한 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2-4번 ④ 일주일에 2-3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상
산출식	분자	최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 연간음주자의 고위험음주율

지표정의		최근 1년 동안 음주한 사람 중에서 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2~4번 정도 ④ 일주일에 2~3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상 1-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다) ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
산출식	분자	최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔)이상을 주 2회 이상 마신 적이 있는 사람의 수×100
	분모	최근 1년 동안 음주한 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 연간 음주폐해 경험률

지표정의		최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전사고 등을 경험한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 연간 절주 또는 금주시도율

지표정의		최근 1년 동안 절주나 금주를 시도한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까?</u> ① 예 ② 아니오
		1-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2~4번 정도 ④ 일주일에 2~3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상
		1-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다) ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
		2. <u>최근 1년 동안 절주(음주량을 줄임)나 금주를 시도한 적이 있습니까?</u> ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 절주나 금주를 시도한 적이 있는 사람의 수x100
	분모	최근 1년 동안 음주한 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

다. 안전의식

(1) 운전자석 안전벨트 착용률

지표정의		자동차 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항	1. 자동차를 운전을 합니까? ① 예 ② 아니오	
	1-1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까? ① 전혀 매지 않는다 ② 거의 매지 않는 편이다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 맨다	
산출식	분자	자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	자동차 운전자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률

지표정의		승용차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항	1. 다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 맵니까? ① 앞좌석에 타지 않는다 ② 전혀 매지 않는다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 맨다	
산출식	분자	다른 사람이 운전하는 승용차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 ×100
	분모	동승차량 앞좌석 탑승자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률

지표정의		승용차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항		1. 다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 맵니까? ① 뒷좌석에 타지 않는다 ② 전혀 매지 않는다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 맨다
산출식	분자	다른 사람이 운전하는 승용차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	동승차량 뒷좌석 탑승자 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 연간 음주음전 경험률(자동차 또는 오토바이)

지표정의		최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 분율
관련문항		1. 자동차를 운전을 합니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 2. 오토바이를 운전을 합니까? ① 예 ② 아니오 2-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 수×100
	분모	자동차 또는 오토바이 운전자 수
단위		%
조사주기		1년

라. 운동 및 신체활동

(1) 격렬한 신체활동 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?</u>(※격렬한(고강도) 신체활동: 달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업활동 및 체육활동) ☐일
		1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 시간 분
산출식	분자	최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 중등도 신체활동 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?</u>(단, 걷기는 제외합니다)(※중등도(중강도) 신체활동: 천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업활동 및 체육활동) ☐일
		1-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 시간 분
산출식	분자	최근 1주일 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 중등도 이상 신체활동 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 또는 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(※격렬한(고강도) 신체활동: 달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동) □일
		1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 □□시간 □□분
		2. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다)(※중등도(중강도) 신체활동: 천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업활동 및 체육활동) □일
		2-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 □□시간 □□분
산출식	분자	최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 걷기 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까? ※출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오. □일
		1-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까? 하루에 □□시간 □□분
산출식	분자	최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

마. 식생활

(1) 아침식사 빈도

지표정의		최근 1주일 동안 아침식사 빈도
관련문항		1. <u>최근 1주일 동안 아침식사를 한 날은 며칠입니까?</u> □일
산출식	분자	최근 1주일 동안 아침식사한 날
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 저염선회율

지표정의		평소 식습관, 조리음식 등에서 저염 선호하는 사람의 분율(Type I : 3문항 중 한 가지만 선택한 경우) 평소 식습관, 조리음식 등에서 저염 선호하는 사람의 분율(Type II : 3문항 중 두 가지를 선택한 경우) 평소 식습관, 조리음식 등에서 저염 선호하는 사람의 분율(Type III : 3문항 중 세 가지 모두를 선택한 경우)
관련문항		1. 평상시 음식을 먹을 때, 다음 중 본인은 어디에 해당합니까? ① 아주 짜게 먹는다 ② 약간 짜게 먹는다 ③ 보통으로 먹는다 ④ 약간 싱겁게 먹는다 ⑤ 아주 싱겁게 먹는다 2. 식탁이나 상에 차려진 음식을 먹을 때, 소금이나 간장을 더 넣어 먹습니까? ① 항상 더 넣는다 ② 자주 더 넣는다 ③ 거의 더 넣지 않는다 ④ 전혀 더 넣지 않는다 3. 전, 부침, 튀김을 먹을 때, 간장에 찍어 먹습니까? ① 항상 찍어 먹는다 ② 가끔 찍어 먹는다 ③ 찍어 먹지 않는다
산출식	분자	평소 음식을 먹을 때 “약간 싱겁게 먹는다” 또는 “아주 싱겁게 먹는다”로 응답한 사람의 수 혹은, 조리된 음식을 먹을 때 소금이나 간장을 “전혀 더 넣지 않는다”에 응답한 사람의 수 혹은, 전, 부침, 튀김 등을 먹을 때 간장에 “찍어 먹지 않는다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 영양표시 활용률

지표정의		영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. ‘영양표시’를 알고 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-1. 가공식품을 사거나 고를 때 ‘영양표시’를 읽습니까? ① 예 ② 아니오
		1-2. 영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고르는데 영향을 미칩니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수×100
	분모	가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

바. 비만 및 체중조절

(1) 비만을

지표정의	체질량지수
관련문항	1. 현재 본인의 키는 얼마입니까? □□□.□cm 2. 현재 본인의 몸무게는 얼마입니까? □□□.□kg
산출식	분자 체질량지수(kg/m²)가 25 이상인 사람의 수×100 - 저체중 = BMI<18.5 인 사람의 수×100 - 정상 = 18.5≤BMI<25 인 사람의 수×100 - 비만(비만인구율) = BMI≥25 인 사람의 수×100 분모 조사대상 응답자 수
단위	%
조사주기	1년

(2) 주관적 비만인지율

지표정의	주관적으로 “약간 비만” 또는 “매우 비만”이라고 생각하는 사람의 분율
관련문항	1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까? ① 매우 마른 편임 ② 약간 마른 편임 ③ 보통임 ④ 약간 비만임 ⑤ 매우 비만임
산출식	분자 “약간 비만임” 또는 “매우 비만임”에 응답한 사람의 수×100 분모 조사대상 응답자 수
단위	%
조사주기	1년

(3) 연간 체중조절 시도율

지표정의	최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 분율
관련문항	1. 최근 1년 동안 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까? ① 몸무게를 줄이려고 노력했다 ② 몸무게를 유지하려고 노력했다 ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다 ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다
산출식	분자 최근 1년 동안 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 했던 사람의 수×100 분모 조사대상 응답자 수
단위	%
조사주기	1년

사. 구강건강

(1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

지표정의		주관적으로 구강건강이 나쁘다고 인식하는 사람의 분율
관련문항		1. 스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각하십니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨
산출식	분자	“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 저작불편호소율(65세 이상)

지표정의		현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 65세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까? (※틀니를 사용하는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오) ① 매우 불편하다 ② 불편하다 ③ 그저 그렇다 ④ 별로 불편하지 않다 ⑤ 전혀 불편하지 않다
산출식	분자	“매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	65세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 어제 아침식사 후 칫솔질 실천율

지표정의		아침식사 후 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. 어제 하루 동안 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? 아침 식사 후에 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 아침식사 하지 않음
산출식	분자	아침식사 후 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	어제 하루 동안 아침식사 한 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율

지표정의		점심식사 후 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. <u>어제 하루 동안</u> 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? 점심 식사 후에 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 점심식사 하지 않음
산출식	분자	점심식사 후 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	어제 하루 동안 점심식사 한 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 어제 저녁식사 후 칫솔질 실천율

지표정의		저녁식사 후 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. <u>어제 하루 동안</u> 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? 저녁 식사 후 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 저녁식사 하지 않음
산출식	분자	저녁식사 후 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	어제 하루 동안 저녁식사 한 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(6) 어제 잠자기 전 칫솔질 실천율

지표정의		잠자기 전 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. <u>어제 하루 동안</u> 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? 잠자기 전에 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 잠자지 않음
산출식	분자	잠자기 전 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	어제 하루 동안 잠을 잔 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(7) 연간 구강검진 수진율

지표정의		최근 1년 동안 치료목적이 아닌 순수검진 목적으로 구강검진을 받은 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까? ※학교 사업장 구강검진, 국민건강보험공단 구강검진 포함 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 구강검진을 받은 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(8) 연간 치과진료 미치료율

지표정의		최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

아. 정신건강

(1) 스트레스 인지율

지표정의		평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이” 또는 “많이” 느끼는 사람의 분율
관련문항		1. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까? ① 대단히 많이 느낀다 ② 많이 느끼는 편이다 ③ 조금 느끼는 편이다 ④ 거의 느끼지 않는다
산출식	분자	평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수 ×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 우울감 경험률

지표정의		최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까? ① 예 ② 아니요
산출식	분자	최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

2. 예방접종 및 검진

(1) 연간 인플루엔자 예방접종률

지표정의		최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?</u> ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 건강검진 수진율

지표정의		최근 2년 동안 건강검진을 받은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으나 건강상태를 알아보기 위해 건강검진(암검진 제외) 받은 적이 있습니까?</u> ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 2년 동안 건강검진(암검진 제외)을 받은 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 암 검진율

지표정의		최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으나 건강상태를 알아보기 위해 암 검진을 받은 적이 있습니까?</u> ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

3. 이환

(1) 만성·급성질환 및 사고중독 경험률

지표정의	최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 사람의 분율	
관련문항	1. 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고, 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까? ① 예→□□일 ② 아니오	
산출식	분자	최근 2주(14일) 동안 만성, 급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위	%	
조사주기	1년	

(2) 고혈압 진단 경험률(≥30)

지표정의	의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람의 분율	
관련문항	1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	
산출식	분자	의사에게 고혈압을 진단 받은 사람의 수×100
	분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위	%	
조사주기	1년	

(3) 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)

지표정의	의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람으로 현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용한 분율	
관련문항	1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	
	1-1. 현재 치료를 받고 있습니까? ① 예 ② 아니오	
	1-2. 혈압을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모든 응답 해 주십시오. 혈압약 복용 ① 예→한 달에 □□일 ② 아니오 비약물요법 (운동, 식사요법) ① 예 ② 아니오	
산출식	분자	현재 혈압조절약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위	%	
조사주기	1년	

(4) 고혈압 관리교육 이수율(≥30)

지표정의		의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람 중 고혈압 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 2. 고혈압을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) 병의원 ① 예 ② 아니오 한방병원 ① 예 ② 아니오 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 혈압수치 인지율

지표정의		본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 분율
관련문항		1. 본인의 혈압수치를 알고 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(6) 당뇨병 진단 경험률(≥ 30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	의사에게 당뇨병을 진단 받은 사람의 수×100
	분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(7) 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥ 30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 혈당을 관리하기 위해 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구혈당강하제)를 치료 받고 있는 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-2. 현재 치료를 받고 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-3. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모든 응답해 주십시오. 인슐린 주사

(8) 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 당뇨병 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) 병의원 ① 예 ② 아니오 한방병의원 ① 예 ② 아니오 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(9) 연간 당뇨병성 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년 동안 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-2. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(10) 연간 당뇨병 신장합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥ 30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년 동안 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-2. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 $\times 100$
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(11) 혈당 수치 인지율

지표정의		본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 분율
관련문항		1. 본인의 혈당수치를 알고 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 수 $\times 100$
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(12) 관절염 진단 경험률(≥50)

지표정의		의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 50세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단 받은 사람의 수×100
	분모	50세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(13) 관절염 관리교육 이수율(≥50)

지표정의		의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 50세 이상 사람 중 관절염을 관리하는 방법에 대해 병의원 또는 한방병의원 또는 보건소에서 교육을 받은 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-2. 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) 병의원 ① 예 ② 아니오 한방병의원 ① 예 ② 아니오 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염) 관리교육을 받은 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(14) 이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험률(≥30)

지표정의		의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 30세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단 받은 사람의 수×100
	분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

4. 의료이용

(1) 연간 필요의료서비스 미치료율

지표정의		최근 1년 동안 필요한 의료서비스를 받지 못한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 본인이 병의원(치과 미포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

5. 사고 및 중독(낙상)

(1) 연간 사고중독 경험률

지표정의		최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외 ① 예 → ☐ 회 ② 아니오
산출식	분자	연간 사고 및 중독 경험자 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

6. 활동제한 및 삶의 질

(1) 양호한 주관적 건강수준 인지율

지표정의		주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”이라고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. 평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨
산출식	분자	주관적 건강수준을 “매우 좋음” 혹은 “좋음”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

7. 보건기관 이용

(1) 연간 보건기관 이용률

지표정의		최근 1년 동안 보건기관을 이용한 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

8. 개인위생

(1) 손 씻기 감염병 예방 인지율


지표정의		손 씻기가 감염병(전염병) 예방에 “매우 도움이 된다” 또는 “도움이 된다”에 응답한 사람의 분율
관련문항		1. 손 씻기가 감염병(전염병) 예방에 어느 정도 도움이 된다고 생각합니까? ① 매우 도움이 된다 ② 도움이 된다 ③ 도움이 되지 않는다 ④ 전혀 도움이 되지 않는다
산출식	분자	“매우 도움이 된다” 또는 “도움이 된다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		2년

9. 가구조사

(1) 식품 안정성 확보율

지표정의		최근 1년 동안 가구 식생활 형편을 물었을 때 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었거나 혹은 충분한 양이지만 다양하지 못한 음식을 먹은 사람의 분율
관련문항		1. 다음 중 최근 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까? ① 우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다 ② 우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다 ③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다 ④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다
산출식	분자	“우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다” 혹은 “우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다”에 응답한 가구의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

제 4 부 부록



IV. 2008-2017 산출지표

2008-2017 산출지표

1. 흡연

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
평생흡연율	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
흡연시작연령 ¹⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
현재흡연율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
매일흡연자의 하루 평균 흡연량	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
현재흡연자의 1개월 내 금연계획률	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
현재흡연자의 금연시도율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
과거흡연자의 금연기간	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 ²⁾	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 ³⁾	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○
현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률 ⁴⁾	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
연간 금연캠페인 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○
연간 금연교육 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○
현재흡연자의 금연교육 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○
금연구역 인지율	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
평생 전자담배 사용 경험률	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
현재 전자담배 사용 경험률	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
총계	8	10	10	13	8	13	11	17	11	17

2. 음주

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
평생음주율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
음주시작연령 ⁵⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간음주율	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
월간음주율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간음주자의 고위험음주율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 음주폐해 경험률	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
연간 절주 또는 금주시도율	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
총계	4	5	5	5	5	5	7	7	7	7

1) '08년 지표명: 처음 흡연경험연령

2) '08년 지표명: 가정 내 간접흡연 노출률, '10-'13년 지표명: 가정실내 간접흡연 노출률

3) '09-'14년 지표명: 직장실내 간접흡연 노출률

4) '11-'13년 지표명: 공공장소 간접흡연 노출률

3. 안전의식

산출지표	년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
운전자석 안전벨트 착용률 ⁶⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
버스 안전벨트 착용률		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이) ⁷⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 음주운전차량 동승경험률 ⁸⁾		-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 자전거 음주운전 경험률		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
총계		3	3	4	4	4	4	7	7	7	7

4. 운동 및 신체활동

산출지표	년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
격렬한 신체활동 실천율		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
중등도 신체활동 실천율		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
중등도 이상 신체활동 실천율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
걷기 실천율 ⁹⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
근력운동 실천율		-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
유연성운동 실천 빈도		-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
주중 여가시간에 앉아서 보내는 시간		-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
주말 여가시간에 앉아서 보내는 시간		-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
총계		2	4	4	8	4	8	4	8	4	8

5. 식생활

산출지표	년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
아침식사빈도 ¹⁰⁾		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
아침결식 예방인구비율		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
저염선택율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
영양표시 인지율		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
영양표시 독해율 ¹¹⁾		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
영양표시 활용률		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
총계		1	2	2	4	4	4	6	6	6	6

5) '08년 지표명: 처음 음주경험연령

6) '08-'16년 지표명: 운전 시 안전벨트 착용률

7) '08년 지표명: 연간 음주운전 경험률(자동차, 오토바이)

8) '14년 지표명: 연간 자동차 음주운전차량 동승률

9) '08년 지표명: 걷기운동 실천율

10) '11-'14년 지표명: 아침식사 섭취빈도

6. 비만 및 체중조절

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
비만율 ¹²⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
비만도 분포	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
주관적 비만인지율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 체중조절 시도율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
총계	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

7. 구강건강

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
저작불편호소율(65세 이상)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
틀니 이용 행태(50세 이상)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
주관적 틀니 필요 인지율(50세 이상)	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
어제 아침식사 후 칫솔질 실천율	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
어제 점심식사 후 칫솔질 실천율	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
어제 저녁식사 후 칫솔질 실천율	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
어제 잠자기 전 칫솔질 실천율	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
연간 구강검진 수진율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 스케일링 경험률	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 치과진료 미치료율	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
치과진료 미치료자의 미치료 이유 ¹³⁾	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
주관적 잇몸 건강 인지율	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
총계	7	8	6	10	8	10	11	13	11	13

11) '09-'13년 지표명: 가공식품 선택 시 영양표시 이용률

12) '08년 지표명: 비만인구율

13) '14년 지표명: 치과진료 미치료자의 미치료 이유

8. 정신건강

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
하루 평균 수면시간	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
스트레스 인지율 ¹⁴⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
스트레스로 인한 정신상담률	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
우울감 경험률	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
우울증상으로 인한 정신상담률	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
자살생각률	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○
자살생각으로 인한 정신상담률	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○
자살시도율	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○
자살시도로 인한 정신상담률	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○
자살생각행동 원인	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
인터넷, 게임(오락), 스마트폰일상생활지장경험빈도	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○
인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○
우울증상유병률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
우울증상 경험자의 정신문제 상담경험률 ¹⁵⁾	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
총계	4	5	5	5	5	11	5	5	5	14

9. 예방접종 및 검진

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
연간 인플루엔자 예방접종률	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
건강검진 수진율	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○
건강검진 사후 관리 상담률	-	○	○	-	○	-	○	-	○	-
건강검진 미수진 이유	-	○	○	-	○	-	○	-	○	-
암 검진율	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○
암 검진 사후 관리 상담률	-	○	○	-	○	-	○	-	○	-
암 검진 미수검 이유	-	○	○	-	○	-	○	-	○	-
연간 인플루엔자 예방접종 횟수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
계절별 인플루엔자 예방접종 경험률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
연간 인플루엔자 예방접종 장소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
총계	3	7	7	1	7	1	7	3	7	6

14) '08년 지표명: 주관적 스트레스 인지율

15) '08년 지표명: 우울장애로 인한 상담 경험률

10. 이환

산출지표	년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
[이환]											
만성·급성질환 및 사고중독 경험률 ¹⁶⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
만성·급성질환 및 사고중독 경험일수 ¹⁷⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
[고혈압]											
고혈압 진단 경험률 ¹⁸⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고혈압 현재치료를		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고혈압 진단 경험자의 치료율 ¹⁹⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고혈압 관리교육 이수율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고혈압 관리교육 장소		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
혈압수치 인지율 ²⁰⁾		-	-	-	○	-	○	○	-	○	○
[당뇨병]											
당뇨병 진단 경험률 ²¹⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 현재치료를		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 진단 경험자의 치료율 ²²⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 치료방법 ²³⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 관리교육 이수율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 관리교육 장소		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 당뇨병 안질환합병증검사(안저검사) 수진율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 당뇨병 신장합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
혈당수치 인지율 ²⁴⁾		-	-	-	○	-	○	○	-	○	○
당화혈색소 인지율		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
당화혈색소 검사 횟수		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
[이상지질혈증(고지혈증 포함)]											
이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험률 ²⁵⁾		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
이상지질혈증(고지혈증 포함) 현재치료를		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
이상지질혈증(고지혈증 포함) 약물치료를		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○

16) '08-'10년 영역: 활동제한 및 삶의 질

17) '08-'10년 영역: 활동제한 및 삶의 질

18) '08년 지표명: 고혈압 평생 의사진단 유병률, '09-'16년 지표명: 고혈압 평생 의사진단 경험률

19) '08년 지표명: 혈압조절약의 정기적 복용률 '09-'16년 지표명: 고혈압 약물치료를

20) '11-'16년 지표명: 혈압 인지율

21) '08년 지표명: 당뇨병 평생 의사진단 유병률, '09-'16년 지표명: 당뇨병 평생 의사진단 경험률

22) '08-'16년 지표명: 당뇨병 약물치료를

23) '08년 지표명: 당뇨병 관리형태(혈당관리방법)

24) '11-'16년 지표명: 혈당 인지율

25) '08년 지표명: 고지혈증 평생 의사진단 유병률, '09-'10년 지표명: 고지혈증 평생 의사진단 경험률, '11-'16년 지표명: 이상지질혈증(고지혈증 포함) 평생 의사진단 경험률

26) '08년 지표명: 골관절염 평생 의사진단 유병률, '09-'16년 지표명: 관절염 평생 의사진단 경험률

27) '08-'16년 지표명: 백내장 평생 의사진단 경험률

산출지표	년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
[뇌졸중(중풍)]											
뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
뇌졸중(중풍) 증상 대처 방법		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
[심근경색증]											
심근경색증 조기증상 인지율		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
심근경색증 증상 대처 방법		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
[관절염]											
관절염 진단 경험률 ²⁶⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
관절염 현재치료율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
관절염 관리교육 이수율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
관절염 관리교육 장소		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
[백내장]											
백내장 진단 경험률 ²⁷⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
백내장 현재치료율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
총계		21	21	21	26	24	26	28	26	28	32

11. 의료이용

산출지표	년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
연간 필요의료서비스 미치료율 ²⁸⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
필요의료서비스 미치료 이유		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
총계		1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

12. 사고 및 중독(낙상)

산출지표	년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
연간 사고중독 경험률 ²⁹⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 사고중독 건수율 ³⁰⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 낙상 경험률		-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
연간 낙상 건수율		-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
연간 낙상 치료 경험률		-	-	-	-	-	-	-	○	-	○
장소별 낙상 분포		-	-	-	○	-	○	-	-	-	○
원인별 낙상 분포		-	-	-	○	-	○	-	-	-	○
총계		2	2	2	6	2	6	2	5	2	7

28) '10년 치과포함 미치료율

29) '08년 지표명: 사고중독 발생률

13. 활동제한 및 삶의 질

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
양호한 주관적 건강수준 인지율 ³¹⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
삶의 질 지수(EQ-5D Index)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
월간 침상외병 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○
월간 침상외병 일수	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○
월간 결근결석 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○
월간 결근결석 일수	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○
행복감 지수	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
총계	6	6	6	7	6	7	2	7	2	7

14. 보건기관 이용

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
연간 보건기관 이용률	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
총계	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

15. 사회 물리적 환경

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
지역의 사회물리적 환경에 대한 긍정적 태도율	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
사회적 연결망(친척, 이웃, 친구)	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
사회활동 참여율	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
총계	-	-	-	3	-	3	-	3	-	3

30) '08년 지표명: 연간 사고중독발생 건수율

31) '09-'11년 지표명: 주관적 건강수준 인지율

16. 개인위생

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
손 씻기 감염병 예방 인지율	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○
식사 전 손 씻기 실천율	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○
화장실 다녀온 후 손 씻기 실천율	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○
외출 후 손 씻기 실천율	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○
비누, 손 세정제 사용률	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○
연간 손 씻기 교육 및 홍보 경험률	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○
총계	-	-	-	-	-	6	-	6	-	6

17. 가구조사

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
식품 안정성 확보율 ³²⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
치매환자 동거가구율	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
총계	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

32) '09-'13년 영역: 개인조사 「식생활」

참여연구진

지역 책임 교수	이 중 정	계 명 대 학 교
지역부책임교수	배 상 근	계 명 대 학 교
지역담당연구원	최 정 예	계 명 대 학 교
	최 정 인	계 명 대 학 교
	문 광 호	계 명 대 학 교
	한 효 완	계 명 대 학 교
조사관리담당관	이 은 주	울주군보건소
조사협조지원		-
지역조사원	김 정 희	울주군보건소
	김 형 미	울주군보건소
	김 형 주	울주군보건소
	이 채 빈	울주군보건소

2017년 울산광역시 울주군 지역사회 건강통계

발 행 : 2018. 3.

발 행 인 : 신 장 열 (울산광역시 울주군수)

편 집 인 : 이 중 정 (계명대학교)

발 행 처 : 기 관 명 울산광역시 울주군보건소

홈페이지 <http://health.ulju.ulsan.kr>

주 소 (44950) 울산광역시 울주군 삼남면 서향교1길 67-12

전화번호 (052) 204-2711

팩 스 (052) 204-2719

이 책은 울산광역시 울주보건소에 소유권이 있습니다. 울산광역시 울주군보건소
승인 없이 상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.