

발 간 등 록 번 호

11-1352477-000174-10

ISSN 2092-2876
통계승인번호 제 117075호


2008-2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

“11년 간 우리 지역사회 건강 기록”

지역사회 건강통계

울산광역시 울주군



Community
Health Survey



발간사



지역사회건강조사는 우리 지역의 건강한 미래를 준비하기 위한 조사로 시·군·구별 900여 명의 표본을 추출하여 건강행태, 생활습관 등을 조사하고, 수집된 자료는 지역 건강계획 수립 및 사업수행을 위한 중요한 기초자료로 활용됩니다. 그런 의미에서 2018년 울주군 지역사회 건강통계집을 발간하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.

오늘날 우리 사회는 도시화·정보화의 발달로 생활의 여유가 생기면서 건강에 관한 관심이 날로 증가해 가고 있지만, 고령화와 서구식 식생활, 운동 부족에 따른 만성질환이 지속적으로 늘어나고 있습니다.

‘질병은 만개나 있지만, 건강은 하나밖에 없다’라는 이야기가 있습니다. 건강하고 행복한 생활을 위해서는 개인 스스로의 노력이 가장 중요하겠지만, 지역의 건강통계를 기반으로 맞춤형 보건사업을 계획하고 시행하여 사전 예방적 건강증진사업을 수행함으로써 주민 여러분의 삶의 질을 향상시키는 건강 생활 중심에 보건소가 함께 하겠습니다.

이 자리를 빌려 지역사회 건강조사에 적극적으로 참여해 주신 주민 여러분들과 건강조사를 위해 수고를 아끼지 않으신 조사원, 계명대학교 이중정 책임교수님을 비롯한 관계자 여러분께 진심으로 감사를 드립니다.

아무쪼록 이 책자를 접하시는 모든 분의 건강과 행복이 가득하시길 기원드리며 발간사에 갈음합니다.

감사합니다.

2019. 3.

울산광역시 울주군보건소장 **최 우 영**

발간에 즈음하여

지역건강을 위한 지역사회건강조사가 2008년을 시작으로 2018년까지 어느덧 열한 번째 조사가 완료되었습니다. 2018년에도 울산광역시 울주군 주민들의 건강조사결과 통계집을 발간하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다.

지역사회건강조사가 매년 어렵고 힘든 문제를 당면하고 해결해 나가면서 조사의 질적인 부분에서 해를 거듭할수록 성장해 나가는 것 같습니다.

그동안 모아진 지역사회건강조사 자료들은 우리지역의 각종 보건지표를 생산하며 지역사회 주민들의 건강행태 파악 및 우리지역 보건문제의 파악과 우선 문제가 무엇인지를 도출해내는데 활용이 되어 왔습니다.

아울러 조사의 결과를 바탕으로 하여 우리 지역의 특성을 고려한 한 단계 발전된 구체적이며 체계적인 보건 문제 개선의 방향 및 계획을 선정하여, 이를 실천하기 위해 다 같이 고민하고 노력할 수 있는 기반이 되었으면 합니다.

또한 지역사회건강조사 결과가 주민들에게 더욱 홍보되어 건강에 대한 지역사회의 관심을 고취시켜 울주군이 더욱 건강하고 행복한 지역사회가 되기 위한 초석이 되기를 바랍니다.

소중한 자료의 수집을 위하여 여러 어려움에도 불구하고, 묵묵히 성공적인 조사를 함께 수행한 울산 울주군 조사원 여러분과 조사에 성실히 참여해 주신 울주군 구민 여러분께 진심 어린 감사를 드립니다.

그리고 어려운 조사에 격려를 아끼지 않으시고 아낌없는 행정적인 지원을 해주신 울주군 보건소장님 이하 사업 담당자 여러분들께 깊은 감사를 드립니다. 마지막으로 통계집이 나올 수 있도록 애써주신 계명대학교 연구진들께도 감사드립니다.



2019. 3.

계명대학교 의과대학 책임교수 이 중 정

이용자를 위하여

- ❖ 본 통계집은 2018. 8. 16. - 2018. 10. 31. 울산광역시에서 실시된 지역사회건강조사 결과를 수록한 자료입니다.
- ❖ 본 통계집에 제시된 추정치는 가중치를 적용한 결과(조율)이며, 가중치는 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율, 개인응답률, 당해 연도 모집단 성·연령별 인구 구성비를 반영하여 산출하였습니다.
- ❖ 2부 주요통계결과에서 2014-2018년 비교 가능한 지표(조율)에 대해서 당해 연도의 전체·성·연령별 그래프와 함께 울주군 및 울산광역시의 연도별 추이 그래프를 제시하였으며, 증감 현황을 기술하였습니다. 조사문항 변경내용은 제4부 부록 <2009-2018 산출지표>에서 확인하실 수 있습니다.
- ❖ 제3부 통계표에서는 당해 연도에 선정된 주요지표의 상세분석결과를 제시하였으며, 주요지표를 포함한 모든 산출지표의 통계표는 엑셀파일 형태로 지역사회건강조사 홈페이지(<http://chs.cdc.go.kr>) 자료실에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
- ❖ 본 자료 중 2008-2017년 수치는 응답의 이상치와 논리적 오류를 수정하여 산출된 결과로 기 발간된 보고서의 수치와 일부 다를 수 있습니다.
- ❖ 분석대상자 수(N)가 20명 미만인 경우 제2부 주요통계결과에서 제시하지 않았으며 제3부 통계표에서 해당 값을 하이픈(-)으로 처리하였습니다. 변동계수(또는 상대표준오차, Coefficient of Variation, CV)가 30%이상인 경우 추정치의 신뢰도가 낮다는 것을 의미하므로, 변동계수가 30% 이상인 경우에 결과해석 시 주의를 바랍니다.
- ❖ 통계표에 수록된 숫자는 소수점 두 번째 자리에서 반올림되었으며, 반올림된 수치의 총계가 일치하지 않을 수 있으나 이는 통계표의 오류가 아닙니다.
- ❖ 본 통계집 및 조사표, 지침서 등 기타 지역사회건강조사 관련 자료는 지역사회건강조사 홈페이지 「자료실」에서 다운로드 받으실 수 있으며, 2008년부터 2017년까지의 지역사회건강조사 원시자료는 홈페이지를 통한 신청 및 승인절차를 통해 제공하고 있습니다.
- ❖ 수록된 자료 및 지역사회건강조사에 관한 문의는 울주군보건소(☎052-204-2711), 계명대학교(☎053-258-7467)로 해주시기 바랍니다.

용어정의

1 통계

 지역사회건강조사
Community Health Survey

① 모집단(Population)

조사대상이 되는 집단 전체

② 표본(Sample)

모집단 중 조사를 위해 추출된 일부 집단

③ 표본오차(Sampling Error)

모집단 중 일부를 표본으로 선정하여 조사함에 따라 발생하는 오차로서 표본조사의 정확성을 나타내는 척도

표본오차의 범위는 그래프에서 오차막대로 표기(오차막대의 길이는 조사응답자수에 따른 오차 범위)

④ 비표본오차(Non-Sampling Error)

표본추출을 제외한 조사 설계, 조사 수행, 자료 집계 및 분석 과정에서 발생하는 오차로서 불명확한 조사개념, 조사문항의 객관성 결여, 조사지 구성의 논리적 오류, 면접방법, 조사원의 자질, 조사원을 감독하는 관리자의 태도, 조사대상자의 무응답, 자료 코딩 등이 비표본오차의 주요 발생 원인에 해당

⑤ 조율(Crude Rate)

총 발생건수를 전체 모집단으로 나눈 값으로, 모집단의 성·연령별 등의 인구 집단 특성을 보정하지 않은 통계치



⑥ 표준오차 (Standard Error, SE)

각 표본들의 평균이 모집단의 평균과 얼마만큼의 차이가 있는지 나타내는 값

⑦ 변동계수 (Coefficient of Variation, CV)

표준오차를 평균으로 나눈 값(표준오차/추정치×100)으로 통계치의 신뢰도를 나타내는 척도이며, 변동계수와 통계치의 신뢰도는 반비례 관계

⑧ 가중치 (Weight)

전체집단에서 개별 구성요소가 차지하는 비중이나 중요도를 수치로 나타내는 값

2 조사

지역사회건강조사
Community Health Survey

① CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

컴퓨터를 이용하여 조사 자료를 수집하는 방식으로, 조사원이 전자조사표가 설치된 노트북으로 면접조사를 수행 시, 조사현장에서 직접 자료입력, 수정, 저장 및 전송 가능

② 순환조사체계

타당도, 활용성 및 수행 가능성을 고려하여 조사항목의 조사주기를 1년, 2년, 4년으로 구분하여 조사하는 체계

③ 지표뱅크

지역사회에서 보건사업 추진 시 활용 가능한 조사문항 및 산출지표를 수집·정리한 것으로 지표별 조사문항 및 응답보기, 지표정의, 산출식, 조사주기 등 상세정보 포함

CONTENTS

발간사	
발간에 즈음하여	
이용자를 위하여	
용어정의	
2018년 울주군 주요 건강지표 요약	2
우리 지역사회의 주요 건강이슈	5

제1부 조사체계

I. 조사개요	11
1. 조사목적	12
2. 조사방법	12
3. 조사내용	12
4. 표본설계	13
5. 조사체계	14
6. 자료관리	15
7. 조사현황	16
II. 통계 추정방법	19
1. 가중치의 사용	20
2. 자료처리	21
3. 분산추정	22

제2부 주요통계결과

I. 건강행태	25
1. 흡연	26
2. 음주	32
3. 안전의식	34
4. 신체활동	38
5. 식생활	42
6. 비만 및 체중조절	46
7. 구강건강	50
8. 정신건강	54
II. 예방접종	61
1. 예방접종	62
III. 이환 및 의료이용	65
1. 주요 질환별 진단 경험률 및 관리행태	66
2. 의료이용	74
IV. 사고 및 중독	77
1. 연간 사고 및 중독 경험률	78

Community Health Survey

V. 활동제한 및 삶의 질 81

1. 양호한 주관적 건강수준 인지율 82

VI. 개인위생 85

1. 기침예절 실천율 86

VII. 여성건강 89

1. 출산 경험률 90

2. 최초 출산연령 90

제3부 통계표

I. 통계표 95

제4부 부록

I. 개인조사표 157

II. 가구조사표 193

III. 지표정의 199

IV. 2008-2018 산출지표 231

참여연구진 243

CONTENTS

〈표목차〉

〈표 1〉 2015-2018년 지역사회건강조사 주요지표 결과	2
〈표 2〉 2018년 지역사회건강조사 주요지표 결과	4
〈표 3〉 2018년 전국 시·군·구별 표준화율과 읍·면·동 표준화율의 비교	5
〈표 4〉 2018년 전국공통 조사항목	13
〈표 5〉 2018년 울산광역시 지역선택 조사항목	13
〈표 6〉 동·읍·면별 표본지점 분포	14
〈표 7〉 조사현황	16
〈표 8〉 가구당 조사인원 수	16
〈표 9〉 2018년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성	17
〈표 10〉 2018년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성	18
〈표 11〉 가구가중치 산출 예	20
〈표 12〉 개인가중치 산출 예	21
〈표 13〉 보장가중치 산출 예	21
〈표 14〉 교육수준분류	21
〈표 15〉 직업분류	22

Community Health Survey

〈그림목차〉

〈그림 1〉 2018년 주요지표 결과 비교 - 긍정적 지표 6	〈그림 32〉 저염선호율 45
〈그림 2〉 2018년 주요지표 결과 비교 - 부정적 지표 7	〈그림 33〉 저염식 실천 노력 경험률 45
〈그림 3〉 황금다이아몬드를 이용한 보건사업 우선순위 8	〈그림 34〉 연간 영양교육 및 상담수혜율 45
〈그림 4〉 표본선정과정 14	〈그림 35〉 비만을(자기보고) 47
〈그림 5〉 수행체계 14	〈그림 35〉 비만을(신체계측) 47
〈그림 6〉 수행과정 15	〈그림 37〉 주관적 비만인지를 47
〈그림 7〉 전화점검 절차 15	〈그림 38〉 연간 체중조절 시도율 49
〈그림 8〉 가중치 산출 과정 20	〈그림 39〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 51
〈그림 9〉 흡연시작연령 27	〈그림 40〉 자작불편호소율(≥65) 51
〈그림 10〉 현재흡연율 27	〈그림 41〉 치실실천율 53
〈그림 11〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량 27	〈그림 42〉 연간 치과병원 이용률 53
〈그림 12〉 현재흡연자의 금연시도율 29	〈그림 43〉 스트레스 인지율 55
〈그림 13〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률 29	〈그림 43〉 우울감 경험률 55
〈그림 14〉 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 31	〈그림 45〉 우울증상유병률 55
〈그림 15〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 31	〈그림 46〉 인지장애 경험률(≥50) 57
〈그림 16〉 금연구역 관련 법률 인지율 31	〈그림 47〉 인지장애로 인한 일상생활 자정률(≥50) 57
〈그림 17〉 월간음주율 33	〈그림 48〉 연간 치매 선별 검사 수진율(≥50) 57
〈그림 18〉 연간음주자의 고위험음주율 33	〈그림 47〉 정신건강증진센터 인지율 59
〈그림 19〉 전체 고위험음주율 33	〈그림 50〉 평생 치매 예방관리 프로그램 참여 경험률 59
〈그림 20〉 운전자석 안전벨트 착용률 35	〈그림 51〉 치매 예방관리 프로그램 참여 희망률 59
〈그림 21〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 35	〈그림 52〉 연간 인플루엔자 예방접종률 63
〈그림 22〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 35	〈그림 53〉 고혈압 진단 경험률(≥30) 67
〈그림 23〉 연간 음주운전 경험률 (자동차 또는 오토바이) 37	〈그림 54〉 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30) 67
〈그림 24〉 걷기 실천율 39	〈그림 55〉 고혈압 관리교육 이수율(≥30) 67
〈그림 25〉 지역사회 내 운동시설 접근율 39	〈그림 56〉 당뇨병 진단 경험률(≥30) 69
〈그림 26〉 근력운동 실천율 39	〈그림 57〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30) 69
〈그림 27〉 연간 지역사회 내 운동프로그램 참여율 41	〈그림 58〉 당뇨병 관리교육 이수율(≥30) 69
〈그림 28〉 걷기 코스 인지율 41	〈그림 59〉 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사 (안저검사) 수진율(≥30) 71
〈그림 29〉 운동 필요성 인지율 41	〈그림 60〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥30) 71
〈그림 30〉 아침결식 예방인구비율 43	〈그림 61〉 연간 평균 혈압 측정횟수 73
〈그림 31〉 영양표시 활용률 43	

CONTENTS

〈그림목차〉

〈그림 62〉 연간 평균 혈당 측정횟수	73
〈그림 63〉 대사증후군 인지율	73
〈그림 64〉 연간 미충족의료율	75
〈그림 65〉 연간 사고 및 중독 경험률	79
〈그림 66〉 양호한 주관적 건강수준 인지율	83
〈그림 67〉 기침예절 실천율	87
〈그림 68〉 출산 경험률	91
〈그림 69〉 최초 출산연령	91

Community Health Survey

〈통계표목차〉

〈표 1〉 흡연시작연령	96	〈표 32〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	127
〈표 2〉 현재흡연을	97	〈표 33〉 자작불편호소율 : 65세 이상	128
〈표 3〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량	98	〈표 34〉 치솔질 실천율	129
〈표 4〉 현재흡연자의 금연시도율	99	〈표 35〉 연간 치과병원 이용률	130
〈표 5〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률	100	〈표 36〉 스트레스 인지율	131
〈표 6〉 현재비흡연자의 가정살내 간접흡연 노출률 ·	101	〈표 37〉 우울감 경험률	132
〈표 7〉 현재비흡연자의 직장살내 간접흡연 노출률 ·	102	〈표 38〉 우울증상유병률	133
〈표 8〉 금연구역 관련 법률 인지율	103	〈표 39〉 인지장애 경험률(≥50)	134
〈표 9〉 월간음주율	104	〈표 40〉 인지장애로 인한 지장 및 도움(≥50)	135
〈표 10〉 연간 음주자의 고위험음주율	105	〈표 41〉 인지장애 상담률(≥50)	136
〈표 11〉 전체 고위험음주율	106	〈표 42〉 연간 치매선별검사 수진율 및 장소	137
〈표 12〉 연간 절주 또는 금주 시도율	107	〈표 43〉 정신건강증진센터 인지율	138
〈표 13〉 운전자석 안전벨트 착용률	108	〈표 44〉 평생 치매 예방관리 프로그램 참여 경험률	139
〈표 14〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	109	〈표 45〉 치매 예방관리 프로그램 참여 희망률	140
〈표 15〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	110	〈표 46〉 연간 인플루엔자 예방접종률	141
〈표 16〉 연간 음주운전 경험률 (자동차 또는 오토바이)	111	〈표 47〉 혈압 및 혈당수치 인지율	142
〈표 17〉 걷기 실천율	112	〈표 48〉 고혈압 진단 경험률	143
〈표 18〉 지역사회 내 운동시설 접근율	113	〈표 49〉 고혈압 진단 경험자의 치료율	143
〈표 19〉 근력운동 실천율	114	〈표 50〉 고혈압 관리교육 장소 및 고혈압 관리교육 이수율	144
〈표 20〉 연간 지역사회 내 운동프로그램 참여율 ·	115	〈표 51〉 당뇨병 진단 경험률	145
〈표 21〉 걷기 코스 인지율	116	〈표 52〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율	145
〈표 22〉 운동 필요성 인지율	117	〈표 53〉 당뇨병 관리교육 장소 및 당뇨병 관리교육 이수율	146
〈표 23〉 아침식사 빈도 및 아침결식 예방인구비율 ·	118	〈표 54〉 연간 당뇨병성 안질환 합병증 검사 수진율 및 연간 당뇨병성 신장질환 합병증 검사 수진율	147
〈표 24〉 영양표시 활용률	119	〈표 55〉 연간 평균 혈압 및 혈당 측정 횟수	148
〈표 25〉 저염선택율	120	〈표 56〉 대사증후군 인지율	149
〈표 26〉 저염식 실천 노력 경험률	121	〈표 57〉 연간 미충족의료를	150
〈표 27〉 연간 영양교육 및 상담수혜율	122	〈표 58〉 연간 사고 및 중독 경험률	151
〈표 28〉 비만도 분포 및 비만율2) (자기보고)	123	〈표 59〉 양호한 주관적 건강수준 인지율	152
〈표 29〉 비만도 분포 및 비만율2) (신체계측)	124		
〈표 30〉 주관적 비만인지율	125		
〈표 31〉 연간 체중조절 시도율	126		

CONTENTS

〈통계표목차〉

〈표 60〉 기침예절 실천율	153
〈표 61〉 출산 경험률 및 최초 출산연령	154



요약

CHS

Community Health Survey

2018년 울주군 주요 건강지표 요약

울산광역시 울주군의 2015년부터 2018년까지 지역사회건강조사 주요지표 및 울산광역시와 전국 보건소 중앙값을 비교한 결과는 <표 1>과 같다.

<표 1> 2015-2018년 지역사회건강조사 주요지표 결과

(단위 : %, 조율(표준오차))

분류	영역	산출지표	울산광역시 울주군				울산광역시	전국 중앙값
			2015	2016	2017	2018	2018	2018
Ⅰ. 건강행태	흡연	흡연시작연령	20.3(0.2)	20.1(0.3)	20.0(0.3)	19.7(0.2)	20.0(0.1)	20.4
		현재흡연율	23.0(1.4)	21.9(1.7)	21.8(1.4)	18.9(1.3)	20.1(0.7)	20.0
		남자 현재흡연율	41.6(2.3)	39.9(3.1)	39.9(2.1)	35.4(2.2)	36.8(1.1)	37.4
		현재흡연자의 금연시도율	30.8(3.3)	28.8(3.9)	32.7(3.7)	37.3(3.9)	24.5(1.5)	21.9
		현재흡연자의 1개월 내 금연계획률	5.2(1.7)	7.6(1.9)	7.5(2.0)	6.7(2.1)	6.0(0.9)	5.0
		현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률	5.9(0.8)	4.6(1.3)	2.8(0.8)	1.2(0.4)	2.5(0.3)	3.0
		현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률	23.8(2.4)	19.9(2.4)	19.4(2.2)	7.5(1.5)	13.0(0.8)	12.1
	음주	월간음주율	56.5(1.6)	58.5(2.3)	59.1(1.9)	58.2(2.0)	61.1(0.8)	56.0
		전체 고위험음주율	14.6(1.1)	15.4(1.3)	17.6(1.5)	13.4(1.2)	15.3(0.6)	13.8
	안전의식	운전자석 안전벨트 착용률	77.5(1.9)	83.4(1.9)	92.9(1.0)	95.7(0.9)	93.8(0.5)	88.7
		동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	73.9(1.9)	75.6(1.6)	88.3(1.2)	94.0(0.9)	90.4(0.5)	84.1
	신체활동	걷기 실천율	52.8(2.3)	35.0(2.3)	41.5(1.8)	51.1(1.9)	44.1(0.9)	43.1
	식생활	영양표시 활용률	81.5(3.6)	81.1(3.0)	82.0(3.1)	84.1(2.2)	83.6(1.0)	79.3
	비만 및 체중조절	비만율(자가보고)	25.8(1.5)	26.8(1.8)	25.7(1.7)	29.5(1.7)	28.8(0.7)	31.6
		비만율(신체계측)	-	-	-	28.0(2.0)	30.5(0.8)	35.1
		주관적 비만인지율	36.8(1.8)	37.6(1.6)	33.5(1.6)	33.2(2.0)	38.2(0.7)	39.6
		연간 체중조절 시도율	54.8(1.6)	53.7(2.1)	50.4(2.1)	49.1(2.1)	60.8(0.9)	55.0
	구강건강	저작불편호소율(≥65)	42.2(3.7)	48.8(3.5)	35.9(3.1)	33.1(3.3)	36.7(1.9)	39.7
	정신건강	스트레스 인지율	23.8(1.8)	27.0(1.7)	25.5(1.6)	20.1(1.4)	23.8(0.7)	24.7
		우울감 경험률	3.3(0.7)	5.2(0.8)	3.0(0.5)	1.1(0.4)	4.7(0.4)	5.3
Ⅱ. 예방접종 및 검진		연간 인플루엔자 예방접종률	36.2(1.9)	35.5(1.9)	38.4(1.6)	39.9(2.0)	42.0(0.9)	45.3
Ⅲ. 이완 및 의료이용		고혈압 진단 경험률(≥30)	22.7(1.7)	22.4(1.6)	21.1(1.8)	21.4(1.6)	20.7(0.7)	26.5
		고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)	83.0(3.0)	89.1(1.9)	88.8(2.3)	95.3(1.5)	92.4(1.0)	94.3
		당뇨병 진단 경험률(≥30)	10.0(1.1)	9.7(1.0)	11.5(1.0)	10.3(1.2)	9.0(0.5)	10.7
		당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30)	85.7(4.2)	83.4(4.4)	89.3(3.3)	90.7(3.7)	90.7(1.6)	94.1
		연간 당뇨병 안정한 합병증 검사 수진율(≥30)	45.8(4.4)	28.1(4.5)	28.2(5.0)	40.5(5.3)	38.9(2.5)	38.0
		연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사 수진율(≥30)	37.1(7.5)	35.1(5.5)	47.4(5.6)	59.2(4.4)	45.7(2.5)	45.2
		연간 미충족의료율	6.0(0.9)	7.4(0.9)	5.7(1.0)	4.2(0.7)	7.0(0.4)	8.9

분류	영역	산출지표	울산광역시 울주군				울산광역시	전국
			2015	2016	2017	2018	2018	2018
IV. 사고 및 중독(손상)	연간 사고 및 중독 경험률		7.4(0.8)	7.9(1.0)	3.3(0.5)	3.0(0.6)	4.4(0.3)	4.4
V. 삶의 질	양호한 주관적 건강수준 인지율		48.0(1.8)	45.3(2.1)	48.9(1.8)	58.1(1.7)	45.4(0.8)	37.5

주 : 1) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률, 현재흡연자의 금연시도율 : 2012년 설문문항 및 응답보기, 설문순서 변경되어 연도비교 시 2008-2011년 결과 제외
 2) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률, 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 : 2009년 신규 도입되어 조사되었으나, 2014년 설문문항 및 응답보기 변경되어 연도비교 시 2009-2013년 결과 제외
 3) 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률, 영양표시 활용률 : 2014년 신규 도입
 4) 연간 필요의료서비스 미치료율 : 2010년 설문문항 다름으로 연도비교 시 해당연도(2010년) 결과 제외
 5) 어제 점심식사 후 치솔질 실천율 : 2014년부터 설문문항 및 응답보기 변경되어 연도비교 시 2008-2013년 결과 제외
 6) 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 : 2011년부터 설문문항 및 응답보기 변경되어 연도비교 시 2008-2010년 결과 제외
 7) 연간 필요의료서비스 미치료율 : 2010년 설문문항 다름으로 연도비교 시 해당연도(2010년) 결과 제외

2018년 지역사회건강조사 울산광역시 울주군 및 울산광역시, 전국 사분위수, 2016년과 2017년 국민건강영양조사의 주요지표를 비교한 결과는 <표 2>와 같다.

<표 2> 2018년 지역사회건강조사 주요지표 결과

(단위 : %, 조율(표준오차))

분류	영역	산출지표	2018년		전국(2018년)			국민건강영양조사	
			울주군	울산광역시	1사분위	2사분위	3사분위	2016	2017
I. 건강행태	흡연	흡연시작연령	19.7(0.2)	20.0(0.1)	20.1	20.4	20.7	19.8(0.1)	19.6(0.1)
		현재흡연율	18.9(1.3)	20.1(0.7)	18.0	20.0	22.0	22.6(0.8)	21.1(0.8)
		남자 현재흡연율	35.4(2.2)	36.8(1.1)	33.9	37.4	40.2	39.4(1.3)	37.0(1.4)
		현재흡연자의 금연시도율	37.3(3.9)	24.5(1.5)	16.7	21.9	27.1	58.0(1.8)	57.7(1.8)
		현재흡연자의 1개월 내 금연계획률	6.7(2.1)	6.0(0.9)	3.4	5.0	7.0	21.8(1.6)	17.6(1.2)
		현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률	1.2(0.4)	2.5(0.3)	2.0	3.0	4.0	6.1(0.5)	4.7(0.4)
		현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률	7.5(1.5)	13.0(0.8)	8.3	12.1	17.5	17.8(1.0)	13.4(0.8)
	음주	월간음주율	58.2(2.0)	61.1(0.8)	51.0	56.0	59.7	59.4(0.9)	59.2(0.8)
		전체 고위험음주율	13.4(1.2)	15.3(0.6)	12.1	13.8	15.6	13.2(0.6)	13.4(0.5)
	안전의식	운전자석 안전벨트 착용률	95.7(0.9)	93.8(0.5)	80.2	88.7	94.2	76.7(1.0)	79.4(0.9)
		동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	94.0(0.9)	90.4(0.5)	77.2	84.1	89.1	67.1(0.9)	71.7(0.8)
	신체활동	걷기 실천율	51.1(1.9)	44.1(0.9)	34.6	43.1	52.7	39.1(1.0)	38.6(0.9)
	식생활	영양표시 활용률	84.1(2.2)	83.6(1.0)	75.1	79.3	84.1	24.2(0.7)	29.2(0.9)
	비만 및 체중조절	비만율(자가보고)	29.5(1.7)	28.8(0.7)	29.4	31.6	33.9	35.5(0.9)	34.8(0.8)
		비만율(신체계측)	28.0(2.0)	30.5(0.8)	32.4	35.1	37.4	-	-
		주관적 비만인지율	33.2(2.0)	38.2(0.7)	36.0	39.6	42.9	83.7(0.8)	
		연간 체중조절 시도율	49.1(2.1)	60.8(0.9)	45.7	55.0	61.1	58.4(0.9)	
	구강건강	저작불편호소율(≥65)	33.1(3.3)	36.7(1.9)	33.7	39.7	45.0	44.1(1.7)	42.9(1.5)
	정신건강	스트레스 인지율	20.1(1.4)	23.8(0.7)	21.5	24.7	27.4	27.9(0.6)	29.1(0.6)
		우울감 경험률	1.1(0.4)	4.7(0.4)	3.8	5.3	7.1	-	11.6(0.6)
II. 예방접종 및 검진		연간 인플루엔자 예방접종률	39.9(2.0)	42.0(0.9)	41.8	45.3	53.6	37.4(0.9)	37.3(0.9)
III. 이환 및 의료이용	고혈압 진단 경험률(≥30)	21.4(1.6)	20.7(0.7)	23.2	26.5	32.9	-	-	
	고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)	95.3(1.5)	92.4(1.0)	92.1	94.3	95.9	-	-	
	당뇨병 진단 경험률(≥30)	10.3(1.2)	9.0(0.5)	9.1	10.7	12.8	-	-	
	당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30)	90.7(3.7)	90.7(1.6)	91.4	94.1	96.2	-	-	
	연간 당뇨병 안정한 합병증 검사 수진율(≥30)	40.5(5.3)	38.9(2.5)	30.7	38.0	46.7	-	-	
	연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사 수진율(≥30)	59.2(4.4)	45.7(2.5)	35.8	45.2	57.1	-	-	
	연간 미충족의료율	4.2(0.7)	7.0(0.4)	6.6	8.9	11.0	9.4(0.5)	10.1(0.5)	
IV. 사고 및 중독(손상)		연간 사고 및 중독 경험률	3.0(0.6)	4.4(0.3)	3.2	4.4	6.0	7.2(0.4)	6.5(0.4)
V. 삶의 질		양호한 주관적 건강수준 인지율	58.1(1.7)	45.4(0.8)	33.2	37.5	41.8	31.0(0.7)	27.8(0.7)

- 주 : 1) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률, 현재흡연자의 금연시도율 : 2012년 설문문항 및 응답보기, 설문순서 변경되어 연도비교 시 2008-2011년 결과 제외
 2) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률, 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 : 2009년 신규 도입되어 조사되었으나, 2014년 설문문항 및 응답보기 변경되어 연도비교 시 2009-2013년 결과 제외
 3) 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률, 영양표시 활용률 : 2014년 신규 도입
 4) 연간 필요의료서비스 미치료율 : 2010년 설문문항 다름으로 연도비교 시 해당연도(2010년) 결과 제외
 5) 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 : 2014년부터 설문문항 및 응답보기 변경되어 연도비교 시 2008-2013년 결과 제외
 6) 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 : 2011년부터 설문문항 및 응답보기 변경되어 연도비교 시 2008-2010년 결과 제외
 7) 연간 필요의료서비스 미치료율 : 2010년 설문문항 다름으로 연도비교 시 해당연도(2010년) 결과 제외

우리 지역사회의 주요 건강이슈

1. 2018년 전국 시·군·구별 표준화율과 울주군의 표준화율의 비교


전국 수준에 대비한 울산광역시 울주군의 건강수준을 파악하기 위하여 <표 3>과 같이 요약하였다. 주요 지표 결과를 분율(%)이 높을수록 긍정적인 지표와 부정적인 지표로 구분하였으며, 2018년 지역사회건강조사의 전국 시·군·구별 표준화율 사분위수와 울산광역시 울주군의 표준화율을 비교하여 제시하였다.

<표 3> 2018년 전국 시·군·구별 표준화율과 울주군 표준화율의 비교


1. 분율(%)이 높을수록 긍정적인 지표			
제1사분위수 미만	제1사분위수 이상, 제2사분위수 미만	제2사분위수 이상, 제3사분위수 미만	제3사분위수 이상
- 연간 채증조절 시도율 - 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30)	- 연간 인플루엔자 예방접종률 - 연간 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)	- 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률 - 걷기실천율 - 영양표시 활용률 - 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30) - 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)	- 현재흡연자의 금연 시도율 - 운전자석 안전벨트 착용률 - 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 - 양호한 주관적 건강수준 인지율
2. 분율(%)이 높을수록 부정적인 지표			
제1사분위수 미만	제1사분위수 이상, 제2사분위수 미만	제2사분위수 이상, 제3사분위수 미만	제3사분위수 이상
- 현재흡연율 - 현재흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 - 현재흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 - 비만율(자가보고) - 비만율(신체계측) - 주관적 비만인지율 - 저작불편 호소율(≥65) - 스트레스 인지율 - 우울감 경험율 - 고혈압 진단 경험률(≥30) - 연간 미충족의료율 - 연간 사고 및 중독 경험률	- 남자 현재흡연율 - 전체 고위험음주율	- 월간음주율 - 당뇨병 진단 경험률(≥30)	

2. 울주군과 울산광역시의 주요지표 비교

2018년 울주군 지역사회건강조사의 주요지표 결과를 울산광역시와 비교(조율)하였다. <그림 1>과 <그림 2>는 각각 긍정적 지표와 부정적 지표에 대하여 울주군과 울산광역시를 비교한 그래프이다. 긍정적 지표는 높은 값을 긍정적으로 해석할 수 있는 지표이며, 부정적 지표는 높은 값을 부정적으로 해석할 수 있는 지표이다. 각 지표의 울산광역시를 1로 환산하였을 때 울주군의 상대적인 지표값을 표시하였다.




〈그림 1〉 2018년 주요지표 결과 비교 - 긍정적 지표



〈그림 2〉 2018년 주요지표 결과 비교 - 부정적 지표

3. 황금다이아몬드를 이용한 보건사업 우선순위 지역사회건강지표

사업의 우선순위를 선정하기 위해 황금다이아몬드법(golden diamond)을 이용하였다. 2018년 울주군의 조율과 전국의 사분위수(조율)를 비교하여 제1사분위수 미만 혹은 제3사분위수 이상인 지표는 ‘좋음’ 또는 ‘나쁨’, 제1사분위수 이상 이면서 제3사분위수 미만인 지표는 ‘보통’으로 분류하였고, 울주군의 최근 5년간(2014-2018) 변화 추세는 2014년과 2018년 결과(조율)의 95% 신뢰구간을 비교하여 ‘좋아짐’, ‘비슷함’, ‘나빠짐’으로 분류하였다. 분류결과 기준으로 우선순위를 선정하여 제시하였다<그림 3>.



〈그림 3〉 황금다이아몬드를 이용한 보건사업 우선순위



제1부 조사체계

I. 조사개요

II. 통계 추정방법

CHS

Community Health Survey

제 1 부 조사체계

I. 조사개요

1. 조사목적
2. 조사방법
3. 조사내용
4. 표본설계
5. 조사체계
6. 자료관리
7. 조사현황



I. 조사개요

1. 조사목적

1995년 지방자치단체의 보건사업계획 수립을 의무화하는 지역보건법이 제정되었으나 시·군·구 단위의 대표성과 신뢰성 있는 통계가 부재한 상황이었다. 이에 질병관리본부에서는 지역보건법 제4조(지역사회 건강실태조사) 및 동법시행령 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)에 의거, 지역보건의료계획 수립 및 보건사업수행에 필요한 건강통계를 생산하기 위하여 2008년 이후 매년 시·군·구에서 지역사회건강조사를 수행하고 있다. 생산된 통계자료는 지역보건의료계획 수립 및 보건사업의 성과를 평가하는 자료로 활용되고 있다.

2. 조사방법

가. 조사대상

조사시점 표본가구에 거주하는 만 19세 이상 가구원 (1999년 7월 31일 이전 출생자)

나. 조사시기

2018년 8월 16일 - 10월 31일

다. 조사방법

조사원이 표본가구를 방문하여 노트북에 탑재된 전자조사표를 이용해 조사대상자와 1:1 면접 조사하는 방법

3. 조사내용

지역사회건강조사에서는 2010년부터 4년 주기의 순환조사체계를 도입하여 지표의 중요도와 활용성, 표본의 크기 등을 고려하여 각각의 조사항목을 1년, 2년, 4년 주기로 구분하여 조사하고 있다.

2018년부터 제3기 순환조사가 시작되었으며, 전국의 모든 시·군·구에서 조사하는 전국공통문항 외에 각 시·도별로 지역선택문항을 선정하여 조사하였다.

가. 전국공통 조사항목

총 21개 영역, 총 201개 문항으로 구성된 전국 공통조사표는 가구원 대표 1인이 참여하는 가구 조사와 만 19세 이상 가구원이 참여하는 개인조사로 구성하였다.

개인조사 영역에는 계측조사(혈압측정, 신체계측), 건강행태(흡연, 음주, 안전의식, 신체활동, 식생활, 비만 및 체중조절, 구강건강, 정신건강), 예방접종, 이환, 의료이용, 사고 및 중독, 활동제한 및 삶의 질, 보건기관 이용, 사회 물리적 환경, 심폐소생술, 여성 건강, 교육 및 경제활동이 포함되었다.

〈표 4〉 2018년 전국공통 조사항목

영역	조사항목
가구조사 (*가구대표 1인 참여)	세대유형, 기초생활수급자 여부, 가구 소득, 가구 식생활 형편, 치매환자 동거여부 등
혈압측정 기초설문	현재부터 30분 이내 활동, 금일 혈압약 복용, 혈압수치 인지 여부, 마지막 음식섭취 시간
신체계측 사전설문	평소 알고 있는 키, 평소 알고 있는 몸무게
흡연	평생흡연, 흡연시작연령, 현재흡연, 금연기간, 금연시도, 금연계획, 간접흡연, 전자담배 사용, 다른 담배 사용 등
음주	평생음주, 음주시작연령, 음주빈도, 음주량, 절주 및 금주시도, 음주폐해
안전의식	안전벨트 착용(자동차, 택시, 버스, 오토바이, 자전거), 음주운전 경험(자동차, 오토바이, 자전거), 음주운전차량 동승경험 등
운동 및 신체활동	유산소 신체활동 실천, 걷기 실천, 지역사회 내 운동시설 접근성
식생활	아침식사, 영양표시 인지·해독·활용
비만 및 체중조절	본인인지체형, 체중조절 경험
구강건강	주관적 구강건강, 저작불편, 치솔질, 치과진료 등
정신건강	수면시간, 스트레스 및 우울감, 정신상당, 주요 우울장애 경험, 수면의 질, 치매 등
예방접종	인플루엔자 예방접종 경험
이환	고혈압 진단 경험, 당뇨병 진단 경험, 뇌졸중 조기증상 인지, 심근경색증 조기증상 인지 등
의료이용	미충족 의료 경험, 미충족 의료 이유
사고 및 중독	사고중독 경험 및 건수, 사고중독 원인 등
활동제한 및 삶의 질	주관적 건강수준, 삶의 질 지수
보건기관 이용	보건기관 이용
사회 물리적 환경	현재 체감 환경, 광역 시·도 및 시·군·구 거주기간
심폐소생술	심폐소생술 인지, 심폐소생술 교육 경험, 마네킹 실습 경험, 심폐소생술 시행능력 정도
여성건강	임신여부, 최근 출산 경험, 모유수유 경험
교육 및 경제활동	직업, 학력, 혼인상태
혈압측정	혈압 측정(2회)
신체계측	키(2회), 몸무게(1회)

설문조사
개인조사

계측조사

나. 지역선택 조사항목

〈표 5〉 2018년 울산광역시 지역선택 조사항목

영역	조사항목
흡연	하루 평균 흡연량, 금연정책 강화 필요 영역
운동 및 신체활동	지역사회 내 운동시설 접근율, 연간 지역사회 내 운동프로그램 참여율
식생활	저염식 실천 노력 경험률, 연간 영양교육 및 상담수혜율
구강건강	연간 치과병의원 이용률
정신건강	우울감 원인, 정신건강증진센터 인지율
이환	연간 평균 혈압·혈당 측정횟수, 혈압 및 혈당수치 인지율

4. 표본설계

가. 모집단

(1) 목표 모집단은 2018년 7월 기준으로 시·군·구에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.

(2) 조사 모집단은 시·군·구의 동·읍·면 내 통·반·리의 표본지점을 1차 추출단위로 하며, 선정된 통·반·리의 표본지점 내 주거용 주택(아파트, 일반주택)에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.

나. 표본추출

(1) 1차 추출(표본지점)

통·반·리 내 주택유형별 가구 수를 기준으로 주민등록인구자료와 주택자료를 연계하여 작성된 표본추출틀에서 각 동·읍·면 별로 할당된 표본지점을 추출하는데, 이때 통·반·리를 명칭기준으로 정렬한 후 가구 수 크기를 고려하여 추출확률이 비례하도록 추출하였다.

(2) 2차 추출(표본가구)

표본가구는 표본지점으로 선정된 통·반·리의 가구수를 파악하여 계통추출법으로 선정하였다. 이 때 통·반·리의 규모가 커서 2개 이상의 표본지점이 할당된 경우 표본오차를 최소화하기 위해 표본가구가 가능한 고르게 분포하도록 하였다. 최종적으로 표본지점별로 평균 5개 가구를 표본가구로 선정하였다.

모집단 정의	주민등록기준 만 19세 이상 성인(1999. 7. 31.)		
분석 및 층화	동/읍·면, 주택유형별 층화		
표본 배분	표본크기 결정	보건소별 평균 900명, 목표오차 ±3%	
	동/읍·면 할당	동/읍·면	동/읍·면 최소 1개 이상 표본지점 할당
표본 추출	표본지점 추출	통·반·리	확률비례계통추출(1차추출)
	표본가구 추출	계통추출(2차추출)	

〈그림 4〉 표본선정과정

〈표 6〉 동/읍·면별 표본지점 분포


동/읍·면	전체 가구 수			표본지점 수		
	일반	아파트	합계	일반	아파트	합계
읍·면지역	37,469	44,051	79,299	45	46	91
두동면	1,779	-	1,779	3	0	3
두서면	1,423	-	-	2	0	2
범서읍	3,818	19,910	23,728	4	20	24
삼남면	3,741	4,142	7,883	4	5	9
삼동면	798	-	-	2	0	2
상북면	2,390	1,078	3,468	3	1	4
서생면	3,402	342	3,744	5	0	5
연양읍	4,703	4,807	9,510	5	5	10
온산읍	6,455	2,401	8,856	7	3	10
온양읍	4,180	6,075	10,255	4	7	11
웅촌면	2,090	1,227	3,317	3	1	4
청량읍	2,690	4,069	6,759	3	4	7
합계	37,469	44,051	79,299	45	46	91

5. 조사체계

가. 수행체계

질병관리본부는 지역사회건강조사 사업계획을 수립하여 시·도에 배포하고, 표본설계, 조사문항 및 지침표준화, 교육 및 홍보물 개발 등의 사업수행과 관련한 기술지원을 하였다. 사업 관련 주요 현안에 대한 검토 및 심의는 시·도 및 책임대학교 위원회, 전문분과위원회로 구성된 운영위원회를 통해 이루어졌다.


시·도는 권역대표대학교를 지정하여 지역사회건강조사 수행을 위한 지역 거점센터를 운영하고, 중앙정부로부터 사업예산을 받아 시·군·구 보건소로 배정하는 역할을 담당하여 수행하였다. 시·군·구 보건소는 책임대학교와 협약을 체결하고, 조사수행 관련한 행정지원을 하였다.



〈그림 5〉 수행체계

나. 수행과정

질병관리본부에서 설문지 개발 및 표본추출을 담당하였고, 책임대학교에서 조사원 교육을 실시하였다. 조사원은 가구선정통지서 발송 1-2주 후 표본가구를 방문하여 면접조사를 진행하여 조사자료를 중앙서버로 전송하였다. 이후 질병관리본부의 조사자료 확인 및 책임대학교의 자료분석 절차를 거쳐 통계집을 발간하였다.



〈그림 6〉 수행과정

6. 자료관리


가. 콜센터 운영

2018년 지역사회건강조사에서는 조사원에게 표준화된 조사수행 및 조사문항지침을 전달하고자 책임대학교 단위의 콜센터를 운영하였다.

콜센터에서는 표본가구 및 가구원 선정, 가구대체, 조사문항, 노트북 관련 질의사항을 처리하고, 담당자는 질의사항에 대한 조치내역을 질병보건통합관리시스템에 일단위로 등록하였다.

나. 자료검증

2018년 지역사회건강조사에서는 조사완료자 중 10%를 무작위로 추출하여 제3기관을 통해 전화 점검을 실시하였다. 전화점검은 조사완료 후 평균 3일 이내 실시하였으며, 책임대학교에서 전화점검 결과에 대해 확인 후 최종적으로 조사자료의 사용 여부를 결정하였다.



〈그림 7〉 전화점검 절차

7. 조사현황

가. 조사현황

조사현황은 <표 7>와 같다. 총 조사가구 수는 459가구였고, 조사완료자 수는 912명이었다. 가구당 평균 2.1명이 조사되었다.

<표 7> 조사현황

동·읍·면	조사가구 수			조사완료자 수(명)		
	일반	아파트	합계	일반	아파트	합계
읍·면지역	229	230	459	431	481	912
두동면	15	0	15	30	0	30
두서면	10	0	10	18	0	18
범서읍	20	100	120	36	225	261
삼남면	20	25	45	47	45	92
삼동면	10	0	10	17	0	17
상북면	15	5	20	28	10	38
서생면	25	0	25	45	0	45
언양읍	25	25	50	52	53	105
온산읍	35	15	50	54	29	83
온양읍	24	35	59	40	72	112
웅촌면	15	5	20	32	8	40
청량읍	15	20	35	32	39	71
합계	229	230	459	431	481	912

<표 8> 가구당 조사인원 수

	일반	아파트	계
읍·면지역	1.9	2.3	2.1
계	1.9	2.3	2.1

나. 조사가구 및 인구 특성

2018년 지역사회건강조사 대상자의 가구원수는 2명인 경우가 34.4%로 가장 많았고, 평균은 2.5명이 었다. 조사자의 기초생활수급자 여부는 미수급자가 98.3%로 가장 높았고, 월 가구소득은 400만원 이상이 36.7%로 가장 많았고, 다음이 300~400만원 미만 25.3%의 순이었다.

성별분포는 남자가 49.1%, 여자가 50.9%이었다. 연령은 50대가 22.8%로 가장 높았고, 다음이 40대 20.5%의 순이었다. 대상자의 평균연령은 50.7세 였다. 결혼은 유배우가 68.3%로 가장 높았고, 교육 수준은 고등학교 졸업이 41.9%로 가장 많았고, 다음이 대학교 이상 34.1% 순이었다.

〈표 9〉 2018년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성

(단위 : 명, %)

조사대상 가구특성(N=459)		
	N	(%)
가구원 수		
1명	108	23.5
2명	158	34.4
3명	70	15.3
4명	90	19.6
5명	27	5.9
6명	4	0.9
7명 이상	2	0.4
평균(명)	2.5	-
세대유형		
1세대	244	53.2
2세대	191	41.6
3세대	24	5.2
기초생활수급자 여부		
현재 수급자	8	1.7
과거 수급자	-	-
미수급자	451	98.3
월 가구소득		
100만원 미만	40	8.8
100~200만원 미만	58	12.7
200~300만원 미만	75	16.5
300~400만원 미만	115	25.3
400만원 이상	167	36.7
치매환자 동거가구	1	6.7
거주유형		
읍·면	459	100.0

〈표 10〉 2018년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성

(단위 : 명, %)

조사대상 인구특성 (N=912)		
	N	(%)
성별		
남자	448	49.1
여자	464	50.9
연령(10세 간격)		
19-29세	121	13.3
30-39세	123	13.5
40-49세	187	20.5
50-59세	208	22.8
60-69세	145	15.9
70세 이상	128	14.0
평균(세)	50.7	-
생애주기별		
19-64세	714	78.3
65세 이상	198	21.7
결혼상태		
미혼	162	17.8
유배우	620	68.3
사별, 이혼, 별거	126	13.9
교육수준 ¹⁾		
무학	50	5.5
초등학교	95	10.4
중학교	74	8.1
고등학교	382	41.9
대학교 이상	311	34.1
직업		
전문행정관리직	91	10.0
사무직	112	12.3
판매·서비스직	83	9.1
농림어업	54	5.9
기능단순노무직	183	20.1
기타 ²⁾	389	42.7

1) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

2) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

제 1 부 조사체계

Ⅱ. 통계 추정방법

1. 가중치의 사용
2. 자료처리
3. 분산추정



II. 통계 추정방법

1. 가중치의 사용

가. 소개

2018년 지역사회건강조사는 표본설계를 통하여 추출한 표본을 조사하여 설계 구조를 바탕으로 가중치를 부여함으로써 모집단의 건강수준 등을 추정하였다. 가중치는 가구단위 분석을 위한 가구가중치와 개인단위 분석을 위한 개인가중치로 분류하였다.

나. 가중치 산출 과정

가구가중치는 가구추출률과 조사적격 가구율을 반영하였고, 개인가중치는 가구가중치에 개인 응답률을 반영하였다. 추정에 쓰이는 보정가중치는 개인가중치를 성별, 연령별 인구구조(2018년 7월 주민등록인구)와 같도록 보정하여 산출하였다.

설계가중치		벤치마킹 가중치
가구가중치	→ 개인가중치	→ 보정가중치
· 가구추출률 · 조사적격가구율 · 주택유형별 가구 비율	· 개인 응답률	· 성별·연령별 인구보정 - 성별 : 남, 여 - 연령별 : 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+ - 주민등록인구 기준 (2018. 07)

〈그림 8〉 가중치 산출 과정

(1) 가구가중치

- 표본설계의 표본추출과정을 고려한 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율을 반영한 가중치

$$W_{hi} = \frac{M_{hi}}{n_{hi}} = \frac{e_{hi} \cdot N_{hi}}{n_{hi}}$$

- N_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 가구 수
- M_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 적격가구 수
- n_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사가구 수
- e_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사적격 가구율

〈표 11〉 가구가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 가구 수(③)	(2,620)
①, ②의 조사된 가구 수(④)	(7)
①, ②의 조사접촉 가구 수(⑤)	(9)
①, ②의 조사적격 가구 수(⑥)	(8)
가구가중치(⑦) = ③ ÷ ④ × ⑥ ÷ ⑤	(332,698 = 2620/7 × 8/9)
전체 가구가중치 합(⑧)	(8569,456)
전체 ②의 가구 수 합(⑨)	(10,356)
가구가중치 보정(⑩) = ⑦ × (⑨/⑧)	(402,0583 = 332,698 × 10,356/8569,456)

(2) 개인가중치

- 가구가중치에 개인 응답률을 반영한 가중치

$$W_{hjk} = W_{hjk} \times \frac{P_{hjk}}{p_{hjk}}$$

- h : 읍·면/동, j : 표본지점
- k : 가구, l : 가구원
- P_{hjk} : 가구내 만 19세 이상 가구원수
- p_{hjk} : 가구내 만 19세 이상 조사 가구원수

〈표 12〉 개인가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 가구가중치(③)	(402.0583)
만 19세 이상 가구원수(④)	(4)
만 19세 이상 조사 가구원수(⑤)	(3)
개인가중치(⑥)=③×④/⑤	(536.0777=402.0583×4/3)

(3) 보정가중치

- 2018년 7월 주민등록인구 기준으로 성별, 연령별 인구구조를 보정한 가중치

$$W'_{ijkl} = BF_d \cdot W_{ijkl}$$

$$BF_d = \frac{d(\text{성별} \cdot \text{연령대별}) \text{ 주민등록인구수}}{\sum_h \sum_i \sum_{jkl} W_{ijkl} I_{d=\text{성별} \cdot \text{연령대별}}}$$

〈표 13〉 보정가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 개인가중치(③)	(536.0777)
주민등록인구(④)	(14,693)
성·연령별 개인가중치 합(⑤)	(12,157.23)
성·연령별 보정비(⑥)=④/⑤	(1.208=14,693/12,157.23)
보정가중치(⑦)=③×⑥	(647.89=536.0777×1.208)

(4) 가중치의 이상치 제거

특정 조사대상자의 개인가중치가 다른 조사대상자의 개인가중치보다 월등히 클 경우, 해당 조사대상자의 응답값에 의해 조사결과에 바이어스(bias, 편향성)가 생길 수 있으므로 보정가중치의 이상치를 Raking Ratio 방법으로 제거하여 재보정 하였다.

$Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 보다 큰 가중치는 이상치로 정의하였으며, $Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 로 변경하였다.

- IQR : $Q_3(W') - Q_1(W')$
- $Q_1(W')$: 가중치 중 1사분위수
- $Q_3(W')$: 가중치 중 3사분위수

2. 자료처리

가. 무응답처리

무응답은 대체하지 않았으며 지표 산출 시 제외하였다. 무응답은 개체 무응답과 항목 무응답으로 구분하는데 개체 무응답은 조사에 참여하지 않음으로써 모든 문항에 대해 발생한 결측치를 의미하고, 항목 무응답은 조사에 참여한 대상자가 일부 항목에 응답하지 않아 발생한 결측치이다.

나. 사회경제적 특성분류

(1) 연령

연령은 2018년 8월 1일 기준으로 만 연령을 정의하였다. 연령분류는 10세 단위로 “19-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60-69세, 70세 이상”으로 분류하였고, 생애주기별 특성을 알아보기 위해 “19-64세, 65세 이상”의 연령구분을 추가하였다.

(2) 교육수준

교육수준은 <교육 및 경제활동> 영역에서 교육 정도와 졸업여부 2개 문항으로 조사하고 있으며 최종 교육수준은 두 문항을 조합하여 “무학, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 이상”으로 구분하였다. 졸업여부가 ‘졸업’인 경우만 해당 교육수준을 의미하며 졸업여부가 ‘수료, 중퇴, 재학/휴학’인 경우에는 이전 정도의 교육수준으로 분류하였다.

〈표 14〉 교육수준분류

교육수준	졸업여부	분류
무학	-	무학
서당/한학	-	
초등학교	졸업	초등학교
중학교	졸업	중학교
고등학교	졸업	고등학교
2년/3년제 대학	졸업	대학교 이상
4년제 대학	졸업	
대학원 이상	전체	

(3) 직업

직업분류는 통계청 한국표준직업분류(KSCO, 제6차 개정)의 대분류 직업군에서 유사한 직업 분류를 묶어서 6개 직업군으로 분류하였다.

〈표 15〉 직업분류

제6차 한국표준직업분류	직업분류 재구분
관리자	전문행정관리
전문가 및 관련 종사자	
사무 종사자	사무직
서비스 종사자	판매·서비스직
판매 종사자	
농업, 임업 및 어업숙련 종사자	농림어업
기능원 및 관련 기능 종사자	기능단순노무직
장치, 기계조작 및 조립 종사자	
단순노무 종사자	
군인	기타
학생	
주부	
무직	

(4) 가구소득

소득수준은 월 단위로 “100만원 미만, 100-200만원 미만, 200-300만원 미만, 300-400만원 미만, 400만원 이상”의 5개 그룹으로 분류하였다.

(5) 거주유형

거주유형은 “동”과 “읍·면”으로 구분하였다.

3. 분산추정

지역사회건강조사에서는 모집단의 특성을 추정하기 위해 가중치를 적용한 표본가중평균을 제시하였다.

표본조사로 모집단의 특성을 추정할 때 일반적으로 표본오차(sampling error) 및 비표본오차(non-sampling error)가 수반된다. 표본오차는 표본이 모집단의 특성과 어긋나는 정도를 나타내며, 비표본오차는 표본추출과정을 제외한 자료수집 과정이나 분석 과정에서 발생하는 오류를 말한다. 표준오차(standard error)로 표현되는 표본오차는 추정치의 신뢰도에 대한 척도가 되며 분산추정에 의해 측정할 수 있다. 울산광역시 울주군 지역사회건강조사는 SAS 9.4를 활용하여 분산을 추정하였다.

• 표본가중평균

$$\hat{Y} = \frac{\left(\sum_h \sum_j \sum_k \sum_l W_{h j k l} y_{h j k l} \right)}{W_{....}}$$

- h : 동/읍·면, j : 표본지점
- k : 가구, l : 가구원
- $W_{....} = \sum_h \sum_j \sum_k \sum_l W_{h j k l}$: 가중치 계
- $y_{h j k l}$: 해당 문항의 응답값

• 표본오차

$$SE(\hat{Y}) = \sqrt{\sum_{h=1} \sum_{j=1} \frac{n_{hj}(1-f_{hj})}{n_{hj}-1} \sum_{k=1}^{n_{hj}} (e_{hjk} - \overline{e_{hj}})^2}$$

$$\text{여기서 } e_{hjk} = \frac{\left(\sum_{l=1} W_{h j k l} (y_{h j k l} - \hat{Y}) \right)}{W_{....}} \text{ 이고,}$$

$$\overline{e_{hj}} = \left(\sum_{k=1} e_{hjk} \right) / n_{hj} \text{ 이다.}$$

• 변동계수

$$cv(\hat{Y}) = \frac{SE(\hat{Y})}{\hat{Y}}$$



제2부 주요통계결과

- I. 건강행태
- II. 예방접종
- III. 이환 및 의료이용
- IV. 사고 및 중독
- V. 활동제한 및 삶의 질
- VI. 개인위생
- VII. 여성건강

CHS

Community Health Survey

제 2 부 주요통계결과

I. 건강행태

1. 흡연
2. 음주
3. 안전의식
4. 신체활동
5. 식생활
6. 비만 및 체중조절
7. 구강건강
8. 정신건강



I. 건강행태

1. 흡연

가. 흡연시작연령


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 흡연시작연령은 19.7세로 울산광역시의 20.0세보다 0.3세 낮았다.
- 성별 : 남자에서만 19.3세로 나타났다.
- 5년간 비교 : 2018년은 19.7세로 2017년 20.0세에 비해 0.3세 감소하였으나 지난 5년간 큰 변화는 없었다.

다. 매일흡연자의 하루 평균 흡연량


- 울주군의 매일흡연자의 하루 평균 흡연량은 15.8개비였다.
- 성별 : 남자에서만 15.9개비로 나타났다.
- 연령대별 : 50대가 17.1개비로 가장 높았고, 40대가 16.0개비로 뒤를 이었다.

나. 현재흡연율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 현재흡연율은 18.9%로 울산광역시의 20.1%보다 1.2%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 35.4%로 여자 1.2%보다 34.2%p 높았다.
- 연령대별 : 30대가 28.7%로 가장 높았고, 40대가 25.4%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 18.9%로 2017년 21.8%에 비해 2.9%p 감소하였으며, 2015년 23.0% 이후 지속적으로 감소하였다.



〈그림 9〉 흡연시작연령



〈그림 10〉 현재흡연율




〈그림 11〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량

라. 현재흡연자의 금연시도율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 현재흡연자의 금연시도율은 37.3%로 울산광역시의 24.5%보다 12.8%p 높았다.
- 성별 : 남자에서만 36.8%로 나타났다.
- 연령대별 : 50대가 42.6%로 가장 높았고, 30대가 40.1%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 37.3%로 2017년 32.7%에 비해 4.6%p 증가하였으며, 2014년 15.1%에 비해 22.2%p 증가하였다.

마. 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률은 6.7%로 울산광역시의 6.0%보다 0.7%p 높았다.
- 성별 : 남자에서만 6.9%로 나타났다.
- 연령대별 : 50대가 9.0%로 가장 높았고, 40대가 8.8%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 6.7%로 2017년 7.5%에 비해 0.8%p 감소하였으며, 2014년 4.2%에 비해 2.5%p 증가하였다.



〈그림 12〉 현재흡연자의 금연시도율



〈그림 13〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률

바. 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률은 1.2%로 울산광역시 2.5%보다 1.3%p 낮았다.
- 성별 : 여자가 2.0%로 남자 0.0%보다 2.0%p 높았다.
- 연령대별 : 50대가 2.7%로 가장 높았고, 70세 이상이 2.5%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 1.2%로 2017년 2.8%에 비해 1.6%p 감소하였으며, 2015년 5.9% 이후 지속적으로 감소하였다.


【울산 선택지표】

아. 금연구역 관련 법률 인지율


- 울주군의 금연구역 관련 법률 인지율은 85.9%였다.
- 성별 : 남자가 87.3%로 여자 84.3%보다 3.0%p 높았다.
- 연령대별 : 30대와 60대가 89.3%로 가장 높았고, 40대가 89.1%로 뒤를 이었다.

사. 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률은 7.5%로 울산광역시의 13.0%보다 5.5%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 9.8%로 여자 5.0%보다 4.8%p 높았다.
- 연령대별 : 50대가 10.8%로 가장 높았고, 20대가 7.8%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 7.5%로 2017년 19.4%에 비해 11.9%p 감소하였으며, 2014년 33.7% 이후 지속적으로 감소하였다.



〈그림 14〉 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률



〈그림 15〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률



〈그림 16〉 금연구역 관련 법률 인지도

2. 음주

가. 월간음주율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 월간음주율은 58.2%로 울산광역시의 61.1%보다 2.9%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 69.4%로 여자 46.3%보다 23.1%p 높았다.
- 연령대별 : 30대가 72.4%로 가장 높았고, 40대가 68.0%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년은 58.2%로 2017년 59.1%에 비해 0.9%p 감소하였으며, 2014년 57.9%에 비해 0.3%p 감소하였다.

다. 전체 고위험음주율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 전체 고위험음주율은 13.4%로 울산광역시의 15.3%보다 1.9%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 20.7%로 여자 5.6%보다 15.1%p 높았다.
- 연령대별 : 40대가 20.5%로 가장 높았고, 30대가 17.3%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 13.4%로 2017년 17.6%에 비해 4.2%p 감소하였으며, 2014년 14.0%에 비해 0.6%p 감소하였다.

나. 연간음주자의 고위험음주율


- 울주군의 연간음주자의 고위험음주율은 19.1%였다.
- 성별 : 남자가 26.4%로 여자 9.1%보다 17.3%p 높았다.
- 연령대별 : 40대가 27.2%로 가장 높았고, 50대가 24.3%로 뒤를 이었다.



〈그림 17〉 월간음주율



〈그림 18〉 연간음주자의 고위험음주율



〈그림 19〉 전체 고위험음주율

3. 안전의식

가. 운전자석 안전벨트 착용률


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 운전자석 안전벨트 착용률은 95.7%로 울산광역시의 93.8%보다 1.9%p 높았다.
- 성별 : 여자가 95.8%로 남자 95.6%보다 0.2%p 높았다.
- 연령대별 : 70세 이상이 97.5%로 가장 높았고, 20대가 97.3%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 95.7%로 2017년 92.9%에 비해 2.8%p 증가하였으며, 2014년 78.5% 이후 지속적으로 증가하였다.

다. 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률


- 울주군의 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률은 45.7%였다.
- 성별 : 여자가 49.3%로 남자 42.2%보다 7.1%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 51.6%로 가장 높았고, 30대가 49.4%로 뒤를 이었다.

나. 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률은 94.0%로 울산광역시의 90.4%보다 3.6%p 높았다.
- 성별 : 여자가 95.0%로 남자 93.1%보다 1.9%p 높았다.
- 연령대별 : 70세 이상이 97.0%로 가장 높았고, 60대가 95.3%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 94.0%로 2017년 88.3%에 비해 5.7%p 증가하였으며, 2014년 70.7% 이후 지속적으로 증가하였다.



〈그림 20〉 운전자석 안전벨트 착용률




〈그림 21〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률



〈그림 22〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률

라. 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)

- 울주군의 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)은 6.3%였다.
- 성별 : 남자가 8.3%로 여자 2.9%보다 5.4%p 높았다.
- 연령대별 : 70세 이상이 8.9%로 가장 높았고, 20대가 8.8%로 뒤를 이었다.



〈그림 23〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)

4. 신체활동

가. 걷기 실천율

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 걷기 실천율은 51.1%로 울산광역시의 44.1%보다 7.0%p 높았다.
- 성별 : 여자가 52.5%로 남자 49.8%보다 2.7%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 57.1%로 가장 높았고, 60대가 53.4%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 51.1%로 2017년 41.5%에 비해 9.6%p 증가하였으며, 2014년 49.4%에 비해 1.7%p 증가하였다.


나. 지역사회 내 운동시설 접근율

- 울주군의 지역사회 내 운동시설 접근율은 74.9%였다.
- 성별 : 여자가 75.1%로 남자 74.7%보다 0.4%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 82.0%로 가장 높았고, 40대가 79.8%로 뒤를 이었다.


【울산 선택지표】

다. 근력운동 실천율


- 울주군의 근력운동 실천율은 14.6%였다.
- 성별 : 남자가 18.9%로 여자 10.0%보다 8.9%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 19.1%로 가장 높았고, 60대가 16.6%로 뒤를 이었다.



〈그림 24〉 건기 실천율



〈그림 25〉 지역사회 내 운동시설 접근율



〈그림 26〉 근력운동 실천율

【울산 선택지표】

라. 연간 지역사회 내 운동프로그램 참여율

- 울주군의 연간 지역사회 내 운동프로그램 참여율은 6.2%였다.
- 성별 : 여자가 8.3%로 남자 4.3%보다 4.0%p 높았다.
- 연령대별 : 60대가 9.3%로 가장 높았고, 70세 이상이 8.6%로 뒤를 이었다.

【울산 선택지표】


바. 운동 필요성 인지율

- 울주군의 운동 필요성 인지율은 95.3%였다.
- 성별 : 여자가 95.9%로 남자 94.7%보다 1.2%p 높았다.
- 연령대별 : 50대가 96.9%로 가장 높았고, 40대가 96.7%로 뒤를 이었다.


【울산 선택지표】

마. 걷기 코스 인지율


- 울주군의 걷기 코스 인지율은 40.5%였다.
- 성별 : 남자가 42.2%로 여자 38.8%보다 3.4%p 높았다.
- 연령대별 : 40대가 48.4%로 가장 높았고, 50대가 47.5%로 뒤를 이었다.



〈그림 27〉 연간 지역사회 내 운동프로그램 참여율



〈그림 28〉 걷기 코스 인지율



〈그림 29〉 운동 필요성 인지율


5. 식생활

가. 아침결식 예방인구비율


- 울주군의 아침결식 예방인구비율은 72.1%였다.
- 성별 : 여자가 73.5%로 남자 70.9%보다 2.6%p 높았다.
- 연령대별 : 70세 이상이 96.8%로 가장 높았고, 60대가 95.7%로 뒤를 이었다.

나. 영양표시 활용률

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 영양표시 활용률은 84.1%로 울산광역시의 83.6%보다 0.5%p 높았다.
- 성별 : 남자가 87.4%로 여자 82.9%보다 4.5%p 높았다.
- 연령대별 : 40대가 89.2%로 가장 높았고, 60대가 86.2%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 84.1%로 2017년 82.0%에 비해 2.1%p 증가하였으며, 2014년 89.8%에 비해 5.7%p 감소하였다.



〈그림 30〉 아침결식 예방인구비율



〈그림 31〉 영양표시 활용률

【울산 선택지표】

다. 저염선택호율

- 울주군의 저염선택호율은 Type I 36.1%, Type II 16.4%, Type III 6.8%였다.
- 성별 : Type I 은 남자가 38.0%로 여자 34.1%보다 3.9%p 높았다.
Type II 는 여자가 19.9%로 남자 13.1%보다 6.8%p 높았다.
Type III 는 여자가 9.7%로 남자 4.0%보다 5.7%p 높았다.

【울산 선택지표】


라. 저염식 실천 노력 경험률

- 울주군의 저염식 실천 노력 경험률은 49.1%였다.
- 성별 : 여자가 55.3%로 남자 43.2%보다 12.1%p 높았다.
- 연령대별 : 60대가 62.0%로 가장 높았고, 50대가 60.8%로 뒤를 이었다.


【울산 선택지표】

마. 연간 영양교육 및 상담수혜율


- 울주군의 연간 영양교육 및 상담수혜율은 1.5%였다.
- 성별 : 여자가 2.6%로 남자 0.5%보다 2.1%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 3.9%로 가장 높았고, 30대가 3.1%로 뒤를 이었다.



〈그림 32〉 저염선택률



〈그림 33〉 저염식 실천 노력 경험률



〈그림 34〉 연간 영양교육 및 상담수혜율

6. 비만 및 체중조절

가. 비만율(자가보고)


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 비만율(자가보고)은 29.5%로 울산광역시의 28.8%보다 0.7%p 높았다.
- 성별 : 남자가 35.8%로 여자 22.6%보다 13.2%p 높았다.
- 연령대별 : 60대가 36.4%로 가장 높았고, 40대와 50대가 31.5%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 29.5%로 2017년 25.7%에 비해 3.8%p 증가하였으며, 2014년 23.5%에 비해 6.0%p 증가하였다.

다. 주관적 비만인지율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 주관적 비만인지율은 33.2%로 울산광역시의 38.2%보다 5.0%p 낮았다.
- 성별 : 여자가 34.9%로 남자 31.6%보다 3.3%p 높았다.
- 연령대별 : 40대가 41.6%로 가장 높았고, 60대가 38.3%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 33.2%로 2017년 33.5%에 비해 0.3%p 감소하였으며, 2014년 36.7%에 비해 3.5%p 감소하였다.

나. 비만율(신체계측)


- 울주군의 비만율(신체계측)은 28.0%였다.
- 성별 : 남자가 32.8%로 여자 23.2%보다 9.6%p 높았다.
- 연령대별 : 60대가 39.7%로 가장 높았고, 40대가 30.9%로 뒤를 이었다.



〈그림 35〉 비만을(자가보고)




〈그림 36〉 비만을(신체계측)



〈그림 37〉 주관적 비만인지를

라. 연간 체중조절 시도율

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간 체중조절 시도율은 49.1%로 울산광역시의 60.8%보다 11.7%p 낮았다.
- 성별 : 여자가 59.4%로 남자 39.4%보다 20.0%p 높았다.
- 연령대별 : 30대가 61.5%로 가장 높았고, 40대가 55.5%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 49.1%로 2017년 50.4%에 비해 1.3%p 감소하였으며, 2015년 54.8% 이후 지속적으로 감소하였다.



〈그림 38〉 연간 체중조절 시도율


7. 구강건강

가. 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율


- 울주군의 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 25.3%였다.
- 성별 : 남자가 25.8%로 여자 24.8%보다 1.0%p 높았다.
- 연령대별 : 70세 이상이 41.5%로 가장 높았고, 60대가 34.5%로 뒤를 이었다.

나. 저작불편호소율(≥65)

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 저작불편호소율(≥65)은 33.1%로 울산광역시의 36.7%보다 3.6%p 낮았다.
- 성별 : 여자가 37.0%로 남자 28.9%보다 8.1%p 높았다.
- 5년간 비교 : 2018년 33.1%로 2017년 35.9%에 비해 2.8%p 감소하였으며, 2014년 46.3%에 비해 13.2%p 감소하였다.



〈그림 39〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율



〈그림 40〉 저작불편호소율(≥65)

다. 치솔질 실천율

(1) 어제 아침식사 후 치솔질 실천율

- 울주군의 어제 아침식사 후 치솔질 실천율은 79.6%였다.
- 성별 : 여자가 84.0%로 남자 75.4%보다 8.6%p 높았다.

(2) 어제 점심식사 후 치솔질 실천율

- 울주군의 어제 점심식사 후 치솔질 실천율은 61.7%였다.
- 성별 : 여자가 70.6%로 남자 53.3%보다 17.3%p 높았다.

(3) 어제 저녁식사 후 치솔질 실천율

- 울주군의 어제 저녁식사 후 치솔질 실천율은 77.4%였다.
- 성별 : 여자가 80.5%로 남자 74.4%보다 6.1%p 높았다.


(4) 어제 잠자기 전 치솔질 실천율

- 울주군의 어제 잠자기 전 치솔질 실천율은 63.9%였다.
- 성별 : 여자가 65.1%로 남자 62.8%보다 2.3%p 높았다.


【울산 선택지표】

라. 연간 치과병의원 이용률

- 울주군의 연간 치과병의원 이용률은 40.6%였다.
- 성별 : 여자가 40.9%로 남자 40.3%보다 0.6%p 높았다.
- 연령대별 : 50대가 46.2%로 가장 높았고, 40대가 40.8%로 뒤를 이었다.



〈그림 41〉 치솔질 실천율



〈그림 42〉 연간 치과병원 이용률

8. 정신건강

가. 스트레스 인지율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 스트레스 인지율은 20.1%로 울산광역시의 23.8%보다 3.7%p 낮았다.
- 성별 : 여자가 20.3%로 남자 19.9%보다 0.4%p 높았다.
- 연령대별 : 30대가 30.7%로 가장 높았고, 20대가 19.6%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 20.1%로 2017년 25.5%에 비해 5.4%p 감소하였으며, 2014년 27.3%에 비해 7.2%p 감소하였다.

다. 우울증상유병률


- 울주군의 우울증상유병률은 1.1%였다.
- 성별 : 여자가 1.3%로 남자 1.0%보다 0.3%p 높았다.
- 연령대별 : 60대가 1.8%로 가장 높았고, 20대가 1.7%로 뒤를 이었다.

나. 우울감 경험률


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 우울감 경험률은 1.1%로 울산광역시의 4.7%보다 3.6%p 낮았다.
- 성별 : 여자가 1.8%로 남자 0.5%보다 1.3%p 높았다.
- 연령대별 : 50대가 2.6%로 가장 높았고, 70세 이상이 1.4%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 1.1%로 2017년 3.0%에 비해 1.9%p 감소하였으며, 2014년 4.8%에 비해 3.7%p 감소하였다.



〈그림 43〉 스트레스 인지율



〈그림 44〉 우울감 경험률



〈그림 45〉 우울증상유병률

라. 인지장애 경험률(≥50)


- 울주군의 인지장애 경험률(≥50)은 9.2%였다.
- 성별 : 여자가 12.8%로 남자 5.5%보다 7.3%p 높았다.
- 연령대별 : 70세 이상이 15.5%로 가장 높았고, 50대가 8.4%로 뒤를 이었다.

바. 연간 치매 선별 검사 수진율(≥50)


- 울주군의 연간 치매 선별 검사 수진율(≥50)은 9.2%였다.
- 성별 : 여자가 13.0%로 남자 5.5%보다 7.5%p 높았다.
- 연령대별 : 70세 이상이 27.2%로 가장 높았고, 60대가 8.8%로 뒤를 이었다.

마. 인지장애로 인한 일상생활 지장률(≥50)


- 울주군의 인지장애로 인한 일상생활 지장률(≥50)은 3.9%였다.
- 성별 : 여자에서만 3.3%로 나타났다.
- 연령대별 : 70세 이상에서만 9.5%로 나타났다.



〈그림 46〉 인지장애 경험률(≥50)



〈그림 47〉 인지장애로 인한 일상생활 지장률(≥50)



〈그림 48〉 연간 치매 선별 검사 수진율(≥50)

【울산 선택지표】

사. 정신건강증진센터 인지율

- 울주군의 정신건강증진센터 인지율은 12.1%였다.
- 성별 : 여자가 14.3%로 남자 10.1%보다 4.2%p 높았다.
- 연령대별 : 40대가 16.9%로 가장 높았고, 50대가 16.4%로 뒤를 이었다.

【울산 선택지표】


자. 치매 예방관리 프로그램 참여 희망률

- 울주군의 치매 예방관리 프로그램 참여 희망률은 15.4%였다.
- 성별 : 여자가 22.7%로 남자 8.7%보다 14.0%p 높았다.
- 연령대별 : 60대가 30.5%로 가장 높았고, 70세 이상이 29.5%로 뒤를 이었다.


【울산 선택지표】

아. 평생 치매 예방관리 프로그램 참여 경험률


- 울주군의 평생 치매 예방관리 프로그램 참여 경험률은 2.2%였다.
- 성별 : 여자가 3.6%로 남자 1.0%보다 2.6%p 높았다.
- 연령대별 : 70세 이상이 6.7%로 가장 높았고, 60대가 2.8%로 뒤를 이었다.



〈그림 49〉 정신건강증진센터 인지율



〈그림 50〉 평생 치매 예방관리 프로그램 참여 경험률



〈그림 51〉 치매 예방관리 프로그램 참여 희망률

제 2 부 주요통계결과

Ⅱ. 예방접종

1. 예방접종




Ⅱ. 예방접종

1. 예방접종

가. 연간 인플루엔자 예방접종률

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간 인플루엔자 예방접종률은 39.9%로 울산광역시의 42.0%보다 2.1%p 낮았다.
- 성별 : 여자가 42.4%로 남자 37.5%보다 4.9%p 높았다.
- 연령대별 : 70세 이상이 81.3%로 가장 높았고, 60대가 57.9%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 39.9%로 2017년 38.4%에 비해 1.5%p 증가하였으며, 2014년 33.5%에 비해 6.4%p 증가하였다.



〈그림 52〉 연간 인플루엔자 예방접종률

제 2 부 주요통계결과

Ⅲ. 이환 및 의료이용

1. 주요 질환별 진단 경험률
및 관리행태
2. 의료이용



Ⅲ. 이환 및 의료이용

1. 주요 질환별 진단 경험률 및 관리행태

가. 고혈압

(1) 고혈압 진단 경험률(≥30)


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 고혈압 진단 경험률(≥30)은 21.4%로 울산광역시의 20.7%보다 0.7%p 높았다.
- 성별 : 여자가 22.5%로 남자 20.3%보다 2.2%p 높았다.
- 연령대별 : 70세 이상이 44.2%로 가장 높았고, 60대가 37.8%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 21.4%로 2017년 21.1%에 비해 0.3%p 증가하였으며, 2014년 20.8%에 비해 0.6%p 증가하였다.

(3) 고혈압 관리교육 이수율(≥30)


- 울주군의 고혈압 관리교육 이수율(≥30)은 13.9%였다.
- 성별 : 남자가 18.6%로 여자 9.6%보다 9.0%p 높았다.
- 연령대별 : 50대가 20.9%로 가장 높았고, 70세 이상이 9.4%로 뒤를 이었다.

(2) 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)


- 울주군의 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)은 95.3%였다.
- 성별 : 남자가 97.6%로 여자 93.2%보다 4.4%p 높았다.
- 연령대별 : 70세 이상이 96.4%로 가장 높았고, 60대와 50대가 96.1%로 뒤를 이었다.



〈그림 53〉 고혈압 진단 경험률(≥30)



〈그림 54〉 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)



〈그림 55〉 고혈압 관리교육 이수율(≥30)

나. 당뇨병

(1) 당뇨병 진단 경험률(≥ 30)


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 당뇨병 진단 경험률(≥ 30)은 10.3%로 울산광역시의 9.0%보다 1.3%p 높았다.
- 성별 : 남자가 10.4%로 여자 10.3%보다 0.1%p 높았다.
- 연령대별 : 60대가 23.9%로 가장 높았고, 70세 이상이 22.0%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 10.3%로 2017년 11.5%에 비해 1.2%p 감소하였으며, 2014년 9.6%에 비해 0.7%p 증가하였다.

(2) 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥ 30)


- 울주군의 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥ 30)은 90.7%였다.
- 성별 : 남자가 92.1%로 여자 89.2%보다 2.9%p 높았다.
- 연령대별 : 70세 이상이 92.7%로 가장 높았고, 60대가 89.4%로 뒤를 이었다.

(3) 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)


- 울주군의 당뇨병 관리교육 이수율(≥ 30)은 12.2%였다.
- 성별 : 남자가 18.0%로 여자 6.3%보다 11.7%p 높았다.
- 연령대별 : 60대가 10.1%로 가장 높았고, 70세 이상이 3.9%로 뒤를 이었다.



〈그림 56〉 당뇨병 진단 경험률(≥30)



〈그림 57〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30)




〈그림 58〉 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)

(4) 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사 (안저검사) 수진율(≥30)


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥30)은 40.5%로 울산광역시의 38.9%보다 1.6%p 높았다.
- 성별 : 여자가 47.9%로 남자 33.3%보다 14.6%p 높았다.
- 연령대별 : 70세 이상이 54.9%로 가장 높았고, 60대가 40.2%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 40.5%로 2017년 28.2%에 비해 12.3%p 증가하였으며, 2014년 30.0%에 비해 10.5%p 증가하였다.

(5) 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사 (미세단백뇨검사) 수진율(≥30)

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥30)은 59.2%로 울산광역시의 45.7%보다 13.5%p 높았다.
- 성별 : 여자가 60.5%로 남자 58.0%보다 2.5%p 높았다.
- 연령대별 : 70세 이상이 71.0%로 가장 높았고, 60대가 60.1%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 59.2%로 2017년 47.4%에 비해 11.8%p 증가하였으며, 2014년 36.0%에 비해 23.2%p 증가하였다.



〈그림 59〉 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥30)



〈그림 60〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥30)

【울산 선택지표】

다. 연간 평균 혈압 측정횟수

- 울주군의 연간 평균 혈압 측정횟수는 14.6회였다.
- 성별 : 남자가 14.7회로 여자 14.5회보다 0.2회 높았다.
- 연령대별 : 50대가 26.2회로 가장 높았고, 70세 이상이 21.1회로 뒤를 이었다.

【울산 선택지표】


마. 대사증후군 인지율

- 울주군의 대사증후군 인지율은 37.5%였다.
- 성별 : 여자가 37.9%로 남자 37.1%보다 0.8%p 높았다.
- 연령대별 : 40대가 49.5%로 가장 높았고, 20대가 45.6%로 뒤를 이었다.


【울산 선택지표】

라. 연간 평균 혈당 측정횟수


- 울주군의 연간 평균 혈당 측정횟수는 7.1회였다.
- 성별 : 남자가 7.9회로 여자 6.2회보다 1.7회 높았다.
- 연령대별 : 50대가 11.9회로 가장 높았고, 60대가 11.8회로 뒤를 이었다.



〈그림 61〉 연간 평균 혈압 측정횟수



〈그림 62〉 연간 평균 혈당 측정횟수




〈그림 63〉 대사증후군 인지율

2. 의료이용

가. 연간 미충족의료율¹⁾

- 울주군의 연간 미충족의료율은 4.2%였다.
- 성별 : 여자가 4.3%로 남자 4.1%보다 0.2%p 높았다.
- 연령대별 : 40대가 5.4%로 가장 높았고, 30대가 5.1%로 뒤를 이었다.

1) 2008년 지표정의 : 최근 1년간 필요한 의료서비스를 받지 못한 사람 수×100 / 조사대상 인구 수
 2009년 지표정의 : 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수
 2010년 지표정의 : 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 포함)를 받지 못한 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수



〈그림 64〉 연간 미충족의료율

제 2 부 주요통계결과

Ⅳ. 사고 및 중독


1. 연간 사고 및 중독 경험률



IV. 사고 및 중독

1. 연간 사고 및 중독 경험률

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간 사고 및 중독 경험률은 3.0%로 울산광역시의 4.4%보다 1.4%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 4.0%로 여자 2.0%보다 2.0%p 높았다.
- 연령대별 : 70세 이상이 4.9%로 가장 높았고, 60대가 4.7%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 3.0%로 2017년 3.3%에 비해 0.3%p 감소하였으며, 2014년 2.8%에 비해 0.2%p 증가하였다.



〈그림 65〉 연간 사고 및 중독 경험률

제 2 부 주요통계결과

V. 활동제한 및 삶의 질


1. 양호한 주관적 건강수준 인지율



V. 활동제한 및 삶의 질

1. 양호한 주관적 건강수준 인지율

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 양호한 주관적 건강수준 인지율은 58.1%로 울산광역시의 45.4%보다 12.7%p 높았다.
- 성별 : 남자가 60.8%로 여자 55.2%보다 5.6%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 69.3%로 가장 높았고, 30대가 63.0%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2018년 58.1%로 2017년 48.9%에 비해 9.2%p 증가하였으며, 2014년 42.0%에 비해 16.1%p 증가하였다.



〈그림 66〉 양호한 주관적 건강수준 인지도

제 2 부 주요통계결과

VI. 개인위생

1. 기침예절 실천율




VI. 개인위생

【울산 선택지표】

1. 기침예절 실천율

- 울주군의 기침예절 실천율은 38.1%였다.
- 성별 : 여자가 45.7%로 남자 30.9%보다 14.8%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 55.3%로 가장 높았고, 30대가 54.7%로 뒤를 이었다.



〈그림 67〉 기침예절 실천율

제 2 부 주요통계결과

VII. 여성건강

1. 출산 경험률
2. 최초 출산연령



VII. 여성건강

【울산 선택지표】


1. 출산 경험률

- 울주군의 출산 경험률은 69.8%였다.
- 연령대별 : 50대가 94.7%로 가장 높았고, 40대가 90.0%로 뒤를 이었다.


【울산 선택지표】

2. 최초 출산연령

- 울주군의 최초 출산연령은 27.6세다.
- 연령대별 : 30대가 29.6세로 가장 높았고, 40대가 28.0세로 뒤를 이었다.



〈그림 68〉 출산 경험률



〈그림 69〉 최초 출산연령



제3부 통계표

I. 통계표

CHS

Community Health Survey

제 3 부 통계표

I. 통계표



〈표 1〉 흡연시작연령¹⁾

(단위 : 세)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	325	19.7(0.2)	1.1	313	19.3(0.2)	1.0	12	-(-)	-
연령									
19-29	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	43	18.8(0.5)	2.4	41	18.8(0.5)	2.5	2	-(-)	-
40-49	72	19.2(0.2)	1.0	72	19.2(0.2)	1.0	0	-(-)	-
50-59	86	20.1(0.4)	1.9	80	19.2(0.3)	1.6	6	-(-)	-
60-69	62	20.7(0.7)	3.6	60	20.0(0.5)	2.6	2	-(-)	-
70 이상	45	20.8(1.1)	5.3	43	20.4(1.0)	5.0	2	-(-)	-
19-64	245	19.5(0.2)	1.1	235	19.0(0.2)	0.9	10	-(-)	-
65 이상	80	20.4(0.6)	3.2	78	20.2(0.6)	3.1	2	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	4	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-
초등학교	28	20.9(1.3)	6.4	25	18.9(0.6)	3.1	3	-(-)	-
중학교	31	20.6(1.4)	6.6	29	19.3(0.9)	4.7	2	-(-)	-
고등학교	154	19.1(0.2)	1.2	150	18.9(0.2)	1.0	4	-(-)	-
대학교 이상	108	19.9(0.3)	1.7	107	19.9(0.3)	1.8	1	-(-)	-
직업									
전문행정관리	39	20.7(0.7)	3.5	38	20.7(0.7)	3.6	1	-(-)	-
사무직	42	19.2(0.3)	1.6	42	19.2(0.3)	1.6	0	-(-)	-
판매·서비스직	19	-(-)	-	16	-(-)	-	3	-(-)	-
농림어업	27	20.1(0.9)	4.4	27	20.1(0.9)	4.4	0	-(-)	-
기능단순노무직	116	19.1(0.3)	1.3	114	18.9(0.3)	1.5	2	-(-)	-
기타 ³⁾	82	19.5(0.5)	2.4	76	18.8(0.3)	1.7	6	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	16	-(-)	-	15	-(-)	-	1	-(-)	-
101-200만원 미만	33	19.7(0.7)	3.5	32	19.4(0.8)	4.1	1	-(-)	-
201-300만원 미만	43	19.8(0.4)	2.1	41	19.4(0.5)	2.8	2	-(-)	-
301-400만원 미만	91	19.0(0.4)	2.0	88	18.6(0.3)	1.5	3	-(-)	-
400만원 이상	135	19.9(0.3)	1.7	130	19.7(0.3)	1.6	5	-(-)	-

주 : 1) 흡연시작연령 : 처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 2〉 현재흡연율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	18.9(1.3)	7.1	448	35.4(2.2)	6.3	464	1.2(0.5)	40.1
연령									
19-29	121	12.2(3.1)	25.0	60	21.7(5.0)	23.2	61	0.0(0.0)	.
30-39	123	28.7(3.7)	12.9	58	53.5(6.2)	11.6	65	1.4(1.3)	98.9
40-49	187	25.4(3.1)	12.3	95	49.4(5.2)	10.5	92	0.0(0.0)	.
50-59	208	21.5(2.9)	13.3	107	36.8(5.0)	13.5	101	3.8(1.9)	49.3
60-69	145	13.2(3.0)	22.9	73	25.4(5.4)	21.4	72	1.4(1.4)	100.1
70 이상	128	3.2(1.4)	44.0	55	7.5(3.3)	44.7	73	0.0(0.0)	.
19-64	714	21.2(1.5)	7.2	351	39.1(2.5)	6.5	363	1.5(0.6)	40.0
65 이상	198	7.7(2.2)	28.5	97	16.0(4.5)	27.8	101	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	50	0.0(0.0)	.	4	-(-)	-	46	0.0(0.0)	.
초등학교	95	12.1(3.1)	25.6	35	24.3(6.9)	28.5	60	5.6(3.2)	56.3
중학교	74	14.8(4.9)	33.5	34	29.9(9.6)	32.2	40	2.4(2.4)	100.4
고등학교	382	24.1(2.3)	9.6	211	40.9(3.5)	8.5	171	1.0(0.7)	71.3
대학교 이상	311	17.2(1.9)	11.2	164	31.8(3.4)	10.6	147	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	91	21.0(4.3)	20.3	54	34.3(5.9)	17.2	37	0.0(0.0)	.
사무직	112	20.2(3.7)	18.2	62	34.6(5.5)	15.8	50	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	83	13.8(3.7)	27.1	22	38.3(11.0)	28.7	61	4.6(2.7)	59.7
농림어업	54	18.8(5.8)	31.0	33	31.7(8.5)	26.8	21	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	183	40.1(4.1)	10.1	154	46.2(4.6)	9.9	29	3.3(3.2)	96.7
기타 ³⁾	389	8.0(1.3)	16.2	123	22.5(3.4)	15.1	266	0.7(0.5)	71.2
월 가구소득									
100만원 미만	48	10.5(4.7)	44.7	19	-(-)	-	29	3.9(3.8)	99.1
101-200만원 미만	91	8.2(2.7)	32.4	39	18.8(5.9)	31.4	52	0.0(0.0)	.
201-300만원 미만	134	15.0(3.0)	19.7	66	30.1(5.9)	19.5	68	0.0(0.0)	.
301-400만원 미만	233	23.3(2.4)	10.3	114	45.4(4.2)	9.2	119	0.8(0.8)	99.6
400만원 이상	395	19.3(2.0)	10.6	203	33.8(3.3)	9.9	192	1.8(0.9)	47.5

주 : 1) 현재흡연율 : (평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수 / 조사대상 응답자 수 × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 3〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량¹⁾

(단위 : %, 개비)

구분	N ²⁾	10개비 미만		10-19개비		20-39개비		40개비 이상		평균	
		% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	개비 (표준오차)	변동 계수
전체	150	8.8(2.5)	28.4	48.8(3.5)	7.2	40.6(3.6)	8.8	1.7(0.9)	55.5	15.8(0.6)	3.5
성											
남자	145	7.8(2.5)	31.9	48.6(3.6)	7.4	41.8(3.7)	8.8	1.8(1.0)	55.7	15.9(0.6)	3.7
여자	5	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—
연령											
19-29	12	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—
30-39	31	6.2(4.4)	70.0	62.6(8.5)	13.6	31.2(8.7)	27.8	0.0(0.0)	.	15.0(1.1)	7.3
40-49	44	12.9(5.7)	44.2	39.2(7.0)	17.8	45.6(7.9)	17.3	2.2(2.2)	98.7	16.0(1.0)	6.5
50-59	39	8.5(4.0)	46.9	36.6(6.1)	16.8	50.7(5.9)	11.7	4.3(3.0)	69.6	17.1(1.2)	7.1
60-69	19	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—
70 이상	5	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—
19-64	135	9.5(2.7)	28.4	48.7(3.7)	7.6	40.0(3.8)	9.4	1.8(1.0)	55.2	15.8(0.6)	3.7
65 이상	15	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—
교육수준 ³⁾											
무학	0	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—
초등학교	10	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—
중학교	10	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—
고등학교	84	6.9(3.1)	44.0	47.5(5.3)	11.1	43.3(5.1)	11.8	2.2(1.5)	65.3	16.4(0.8)	4.9
대학교 이상	46	11.0(4.2)	38.7	51.3(7.3)	14.2	37.8(7.5)	19.8	0.0(0.0)	.	14.8(0.8)	5.5
직업											
전문행정관리	16	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—
사무직	19	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—
판매·서비스직	11	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—
농림어업	10	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—
기능단순노무직	70	10.3(4.1)	40.2	43.1(5.7)	13.2	45.2(5.3)	11.7	1.4(1.4)	96.0	16.4(0.7)	4.5
기타 ⁴⁾	24	0.0(0.0)	.	77.4(8.0)	10.4	22.6(8.0)	35.6	0.0(0.0)	.	13.6(0.8)	5.6
월 가구소득											
100만원 미만	4	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—
101-200만원 미만	7	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—
201-300만원 미만	17	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—	—(-)	—
301-400만원 미만	48	10.3(5.1)	49.7	49.5(7.6)	15.4	38.1(6.5)	17.1	2.1(2.1)	97.6	15.6(1.0)	6.2
400만원 이상	68	7.3(3.2)	44.2	51.9(3.9)	7.5	38.6(4.2)	11.0	2.2(1.4)	66.1	16.1(0.8)	5.1

주 : 1) 매일흡연자의 하루 평균 흡연량 : 하루 평균 흡연개비 수의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일흡연자 수

2) 평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일흡연자 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 4〉 현재흡연자의 금연시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	161	37.3(3.9)	10.4	155	36.8(4.0)	10.8	6	-()	-
연령									
19-29	13	-()	-	13	-()	-	0	-()	-
30-39	33	40.1(7.8)	19.3	32	41.0(8.1)	19.6	1	-()	-
40-49	47	33.5(7.1)	21.2	47	33.5(7.1)	21.2	0	-()	-
50-59	43	42.6(8.8)	20.7	39	41.3(9.4)	22.7	4	-()	-
60-69	20	24.1(9.1)	37.7	19	-()	-	1	-()	-
70 이상	5	-()	-	5	-()	-	0	-()	-
19-64	145	38.4(4.2)	10.9	139	37.9(4.3)	11.4	6	-()	-
65 이상	16	-()	-	16	-()	-	0	-()	-
교육수준 ²⁾									
무학	0	-()	-	0	-()	-	0	-()	-
초등학교	12	-()	-	9	-()	-	3	-()	-
중학교	10	-()	-	9	-()	-	1	-()	-
고등학교	89	35.9(5.2)	14.5	87	36.5(5.3)	14.5	2	-()	-
대학교 이상	50	37.4(6.7)	17.9	50	37.4(6.7)	17.9	0	-()	-
직업									
전문행정관리	17	-()	-	17	-()	-	0	-()	-
사무직	22	48.1(12.2)	25.3	22	48.1(12.2)	25.3	0	-()	-
판매·서비스직	12	-()	-	9	-()	-	3	-()	-
농림어업	10	-()	-	10	-()	-	0	-()	-
기능단순노무직	72	40.3(6.3)	15.7	71	39.6(6.4)	16.2	1	-()	-
기타 ³⁾	28	30.6(8.1)	26.5	26	32.5(8.9)	27.5	2	-()	-
월 가구소득									
100만원 미만	5	-()	-	4	-()	-	1	-()	-
101-200만원 미만	7	-()	-	7	-()	-	0	-()	-
201-300만원 미만	19	-()	-	19	-()	-	0	-()	-
301-400만원 미만	51	33.9(5.8)	17.2	50	32.7(5.7)	17.5	1	-()	-
400만원 이상	73	37.7(6.1)	16.3	69	38.0(6.4)	16.7	4	-()	-

주 : 1) 현재흡연자의 금연시도율 : (최근 1년 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 수 / 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 5〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	161	6.7(2.1)	31.7	155	6.9(2.2)	31.5	6	-()	-
연령									
19-29	13	-()	-	13	-()	-	0	-()	-
30-39	33	6.1(4.3)	70.2	32	6.3(4.4)	69.9	1	-()	-
40-49	47	8.8(4.8)	54.6	47	8.8(4.8)	54.6	0	-()	-
50-59	43	9.0(4.2)	46.2	39	9.8(4.6)	46.7	4	-()	-
60-69	20	3.8(3.7)	98.8	19	-()	-	1	-()	-
70 이상	5	-()	-	5	-()	-	0	-()	-
19-64	145	6.8(2.2)	32.8	139	7.0(2.3)	32.7	6	-()	-
65 이상	16	-()	-	16	-()	-	0	-()	-
교육수준 ²⁾									
무학	0	-()	-	0	-()	-	0	-()	-
초등학교	12	-()	-	9	-()	-	3	-()	-
중학교	10	-()	-	9	-()	-	1	-()	-
고등학교	89	4.8(2.5)	51.5	87	4.9(2.5)	51.3	2	-()	-
대학교 이상	50	11.8(4.7)	39.4	50	11.8(4.7)	39.4	0	-()	-
직업									
전문행정관리	17	-()	-	17	-()	-	0	-()	-
사무직	22	18.4(7.1)	38.6	22	18.4(7.1)	38.6	0	-()	-
판매·서비스직	12	-()	-	9	-()	-	3	-()	-
농림어업	10	-()	-	10	-()	-	0	-()	-
기능단순노무직	72	6.3(3.3)	52.1	71	6.4(3.4)	52.6	1	-()	-
기타 ³⁾	28	1.9(1.9)	99.3	26	2.1(2.1)	99.3	2	-()	-
월 가구소득									
100만원 미만	5	-()	-	4	-()	-	1	-()	-
101-200만원 미만	7	-()	-	7	-()	-	0	-()	-
201-300만원 미만	19	-()	-	19	-()	-	0	-()	-
301-400만원 미만	51	6.5(3.7)	56.4	50	6.6(3.8)	57.3	1	-()	-
400만원 이상	73	7.8(3.4)	44.1	69	8.2(3.5)	43.5	4	-()	-

주 : 1) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률 : 1개월 내 금연계획이 있는 사람의 수 / 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수 × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 6〉 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	751	1.2(0.4)	36.9	293	0.0(0.0)	.	458	2.0(0.7)	36.7
연령									
19-29	108	0.0(0.0)	.	47	0.0(0.0)	.	61	0.0(0.0)	.
30-39	90	0.0(0.0)	.	26	0.0(0.0)	.	64	0.0(0.0)	.
40-49	140	0.7(0.7)	100.2	48	0.0(0.0)	.	92	1.0(1.0)	100.2
50-59	165	2.7(1.5)	56.8	68	0.0(0.0)	.	97	4.7(2.6)	55.5
60-69	125	1.0(1.0)	100.2	54	0.0(0.0)	.	71	1.7(1.7)	100.0
70 이상	123	2.5(1.5)	59.5	50	0.0(0.0)	.	73	4.2(2.4)	56.7
19-64	569	1.0(0.5)	45.9	212	0.0(0.0)	.	357	1.7(0.8)	45.6
65 이상	182	1.7(1.0)	59.9	81	0.0(0.0)	.	101	3.0(1.7)	57.8
교육수준 ²⁾									
무학	50	7.9(4.0)	50.4	4	-(-)	-	46	8.7(4.3)	49.3
초등학교	83	1.5(1.4)	97.5	26	0.0(0.0)	.	57	2.1(2.0)	98.1
중학교	64	3.8(2.8)	73.0	25	0.0(0.0)	.	39	6.0(4.3)	72.3
고등학교	293	0.9(0.6)	72.5	124	0.0(0.0)	.	169	1.6(1.1)	71.9
대학교 이상	261	0.0(0.0)	.	114	0.0(0.0)	.	147	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	74	3.3(2.4)	72.2	37	0.0(0.0)	.	37	6.7(4.8)	71.0
사무직	90	0.0(0.0)	.	40	0.0(0.0)	.	50	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	71	0.0(0.0)	.	13	-(-)	-	58	0.0(0.0)	.
농림어업	44	1.9(2.0)	104.3	23	0.0(0.0)	.	21	3.8(3.9)	103.3
기능단순노무직	111	0.9(0.8)	98.6	83	0.0(0.0)	.	28	3.7(3.6)	98.0
기타 ³⁾	361	1.3(0.6)	46.2	97	0.0(0.0)	.	264	1.8(0.8)	46.0
월 가구소득									
100만원 미만	43	2.0(1.9)	96.8	15	-(-)	-	28	3.2(3.0)	94.0
101-200만원 미만	84	0.0(0.0)	.	32	0.0(0.0)	.	52	0.0(0.0)	.
201-300만원 미만	115	1.8(1.3)	72.8	47	0.0(0.0)	.	68	3.0(2.1)	71.3
301-400만원 미만	182	0.9(0.6)	72.1	64	0.0(0.0)	.	118	1.4(1.0)	72.0
400만원 이상	322	1.3(0.7)	52.9	134	0.0(0.0)	.	188	2.4(1.2)	52.1

주 : 1) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 : (최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 7〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	381	7.5(1.5)	19.6	191	9.8(2.4)	24.8	190	5.0(1.8)	35.3
연령									
19-29	43	7.8(4.1)	52.7	18	-(-)	-	25	4.6(4.2)	92.9
30-39	60	3.6(2.5)	69.4	25	7.5(5.0)	66.0	35	0.0(0.0)	.
40-49	93	7.3(2.9)	39.2	47	6.2(4.5)	73.1	46	8.6(4.0)	47.0
50-59	103	10.8(3.4)	32.0	55	14.0(5.0)	35.6	48	6.6(3.9)	58.2
60-69	56	7.4(3.5)	47.1	30	9.6(5.2)	53.5	26	4.8(4.7)	97.1
70 이상	26	4.9(1.0)	20.5	16	-(-)	-	10	-(-)	-
19-64	325	7.6(1.6)	21.4	158	10.1(2.8)	27.2	167	5.0(1.9)	37.9
65 이상	56	6.4(2.7)	41.8	33	7.3(3.1)	41.7	23	5.2(5.1)	97.2
교육수준 ²⁾									
무학	11	-(-)	-	2	-(-)	-	9	-(-)	-
초등학교	29	4.0(3.6)	90.4	10	-(-)	-	19	-(-)	-
중학교	28	7.6(3.0)	39.2	12	-(-)	-	16	-(-)	-
고등학교	139	11.8(2.9)	24.6	73	12.0(3.7)	30.6	66	11.5(4.5)	39.5
대학교 이상	174	5.0(2.2)	44.9	94	8.9(3.9)	43.5	80	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	73	6.1(2.7)	45.0	36	8.1(3.9)	48.9	37	4.2(4.1)	99.5
사무직	90	5.0(2.3)	47.0	40	7.7(4.4)	56.6	50	2.5(2.4)	96.7
판매·서비스직	68	6.8(3.0)	44.6	13	-(-)	-	55	6.6(3.3)	50.0
농림어업	40	3.2(3.0)	94.9	20	0.0(0.0)	.	20	6.2(5.6)	90.7
기능단순노무직	109	12.4(3.5)	28.6	81	14.0(4.6)	33.2	28	7.1(4.8)	67.3
기타 ³⁾	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
101-200만원 미만	30	11.2(5.7)	50.6	14	-(-)	-	16	-(-)	-
201-300만원 미만	45	7.9(3.1)	38.9	19	-(-)	-	26	2.8(2.7)	97.2
301-400만원 미만	101	3.1(1.8)	58.1	50	6.0(3.4)	56.7	51	0.0(0.0)	.
400만원 이상	200	8.8(2.0)	23.3	104	9.6(3.0)	31.0	96	7.7(3.1)	40.7

주 : 1) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 : (최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 8〉 금연구역 관련 법률 인지도¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	909	85.9(1.3)	1.6	447	87.3(1.7)	2.0	462	84.3(1.7)	2.1
연령									
19-29	121	87.7(3.4)	3.8	60	85.0(5.1)	6.0	61	91.2(3.1)	3.4
30-39	123	89.3(3.1)	3.4	58	88.2(4.6)	5.2	65	90.5(4.1)	4.5
40-49	184	89.1(2.1)	2.4	94	90.0(3.0)	3.3	90	88.1(3.2)	3.6
50-59	208	84.0(3.2)	3.8	107	86.0(4.1)	4.8	101	81.8(3.7)	4.5
60-69	145	89.3(2.8)	3.1	73	93.3(2.9)	3.1	72	85.4(3.8)	4.4
70 이상	128	72.0(4.1)	5.7	55	79.5(5.1)	6.4	73	66.5(5.5)	8.3
19-64	711	87.7(1.4)	1.6	350	87.8(1.9)	2.2	361	87.7(1.6)	1.8
65 이상	198	76.9(3.2)	4.2	97	85.0(3.1)	3.7	101	69.5(5.0)	7.1
교육수준 ²⁾									
무학	50	55.8(8.3)	14.9	4	-(-)	-	46	56.2(8.0)	14.2
초등학교	95	82.8(3.9)	4.8	35	72.9(7.3)	10.0	60	88.1(4.1)	4.6
중학교	74	81.7(4.5)	5.5	34	92.2(4.3)	4.7	40	73.2(6.6)	9.1
고등학교	381	87.1(1.9)	2.2	211	89.0(2.4)	2.8	170	84.6(2.7)	3.1
대학교 이상	309	89.4(1.7)	1.9	163	87.3(2.8)	3.2	146	91.9(2.3)	2.5
직업									
전문행정관리	91	95.3(2.3)	2.4	54	93.8(3.6)	3.8	37	97.8(2.2)	2.3
사무직	112	85.9(3.0)	3.5	62	81.5(4.7)	5.8	50	92.2(4.3)	4.6
판매·서비스직	82	82.8(4.2)	5.0	22	85.6(7.7)	9.0	60	81.7(4.8)	5.9
농림어업	54	85.4(6.8)	7.9	33	83.9(8.2)	9.8	21	87.5(6.7)	7.6
기능단순노무직	182	88.6(2.4)	2.7	153	90.2(2.5)	2.8	29	78.8(7.3)	9.3
기타 ³⁾	388	82.7(2.0)	2.5	123	84.8(3.4)	4.1	265	81.6(2.5)	3.0
월 가구소득									
100만원 미만	48	71.5(7.2)	10.0	19	-(-)	-	29	71.0(8.4)	11.8
101-200만원 미만	90	81.0(4.6)	5.7	38	86.8(5.4)	6.2	52	76.6(6.4)	8.4
201-300만원 미만	134	84.9(3.2)	3.7	66	82.9(4.8)	5.8	68	86.8(3.3)	3.8
301-400만원 미만	233	91.0(2.2)	2.4	114	92.8(2.1)	2.2	119	89.1(3.5)	3.9
400만원 이상	393	86.1(2.0)	2.3	203	87.8(2.4)	2.7	190	84.2(2.8)	3.3

주 : 1) 금연구역 관련 법률 인지도 : ('지정된 금연구역에서 흡연하면 일정액 이하의 과태료를 내야한다'와 '금연구역에서 전자담배를 피우는 것은 불법이다'에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 9〉 월간음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	58.2(2.0)	3.4	448	69.4(2.5)	3.7	464	46.3(2.8)	6.0
연령									
19-29	121	65.1(4.7)	7.2	60	66.0(6.6)	10.0	61	64.1(6.8)	10.5
30-39	123	72.4(4.8)	6.6	58	79.8(6.1)	7.6	65	64.1(6.8)	10.6
40-49	187	68.0(3.9)	5.7	95	75.2(4.9)	6.5	92	60.3(4.9)	8.1
50-59	208	55.8(2.9)	5.2	107	69.6(4.5)	6.5	101	40.0(4.9)	12.2
60-69	145	44.7(3.9)	8.8	73	61.1(6.0)	9.8	72	28.9(5.3)	18.3
70 이상	128	28.6(4.7)	16.4	55	54.1(7.6)	14.1	73	9.9(3.8)	38.0
19-64	714	63.1(2.1)	3.3	351	72.0(2.7)	3.7	363	53.3(2.9)	5.5
65 이상	198	34.3(3.9)	11.3	97	55.2(5.1)	9.3	101	15.1(3.8)	25.1
교육수준 ²⁾									
무학	50	14.2(6.0)	42.4	4	-(-)	-	46	8.7(5.1)	59.3
초등학교	95	32.0(5.1)	15.9	35	38.5(8.8)	22.9	60	28.5(6.0)	21.0
중학교	74	55.3(4.6)	8.3	34	73.6(6.1)	8.3	40	40.3(7.7)	19.2
고등학교	382	62.4(2.4)	3.8	211	69.0(3.3)	4.9	171	53.3(3.8)	7.1
대학교 이상	311	64.8(3.4)	5.2	164	73.5(3.9)	5.3	147	54.4(4.9)	9.0
직업									
전문행정관리	91	66.1(4.9)	7.4	54	73.3(6.9)	9.4	37	54.7(6.4)	11.8
사무직	112	75.6(4.3)	5.6	62	80.8(4.9)	6.1	50	68.3(7.4)	10.9
판매·서비스직	83	63.9(6.0)	9.4	22	60.4(11.2)	18.5	61	65.3(7.3)	11.1
농림어업	54	48.2(5.7)	11.7	33	64.3(7.5)	11.7	21	24.6(10.2)	41.5
기능단순노무직	183	71.2(3.6)	5.0	154	74.6(3.6)	4.8	29	50.1(8.7)	17.4
기타 ³⁾	389	43.3(2.8)	6.5	123	56.3(5.2)	9.2	266	36.8(3.2)	8.7
월 가구소득									
100만원 미만	48	32.7(7.3)	22.4	19	-(-)	-	29	18.0(8.4)	46.8
101-200만원 미만	91	42.4(5.4)	12.7	39	46.6(8.1)	17.4	52	39.1(7.3)	18.7
201-300만원 미만	134	52.8(4.4)	8.3	66	65.4(6.7)	10.3	68	40.3(5.2)	12.8
301-400만원 미만	233	59.3(3.8)	6.4	114	68.9(4.1)	5.9	119	49.5(5.4)	11.0
400만원 이상	395	64.1(2.9)	4.5	203	75.1(3.5)	4.7	192	51.0(4.4)	8.7

주 : 1) 월간음주율 : (최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 10〉 연간 음주자의 고위험음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	624	19.1(1.6)	8.5	345	26.4(2.7)	10.1	279	9.1(1.6)	17.1
연령									
19-29	96	10.1(3.4)	33.6	47	11.2(5.1)	46.0	49	8.9(3.2)	36.3
30-39	103	20.4(3.7)	18.0	53	29.8(6.6)	22.0	50	8.1(3.0)	36.3
40-49	140	27.2(4.2)	15.5	78	35.5(5.6)	15.8	62	16.4(4.9)	29.9
50-59	147	24.3(3.4)	14.0	85	34.9(5.1)	14.5	62	8.1(3.3)	41.0
60-69	86	9.7(2.9)	29.7	50	17.0(5.0)	29.3	36	0.0(0.0)	.
70 이상	52	8.9(4.1)	46.0	32	11.7(5.2)	44.8	20	4.2(4.2)	101.3
19-64	528	20.4(1.8)	8.6	285	28.3(2.9)	10.2	243	10.0(1.7)	17.0
65 이상	96	8.9(3.0)	33.4	60	12.9(4.2)	32.6	36	2.3(2.3)	102.0
교육수준 ²⁾									
무학	14	-(-)	-	3	-(-)	-	11	-(-)	-
초등학교	47	10.9(4.3)	39.8	17	-(-)	-	30	7.7(4.8)	61.8
중학교	51	13.4(5.1)	38.1	25	24.3(8.8)	36.0	26	2.9(2.9)	98.2
고등학교	277	25.2(3.1)	12.3	166	31.9(4.5)	14.1	111	14.0(3.3)	23.8
대학교 이상	235	15.3(2.3)	15.3	134	21.4(3.9)	18.0	101	6.6(2.1)	31.3
직업									
전문행정관리	66	24.8(4.4)	17.7	43	30.0(6.5)	21.7	23	14.0(5.5)	39.3
사무직	93	19.2(3.8)	19.7	54	24.5(5.6)	23.0	39	11.0(3.8)	34.7
판매·서비스직	61	17.2(5.4)	31.6	15	-(-)	-	46	15.6(5.7)	36.5
농림어업	36	16.2(7.0)	43.2	24	25.0(11.0)	43.9	12	-(-)	-
기능단순노무직	141	32.5(3.8)	11.6	124	35.8(4.2)	11.8	17	-(-)	-
기타 ³⁾	227	9.0(2.1)	23.6	85	12.6(4.7)	37.6	142	6.7(2.1)	30.8
월 가구소득									
100만원 미만	23	3.0(3.0)	99.6	10	-(-)	-	13	-(-)	-
101-200만원 미만	56	10.8(4.2)	38.3	26	16.9(7.1)	42.2	30	5.7(4.1)	72.0
201-300만원 미만	84	17.8(4.4)	24.5	49	26.0(7.3)	28.1	35	5.9(4.0)	68.2
301-400만원 미만	153	20.0(3.4)	17.1	81	30.9(5.3)	17.1	72	6.9(2.8)	40.8
400만원 이상	300	21.0(2.1)	10.0	173	26.3(3.2)	12.4	127	12.8(2.7)	21.4

주 : 1) 연간 음주자의 고위험음주율 : (최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 11〉 전체 고위험음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	13.4(1.2)	9.1	448	20.7(2.2)	10.4	464	5.6(1.0)	17.6
연령									
19-29	121	8.0(2.8)	35.4	60	8.7(4.1)	47.8	61	7.1(2.7)	37.9
30-39	123	17.3(3.2)	18.5	58	27.3(6.3)	23.1	65	6.3(2.3)	36.6
40-49	187	20.5(3.3)	16.1	95	29.4(4.7)	16.2	92	11.0(3.3)	30.2
50-59	208	17.1(2.5)	14.5	107	27.7(4.1)	14.9	101	4.9(2.0)	40.2
60-69	145	5.7(1.7)	30.6	73	11.6(3.5)	30.2	72	0.0(0.0)	.
70 이상	128	3.7(1.7)	45.5	55	7.1(3.2)	44.8	73	1.1(1.1)	101.1
19-64	714	15.3(1.4)	9.0	351	23.1(2.4)	10.6	363	6.7(1.2)	17.4
65 이상	198	4.3(1.4)	33.6	97	8.1(2.6)	32.5	101	0.8(0.8)	101.2
교육수준 ²⁾									
무학	50	0.0(0.0)	.	4	-(-)	-	46	0.0(0.0)	.
초등학교	95	5.4(2.3)	42.4	35	8.3(4.6)	55.7	60	3.9(2.5)	64.1
중학교	74	9.4(3.7)	39.0	34	18.5(6.7)	36.1	40	1.9(1.9)	98.7
고등학교	382	18.3(2.3)	12.7	211	25.0(3.6)	14.4	171	9.1(2.2)	24.2
대학교 이상	311	11.8(1.9)	15.9	164	17.9(3.3)	18.6	147	4.6(1.5)	32.2
직업									
전문행정관리	91	18.7(3.5)	18.6	54	24.9(5.7)	22.8	37	8.8(3.5)	39.7
사무직	112	16.0(3.1)	19.4	62	21.2(4.7)	22.3	50	8.7(3.2)	36.7
판매·서비스직	83	12.8(4.2)	33.0	22	15.5(8.3)	53.7	61	11.8(4.4)	37.7
농림어업	54	10.7(4.8)	45.0	33	18.1(8.2)	45.3	21	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	183	25.4(3.1)	12.3	154	29.1(3.6)	12.4	29	3.1(3.1)	99.1
기타 ³⁾	389	5.4(1.3)	24.7	123	8.9(3.4)	38.5	266	3.6(1.1)	30.7
월 가구소득									
100만원 미만	48	1.6(1.5)	95.5	19	-(-)	-	29	0.0(0.0)	.
101-200만원 미만	91	6.9(2.7)	39.9	39	11.2(5.1)	45.0	52	3.5(2.5)	71.8
201-300만원 미만	134	11.1(3.0)	27.3	66	19.3(5.9)	30.7	68	3.0(2.1)	70.4
301-400만원 미만	233	13.6(2.4)	17.8	114	22.7(4.0)	17.8	119	4.3(1.8)	42.0
400만원 이상	395	16.1(1.7)	10.4	203	22.4(2.8)	12.5	192	8.4(1.9)	22.1

주 : 1) 전체 고위험음주율 : (최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 12〉 연간 절주 또는 금주 시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	624	5.4(0.8)	14.6	345	6.4(1.3)	20.3	279	4.0(0.9)	22.3
연령									
19-29	96	5.6(2.5)	45.0	47	6.5(3.6)	55.1	49	4.4(2.5)	57.6
30-39	103	8.7(2.7)	31.3	53	9.5(3.6)	37.8	50	7.8(3.0)	39.2
40-49	140	3.9(1.4)	35.8	78	3.9(2.0)	52.1	62	3.9(2.4)	60.0
50-59	147	5.8(2.0)	34.1	85	8.5(2.9)	34.6	62	1.6(1.6)	97.1
60-69	86	1.3(1.2)	94.4	50	0.0(0.0)	.	36	3.1(2.9)	93.2
70 이상	52	5.7(4.1)	70.7	32	9.1(6.4)	69.9	20	0.0(0.0)	.
19-64	528	5.5(0.8)	14.9	285	6.6(1.3)	20.0	243	4.1(1.0)	24.1
65 이상	96	4.4(2.5)	58.2	60	5.1(3.7)	73.5	36	3.1(3.1)	98.3
교육수준 ²⁾									
무학	14	-(-)	-	3	-(-)	-	11	-(-)	-
초등학교	47	4.3(2.9)	68.4	17	-(-)	-	30	3.5(3.5)	98.9
중학교	51	8.1(4.6)	57.1	25	12.3(8.1)	66.4	26	4.1(3.9)	95.1
고등학교	277	5.7(1.4)	24.4	166	8.1(2.3)	27.9	111	1.8(1.3)	71.4
대학교 이상	235	4.9(1.2)	23.5	134	3.8(1.6)	41.2	101	6.5(1.8)	27.2
직업									
전문행정관리	66	8.8(2.7)	30.6	43	10.4(3.9)	38.0	23	5.4(1.0)	19.1
사무직	93	3.8(1.8)	46.5	54	3.4(2.3)	66.1	39	4.3(3.0)	69.0
판매·서비스직	61	3.3(2.3)	70.1	15	-(-)	-	46	2.8(2.7)	96.3
농림어업	36	0.0(0.0)	.	24	0.0(0.0)	.	12	-(-)	-
기능단순노무직	141	7.4(2.3)	30.9	124	8.3(2.6)	31.3	17	-(-)	-
기타 ³⁾	227	4.9(1.7)	34.4	85	5.1(3.8)	73.6	142	4.8(1.6)	32.8
월 가구소득									
100만원 미만	23	8.4(7.9)	93.7	10	-(-)	-	13	-(-)	-
101-200만원 미만	56	5.5(3.5)	64.2	26	4.3(4.3)	100.6	30	6.5(3.7)	57.8
201-300만원 미만	84	4.8(2.0)	42.3	49	3.8(2.7)	71.4	35	6.3(4.3)	67.0
301-400만원 미만	153	2.9(1.5)	51.6	81	4.2(2.1)	49.9	72	1.4(1.4)	97.4
400만원 이상	300	6.3(1.2)	18.6	173	7.4(1.8)	24.7	127	4.6(1.7)	37.1

주 : 1) 평생 음주예방교육 경험률 : (음주예방에 대한 교육을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 13〉 운전자석 안전벨트 착용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	585	95.7(0.9)	0.9	352	95.6(0.9)	1.0	233	95.8(1.3)	1.4
연령									
19-29	41	97.3(2.8)	2.8	25	95.9(4.1)	4.2	16	—(—)	—
30-39	103	95.1(2.1)	2.2	53	94.1(3.5)	3.7	50	96.3(2.6)	2.7
40-49	160	96.5(1.6)	1.6	92	96.8(1.8)	1.8	68	96.0(2.3)	2.3
50-59	162	94.0(2.1)	2.2	94	94.1(2.2)	2.3	68	93.8(3.0)	3.2
60-69	90	96.9(1.9)	1.9	64	97.2(2.0)	2.1	26	96.1(3.6)	3.8
70 이상	29	97.5(2.5)	2.6	24	97.0(3.0)	3.1	5	—(—)	—
19-64	514	95.5(0.9)	1.0	292	95.4(1.0)	1.1	222	95.7(1.4)	1.4
65 이상	71	97.5(1.8)	1.9	60	97.0(2.2)	2.2	11	—(—)	—
교육수준 ²⁾									
무학	0	—(—)	—	0	—(—)	—	0	—(—)	—
초등학교	26	93.1(4.8)	5.1	14	—(—)	—	12	—(—)	—
중학교	42	91.7(4.4)	4.8	27	91.1(5.9)	6.4	15	—(—)	—
고등학교	257	97.0(1.1)	1.1	162	97.1(1.2)	1.3	95	96.7(1.9)	1.9
대학교 이상	260	95.2(1.2)	1.3	149	94.8(1.4)	1.4	111	95.9(1.8)	1.8
직업									
전문행정관리	85	94.7(2.3)	2.4	52	96.3(2.5)	2.6	33	92.0(4.4)	4.7
사무직	98	99.0(0.9)	0.9	57	98.4(1.5)	1.5	41	100.0(0.0)	0.0
판매·서비스직	49	93.8(3.3)	3.5	17	—(—)	—	32	90.3(5.0)	5.5
농림어업	28	93.6(4.3)	4.6	23	92.0(5.2)	5.6	5	—(—)	—
기능단순노무직	160	92.7(1.9)	2.1	144	93.2(2.0)	2.1	16	—(—)	—
기타 ³⁾	165	98.1(1.0)	1.0	59	98.1(1.9)	1.9	106	98.2(1.3)	1.3
월 가구소득									
100만원 미만	8	—(—)	—	4	—(—)	—	4	—(—)	—
101-200만원 미만	38	100.0(0.0)	0.0	23	100.0(0.0)	0.0	15	—(—)	—
201-300만원 미만	81	96.1(2.0)	2.1	51	98.4(1.6)	1.6	30	92.1(5.2)	5.6
301-400만원 미만	161	95.0(1.7)	1.8	102	96.7(1.7)	1.7	59	91.7(3.2)	3.4
400만원 이상	292	95.3(1.1)	1.2	168	93.6(1.5)	1.6	124	97.8(1.2)	1.3

주 : 1) 운전자석 안전벨트 착용률 : (자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 / 자동차 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 14〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	844	94.0(0.9)	1.0	425	93.1(1.2)	1.3	419	95.0(1.2)	1.3
연령									
19-29	119	92.3(2.8)	3.0	60	95.2(2.7)	2.9	59	88.5(5.2)	5.9
30-39	117	92.1(2.7)	2.9	56	89.3(4.4)	4.9	61	95.4(2.6)	2.7
40-49	174	95.0(1.5)	1.5	89	91.3(2.7)	3.0	85	99.0(0.9)	1.0
50-59	197	93.8(1.8)	2.0	101	94.9(2.0)	2.1	96	92.5(2.7)	2.9
60-69	138	95.3(1.9)	2.0	69	91.9(3.6)	3.9	69	98.5(1.5)	1.5
70 이상	99	97.0(1.7)	1.8	50	97.4(2.6)	2.7	49	96.6(2.3)	2.4
19-64	679	93.6(1.0)	1.1	335	92.5(1.4)	1.5	344	94.8(1.4)	1.5
65 이상	165	96.4(1.2)	1.3	90	96.5(2.0)	2.1	75	96.4(2.1)	2.1
교육수준 ²⁾									
무학	30	95.7(4.1)	4.2	2	-(-)	-	28	100.0(0.0)	0.0
초등학교	86	96.5(2.1)	2.1	32	100.0(0.0)	0.0	54	94.6(3.2)	3.4
중학교	69	90.9(4.2)	4.6	33	90.4(5.6)	6.2	36	91.3(5.2)	5.7
고등학교	371	94.1(1.2)	1.2	204	92.0(1.8)	2.0	167	96.9(1.3)	1.3
대학교 이상	288	93.9(1.5)	1.6	154	94.5(1.8)	1.9	134	93.1(2.5)	2.7
직업									
전문행정관리	81	94.2(2.5)	2.6	49	98.0(2.0)	2.0	32	87.9(5.8)	6.6
사무직	107	95.9(2.0)	2.1	59	94.5(3.1)	3.3	48	97.8(2.2)	2.2
판매·서비스직	76	93.9(3.0)	3.2	20	100.0(0.0)	0.0	56	91.6(4.1)	4.5
농림어업	49	94.6(3.7)	3.9	29	93.5(4.3)	4.6	20	95.9(4.1)	4.2
기능단순노무직	175	87.5(2.6)	3.0	149	86.1(3.0)	3.5	26	96.3(3.6)	3.7
기타 ³⁾	356	96.8(0.9)	1.0	119	98.1(1.1)	1.1	237	96.1(1.3)	1.3
월 가구소득									
100만원 미만	40	100.0(0.0)	0.0	16	-(-)	-	24	100.0(0.0)	0.0
101-200만원 미만	83	96.9(1.8)	1.8	37	100.0(0.0)	0.0	46	94.3(3.3)	3.6
201-300만원 미만	120	93.1(2.7)	2.9	62	93.4(3.1)	3.3	58	92.8(3.5)	3.7
301-400만원 미만	225	92.0(2.1)	2.2	110	91.6(2.8)	3.0	115	92.5(3.0)	3.3
400만원 이상	365	94.6(1.1)	1.2	193	92.8(1.8)	2.0	172	96.9(1.4)	1.4

주 : 1) 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 : (다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 동승차량 앞좌석 탑승자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 15〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	842	45.7(2.0)	4.3	403	42.2(2.6)	6.2	439	49.3(2.5)	5.2
연령									
19-29	118	51.6(5.1)	9.9	58	55.5(7.2)	12.9	60	46.7(7.1)	15.1
30-39	111	49.4(5.3)	10.7	49	41.9(8.2)	19.6	62	56.7(6.3)	11.2
40-49	169	41.1(4.0)	9.8	83	34.1(5.2)	15.3	86	48.0(5.1)	10.6
50-59	187	42.9(4.2)	9.8	95	40.7(4.9)	12.0	92	45.4(5.6)	12.3
60-69	136	44.6(4.8)	10.7	68	38.8(6.1)	15.8	68	50.1(5.8)	11.6
70 이상	121	47.1(5.3)	11.2	50	41.5(7.2)	17.3	71	50.8(6.3)	12.3
19-64	657	45.9(2.0)	4.5	314	42.6(2.9)	6.9	343	49.4(2.7)	5.6
65 이상	185	44.8(4.3)	9.6	89	40.1(5.9)	14.7	96	49.0(5.6)	11.5
교육수준 ²⁾									
무학	48	44.3(8.6)	19.4	4	-(-)	-	44	48.7(8.1)	16.7
초등학교	90	54.0(5.7)	10.6	33	49.3(8.6)	17.4	57	56.5(6.9)	12.2
중학교	71	31.4(6.3)	20.0	31	28.0(8.3)	29.6	40	34.0(7.0)	20.7
고등학교	351	43.2(3.1)	7.3	190	41.2(4.4)	10.7	161	45.8(3.5)	7.7
대학교 이상	282	49.8(3.3)	6.6	145	45.5(4.4)	9.7	137	54.5(4.5)	8.3
직업									
전문행정관리	81	47.5(5.9)	12.5	48	49.1(6.3)	12.9	33	44.9(8.6)	19.1
사무직	101	49.0(5.2)	10.6	56	37.8(6.8)	18.0	45	64.9(6.6)	10.1
판매·서비스직	78	39.0(6.1)	15.6	19	-(-)	-	59	38.1(6.5)	17.0
농림어업	52	31.5(9.2)	29.1	32	26.7(9.9)	36.9	20	38.6(11.1)	28.7
기능단순노무직	162	30.0(3.6)	12.1	133	33.2(3.8)	11.6	29	13.7(6.4)	46.9
기타 ³⁾	368	54.8(3.2)	5.8	115	55.6(5.1)	9.1	253	54.5(3.6)	6.6
월 가구소득									
100만원 미만	43	29.0(7.6)	26.1	17	-(-)	-	26	33.7(10.2)	30.3
101-200만원 미만	84	47.3(6.4)	13.6	35	53.1(8.2)	15.5	49	42.9(7.9)	18.3
201-300만원 미만	123	51.5(5.6)	10.9	60	49.7(8.0)	16.0	63	53.2(5.9)	11.2
301-400만원 미만	215	45.4(5.0)	11.0	100	42.9(5.8)	13.5	115	47.7(6.0)	12.6
400만원 이상	366	46.2(2.9)	6.4	184	41.2(4.0)	9.7	182	52.0(3.8)	7.3

주 : 1) 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 : (다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 동승차량 뒷좌석 탑승자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 16〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	595	6.3(1.2)	18.7	362	8.3(1.6)	19.1	233	2.9(1.5)	51.9
연령									
19-29	41	8.8(4.7)	53.6	25	13.0(6.6)	50.6	16	-(-)	-
30-39	103	4.0(2.0)	49.8	53	5.4(3.1)	58.1	50	2.0(2.0)	99.7
40-49	160	7.1(2.0)	28.2	92	8.2(2.7)	32.3	68	5.5(3.2)	57.8
50-59	165	7.1(2.0)	28.0	97	9.9(2.9)	29.8	68	2.7(1.9)	71.6
60-69	92	3.8(1.9)	49.6	66	5.4(2.6)	48.8	26	0.0(0.0)	.
70 이상	34	8.9(5.3)	59.2	29	10.6(6.2)	58.4	5	-(-)	-
19-64	517	6.3(1.3)	20.3	295	8.5(1.8)	21.2	222	3.0(1.6)	52.0
65 이상	78	6.3(2.7)	43.1	67	7.4(3.2)	43.4	11	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
초등학교	28	6.1(4.4)	72.1	16	-(-)	-	12	-(-)	-
중학교	44	8.9(4.9)	55.0	29	13.5(7.0)	51.7	15	-(-)	-
고등학교	261	8.1(1.8)	21.7	166	10.3(2.5)	24.3	95	4.0(1.9)	47.8
대학교 이상	261	4.0(1.4)	35.0	150	4.9(1.6)	32.9	111	2.6(2.5)	96.8
직업									
전문행정관리	85	4.4(2.2)	48.7	52	5.7(3.2)	56.0	33	2.3(2.2)	94.8
사무직	98	5.2(2.1)	40.6	57	8.5(3.2)	38.0	41	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	51	0.0(0.0)	.	19	-(-)	-	32	0.0(0.0)	.
농림어업	29	13.2(7.1)	54.1	24	16.2(8.8)	54.2	5	-(-)	-
기능단순노무직	162	9.1(2.4)	25.9	146	9.3(2.6)	27.6	16	-(-)	-
기타 ³⁾	170	6.1(2.5)	41.2	64	8.5(3.9)	45.5	106	4.8(3.2)	65.2
월 가구소득									
100만원 미만	10	-(-)	-	6	-(-)	-	4	-(-)	-
101-200만원 미만	40	10.5(4.9)	46.8	25	17.5(7.7)	44.1	15	-(-)	-
201-300만원 미만	83	4.4(2.2)	49.8	53	4.8(2.9)	59.6	30	3.8(3.6)	94.7
301-400만원 미만	162	4.5(2.4)	53.5	103	5.3(2.9)	55.8	59	3.1(2.2)	71.5
400만원 이상	295	7.1(1.6)	22.9	171	9.8(2.3)	23.7	124	3.1(2.4)	77.6

주 : 1) 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이) : (최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 수 / 자동차 또는 오토바이 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 17〉 걷기 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	51.1(1.9)	3.8	448	49.8(2.6)	5.3	464	52.5(2.2)	4.2
연령									
19-29	121	57.1(5.2)	9.2	60	56.8(7.3)	12.9	61	57.5(6.6)	11.5
30-39	123	47.8(5.8)	12.1	58	51.9(6.9)	13.3	65	43.2(7.4)	17.1
40-49	187	49.3(3.8)	7.7	95	49.2(4.9)	9.9	92	49.4(5.4)	11.0
50-59	208	52.3(3.6)	6.8	107	51.9(5.1)	9.8	101	52.9(4.6)	8.6
60-69	145	53.4(5.0)	9.4	73	43.2(6.3)	14.5	72	63.4(5.9)	9.3
70 이상	128	45.1(4.6)	10.2	55	37.0(6.4)	17.3	73	51.1(5.3)	10.3
19-64	714	52.2(2.1)	4.1	351	51.7(2.9)	5.6	363	52.8(2.4)	4.6
65 이상	198	45.6(4.2)	9.1	97	39.7(5.3)	13.4	101	51.0(5.0)	9.8
교육수준 ²⁾									
무학	50	43.6(5.4)	12.4	4	-(-)	-	46	45.2(6.4)	14.2
초등학교	95	56.6(5.8)	10.2	35	36.8(7.8)	21.1	60	67.1(6.6)	9.8
중학교	74	39.6(5.8)	14.7	34	32.6(7.6)	23.3	40	45.3(7.7)	17.1
고등학교	382	53.4(2.6)	4.9	211	52.0(3.3)	6.3	171	55.2(3.6)	6.6
대학교 이상	311	50.1(3.5)	6.9	164	51.8(4.4)	8.5	147	48.1(4.3)	8.9
직업									
전문행정관리	91	48.5(5.3)	10.9	54	52.6(6.6)	12.5	37	42.0(6.8)	16.3
사무직	112	44.2(5.8)	13.0	62	44.5(6.0)	13.6	50	43.9(9.2)	20.9
판매·서비스직	83	53.6(5.8)	10.9	22	59.2(11.0)	18.6	61	51.6(6.4)	12.4
농림어업	54	52.8(9.1)	17.2	33	52.8(9.0)	17.0	21	52.9(12.1)	22.9
기능단순노무직	183	50.8(3.0)	5.9	154	49.3(3.4)	7.0	29	59.7(8.8)	14.8
기타 ³⁾	389	53.5(2.7)	5.1	123	49.8(5.3)	10.7	266	55.3(2.9)	5.2
월 가구소득									
100만원 미만	48	36.7(6.3)	17.2	19	-(-)	-	29	46.4(8.6)	18.4
101-200만원 미만	91	48.9(6.3)	12.9	39	41.6(9.1)	21.8	52	54.5(7.6)	14.0
201-300만원 미만	134	49.0(4.7)	9.6	66	44.6(5.6)	12.7	68	53.3(6.0)	11.2
301-400만원 미만	233	52.5(3.4)	6.4	114	50.9(4.5)	8.8	119	54.1(4.4)	8.2
400만원 이상	395	52.6(3.3)	6.3	203	53.5(4.1)	7.6	192	51.6(4.1)	7.9

주 : 1) 걷기 실천율 : (최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 18〉 지역사회 내 운동시설 접근율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	910	74.9(2.0)	2.6	447	74.7(2.3)	3.0	463	75.1(2.3)	3.0
연령									
19-29	121	82.0(3.3)	4.0	60	82.3(4.6)	5.5	61	81.7(4.3)	5.2
30-39	121	72.0(4.2)	5.8	57	70.4(5.8)	8.2	64	73.8(5.1)	6.9
40-49	187	79.8(3.0)	3.7	95	74.8(4.1)	5.5	92	85.1(3.8)	4.4
50-59	208	76.1(3.6)	4.8	107	78.9(4.2)	5.3	101	72.8(4.9)	6.7
60-69	145	68.0(3.9)	5.7	73	71.1(4.7)	6.6	72	65.1(5.4)	8.3
70 이상	128	64.3(6.4)	10.0	55	61.5(8.2)	13.4	73	66.4(6.2)	9.3
19-64	712	77.3(1.9)	2.4	350	77.0(2.3)	3.0	362	77.6(2.3)	2.9
65 이상	198	63.5(4.9)	7.7	97	63.0(5.9)	9.3	101	64.0(5.5)	8.6
교육수준 ²⁾									
무학	50	56.9(10.1)	17.7	4	-(-)	-	46	60.3(8.4)	14.0
초등학교	95	56.8(6.1)	10.7	35	57.1(8.6)	15.0	60	56.7(7.5)	13.2
중학교	74	64.6(6.8)	10.6	34	46.9(9.3)	19.8	40	79.1(6.6)	8.4
고등학교	382	75.6(2.7)	3.5	211	75.4(3.3)	4.3	171	75.9(3.3)	4.3
대학교 이상	309	82.1(2.3)	2.8	163	81.6(2.9)	3.6	146	82.6(3.0)	3.6
직업									
전문행정관리	91	77.5(3.3)	4.3	54	81.1(3.9)	4.9	37	71.7(6.7)	9.3
사무직	111	85.2(3.2)	3.8	61	81.2(4.7)	5.8	50	90.8(3.3)	3.7
판매·서비스직	83	72.0(5.1)	7.1	22	75.1(9.9)	13.2	61	70.9(5.8)	8.1
농림어업	54	46.0(8.6)	18.7	33	37.8(8.9)	23.5	21	57.9(10.1)	17.4
기능단순노무직	183	74.3(3.4)	4.6	154	74.4(3.6)	4.8	29	73.3(8.1)	11.1
기타 ³⁾	388	75.0(2.5)	3.3	123	75.7(4.0)	5.2	265	74.7(2.9)	3.9
월 가구소득									
100만원 미만	48	57.4(8.1)	14.2	19	-(-)	-	29	66.6(9.0)	13.6
101-200만원 미만	91	74.1(4.6)	6.2	39	75.9(6.0)	8.0	52	72.8(5.8)	8.0
201-300만원 미만	133	69.9(5.0)	7.1	66	71.5(5.5)	7.7	67	68.3(6.9)	10.1
301-400만원 미만	232	66.0(4.0)	6.1	113	63.5(5.0)	7.9	119	68.5(4.4)	6.4
400만원 이상	395	83.2(2.1)	2.6	203	83.4(2.7)	3.2	192	83.0(2.9)	3.5

주 : 1) 지역사회 내 운동시설 접근율 : (최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 찾기 “매우 쉬웠다” 또는 “쉬운 편이었다”에 응답한 사람 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 19〉 근력운동 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	14.6(1.1)	7.5	448	18.9(1.7)	9.0	464	10.0(1.5)	14.6
연령									
19-29	121	19.1(3.9)	20.3	60	23.5(5.0)	21.2	61	13.5(4.1)	30.7
30-39	123	15.0(3.3)	21.8	58	19.1(5.0)	26.4	65	10.4(4.1)	39.2
40-49	187	11.7(2.2)	18.6	95	14.3(3.8)	26.6	92	8.9(3.1)	35.5
50-59	208	14.5(2.9)	20.2	107	18.1(3.6)	19.8	101	10.5(3.0)	29.1
60-69	145	16.6(3.2)	19.5	73	19.6(4.7)	23.8	72	13.8(4.2)	30.6
70 이상	128	10.9(3.1)	28.6	55	21.7(6.0)	27.5	73	2.9(2.1)	71.0
19-64	714	14.7(1.3)	8.7	351	18.5(2.0)	10.6	363	10.6(1.7)	16.2
65 이상	198	14.1(2.4)	16.8	97	21.2(4.4)	20.8	101	7.5(2.7)	35.9
교육수준 ²⁾									
무학	50	0.0(0.0)	.	4	-(-)	-	46	0.0(0.0)	.
초등학교	95	7.7(3.1)	39.9	35	5.9(4.0)	68.1	60	8.7(3.8)	43.7
중학교	74	6.7(2.9)	43.7	34	9.7(4.8)	50.1	40	4.3(2.9)	67.7
고등학교	382	15.4(1.8)	11.8	211	17.9(2.6)	14.6	171	11.9(2.6)	22.0
대학교 이상	311	18.3(2.0)	10.7	164	23.7(3.1)	13.1	147	12.0(2.6)	21.8
직업									
전문행정관리	91	20.5(4.3)	21.0	54	28.3(6.3)	22.2	37	8.3(3.9)	46.7
사무직	112	13.8(3.5)	25.4	62	15.9(5.2)	33.0	50	10.9(4.8)	43.7
판매·서비스직	83	21.1(5.1)	24.3	22	34.2(11.0)	32.0	61	16.1(4.8)	29.7
농림어업	54	3.1(1.9)	61.3	33	5.3(3.1)	59.4	21	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	183	12.6(2.2)	17.8	154	13.9(2.5)	18.1	29	5.1(5.0)	99.3
기타 ³⁾	389	14.1(1.8)	12.8	123	22.7(3.8)	16.8	266	9.8(1.7)	16.9
월 가구소득									
100만원 미만	48	15.6(5.9)	37.6	19	-(-)	-	29	11.4(6.8)	59.8
101-200만원 미만	91	18.4(3.5)	19.1	39	27.1(6.4)	23.6	52	11.8(4.0)	33.8
201-300만원 미만	134	9.4(2.7)	28.5	66	9.2(3.4)	37.4	68	9.6(4.0)	41.5
301-400만원 미만	233	12.9(2.2)	17.5	114	19.2(3.9)	20.3	119	6.5(2.5)	38.7
400만원 이상	395	16.0(1.9)	12.0	203	20.0(2.5)	12.3	192	11.2(2.5)	22.3

주 : 1) 근력운동 실천율 : (최근 1주일 동안 2일 이상 근력운동을 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 20〉 연간 지역사회 내 운동프로그램 참여율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	6.2(0.9)	14.2	448	4.3(1.0)	23.9	464	8.3(1.3)	16.3
연령									
19-29	121	4.5(2.3)	50.7	60	4.8(3.6)	73.9	61	4.0(2.7)	66.2
30-39	123	1.6(1.1)	69.7	58	3.1(2.2)	69.4	65	0.0(0.0)	.
40-49	187	6.7(1.7)	25.1	95	2.1(1.5)	70.0	92	11.7(3.3)	27.9
50-59	208	7.3(2.2)	30.6	107	5.8(2.4)	40.4	101	9.1(3.2)	34.9
60-69	145	9.3(2.7)	29.3	73	1.4(1.5)	100.7	72	16.8(4.6)	27.5
70 이상	128	8.6(2.6)	30.2	55	10.6(4.9)	46.5	73	7.1(3.0)	41.9
19-64	714	5.8(1.0)	16.8	351	3.8(1.1)	29.6	363	8.1(1.4)	17.7
65 이상	198	8.3(2.0)	24.7	97	7.2(2.9)	40.8	101	9.2(3.1)	33.9
교육수준 ²⁾									
무학	50	6.5(3.6)	55.2	4	-(-)	-	46	7.1(3.9)	54.4
초등학교	95	8.2(2.9)	35.4	35	0.0(0.0)	.	60	12.5(4.4)	35.5
중학교	74	1.4(1.4)	99.8	34	0.0(0.0)	.	40	2.6(2.6)	99.5
고등학교	382	7.3(1.5)	21.1	211	5.1(1.7)	33.6	171	10.2(2.5)	24.8
대학교 이상	311	5.4(1.3)	23.1	164	4.6(1.7)	35.8	147	6.3(2.1)	33.4
직업									
전문행정관리	91	1.0(1.0)	99.4	54	0.0(0.0)	.	37	2.5(2.5)	97.4
사무직	112	3.5(1.4)	40.7	62	1.4(1.4)	100.0	50	6.6(2.8)	42.3
판매·서비스직	83	8.8(4.1)	46.3	22	12.2(7.6)	62.6	61	7.6(3.8)	50.3
농림어업	54	5.7(3.9)	67.8	33	0.0(0.0)	.	21	14.1(9.3)	66.0
기능단순노무직	183	6.1(1.7)	28.3	154	6.5(1.9)	29.3	29	3.5(3.5)	98.7
기타 ³⁾	389	8.1(1.4)	17.0	123	4.7(2.0)	42.1	266	9.8(2.0)	19.9
월 가구소득									
100만원 미만	48	11.6(5.5)	47.7	19	-(-)	-	29	12.6(6.6)	52.2
101-200만원 미만	91	2.5(1.8)	72.5	39	3.0(3.1)	102.6	52	2.1(2.0)	97.0
201-300만원 미만	134	7.8(3.4)	43.5	66	6.4(2.9)	44.9	68	9.2(5.2)	56.1
301-400만원 미만	233	5.1(1.2)	24.6	114	0.7(0.8)	100.5	119	9.5(2.6)	27.0
400만원 이상	395	6.8(1.5)	22.2	203	5.4(1.7)	32.3	192	8.5(2.1)	25.0

주 : 1) 연간 지역사회 내 운동프로그램 참여율 : (최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역의 주민센터(동사무소), 보건소, 구청, 시청 등의 지방자치단체 운동프로그램에 참여한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 21〉 걷기 코스 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	40.5(1.8)	4.5	448	42.2(2.2)	5.2	464	38.8(2.6)	6.6
연령									
19-29	121	34.8(4.2)	12.2	60	39.2(5.8)	14.7	61	29.2(5.8)	20.0
30-39	123	37.8(5.6)	14.8	58	36.9(6.3)	17.1	65	38.7(7.2)	18.6
40-49	187	48.4(4.2)	8.6	95	48.4(5.4)	11.2	92	48.4(5.4)	11.2
50-59	208	47.5(3.6)	7.6	107	47.5(4.8)	10.2	101	47.6(5.6)	11.9
60-69	145	43.8(4.8)	11.1	73	43.3(6.4)	14.8	72	44.2(5.9)	13.3
70 이상	128	19.9(4.5)	22.4	55	28.0(6.5)	23.3	73	14.0(4.2)	29.8
19-64	714	42.8(2.0)	4.7	351	43.0(2.5)	5.7	363	42.6(2.7)	6.4
65 이상	198	29.6(4.6)	15.5	97	38.2(5.7)	15.0	101	21.8(5.1)	23.4
교육수준 ²⁾									
무학	50	17.1(7.0)	41.1	4	-(-)	-	46	16.7(6.1)	36.6
초등학교	95	24.7(5.2)	21.0	35	22.9(6.3)	27.6	60	25.6(6.2)	24.2
중학교	74	43.1(6.9)	16.0	34	41.9(9.1)	21.6	40	44.1(7.9)	18.0
고등학교	382	40.1(2.5)	6.2	211	40.9(2.7)	6.6	171	39.0(3.8)	9.8
대학교 이상	311	46.8(2.8)	5.9	164	47.0(3.6)	7.6	147	46.5(4.2)	9.1
직업									
전문행정관리	91	44.6(5.0)	11.3	54	50.6(6.5)	12.8	37	35.2(6.2)	17.7
사무직	112	48.1(4.6)	9.6	62	49.9(5.6)	11.2	50	45.6(6.7)	14.8
판매·서비스직	83	39.5(5.9)	14.8	22	57.0(11.5)	20.1	61	33.0(6.2)	18.9
농림어업	54	38.0(8.2)	21.5	33	35.9(8.4)	23.4	21	41.1(10.5)	25.5
기능단순노무직	183	38.4(3.6)	9.3	154	39.4(3.5)	8.8	29	32.0(8.9)	27.8
기타 ³⁾	389	38.5(2.8)	7.2	123	35.9(4.8)	13.5	266	39.8(3.3)	8.4
월 가구소득									
100만원 미만	48	12.8(5.7)	44.5	19	-(-)	-	29	11.3(6.4)	56.4
101-200만원 미만	91	35.7(5.8)	16.3	39	32.7(7.3)	22.2	52	38.0(7.7)	20.3
201-300만원 미만	134	36.3(5.3)	14.6	66	38.5(6.4)	16.6	68	34.2(6.5)	18.9
301-400만원 미만	233	31.5(3.6)	11.4	114	32.3(4.1)	12.8	119	30.6(4.5)	14.7
400만원 이상	395	49.4(2.8)	5.8	203	50.8(3.2)	6.3	192	47.7(4.3)	9.0

주 : 1) 걷기 코스 인지율 : (거주하고 있는 지역의 걷기 코스에 대해 알고 있거나 들어 본적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 22〉 운동 필요성 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	95.3(0.7)	0.7	448	94.7(1.0)	1.0	464	95.9(0.9)	0.9
연령									
19-29	121	95.6(1.9)	2.0	60	94.5(3.1)	3.3	61	97.1(2.0)	2.0
30-39	123	95.6(1.8)	1.9	58	93.9(3.0)	3.2	65	97.5(1.8)	1.8
40-49	187	96.7(1.3)	1.3	95	95.6(2.2)	2.3	92	97.9(1.4)	1.4
50-59	208	96.9(1.2)	1.2	107	97.4(1.5)	1.6	101	96.3(1.9)	2.0
60-69	145	93.6(2.0)	2.2	73	90.7(3.4)	3.7	72	96.4(2.1)	2.2
70 이상	128	90.4(2.3)	2.5	55	93.3(2.5)	2.7	73	88.4(3.2)	3.6
19-64	714	96.3(0.7)	0.7	351	95.4(1.1)	1.2	363	97.3(0.9)	0.9
65 이상	198	90.3(2.4)	2.6	97	91.1(2.6)	2.8	101	89.7(3.1)	3.5
교육수준 ²⁾									
무학	50	82.6(4.7)	5.7	4	-(-)	-	46	81.0(5.1)	6.3
초등학교	95	96.5(2.1)	2.2	35	92.3(4.5)	4.9	60	98.7(1.3)	1.4
중학교	74	88.5(3.7)	4.2	34	86.2(5.6)	6.5	40	90.3(4.2)	4.7
고등학교	382	95.7(1.0)	1.0	211	95.3(1.4)	1.5	171	96.2(1.5)	1.5
대학교 이상	311	97.3(0.9)	0.9	164	95.5(1.5)	1.6	147	99.3(0.6)	0.6
직업									
전문행정관리	91	97.2(1.2)	1.3	54	95.4(1.9)	2.0	37	100.0(0.0)	0.0
사무직	112	100.0(0.0)	0.0	62	100.0(0.0)	0.0	50	100.0(0.0)	0.0
판매·서비스직	83	96.7(2.2)	2.3	22	91.6(7.9)	8.6	61	98.7(1.3)	1.3
농림어업	54	90.2(4.3)	4.8	33	90.7(4.1)	4.5	21	89.5(7.0)	7.8
기능단순노무직	183	93.2(1.7)	1.9	154	92.5(2.0)	2.2	29	97.6(2.4)	2.5
기타 ³⁾	389	94.6(1.1)	1.2	123	95.7(1.9)	1.9	266	94.0(1.3)	1.4
월 가구소득									
100만원 미만	48	90.7(5.3)	5.8	19	-(-)	-	29	86.5(6.9)	8.0
101-200만원 미만	91	93.9(2.9)	3.1	39	88.8(6.1)	6.8	52	97.8(2.2)	2.2
201-300만원 미만	134	90.2(2.6)	2.9	66	91.4(3.4)	3.7	68	89.0(4.1)	4.6
301-400만원 미만	233	95.9(1.6)	1.6	114	97.5(1.5)	1.5	119	94.4(2.2)	2.3
400만원 이상	395	97.1(0.8)	0.8	203	95.2(1.4)	1.4	192	99.5(0.5)	0.5

주 : 1) 운동 필요성 인지율 : ("매우 필요" 또는 "필요"라고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 23〉 아침식사 빈도 및 아침결식 예방인구비율¹⁾

(단위 : %)

구분	N	0일		1-2일		3-4일		5-7일	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	912	13.1(1.5)	11.5	7.4(1.1)	14.5	7.3(1.2)	16.0	72.1(2.1)	2.9
성									
남자	448	15.6(2.1)	13.7	6.7(1.4)	20.7	6.9(1.6)	23.1	70.9(2.5)	3.5
여자	464	10.6(1.7)	16.1	8.2(1.4)	17.2	7.8(1.6)	20.0	73.5(2.6)	3.6
연령									
19-29	121	29.1(5.1)	17.6	14.8(3.5)	23.8	11.1(3.2)	28.9	45.1(5.0)	11.1
30-39	123	20.6(3.7)	17.8	12.6(2.8)	22.1	11.6(3.3)	28.4	55.3(4.9)	8.8
40-49	187	13.6(2.8)	20.6	7.7(2.1)	27.4	10.9(2.2)	20.1	67.8(3.6)	5.3
50-59	208	6.8(1.9)	28.0	5.4(1.7)	32.0	5.0(1.8)	35.6	82.8(2.8)	3.4
60-69	145	2.8(1.7)	59.3	0.0(0.0)	.	1.5(1.1)	69.8	95.7(1.9)	2.0
70 이상	128	2.4(1.8)	74.2	0.8(0.9)	101.0	0.0(0.0)	.	96.8(2.0)	2.0
19-64	714	15.4(1.8)	11.4	8.8(1.3)	14.3	8.7(1.4)	16.1	67.0(2.3)	3.4
65 이상	198	2.1(1.3)	61.0	0.5(0.5)	99.4	0.5(0.5)	100.4	96.9(1.7)	1.7
교육수준 ²⁾									
무학	50	2.0(2.0)	99.3	2.2(2.2)	101.3	0.0(0.0)	.	95.8(3.0)	3.1
초등학교	95	2.1(1.5)	69.9	1.7(1.7)	100.5	1.3(1.3)	99.9	94.9(2.6)	2.7
중학교	74	4.1(3.0)	74.2	0.0(0.0)	.	4.2(2.9)	70.0	91.7(4.2)	4.6
고등학교	382	17.3(2.4)	13.8	6.5(1.4)	20.7	7.8(1.4)	17.5	68.4(2.7)	3.9
대학교 이상	311	13.7(2.1)	15.2	11.6(2.1)	18.4	9.5(2.1)	21.9	65.1(3.2)	5.0
직업									
전문행정관리	91	14.9(3.3)	22.4	8.7(3.1)	35.4	9.6(3.6)	37.2	66.7(4.9)	7.4
사무직	112	9.9(2.8)	28.7	14.8(3.8)	25.8	6.3(2.1)	33.9	69.0(4.6)	6.7
판매·서비스직	83	22.0(5.2)	23.8	4.5(2.2)	49.6	5.8(2.9)	50.7	67.7(5.4)	8.0
농림어업	54	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.4(2.1)	90.2	97.6(2.1)	2.2
기능단순노무직	183	16.2(3.3)	20.4	4.4(1.7)	39.0	10.0(2.6)	26.1	69.4(3.6)	5.2
기타 ³⁾	389	11.8(1.9)	16.6	7.6(1.4)	19.0	6.5(1.4)	21.7	74.1(2.7)	3.6
월 가구소득									
100만원 미만	48	7.8(5.3)	67.7	7.4(5.4)	73.0	0.0(0.0)	.	84.8(7.0)	8.3
101-200만원 미만	91	9.9(3.6)	36.6	3.7(1.4)	36.5	2.7(1.2)	43.4	83.6(4.4)	5.3
201-300만원 미만	134	12.0(3.9)	32.2	2.4(1.0)	44.0	3.3(2.1)	63.2	82.3(4.7)	5.7
301-400만원 미만	233	14.5(2.8)	19.2	3.4(1.3)	37.9	9.2(2.2)	24.0	72.9(3.7)	5.0
400만원 이상	395	14.2(2.3)	16.2	11.5(1.9)	16.6	8.7(1.8)	20.7	65.5(3.4)	5.1

주 : 1) 아침결식예방 인구비율 : (최근 1주일 동안 5일 이상 아침식사를 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 24〉 영양표시 활용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	153	84.1(2.2)	2.6	38	87.4(5.6)	6.4	115	82.9(3.0)	3.6
연령									
19-29	29	80.6(4.8)	6.0	10	-(-)	-	19	-(-)	-
30-39	29	79.2(7.9)	10.0	6	-(-)	-	23	77.8(9.4)	12.1
40-49	47	89.2(4.6)	5.2	11	-(-)	-	36	91.6(5.1)	5.6
50-59	25	81.9(7.9)	9.7	4	-(-)	-	21	78.6(9.0)	11.5
60-69	21	86.2(6.8)	7.8	6	-(-)	-	15	-(-)	-
70 이상	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-

주 : 1) 영양표시 활용률 : (영양표시 내용이 가공식품을 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수 / 가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수) × 100

〈표 25〉 저염선택율¹⁾

(단위 : %)

구분	N	Type I		Type II		Type III	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	912	36.1(1.9)	5.4	16.4(1.3)	7.7	6.8(0.9)	12.6
성							
남자	448	38.0(2.6)	6.7	13.1(1.5)	11.8	4.0(0.9)	23.4
여자	464	34.1(2.4)	6.9	19.9(1.8)	9.2	9.7(1.3)	13.8
연령							
19-29	121	36.5(5.0)	13.7	12.7(4.1)	31.8	5.2(1.9)	36.9
30-39	123	35.7(4.5)	12.6	13.4(2.8)	21.3	2.2(1.3)	58.6
40-49	187	35.9(3.9)	10.7	14.9(2.8)	18.9	6.7(2.0)	29.3
50-59	208	36.9(4.0)	10.8	22.1(3.2)	14.5	7.7(2.0)	26.3
60-69	145	35.9(4.5)	12.5	17.2(3.4)	20.0	11.2(2.8)	25.1
70 이상	128	35.0(5.0)	14.2	17.0(3.7)	21.9	8.8(3.0)	33.7
19-64	714	36.0(2.2)	6.1	16.5(1.4)	8.8	6.1(0.9)	15.0
65 이상	198	36.6(4.3)	11.8	15.8(2.6)	16.3	10.2(2.3)	22.8
교육수준 ²⁾							
무학	50	29.6(5.8)	19.4	24.4(6.2)	25.5	8.7(4.0)	46.4
초등학교	95	39.4(6.5)	16.5	15.3(3.3)	21.6	5.6(2.1)	37.2
중학교	74	29.0(5.4)	18.6	17.5(5.2)	29.9	13.1(4.5)	34.2
고등학교	382	36.1(2.6)	7.3	17.3(1.9)	10.9	7.3(1.3)	18.1
대학교 이상	311	37.4(3.1)	8.4	14.5(2.1)	14.2	5.0(1.3)	26.1
직업							
전문행정관리	91	40.2(5.6)	13.9	15.1(3.9)	25.7	4.8(2.4)	50.3
사무직	112	36.6(5.1)	13.8	10.9(2.6)	23.5	4.0(1.8)	45.7
판매·서비스직	83	39.5(5.7)	14.4	17.8(4.7)	26.2	8.2(3.7)	44.8
농림어업	54	37.1(6.9)	18.7	19.2(6.0)	31.3	5.8(3.2)	56.5
기능단순노무직	183	36.0(4.1)	11.3	20.0(3.5)	17.4	6.7(1.7)	25.9
기타 ³⁾	389	34.0(3.0)	8.8	16.1(2.0)	12.4	8.1(1.4)	17.3
월 가구소득							
100만원 미만	48	34.6(8.7)	25.2	26.2(7.0)	26.9	6.6(3.7)	56.3
101-200만원 미만	91	39.2(4.8)	12.2	21.4(4.0)	18.8	11.8(3.7)	31.1
201-300만원 미만	134	35.6(4.8)	13.5	19.4(4.1)	21.2	6.4(2.3)	36.2
301-400만원 미만	233	40.8(3.2)	7.9	16.9(2.4)	14.4	8.8(1.7)	19.9
400만원 이상	395	32.0(2.7)	8.5	13.7(1.9)	13.9	5.0(1.2)	23.9

주 : 1) 저염선택율 : 3문항 중 「한 가지만 선택한 경우 Type I, 두 가지를 선택한 경우 Type II, 세 가지 모두 선택 시 Type III」

- ① 평소 음식을 먹을 때 “약간 싱겁게 먹는다” 또는 “아주 싱겁게 먹는다”에 응답한 사람의 수
혹은,
② 조리된 음식을 먹을 때 소금이나 간장을 “전혀 더 넣지 않는다”에 응답한 사람의 수
혹은,
③ 전, 부침, 튀김 등을 먹을 때 간장에 “짜여 먹지 않는다”에 응답한 사람의 수 × 100

/ 조사대상 응답자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 26〉 저염식 실천 노력 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	49.1(2.3)	4.8	448	43.2(2.6)	6.0	464	55.3(2.8)	5.0
연령									
19-29	121	29.7(4.8)	16.2	60	22.4(5.3)	23.8	61	39.1(6.7)	17.2
30-39	123	43.0(5.4)	12.6	58	34.3(6.3)	18.5	65	52.6(7.5)	14.2
40-49	187	50.6(4.0)	8.0	95	42.9(4.5)	10.5	92	58.9(6.4)	10.9
50-59	208	60.8(3.1)	5.1	107	56.7(4.6)	8.0	101	65.5(4.1)	6.3
60-69	145	62.0(4.1)	6.6	73	54.9(6.4)	11.6	72	68.8(4.8)	7.0
70 이상	128	45.5(4.3)	9.3	55	51.5(6.5)	12.6	73	41.0(5.9)	14.4
19-64	714	48.9(2.6)	5.4	351	42.1(2.8)	6.7	363	56.3(3.1)	5.5
65 이상	198	50.0(3.5)	7.0	97	49.1(5.4)	11.0	101	50.8(4.9)	9.6
교육수준 ²⁾									
무학	50	49.9(8.6)	17.2	4	-(-)	-	46	49.2(8.4)	17.1
초등학교	95	48.4(4.5)	9.4	35	47.2(8.0)	17.0	60	49.0(5.5)	11.1
중학교	74	56.3(6.6)	11.8	34	39.2(8.9)	22.8	40	70.2(6.8)	9.7
고등학교	382	52.6(3.0)	5.8	211	47.2(3.9)	8.2	171	60.0(3.4)	5.6
대학교 이상	311	43.7(3.9)	8.8	164	38.0(3.9)	10.4	147	50.5(5.5)	10.9
직업									
전문행정관리	91	50.9(6.3)	12.4	54	49.7(6.9)	13.9	37	52.8(9.3)	17.5
사무직	112	44.7(4.7)	10.6	62	39.0(5.4)	13.8	50	52.6(7.8)	14.8
판매·서비스직	83	51.1(5.1)	9.9	22	32.0(9.6)	29.9	61	58.3(6.0)	10.4
농림어업	54	48.7(7.1)	14.6	33	36.9(7.8)	21.1	21	65.9(8.8)	13.4
기능단순노무직	183	52.9(3.8)	7.1	154	50.4(4.0)	7.9	29	68.2(9.4)	13.8
기타 ³⁾	389	47.7(3.1)	6.5	123	36.3(4.8)	13.2	266	53.4(3.4)	6.4
월 가구소득									
100만원 미만	48	35.0(8.7)	24.9	19	-(-)	-	29	32.4(9.3)	28.7
101-200만원 미만	91	57.4(5.5)	9.5	39	39.0(7.0)	18.0	52	71.7(7.6)	10.6
201-300만원 미만	134	53.5(4.1)	7.7	66	44.1(5.2)	11.9	68	62.8(5.1)	8.2
301-400만원 미만	233	60.8(3.5)	5.7	114	55.9(4.8)	8.6	119	65.7(4.2)	6.4
400만원 이상	395	41.4(3.5)	8.4	203	38.1(3.5)	9.1	192	45.3(4.8)	10.7

주 : 1) 저염식 실천 노력 경험률 : (평소 덜 짜게 먹으려고 "항상 노력한다" 또는 "대체로 노력한다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 27〉 연간 영양교육 및 상담수혜율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	1.5(0.4)	27.5	448	0.5(0.4)	73.8	464	2.6(0.7)	26.8
연령									
19-29	121	3.9(1.6)	41.3	60	1.7(1.7)	99.3	61	6.6(3.1)	47.3
30-39	123	3.1(1.2)	39.6	58	0.0(0.0)	.	65	6.5(2.7)	41.1
40-49	187	0.5(0.5)	100.5	95	0.0(0.0)	.	92	1.0(1.1)	100.3
50-59	208	0.7(0.5)	72.1	107	0.0(0.0)	.	101	1.6(1.1)	72.4
60-69	145	0.0(0.0)	.	73	0.0(0.0)	.	72	0.0(0.0)	.
70 이상	128	0.8(0.8)	96.8	55	1.9(1.9)	97.7	73	0.0(0.0)	.
19-64	714	1.7(0.5)	29.2	351	0.4(0.4)	100.3	363	3.1(0.8)	26.8
65 이상	198	0.5(0.5)	97.2	97	1.1(1.1)	98.0	101	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	50	0.0(0.0)	.	4	-(-)	-	46	0.0(0.0)	.
초등학교	95	1.1(1.0)	98.1	35	3.1(3.0)	96.5	60	0.0(0.0)	.
중학교	74	1.5(1.5)	99.2	34	0.0(0.0)	.	40	2.8(2.8)	99.9
고등학교	382	1.3(0.6)	46.0	211	0.6(0.6)	99.0	171	2.2(1.1)	50.5
대학교 이상	311	1.9(0.7)	34.4	164	0.0(0.0)	.	147	4.2(1.4)	34.0
직업									
전문행정관리	91	3.5(1.6)	44.7	54	0.0(0.0)	.	37	9.0(3.9)	43.1
사무직	112	1.2(1.2)	100.1	62	2.0(2.0)	101.2	50	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	83	0.7(0.7)	99.2	22	0.0(0.0)	.	61	1.0(0.9)	99.3
농림어업	54	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	21	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	183	0.5(0.5)	99.1	154	0.0(0.0)	.	29	3.7(3.7)	97.9
기타 ³⁾	389	1.9(0.7)	37.2	123	0.7(0.7)	101.3	266	2.5(1.0)	40.0
월 가구소득									
100만원 미만	48	0.0(0.0)	.	19	-(-)	-	29	0.0(0.0)	.
101-200만원 미만	91	1.9(1.3)	69.2	39	0.0(0.0)	.	52	3.3(2.3)	68.8
201-300만원 미만	134	1.5(1.1)	71.3	66	1.3(1.3)	100.5	68	1.6(1.7)	100.7
301-400만원 미만	233	0.9(0.6)	70.4	114	0.0(0.0)	.	119	1.8(1.2)	71.1
400만원 이상	395	1.9(0.6)	34.0	203	0.6(0.6)	100.7	192	3.5(1.2)	34.2

주 : 1) 연간 영양교육 및 상담수혜율 : (최근 1년 동안 영양교육 및 상담을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 28〉 비만도 분포¹⁾ 및 비만율²⁾ (자가보고)

(단위 : %)

구분	N	비만도 분포 ¹⁾						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율) ²⁾		평균(표준오차)	변동계수
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수		
전체	907	4.8(0.9)	18.4	65.7(1.8)	2.7	29.5(1.7)	5.9	23.4(0.1)	0.5
성									
남자	447	3.0(1.1)	36.6	61.2(2.7)	4.4	35.8(2.6)	7.4	24.1(0.2)	0.8
여자	460	6.8(1.2)	18.4	70.6(2.2)	3.1	22.6(1.9)	8.5	22.8(0.2)	0.7
연령									
19-29	121	9.3(2.6)	28.2	70.0(3.9)	5.6	20.8(3.8)	18.5	22.3(0.3)	1.5
30-39	123	6.4(2.6)	41.3	64.6(4.6)	7.2	29.1(4.6)	15.9	23.3(0.3)	1.5
40-49	187	3.0(1.1)	37.5	65.5(3.7)	5.7	31.5(3.5)	11.2	23.7(0.2)	1.0
50-59	208	2.1(1.1)	49.4	66.4(3.1)	4.7	31.5(3.2)	10.2	23.8(0.2)	0.7
60-69	145	3.0(1.2)	38.3	60.6(4.4)	7.3	36.4(4.3)	11.9	24.2(0.3)	1.2
70 이상	123	7.0(2.6)	37.2	66.3(4.3)	6.5	26.7(4.2)	15.6	23.1(0.3)	1.2
19-64	714	4.9(0.9)	19.0	65.9(1.9)	2.8	29.2(1.9)	6.5	23.4(0.1)	0.6
65 이상	193	4.5(1.7)	37.0	64.7(3.8)	5.9	30.8(3.4)	11.0	23.6(0.2)	1.0
교육수준 ³⁾									
무학	46	7.2(3.5)	47.7	65.7(6.5)	9.9	27.1(6.3)	23.3	23.0(0.4)	1.9
초등학교	94	2.1(1.4)	70.2	58.0(6.1)	10.5	39.9(6.1)	15.2	24.5(0.5)	1.9
중학교	74	3.1(2.3)	74.5	59.6(5.6)	9.4	37.3(5.7)	15.3	24.1(0.5)	1.9
고등학교	382	5.5(1.4)	26.2	67.0(2.7)	4.1	27.4(2.4)	8.8	23.3(0.2)	0.7
대학교 이상	311	4.7(1.3)	27.6	67.0(2.9)	4.3	28.3(2.8)	9.9	23.2(0.2)	0.8
직업									
전문행정관리	91	4.2(1.9)	46.2	67.1(5.0)	7.4	28.7(4.7)	16.5	23.3(0.3)	1.3
사무직	112	6.4(2.7)	42.9	68.3(4.6)	6.8	25.3(4.6)	18.0	23.1(0.3)	1.4
판매·서비스직	83	2.5(1.7)	69.0	66.5(5.8)	8.7	31.0(5.6)	18.2	23.7(0.4)	1.6
농림어업	53	8.1(5.7)	70.5	60.5(8.6)	14.2	31.3(7.3)	23.3	23.4(0.6)	2.5
기능단순노무직	183	0.9(0.7)	71.4	63.5(3.3)	5.2	35.5(3.3)	9.4	24.2(0.2)	0.8
기타 ⁴⁾	385	6.6(1.5)	22.3	66.0(2.5)	3.8	27.4(2.6)	9.5	23.1(0.2)	0.8
월 가구소득									
100만원 미만	46	2.0(2.0)	98.2	70.3(7.4)	10.5	27.7(7.7)	27.8	24.0(0.6)	2.7
101-200만원 미만	90	5.7(2.2)	38.0	56.1(5.2)	9.3	38.3(4.7)	12.4	23.8(0.3)	1.3
201-300만원 미만	133	4.1(1.7)	41.3	69.4(4.4)	6.4	26.5(4.1)	15.3	23.1(0.3)	1.2
301-400만원 미만	232	4.7(1.9)	40.6	64.1(3.2)	5.0	31.2(3.5)	11.3	23.7(0.3)	1.1
400만원 이상	395	4.6(1.0)	22.2	67.2(2.6)	3.9	28.3(2.5)	8.8	23.3(0.2)	0.7

주 : 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만율 : (체질량지수(kg/m²) 25 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 29〉 비만도 분포¹⁾ 및 비만율²⁾ (신체계측)

(단위 : %)

구분	N	비만도 분포 ¹⁾						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율) ²⁾		평균(표준오차)	변동계수
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수		
전체	727	6.2(1.1)	17.0	65.8(2.0)	3.0	28.0(2.0)	7.1	23.4(0.1)	0.6
성									
남자	352	3.6(1.2)	33.2	63.7(2.9)	4.6	32.8(3.0)	9.3	24.0(0.2)	0.9
여자	375	8.9(1.6)	18.4	67.9(2.3)	3.4	23.2(2.1)	9.1	22.8(0.2)	0.8
연령									
19-29	100	14.1(3.6)	25.5	69.0(4.5)	6.6	16.9(4.2)	24.8	21.8(0.4)	1.8
30-39	92	10.8(3.7)	34.3	64.5(5.7)	8.9	24.7(4.9)	19.9	22.8(0.4)	1.6
40-49	158	3.4(1.6)	47.1	65.7(4.1)	6.2	30.9(4.0)	13.0	23.8(0.3)	1.1
50-59	172	1.8(1.0)	56.3	67.8(3.4)	5.1	30.4(3.5)	11.5	24.1(0.2)	0.8
60-69	108	4.0(1.5)	38.0	56.3(5.1)	9.0	39.7(5.1)	12.9	24.3(0.3)	1.3
70 이상	97	5.5(2.5)	45.6	68.9(4.4)	6.4	25.6(4.2)	16.4	23.4(0.3)	1.1
19-64	576	6.7(1.2)	18.1	65.7(2.2)	3.4	27.6(2.2)	8.0	23.3(0.2)	0.7
65 이상	151	3.5(1.6)	45.1	66.2(4.1)	6.2	30.3(3.7)	12.3	23.9(0.2)	1.0
교육수준 ³⁾									
무학	33	0.0(0.0)	.	70.5(7.6)	10.7	29.5(7.6)	25.6	23.5(0.6)	2.4
초등학교	76	2.5(1.8)	71.1	58.5(6.7)	11.4	39.0(6.6)	16.9	24.5(0.4)	1.7
중학교	59	5.7(3.3)	57.7	54.1(6.3)	11.6	40.2(6.1)	15.1	24.1(0.5)	1.9
고등학교	314	6.1(1.7)	28.6	66.8(3.0)	4.5	27.2(2.8)	10.2	23.4(0.2)	0.9
대학교 이상	245	7.9(1.6)	19.8	67.9(3.5)	5.1	24.2(3.2)	13.4	22.9(0.2)	0.9
직업									
전문행정관리	71	5.0(2.3)	46.2	65.7(6.4)	9.7	29.3(6.1)	20.7	23.4(0.4)	1.7
사무직	89	8.1(3.4)	41.7	77.7(5.2)	6.7	14.2(4.3)	30.0	22.6(0.3)	1.5
판매·서비스직	60	3.9(2.7)	69.8	61.7(7.0)	11.4	34.4(6.7)	19.4	24.3(0.5)	1.9
농림어업	44	4.6(2.7)	60.3	62.0(7.4)	11.9	33.4(6.7)	20.1	23.5(0.5)	2.1
기능단순노무직	152	1.1(0.8)	71.3	63.3(4.2)	6.7	35.5(4.3)	12.0	24.3(0.2)	0.9
기타 ⁴⁾	311	9.2(1.9)	21.1	64.4(2.7)	4.2	26.4(2.8)	10.6	23.0(0.2)	0.9
월 가구소득									
100만원 미만	38	2.5(2.4)	98.0	68.3(7.9)	11.6	29.2(8.4)	28.6	23.7(0.6)	2.5
101-200만원 미만	69	7.6(2.6)	33.4	61.0(4.8)	7.9	31.3(4.9)	15.5	23.6(0.3)	1.4
201-300만원 미만	100	4.7(2.8)	58.2	66.0(5.4)	8.3	29.3(4.8)	16.5	23.4(0.3)	1.3
301-400만원 미만	178	6.7(2.1)	32.2	61.6(3.8)	6.1	31.7(3.9)	12.1	23.9(0.3)	1.1
400만원 이상	331	6.0(1.4)	22.8	68.3(3.0)	4.4	25.6(2.7)	10.5	23.1(0.2)	0.8

주 : 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만율 : (체질량지수(kg/㎡) 25 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 30〉 주관적 비만인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	33.2(2.0)	6.0	448	31.6(2.6)	8.3	464	34.9(2.6)	7.4
연령									
19-29	121	25.0(3.9)	15.6	60	20.2(5.2)	26.0	61	31.3(6.3)	20.0
30-39	123	36.2(4.7)	13.0	58	39.3(6.1)	15.6	65	32.9(5.5)	16.8
40-49	187	41.6(3.8)	9.1	95	40.8(5.2)	12.7	92	42.5(4.7)	11.0
50-59	208	36.6(3.4)	9.4	107	34.3(5.1)	15.0	101	39.2(5.4)	13.7
60-69	145	38.3(3.9)	10.1	73	33.0(5.3)	16.1	72	43.5(5.5)	12.6
70 이상	128	12.2(2.8)	23.2	55	10.2(4.8)	47.3	73	13.6(3.2)	23.9
19-64	714	35.5(2.2)	6.3	351	33.5(2.8)	8.3	363	37.8(3.0)	8.0
65 이상	198	22.0(3.6)	16.2	97	21.6(4.9)	22.5	101	22.3(4.0)	17.9
교육수준 ²⁾									
무학	50	9.9(4.2)	42.1	4	-(-)	-	46	10.8(4.5)	41.4
초등학교	95	39.4(5.2)	13.1	35	28.7(8.6)	29.9	60	45.1(6.1)	13.5
중학교	74	35.6(6.0)	16.7	34	36.0(9.4)	26.0	40	35.3(7.6)	21.5
고등학교	382	32.4(2.9)	8.8	211	28.2(3.9)	13.7	171	38.2(4.1)	10.8
대학교 이상	311	35.1(3.1)	8.9	164	36.3(3.9)	10.9	147	33.7(3.8)	11.4
직업									
전문행정관리	91	26.6(4.6)	17.3	54	28.3(5.9)	20.7	37	23.8(6.6)	27.8
사무직	112	33.4(4.6)	13.7	62	39.1(6.2)	15.8	50	25.4(6.1)	23.9
판매·서비스직	83	42.8(5.6)	13.2	22	28.2(11.0)	38.8	61	48.2(6.9)	14.2
농림어업	54	27.2(5.6)	20.7	33	20.7(6.3)	30.6	21	36.6(9.2)	25.1
기능단순노무직	183	32.4(3.5)	10.8	154	34.2(4.1)	11.9	29	21.6(7.9)	36.6
기타 ³⁾	389	34.0(2.7)	8.0	123	28.2(4.9)	17.3	266	36.9(3.4)	9.1
월 가구소득									
100만원 미만	48	28.8(8.4)	29.3	19	-(-)	-	29	36.3(10.4)	28.5
101-200만원 미만	91	39.8(6.1)	15.4	39	45.1(8.4)	18.6	52	35.7(6.9)	19.5
201-300만원 미만	134	29.6(4.4)	14.8	66	22.1(5.7)	25.7	68	36.9(5.8)	15.8
301-400만원 미만	233	37.5(4.1)	11.0	114	35.5(5.6)	15.7	119	39.5(5.2)	13.1
400만원 이상	395	30.9(2.5)	8.0	203	30.9(3.1)	10.1	192	31.0(3.6)	11.6

주 : 1) 주관적 비만인지율 : (“약간 비만임” 또는 “매우 비만임”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 31〉 연간 체중조절 시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	49.1(2.1)	4.2	448	39.4(2.4)	6.2	464	59.4(2.5)	4.1
연령									
19-29	121	50.9(5.2)	10.2	60	34.0(6.2)	18.2	61	72.7(6.6)	9.0
30-39	123	61.5(3.3)	5.3	58	50.1(5.3)	10.5	65	74.2(5.2)	7.0
40-49	187	55.5(3.8)	6.9	95	43.7(5.1)	11.6	92	68.1(4.6)	6.7
50-59	208	50.7(3.3)	6.5	107	43.6(4.9)	11.2	101	58.9(5.5)	9.3
60-69	145	41.4(3.8)	9.2	73	28.6(5.1)	17.7	72	53.9(6.1)	11.3
70 이상	128	21.5(4.9)	22.9	55	24.8(7.3)	29.4	73	19.1(5.0)	26.0
19-64	714	53.2(2.2)	4.0	351	41.5(2.7)	6.4	363	66.0(2.6)	3.9
65 이상	198	29.1(4.3)	14.6	97	28.2(5.1)	18.2	101	30.0(5.5)	18.5
교육수준 ²⁾									
무학	50	3.9(2.8)	71.4	4	-(-)	-	46	4.3(3.1)	71.0
초등학교	95	43.0(5.5)	12.8	35	20.5(6.4)	31.0	60	54.8(8.1)	14.7
중학교	74	37.8(6.8)	17.9	34	21.8(8.0)	36.6	40	50.9(8.5)	16.7
고등학교	382	45.4(2.6)	5.6	211	36.7(3.3)	8.9	171	57.4(3.6)	6.2
대학교 이상	311	61.9(3.0)	4.8	164	48.8(4.5)	9.1	147	77.5(3.2)	4.2
직업									
전문행정관리	91	57.3(5.1)	8.8	54	47.0(7.0)	14.9	37	73.7(6.8)	9.2
사무직	112	53.9(4.4)	8.1	62	38.5(5.6)	14.5	50	75.8(5.3)	6.9
판매·서비스직	83	64.2(5.6)	8.7	22	46.0(11.8)	25.8	61	71.0(6.3)	8.9
농림어업	54	24.1(5.7)	23.8	33	20.0(6.5)	32.2	21	30.1(11.0)	36.5
기능단순노무직	183	41.4(3.5)	8.5	154	44.0(4.0)	9.1	29	25.7(8.0)	31.2
기타 ³⁾	389	48.6(3.0)	6.2	123	32.7(4.8)	14.5	266	56.7(3.2)	5.6
월 가구소득									
100만원 미만	48	37.6(7.6)	20.3	19	-(-)	-	29	43.5(9.6)	21.9
101-200만원 미만	91	45.9(6.1)	13.3	39	41.2(8.7)	21.1	52	49.5(7.9)	15.9
201-300만원 미만	134	35.5(4.8)	13.6	66	22.5(5.6)	25.1	68	48.3(6.8)	14.0
301-400만원 미만	233	47.0(3.2)	6.8	114	39.2(4.3)	10.9	119	54.9(4.1)	7.5
400만원 이상	395	55.9(3.0)	5.4	203	45.0(3.5)	7.9	192	69.0(3.7)	5.4

주 : 1) 연간 체중조절 시도율 : (최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 32〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	25.3(1.3)	5.2	448	25.8(1.9)	7.4	464	24.8(1.9)	7.8
연령									
19-29	121	14.4(3.9)	27.1	60	9.9(3.9)	38.8	61	20.2(7.3)	36.2
30-39	123	17.2(3.3)	19.0	58	18.4(5.0)	27.2	65	15.8(4.0)	25.2
40-49	187	25.8(3.7)	14.5	95	29.6(5.0)	16.9	92	21.8(4.1)	18.8
50-59	208	25.3(3.7)	14.7	107	24.7(4.5)	18.1	101	26.0(4.5)	17.2
60-69	145	34.5(4.3)	12.4	73	42.5(7.0)	16.5	72	26.7(4.9)	18.5
70 이상	128	41.5(3.6)	8.7	55	40.8(6.7)	16.5	73	42.1(4.8)	11.4
19-64	714	21.6(1.5)	6.8	351	22.2(1.9)	8.4	363	20.9(2.2)	10.6
65 이상	198	43.4(3.5)	8.1	97	44.5(5.3)	11.8	101	42.5(4.5)	10.5
교육수준 ²⁾									
무학	50	50.6(5.6)	11.0	4	-(-)	-	46	48.6(5.8)	12.0
초등학교	95	40.1(5.0)	12.4	35	55.2(7.9)	14.2	60	32.1(6.2)	19.4
중학교	74	36.0(5.5)	15.3	34	41.6(7.9)	18.9	40	31.5(7.0)	22.3
고등학교	382	24.5(2.2)	9.0	211	27.5(2.9)	10.6	171	20.3(3.0)	14.9
대학교 이상	311	18.1(2.2)	12.0	164	16.1(2.6)	16.1	147	20.5(3.2)	15.7
직업									
전문행정관리	91	31.1(5.3)	17.1	54	32.2(6.7)	20.8	37	29.4(7.9)	27.0
사무직	112	17.0(3.5)	20.5	62	13.2(4.4)	33.3	50	22.3(5.5)	24.9
판매·서비스직	83	24.9(4.6)	18.6	22	18.3(8.7)	47.4	61	27.4(5.3)	19.4
농림어업	54	30.3(7.1)	23.3	33	36.9(9.2)	25.0	21	20.6(11.1)	53.9
기능단순노무직	183	28.2(3.6)	12.7	154	27.9(3.7)	13.1	29	29.7(9.0)	30.3
기타 ³⁾	389	24.6(1.8)	7.4	123	26.3(4.1)	15.6	266	23.8(2.2)	9.4
월 가구소득									
100만원 미만	48	37.2(6.9)	18.4	19	-(-)	-	29	38.5(9.2)	23.8
101-200만원 미만	91	39.5(5.4)	13.6	39	46.0(7.3)	16.0	52	34.5(5.9)	17.1
201-300만원 미만	134	27.3(4.0)	14.6	66	26.6(5.3)	20.0	68	27.9(4.6)	16.3
301-400만원 미만	233	30.7(3.1)	10.2	114	35.2(4.8)	13.7	119	26.1(4.5)	17.4
400만원 이상	395	18.5(1.9)	10.4	203	17.2(2.4)	14.2	192	20.0(3.2)	15.9

주 : 1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 : (“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 33〉 저작불편호소율 : 65세 이상¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	198	33.1(3.3)	9.9	97	28.9(4.9)	17.0	101	37.0(4.2)	11.5
교육수준 ²⁾									
무학	47	47.7(6.1)	12.7	3	-(-)	-	44	46.8(6.5)	13.9
초등학교	67	36.1(4.9)	13.6	29	47.0(8.7)	18.4	38	28.9(5.9)	20.4
중학교	37	26.7(7.6)	28.5	26	22.4(8.0)	35.6	11	-(-)	-
고등학교	33	24.5(9.2)	37.7	25	23.9(10.6)	44.1	8	-(-)	-
대학교 이상	14	-(-)	-	14	-(-)	-	0	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	39	25.3(7.2)	28.7	15	-(-)	-	24	27.5(8.7)	31.7
101-200만원 미만	47	35.7(6.6)	18.4	24	41.2(10.7)	26.1	23	30.2(8.0)	26.4
201-300만원 미만	46	43.4(7.2)	16.6	27	39.2(9.8)	24.9	19	-(-)	-
301-400만원 미만	38	28.6(5.9)	20.8	18	-(-)	-	20	38.3(8.2)	21.5
400만원 이상	26	30.1(9.6)	31.7	12	-(-)	-	14	-(-)	-

주 : 1) 저작불편호소율(65세 이상) : (“매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

〈표 34〉 칫솔질 실천율

(단위 : %)

구분	아침식사 후 칫솔질실천율 ¹⁾			점심식사 후 칫솔질실천율 ²⁾			저녁식사 후 칫솔질실천율 ³⁾			잠자기 전 칫솔질실천율 ⁴⁾		
	N	%(표준오차)	변동 계수	N	%(표준오차)	변동 계수	N	%(표준오차)	변동 계수	N	%(표준오차)	변동 계수
전체	912	79.6(1.6)	2.1	912	61.7(2.1)	3.3	912	77.4(1.6)	2.0	912	63.9(1.9)	2.9
성												
남자	448	75.4(2.5)	3.3	448	53.3(2.7)	5.1	448	74.4(2.2)	2.9	448	62.8(2.7)	4.3
여자	464	84.0(1.9)	2.3	464	70.6(2.2)	3.1	464	80.5(1.9)	2.3	464	65.1(1.9)	2.9
연령												
19-29	121	57.1(5.4)	9.4	121	65.8(4.2)	6.4	121	71.1(4.3)	6.0	121	69.7(5.9)	8.5
30-39	123	73.8(4.3)	5.9	123	73.8(4.3)	5.9	123	77.1(4.5)	5.9	123	74.3(4.1)	5.5
40-49	187	80.9(3.3)	4.1	187	61.5(3.9)	6.3	187	75.5(3.2)	4.2	187	72.7(4.0)	5.5
50-59	208	86.7(2.8)	3.2	208	60.5(3.6)	6.0	208	81.2(2.6)	3.2	208	63.9(3.4)	5.4
60-69	145	91.8(2.7)	2.9	145	59.8(4.6)	7.8	145	81.1(3.6)	4.4	145	49.4(4.5)	9.2
70 이상	128	90.5(2.6)	2.9	128	43.3(4.8)	11.2	128	78.8(4.3)	5.4	128	39.8(4.1)	10.2
19-64	714	77.2(1.8)	2.4	714	64.8(2.2)	3.4	714	76.9(1.7)	2.3	714	68.9(2.3)	3.3
65 이상	198	90.9(2.0)	2.2	198	46.5(3.7)	7.9	198	79.8(3.5)	4.4	198	39.5(3.2)	8.1
교육수준 ⁵⁾												
무학	50	91.8(3.8)	4.2	50	41.7(6.6)	15.9	50	76.7(6.3)	8.2	50	37.5(6.9)	18.4
초등학교	95	88.4(3.7)	4.2	95	45.1(5.4)	12.0	95	75.1(5.5)	7.3	95	49.7(6.5)	13.0
중학교	74	87.9(5.4)	6.1	74	46.0(5.9)	12.9	74	71.6(5.9)	8.3	74	51.9(6.3)	12.2
고등학교	382	76.6(2.4)	3.1	382	60.0(2.8)	4.7	382	77.2(2.4)	3.1	382	64.1(2.7)	4.3
대학교 이상	311	78.1(2.7)	3.4	311	72.5(2.9)	4.0	311	79.2(2.2)	2.8	311	72.1(2.8)	3.9
직업												
전문행정관리	91	77.9(4.7)	6.1	91	72.0(4.6)	6.4	91	86.6(3.5)	4.0	91	64.8(5.2)	8.1
사무직	112	85.1(2.9)	3.4	112	76.2(3.8)	5.0	112	73.8(4.7)	6.4	112	69.6(4.8)	7.0
판매·서비스직	83	76.2(5.2)	6.9	83	60.5(5.9)	9.8	83	73.1(5.3)	7.2	83	68.1(4.8)	7.1
농림어업	54	90.4(5.3)	5.8	54	42.0(8.1)	19.4	54	69.5(6.7)	9.7	54	45.7(7.9)	17.4
기능단순노무직	183	75.0(3.5)	4.6	183	46.5(3.4)	7.3	183	72.0(3.0)	4.1	183	62.0(3.8)	6.2
기타 ⁶⁾	389	80.0(2.3)	2.8	389	64.3(2.8)	4.4	389	80.8(2.2)	2.7	389	64.0(2.6)	4.1
월 가구소득												
100만원 미만	48	84.9(6.1)	7.2	48	46.4(8.3)	17.9	48	72.7(6.9)	9.6	48	35.7(8.5)	23.9
101-200만원 미만	91	83.6(4.4)	5.3	91	49.3(6.0)	12.1	91	84.8(4.3)	5.0	91	40.4(4.9)	12.0
201-300만원 미만	134	83.1(3.7)	4.4	134	53.9(4.6)	8.6	134	78.4(3.7)	4.8	134	61.4(4.5)	7.4
301-400만원 미만	233	80.0(2.9)	3.6	233	67.8(3.5)	5.1	233	75.7(3.1)	4.0	233	64.0(3.4)	5.3
400만원 이상	395	77.8(2.5)	3.3	395	65.0(3.1)	4.7	395	77.3(2.5)	3.2	395	71.5(3.0)	4.2

주 : 1) 어제 아침식사 후 칫솔질 실천율 : (아침식사 후 칫솔질 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 : (점심식사 후 칫솔질 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 어제 저녁식사 후 칫솔질 실천율 : (저녁식사 후 칫솔질 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

4) 어제 잠자기 전 칫솔질 실천율 : (잠자기 전 칫솔질 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

5) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

6) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 35〉 연간 치과병의원 이용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	911	40.6(2.1)	5.3	448	40.3(2.8)	6.9	463	40.9(2.6)	6.3
연령									
19-29	120	38.4(5.6)	14.5	60	23.8(6.1)	25.8	60	57.5(6.4)	11.2
30-39	123	40.6(4.7)	11.6	58	37.3(5.9)	15.9	65	44.3(6.4)	14.5
40-49	187	40.8(4.3)	10.5	95	47.7(5.6)	11.7	92	33.4(5.7)	17.1
50-59	208	46.2(3.7)	8.0	107	45.1(5.0)	11.2	101	47.5(5.3)	11.1
60-69	145	39.6(3.8)	9.6	73	48.0(6.0)	12.4	72	31.5(5.0)	16.0
70 이상	128	33.7(4.4)	12.9	55	38.5(6.8)	17.7	73	30.2(5.1)	17.0
19-64	713	40.9(2.5)	6.2	351	39.7(3.1)	7.8	362	42.3(3.0)	7.0
65 이상	198	39.1(3.7)	9.4	97	43.8(5.8)	13.4	101	34.8(4.2)	12.2
교육수준 ²⁾									
무학	50	22.2(6.6)	29.6	4	-(-)	-	46	24.3(6.7)	27.5
초등학교	95	41.5(5.0)	12.0	35	45.6(9.9)	21.8	60	39.3(6.5)	16.6
중학교	74	38.6(6.1)	15.8	34	38.7(9.1)	23.6	40	38.5(7.6)	19.7
고등학교	381	41.2(3.0)	7.3	211	40.4(3.8)	9.4	170	42.3(3.8)	9.0
대학교 이상	311	42.2(3.2)	7.6	164	40.4(3.8)	9.4	147	44.3(4.3)	9.7
직업									
전문행정관리	91	43.3(5.4)	12.4	54	48.0(6.8)	14.1	37	35.7(7.5)	20.9
사무직	112	45.9(6.1)	13.2	62	41.9(6.3)	15.1	50	51.6(9.0)	17.4
판매·서비스직	83	40.3(6.0)	15.0	22	51.2(11.3)	22.1	61	36.1(6.5)	17.9
농림어업	54	40.0(6.7)	16.9	33	37.4(10.1)	26.9	21	43.8(11.0)	25.1
기능단순노무직	183	44.7(3.8)	8.6	154	44.2(4.3)	9.6	29	47.9(8.9)	18.6
기타 ³⁾	388	36.1(2.6)	7.3	123	29.1(4.8)	16.4	265	39.7(3.1)	7.8
월 가구소득									
100만원 미만	48	44.7(8.3)	18.5	19	-(-)	-	29	42.6(12.7)	29.8
101-200만원 미만	91	43.5(4.9)	11.3	39	43.5(7.5)	17.3	52	43.5(7.1)	16.2
201-300만원 미만	134	38.0(4.6)	12.1	66	36.6(6.0)	16.3	68	39.4(5.8)	14.7
301-400만원 미만	233	37.9(4.2)	11.1	114	41.1(5.2)	12.8	119	34.6(4.8)	13.9
400만원 이상	394	41.2(3.5)	8.6	203	39.5(4.0)	10.1	191	43.3(4.2)	9.7

주 : 1) 연간 치과병의원 이용률 : (최근 1년 동안 치과병의원을 이용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 36〉 스트레스 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	20.1(1.4)	6.8	448	19.9(1.9)	9.4	464	20.3(1.9)	9.5
연령									
19-29	121	19.6(3.0)	15.1	60	15.8(4.5)	28.6	61	24.5(4.5)	18.4
30-39	123	30.7(4.2)	13.6	58	27.7(6.2)	22.3	65	34.0(5.6)	16.5
40-49	187	19.0(2.6)	13.8	95	25.0(4.1)	16.3	92	12.7(3.0)	23.6
50-59	208	18.6(3.3)	17.6	107	17.7(3.8)	21.4	101	19.6(4.8)	24.4
60-69	145	19.4(3.5)	17.9	73	15.3(4.0)	26.3	72	23.3(4.9)	21.2
70 이상	128	11.7(3.3)	28.0	55	13.7(5.1)	37.5	73	10.2(3.3)	32.5
19-64	714	20.9(1.4)	6.8	351	21.0(2.0)	9.7	363	20.7(2.0)	9.7
65 이상	198	16.4(2.9)	17.8	97	13.9(3.6)	25.9	101	18.7(4.1)	22.0
교육수준 ²⁾									
무학	50	11.2(5.2)	46.2	4	-(-)	-	46	10.2(4.6)	45.3
초등학교	95	18.1(3.5)	19.6	35	13.6(6.2)	45.8	60	20.4(4.7)	22.9
중학교	74	27.0(6.5)	24.2	34	20.9(7.5)	36.1	40	31.9(8.1)	25.3
고등학교	382	18.7(2.0)	11.0	211	20.3(2.7)	13.3	171	16.4(2.9)	17.9
대학교 이상	311	22.0(2.4)	10.7	164	20.1(3.2)	16.0	147	24.2(4.1)	16.9
직업									
전문행정관리	91	19.4(4.0)	20.5	54	13.0(4.6)	35.0	37	29.5(7.5)	25.4
사무직	112	19.2(4.0)	21.0	62	18.7(5.6)	29.9	50	19.8(6.0)	30.2
판매·서비스직	83	22.1(5.6)	25.4	22	24.9(10.6)	42.7	61	21.0(5.7)	27.2
농림어업	54	15.0(5.2)	34.7	33	8.6(5.3)	61.6	21	24.5(7.8)	32.1
기능단순노무직	183	25.1(3.1)	12.3	154	25.6(3.4)	13.4	29	22.6(7.0)	30.8
기타 ³⁾	389	18.1(1.9)	10.6	123	17.9(3.9)	21.9	266	18.2(2.1)	11.5
월 가구소득									
100만원 미만	48	12.4(4.4)	35.1	19	-(-)	-	29	10.3(5.4)	53.0
101-200만원 미만	91	24.2(5.8)	24.1	39	19.7(6.7)	34.3	52	27.7(6.3)	22.7
201-300만원 미만	134	23.3(4.6)	19.8	66	28.3(6.0)	21.2	68	18.4(5.8)	31.4
301-400만원 미만	233	21.5(2.6)	12.3	114	22.4(3.9)	17.4	119	20.6(3.6)	17.7
400만원 이상	395	18.6(2.0)	10.5	203	17.5(2.7)	15.2	192	20.0(2.8)	13.8

주 : 1) 스트레스 인지율 : (평균 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 37〉 우울감 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	1.1(0.4)	32.7	448	0.5(0.4)	70.8	464	1.8(0.7)	38.9
연령									
19-29	121	0.8(0.8)	101.1	60	1.5(1.5)	100.1	61	0.0(0.0)	.
30-39	123	0.0(0.0)	.	58	0.0(0.0)	.	65	0.0(0.0)	.
40-49	187	0.5(0.5)	99.5	95	0.0(0.0)	.	92	1.1(1.1)	99.4
50-59	208	2.6(1.3)	50.2	107	0.0(0.0)	.	101	5.5(2.7)	49.5
60-69	145	1.3(0.9)	73.0	73	1.0(1.0)	101.0	72	1.5(1.5)	99.5
70 이상	128	1.4(1.0)	71.7	55	1.4(1.4)	103.3	73	1.4(1.4)	98.4
19-64	714	1.1(0.4)	38.4	351	0.5(0.4)	75.0	363	1.7(0.8)	46.2
65 이상	198	1.5(0.9)	58.6	97	0.8(0.8)	102.9	101	2.1(1.4)	68.9
교육수준 ²⁾									
무학	50	2.1(2.1)	97.3	4	-(-)	-	46	2.3(2.3)	97.3
초등학교	95	2.5(1.7)	67.6	35	0.0(0.0)	.	60	3.8(2.6)	67.4
중학교	74	3.9(3.1)	78.7	34	2.1(2.2)	101.2	40	5.3(5.2)	97.3
고등학교	382	1.3(0.6)	46.4	211	0.8(0.6)	74.7	171	2.0(1.2)	58.5
대학교 이상	311	0.0(0.0)	.	164	0.0(0.0)	.	147	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	91	0.0(0.0)	.	54	0.0(0.0)	.	37	0.0(0.0)	.
사무직	112	0.0(0.0)	.	62	0.0(0.0)	.	50	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	83	1.1(1.1)	99.7	22	0.0(0.0)	.	61	1.5(1.5)	100.1
농림어업	54	2.4(2.2)	94.1	33	0.0(0.0)	.	21	5.8(5.3)	91.4
기능단순노무직	183	0.0(0.0)	.	154	0.0(0.0)	.	29	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	389	2.3(0.9)	38.4	123	2.0(1.4)	70.4	266	2.4(1.1)	45.3
월 가구소득									
100만원 미만	48	1.6(1.6)	102.5	19	-(-)	-	29	0.0(0.0)	.
101-200만원 미만	91	4.8(2.7)	55.9	39	3.5(3.5)	99.9	52	5.8(4.1)	71.0
201-300만원 미만	134	2.1(1.2)	57.4	66	1.0(1.0)	99.8	68	3.2(2.2)	67.8
301-400만원 미만	233	0.8(0.6)	70.5	114	0.0(0.0)	.	119	1.7(1.2)	70.6
400만원 이상	395	0.3(0.3)	100.0	203	0.0(0.0)	.	192	0.7(0.7)	99.9

주 : 1) 우울감 경험률 : (최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 경험한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 38〉 우울증상유병률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	1.1(0.3)	28.6	448	1.0(0.5)	50.8	464	1.3(0.5)	41.7
연령									
19-29	121	1.7(1.1)	61.0	60	1.5(1.5)	100.1	61	2.1(2.0)	95.3
30-39	123	1.6(1.0)	61.5	58	1.7(1.7)	99.5	65	1.5(1.5)	99.3
40-49	187	0.9(0.6)	70.1	95	0.0(0.0)	.	92	1.9(1.3)	70.1
50-59	208	0.0(0.0)	.	107	0.0(0.0)	.	101	0.0(0.0)	.
60-69	145	1.8(0.9)	51.1	73	2.4(1.7)	72.0	72	1.1(1.1)	100.2
70 이상	128	1.4(1.0)	71.7	55	1.4(1.4)	103.3	73	1.4(1.4)	98.4
19-64	714	1.0(0.3)	35.2	351	0.8(0.5)	60.7	363	1.2(0.6)	50.4
65 이상	198	1.8(0.8)	45.8	97	1.8(1.4)	73.4	101	1.8(1.3)	68.4
교육수준 ²⁾									
무학	50	2.1(2.1)	97.3	4	-(-)	-	46	2.3(2.3)	97.3
초등학교	95	1.9(1.4)	71.6	35	3.0(3.0)	99.2	60	1.3(1.3)	100.2
중학교	74	1.0(1.0)	101.7	34	2.1(2.2)	101.2	40	0.0(0.0)	.
고등학교	382	1.1(0.5)	45.7	211	0.8(0.6)	74.7	171	1.4(1.0)	70.1
대학교 이상	311	0.9(0.5)	58.5	164	0.7(0.7)	99.6	147	1.2(0.8)	70.2
직업									
전문행정관리	91	0.0(0.0)	.	54	0.0(0.0)	.	37	0.0(0.0)	.
사무직	112	1.0(1.0)	100.5	62	1.7(1.7)	99.8	50	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	83	0.0(0.0)	.	22	0.0(0.0)	.	61	0.0(0.0)	.
농림어업	54	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	21	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	183	0.0(0.0)	.	154	0.0(0.0)	.	29	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	389	2.4(0.7)	30.6	123	2.6(1.5)	58.6	266	2.3(1.0)	41.8
월 가구소득									
100만원 미만	48	3.3(1.6)	47.9	19	-(-)	-	29	3.1(2.9)	94.2
101-200만원 미만	91	5.0(2.5)	50.5	39	3.5(3.5)	99.9	52	6.1(3.4)	55.7
201-300만원 미만	134	1.1(0.8)	69.9	66	2.2(1.6)	70.1	68	0.0(0.0)	.
301-400만원 미만	233	1.2(0.8)	70.0	114	1.1(1.1)	98.7	119	1.2(1.2)	98.5
400만원 이상	395	0.2(0.2)	99.7	203	0.0(0.0)	.	192	0.5(0.5)	99.6

주 : 1) 우울증상유병률 : (우울증선별도구(PHQ-9) 점수 종합이 10점 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 39〉 인지장애 경험률(≥50)¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	481	9.2(1.4)	15.5	235	5.5(1.5)	26.8	246	12.8(2.3)	18.0
연령									
50-59	208	8.4(2.1)	24.8	107	3.9(1.8)	46.9	101	13.6(3.6)	26.4
60-69	145	5.2(1.6)	30.1	73	2.6(1.8)	67.9	72	7.7(2.9)	37.9
70 이상	128	15.5(3.7)	23.8	55	13.6(4.8)	35.4	73	16.9(4.8)	28.2
50-64	283	7.1(1.6)	23.1	138	3.6(1.6)	42.8	145	10.7(2.6)	24.8
65 이상	198	12.8(2.9)	22.9	97	8.9(3.0)	33.8	101	16.3(4.2)	25.7
교육수준 ²⁾									
무학	50	15.0(5.2)	34.6	4	-(-)	-	46	13.6(5.0)	37.0
초등학교	94	14.4(3.7)	25.4	34	10.6(5.1)	48.3	60	16.3(4.7)	28.8
중학교	68	6.0(2.6)	43.8	31	2.4(2.5)	101.2	37	8.7(4.2)	48.0
고등학교	192	8.3(1.9)	22.5	108	6.1(2.5)	41.2	84	11.3(3.6)	31.6
대학교 이상	77	5.3(3.2)	59.3	58	2.0(2.0)	98.0	19	-(-)	-
직업									
전문행정관리	36	5.4(3.6)	66.8	29	3.6(3.4)	95.8	7	-(-)	-
사무직	24	3.2(3.2)	99.8	16	-(-)	-	8	-(-)	-
판매·서비스직	53	0.0(0.0)	.	13	-(-)	-	40	0.0(0.0)	.
농림어업	50	13.0(4.2)	32.8	30	6.7(4.9)	73.0	20	21.5(8.4)	38.9
기능단순노무직	85	3.9(2.1)	54.6	68	4.8(2.6)	54.8	17	-(-)	-
기타 ³⁾	233	14.4(2.5)	17.3	79	9.3(3.3)	35.1	154	16.8(3.3)	19.8
월 가구소득									
100만원 미만	44	12.1(4.5)	37.0	17	-(-)	-	27	11.0(6.5)	58.9
101-200만원 미만	73	18.6(4.8)	25.6	31	15.4(7.2)	47.1	42	21.0(7.1)	34.0
201-300만원 미만	98	7.1(3.0)	42.7	51	6.2(3.7)	60.4	47	8.1(3.9)	47.6
301-400만원 미만	117	10.1(2.9)	28.9	57	2.0(2.0)	98.9	60	17.9(4.9)	27.4
400만원 이상	143	5.4(2.4)	45.4	75	3.0(2.0)	66.0	68	8.2(3.9)	47.3

주 : 1) 인지장애 경험률 : (최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 평소 잘 하던 집안일이나 일상생활에서의 일을 못한 적이 “항상” 또는 “자주”에 응답한 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 40〉 인지장애로 인한 지장 및 도움(≥50)

(단위 : %)

구분	인지장애로 인한 일상생활 지장률 ¹⁾			인지장애로 인한 도움 필요율 ²⁾			일상생활 도움 수혜율 ³⁾			인지장애로 인한 사회활동 지장률 ⁴⁾		
	N	%(표준오차)	변동 계수	N	%(표준오차)	변동 계수	N	%(표준오차)	변동 계수	N	%(표준오차)	변동 계수
전체	46	3.9(1.6)	40.9	46	8.4(1.7)	20.2	10	-(-)	-	46	3.9(1.6)	40.9
성												
남자	13	-(-)	-	13	-(-)	-	5	-(-)	-	13	-(-)	-
여자	33	3.3(0.4)	11.7	33	6.7(3.3)	48.6	5	-(-)	-	33	3.3(0.4)	11.7
연령												
50-59	18	-(-)	-	18	-(-)	-	1	-(-)	-	18	-(-)	-
60-69	8	-(-)	-	8	-(-)	-	1	-(-)	-	8	-(-)	-
70 이상	20	9.5(3.9)	41.6	20	15.4(6.6)	42.6	8	-(-)	-	20	9.5(3.9)	41.6
50-64	21	0.0(0.0)	.	21	0.0(0.0)	.	1	-(-)	-	21	0.0(0.0)	.
65 이상	25	7.5(3.1)	41.9	25	16.2(3.9)	24.1	9	-(-)	-	25	7.5(3.1)	41.9
교육수준 ⁵⁾												
무학	8	-(-)	-	8	-(-)	-	2	-(-)	-	8	-(-)	-
초등학교	14	-(-)	-	14	-(-)	-	4	-(-)	-	14	-(-)	-
중학교	4	-(-)	-	4	-(-)	-	1	-(-)	-	4	-(-)	-
고등학교	16	-(-)	-	16	-(-)	-	3	-(-)	-	16	-(-)	-
대학교 이상	4	-(-)	-	4	-(-)	-	0	-(-)	-	4	-(-)	-
직업												
전문행정관리	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-	2	-(-)	-
사무직	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-	1	-(-)	-
판매·서비스직	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
농림어업	6	-(-)	-	6	-(-)	-	1	-(-)	-	6	-(-)	-
기능단순노무직	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-	3	-(-)	-
기타 ⁶⁾	34	5.4(2.2)	40.2	34	8.7(3.8)	43.3	9	-(-)	-	34	5.4(2.2)	40.2
월 가구소득												
100만원 미만	6	-(-)	-	6	-(-)	-	3	-(-)	-	6	-(-)	-
101-200만원 미만	13	-(-)	-	13	-(-)	-	4	-(-)	-	13	-(-)	-
201-300만원 미만	7	-(-)	-	7	-(-)	-	1	-(-)	-	7	-(-)	-
301-400만원 미만	12	-(-)	-	12	-(-)	-	1	-(-)	-	12	-(-)	-
400만원 이상	8	-(-)	-	8	-(-)	-	1	-(-)	-	8	-(-)	-

주 : 1) 인지장애로 인한 일상생활 지장률 : (최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 평소 잘 하던 집안일이나 일상생활에서의 일을 못한 적이 “항상” 또는 “자주”에 응답한 사람의 수 / 인지장애 경험이 있다고 응답한 50세 이상 사람의 수) × 100

2) 인지장애로 인한 도움 필요율 : (정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어진 것 때문에, 일상생활에서 “항상” 또는 “자주”에 응답한 사람의 수 / 인지장애 경험이 있다고 응답한 50세 이상 사람의 수) × 100

3) 일상생활 도움 수혜율 : (일상생활에서 도움이 필요할 때, “항상” 또는 “자주”에 응답한 사람의 수 / 인지장애로 인한 도움이 필요하다고 응답한 50세 이상 사람의 수) × 100

4) 인지장애로 인한 사회활동 지장률 : (최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 직장생활이나 자원봉사, 사회활동을 하는데 “항상” 또는 “자주”에 응답한 사람의 수 / 인지장애 경험이 있다고 응답한 50세 이상 사람의 수) × 100

5) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

6) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 41〉 인지장애 상담률(≥50)¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	46	0.0(0.0)	.	13	-(-)	-	33	0.0(0.0)	.
연령									
50-59	18	-(-)	-	4	-(-)	-	14	-(-)	-
60-69	8	-(-)	-	2	-(-)	-	6	-(-)	-
70 이상	20	0.0(0.0)	.	7	-(-)	-	13	-(-)	-
50-64	21	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	16	-(-)	-
65 이상	25	0.0(0.0)	.	8	-(-)	-	17	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	8	-(-)	-	1	-(-)	-	7	-(-)	-
초등학교	14	-(-)	-	4	-(-)	-	10	-(-)	-
중학교	4	-(-)	-	1	-(-)	-	3	-(-)	-
고등학교	16	-(-)	-	6	-(-)	-	10	-(-)	-
대학교 이상	4	-(-)	-	1	-(-)	-	3	-(-)	-
직업									
전문행정관리	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
사무직	1	-(-)	-	0	-(-)	-	1	-(-)	-
판매·서비스직	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
농림어업	6	-(-)	-	2	-(-)	-	4	-(-)	-
기능단순노무직	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
기타 ³⁾	34	0.0(0.0)	.	7	-(-)	-	27	0.0(0.0)	.
월 가구소득									
100만원 미만	6	-(-)	-	3	-(-)	-	3	-(-)	-
101-200만원 미만	13	-(-)	-	4	-(-)	-	9	-(-)	-
201-300만원 미만	7	-(-)	-	3	-(-)	-	4	-(-)	-
301-400만원 미만	12	-(-)	-	1	-(-)	-	11	-(-)	-
400만원 이상	8	-(-)	-	2	-(-)	-	6	-(-)	-

주 : 1) 인지장애 상담률 : (정신 혼란이나 기억력 감소 때문에 본인이나 다른 사람이 전문가의 상담을 받은 적이 있는 사람의 수 / 인지장애 경험이 있다고 응답한 50세 이상 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 42〉 연간 치매선별검사 수진율 및 장소

(단위 : %)

구분	N ³⁾	치매선별검사 장소 ¹⁾								N ⁴⁾	연간 치매선별검사 수진율 ²⁾	
		치매안심센터(보건소)		보건지소, 보건진료소		병원		기타			% (표준오차)	변동계수
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수			
전체	47	25.5(4.6)	17.9	41.5(5.6)	13.5	6.3(3.4)	54.5	26.8(6.4)	23.9	481	9.2(1.4)	15.6
성												
남자	13	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	235	5.5(1.8)	33.4
여자	34	21.5(3.5)	16.4	45.7(7.1)	15.6	8.9(4.6)	51.9	24.0(6.6)	27.6	246	13.0(2.3)	17.9
연령												
50-59	1	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	208	0.5(0.4)	97.3
60-69	13	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	145	8.8(2.3)	26.3
70 이상	33	19.9(7.9)	39.9	43.3(6.3)	14.6	6.7(4.8)	72.0	30.1(9.4)	31.2	128	27.2(4.1)	15.1

주 : 1) 연간 치매선별검사 장소 : (각 장소별 검사자 수 / 최근 1년 동안 치매 선별검사를 받은 적이 있는 사람의 수) × 100

2) 연간 치매선별검사 수진율 : (최근 1년 동안 치매선별검사를 받은 적이 있는 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자의 수) × 100

3) 최근 1년 동안 치매 선별검사를 받은 적이 있는 사람의 수

4) 50세 이상 조사대상 응답자의 수

〈표 43〉 정신건강증진센터 인지도¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	12.1(1.1)	9.3	448	10.1(1.4)	13.8	464	14.3(1.6)	11.2
연령									
19-29	121	6.7(1.9)	29.0	60	5.3(2.7)	51.6	61	8.5(2.5)	29.5
30-39	123	9.9(2.5)	25.4	58	10.9(3.2)	29.7	65	8.8(3.1)	35.3
40-49	187	16.9(3.0)	17.9	95	10.3(3.0)	29.5	92	23.8(4.8)	20.0
50-59	208	16.4(2.9)	17.5	107	13.5(3.5)	26.0	101	19.8(3.9)	19.4
60-69	145	9.8(2.0)	20.2	73	9.9(3.3)	33.4	72	9.6(2.8)	29.1
70 이상	128	7.9(2.6)	33.0	55	9.1(3.9)	42.9	73	7.0(2.9)	40.7
19-64	714	13.1(1.3)	9.6	351	10.6(1.6)	14.8	363	15.9(1.9)	11.7
65 이상	198	7.0(2.0)	28.2	97	7.2(2.6)	35.6	101	6.8(2.6)	38.3
교육수준 ²⁾									
무학	50	5.5(3.1)	56.0	4	-(-)	-	46	6.1(3.3)	55.3
초등학교	95	9.4(3.0)	31.7	35	6.1(4.2)	68.7	60	11.1(3.7)	33.7
중학교	74	5.9(2.7)	46.3	34	2.1(2.1)	99.7	40	9.0(4.5)	49.9
고등학교	382	11.4(1.7)	14.6	211	9.3(2.1)	23.0	171	14.3(2.6)	18.3
대학교 이상	311	15.4(2.1)	13.4	164	12.9(2.2)	17.0	147	18.3(3.2)	17.4
직업									
전문행정관리	91	21.4(4.8)	22.3	54	19.6(5.8)	29.5	37	24.1(7.1)	29.6
사무직	112	17.0(3.6)	21.2	62	14.4(4.7)	32.4	50	20.8(4.9)	23.6
판매·서비스직	83	11.2(3.5)	31.8	22	25.0(10.2)	40.6	61	6.0(2.7)	45.9
농림어업	54	10.4(3.9)	37.6	33	11.5(5.3)	46.1	21	8.9(6.3)	71.2
기능단순노무직	183	6.1(1.7)	28.1	154	5.4(1.7)	30.8	29	10.2(5.5)	54.1
기타 ³⁾	389	11.4(1.7)	14.5	123	5.9(1.8)	31.1	266	14.2(2.3)	16.0
월 가구소득									
100만원 미만	48	1.5(1.5)	99.9	19	-(-)	-	29	2.6(2.6)	99.0
101-200만원 미만	91	9.0(2.8)	31.2	39	2.2(2.1)	94.7	52	14.3(4.6)	32.1
201-300만원 미만	134	7.8(2.6)	32.7	66	3.6(2.1)	59.5	68	12.0(4.0)	33.3
301-400만원 미만	233	9.0(1.7)	18.7	114	8.4(2.3)	27.0	119	9.7(2.7)	27.9
400만원 이상	395	16.1(1.7)	10.4	203	14.1(2.1)	14.8	192	18.5(2.9)	15.9

주 : 1) 정신건강증진센터 인지도 : (본인이 거주하고 있는 지역에 정신건강증진센터가 있다는 것을 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 44〉 평생 치매 예방관리 프로그램 참여 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	2.2(0.5)	22.5	448	1.0(0.5)	50.5	464	3.6(0.9)	24.2
연령									
19-29	121	1.0(1.0)	99.8	60	1.7(1.7)	99.3	61	0.0(0.0)	.
30-39	123	2.0(1.1)	56.9	58	0.0(0.0)	.	65	4.2(2.4)	57.0
40-49	187	2.5(1.2)	48.3	95	1.1(1.1)	99.7	92	4.0(2.2)	54.7
50-59	208	0.5(0.5)	100.7	107	1.0(1.0)	100.7	101	0.0(0.0)	.
60-69	145	2.8(1.4)	48.6	73	0.0(0.0)	.	72	5.5(2.8)	51.3
70 이상	128	6.7(2.3)	34.4	55	1.9(1.9)	100.5	73	10.2(3.8)	37.1
19-64	714	1.4(0.4)	32.2	351	0.9(0.5)	57.6	363	1.9(0.7)	36.5
65 이상	198	6.4(1.9)	29.3	97	1.1(1.1)	97.8	101	11.3(3.6)	31.4
교육수준 ²⁾									
무학	50	10.1(4.4)	43.7	4	-(-)	-	46	11.0(4.7)	42.7
초등학교	95	6.9(2.6)	37.5	35	0.0(0.0)	.	60	10.6(4.1)	39.1
중학교	74	1.3(1.2)	96.0	34	2.9(2.7)	93.3	40	0.0(0.0)	.
고등학교	382	0.9(0.4)	52.3	211	0.6(0.6)	99.0	171	1.2(0.8)	70.0
대학교 이상	311	2.1(0.8)	39.7	164	1.2(0.8)	68.3	147	3.1(1.5)	49.0
직업									
전문행정관리	91	2.1(1.4)	67.2	54	1.8(1.8)	101.0	37	2.8(2.6)	94.6
사무직	112	2.7(1.5)	57.7	62	3.5(2.5)	70.7	50	1.4(1.4)	100.0
판매·서비스직	83	2.2(1.5)	71.0	22	0.0(0.0)	.	61	3.0(2.1)	71.4
농림어업	54	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	21	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	183	0.0(0.0)	.	154	0.0(0.0)	.	29	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	389	3.5(1.0)	27.3	123	0.6(0.6)	99.5	266	5.0(1.4)	28.5
월 가구소득									
100만원 미만	48	7.3(3.7)	51.2	19	-(-)	-	29	12.8(6.1)	47.8
101-200만원 미만	91	2.7(1.6)	59.4	39	2.3(2.3)	103.6	52	3.1(2.2)	70.6
201-300만원 미만	134	4.3(1.8)	42.6	66	0.0(0.0)	.	68	8.5(3.5)	41.4
301-400만원 미만	233	0.3(0.3)	99.3	114	0.0(0.0)	.	119	0.6(0.6)	98.8
400만원 이상	395	2.2(0.7)	31.3	203	1.6(0.9)	57.7	192	3.0(1.2)	39.6

주 : 1) 평생 치매 예방관리 프로그램 참여 경험률 : (평생 동안 치매예방 및 관리 프로그램에 참여한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 45〉 치매 예방관리 프로그램 참여 희망률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	889	15.4(1.0)	6.8	443	8.7(1.1)	12.1	446	22.7(1.7)	7.5
연령									
19-29	120	5.8(2.0)	34.0	59	3.0(2.1)	70.8	61	9.4(3.0)	31.6
30-39	120	6.9(2.5)	36.3	58	7.6(2.3)	30.5	62	6.0(3.5)	57.3
40-49	183	9.5(2.0)	21.5	94	4.3(2.0)	45.6	89	15.1(3.4)	22.7
50-59	207	19.2(2.5)	12.8	106	6.2(2.2)	35.4	101	34.1(4.6)	13.5
60-69	140	30.5(4.3)	14.3	72	20.0(5.0)	25.2	68	41.1(6.5)	15.8
70 이상	119	29.5(4.2)	14.2	54	24.2(4.9)	20.1	65	33.8(5.8)	17.2
19-64	705	13.0(1.2)	9.0	348	6.6(1.1)	17.0	357	20.2(2.0)	9.9
65 이상	184	27.6(3.2)	11.5	95	20.3(3.5)	17.3	89	34.9(4.6)	13.2
교육수준 ²⁾									
무학	44	26.3(7.5)	28.4	4	-(-)	-	40	26.7(7.6)	28.3
초등학교	89	34.6(5.7)	16.5	35	22.5(6.8)	30.2	54	41.7(7.0)	16.8
중학교	73	20.1(4.0)	20.0	33	11.6(5.1)	44.3	40	26.9(5.8)	21.7
고등학교	378	14.4(1.8)	12.9	209	8.5(1.5)	17.9	169	22.4(3.6)	16.2
대학교 이상	305	10.5(1.4)	13.1	162	6.4(1.7)	27.1	143	15.5(2.2)	14.2
직업									
전문행정관리	89	17.6(3.2)	18.2	53	7.6(2.1)	27.2	36	33.5(6.9)	20.5
사무직	109	7.9(2.2)	27.4	60	4.7(2.6)	56.1	49	12.3(4.0)	32.1
판매·서비스직	80	22.6(4.7)	20.8	21	7.4(3.7)	50.6	59	28.3(6.2)	21.8
농림어업	54	20.2(5.3)	26.2	33	23.5(6.1)	26.0	21	15.5(7.3)	46.9
기능단순노무직	183	9.4(2.0)	21.0	154	6.4(1.8)	27.7	29	27.4(8.0)	29.1
기타 ³⁾	374	18.4(2.1)	11.4	122	12.0(2.8)	23.8	252	21.8(2.6)	11.9
월 가구소득									
100만원 미만	44	24.7(7.6)	30.7	19	-(-)	-	25	37.8(10.2)	27.0
101-200만원 미만	87	24.5(5.6)	22.8	37	12.6(5.7)	45.4	50	33.6(6.5)	19.5
201-300만원 미만	129	21.2(4.1)	19.5	66	15.9(4.6)	28.8	63	26.9(6.1)	22.5
301-400만원 미만	232	15.3(2.8)	18.5	114	8.4(2.9)	34.3	118	22.3(3.7)	16.5
400만원 이상	386	11.6(1.5)	13.2	200	6.6(1.4)	21.4	186	17.7(2.9)	16.1

주 : 1) 치매 예방관리 프로그램 참여 희망률 : (치매예방 및 관리 프로그램에 참여할 의사가 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 46〉 연간 인플루엔자 예방접종률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	39.9(2.0)	4.9	448	37.5(2.4)	6.4	464	42.4(2.5)	5.9
연령									
19-29	121	22.5(4.1)	18.2	60	23.4(5.9)	25.1	61	21.4(4.6)	21.4
30-39	123	40.4(5.2)	12.8	58	36.7(6.8)	18.6	65	44.5(7.2)	16.2
40-49	187	28.4(3.4)	11.9	95	27.8(4.3)	15.6	92	29.0(5.1)	17.5
50-59	208	32.6(3.6)	10.9	107	29.1(4.8)	16.5	101	36.6(4.6)	12.6
60-69	145	57.9(4.4)	7.6	73	58.6(6.3)	10.8	72	57.3(5.5)	9.5
70 이상	128	81.3(3.7)	4.6	55	83.1(6.5)	7.8	73	80.0(4.1)	5.1
19-64	714	31.3(1.9)	5.9	351	29.2(2.1)	7.2	363	33.7(2.8)	8.3
65 이상	198	81.5(2.9)	3.6	97	82.0(4.7)	5.7	101	81.0(3.5)	4.3
교육수준 ²⁾									
무학	50	81.0(5.4)	6.7	4	-(-)	-	46	79.2(5.8)	7.4
초등학교	95	67.2(5.1)	7.6	35	78.7(7.7)	9.8	60	61.2(6.3)	10.2
중학교	74	57.6(7.6)	13.2	34	60.0(9.4)	15.7	40	55.6(8.9)	15.9
고등학교	382	30.6(2.4)	7.8	211	30.6(3.0)	9.7	171	30.5(3.8)	12.5
대학교 이상	311	36.6(2.8)	7.7	164	35.7(3.4)	9.7	147	37.7(4.2)	11.1
직업									
전문행정관리	91	31.0(5.6)	18.2	54	29.2(6.4)	22.0	37	33.8(7.8)	23.0
사무직	112	30.7(4.8)	15.8	62	35.2(5.8)	16.5	50	24.2(6.4)	26.6
판매·서비스직	83	33.7(5.9)	17.5	22	34.1(10.5)	31.0	61	33.6(6.1)	18.1
농림어업	54	65.9(7.2)	11.0	33	71.6(7.9)	11.1	21	57.6(11.5)	19.9
기능단순노무직	183	33.7(3.4)	10.2	154	32.0(3.7)	11.5	29	43.6(10.4)	23.7
기타 ³⁾	389	46.9(2.7)	5.8	123	43.9(5.0)	11.4	266	48.5(3.0)	6.1
월 가구소득									
100만원 미만	48	78.9(6.6)	8.4	19	-(-)	-	29	85.9(5.9)	6.9
101-200만원 미만	91	53.8(6.7)	12.4	39	64.0(9.9)	15.5	52	46.0(6.5)	14.2
201-300만원 미만	134	50.4(5.0)	10.0	66	53.8(6.8)	12.7	68	47.1(5.7)	12.1
301-400만원 미만	233	38.0(3.7)	9.7	114	34.9(4.4)	12.6	119	41.2(4.4)	10.6
400만원 이상	395	32.4(2.9)	8.9	203	29.2(3.3)	11.2	192	36.3(4.3)	11.7

주 : 1) 연간 인플루엔자 예방접종률 : (최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 47〉 혈압 및 혈당수치 인지율

(단위 : %)

구분	혈압수치 인지율 ¹⁾			혈당수치 인지율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	25.5(2.0)	7.6	912	11.5(1.3)	11.0
성						
남자	448	28.8(2.5)	8.7	448	12.9(1.5)	11.8
여자	464	22.1(2.0)	9.2	464	10.1(1.6)	15.9
연령						
19-29	121	15.6(3.9)	24.8	121	5.1(2.7)	53.5
30-39	123	22.8(4.2)	18.5	123	8.0(2.4)	30.1
40-49	187	24.0(3.8)	16.0	187	10.5(2.4)	22.7
50-59	208	36.4(4.0)	11.0	208	11.2(2.2)	19.7
60-69	145	36.0(4.1)	11.4	145	28.1(4.3)	15.3
70 이상	128	13.9(3.9)	28.5	128	9.9(3.3)	33.6
19-64	714	26.7(2.2)	8.1	714	10.8(1.3)	11.9
65 이상	198	20.2(3.3)	16.3	198	15.3(3.0)	19.8
교육수준 ³⁾						
무학	50	1.7(1.7)	102.2	50	3.6(2.5)	68.5
초등학교	95	17.3(3.9)	22.7	95	16.4(4.2)	25.5
중학교	74	22.1(6.4)	29.2	74	19.5(5.2)	26.7
고등학교	382	27.3(2.5)	9.3	382	12.0(2.1)	17.1
대학교 이상	311	28.8(3.3)	11.4	311	9.4(1.6)	16.7
직업						
전문행정관리	91	34.1(5.4)	15.8	91	17.8(3.4)	18.9
사무직	112	24.3(4.2)	17.3	112	8.3(2.4)	28.6
판매·서비스직	83	20.6(5.3)	25.7	83	7.8(2.7)	34.4
농림어업	54	16.8(4.8)	28.8	54	10.9(5.3)	48.6
기능단순노무직	183	26.2(3.8)	14.7	183	9.7(1.9)	19.3
기타 ⁴⁾	389	25.4(2.3)	8.9	389	12.8(2.2)	17.4
월 가구소득						
100만원 미만	48	17.0(5.3)	31.3	48	15.0(5.5)	36.9
101-200만원 미만	91	30.4(4.8)	15.7	91	23.3(5.2)	22.3
201-300만원 미만	134	22.9(4.0)	17.7	134	11.0(3.0)	27.4
301-400만원 미만	233	25.4(3.8)	15.1	233	13.8(2.9)	21.1
400만원 이상	395	26.0(2.8)	10.8	395	8.1(1.4)	16.7

주 : 1) 혈압수치 인지율 : (본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 혈당수치 인지율 : (본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 48〉 고혈압 진단 경험률

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체 ¹⁾	912	17.9(1.3)	7.4	448	16.7(1.7)	10.3	464	19.2(1.8)	9.4
30세 이상 ²⁾	791	21.4(1.6)	7.3	388	20.3(2.1)	10.2	403	22.5(2.1)	9.2
연령									
19-29	121	0.0(0.0)	.	60	0.0(0.0)	.	61	0.0(0.0)	.
30-39	123	0.9(0.9)	100.4	58	1.6(1.6)	100.0	65	0.0(0.0)	.
40-49	187	8.0(2.3)	29.0	95	9.1(2.8)	31.1	92	6.8(2.8)	40.6
50-59	208	28.6(3.5)	12.3	107	29.0(4.5)	15.4	101	28.1(4.8)	16.9
60-69	145	37.8(3.8)	10.1	73	40.4(6.1)	15.1	72	35.2(5.3)	15.1
70 이상	128	44.2(4.9)	11.1	55	31.8(7.8)	24.4	73	53.3(5.9)	11.0

주 : 1) 고혈압 진단 경험률 : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 고혈압 진단 경험률(≥30) : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 49〉 고혈압 진단 경험자의 치료율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체 ¹⁾	182	95.3(1.5)	1.6	85	97.6(1.7)	1.8	97	93.2(2.4)	2.6
30세 이상 ²⁾	182	95.3(1.5)	1.6	85	97.6(1.7)	1.8	97	93.2(2.4)	2.6
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	15	-(-)	-	9	-(-)	-	6	-(-)	-
50-59	58	96.1(2.6)	2.7	31	100.0(0.0)	0.0	27	91.5(6.0)	6.6
60-69	54	96.1(2.8)	2.9	29	100.0(0.0)	0.0	25	91.7(5.7)	6.2
70 이상	54	96.4(2.4)	2.5	15	-(-)	-	39	97.3(2.5)	2.6

주 : 1) 고혈압 진단 경험자의 치료율 : (현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30) : (현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 50〉 고혈압 관리교육 장소 및 고혈압 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	N ⁵⁾	고혈압 관리교육 장소 ¹⁾				고혈압 관리교육 이수율 ²⁾	
		병원		보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소			
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	182	13. 4(2. 8)	21. 1	5. 7(2. 0)	34. 7	13. 9(2. 8)	20. 2
성							
남자	85	17. 6(4. 5)	25. 6	5. 5(2. 7)	48. 9	18. 6(4. 5)	24. 1
여자	97	9. 6(3. 2)	33. 1	5. 9(2. 6)	43. 5	9. 6(3. 2)	33. 1
30세 이상 ^{3), 4)}	182	13. 4(2. 8)	21. 1	5. 7(2. 0)	34. 7	13. 9(2. 8)	20. 2
성							
남자	85	17. 6(4. 5)	25. 6	5. 5(2. 7)	48. 9	18. 6(4. 5)	24. 1
여자	97	9. 6(3. 2)	33. 1	5. 9(2. 6)	43. 5	9. 6(3. 2)	33. 1
연령							
19-29	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	58	20. 9(6. 2)	29. 5	5. 6(3. 3)	58. 7	20. 9(6. 2)	29. 5
60-69	54	3. 9(2. 8)	71. 4	1. 8(1. 7)	92. 1	5. 7(3. 1)	53. 9
70 이상	54	9. 4(4. 3)	45. 5	9. 4(4. 3)	45. 5	9. 4(4. 3)	45. 5

주 : 1) 고혈압 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 관리교육 이수율 : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 고혈압 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 고혈압 관리교육 이수율(≥30) : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

5) 고혈압 평생 의사진단을 받은 사람의 수

〈표 51〉 당뇨병 진단 경험률

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체 ¹⁾	912	8.6(1.1)	12.2	448	8.5(1.1)	13.2	464	8.7(1.5)	16.7
30세 이상 ²⁾	791	10.3(1.2)	11.9	388	10.4(1.3)	13.0	403	10.3(1.7)	16.3
연령									
19-29	121	0.0(0.0)	.	60	0.0(0.0)	.	61	0.0(0.0)	.
30-39	123	2.8(1.2)	43.4	58	5.4(2.3)	42.8	65	0.0(0.0)	.
40-49	187	4.4(1.3)	30.3	95	6.0(2.2)	36.9	92	2.7(1.5)	55.2
50-59	208	7.8(1.7)	21.9	107	4.2(1.5)	36.0	101	12.0(3.4)	28.1
60-69	145	23.9(4.0)	16.5	73	28.0(5.3)	18.8	72	20.0(4.4)	22.0
70 이상	128	22.0(4.0)	18.2	55	21.6(6.5)	30.3	73	22.3(5.0)	22.3

주 : 1) 당뇨병 진단 경험률 : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 당뇨병 진단 경험률(≥30) : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 52〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체 ¹⁾	89	90.7(3.7)	4.0	44	92.1(4.5)	4.8	45	89.2(5.1)	5.7
30세 이상 ²⁾	89	90.7(3.7)	4.0	44	92.1(4.5)	4.8	45	89.2(5.1)	5.7
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	9	-(-)	-	6	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	16	-(-)	-	5	-(-)	-	11	-(-)	-
60-69	33	89.4(6.1)	6.8	19	-(-)	-	14	-(-)	-
70 이상	28	92.7(5.3)	5.8	11	-(-)	-	17	-(-)	-

주 : 1) 당뇨병 진단 경험자의 치료율 : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30) : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 53〉 당뇨병 관리교육 장소 및 당뇨병 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	N ⁵⁾	당뇨병 관리교육 장소 ¹⁾				당뇨병 관리교육 이수율 ²⁾	
		병의원		보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소			
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	89	11. 2(3. 2)	28. 3	1. 0(1. 0)	96. 3	12. 2(3. 2)	26. 1
성							
남자	44	16. 0(4. 6)	28. 5	2. 0(2. 0)	98. 4	18. 0(4. 8)	26. 6
여자	45	6. 3(3. 7)	58. 9	0. 0(0. 0)	.	6. 3(3. 7)	58. 9
30세 이상 ^{3), 4)}	89	11. 2(3. 2)	28. 3	1. 0(1. 0)	96. 3	12. 2(3. 2)	26. 1
성							
남자	44	16. 0(4. 6)	28. 5	2. 0(2. 0)	98. 4	18. 0(4. 8)	26. 6
여자	45	6. 3(3. 7)	58. 9	0. 0(0. 0)	.	6. 3(3. 7)	58. 9
연령							
19-29	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
60-69	33	7. 2(3. 9)	53. 3	2. 9(2. 6)	90. 6	10. 1(4. 3)	42. 1
70 이상	28	3. 9(4. 0)	102. 1	0. 0(0. 0)	.	3. 9(4. 0)	102. 1

주 : 1) 당뇨병 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 관리교육 이수율 : (당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 당뇨병 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 당뇨병 관리교육 이수율(≥30) : (당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

5) 당뇨병 평생 의사진단을 받은 사람의 수

〈표 54〉 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사 수진율 및 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사 수진율

(단위 : %)

구분	연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율 ¹⁾			연간 당뇨병 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	89	40.5(5.3)	13.1	89	59.2(4.4)	7.5
성						
남자	44	33.3(6.5)	19.4	44	58.0(5.6)	9.6
여자	45	47.9(7.1)	14.8	45	60.5(6.4)	10.5
30세 이상 ^{3),4)}	89	40.5(5.3)	13.1	89	59.2(4.4)	7.5
성						
남자	44	33.3(6.5)	19.4	44	58.0(5.6)	9.6
여자	45	47.9(7.1)	14.8	45	60.5(6.4)	10.5
연령						
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	3	-(-)	-	3	-(-)	-
40-49	9	-(-)	-	9	-(-)	-
50-59	16	-(-)	-	16	-(-)	-
60-69	33	40.2(8.8)	21.9	33	60.1(7.8)	13.0
70 이상	28	54.9(11.5)	21.0	28	71.0(8.7)	12.2

주 : 1) 연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율 : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율 : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율(≥30) : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥30) : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 55〉 연간 평균 혈압 및 혈당 측정 횟수

(단위 : 회)

구분	연간 평균 혈압 측정 횟수 ¹⁾			연간 평균 혈당 측정 횟수 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	911	14.6(1.3)	8.7	911	7.1(1.0)	14.3
성						
남자	448	14.7(1.5)	10.5	447	7.9(1.5)	18.5
여자	463	14.5(2.1)	14.6	464	6.2(1.4)	23.2
연령						
19-29	121	9.1(2.6)	28.6	121	0.9(0.1)	8.4
30-39	123	6.4(0.7)	10.8	123	5.8(0.5)	9.2
40-49	187	9.2(1.6)	17.5	187	3.0(1.0)	34.4
50-59	207	26.2(4.8)	18.4	208	11.9(3.8)	32.3
60-69	145	15.9(2.2)	14.0	144	11.8(1.9)	16.0
70 이상	128	21.1(4.7)	22.3	128	11.2(3.4)	30.2
19-64	713	13.5(1.5)	11.2	714	6.2(1.2)	18.8
65 이상	198	20.2(3.4)	16.6	197	11.4(2.5)	22.0
교육수준 ³⁾						
무학	50	16.7(3.5)	21.0	50	13.2(7.0)	53.3
초등학교	95	25.8(9.9)	38.5	94	8.8(2.4)	27.8
중학교	74	11.6(2.3)	20.0	74	21.3(9.2)	43.5
고등학교	381	16.1(1.9)	11.8	382	6.3(1.7)	26.9
대학교 이상	311	10.8(2.1)	19.8	311	4.3(0.7)	15.6
직업						
전문행정관리	91	12.9(3.4)	26.3	91	12.4(2.9)	23.5
사무직	112	16.6(4.1)	25.0	112	2.0(0.2)	11.0
판매·서비스직	83	5.9(0.6)	10.7	83	3.2(1.1)	33.3
농림어업	54	15.5(6.2)	40.1	54	9.3(3.4)	36.9
기능단순노무직	183	13.4(2.1)	15.3	183	7.1(3.0)	41.9
기타 ⁴⁾	388	16.9(2.6)	15.1	388	8.0(1.8)	23.1
월 가구소득						
100만원 미만	48	29.0(17.9)	61.9	48	13.0(6.3)	48.4
101-200만원 미만	91	19.1(5.3)	27.5	91	10.9(3.7)	33.6
201-300만원 미만	134	10.3(1.1)	10.5	133	4.0(1.2)	31.3
301-400만원 미만	232	10.8(2.1)	19.4	233	6.1(1.5)	25.4
400만원 이상	395	15.6(2.0)	12.5	395	7.4(1.9)	25.3

주 : 1) 연간 평균 혈압 측정횟수 : ((하루 측정횟수×365일)+(일주일 측정횟수×52주)+(한 달 측정횟수×12개월)+(일 년 측정횟수)) / 조사대상 응답자 수

2) 연간 평균 혈당 측정횟수 : ((하루 측정횟수×365일)+(일주일 측정횟수×52주)+(한 달 측정횟수×12개월)+(일 년 측정횟수)) / 조사대상 응답자 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직일 수의 총 합 / 만성·급성질환 및 사고중독 경험자 수

〈표 56〉 대사증후군 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	37.5(2.4)	6.5	448	37.1(2.7)	7.3	464	37.9(3.0)	7.8
연령									
19-29	121	45.6(5.0)	10.9	60	36.6(7.0)	19.1	61	57.0(6.3)	11.1
30-39	123	38.6(5.3)	13.7	58	40.6(6.4)	15.8	65	36.4(6.3)	17.4
40-49	187	49.5(4.6)	9.2	95	40.6(5.6)	13.7	92	59.0(5.4)	9.1
50-59	208	41.1(3.9)	9.5	107	45.0(4.6)	10.2	101	36.5(5.2)	14.4
60-69	145	26.2(3.9)	15.0	73	32.0(5.1)	15.9	72	20.7(5.5)	26.7
70 이상	128	6.1(2.6)	42.5	55	10.4(4.8)	45.9	73	2.9(2.1)	71.0
19-64	714	42.3(2.8)	6.6	351	39.6(3.2)	8.1	363	45.3(3.4)	7.5
65 이상	198	14.2(2.6)	18.3	97	23.8(4.0)	16.8	101	5.4(2.7)	49.5
교육수준 ²⁾									
무학	50	0.0(0.0)	.	4	-(-)	-	46	0.0(0.0)	.
초등학교	95	10.5(3.3)	31.2	35	13.8(6.6)	47.8	60	8.7(3.5)	40.5
중학교	74	18.6(4.7)	25.0	34	18.6(6.7)	35.7	40	18.6(6.0)	32.2
고등학교	382	43.0(3.2)	7.5	211	38.5(3.6)	9.3	171	49.0(4.3)	8.8
대학교 이상	311	45.0(3.9)	8.6	164	42.1(4.4)	10.4	147	48.3(5.4)	11.3
직업									
전문행정관리	91	38.4(5.2)	13.4	54	36.3(6.1)	16.7	37	41.8(8.7)	20.8
사무직	112	49.5(6.2)	12.6	62	47.7(6.5)	13.5	50	51.9(9.3)	18.0
판매·서비스직	83	35.1(5.7)	16.2	22	54.0(11.1)	20.5	61	28.1(5.8)	20.5
농림어업	54	21.3(6.8)	32.0	33	28.1(8.1)	28.9	21	11.4(7.1)	62.1
기능단순노무직	183	38.8(3.8)	9.8	154	38.4(4.3)	11.1	29	41.4(7.9)	19.1
기타 ³⁾	389	34.9(3.1)	8.8	123	28.2(4.3)	15.1	266	38.3(3.6)	9.5
월 가구소득									
100만원 미만	48	20.1(7.2)	35.6	19	-(-)	-	29	15.1(9.1)	60.5
101-200만원 미만	91	27.2(5.0)	18.5	39	24.4(6.6)	27.0	52	29.4(6.2)	21.2
201-300만원 미만	134	26.4(4.6)	17.4	66	27.1(6.2)	22.8	68	25.8(5.7)	21.9
301-400만원 미만	233	36.8(3.7)	10.1	114	33.9(4.7)	14.0	119	39.8(4.3)	10.8
400만원 이상	395	43.6(3.8)	8.6	203	43.1(4.2)	9.7	192	44.2(4.6)	10.5

주 : 1) 대사증후군 인지율 : (대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 57〉 연간 미충족의료율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	4.2(0.7)	15.7	448	4.1(0.9)	22.7	464	4.3(0.8)	17.5
연령									
19-29	121	4.6(1.9)	41.7	60	3.2(2.2)	69.4	61	6.4(2.8)	43.0
30-39	123	5.1(1.9)	37.5	58	6.7(2.6)	39.4	65	3.4(1.5)	43.5
40-49	187	5.4(1.8)	33.0	95	5.1(2.5)	48.5	92	5.8(2.3)	39.1
50-59	208	3.6(1.4)	37.9	107	1.9(1.3)	69.6	101	5.5(2.2)	39.8
60-69	145	2.0(1.2)	58.6	73	1.0(1.0)	100.4	72	2.9(2.1)	71.5
70 이상	128	3.7(2.0)	52.9	55	8.7(4.6)	52.4	73	0.0(0.0)	.
19-64	714	4.4(0.8)	17.5	351	3.8(1.0)	26.0	363	5.0(0.9)	17.8
65 이상	198	3.3(1.3)	38.6	97	5.8(2.7)	47.5	101	1.1(1.1)	100.3
교육수준 ²⁾									
무학	50	0.0(0.0)	.	4	-(-)	-	46	0.0(0.0)	.
초등학교	95	6.7(2.5)	37.1	35	12.6(5.9)	47.1	60	3.6(2.5)	69.5
중학교	74	3.3(2.3)	71.7	34	4.2(4.1)	96.9	40	2.4(2.4)	100.4
고등학교	382	4.6(1.0)	21.0	211	3.5(1.0)	28.0	171	6.0(1.8)	29.4
대학교 이상	311	3.9(1.4)	35.2	164	3.7(1.8)	48.4	147	4.1(1.4)	33.7
직업									
전문행정관리	91	8.5(2.4)	28.2	54	5.3(2.5)	47.1	37	13.4(5.0)	37.3
사무직	112	0.8(0.8)	99.5	62	0.0(0.0)	.	50	1.8(1.8)	97.1
판매·서비스직	83	4.6(2.2)	47.1	22	4.7(4.6)	99.6	61	4.6(2.4)	52.0
농림어업	54	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	21	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	183	7.2(2.3)	32.8	154	7.2(2.3)	32.3	29	6.9(3.8)	55.5
기타 ³⁾	389	3.1(1.0)	31.5	123	2.6(1.6)	60.2	266	3.4(1.0)	30.6
월 가구소득									
100만원 미만	48	8.0(4.7)	59.5	19	-(-)	-	29	8.0(5.6)	69.3
101-200만원 미만	91	7.1(2.8)	40.2	39	8.2(5.0)	61.2	52	6.2(3.4)	55.8
201-300만원 미만	134	0.5(0.5)	99.5	66	1.1(1.1)	98.8	68	0.0(0.0)	.
301-400만원 미만	233	5.4(1.3)	24.2	114	5.7(2.0)	34.6	119	5.1(1.4)	28.1
400만원 이상	395	3.9(0.9)	23.2	203	3.4(1.1)	33.8	192	4.5(1.3)	29.1

주 : 1) 연간 미충족의료율 : (최근 1년 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 58〉 연간 사고 및 중독 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	3.0(0.6)	20.2	448	4.0(1.0)	26.4	464	2.0(0.6)	29.5
연령									
19-29	121	0.9(0.9)	99.0	60	1.7(1.6)	98.1	61	0.0(0.0)	.
30-39	123	3.6(1.7)	46.5	58	5.7(3.0)	52.1	65	1.3(1.3)	100.1
40-49	187	2.0(1.1)	53.5	95	2.0(1.4)	71.0	92	2.0(1.9)	99.2
50-59	208	3.1(1.4)	46.1	107	3.7(2.3)	60.8	101	2.4(1.7)	69.6
60-69	145	4.7(2.1)	44.4	73	8.1(4.3)	52.8	72	1.5(1.5)	95.9
70 이상	128	4.9(1.8)	37.4	55	5.1(2.5)	48.1	73	4.7(1.9)	41.1
19-64	714	2.4(0.6)	23.2	351	3.4(1.0)	29.6	363	1.4(0.7)	50.5
65 이상	198	5.7(2.1)	37.4	97	7.1(3.5)	49.5	101	4.5(1.8)	40.2
교육수준 ²⁾									
무학	50	2.3(2.3)	99.4	4	-(-)	-	46	2.5(2.4)	98.1
초등학교	95	6.5(3.4)	52.2	35	9.5(6.9)	72.8	60	5.0(2.4)	49.0
중학교	74	4.2(1.7)	40.8	34	5.0(3.7)	74.5	40	3.5(0.5)	14.6
고등학교	382	2.2(0.9)	41.0	211	2.3(1.2)	49.6	171	2.0(1.4)	71.7
대학교 이상	311	3.0(1.1)	37.8	164	5.1(2.0)	40.1	147	0.6(0.6)	101.6
직업									
전문행정관리	91	0.8(0.8)	99.4	54	1.3(1.4)	101.5	37	0.0(0.0)	.
사무직	112	1.0(1.0)	100.5	62	1.7(1.7)	99.8	50	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	83	2.6(1.2)	44.4	22	0.0(0.0)	.	61	3.6(1.6)	45.0
농림어업	54	2.1(2.0)	94.1	33	3.5(3.4)	97.0	21	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	183	5.3(1.8)	34.3	154	6.1(2.1)	34.6	29	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	389	3.3(0.9)	28.3	123	4.5(2.1)	47.0	266	2.7(0.9)	32.3
월 가구소득									
100만원 미만	48	9.4(4.9)	52.4	19	-(-)	-	29	4.2(4.1)	97.4
101-200만원 미만	91	4.5(2.1)	46.6	39	7.8(4.4)	56.0	52	2.0(2.0)	101.8
201-300만원 미만	134	2.3(0.8)	35.9	66	1.3(1.3)	102.0	68	3.3(1.4)	43.4
301-400만원 미만	233	3.2(1.2)	38.1	114	4.9(2.0)	40.1	119	1.4(1.0)	72.8
400만원 이상	395	2.3(0.8)	35.1	203	2.9(1.2)	40.3	192	1.7(1.2)	71.8

주 : 1) 연간 사고 및 중독 경험률 : (연간 사고 및 중독 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 59〉 양호한 주관적 건강수준 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	58.1(1.7)	2.9	448	60.8(2.4)	4.0	464	55.2(2.2)	3.9
연령									
19-29	121	69.3(3.7)	5.4	60	73.0(5.4)	7.5	61	64.6(5.5)	8.5
30-39	123	63.0(4.2)	6.7	58	61.1(5.7)	9.4	65	65.2(5.7)	8.7
40-49	187	62.7(3.5)	5.6	95	59.8(4.5)	7.5	92	65.7(5.2)	7.9
50-59	208	59.2(3.7)	6.2	107	64.2(5.0)	7.8	101	53.4(5.1)	9.6
60-69	145	48.1(4.8)	10.0	73	52.7(5.9)	11.2	72	43.7(6.5)	14.8
70 이상	128	34.6(3.8)	10.8	55	40.6(6.7)	16.6	73	30.3(5.3)	17.4
19-64	714	62.3(1.8)	2.9	351	63.8(2.7)	4.3	363	60.8(2.2)	3.7
65 이상	198	37.4(3.5)	9.5	97	44.9(4.7)	10.5	101	30.6(4.9)	16.0
교육수준 ²⁾									
무학	50	34.4(6.7)	19.4	4	-(-)	-	46	32.9(7.3)	22.1
초등학교	95	34.5(5.6)	16.3	35	35.3(6.8)	19.2	60	34.1(7.2)	21.1
중학교	74	42.4(6.9)	16.2	34	41.1(9.6)	23.5	40	43.6(8.5)	19.6
고등학교	382	61.9(2.6)	4.2	211	65.1(3.7)	5.6	171	57.6(3.3)	5.7
대학교 이상	311	64.5(3.1)	4.7	164	62.1(4.2)	6.8	147	67.2(3.9)	5.8
직업									
전문행정관리	91	64.2(4.8)	7.6	54	66.8(6.1)	9.1	37	60.1(8.3)	13.8
사무직	112	69.2(4.1)	6.0	62	65.8(5.7)	8.6	50	73.9(5.6)	7.6
판매·서비스직	83	63.5(4.9)	7.7	22	58.5(11.4)	19.5	61	65.4(5.0)	7.7
농림어업	54	49.9(7.9)	15.9	33	60.7(8.3)	13.6	21	34.0(11.8)	34.7
기능단순노무직	183	55.2(4.1)	7.5	154	56.2(4.3)	7.6	29	48.7(9.7)	19.8
기타 ³⁾	389	53.9(2.8)	5.2	123	61.2(4.1)	6.7	266	50.3(3.1)	6.1
월 가구소득									
100만원 미만	48	34.0(7.0)	20.6	19	-(-)	-	29	24.8(9.0)	36.1
101-200만원 미만	91	34.1(4.5)	13.1	39	31.9(8.3)	25.9	52	35.8(6.0)	16.8
201-300만원 미만	134	51.1(4.6)	8.9	66	57.9(6.2)	10.8	68	44.4(6.3)	14.1
301-400만원 미만	233	56.5(3.5)	6.2	114	53.8(5.0)	9.3	119	59.2(5.3)	9.0
400만원 이상	395	68.2(2.7)	4.0	203	71.2(3.4)	4.8	192	64.5(3.3)	5.2

주 : 1) 양호한 주관적 건강수준 인지율 : (주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 60〉 기침예절 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	912	38.1(2.2)	5.8	448	30.9(2.8)	9.0	464	45.7(2.7)	5.8
연령									
19-29	121	55.3(4.5)	8.1	60	51.6(6.6)	12.9	61	60.2(6.4)	10.6
30-39	123	54.7(4.5)	8.3	58	36.1(6.4)	17.8	65	75.3(5.0)	6.6
40-49	187	34.9(4.2)	11.9	95	23.7(4.6)	19.4	92	46.9(6.3)	13.5
50-59	208	33.5(4.0)	11.9	107	29.0(3.9)	13.6	101	38.7(6.3)	16.3
60-69	145	31.1(4.7)	15.1	73	28.8(5.7)	19.7	72	33.4(6.2)	18.7
70 이상	128	12.1(2.5)	21.0	55	5.9(2.7)	46.5	73	16.7(3.9)	23.3
19-64	714	42.5(2.5)	5.9	351	34.3(3.1)	9.1	363	51.6(3.1)	6.1
65 이상	198	16.6(2.8)	16.8	97	13.0(3.2)	24.3	101	19.9(3.7)	18.4
교육수준 ²⁾									
무학	50	8.7(3.9)	45.3	4	—(—)	—	46	9.5(4.2)	43.7
초등학교	95	25.3(5.6)	22.0	35	21.8(7.6)	34.6	60	27.2(6.5)	23.8
중학교	74	22.5(5.0)	22.1	34	14.4(5.2)	35.7	40	29.1(6.9)	23.6
고등학교	382	34.7(3.0)	8.6	211	28.1(3.4)	12.2	171	43.6(4.1)	9.4
대학교 이상	311	51.1(3.2)	6.2	164	38.7(4.4)	11.4	147	65.8(4.2)	6.3
직업									
전문행정관리	91	42.0(5.9)	14.0	54	29.7(6.3)	21.4	37	61.4(6.9)	11.2
사무직	112	46.3(4.9)	10.5	62	35.5(6.6)	18.6	50	61.6(7.8)	12.6
판매·서비스직	83	48.8(5.8)	11.9	22	41.1(11.3)	27.4	61	51.6(6.8)	13.3
농림어업	54	7.6(4.3)	56.4	33	9.8(5.5)	56.4	21	4.4(4.2)	94.4
기능단순노무직	183	22.8(2.8)	12.5	154	23.7(3.0)	12.8	29	17.6(6.9)	39.0
기타 ³⁾	389	43.2(3.2)	7.4	123	40.7(5.3)	13.0	266	44.5(3.3)	7.4
월 가구소득									
100만원 미만	48	20.7(6.5)	31.5	19	—(—)	—	29	20.8(8.7)	41.7
101-200만원 미만	91	31.3(6.5)	20.6	39	31.2(9.3)	29.9	52	31.3(6.9)	22.2
201-300만원 미만	134	32.7(4.2)	12.8	66	26.9(4.6)	17.2	68	38.3(6.2)	16.3
301-400만원 미만	233	39.5(3.5)	8.9	114	25.9(4.4)	16.9	119	53.3(4.6)	8.7
400만원 이상	395	41.9(3.3)	7.8	203	35.5(4.2)	11.8	192	49.7(4.0)	8.0

주 : 1) 기침예절 실천율 : ("항상 그렇다" 또는 "그런 편이다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 61〉 출산 경험률 및 최초 출산연령

(단위 : %, 세)

구분	출산 경험률 ¹⁾			최초 출산연령 ²⁾		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	284	69.8(2.8)	4.1	202	27.6(0.3)	1.1
연령						
19-29	61	11.6(4.7)	40.6	8	-(-)	-
30-39	65	74.3(6.8)	9.1	49	29.6(0.4)	1.5
40-49	92	90.0(3.5)	3.8	83	28.0(0.4)	1.6
50-59	66	94.7(2.7)	2.9	62	25.9(0.4)	1.5
교육수준 ³⁾						
무학	1	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	3	-(-)	-	3	-(-)	-
중학교	11	-(-)	-	11	-(-)	-
고등학교	127	69.9(4.0)	5.8	90	26.3(0.3)	1.3
대학교 이상	142	66.9(4.4)	6.5	97	29.3(0.4)	1.3
직업						
전문행정관리	35	64.9(7.3)	11.3	23	28.5(0.5)	1.6
사무직	48	57.3(8.5)	14.9	29	27.9(0.8)	2.9
판매·서비스직	37	76.7(6.6)	8.6	28	26.9(1.0)	3.7
농림어업	6	-(-)	-	6	-(-)	-
기능단순노무직	17	-(-)	-	14	-(-)	-
기타 ⁴⁾	141	71.8(4.0)	5.5	102	27.8(0.4)	1.4
월 가구소득						
100만원 미만	2	-(-)	-	0	-(-)	-
101-200만원 미만	16	-(-)	-	12	-(-)	-
201-300만원 미만	26	59.9(7.5)	12.6	16	-(-)	-
301-400만원 미만	78	72.3(4.4)	6.1	57	27.4(0.6)	2.2
400만원 이상	159	70.6(4.2)	5.9	115	27.6(0.4)	1.5

주 : 1) 출산 경험률 : (출산 경험이 있는 사람의 수 / 여자 조사대상 응답자 수) × 100

2) 최초 출산연령 : (처음으로 출산한 만 나이의 총 합 / 출산경험이 있는 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직



제4부 부록

- I. 개인조사표
- II. 가구조사표
- III. 지표정의
- IV. 2008-2018 산출지표

CHS

Community Health Survey

제 4 부 부록

I. 개인조사표



CHS

Community Health Survey

다음은 2018년 지역사회건강조사 개인조사표(울산권역)입니다. →

 승인번호 제 117075 호	 지역사회건강조사 Community Health Survey	울산
---	--	-----------

안녕하십니까?

질병관리본부에서는 「지역보건법」 제4조(지역사회 건강실태조사), 「지역보건법 시행령」 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)에 의거하여 지역 건강통계를 생산하여 근거 중심의 보건사업 수행 기반을 마련하고자 매년 「지역사회건강조사」를 실시하오니 적극적인 협조 부탁드립니다.

지역사회건강조사는 전국 254개 보건소에서 매년 8월에서 10월까지 실시하며, 만 19세 이상 성인을 대상으로 흡연, 음주, 신체활동 등의 건강행태, 의료이용, 삶의 질 등을 조사합니다.

조사 자료는 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며, 통계작성 외의 목적으로는 사용하지 않습니다. 정확한 응답을 위하여 반드시 조사대상자 본인이 성실하게 조사에 응답하여 주시기 바랍니다.

※ 통계법 제32조(통계응답자의 성실응답의무)

통계응답자는 통계의 작성에 관한 사무에 종사하는 자로부터 통계의 작성을 목적으로 질문 또는 자료제출 등의 요구를 받은 때에는 신뢰성 있는 통계가 작성될 수 있도록 조사사항에 대하여 성실하게 응답하여야 한다.

※ 통계법 제33조(비밀의 보호)

- ① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
- ② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계 작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.



보건복지부
질병관리본부

시도 보건소 표본지점 가구 가구원

관리번호 :

2018년 지역사회건강조사 참여 동의서

『지역사회건강조사』는 지역주민의 건강수준을 파악하여 지역단위 건강통계를 생산하기 위한 목적으로 실시되며, 수집된 개인정보는 조사의 진실성 검증을 위한 전화 확인 조사 후 파기됩니다. 그 외 수집된 자료는 통계 자료로서 보건정책 수립 및 보건사업 평가, 관련 연구 수행을 위한 용도로만 활용됩니다.

■ 개인정보 수집 및 이용 동의

[개인정보의 수집·이용 목적]

- 지역주민의 건강수준에 관한 지역사회건강통계 생산 및 관련 연구 수행
- 조사 진실성 검증을 위한 전화 확인 조사

[수집하려는 개인정보 항목]

- 개인정보: 성명, 생년월일, 전화번호
- 민감정보: 키, 몸무게, 혈압, 설문조사를 통한 질병에 관한 정보

[개인정보의 보유 및 이용 기간]

- 개인정보: 2018년 11월 30일까지
- 민감정보: 영구

개인정보 수집에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 거부할 경우 불이익은 없습니다.

- 개인정보 수집·이용에 동의합니까?
☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음
- 민감정보 수집·이용에 동의합니까?
☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

위 동의 사항을 확인하였습니다.

2018년 월 일

참여자 성명 : (인) 또는 서명

수령증

조사를 마친 후 조사원으로부터 답례품을 받았습니다.

2018년 월 일

참여자 성명 : (인) 또는 서명

조사원 성명:

서명

 승 인 번 호 제 117075 호	2018년 지역사회건강조사	이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.
--	----------------	--

※ 조사대상자 번호를 정확히 기입하십시오.

시도 번호	보건소번호			표본지점번호					가구번호				가구원번호	

조 사 대 상 자		
성명		주민등록 생년월일
성별	① 남자 ② 여자	
		년 월 일 가구명부의 주민등록상 생년월일과 동일한지 확인하십시오. 다른 경우 가구명부를 수정합니다.

조사장소 (* CAPI 내 조사원 입력 사항)

1. 조사장소

- ① 실내(집 안) ② 실외(마당, 논밭 등 바깥)

☐

혈압측정 기초설문

1. 현재부터 30분 이내에 담배, 술, 커피, 격렬한 운동을 하셨습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

2. 오늘 고혈압 약을 복용하십니까?

- ① 예 ② 아니오 ③ 해당없음

☐

3. 본인의 혈압수치를 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

4. 마지막 음식섭취 시간은 언제입니까?

□□월 □□일 □□시 □□분

□□	월	□□	일
□□	시	□□	분

혈압측정(실제계측) 1차 (*CAPI 내 조사원 입력 사항)

1. 미측정 이유

- ① 측정 ② 제외대상 ③ 계측거부 ④ 기타()

☐

기 타

2. 혈압 측정 팔

- ① 오른팔 ② 왼팔
⑧ 비해당(문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정)

☐

8. 비해당

3. 측정 전 5분 안정

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정)

☐

8. 비해당

4. 혈압측정 값 입력

수축기(최고혈압/SYS) □□□ mmHG

이완기(최저혈압/DIA) □□□ mmHG

888 888. 비해당(문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정)

수축기

□□□	mmHG
-----	------

이완기

□□□	mmHG
-----	------

888 888. 비해당

흡연

1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 5번 문항으로)



1-1. 처음으로 담배 한 대를 다 피운 시기는 언제입니까?

만 세 888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음)

세

888. 비해당

2. 현재 담배를 피웁니까?

- ① 매일 피움 ⇒ 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? 개비 (⇒ 3번 문항으로)

888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비)이상 피우지 않음, 문항2/②, ③: 현재 담배를 가끔 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

8. 비해당

개비

888. 비해당

- ② 가끔 피움 ⇒ 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? 일

- ⇒ 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? 개비

(⇒ 3번 문항으로)

88 888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비)이상 피우지 않음, 문항2/①, ③: 현재 담배를 매일 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

일

개비

88. 비해당

888. 비해당

- ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음

- ⇒ 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? 년 개월

- ⇒ 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? 개비

88 88 888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비)이상 피우지 않음, 문항2/①, ②: 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움)

년 월

개비

88. 88. 비해당

888. 비해당

- ⇒ 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? (⇒ 5번 문항으로)

- ① 1년 미만

- ② 1년-5년 미만

- ③ 5년-10년 미만

- ④ 10년-15년 미만

- ⑤ 15년-20년 미만

- ⑥ 20년 이상

- ⑦ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비)이상 피우지 않음,

문항2/①, ②: 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움)

- ⑧ 비해당(문항 1/②: 평생 5갑(100개비)이상 피우지 않았음)

8. 비해당

3. 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

- ① 최근 1년간 금연한 적이 있다

- ② 과거에는 있었지만, 최근 1년간 없다

- ③ 금연한 적이 없다

- ④ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/③: 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

8. 비해당

4. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까?

- ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
 ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
 ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
 ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않음, 문항2/③: 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

☐

8. 비해당

※ 5-6번은 간접흡연에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

5. 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 6번 문항으로)

☐

5-1. 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항5/②: 가정실내에서 일상적으로 담배를 피우는 사람이 없음)

☐

8. 비해당

6. 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예
 ② 아니오
 ③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)

☐

7. 지금까지 살아오는 동안 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 8번 문항으로)

☐

7-1. 최근 1달 동안 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항7/②: 평생 전자담배를 사용한 적이 없음)

☐

8. 비해당

8. 지금까지 사용해본 것을 모두 표시해 주십시오. ※ 일반담배, 전자담배는 제외합니다.

- ① 피운적 없다 (→ 9번 문항으로)
 ② 머금는담배(스누스) ③ 물담배 ④ 시가
 ⑤ 껴련형 전자담배(아이코스, 글로 등, 쥘담배, 가열담배라고도 불림)
 ⑥ 씹는 담배 ⑦ 파이프 담배
 ⑧ 각련(롤링타바코) ⑨ 냄새 맡는 담배 ⑩ 기타()

☐기
타

8-1. 최근 1달 동안 사용해본 것을 모두 표시해 주십시오. ※ 일반담배, 전자담배는 제외합니다.

- ① 피운적 없다
 ② 머금는담배(스누스) ③ 물담배 ④ 시가
 ⑤ 껴련형 전자담배(아이코스, 글로 등, 쥘담배, 가열담배라고도 불림)
 ⑥ 씹는 담배 ⑦ 파이프 담배
 ⑧ 각련(롤링타바코) ⑨ 냄새 맡는 담배 ⑩ 기타()

☐기
타

88. 비해당(문항8/①: 평생 다른 담배 제품을 사용하지 않음)

88. 비해당

9. (지역) 다음은 금연구역 관련 법률에 대한 내용입니다. 내용이 맞으면 “예”, 틀리면 “아니오”로 응답하여 주십시오.

9-1. 지정된 금연구역에서 흡연하면 일정액 이하의 과태료를 내야한다.	① 예 ② 아니오
9-2. 금연구역에서 전자담배를 사용하는 것은 불법이다.	① 예 ② 아니오

☐☐

음주

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다.

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 3번 문항으로)

☐

2. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 3번 문항으로)
⑧ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당



2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까?

- ① 한 달에 1번 미만
② 한 달에 1번 정도
③ 한 달에 2~4번 정도
④ 일주일에 2~3번 정도
⑤ 일주일에 4번 이상
⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?

(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다)

- ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-3. 최근 1년 동안 절주(음주량을 줄임)나 금주를 시도한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

3. 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

4. (지역) 최근 1년 동안 음주문제로 의료기관, 보건소, 알코올 상담센터, 정신보건센터 등에서 상담을 받아본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년 동안 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

5. (지역) 지금까지 살아오면서 음주예방에 대한 교육을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

안전의식

【자동차 운전】

1. 자동차 운전을 합니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 2번 문항으로)



1-1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까?

- ① 전혀 매지 않는다
 ② 거의 매지 않는 편이다
 ③ 가끔 매는 편이다
 ④ 대체로 매는 편이다
 ⑤ 항상 맨다
 ⑧ 비해당(문항1/②: 자동차 운전을 하지 않음)

1-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항1/②: 자동차 운전을 하지 않음, 「음주」문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

2. 다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 맵니까?

- ① 앞좌석에 타지 않는다
 ② 전혀 매지 않는다
 ③ 가끔 매는 편이다
 ④ 대체로 매는 편이다
 ⑤ 항상 맨다

3. 다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 맵니까?

- ① 뒷좌석에 타지 않는다
 ② 전혀 매지 않는다
 ③ 가끔 매는 편이다
 ④ 대체로 매는 편이다
 ⑤ 항상 맨다

4. 버스(광역 시내버스, 시외버스, 전세버스)를 탈 때 안전벨트를 맵니까?

- ① 버스를 타지 않는다
 ② 전혀 매지 않는다
 ③ 가끔 매는 편이다
 ④ 대체로 매는 편이다
 ⑤ 항상 맨다

5. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 탄 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

【오토바이 운전】

6. 오토바이 운전을 합니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 7번 문항으로)



6-1. 오토바이를 운전할 때 헬멧을 착용합니까?

- ① 전혀 착용하지 않는다
② 거의 착용하지 않는 편이다
③ 가끔 착용하는 편이다
④ 대체로 착용하는 편이다
⑤ 항상 착용한다
⑧ 비해당(문항6/②: 오토바이 운전을 하지 않음)

6-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항6/②: 오토바이 운전을 하지 않음, 「음주」문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐
☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

【자전거 운전】

7. 자전거 운전을 합니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「운동 및 신체활동」 1번 문항으로)



7-1. 자전거를 탈 때 헬멧을 착용합니까?

- ① 전혀 착용하지 않는다
② 거의 착용하지 않는 편이다
③ 가끔 착용하는 편이다
④ 대체로 착용하는 편이다
⑤ 항상 착용한다
⑧ 비해당(문항7/②: 자전거를 타지 않음)

7-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거를 운전한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항7/②: 자전거를 타지 않음, 「음주」문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐
☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

운동 및 신체활동

1. 우선 본인이 일하는 시간을 생각해 보세요. 돈을 받고 하는 일, 돈을 받지 않고 하는 일, 학교생활/교육, 집안일, 농업, 어업, 목축업, 구직과 같이 현재 하고 있는 일이라고 생각하시면 됩니다(예: 직업, 학업, 집안일, 봉사활동, 학교 체육 수업 등).

1-1. 본인의 일은 최소 10분 이상 계속 숨이 많이 차거나 심장이 매우 빠르게 뛰는 고강도 신체 활동을 포함하고 있습니까?

※ 고강도 신체활동: 무거운 것을 들어 올리거나 나르는 일(약 20kg 이상), 땅파기, 건설 현장에서의 노동, 계단으로 물건 나르기 등

- ① 예
② 아니오(⇒ 문항 1-4번으로)

1-2. 평소 1주일 동안 일과 관련된 고강도 신체활동을 며칠 하십니까?

일주일애 일 8. 비해당(문항1-1/② : 고강도 운동을 하지 않음)

1-3. 평소 하루에 일과 관련된 고강도 신체활동을 몇 시간 하십니까?

하루에 시간 분
88 88. 비해당(문항1-1/② : 고강도 운동을 하지 않음)

1-4. 본인의 일은 최소 10분 이상 계속 숨이 차거나 심장이 약간 빠르게 뛰는 중강도 신체활동을 포함하고 있습니까?

※ 중강도 신체활동: 빠르게 걷기(일하는 중에), 가벼운 물건 나르기, 청소, 육아(목욕시키기, 아이 안아 주기 등) 등

- ① 예
② 아니오(⇒ 문항 2번으로)

1-5. 평소 1주일 동안 일과 관련된 중강도 신체활동을 며칠 하십니까?

일주일애 일 8. 비해당(문항1-4/② : 중강도 운동을 하지 않음)

1-6. 평소 하루에 일과 관련된 중강도 신체활동을 몇 시간 하십니까?

하루에 시간 분
88 88. 비해당(문항1-4/② : 중강도 운동을 하지 않음)

2. 앞서 말한 일과 관련된 신체활동은 제외합니다. 본인이 장소를 이동할 때, 어떻게 하시는지에 대해 묻겠습니다.

2-1. 평소 장소를 이동할 때 최소 10분 이상 계속 걷거나 자전거 이용을 하십니까?

- ① 예
② 아니오(⇒ 문항 3번으로)

2-2. 평소 1주일 동안 장소를 이동할 때 최소 10분 이상 계속 걷거나 자전거 이용을 며칠 하십니까?

일주일애 일 8. 비해당(문항2-1/② : 걷거나 자전거 이용하지 않음)

2-3. 평소 하루에 장소를 이동할 때 걷거나 자전거 이용을 몇 시간 하십니까?

하루에 시간 분
88 88. 비해당(문항2-1/② : 걷거나 자전거 이용하지 않음)

건강조사 참여 Energy, 지역건강 Synergy

3. 앞서 말한 일과 장소 이동 시 신체활동에 대해서는 제외합니다. 스포츠, 운동 및 여가 활동에 대하여 묻겠습니다.

3-1. 평소 최소 10분 이상 계속 숨이 많이 차거나 심장이 매우 빠르게 뛰는 고강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 하십니까?

※ 고강도 운동 및 여가활동: 달리기, 줄넘기, 등산, 농구 시합, 수영, 배드민턴 등

① 예

② 아니오(⇒ 문항 3-4번으로)

3-2. 평소 1주일 동안 고강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 며칠 하십니까?

일주일에 일

8. 비해당(문항3-1/② : 고강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 하지 않음)

3-3. 평소 하루에 고강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 몇 시간 하십니까?

하루에 시간 분

88 88. 비해당(문항3-1/②, 문항3-2/0일 : 고강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 하지 않음)

3-4. 평소 최소 10분 이상 계속 숨이 약간 차거나 심장이 약간 빠르게 뛰는 중강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 하십니까?

※ 중강도 운동 및 여가활동: 빠르게 걷기, 가볍게 뛰기(조깅), 웨이트 트레이닝(근력 운동), 골프, 댄스스포츠, 필라테스 등

① 예

② 아니오(⇒ 문항 4번으로)

3-5. 평소 1주일 동안 중강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 며칠 하십니까?

일주일에 일

8. 비해당(문항3-4/② : 중강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 하지 않음)

3-6. 평소 하루에 중강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 몇 시간 하십니까?

하루에 시간 분

88 88. 비해당(문항3-4/② : 중강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 하지 않음)

4. 다음은 자는 시간을 제외하고, 일할 때나 집에 있을 때, 장소를 이동할 때, 친구와 함께 할 때에 앉아 있거나 누워 있는 것에 대한 질문입니다.

※ 예: 책상에 앉아 있기, 친구와 앉아 있기, 자동차·버스·기차를 이용해 이동하기, 책읽기, 글쓰기, 카드 놀이 하기, 텔레비전 보기, 게임 하기(닌텐도, 컴퓨터, 플레이스테이션), 인터넷 사용, 음악 감상 등

4-1. 평소 하루에 앉아 있거나, 누워 있는 시간이 몇 시간입니까?

하루에 시간 분

5. 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까? 일

※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.

5-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까?

하루에 시간 분 88 88. 비해당(문항5/0일: 걷기운동 없음)

6. **최근 1년 동안** 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 쉽게 찾을 수 있었습니까?

- ① 매우 쉬웠다
- ② 쉬운 편이었다
- ③ 어려운 편이었다
- ④ 매우 어려웠다

☐

7. (지역) **최근 1주일 동안** 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력 운동을 한 날은 며칠입니까?

- ① 전혀 하지 않음
- ② 1일
- ③ 2일
- ④ 3일
- ⑤ 4일
- ⑥ 5일 이상

☐

8. (지역) **최근 1년 동안** 본인이 거주하고 있는 지역의 주민센터(동사무소), 보건소, 구청, 시청 등의 지방자치단체에서 운영하는 운동프로그램에 참여해 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

9. (지역) 본인이 거주하고 있는 지역의 걷기코스에 대해 알고 있거나 들어본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

10. (지역) 평소 건강을 위해 운동을 하는 것이 어느 정도 필요하다고 생각합니까?

- ① 매우 필요하다
- ② 필요하다
- ③ 그저 그렇다
- ④ 불필요하다
- ⑤ 매우 불필요하다

☐

식생활

1. 최근 1주일 동안 아침식사를 한 날은 며칠입니까? ☐ 일 ☐ 일

2. 가공식품에 '영양표시'를 알고 있습니까?
 ① 예 ② 아니오 (⇒ 3번 문항으로)
 ↳ 2-1. 가공식품을 사거나 고를 때, '영양표시'를 읽습니까? ☐
 ① 예 ② 아니오 (⇒ 3번 문항으로)
 ③ 비해당(문항2/②: 영양표시를 모름) 8. 비해당
 ↳ 2-1-1. 영양표시 내용이 가공식품을 고르는데 영향을 미칩니까?
 ① 예 ② 아니오 ☐
 ③ 비해당(문항2/②: 영양표시를 모름, 문항2-1/②: 영양표시를 읽지 않음) 8. 비해당

3. (지역) 평상시 음식을 먹을 때, 다음 중 본인은 어디에 해당합니까? ☐
 ① 아주 짜게 먹는다
 ② 약간 짜게 먹는다
 ③ 보통으로 먹는다
 ④ 약간 싱겁게 먹는다
 ⑤ 아주 싱겁게 먹는다

4. (지역) 식탁이나 상에 차려진 음식을 먹을 때, 소금이나 간장을 더 넣어 먹습니까? ☐
 ① 항상 더 넣는다
 ② 자주 더 넣는다
 ③ 거의 더 넣지 않는다
 ④ 전혀 더 넣지 않는다

5. (지역) 전, 부침, 튀김을 먹을 때, 간장에 찍어 먹습니까? ☐
 ① 항상 찍어 먹는다
 ② 가끔 찍어 먹는다
 ③ 찍어 먹지 않는다

6. (지역) 평소 덜 짜게 먹으려고 노력합니까? ☐
 ① 전혀 노력하지 않는다
 ② 거의 노력하지 않는다
 ③ 가끔 노력한다
 ④ 대체로 노력한다
 ⑤ 항상 노력한다

7. (지역) 최근 1년 동안 보건소, 구청, 주민센터(동사무소), 복지시설, 학교, 병원 등에서 실시된 영양 교육 및 상담을 받은 적이 있습니까? ☐
 ① 예 ② 아니오

비만 및 체중조절**1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까?**

- ① 매우 마른 편임
- ② 약간 마른 편임
- ③ 보통임
- ④ 약간 비만임
- ⑤ 매우 비만임

☐**2. 최근 1년 동안 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?**

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다
- ② 몸무게를 유지하려고 노력했다
- ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다
- ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해 본 적 없다

☐

구강건강

1. 스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

☐

2. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?
(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.)

☐

- ① 매우 불편하다
② 불편하다
③ 그저 그렇다
④ 별로 불편하지 않다
⑤ 전혀 불편하지 않다

3. 어제 하루 동안 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까?

3-1. 아침식사 후에	① 예 ② 아니오 ③ 어제 아침식사 하지 않음
3-2. 점심식사 후에	① 예 ② 아니오 ③ 어제 점심식사 하지 않음
3-3. 저녁식사 후에	① 예 ② 아니오 ③ 어제 저녁식사 하지 않음
3-4. 잠자기 전에	① 예 ② 아니오 ③ 어제 잠자지 않음

☐
☐
☐
☐

4. 최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 5번 문항으로)

☐


4-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까?(한 가지만 선택)

☐
☐

- ① 경제적인 이유로
② 치과병원(또는 보건소, 보건지소 등)이 너무 멀어서
③ 직장이나 학교를 비울 수 없어서
④ 거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에
⑤ 아이를 봐줄 사람이 없어서
⑥ 다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서
⑦ 치과진료를 받기가 무서워서
⑧ 기타()

기
타

88. 비해당(문항4/②: 진료를 받지 못한 적이 없음)

88. 비해당

5. (지역) 최근 1년 동안 치과병원을 이용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

정신건강

1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까? 시간시간

2. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

- ① 대단히 많이 느낀다] (⇒ 2-1번 문항으로)
 ② 많이 느끼는 편이다
 ③ 조금 느끼는 편이다] (⇒ 3번 문항으로)
 ④ 거의 느끼지 않는다

2-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항2/③, ④: 평소 스트레스를 조금 느끼거나 거의 느끼지 않음)

8. 비해당

3. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 4번 문항으로)

3-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항3/②: 2주 이상 슬프거나 절망감을 느낀 적이 없음)

8. 비해당

4. 지난 2주 동안 아래 나열되는 증상들에 얼마나 자주 시달렸습니까?

4-1. 일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-2. 가라앉은 느낌, 우울감 혹은 절망감	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-3. 잠들기 어렵거나 자꾸 깨어남, 혹은 너무 많이 잠	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-4. 피곤함, 기력이 저하됨	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-5. 식욕 저하 혹은 과식	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-6. 내 자신이 나쁜 사람이라는 느낌 혹은 내 자신을 실패자라고 느끼거나, 나 때문에 나 자신이란 내 가족이 불행하게 되었다는 느낌	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-7. 신문을 읽거나 TV를 볼 때 집중하기 어려움	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-8. 남들이 알아챌 정도로 거동이나 말이 느림 또는 반대로 너무 초조하고 안절부절하지 못해서 평소 보다 많이 돌아다니고 서성거림	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-9. 나는 차라리 죽는 것이 낫겠다는 등의 생각 혹은 어떤 면에서건 당신 스스로에게 상처를 주는 생각들	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일

5. 최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷을 통해 상담을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

【수면의 질】

※ 다음은 지난 1달(4주) 동안 당신의 일상적인 수면 습관에 관한 질문입니다. 지난 1달 동안 대부분의 일상에서 가장 적합한 답변에 응답해 주시기 바랍니다(반드시 모든 질문에 답하여 주시기 바랍니다).

1. **지난 1달 동안** 당신은 평소 몇 시에 잠자리에 들었습니까?

- ① 보통 오전 시 분에 잠자리에 든다
② 보통 오후 시 분에 잠자리에 든다

시 분

2. **지난 1달 동안** 당신은 밤에 잠자리에 들어가서 잠이 들기까지 보통 얼마나 오래 걸렸습니까?

시간 분이 걸린다

시 분

3. **지난 1달 동안** 당신은 평소 아침 몇 시에 일어났습니까?

- ① 보통 오전 시 분에 일어난다
② 보통 오후 시 분에 일어난다

시 분

4. **지난 1달 동안** 당신은 밤에 실제로 잠잔 시간은 얼마나 됩니까?(이것은 당신이 잠자리에서 보낸 시간과 다를 수 있습니다.)

하루 밤에 시간 분

시 분

※ 다음 각 문항에서 가장 적합한 응답을 하나만 고르십시오. 모든 질문에 응답해 주시기 바랍니다.

5. **지난 1달 동안** 당신은 아래의 이유로 잠자는데 얼마나 자주 문제가 있었습니까?

5-1. 취침 후 30분 이내에 잠들 수 없었다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-2. 한밤중이나 새벽에 깼다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-3. 화장실에 가려고 일어나야 했다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-4. 편안하게 숨 쉴 수가 없었다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-5. 기침을 하거나 시끄럽게 코를 골았다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-6. 너무 춥다고 느꼈다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-7. 너무 덥다고 느꼈다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-8. 나쁜 꿈을 꾸었다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-9. 통증이 있었다	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-10. 그 외에 다른 이유가 있다면, 기입해 주세요 (이유:) 지난 1달 동안 당신은 위에 기입한 이유들 때문에 잠자는 데 얼마나 자주 어려움이 있었습니까?	①지난 한달 동안 없었다 (없다)	②한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

이유

☐

6. **지난 1달 동안** 당신은 전반적으로 수면의 질이 어느 정도라고 평가 하십니까?

- ① 매우 좋음 ② 상당히 좋음 ③ 상당히 나쁨 ④ 매우 나쁨

☐

7. **지난 1달 동안** 당신은 잠이 들기 위해 얼마나 자주 약을 복용했습니까? (처방약 또는 약국에서 구입한 약)

- ① 지난 한달 동안 없었다.
② 한 주에 1번보다 적게
③ 한 주에 1~2번 정도
④ 한 주에 3번 이상

☐

8. **지난 1달 동안** 당신은 운전하거나, 식사 때 혹은 사회활동을 하는 동안 얼마나 자주 졸음을 느꼈습니까?

- ① 지난 한달 동안 없었다.
② 한 주에 1번보다 적게
③ 한 주에 1~2번 정도
④ 한 주에 3번 이상

☐

9. **지난 1달 동안** 당신은 일에 열중하는데 얼마나 많은 문제가 있었습니까?

- ① 전혀 없었다
② 매우 조금 있었다
③ 다소 있었다
④ 매우 많이 있었다

☐

【치매】

1. 치매 상담 콜센터(☎1899-9988)가 있다는 것을 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 2-1번 문항으로)

☐


1-1. 치매 상담 콜센터(☎1899-9988)를 이용한 적이 있습니까?

- ① 예 (→ 2-1번 문항으로) ② 아니오
③ 비해당(문항1/②: 치매 상담 콜센터가 있다는 것을 모름)

☐

8. 비해당

1-2. 치매 상담 콜센터(☎1899-9988)를 이용하지 않은 이유는 무엇입니까?

- ① 나에게 필요가 없어서
② 별로 도움이 되지 않을 것 같아서
③ 비용이 발생할 것 같아서
④ 개인정보가 노출될 것 같아서
⑤ 개인과 가족의 사생활을 외부에 알리고 싶지 않아서
⑥ 기타()
⑧ 비해당(문항 1/②: 치매 상담 콜센터가 있다는 것을 모름, 문항1-1/①: 치매 상담 콜센터를 이용한 적이 있음)

☐

기
타

8. 비해당

※ 다음은 귀하의 인지 기능에 대한 질문입니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용에 응답해 주시기 바랍니다.

2-1. **최근 1년 동안** 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 만 50세 이상 3번 문항으로,
만 50세 미만 「예방접종」1번 문항으로)

☐

건강조사 참여 Energy, 지역건강 Synergy

2-2. **최근 1년 동안** 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 평소 잘 하던 집안일이나 일상생활에서의 일을 못한 적이 얼마나 자주 있습니까?(예: 요리, 청소, 약 복용, 운전, 공과금 납부 등)

- ① 항상
② 자주
③ 가끔
④ 거의 그런 적 없다
⑤ 전혀 없다
⑧ 비해당(문항2-1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 없음)

☐
8. 비해당

2-3. 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어진 것 때문에, 일상생활에서 얼마나 자주 도움이 필요했습니까?

- ① 항상
② 자주
③ 가끔
④ 거의 필요 없다
⑤ 전혀 필요 없다
⑧ 비해당(문항2-1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 없음)

☐
8. 비해당

2-4. 일상생활에서 도움이 필요할 때, 얼마나 자주 도움을 받을 수 있습니까?

- ① 항상
② 자주
③ 가끔
④ 거의 받을 수 없다
⑤ 전혀 받을 수 없다
⑧ 비해당(문항2-1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 없음, 문항2-3/④, ⑤: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어진 것 때문에, 일상생활에 도움이 필요 없었음)

☐
8. 비해당

2-5. **최근 1년 동안** 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 직장생활이나 자원봉사, 사회활동을 하는데 얼마나 자주 지장이 있었습니까?

- ① 항상
② 자주
③ 가끔
④ 거의 없었다
⑤ 전혀 없었다
⑧ 비해당(문항2-1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 없음)

☐
8. 비해당

2-6. 귀하의 정신 혼란이나 기억력 감소 때문에 본인이나 다른 사람이 전문가의 상담을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항2-1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 없음)

☐
8. 비해당

3. (만 50세 이상 응답해 주십시오) **최근 1년 동안** 치매선별검사를 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (➡ 「지역-정신건강」 1번 문항으로)
⑧ 비해당(나이: 만 50세 미만)

☐
8. 비해당

➡ 3-1. **최근 1년 동안** 치매선별검사를 받은 장소는 어디입니까?

- ① 치매안심센터(보건소)
② 보건지소, 보건진료소
③ 병원
④ 기타 ()
⑧ 비해당(나이: 만 50세 미만, 문항3/②: 최근 1년 동안 치매선별검사를 받은 적이 없음)

☐
기
타
8. 비해당

【지역선택문항-정신건강】

1. (지역) 일상생활에 장애가 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 가장 큰 원인은 무엇입니까?

- ① 경제적인 문제
 ② 질병문제
 ③ 가족문제
 ④ 진로문제
 ⑤ 대인관계(친척, 동료, 친구, 이웃 등)
 ⑥ 기타()
 ⑧ 비해당(문항3/②: 2주 이상 슬프거나 절망감을 느낀 적이 없음)

☐기
타

8. 비해당

2. (지역) 본인이 거주하고 있는 지역에 정신건강증진센터가 있다는 것을 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

【지역선택문항-치매】

1. (지역) 지금까지 살아오면서 치매예방 및 관리 프로그램에 참여한 적이 있습니까?

- ① 예(→ 「예방접종」1번 문항으로) ② 아니오



1-1. (지역) 치매예방 및 관리 프로그램에 참여할 의사가 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항1/①: 치매예방 및 관리프로그램에 참여한 적이 있음)

☐☐

8. 비해당

건강조사 참여 Energy, 지역건강 Synergy

예방접종

1. 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

☐

이환

※ 지금부터 우리나라 국민들이 많이 걸리는 질병에 대해서 질문하도록 하겠습니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용을 응답해 주시기 바랍니다.

【고혈압】

1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 (⇒ 「당뇨병」1번 문항으로)

☐

1-1. 의사로부터 고혈압을 처음 진단받은 때는 언제입니까?

만 세

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

888. 비해당

1-2. 본인의 혈압은 잘 조절되고 있습니까?

① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)☐

8. 비해당

1-3. 혈압을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까? 모두 응답해 주십시오.

1-3-1. 혈압약 복용

① 예 ⇒ 한 달에 일
② 아니오

1-3-2. 비약물요법(운동, 식사요법)

① 예 ② 아니오

8 88 8. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

 한달에 일

2 00. 아니오

8 88. 비해당

☐ 8. 비해당

1-4. 고혈압을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외).

1-4-1. 병원

① 예 ② 아니오

1-4-2. 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소

① 예 ② 아니오

88. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

【당뇨병】

1. 본인의 혈당수치를 알고 있습니까?

① 예 ② 아니오

☐

2. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 (⇒ 「뇌졸중(중풍)」1번 문항으로)

☐

2-1. 의사로부터 당뇨병을 처음 진단받은 때는 언제입니까?

만 세

888. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

888. 비해당

2-2. 본인의 혈당은 잘 조절되고 있습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

2-3. 혈당을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까? 모두 응답해 주십시오.

2-3-1. 인슐린 주사	① 예 ② 아니오
2-3-2. 당뇨병약(경구 혈당강하제)	① 예 ② 아니오
2-3-3. 비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오

888. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

8. 비해당

8. 비해당

2-4. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까?
모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료 상담은 제외).

2-4-1. 병의원	① 예 ② 아니오
2-4-2. 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소	① 예 ② 아니오

88. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

8. 비해당

2-5. 최근 1년 동안 당화혈색소 검사를 몇 번이나 했습니까?

① 4회 이상

② 3회

③ 2회

④ 1회

⑤ 측정 안함

⑥ 당화혈색소가 무엇인지 모름

⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

2-6. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈검사(안저검사)를 받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

2-7. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 스팩검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

【뇌졸중(중풍)】

1. 다음의 질문들은 귀하의 뇌졸중(중풍)에 대한 지식을 알아보기 위한 것입니다. 맞다고 생각하면 “예”, 아니라고 생각하면 “아니오”를 선택해 주십시오.

1-1. 갑자기 한쪽 얼굴, 팔, 다리에 힘이 빠진다	① 예 ② 아니오
1-2. 갑자기 말이 어눌해지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못한다	① 예 ② 아니오
1-3. 갑자기 한쪽 눈이나 시야의 반이 보이지 않거나, 물체가 두 개로 보인다	① 예 ② 아니오
1-4. 갑자기 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘들다	① 예 ② 아니오
1-5. 갑자기 이제까지 경험하지 못한 심한 두통이 생긴다	① 예 ② 아니오

☐
☐
☐
☐
☐

2. 만약 누군가가 뇌졸중(중풍)의 증상을 보인다면, 가장 먼저 무엇을 해야 한다고 생각합니까?

- ① 병원(한방병원 제외)으로 데려간다
② 한방병원으로 데려간다
③ 119에 전화한다(구급차를 부른다)
④ 가족에게 연락한다
⑤ 기타()

☐

기
타

【심근경색증】

1. 다음의 질문들은 귀하의 심근경색증(심장발작)에 대한 지식을 알아보기 위한 것입니다. 맞다고 생각하면 “예”, 아니라고 생각하면 “아니오”를 선택해 주십시오.

1-1. 갑자기 턱, 목 또는 등쪽에 통증이나 답답함이 있다	① 예 ② 아니오
1-2. 갑자기 힘이 없으며, 어지럽고, 울렁거리거나 식은땀이 난다	① 예 ② 아니오
1-3. 갑자기 가슴에 통증이나 압박감 또는 짓누르는 느낌이 있다	① 예 ② 아니오
1-4. 갑자기 팔 또는 어깨에 통증이나 불편감이 있다	① 예 ② 아니오
1-5. 갑자기 숨이 찬다	① 예 ② 아니오

☐
☐
☐
☐
☐

2. 만약 누군가가 심근경색증의 증상을 보인다면, 가장 먼저 무엇을 해야 한다고 생각합니까?

- ① 병원(한방병원 제외)으로 데려간다
② 한방병원으로 데려간다
③ 119에 전화한다(구급차를 부른다)
④ 가족에게 연락한다
⑤ 기타()

☐

기
타

【지역선택문항-고혈압】

1. (지역) 최근 1년 동안 혈압을 몇 번이나 잴습니까?

- ① 하루에
② 일주일에
③ 한 달에
④ 일 년에
⑤ 전혀 안함

→ □□□회

□□□□회

5 000. 전혀 안함

【지역선택문항-당뇨병】

1. (지역) 최근 1년 동안 혈당을 몇 번이나 잤습니까?

- ① 하루에
② 일주일에
③ 한 달에
④ 일 년에
⑤ 전혀 안함
- □□□회

□ □ □ □ 회
5 000. 전혀 안함

【지역선택문항-대사증후군】

1. (지역) 대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

□

의료이용

1. 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 미포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까?

① 예

② 아니오 (→ 「사고 및 중독」 1번 문항으로)

--	--

1-1. 그런 적이 있다면, 다음 중 어떤 이유로 본인이 원하는 때 병의원에 가지 못했습니까?
(한 가지만 선택)

① 경제적인 이유로

② 병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서

③ 교통편이 불편해서

④ 내가 갈 수 있는 시간에 병의원 등이 문을 열지 않아서

⑤ 병의원 등에서 오래 기다리기 싫어서

⑥ 증상이 가벼워서

⑦ 기타()

⑧ 비해당(문항1/②: 병의원(치과 미포함)에 가지 못한 적이 없음)

--	--

기
타

8. 비해당

사고 및 중독

1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ☐ 회 ☐ 회
※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외

2 0. 아니오

- ① 예 ➡ ☐ 회 ② 아니오 (➡ 「활동제한 및 삶의 질」 1-1번 문항으로)

※ 여러 번 발생했다면, 각각의 손상 및 사고중독에 대해 2~5번 문항을 반복합니다.

2. 이 사고 또는 중독은 언제 발생했습니까?

20 년 월

88 88. 비해당(문항1/② : 최근 1년 동안 사고나 중독이 발생한 적이 없음)

3. 이 사고 또는 중독은 어떻게 발생했습니까?

- ① 운수사고
② 추락
③ 낙상(미끄러짐 포함)
④ 부딪힘(충돌 포함)
⑤ 자상 및 관통상(찔림 포함)
⑥ 화상(전기, 열, 불로 인한)
⑦ 익수
⑧ 질식
⑨ 중독
⑩ 감전
⑪ 개 물림
⑫ 고양이 물림
⑬ 뱀 물림
⑭ 벌 쏘임
⑮ 기타()

88. 비해당(문항1/② : 최근 1년 동안 사고나 중독이 발생한 적이 없음)

4. 이 사고 또는 중독으로 입은 손상을 어디에서 치료를 받았습니까?

- ① 응급실
② 병원 외래 이용
③ 병원 병실입원
④ 기타()

88. 비해당(문항1/② : 최근 1년 동안 사고나 중독이 발생한 적이 없음)

5. 이 사고 또는 중독은 비의도적 사고였습니까? 아니면 본인이나 타인에 의해 의도적으로 발생한 것입니까?

- ① 비의도적 사고(불의의 사고)
② 의도적 자해
③ 다른 사람의 폭력

88. 비해당(문항1/② : 최근 1년 동안 사고나 중독이 발생한 적이 없음)

사고 및 중독 응답표

1회	2회	3회	4회	5회
20 년 월	20 년 월	20 년 월	20 년 월	20 년 월
88 88. 비해당	88 88. 비해당	88 88. 비해당	88 88. 비해당	88 88. 비해당
기 타	기 타	기 타	기 타	기 타
88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당
기 타	기 타	기 타	기 타	기 타
8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당
기 타	기 타	기 타	기 타	기 타
8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당
기 타	기 타	기 타	기 타	기 타
8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당

활동제한 및 삶의 질

※ 아래의 각 문항에서 오늘 귀하의 건강상태를 가장 잘 설명해주는 하나의 항목에 표시해 주십시오.

1-1. 운동능력

- ① 나는 걷는데 지장이 없다
- ② 나는 걷는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 종일 누워 있어야 한다

☐

1-2. 자기관리

- ① 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다
- ② 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다

☐

1-3. 일상 활동(예: 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가활동)

- ① 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다
- ② 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 일상 활동을 할 수가 없다

☐

1-4. 통증/불편

- ① 나는 통증이나 불편감이 없다
- ② 나는 다소 통증이나 불편감이 있다
- ③ 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다

☐

1-5. 불안/우울

- ① 나는 불안하거나 우울하지 않다
- ② 나는 다소 불안하거나 우울하다
- ③ 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다

☐

보건기관 이용

1. 최근 1년 동안 보건소(보건의원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

사회 물리적 환경

1. 현재 살고 있는 지역의 환경은 어떻다고 생각하십니까?

1-1. 대기	①매우좋다	②약간좋다	③보통이다	④약간나쁘다	⑤매우나쁘다
1-2. 수질	①매우좋다	②약간좋다	③보통이다	④약간나쁘다	⑤매우나쁘다
1-3. 토양 (쓰레기, 폐기물로 인한 오염)	①매우좋다	②약간좋다	③보통이다	④약간나쁘다	⑤매우나쁘다
1-4. 소음 진동	①매우좋다	②약간좋다	③보통이다	④약간나쁘다	⑤매우나쁘다
1-5. 녹지 환경(공원, 가로수 등)	①매우좋다	②약간좋다	③보통이다	④약간나쁘다	⑤매우나쁘다

☐☐☐☐☐

2. 현재 살고 있는 광역 시·도에서 얼마나 오래 살았습니까?

- ① 5년 미만
 ② 5-10년 미만
 ③ 10-15년 미만
 ④ 15-20년 미만
 ⑤ 20년 이상

☐

3. 현재 살고 있는 시·군·구에서 얼마나 오래 살았습니까?

- ① 5년 미만
 ② 5-10년 미만
 ③ 10-15년 미만
 ④ 15-20년 미만
 ⑤ 20년 이상

☐

심폐소생술

1. 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「지역-개인위생」 1번 문항으로)

☐


1-1. 심폐소생술 교육을 받은 경험이 있습니까?

- ① 최근 2년간 교육을 받은 적이 있다 (⇒ 1-1-1번 문항으로)
 ② 과거에는 있었지만, 최근 2년간 없다 (⇒ 2번 문항으로)
 ③ 교육을 받은 적이 없다 (⇒ 2번 문항으로)
 ④ 비해당(문항1/②: 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음)

☐

8. 비해당



1-1-1. 최근 2년 동안 마네킹을 이용한 심폐소생술 실습을 한 경험이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항1/②: 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음,
 문항1-1/②: 과거에는 있었지만, 최근 2년간 없음,
 문항1-1/③: 교육을 받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

2. 심장마비(심정지) 환자를 목격한 경우 심폐소생술을 시행할 수 있습니까?

- ① 정확하게 시행할 수 있다
 ② 대략 시행할 수 있다
 ③ 시행할 수 없다
 ④ 비해당(문항 1/②: 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음)

☐

8. 비해당

(지역선택문항) 개인위생

1. (지역) 기침이나 재채기를 할 때, 티슈(휴지), 손수건 또는 옷소매로 코나 입을 가립니까?

- ① 항상 그렇다
 ② 그런 편이다
 ③ 그렇지 않은 편이다
 ④ 전혀 그렇지 않다

☐

여성건강

1. (만 19세 - 55세 여성만 응답해 주십시오.) 현재 임신 중 입니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(남성 및 만 56세 이상 여성)

☐

8. 비해당

2. (만 19세 - 55세 여성만 응답해 주십시오.) 지난해 2017년 1월 1일부터 출산경험(정상출산, 조산 등 모두 포함)이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 3번 문항으로)
③ 비해당(남성 및 만 56세 이상 여성)

☐

8. 비해당



2-1. 최소 6개월 이상 조제분유 없이 완전 모유수유를 했습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(남성 및 만 56세 이상 여성, 문항2/②: 출산한 적이 없음)

☐

8. 비해당

3. (지역) 출산경험(정상출산, 조산 등 모두 포함)이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「교육 및 경제활동」 1번 문항으로)
③ 비해당(성별: 남성)

☐

8. 비해당



3-1. (지역) 첫 출산은 언제였습니까? 만 □□□세

- ③ 비해당(성별: 남성, 문항3/②: 출산경험(정상출산, 조산 등 모두 포함)이 없음)

☐

8. 비해당

교육 및 경제활동

1. 귀하께서는 최근 1주일 동안 수입을 목적으로 1시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급 가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태도 일을 하신 경우에 포함 됩니다.

① 예 ② 아니오

2. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해주십시오.
(예를 들면, 은행에서 출납 일을 함, 건설현장에서 교통정리를 함, 벽지 도배, 내과질환진료 및 치료 등)

일의 종류	
직 업 분 류	① 관리자 ② 전문가 및 관련종사자
	③ 사무종사자 ④ 서비스종사자
	⑤ 판매종사자 ⑥ 농·림·어업종사자
	⑦ 기능원 및 관련기능종사자 ⑧ 장치, 기계조작 및 조립종사자
	⑨ 단순노무종사자 ⑩ 군인(직업군인)
	⑪ 학생/재수생 ⑫ 주부 ⑬ 무직

☐

일의 종류

☐


- 2-1. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?

(※ 문항 2번 응답보기 ①~⑩에 응답하신 분만 응답해 주십시오.)

- ① 고용주 및 자영업자(내 사업을 한다)
② 임금근로자(타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다)
③ 무급가족종사자(가족, 친척의 일을 돈을 받지 않고 돕는다)
⑧ 비해당(문항1/②: 최근 1주일 동안 일을 하지 않음, 문항2/⑩, ⑫, ⑬: 학생/재수생, 주부, 무직)

☐

8. 비해당

3. 귀하는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

- ① 무학 (⇒ 4번 문항으로) ② 서당/한학 (⇒ 4번 문항으로) ③ 초등학교
④ 중학교 ⑤ 고등학교 ⑥ 2년/3년제 대학
⑦ 4년제 대학 ⑧ 대학원 이상

☐


- 3-1. 귀하는 그 학교를 졸업하셨습니다? 졸업여부를 말씀해 주십시오.

- ① 졸업
② 수료
③ 중퇴
④ 재학/휴학 중
⑧ 비해당(문항3/①, ②: 무학, 서당/한학)

☐

8. 비해당

4. 귀하의 현재 혼인상태(사실혼 포함)는 다음 중 무엇에 해당합니까?

- ① 배우자 있음(같이 살고 있음)
② 이혼
③ 사별
④ 별거
⑤ 미혼

☐

혈압측정(신체계측) 2차 (*CAPI 내 조사원 입력 사항)

1. 미측정 이유

- ① 측정 ② 제외대상 ③ 계측거부 ④ 기타()
 ⑧ 비해당(「혈압측정(신체계측) 1차」문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정)

☐
기
타

8. 비해당

2. 혈압 측정 팔

- ① 오른쪽 ② 왼쪽
 ⑧ 비해당(「혈압측정(신체계측) 1차」문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정,
 「혈압측정(신체계측) 2차」문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정)

☐

8. 비해당

3. 측정 전 5분 안정

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(「혈압측정(신체계측) 1차」문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정,
 「혈압측정(신체계측) 2차」문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정)

☐

8. 비해당

4. 혈압측정 값 입력

수축기(최고혈압/SYS) mmHG이완기(최저혈압/DIA) mmHG

888 888. 비해당(「혈압측정(신체계측) 1차」문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정,
 「혈압측정(신체계측) 2차」문항1/②, ③, ④: 제외대상, 계측거부, 기타의 이유로 미측정)

수축기

mmHG

이완기

mmHG

888 888. 비해당



지역사회건강조사
Community Health Survey

제 4 부 부록

Ⅱ. 가구조사표



CHS

Community Health Survey

다음은 2018년 지역사회건강조사 가구조사표(울산권역)입니다. ➔

2018년 지역사회건강조사 가구명부

시도 보건소 표본지점 가구

번호 :

가구현황

주소	(표본지점 주소)		집전화 ☎ () -	총 방문횟수	() 회
	(이하 상세주소)			방문 1차	2018. . .
				방문 2차	2018. . .
				방문 3차	2018. . .

가 구 구 분 ☐ 본표본가구 ☐ 예비표본가구(본표본가구 번호:) 가구대체 발생시 본표본 가구번호를 기입합니다.

성인거주여부 ☐ 성인거주 ☐ 성인미거주 ☐ 모름 성인기준 : 주민등록상 생일로 1999. 7. 31 이전 출생자

조사적합여부 ☐ 적합 ⇒ 가구원정보 기입 ☐ 부적합 ⇒ 조사종료 & 가구대체 (사유:)

가구원현황

‘가구조사’ 기입란은 가구조사를 한 대표 가구원 1인만 ☑하십시오.

가구원 번호	가구원 성명	성별	주민등록상 생년월일	가구주와의 관계	휴대전화	조사수행 여부	미수행 사유	가구 조사
01		남 / 여			- -	Y / N		☐
02		남 / 여			- -	Y / N		☐
03		남 / 여			- -	Y / N		☐
04		남 / 여			- -	Y / N		☐
05		남 / 여			- -	Y / N		☐
06		남 / 여			- -	Y / N		☐
07		남 / 여			- -	Y / N		☐
08		남 / 여			- -	Y / N		☐
09		남 / 여			- -	Y / N		☐
10		남 / 여			- -	Y / N		☐
11		남 / 여			- -	Y / N		☐
12		남 / 여			- -	Y / N		☐

조사원 성명:

가구완료

- 조 사 인 원 : 만 19세 이상 성인 ()명 중 ()명 조사
- 조 사 완 료 : 만 19세 이상 성인을 모두 조사하였습니까? ☐예 ☐아니오
- 가 구 조 사 : 가구 대표1명만 가구조사를 실시하였습니까? ☐예 ☐아니오
- 답 례 품 전 달 : 조사인원 수만큼 답례품을 제공하였습니까? ☐예 ☐아니오
- 가구선정통지서 : 이 가구는 가구선정통지서를 받았습니까? ☐예 ☐아니오
- 조 사 상 황 : 이 가구에서 처음 만난 조사대상자가 조사 거부했습니까? ☐예 ☐아니오
- 거 부 반 응 : 조사 거부 시 반응은 어떠했습니까?
☐매우 화냄 ☐화냄 ☐보통 ☐별로 화내지 않음 ☐전혀 화내지 않음
- 거 부 이 유 : 조사 거부 이유는 무엇입니까?
☐바빠다 ☐귀찮다 ☐이유없음(무조건) ☐기타()
- 설 득 방 법 : 조사 거부 시 어떻게 설득을 하였습니까? (한 가지만 선택)
☐조사목적 재설명을 통해서 ☐지속적인 재방문을 통해서
☐책임대학교 담당자 또는 보건소담당자의 도움을 통해서
☐통·반리장의 협조를 통해서 ☐기타()

5-2. 귀 가구는 의사로부터 치매를 진단받은 환자와 함께 거주하고 있습니까?

- ① 예 (⇒ 7번 문항으로) ② 아니오 (⇒ 5-3번 문항으로)
 ⑧ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음)

☐

8. 비해당

5-3. 함께 거주하지 않는다면, 치매환자는 어디에서 거주하고 있습니까?

- ① 요양 시설에 거주 (⇒ 6번 문항으로)
 ② 다른 가족과 함께 거주 (⇒ 7번 문항으로)
 ③ 혼자 거주 (⇒ 7번 문항으로)
 ④ 기타() (⇒ 7번 문항으로)
 ⑧ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음.
 문항5-2/①: 치매환자 동거하고 있음)

☐기
타

8. 비해당

6. (* 치매환자가 시설에서 거주할 경우) 거주 비용(경비)을 주로 지원하는 분은 치매환자와 관계가 어떻게 됩니까?

- ① 부모(배우자 부모 포함)
 ② 배우자
 ③ 형제 또는 자매
 ④ 자녀
 ⑤ 친척
 ⑥ 치매환자(본인)
 ⑦ 외부지원기관(보험, 기부금, 공공 보조금)
 ⑧ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음, 문항5-2/①: 치매환자 동거하고 있음, 문항5-3/②③④: 다른 가족과 함께 거주하거나 혼자 거주하거나, 기타 등)

☐

8. 비해당

7. (* 치매환자가 시설 외에 거주할 경우) 가족 중 치매 환자를 주로 돌보는 분이 계십니까?

- ① 예
 ② 아니오(⇒ 8번 문항으로)
 ⑧ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음,
 문항5-3/①: 요양시설에 거주)

☐

8. 비해당



7-1. 있다면, 주로 돌보는 분은 치매환자와의 관계가 어떻게 됩니까?

- ① 부모(배우자 부모 포함)
 ② 배우자
 ③ 형제 또는 자매
 ④ 자녀
 ⑤ 친척
 ⑧ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음,
 문항5-3/①: 요양시설에 거주, 문항7/②: 가족 중에 치매환자를 주로 돌보는 사람이 없음)

☐

8. 비해당

8. 치매환자로 인해 가장 부담스러운 점은 무엇입니까?

- ① 경제적 부담
 ② 심리정서적 부담
 ③ 육체적 부담
 ④ 시간적 부담
 ⑤ 사회적 편견에 대한 부담
 ⑧ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음)

☐

8. 비해당



지역사회건강조사
Community Health Survey

문의 : 질병관리본부 만성질환관리과
☎ 043-719-7385 / 7391
7397~7399

제 4 부 부록

Ⅲ. 지표정의



지표정의

1. 건강행태

가. 흡연

(1) 현재흡연율

지표정의		평생 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오 2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 ➔ 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비 입니까? □□□개비 ② 가끔 피움 ➔ 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 ➔ 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 ➔ 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 ➔ 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비 입니까? □□□개비 ➔ 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상
산출식	분자	평생 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람 중에서 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 남자 현재흡연율

지표정의		평생 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 남자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오 2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ② 가끔 피움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상
산출식	분자	평생 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람 중에서 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수 ×100
	분모	남자 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 매일흡연자의 하루 평균 흡연량

지표정의		평생 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 매일 흡연하는 사람의 하루 평균 흡연량
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오 2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비 입니까? □□□개비 ② 가끔 피움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비 입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상
산출식	분자	하루 평균 흡연개비 수의 총 합
	분모	평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일흡연자 수
단위		개비
조사주기		1년

(4) 현재흡연자의 금연시도율

지표정의		현재흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ② 가끔 피움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상
		3. 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까? ① 최근 1년간 금연한 적이 있다. ② 과거에는 있었지만, 최근 1년간 없다 ③ 금연한 적이 없다
산출식	분자	최근 1년 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 수×100
	분모	현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률

지표정의		현재흡연자 중 1개월 내에 금연할 계획이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오 2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ② 가끔 피움 → 2-2-1. 최근 1달간 흡연일 수는 며칠입니까? □□일 → 2-2-2. 흡연하는 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음 → 2-3-1. 과거흡연 기간은 얼마입니까? □□년 □□개월 → 2-3-2. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 → 2-3-3. 담배를 완전히 끊은 지 얼마나 되었습니까? □□년 □□개월 ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만 ④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상 3. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까? ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다 ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다 ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다 ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다
	분자	1개월 내 금연계획이 있는 사람의 수×100
	분모	현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수
단위		%
조사주기		1년

(6) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률

지표정의		최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. <u>본인을 제외한</u> 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. <u>최근 1주일 동안</u> 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적 있는 사람의 수×100
	분모	현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수
단위		%
조사주기		1년

(7) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률

지표정의		최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1주일 동안</u> 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)
산출식	분자	최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 ×100
	분모	일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수
단위		%
조사주기		1년

나. 음주

(1) 월간음주율

지표정의		최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 음주한 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2-4번 ④ 일주일에 2-3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상
산출식	분자	최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 연간음주자의 고위험음주율

지표정의		최근 1년 동안 음주한 사람 중에서 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까?</u> ① 예 ② 아니오 1-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2~4번 정도 ④ 일주일에 2~3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상 1-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다) ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
산출식	분자	최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔)이상을 주 2회 이상 마신 적이 있는 사람의 수×100
	분모	최근 1년 동안 음주한 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 전체 고위험음주율

지표정의		최근 1년 동안 음주한 사람 중에서 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2~4번 정도 ④ 일주일에 2~3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상 1-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다) ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
산출식	분자	최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔)이상을 주 2회 이상 마신 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 연간 절주 또는 금주시도율

지표정의		최근 1년 동안 절주나 금주를 시도한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 한 달에 1번 미만 ② 한 달에 1번 정도 ③ 한 달에 2~4번 정도 ④ 일주일에 2~3번 정도 ⑤ 일주일에 4번 이상
		1-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다) ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
		2. 최근 1년 동안 절주(음주량을 줄임)나 금주를 시도한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 절주나 금주를 시도한 적이 있는 사람의 수x100
	분모	최근 1년 동안 음주한 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 연간 음주폐해 경험률

지표정의		최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전사고 등을 경험한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니요
산출식	분자	최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있는 사람의 수x100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

다. 안전의식

(1) 운전자석 안전벨트 착용률

지표정의		자동차 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항		1. 자동차를 운전을 합니까? ① 예 ② 아니오
		1-1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까? ① 전혀 매지 않는다 ② 거의 매지 않는 편이다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 맨다
산출식	분자	자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	자동차 운전자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률

지표정의		승용차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항		1. 다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 맵니까? ① 앞좌석에 타지 않는다 ② 전혀 매지 않는다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 맨다
산출식	분자	다른 사람이 운전하는 승용차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 ×100
	분모	동승차량 앞좌석 탑승자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률

지표정의		승용차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항		1. 다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 맵니까? ① 뒷좌석에 타지 않는다 ② 전혀 매지 않는다 ③ 가끔 매는 편이다 ④ 대체로 매는 편이다 ⑤ 항상 맨다
산출식	분자	다른 사람이 운전하는 승용차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수 ×100
	분모	동승차량 뒷좌석 탑승자 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 연간 음주음전 경험률(자동차 또는 오토바이)

지표정의		최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 분율
관련문항		1. 자동차 운전을 합니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 2. 오토바이 운전을 합니까? ① 예 ② 아니오 2-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 수×100
	분모	자동차 또는 오토바이 운전자 수
단위		%
조사주기		1년

라. 신체활동

(1) 걷기 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1주일 동안</u> 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까? ※출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오. □일
		1-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까? 하루에 □□시간 □□분
산출식	분자	최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 지역사회 내 운동시설 접근율

지표정의		최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 쉽게 찾을 수 있다고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 쉽게 찾을 수 있었습니까? ① 매우 쉬웠다 ② 쉬운 편이었다 ③ 어려운 편이었다 ④ 매우 어려웠다
산출식	분자	최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 찾기 "매우 쉬웠다" 또는 "쉬운 편이었다"에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

마. 식생활

(1) 아침결식 예방인구비율

지표정의		최근 1주일 동안 아침식사를 주 5회 이상 먹은 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1주일 동안 아침식사를 한 날은 며칠입니까? ☐ 일
산출식	분자	최근 1주일 동안 아침식사를 5~7일 먹은 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 영양표시 활용률

지표정의		영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. 가공식품에 '영양표시'를 알고 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 가공식품을 사거나 고를 때 '영양표시'를 읽습니까? ① 예 ② 아니오 1-1-1. 영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고르는데 영향을 미칩니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수×100
	분모	가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

바. 비만 및 체중조절

(1) 비만을(자가보고)

지표정의		체질량지수
관련문항		1. 평소 알고 계시는 신장과 체중은 얼마입니까? 1-1. 키(신장) □□□.□cm 1-2. 몸무게(체중) □□□.□kg
산출식	분자	체질량지수(kg/m ²)가 25 이상인 사람의 수×100 - 저체중 = BMI<18.5 인 사람의 수×100 - 정상 = 18.5≤BMI<25 인 사람의 수×100 - 비만(비만인구율) = BMI≥25 인 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 주관적 비만인지율

지표정의		주관적으로 “약간 비만” 또는 “매우 비만”이라고 생각하는 사람의 분율
관련문항		1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까? ① 매우 마른 편임 ② 약간 마른 편임 ③ 보통임 ④ 약간 비만임 ⑤ 매우 비만임
산출식	분자	“약간 비만임” 또는 “매우 비만임”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 연간 체중조절 시도율

지표정의		최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까? ① 몸무게를 줄이려고 노력했다 ② 몸무게를 유지하려고 노력했다 ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다 ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해 본 적 없다
산출식	분자	최근 1년 동안 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 했던 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

사. 구강건강

(1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

지표정의		주관적으로 구강건강이 나쁘다고 인식하는 사람의 분율
관련문항		1. <u>스스로</u> 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨
산출식	분자	“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 저작불편호소율(65세 이상)

지표정의		현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 65세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느끼니까? (※틀니를 사용하는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오) ① 매우 불편하다 ② 불편하다 ③ 그저 그렇다 ④ 별로 불편하지 않다 ⑤ 전혀 불편하지 않다
산출식	분자	“매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	65세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 어제 아침식사 후 칫솔질 실천율

지표정의		아침식사 후 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. <u>어제 하루</u> 동안 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? 아침 식사 후에 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 아침식사 하지 않음
산출식	분자	아침식사 후 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	어제 하루 동안 아침식사 한 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율

지표정의		점심식사 후 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. <u>어제 하루 동안</u> 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? 점심 식사 후에 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 점심식사 하지 않음
산출식	분자	점심식사 후 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 어제 저녁식사 후 칫솔질 실천율

지표정의		저녁식사 후 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. <u>어제 하루 동안</u> 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? 저녁 식사 후 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 저녁식사 하지 않음
산출식	분자	저녁식사 후 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(6) 어제 잠자기 전 칫솔질 실천율

지표정의		잠자기 전 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. <u>어제 하루 동안</u> 다음 시기에 칫솔질(잇솔질)을 했습니까? 잠자기 전에 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 잠자지 않음
산출식	분자	잠자기 전 칫솔질 한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(7) 연간 미충족의료율(치과)

지표정의	최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 분율	
관련문항	1. 최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	
산출식	분자	최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위	%	
조사주기	1년	

아. 정신건강

(1) 스트레스 인지율

지표정의	평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이” 또는 “많이” 느끼는 사람의 분율	
관련문항	1. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까? ① 대단히 많이 느낀다 ② 많이 느끼는 편이다 ③ 조금 느끼는 편이다 ④ 거의 느끼지 않는다	
산출식	분자	평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위	%	
조사주기	1년	

(2) 우울감 경험률

지표정의		최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?</u> ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

2. 예방접종

(1) 연간 인플루엔자 예방접종률

지표정의		최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?</u> ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

3. 이환

(1) 고혈압 진단 경험률(≥ 30)

지표정의	의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람의 분율	
관련문항	1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	
산출식	분자	의사에게 고혈압을 진단 받은 사람의 수 $\times 100$
	분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위	%	
조사주기	1년	

(2) 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥ 30)

지표정의	의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람으로 현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용한 분율	
관련문항	1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 혈압을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까? 모두 응답 해 주십시오. 혈압약 복용 ① 예→한 달에 □□일 ② 아니오 비약물요법 (운동, 식사요법) ① 예 ② 아니오	
산출식	분자	현재 혈압조절약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수 $\times 100$
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위	%	
조사주기	1년	

(3) 고혈압 관리교육 이수율(≥30)

지표정의		의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람 중 고혈압 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 2. 고혈압을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) 병의원 ① 예 ② 아니오 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 혈압수치 인지율

지표정의		본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 분율
관련문항		1. 본인의 혈압수치를 알고 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 당뇨병 진단 경험률(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	의사에게 당뇨병을 진단 받은 사람의 수×100
	분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(6) 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 혈당을 관리하기 위해 인슐린 주사 또는 당뇨병 약(경구혈당강하제)을 치료 받고 있는 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-2. 혈당을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까? 모두 응답해 주십시오. 인슐린 주사 ① 예 ② 아니오 당뇨병 약(경구 혈당강하제) 복용 ① 예 ② 아니오 비약물요법(운동, 식사요법) ① 예 ② 아니오
산출식	분자	현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(7) 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 당뇨병 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 2. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) 병의원 ① 예 ② 아니오 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(8) 연간 당뇨병성 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년 동안 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-2. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(9) 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥30)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년 동안 스틱검사를 제외한 정밀소변 검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-2. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 받은 적이 있는 사람의 수×100
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(10) 혈당 수치 인지율

지표정의		본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 분율
관련문항		1. 본인의 혈당수치를 알고 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

4. 의료이용

(1) 연간 미충족의료율

지표정의		최근 1년 동안 필요한 의료서비스를 받지 못한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 본인이 병원(치과 미포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

5. 사고 및 중독

(1) 연간 사고 및 중독 경험률

지표정의		최근 1년 동안 병원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 병원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외 ① 예 → □회 ② 아니오
산출식	분자	연간 사고 및 중독 경험자 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

6. 활동제한 및 삶의 질

(1) 양호한 주관적 건강수준 인지율

지표정의		주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”이라고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. 평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨
산출식	분자	주관적 건강수준을 “매우 좋음” 혹은 “좋음”에 응답한 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

7. 보건기관 이용

(1) 연간 보건기관 이용률

지표정의		최근 1년 동안 보건기관을 이용한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

8. 사회 물리적 환경

(1) 현재 체감 환경

지표정의		현재 체감하고 있는 지역의 환경 상태에 대한 사람의 분율					
관련문항		1. 현재 살고 있는 지역의 환경은 어떻다고 생각하십니까?					
		1-1. 대기	① 매우 좋다	② 약간 좋다	③ 보통이다	④ 약간 나쁘다	⑤ 매우 나쁘다
		1-2. 수질	① 매우 좋다	② 약간 좋다	③ 보통이다	④ 약간 나쁘다	⑤ 매우 나쁘다
		1-3. 토양	① 매우 좋다	② 약간 좋다	③ 보통이다	④ 약간 나쁘다	⑤ 매우 나쁘다
		1-4. 소음 진동	① 매우 좋다	② 약간 좋다	③ 보통이다	④ 약간 나쁘다	⑤ 매우 나쁘다
		1-5. 녹지환경	① 매우 좋다	② 약간 좋다	③ 보통이다	④ 약간 나쁘다	⑤ 매우 나쁘다
산출식	분자	응답보기 별 응답자 수×100					
	분모	조사대상 응답자 수					
단위		%					
조사주기		2년					

9. 심폐소생술

(1) 심폐소생술 인지율

지표정의		심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 분율					
관련문항		1. 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까?					
		① 예 ② 아니오					
산출식	분자	심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수 ×100					
	분모	조사대상 응답자 수					
단위		%					
조사주기		2년					

10. 여성건강

(1) 최근 출산 경험률

지표정의		최근 출산 경험이 있는 사람의 분율
관련문항		1. (만 19세-55세 여성만 응답해주시시오) 지난해 2017년 1월 1일부터 출산경험(정상출산, 조산 등 모두포함)이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근(2017년 1월 1일 이후) 출산경험이 있는 사람의 수
	분모	여자 조사대상자의 응답자 수
단위		%
조사주기		2년

11. 가구조사

(1) 식품 안정성 확보율

지표정의		최근 1년 동안 가구 식생활 형편을 물었을 때 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었거나 혹은 충분한 양이지만 다양하지 못한 음식을 먹은 사람의 분율
관련문항		1. 다음 중 최근 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까? ① 우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다 ② 우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다 ③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다 ④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다
산출식	분자	“우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다” 혹은 “우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다”에 응답한 가구의 수×100
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

제 4 부 부록

IV. 2008-2018 산출지표



2008-2018 산출지표

1. 흡연

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
평생흡연율	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
흡연시작연령 ¹⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
현재흡연율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
매일흡연자의 하루 평균 흡연량	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
현재흡연자의 1개월 내 금연계획률	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
현재흡연자의 금연시도율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
과거흡연자의 금연기간	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 ²⁾	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 ³⁾	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률 ⁴⁾	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
연간 금연캠페인 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
연간 금연교육 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
현재흡연자의 금연교육 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
금연구역 인지율	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
평생 전자담배 사용 경험률	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
현재 전자담배 사용 경험률	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
평생 다른 담배 제품 사용 경험률	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○
현재 다른 담배 제품 사용 경험률	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○
총계	8	10	10	13	8	13	11	19	11	17	13

1) '08년 지표명: 처음 흡연경험연령

2) '08년 지표명: 가정 내 간접흡연 노출률, '10-'13년 지표명: 가정실내 간접흡연 노출률

3) '09-'14년 지표명: 직장실내 간접흡연 노출률

4) '11-'13년 지표명: 공공장소 간접흡연 노출률

2. 음주

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
평생음주율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
음주시작연령 ⁵⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
연간음주율	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
월간음주율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고위험음주율(연간음주자의 고위험음주율)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
전체 고위험음주율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 음주폐해 경험률	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
연간 절주 또는 금주시도율	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
총계	5	6	6	6	6	6	8	8	8	8	7

3. 안전의식

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
운전자석 안전벨트 착용률 ⁶⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
버스 안전벨트 착용률	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이) ⁷⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 음주운전차량 동승경험률 ⁸⁾	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
오토바이 헬멧 착용률	-	○	○	○	-	○	○	-	○	-	○
자전거 헬멧 착용률	-	○	○	○	-	○	○	-	○	-	○
연간 자전거 음주운전 경험률	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
총계	3	5	6	6	4	6	9	7	9	7	9

5) '08년 지표명: 처음 음주경험연령

6) '08-'16년 지표명: 운전 시 안전벨트 착용률

7) '08년 지표명: 연간 음주운전 경험률(자동차, 오토바이)

8) '14년 지표명: 연간 자동차 음주운전차량 동승률

4. 운동 및 신체활동

산출지표	년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
격렬한 신체활동 실천율		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
중등도 신체활동 실천율		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
중등도 이상 신체활동 실천율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
걷기 실천율 ⁹⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
근력운동 실천율		-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
유연성운동 실천 빈도		-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
주중 여가시간에 앉아서 보내는 시간		-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
주말 여가시간에 앉아서 보내는 시간		-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
지역사회 내 운동시설 접근율		○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	○
총계		3	5	5	8	5	8	5	8	5	8	2

5. 식생활

산출지표	년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
아침식사빈도 ¹⁰⁾		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
아침결식 예방인구비율		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
저염선택율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
영양표시 인지율		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
영양표시 독해율 ¹¹⁾		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
영양표시 활용율		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
총계		1	2	2	4	4	4	6	6	6	6	5

6. 비만 및 체중조절

산출지표	년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
비만율(자가보고) ¹²⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
비만율(신체계측)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
비만도 분포		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
주관적 비만인지율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 체중조절 시도율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
총계		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5

9) '08년 지표명: 걷기운동 실천율

10) '11-'14년 지표명: 아침식사 섭취빈도

11) '09-'13년 지표명: 가공식품 선택 시 영양표시 이용률

12) '08년 지표명: 비만인구율

7. 구강건강

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
저작불편호소율(65세 이상)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
틀니 이용 행태(50세 이상)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
주관적 틀니 필요 인지율(50세 이상)	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
어제 아침식사 후 칫솔질 실천율	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
어제 점심식사 후 칫솔질 실천율	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
어제 저녁식사 후 칫솔질 실천율	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
어제 잠자기 전 칫솔질 실천율	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
연간 구강검진 수진율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
연간 스케일링 경험률	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
연간 미충족의료율(치과)	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
미충족의료 이유(치과) ¹³⁾	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
주관적 잇몸 건강 인지율	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
총계	7	8	6	10	8	10	11	13	11	13	8

13) '14년 지표명: 치과진료 미치료자의 미치료 이유

8. 정신건강

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
하루 평균 수면시간	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
스트레스 인지율 ¹⁴⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
스트레스로 인한 정신상담률	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
우울감 경험률	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
우울증상으로 인한 정신상담률	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
자살생각률	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-
자살생각으로 인한 정신상담률	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-
자살시도율	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-
자살시도로 인한 정신상담률	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-
자살생각행동 원인	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
인터넷, 게임(오락), 스마트폰일상생활지장경험빈도	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-
인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-
우울증상유병률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
정신문제 상담경험률 ¹⁵⁾	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
치매상담 콜센터 인지율	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
치매상담 콜센터 이용률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
치매상담 콜센터 미이용 이유	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
인지장애 경험률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
인지장애로 인한 일상생활 지장률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
인지장애로 인한 도움 필요율	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
일상생활 도움 수혜율	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
인지장애로 인한 사회생활 지장률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
인지장애 상담률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
연간 치매선별검사 수진율	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
치매선별검사 장소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
총계	4	5	5	5	5	11	5	5	5	14	18

14) '08년 지표명: 주관적 스트레스 인지율

15) '08년 지표명: 우울장애로 인한 상담 경험률

9. 예방접종 및 검진

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
연간 인플루엔자 예방접종률	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
건강검진 수진율	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	-
건강검진 사후 관리 상담률	-	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-
건강검진 미수진 이유	-	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-
암 검진율	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	-
암 검진 사후 관리 상담률	-	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-
암 검진 미수검 이유	-	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-
연간 인플루엔자 예방접종 횟수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
계절별 인플루엔자 예방접종 경험률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
연간 인플루엔자 예방접종 장소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
총계	3	7	7	1	7	1	7	3	7	6	1

10. 이환

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
[이환]											
만성·급성질환 및 사고중독 경험률 ¹⁶⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
만성·급성질환 및 사고중독 경험일수 ¹⁷⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
[고혈압]											
고혈압 진단 경험률 ¹⁸⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고혈압 최초 진단 시기	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
본인 인지 혈압조절률	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	○
고혈압 현재치료율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
고혈압 진단 경험자의 치료율 ¹⁹⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고혈압 관리교육 이수율	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

16) '08-'10년 영역: 활동제한 및 삶의 질

17) '08-'10년 영역: 활동제한 및 삶의 질

18) '08년 지표명: 고혈압 평생 의사진단 유병률, '09-'16년 지표명: 고혈압 평생 의사진단 경험률

19) '08년 지표명: 혈압조절약의 정기적 복용률 '09-'16년 지표명: 고혈압 약물치료율

20) '11-'16년 지표명: 혈압 인지율

21) '08년 지표명: 당뇨병 평생 의사진단 유병률, '09-'16년 지표명: 당뇨병 평생 의사진단 경험률

22) '08-'16년 지표명: 당뇨병 약물치료율

23) '08년 지표명: 당뇨병 관리형태(혈당관리방법)

24) '11-'16년 지표명: 혈당 인지율

25) '08년 지표명: 고지혈증 평생 의사진단 유병률, '09-'10년 지표명: 고지혈증 평생 의사진단 경험률, '11-'16년 지표명: 이상지질혈증(고지혈증 포함) 평생 의사진단 경험률

26) '08년 지표명: 골관절염 평생 의사진단 유병률, '09-'16년 지표명: 관절염 평생 의사진단 경험률

27) '08-'16년 지표명: 백내장 평생 의사진단 경험률

산출지표	년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
고혈압 관리교육 장소		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
혈압수치 인지율 ²⁰⁾		-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	○
[당뇨병]												
당뇨병 진단 경험률 ²¹⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 최초 진단 시기		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
본인 인지 혈당조절률		-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	○
당뇨병 현재치료를		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
당뇨병 진단 경험자의 치료율 ²²⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 치료방법 ²³⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
당뇨병 관리교육 이수율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
당뇨병 관리교육 장소		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 당뇨병 안질환합병증검사(안저검사) 수진율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 당뇨병 산장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
혈당수치 인지율 ²⁴⁾		-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	○
당화혈색소 인지율		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
당화혈색소 검사 횟수		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
[이상지질혈증(고지혈증 포함)]												
이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험률 ²⁵⁾		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
이상지질혈증(고지혈증 포함) 현재치료를		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
이상지질혈증(고지혈증 포함) 약물치료를		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
[뇌졸중(중풍)]												
뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
뇌졸중(중풍) 증상 대처 방법		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
[심근경색증]												
심근경색증 조기증상 인지율		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
심근경색증 증상 대처 방법		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
[관절염]												
관절염 진단 경험률 ²⁶⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
관절염 현재치료를		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
관절염 관리교육 이수율		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
관절염 관리교육 장소		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
[백내장]												
백내장 진단 경험률 ²⁷⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
백내장 현재치료를		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
총계		21	21	23	28	26	28	30	26	30	32	22

11. 의료이용

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
연간 필요의료서비스 미치료율 ²⁸⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
필요의료서비스 미치료 이유	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
총계	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2

12. 사고 및 중독

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
연간 사고 및 중독 경험률 ²⁹⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 사고 및 중독 건수율 ³⁰⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
연간 낙상 경험률	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
연간 낙상 건수율	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
연간 낙상 치료 경험률	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
장소별 낙상 분포	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-
원인별 낙상 분포	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-
계절별 사고 및 중독 경험률	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○
사고 및 중독 원인	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○
주 치료처별 사고 및 중독 분포	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○
의도성 및 비의도성 사고분포	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○
총계	5	6	6	6	2	6	6	5	2	7	6

28) '10년 치과포함 미치료율

29) '08년 지표명: 사고중독 발생률

30) '08년 지표명: 연간 사고중독발생 건수율

13. 활동제한 및 삶의 질

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
양호한 주관적 건강수준 인지율 ³¹⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
삶의 질 지수(EQ-5D Index)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
월간 침상와병 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
월간 침상와병 일수	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
월간 결근결석 경험률	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
월간 결근결석 일수	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
행복감 지수	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
총계	6	6	6	7	6	7	2	7	2	7	2

14. 보건기관 이용

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
연간 보건기관 이용률	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
총계	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

15. 사회 물리적 환경

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
지역의 사회물리적 환경에 대한 긍정적 태도율	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
사회적 연결망(친척, 이웃, 친구)	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
사회활동 참여율	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
현재 체감 환경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
광역 시·도 거주기간	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
시·군·구 거주기간	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
총계	-	-	-	5	2	5	2	5	2	5	3

31) '09-'11년 지표명: 주관적 건강수준 인지율

16. 개인위생

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
손 씻기 감염병 예방 인지율	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	
식사 전 손 씻기 실천율	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	
화장실 다녀온 후 손 씻기 실천율	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	
외출 후 손 씻기 실천율	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	
비누, 손 세정제 사용률	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	
연간 손 씻기 교육 및 홍보 경험률	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	
총계	-	-	-	-	-	6	-	6	-	6	

17. 심폐소생술

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
심폐소생술 인지율	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
심폐소생술 교육 경험률	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
심폐소생술 마네킹 실습 경험률	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
심폐소생술 시행능력률	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○
총계	-	-	-	-	4	-	4	-	4	-	4

18. 여성건강

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
최근 출산 경험률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
모유수유 경험률	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
총계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

19. 가구조사

산출지표 \ 년도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
식품 안정성 확보율 ³²⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
치매환자 가족 가구율	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
치매환자 가족관계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
치매환자 동거 가구율	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
비동거 치매환자의 거주상태	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
시설거주 치매환자 비용부담자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
시설 외 거주 치매환자의 돌봄자율	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
시설 외 거주 치매환자의 돌봄자의 관계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
치매 질병 부담 이유	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
총계	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	9

32) '09-'13년 영역: 개인조사 「식생활」

참여연구진

지역 책임 교수	이 중 정	계 명 대 학 교
지역부책임교수	배 상 근	계 명 대 학 교
지역담당연구원	백 경 은	계 명 대 학 교
	오 창 규	계 명 대 학 교
	장 윤 정	계 명 대 학 교
	최 정 예	계 명 대 학 교
	한 효 완	계 명 대 학 교
조사관리담당관	이 종 득	울주군보건소
조사협조지원		
지역조사원	김 정 희	울주군보건소
	김 형 미	울주군보건소
	김 형 주	울주군보건소
	이 채 빈	울주군보건소

2018년 울산광역시 울주군 지역사회 건강통계

발 행 : 2019. 3.

발 행 인 : 이 선 호 (울산광역시 울주군수)

편 집 인 : 이 중 정 (계명대학교)

발 행 처 : 기 관 명 울산광역시 울주군보건소

홈페이지 <http://health.ulju.ulsan.kr>

주 소 (44950) 울산광역시 울주군 삼남면 서향교1길 67-12

전화번호 (052) 204-2711

팩 스 (052) 204-2719

이 책은 울주군보건소에 소유권이 있습니다. 울산광역시 울주군보건소
승인 없이 상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.