

발 간 등 록 번 호

11-1790387-000185-10

ISSN 2092-2876
통계승인번호 제 117075호

COMMUNITY HEALTH SURVEY

2022 지역사회 건강통계

울산광역시 | 울주군



2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

발간사 | 보건소장



2008년부터 시작하여 어느덧 15년 차에 달한 지역사회건강조사는 군민의 건강행태와 생활습관 등 건강관련 현황을 파악하여 건강수준을 통계화하고 건강위험 요인을 찾아내어 분야별 건강정책을 수립하기 위한 실제적인 자료로, 우리군의 지역 간 건강격차 해소와 맞춤 의료서비스 제공을 위해 유용히 활용하고 있습니다.

특히 2020년 1월부터 발생한 코로나19가 군민의 건강과 일상을 위협하고 있는 상황에서, 지역건강조사를 통해 다양한 건강 데이터를 축적하고 분석하는 일은 앞으로 또다시 발생할지 모를 감염병에 대비하는 초석이 될 것입니다.

최근 사회경제적 발전, 위생수준의 향상, 의학기술의 발달로 인하여 수명은 연장되었지만 잘못된 식습관과 운동부족, 스트레스로 인한 고혈압과 당뇨병 발생 등의 심뇌질환 환자가 증가하고 있습니다. 또한, 코로나19로 모임 감소, 외출 자제 등의 사회적 거리두기는 사회적 고립으로 이어졌고, 이에 따라 정신건강지표가 다소 악화되어 정신건강관리에 대한 요구로도 증가하고 있습니다.

이러한 지역사회 건강문제를 파악하고 해결하기 위하여 지역사회건강조사 결과를 적극 활용하여, 울주군의 특성과 요구에 맞는 다양한 보건의료정책을 수립하고 실행하기 위해 최선을 다하겠습니다.

앞으로도 지역사회건강조사 결과가 우리군 군민의 질병예방과 건강증진을 위한 중요한 자료로 활용되도록 노력할 것이며, 건강조사를 수행하고 통계발간을 위해 수고해 주신 계명대학교 이중정 교수님 및 연구원과 조사를 협조해 주신 군민들께 진심으로 감사드립니다.

모두 항상 건강하고 행복하시길 기원합니다. 감사합니다.

2023. 3.

울산광역시 울주군보건소장 **조 은 진**

발간에 즈음하여 | 책임대학 교수

2020년 2월부터 발생한 코로나로 인해 사회 전반에 걸친 불안과 공포 속에서 우리는 많은 변화를 겪었고 이제 일상으로 돌아가고 있습니다.

지난 3년 반이라는 시간은 건강이야말로 우리 사회를 지속 가능하게 하는 원동력이자 근간임을 다시 한번 깨닫게 하는 계기가 되었고, 또 국가, 지역사회에서 보건의료에 위협을 받으면, 우리 사회가 얼마나 불안해지고, 경제적, 사회적으로 막대한 대가를 치루어야 한다는 교훈을 얻었습니다.

이번 코로나 팬데믹으로 전 국민이 보건의료에 대한 관심이 높아졌습니다. 특히 감염병 대응 시 보여준 공공보건의료, 필수의료제공체계에 대한 미비점을 비롯하여 우리나라 보건 의료체계의 여러 문제점들이 여실히 드러났으며, 이를 혁신적으로 개선해야만 하는 과제가 우리들 앞에 남았습니다.

필수의료서비스의 제공, 지속 가능한 의료체계의 방향성 제시, 국가 재난난 시 의료 인력 확충 등 의료 체계의 혁신에 관해 다방면에서 다각적인 시각으로 논의될 것임은 의심의 여지가 없습니다.

이러한 시기에 지역사회건강조사는 그 어느 때보다 중요성이 대두되고 있습니다. 지역보건의료계획을 넘어 국가 방역체계 수립의 기초가 되는 통계 자료의 산출이라는 막대한 역할을 하고 있기 때문입니다.

항상 무거운 책임감을 가지고, 그 어떤 통계 자료보다 높은 신뢰도를 담보할 수 있도록 노력하고 있습니다.

코로나 기간 중에도 조사에 응해주신 울산시민 여러분, 조사대상자들의 대면 접촉 기피에도 불구하고 항상 새로운 방법에 대해 고민하고 조사사업의 타당성에 대해 설득할 수 있는 논리를 고민해 주신 보건소 담당자 및 책임 대학 연구원, 불철주야 열정과 의욕을 바탕으로 현장에서 항상 최선을 다해주신 조사원 여러분 덕분에 2022년도 조사도 성공적인 마무리를 하였습니다.

매해 어려운 환경 속에서도 양질의 통계집 발간을 위해 최선을 다해 주신 모든 분들에게 다시 한번 감사 말씀드립니다.



2023. 3.

계명대학교 의과대학 책임교수 이 중 정

이용자를 위하여

- ❖ 본 통계집은 2022. 8. 16. - 2022. 10. 31. 울산광역시에서 실시된 지역사회건강조사 결과를 수록한 자료입니다.
- ❖ 본 통계집에 제시된 추정치는 가중치를 적용한 결과(조율)이며, 가중치는 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율, 개인응답률, 당해 연도 모집단 성·연령별 인구 구성비를 반영하여 산출하였습니다.
- ❖ 제2부 주요통계결과에서는 2018-2022년 비교 가능한 지표(조율)에 대해서 당해 연도의 전체·성·연령별 그래프와 함께 울주군 및 울산광역시의 연도별 추이 그래프를 제시하였으며(연도별 데이터가 없는 경우 구별 데이터만 제시), 증감 현황을 기술하였습니다. 조사문항 변경내용은 제4부 부록 <2008-2022 산출지표>에서 확인하실 수 있습니다.
- ❖ 제3부 통계표에서는 당해 연도에 선정된 주요지표의 상세분석결과를 제시하였으며, 주요지표를 포함한 모든 산출지표의 통계표는 엑셀파일 형태로 지역사회건강조사 누리집(<http://chs.kdca.go.kr>) 자료실에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
- ❖ 본 자료 중 2022년 이전 연도의 수치는 응답의 이상치와 논리적 오류를 수정하여 산출된 결과로 기 발간된 보고서의 수치와 일부 다를 수 있습니다.
- ❖ 분석대상자 수(N)가 20명 미만인 경우 제2부 주요통계결과에서 제시하지 않았으며 제3부 통계표에서 해당 값을 하이픈(-)으로 처리하였습니다. 상대표준오차(Relative Standard Error, RSE)가 30%이상인 경우 추정치의 신뢰도가 낮다는 것을 의미하므로 결과해석 시 주의 하시기 바랍니다.
- ❖ 통계표에 수록된 숫자는 소수점 두 번째 자리에서 반올림되었으며, 반올림된 수치의 총계가 일치하지 않을 수 있으나 이는 통계표의 오류가 아닙니다.
- ❖ 본 통계집 및 조사표, 지침서 등 기타 지역사회건강조사 관련 자료는 지역사회건강조사 누리집에서 다운로드 받으실 수 있으며, 2008년부터 2021년까지의 지역사회건강조사 원시자료는 누리집을 통해 제공하고 있습니다.
- ❖ 수록된 자료 및 지역사회건강조사에 관한 문의는 울주군보건소(☎052-204-2713), 계명대학교(☎053-258-7467)로 해주시기 바랍니다.

용어 정의

1

통계

① 모집단(Population)

조사대상이 되는 집단 전체

② 표본(Sample)

모집단 중 조사를 위해 추출된 일부 집단

③ 표본오차(Sampling Error)

모집단 중 일부를 표본으로 선정하여 조사함에 따라 발생하는 오차로서 표본조사의 정확성을 나타내는 척도

④ 비표본오차(Non-Sampling Error)

표본추출을 제외한 조사 설계, 조사 수행, 자료 집계 및 분석 과정에서 발생하는 오차로서 불명확한 조사개념, 조사문항의 객관성 결여, 조사지 구성의 논리적 오류, 면접방법, 조사원의 자질, 조사원을 감독하는 관리자의 태도, 조사대상자의 무응답, 자료 코딩 등이 비표본오차의 주요 발생 원인에 해당

⑤ 조율(Crude Rate)

총 발생건수를 전체 모집단으로 나눈 값으로, 해당 지역 모집단의 성·연령별 등의 인구 집단 특성을 반영한 통계치

⑥ 표준화율(Standardized Rate)

비교하고자 하는 집단 간 인구 구조 차이를 표준화 인구를 기준으로 보정한 통계치

⑦ 표준오차 (Standard Error, SE)

각 표본들의 평균이 모집단의 평균과 얼마만큼의 차이가 있는지 나타내는 값

⑧ 상대표준오차 (Relative Standard Error, RSE)

표준오차를 평균으로 나눈 값($\text{표준오차}/\text{추정치} \times 100$)으로 통계치의 신뢰도를 나타내는 척도이며, 상대표준오차와 통계치의 신뢰도는 반비례 관계

⑨ 가중치 (Weight)

전체집단에서 개별 구성요소가 차지하는 비중이나 중요도를 수치로 나타내는 값

2

조사

① CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

컴퓨터를 이용하여 조사 자료를 수집하는 방식으로, 조사원이 전자조사표가 설치된 기기(노트북, 태블릿 PC 등)로 면접조사를 수행 시, 조사현장에서 직접 자료입력, 수정, 저장 및 전송 가능

② 순환조사체계

2010년부터 지역사회건강조사에 도입된 조사체계로서, 산출지표의 활용도 및 사회적 관심 등을 고려하여 조사문항 및 산출지표의 주기를 1년, 2년, 4년으로 구분하고, 순환주기는 총 4년으로 구성

③ 지역보건지표뱅크

지역사회에서 보건사업 추진 시 활용 가능한 조사문항 및 산출지표를 수집·정리한 것으로 지표별 조사문항 및 응답보기, 지표정의, 산출식, 조사주기 등 상세정보 포함

목차

발간사 보건소장	
발간에 즈음하여 책임대학 교수	
이용자를 위하여	
용어 정의	
요약	
2022년 울산광역시 울주군 주요 건강지표 요약	2
우리 지역사회의 주요 건강이슈	6

제1부 조사체계

I. 조사개요	13
1. 조사목적	14
2. 조사방법	14
3. 조사내용	14
4. 표본설계	15
5. 조사체계	17
6. 자료관리	19
7. 조사현황	20
II. 통계 추정방법	23
1. 가중치의 사용	24
2. 자료처리	25
3. 분산추정	26

제2부 주요통계결과

I. 건강행태	29
1. 흡연	30
2. 음주	38
3. 신체활동	42
4. 건강생활실천	46
5. 비만 및 체중조절	48
6. 식생활	50
7. 정신건강	52
8. 구강건강	54
9. 활동제한 및 삶의 질	56
10. 안전의식	58
II. 이환 및 의료이용	61
1. 주요 질환별 진단 경험률 및 관리행태	62
2. 의료이용	70
3. 예방접종	70
4. 보건기관 이용	70
III. 사고 및 중독	73
1. 사고 및 중독	74

목차

IV. 사회 물리적 환경	77
1. 광역 사도 거주기간	78
2. 시·군구 거주기간	78
V. 심폐소생술	81
1. 심폐소생술 인지도	82
2. 심폐소생술 교육 경험률	82
VI. 코로나바이러스감염증-19	85
1. 코로나19로 인한 심리적 영향	86
2. 코로나19 예방접종 경험	88
3. 코로나19 확진	90

제3부 통계표

I. 통계표	99
--------------	----

제4부 부록

I. 개인조사표	203
II. 가구조사표	229
III. 조사항목	233
IV. 지표정의	241

참고문헌	290
참여연구진	291

〈표목차〉

〈표 1〉 2022년 지역사회건강조사 주요지표 결과	2
〈표 2〉 2022년 지역사회건강조사 주요지표 결과	4
〈표 3〉 2022년 전국 시군구별 표준화율과 울주군 표준화율의 비교	6
〈표 4〉 지역사회건강조사 순환조사체계	14
〈표 5〉 2022년 지역사회건강조사 조사항목	15
〈표 6〉 동/읍면별 표본지점 분포	16
〈표 7〉 조사현황	20
〈표 8〉 가구당 조사인원 수	20
〈표 9〉 2022년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성	21
〈표 10〉 2022년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성	22
〈표 11〉 가구가중치 산출 예	24
〈표 12〉 개인가중치 산출 예	25
〈표 13〉 보정가중치 산출 예	25
〈표 14〉 교육수준분류	26
〈표 15〉 직업분류	26

그림목차

〈그림목차〉

〈그림 1〉 2022년 주요지표 결과 비교 - 긍정적 지표 ...	7
〈그림 2〉 2022년 주요지표 결과 비교 - 부정적 지표 ...	8
〈그림 3〉 황금다이아몬드를 이용한 보건사업 우선순위 ...	9
〈그림 4〉 지역사회건강조사 표본선정과정 ...	16
〈그림 5〉 지역사회건강조사 수행체계 ...	17
〈그림 6〉 지역사회건강조사 수행과정 ...	18
〈그림 7〉 전화접점 절차 ...	19
〈그림 8〉 가중치 산출 과정 ...	24
〈그림 9〉 평생흡연을 ...	31
〈그림 10〉 현재흡연을 ...	31
〈그림 11〉 남자 현재흡연을 ...	31
〈그림 12〉 궤련형 전자담배 평생흡연을 ...	33
〈그림 13〉 궤련형 전자담배 현재흡연을 ...	33
〈그림 14〉 액상형 전자담배 평생사용률 ...	35
〈그림 15〉 액상형 전자담배 현재사용률 ...	35
〈그림 16〉 현재흡연자의 금연시도율 ...	37
〈그림 17〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 ...	37
〈그림 18〉 월간음주율 ...	39
〈그림 19〉 고위험음주율 ...	39
〈그림 20〉 연간음주자의 고위험음주율 ...	39
〈그림 21〉 월간폭음률 ...	41
〈그림 22〉 격렬한 신체활동 실천율 ...	43
〈그림 23〉 중등도 신체활동 실천율 ...	43
〈그림 24〉 중등도 이상 신체활동 실천율 ...	43
〈그림 25〉 걷기 실천율 ...	45
〈그림 26〉 건강생활실천율 ...	47
〈그림 27〉 비만율(자가보고) ...	49
〈그림 28〉 주관적 비만인지를 ...	49
〈그림 29〉 연간 체중조절 시도율 ...	49
〈그림 30〉 아침식사 빈도 ...	51
〈그림 31〉 아침 식사 실천율 ...	51
〈그림 32〉 영양표시 활용률 ...	51

〈그림 33〉 스트레스 인지율 ...	53
〈그림 34〉 우울감 경험률 ...	53
〈그림 35〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 ...	55
〈그림 36〉 저작불편호소율(≥65) ...	55
〈그림 37〉 어제 점심식사 후 치솔질 실천율 ...	55
〈그림 38〉 주관적 건강인지율 ...	57
〈그림 39〉 운전자석 안전벨트 착용률 ...	59
〈그림 40〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 ...	59
〈그림 41〉 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률 ...	59
〈그림 42〉 혈압수치 인지율 ...	63
〈그림 43〉 고혈압 진단 경험률(≥30) ...	63
〈그림 44〉 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30) ...	63
〈그림 45〉 혈당수치 인지율 ...	65
〈그림 46〉 당뇨병 진단 경험률(≥30) ...	65
〈그림 47〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30) ...	65
〈그림 48〉 연간 당뇨병 조절환 합병증 검사 (안저검사) 수진율(≥30) ...	67
〈그림 49〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사 (미세단백뇨검사) 수진율(≥30) ...	67
〈그림 50〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 ...	69
〈그림 51〉 심근경색증 조기증상 인지율 ...	69
〈그림 52〉 연간 미충족의료율(병의원) ...	71
〈그림 53〉 연간 인플루엔자 예방접종률 ...	71
〈그림 54〉 연간 보건기관 이용률 ...	71
〈그림 55〉 연간 사고 및 중독 경험률 ...	75
〈그림 56〉 연간 사고 및 중독 건수를 ...	75
〈그림 57〉 사도 거주기간 ...	79
〈그림 58〉 시군구 거주기간 ...	79
〈그림 59〉 심폐소생술 인지율 ...	83
〈그림 60〉 심폐소생술 교육경험률 ...	83
〈그림 61〉 감염에 대한 염려 ...	87

〈그림목차〉

〈그림 62〉 감염으로 인한 피해 염려	87
〈그림 63〉 감염으로 인한 경제적 피해 염려	87
〈그림 64〉 코로나19 예방접종 경험을	89
〈그림 65〉 코로나19 확진 경험을	91
〈그림 66〉 코로나19 확진 시기	91
〈그림 67〉 코로나19 확진 시 치료장소	91
〈그림 68〉 코로나19 후유증 경험을	93
〈그림 69-1〉 코로나19 확진 후 4주이상 지속된 후유증 증상별 경험을	93
〈그림 69-2〉 코로나19 확진 후 4주이상 지속된 후유증 증상별 경험을	93
〈그림 70-1〉 코로나19 확진 후 현재까지 지속된 후유증 증상별 경험을	95
〈그림 70-2〉 코로나19 확진 후 현재까지 지속된 후유증 증상별 경험을	95

통계표목차

〈통계표목차〉

〈표 1〉 평생흡연을	100
〈표 2〉 현재흡연을	101
〈표 3〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량	102
〈표 4〉 궤련형 전자담배 평생흡연을	103
〈표 5〉 궤련형 전자담배 현재흡연을	104
〈표 6〉 액상형 전자담배 평생사용률	105
〈표 7〉 액상형 전자담배 현재사용률	106
〈표 8〉 현재흡연자의 금연시도를	107
〈표 9〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률	108
〈표 10〉 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률	109
〈표 11〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률	110
〈표 12〉 평생음주율	111
〈표 13〉 연간음주율	112
〈표 14〉 월간음주율	113
〈표 15〉 고위험음주율	114
〈표 16〉 연간음주자의 고위험음주율	115
〈표 17〉 월간폭음율	116
〈표 18〉 연간 절주 또는 금주시도를	117
〈표 19〉 운전자석 안전벨트 착용률	118
〈표 20〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	119
〈표 21〉 오토바이 헬멧 착용률	120
〈표 22〉 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	121
〈표 23〉 개인형이동장치 헬멧 착용률	122
〈표 24〉 격렬한 신체활동 실천율	123
〈표 25〉 중등도 신체활동 실천율	124
〈표 26〉 중등도 이상 신체활동 실천율	125
〈표 27〉 걷기 실천율	126
〈표 28〉 아침식사빈도 및 아침 식사 실천율	127
〈표 29〉 영양표시 인지도	128
〈표 30〉 영양표시 독해율	129
〈표 31〉 영양표시 활용률	130

〈표 32〉 비만도 분포 및 비만율(자가보고)	131
〈표 33〉 남자 비만도 분포 및 비만율(자가보고)	132
〈표 34〉 여자 비만도 분포 및 비만율(자가보고)	133
〈표 35〉 주관적 비만인지를	134
〈표 36〉 연간 체중조절 시도를	135
〈표 37〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	136
〈표 38〉 저작불편호소율(65세 이상)	137
〈표 39〉 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율	138
〈표 40〉 어제 저녁식사 후 또는 잠자기 전 칫솔질 실천율	139
〈표 41〉 연간 미충족의료율(치과)	140
〈표 42〉 미충족의료 이유(치과)	141
〈표 43〉 하루 평균 수면시간(주중)	142
〈표 44〉 하루 평균 수면시간(주말)	143
〈표 45〉 스트레스 인지를	144
〈표 46〉 우울감 경험률	145
〈표 47〉 스트레스 및 우울증상으로 인한 정신상담률	146
〈표 48〉 우울증상유병률	147
〈표 49〉 자살생각률	148
〈표 50〉 자살생각행동 원인	149
〈표 51〉 자살시도를	150
〈표 52〉 자살생각 및 자살시도로 인한 정신상담률	151
〈표 53〉 인자장애 경험률(50세 이상)	152
〈표 54〉 연간 인플루엔자 예방접종률	153
〈표 55〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지를	154
〈표 56〉 심근경색증 조기증상 인지를	155
〈표 57〉 혈압수치 및 혈당수치 인지를	156
〈표 58〉 고혈압 진단 경험률	157
〈표 59〉 고혈압 최초 진단 시기	158
〈표 60〉 고혈압 현재치료를	159
〈표 61〉 고혈압 진단 경험자의 치료를	160
〈표 62〉 고혈압 관리교육 이수율	161

〈통계표목차〉

〈표 63〉 당뇨병 진단 경험률	162
〈표 64〉 당뇨병 최초 진단 시기	163
〈표 65〉 당뇨병 현재치료를	164
〈표 66〉 당뇨병 진단 경험자의 치료를	165
〈표 67〉 당뇨병 관리교육 이수율	166
〈표 68〉 당화혈색소 인지율	167
〈표 69〉 연간 당화혈색소 검사 횟수	168
〈표 70〉 연간 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 및 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율	169
〈표 71〉 연간 미충족의료율(병의원)	170
〈표 72〉 미충족의료 이유(병의원)	171
〈표 73〉 연간 사고 및 중독 경험률	172
〈표 74〉 연간 사고 및 중독 건수를	173
〈표 75〉 사고 및 중독 원인	174
〈표 76〉 주 치료처별 사고 및 중독 분포	175
〈표 77〉 주관적 건강인지를	176
〈표 78〉 행복감지수	177
〈표 79〉 삶의 질 지수(EQ-5D Index)	178
〈표 80〉 연간 보건기관 이용률	179
〈표 81〉 광역시도 거주기간	180
〈표 82〉 시군구 거주기간	181
〈표 83〉 심폐소생술 인지율	182
〈표 84〉 심폐소생술 교육 경험률 및 심폐소생술 마네킹, 자동제세동기 실습 경험률	183
〈표 85〉 심폐소생술 시행능력률	184
〈표 86〉 코로나19로 인한 심리적 영향	185
〈표 87〉 코로나19 예방접종 경험률	186
〈표 88〉 코로나19 확진 경험률	187
〈표 89〉 코로나19 확진 시기	188
〈표 90〉 코로나19 확진 시 치료 장소	189
〈표 91〉 코로나19 후유증 경험률	190

〈표 92〉 코로나19 4주 이상 증상별 경험률	191
〈표 93〉 코로나19 4주 이상 증상별 경험률(계속)	192
〈표 94〉 코로나19 현재 후유증 증상별 경험률	193
〈표 95〉 코로나19 현재 후유증 증상별 경험률(계속) ..	194
〈표 96〉 코로나19 후유증 증상 치료 장소	195
〈표 97〉 코로나19 후유증 증상으로 인한 일상생활 지장 경험률	196
〈표 98〉 코로나19 확진자의 기저질환 보유율	197
〈표 99〉 코로나19 확진자의 기저질환 종류	198
〈표 100〉 건강생활실천율	199



요약

2022
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY

2022년 울산광역시 울주군 주요 건강지표 요약

울산광역시 울주군의 2018년부터 2022년까지 지역사회건강조사 주요지표와 울산광역시를 비교한 결과는 <표 1>과 같다.

<표 1> 2022년 지역사회건강조사 주요지표 결과

(단위 : %, 조율(표준오차))

영역	산출지표	울산광역시 울주군					울산광역시
		2018	2019	2020	2021	2022	2022
건강행태							
흡연	현재흡연율	18.9(1.3)	20.4(1.4)	20.5(1.4)	20.7(1.5)	21.5(1.3)	19.9(0.6)
	남자 현재흡연율	35.4(2.2)	37.6(2.5)	38.2(2.5)	37.3(2.7)	38.9(2.2)	36.0(1.1)
음주	월간음주율	58.2(2.0)	54.3(2.0)	52.6(1.9)	52.6(1.9)	57.1(2.2)	58.7(0.8)
	고위험음주율	13.4(1.2)	13.2(1.2)	7.9(1.1)	9.8(0.9)	13.6(1.2)	13.3(0.6)
	연간음주자의 고위험음주율	19.1(1.6)	19.0(1.5)	11.1(1.5)	14.6(1.4)	18.6(1.5)	17.5(0.7)
신체활동	중등도 이상 신체활동 실천율 ¹⁾	-	29.9(2.0)	23.8(1.4)	15.5(1.4)	20.7(1.7)	24.7(0.8)
	걷기 실천율	51.1(1.9)	42.6(2.0)	37.0(1.6)	35.0(2.2)	35.8(1.9)	49.0(0.9)
건강생활실천	건강생활실천율 ²⁾	40.2(1.9)	30.8(1.8)	28.1(1.3)	25.5(1.8)	24.2(1.6)	34.8(0.8)
비만 및 체중조절	비만율(자가보고) ³⁾	29.5(1.7)	-	29.0(1.6)	27.7(1.9)	36.6(1.7)	32.6(0.8)
	연간 체중조절 시도율	49.1(2.1)	44.8(1.8)	47.2(2.2)	49.8(2.0)	62.4(2.1)	66.3(0.8)
식생활	아침 식사 실천율 ⁴⁾	-	62.1(1.7)	65.4(2.5)	61.3(2.4)	57.2(2.3)	54.0(1.0)
	영양표시 활용률 ⁵⁾	84.1(2.2)	88.1(2.8)	81.8(2.8)	81.7(3.1)	84.0(2.5)	80.4(1.1)
정신건강	스트레스 인지율	20.1(1.4)	19.1(1.4)	18.6(1.6)	19.0(1.6)	21.2(1.2)	20.5(0.7)
	우울감 경험률	1.1(0.4)	2.3(0.5)	1.4(0.4)	2.4(0.5)	5.8(0.8)	8.1(0.5)
	우울증상유병률 ⁶⁾	1.1(0.3)	1.3(0.4)	1.0(0.3)	1.5(0.4)	1.7(0.4)	4.2(0.4)
구강건강	저작불편호소율(≥65)	33.1(3.3)	30.2(3.2)	29.6(2.8)	28.2(3.4)	32.9(3.0)	31.4(1.6)
	여제 점심식사 후 칫솔질 실천율 ⁷⁾	61.7(2.1)	53.6(2.2)	61.0(2.3)	57.0(2.4)	64.5(1.6)	70.1(0.8)
활동제한 및 삶의 질	주관적 건강인지율	58.1(1.7)	46.5(2.1)	54.2(1.8)	49.4(2.2)	45.4(1.9)	44.4(0.8)
안전의식	운전자석 안전벨트 착용률	95.7(0.9)	94.1(1.3)	98.0(0.6)	96.8(1.1)	93.4(1.2)	91.8(0.6)
	동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	45.7(2.0)	39.1(4.3)	29.7(2.0)	32.6(2.7)	27.5(2.0)	27.4(0.8)
	자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	6.3(1.2)	4.0(1.1)	1.5(0.5)	1.5(0.6)	1.0(0.4)	1.1(0.2)
이환 및 의료이용							
고혈압	혈압수치 인지율 ⁸⁾	25.5(2.0)	34.0(1.9)	31.9(1.8)	34.8(1.7)	52.8(2.2)	60.8(0.9)
	고혈압 진단 경험률(≥30)	21.4(1.6)	21.2(1.9)	20.5(1.5)	22.2(1.5)	24.1(1.8)	23.0(0.8)
	고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)	95.3(1.5)	91.7(2.2)	96.4(1.4)	95.4(1.5)	91.6(2.4)	91.4(1.0)

영역	산출지표	울산광역시 울주군					울산광역시
		2018	2019	2020	2021	2022	2022
당뇨병	혈당수치 인지율 ⁸⁾	11.5(1.3)	9.8(1.0)	11.8(1.0)	12.6(1.4)	12.8(1.1)	24.7(0.8)
	당뇨병 진단 경험률(≥ 30)	10.3(1.2)	9.3(0.9)	10.9(1.1)	9.0(1.0)	10.5(1.0)	10.7(0.5)
	당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥ 30)	90.7(3.7)	91.6(3.1)	100.0(0.0)	95.5(2.3)	95.5(2.1)	94.5(1.0)
	연간 당뇨병 안정한 합병증검사 수진율(≥ 30)	40.5(5.3)	43.4(6.2)	42.3(5.5)	55.3(5.4)	29.6(4.9)	39.4(2.5)
	연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥ 30) ⁹⁾	59.2(4.4)	57.6(6.2)	52.7(6.5)	68.1(4.9)	42.6(5.9)	45.6(2.9)
조기증상 인지	뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 ¹⁰⁾	82.9(1.4)	77.7(1.9)	74.8(1.9)	66.7(1.8)	59.1(1.9)	59.5(0.8)
	심근경색증 조기증상 인지율 ¹⁰⁾	77.6(1.6)	72.7(2.3)	68.0(2.4)	63.0(2.0)	50.9(2.0)	48.6(0.9)
의료이용	연간 미충족의료율(병의원) ¹¹⁾	4.2(0.7)	3.8(0.7)	4.4(0.6)	3.8(0.6)	3.0(0.6)	4.3(0.4)
예방접종	연간 인플루엔자 예방접종률	39.9(2.0)	40.5(1.8)	43.2(2.4)	54.1(2.1)	46.3(2.2)	47.8(0.9)
코로나바이러스감염증-19							
-	코로나19로 인한 심리적 영향_감염에 대한 염려	-	-	68.3(2.0)	65.6(2.6)	34.5(1.8)	37.6(0.9)
	코로나19로 인한 심리적 영향_감염으로 인한 피해 염려	-	-	76.3(1.8)	74.7(2.6)	21.9(1.6)	23.1(0.7)
	코로나19로 인한 심리적 영향_감염으로 인한 경제적 피해 염려	-	-	77.8(2.0)	77.5(2.6)	27.3(1.8)	30.7(0.9)

주 : 1) 중등도 이상 신체활동 실천율 : 2018년 조사 미수행

2) 건강생활실천율 : 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 분율(복합지표)

3) 비만율(자가보고) : 2019년 조사 미수행

4) 아침 식사 실천율 : 2019년 응답보기 변경, 2022년 지표명 변경

5) 영양표시 활용률, 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 : 2014년 신규 도입

6) 우울증상유병률 : 2017년 신규 도입

7) 어제 점심식사 후 치솔질 실천율 : 2014년부터 설문문항 및 응답보기 변경

8) 혈압수치 인지율, 혈당수치 인지율 : 2011년 신규 도입, 2016년부터 매년 조사

9) 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 : 2011년부터 설문문항 및 응답보기 변경

10) 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율, 심근경색증 조기증상 인지율 : 2017년 신규 도입, 2019년 설문문항 변경

11) 연간 미충족의료율 : 2019년부터 설문문항 및 응답보기 변경

2022년 지역사회건강조사 울산광역시 울주군 및 울산광역시, 전국 사분위수의 주요지표를 표준화율로 비교한 결과는 <표 2>와 같다.

<표 2> 2022년 지역사회건강조사 주요지표 결과

(단위 : %, 표준화율)

영역	산출지표	2022년		전국(2022년)*		
		울주군	울산광역시	1사분위	2사분위	3사분위
건강행태						
흡연	현재흡연율	21.3	19.8	17.2	19.3	21.5
	남자 현재흡연율	39.7	36.8	32.2	35.3	39.0
음주	월간음주율	62.0	62.0	54.8	57.7	60.2
	고위험음주율	14.2	13.8	10.6	12.6	14.5
	연간음주자의 고위험음주율	17.6	17.0	14.3	16.5	18.9
신체활동	중등도 이상 신체활동 실천율 ¹⁾	22.4	26.2	20.5	23.5	27.9
	걷기 실천율	36.6	48.5	37.2	47.1	53.4
건강생활실천	건강생활실천율 ²⁾	23.7	33.7	26.2	33.7	39.3
비만 및 체중조절	비만율(자가보고) ³⁾	37.9	33.4	30.6	32.5	35.5
	연간 체중조절 시도율	66.6	68.8	61.7	65.4	69.0
식생활	아침 식사 실천율 ⁴⁾	47.4	46.2	45.2	48.0	51.8
	영양표시 활용률 ⁵⁾	83.1	80.7	80.4	84.6	88.2
정신건강	스트레스 인지율	23.0	21.9	21.5	23.9	25.7
	우울감 경험률	5.7	7.8	5.4	6.8	8.0
	우울증상유병률 ⁶⁾	1.7	4.6	2.5	3.5	4.6
구강건강	저작불편호소율(≥65)	31.4	31.7	26.9	31.5	35.4
	어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 ⁷⁾	65.9	71.0	64.2	68.3	71.9
활동제한 및 삶의 질	주관적 건강인지율	49.8	48.2	46.0	49.7	54.0
안전의식	운전자석 안전벨트 착용률	91.8	90.4	84.0	91.2	95.5
	동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	26.1	25.9	26.1	32.9	38.2
	자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	1.0	1.0	1.0	1.8	3.1
이환 및 의료이용						
고혈압	혈압수치 인지율 ⁸⁾	49.4	56.5	57.7	62.9	68.2
	고혈압 진단 경험률(≥30)	17.3	17.6	18.4	19.8	22.2
	고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)	91.4	90.7	91.4	93.6	95.4
당뇨병	혈당수치 인지율 ⁹⁾	10.3	20.9	23.0	28.4	33.9
	당뇨병 진단 경험률(≥30)	7.5	8.3	8.1	9.1	10.0
	당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30)	92.4	94.3	87.8	91.8	94.7
	연간 당뇨병 안정환 합병증검사 수진율(≥30)	30.9	39.0	31.0	38.5	45.8
	연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30) ⁹⁾	46.3	44.8	35.9	47.8	55.9
조기증상 인지	뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 ¹⁰⁾	57.3	57.4	51.4	57.5	63.0
	심근경색증 조기증상 인지율 ¹⁰⁾	50.0	47.2	41.0	47.1	54.7
의료이용	연간 미충족의료율(병의원) ¹¹⁾	2.9	4.8	3.7	5.3	7.6
예방접종	연간 인플루엔자 예방접종률	41.8	44.3	39.0	42.5	45.4

영역	산출지표	2022년		전국(2022년)*		
		울주군	울산광역시	1사분위	2사분위	3사분위
코로나바이러스감염증-19						
-	코로나19로 인한 심리적 영향·감염에 대한 염려	32.0	35.3	32.9	36.8	40.8
	코로나19로 인한 심리적 영향·감염으로 인한 피해 염려	19.1	20.6	19.6	24.1	30.4
	코로나19로 인한 심리적 영향·감염으로 인한 경제적 피해 염려	25.1	27.8	26.6	31.9	36.3

주: 1) 중등도 이상 신체활동 실천율: 2018년 조사 미수행

2) 건강생활실천율: 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 비율(복합지표)

3) 비만율(자가보고): 2019년 조사 미수행

4) 아침 식사 실천율: 2019년 응답보기 변경, 2022년 지표명 변경

5) 영양표시 활용률, 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률: 2014년 신규 도입

6) 우울증상유병률: 2017년 신규 도입

7) 어제 점심식사 후 치솔질 실천율: 2014년부터 설문문항 및 응답보기 변경

8) 혈압수치 인지율, 혈당수치 인지율: 2011년 신규 도입, 2016년부터 매년 조사

9) 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율: 2011년부터 설문문항 변경

10) 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율, 심근경색증 조기증상 인지율: 2017년 신규 도입, 2019년 설문문항 변경

11) 연간 미충족의료율: 2019년부터 설문문항 및 응답보기 변경

*1사분위수는 최하위 25%, 2사분위수는 중앙값, 3사분위수 최상위 25%

우리 지역사회의 주요 건강이슈

1


2022년 전국 시·군·구별 표준화율과 울주군의 표준화율의 비교

전국 수준에 대비한 울산광역시 울주군의 건강수준을 파악하기 위하여 <표 3>과 같이 요약하였다. 주요지표 결과를 분율(%)이 높을수록 긍정적인 지표와 부정적인 지표로 구분하였으며, 2022년 지역사회건강조사 전국 시·군·구별 표준화율 사분위수와 울산광역시 울주군의 표준화율을 비교하여 제시하였다.

<표 3> 2022년 전국 시군구별 표준화율과 울주군 표준화율의 비교


1. 분율(%)이 높을수록 좋은 지표			
제1사분위수 미만	제1사분위수 이상, 제2사분위수 미만	제2사분위수 이상, 제3사분위수 미만	제3사분위수 이상
• 걷기 실천율 • 건강생활실천율 • 혈압수치인지율 • 혈당수치인지율 • 연간 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)	• 중등도 이상 신체활동 실천율 • 아침식사 실천율 • 영양표시 활용률 • 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 • 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 • 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30) • 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사 수진율(≥30) • 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 • 연간 인플루엔자 예방접종률	• 연간체중조절 시도율 • 주관적 건강 인지율 • 운전자석 안전벨트 착용률 • 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30) • 심근경색 조기증상 인지율	
2. 분율(%)이 낮을수록 좋은 지표			
제1사분위수 미만	제1사분위수 이상, 제2사분위수 미만	제2사분위수 이상, 제3사분위수 미만	제3사분위수 이상
• 우울증상유병률 • 고혈압 진단 경험률(≥30) • 당뇨병 진단 경험률(≥30) • 연간 미충족의료율(병의원)	• 스트레스 인지율 • 우울감 경험률 • 저작불편호소율(≥65) • 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	• 현재흡연율 • 고위험 음주율 • 연간음주자의 고위험음주율	• 남자 현재흡연율 • 월간 음주율 • 비만율(자가보고)

2022년 울주군 지역사회건강조사의 주요지표 결과를 울산광역시와 비교(조율)하였다. <그림 1>과 <그림 2>는 각각 긍정적 지표와 부정적 지표에 대하여 울주군과 울산광역시를 비교한 방사형 그래프이다. 긍정적 지표는 높은 값을 긍정적으로 해석할 수 있는 지표이며, 부정적 지표는 높은 값을 부정적으로 해석할 수 있는 지표이다. 각 지표의 울산광역시를 1로 환산하였을 때 울주군의 상대적인 지표값(비)을 제시하였다.¹⁾



〈그림 1〉 2022년 주요지표 결과 비교 - 긍정적 지표

1) 긍정적 지표는 비의 값이 1.2를 초과하는 경우 '좋음'으로 0.8 미만인 경우 '나쁨'으로 해석하며, 부정적인 지표는 비의 값이 0.8 미만인 경우 '좋음'으로 1.2를 초과하는 경우 '나쁨'으로 해석. 지표값이 매우 작은 경우에는 두 지표의 차이가 과대평가 될 수 있으므로 결과 해석 시 주의 필요




〈그림 2〉 2022년 주요지표 결과 비교 - 부정적 지표

사업의 우선순위를 선정하기 위해 황금다이아몬드법(golden diamond)을 이용하였다. 2022년 울주군의 표준화율과 전국의 사분위수(표준화율)를 비교하여 제1사분위수 미만 혹은 제3사분위수 이상인 지표는 ‘좋은’ 또는 ‘나쁨’, 제1사분위수 이상 이면서 제3사분위수 미만인 지표는 ‘보통’으로 분류하였고, 울주군의 최근 5년간(2018-2022) 변화 추세는 기준연도인 2018년과 2022년 결과(조율)의 95% 신뢰구간을 비교하여 ‘좋아짐’, ‘비슷함’, ‘나빠짐’으로 분류하였다. 분류결과 기준으로 우선순위를 선정하여 제시하였다<그림 3>. 단, 기준연도에 조사되지 않은 지표나 보건학적 의미가 낮은 지표 등은 우선순위 선정에서 제외하였다.²⁾

변화 추세는 다음과 같은 방법을 통해 판단하였다.

1. 울산광역시 5개구 165개 지표의 조율을 단순선행분석을 이용하여 회귀계수 산출
2. 산출된 회귀계수를 각 지표 조율의 평균으로 나눠 일종의 표준화 된 형태의 계수 산출
3. 표준화 된 계수에 대해 절대값을 취한 후 이 값들의 중앙값(median) 산출
4. 각 지표의 표준화 된 계수가 3번에서 구한 중앙값 보다 클 경우 변화 추세가 있는 것으로 판단



〈그림 3〉 황금다이아몬드를 이용한 보건사업 우선순위

2) 기준연도 결과 값이 없는 지표(신규 지표 포함), 복합요인으로 구성된 지표, 연도별 변동의 폭이 커서 신뢰도가 떨어지는 지표 등



01

제1부 조사체계

- I. 조사개요
- II. 통계 추정방법

2022
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY



I . 조사개요

1. 조사목적
2. 조사방법
3. 조사내용
4. 표본설계
5. 조사체계
6. 자료관리
7. 조사현황

I. 조사개요

1

조사목적

지역사회건강조사는 「지역보건법」 제4조(지역사회 건강실태조사) 및 동법시행령 제2조(지역사회 건강 실태조사의 방법 및 내용)에 의거하여 지역보건의료 계획 수립 및 평가를 위한 지역건강통계를 생산하는 것이 목적이다. 또한 이를 바탕으로 근거 중심의 보건 사업 수행의 기반을 마련하고 지역 간 비교 가능하도록 조사지표 및 수행체계를 표준화하여 지방자치단체 보건사업 통합평가지표를 생산하는데 목적을 두고 있다.

2

조사방법

가. 조사대상

조사시점 표본가구에 거주하는 만 19세 이상 가구원 (2003년 7월 31일 이전 출생자)

나. 조사시기

2022년 8월 16일 - 10월 31일

다. 조사방법

훈련된 조사원이 표본가구를 직접 방문하여 일대일 면접 조사를 실시하며, 설문 응답 내용을 조사원이 태블릿 PC에 직접 입력하는 방식으로 진행

3

조사내용

지역사회건강조사에서는 2010년부터 4년을 하나의 조사주기로 설정하고 지표의 중요도와 활용성, 표본의 크기 등을 고려하여 각각의 조사항목을 1년, 2년, 4년 주기로 구분하여 조사한다(1기 순환조사 : 2010-2013년, 2기 순환조사 : 2014-2017년, 3기 순환조사 : 2018-2021년, 4기 순환조사 : 2022-2025년).

〈표 4〉 지역사회건강조사 순환조사체계

주기	지역사회건강조사 제4기(2022-2025년) 순환조사			
	2022	2023	2024	2025
1년	○	○	○	○
2년	●		●	
		■		■
4년	◎			
		◆		
			■	
				●

2022년 지역사회건강조사에서는 총 19개 영역, 138개 문항으로 전국 공통 조사표를 구성하였고, 구성 가구원 대표 1인이 참여하는 가구조사와 만 19세 이상 가구원이 참여하는 개인조사로 구성하였다.

개인조사 영역에는 흡연, 음주, 안전의식, 신체활동, 식생활, 비만 및 체중조절, 구강건강, 정신건강, 예방 접종 및 검진, 이환, 의료이용, 사고 및 중독, 활동 제한 및 삶의 질, 사회 물리적 환경, 심폐소생술, 교육 및 경제활동, 코로나바이러스감염증-19가 포함되었다.

〈표 5〉 2022년 지역사회건강조사 조사항목

영역		조사항목
설문조사	가구조사	세대유형, 기초생활수급 여부, 연간 가구소득, 가구 식품 안정성 확보 여부, 가구소득 변화
	흡연	평생흡연(일반, 궤련형, 액상형), 현재흡연(일반, 궤련형, 액상형), 일반담배(궤련) 매일흡연자 하루 평균 흡연량, 금연 시도·계획, 간접흡연(가정실내, 직장실내)
	음주	평생음주, 연간 음주 경험 및 빈도, 음주량, 10잔 이상 응답자의 음주량, 폭음빈도, 절주 및 금주 시도
	안전의식	안전벨트 착용(자동차), 헬멧 착용(오토바이, 개인형 이동장치), 음주운전 경험(자동차, 오토바이) 등
	신체활동	격렬한 신체활동 실천, 중등도 신체활동 실천, 걷기 실천
	식생활	아침식사 횟수, 영양표시 인지·해독·활용
	비만 및 체중조절	본인 인지 신장 및 체중, 본인 인지 체형, 연간 체중조절 시도
	구강건강	주관적 구강건강, 저작불편 경험, 어제 하루 칫솔질 여부, 미충족의료(치과) 경험·이유
	정신건강	수면시간, 스트레스 및 정신상담, 우울감 및 정신상담, 우울증상유병, 자살생각 경험·원인 및 정신상담, 자살 시도 경험 및 정신상담, 인지장애 경험
	예방접종	인플루엔자 예방접종
	이환	뇌졸중 및 심근경색증 조기증상 인지, 고혈압, 당뇨병 등
	의료이용	미충족의료 경험, 미충족의료 이유
	사고 및 중독	사고중독 경험 및 건수, 사고중독 원인 및 치료 등
	활동제한 및 삶의 질	주관적 건강수준, 행복감지수, EQ-5D
	보건기관 이용	연간 보건기관 이용
	사회 물리적 환경	광역 시·도 및 시·군·구 거주기간
	심폐소생술	심폐소생술 인지, 심폐소생술 교육 경험, 심폐소생술 실습 경험(마네킹, AED), 심폐소생술 시행능력 정도
	교육 및 경제활동	교육수준 및 최종학력, 직업 및 종사상지위, 혼인상태
	코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)	코로나19로 인한 심리적 영향, 코로나19 예방접종 여부, 코로나19 확진 여부 및 시기·치료 장소, 코로나19 확진자 후유증 여부 및 증상·치료 장소, 코로나19 확진자의 후유증으로 인한 일상생활 지장 여부, 코로나19 확진자의 기저질환 여부 및 종류

4

표본설계

가. 모집단

(1) 목표 모집단은 2022년 7월 기준으로 시·군·구에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.

(2) 조사 모집단은 시·군·구의 동·읍·면 내 통·반/리의 표본지점을 1차 추출단위로 하며, 선정된 통·반/리의 표본지점 내 주거용 주택(아파트, 일반주택)에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.

나. 표본추출

(1) 1차 추출(표본지점)

통·반/리 내 주택유형별 가구 수를 기준으로 주민등록 인구자료와 주택자료를 연계하여 작성된 표본추출틀에서 각 동·읍·면 별로 할당된 표본지점을 추출하는데, 이때 통·반/리를 명칭기준으로 정렬한 후 가구 수 크기를 고려하여 추출확률이 비례하도록 추출하였다.

(2) 2차 추출(표본가구)

표본가구는 표본지점으로 선정된 통·반/리의 가구 수를 파악하여 계통추출법으로 선정하였다. 이 때 통·반/리의 규모가 커서 2개 이상의 표본지점이 할당된 경우 표본오차를 최소화하기 위해 표본가구가 가능한 고르게 분포하도록 하였다. 최종적으로 표본지점별로 평균 5개 가구를 표본가구로 선정하였다.

모집단 정의		주민등록기준 만 19세 이상 성인(2003. 7. 31.)	
분석 및 층화		동/읍·면, 주택유형별 층화	
표본배분	표본크기 결정	보건소별 평균 900명, 목표오차 ±3%	
	동/읍·면 할당	동/읍·면 최소 1개 이상 표본지점 할당	
표본추출	표본지점 추출	통·반/리 확률비례계통추출 (1차추출)	
	표본가구 추출	계통추출 (2차추출)	

〈그림 4〉 지역사회건강조사 표본선정과정

〈표 6〉 동/읍·면별 표본지점 분포


동/읍·면	전체 가구 수			표본지점 수		
	일반	아파트	합계	일반	아파트	합계
읍·면지역	37,795	51,619	89,414	42	49	91
두동면	1,893	11	1,904	3	—	3
두서면	1,477	7	1,484	2	—	2
범서읍	3,911	20,440	24,351	4	19	23
삼남읍	3,867	6,121	9,988	4	6	10
삼동면	797	—	797	2	—	2
상북면	2,680	1,037	3,717	3	1	4
서생면	3,393	428	3,821	4	—	4
연양읍	4,022	6,979	11,001	4	7	11
온산읍	6,875	2,471	9,346	7	2	9
온양읍	4,150	7,447	11,597	4	7	11
웅촌면	2,146	1,494	3,640	2	2	4
청량읍	2,584	5,184	7,768	3	5	8
합계	37,795	51,619	89,414	42	49	91

가. 수행체계

질병관리청은 지역사회건강조사 사업계획을 수립하여 시·도에 배포하고, 표본설계, 조사문항 및 지침 표준화, 교육 및 홍보물 개발 등의 사업수행과 관련한 기술지원을 하였다. 사업 관련 주요 현안에 대한 검토 및

심의는 시·도 및 책임대학교 위원회, 전문분과위원회로 구성된 운영위원회를 통해 이루어졌다.

시·도는 권역대표대학교를 지정하여 지역사회건강조사 수행을 위한 지역 거점센터를 운영하고, 중앙정부로부터 사업예산을 받아 시·군·구 보건소로 배정하는 역할을 담당하여 수행하였다. 시·군·구 보건소는 책임대학교와 협약을 체결하고, 조사수행 관련한 행정지원을 하였다.




〈그림 5〉 지역사회건강조사 수행체계

나. 수행과정

질병관리청에서 설문지 개발 및 표본추출을 담당하였고, 책임대학교에서 조사원 교육을 실시하였다. 조사원은 가구 선정통지서 발송 1-2주 후 표본가구를 방문하여 조사를

진행한 후 조사자료를 중앙서버로 전송하였다. 이후 질병관리청의 조사자료 확인 및 책임대학교의 자료분석 절차를 거쳐 통계집을 발간하였다.




〈그림 6〉 지역사회건강조사 수행과정

가. 콜센터 운영

2022년 지역사회건강조사에서는 조사원에게 표준화된 조사수행 및 조사문항지침을 전달하고자 책임대학교 단위의 콜센터를 운영하였다. 콜센터에서는 표본가구 및 가구원 선정, 가구대체, 조사문항, 조사장비 관련 질의사항을 처리하고, 담당자는 질의사항에 대한 조치 내역을 질병보건통합관리시스템에 매일 등록하였다.

나. 자료검증

2022년 지역사회건강조사에서는 조사완료자 중 13%를 무작위로 추출하여 제3기관을 통해 전화점검을 실시하였다. 전화점검은 조사완료 후 평균 2일 이내 실시하였으며, 책임대학교에서 전화점검 결과에 대해 확인 후 최종적으로 조사자료의 사용여부를 결정하였다.



〈그림 7〉 전화점검 절차

가. 조사현황

조사현황은 <표 7>과 같다. 총 조사가구 수는 가구 499였고, 조사완료자 수는 910명이었다. 가구당 평균 1.8명이 조사되었다.

〈표 7〉 조사현황

	조사가구 수			조사완료자 수(명)		
	일반	아파트	합계	일반	아파트	합계
읍·면지역	226	273	499	382	528	910
두동면	15	-	15	27	-	27
두서면	10	-	10	14	-	14
범서읍	20	110	130	28	215	243
삼남읍	20	30	50	31	49	80
삼동면	10	-	10	19	-	19
상북면	21	5	26	37	9	46
서생면	22	-	22	35	-	35
언양읍	24	40	64	43	78	121
온산읍	37	12	49	61	24	85
온양읍	22	39	61	40	77	117
웅촌면	10	10	20	21	19	40
청량읍	15	27	42	26	57	83
합계	226	273	499	382	528	910

〈표 8〉 가구당 조사인원 수

	일반	아파트	계
읍·면지역	1.7	1.9	1.8
계	1.7	1.9	1.8

나. 조사가구 및 인구 특성

2022년 지역사회건강조사 대상자의 가구원수는 2명인 경우가 34.1%로 가장 많았고, 평균은 2.4명이었다. 조사자의 월 가구소득은 400만원 이상이 45.9%로 가장 많았고, 다음이 300~400만원 미만 17.2%의 순이었다.

성별분포는 남자가 48.9%, 여자가 51.1%이었다. 연령은 60대가 21.9%로 가장 높았고, 다음이 50대 21.0%의 순이었다. 대상자의 평균연령은 52.6세였다. 결혼 상태는 배우자가 있는 경우가 67.3%이고, 교육 수준은 고등학교 졸업이 41.1%로 가장 많았고, 다음이 대학교 이상 36.8% 순이었다.

〈표 9〉 2022년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성

(단위 : 명, %)

조사대상 가구특성(N=499)		
	N	(%)
가구원 수		
1명	137	27.5
2명	170	34.1
3명	92	18.4
4명	76	15.2
5명	22	4.4
6명	.	.
7명 이상	2	0.4
평균(명)	2.4	.
세대유형		
1세대	287	57.5
2세대	199	39.9
3세대	13	2.6
기초생활수급자 여부		
현재 수급자	10	2.0
과거 수급자	.	.
미수급자	489	98.0
월 가구소득		
100만원 미만	64	12.8
100~200만원 미만	54	10.8
200~300만원 미만	66	13.2
300~400만원 미만	86	17.2
400만원 이상	229	45.9
거주유형		
읍·면	499	100.0

요약

제1부

조사체계

제2부

주요통계결과

제3부

통계표

제4부

부록

〈표 10〉 2022년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성

(단위 : 명, %)

조사대상 인구특성(N=910)		
	N	(%)
성별		
남자	445	48.9
여자	465	51.1
연령(10세 간격)		
19-29세	88	9.7
30-39세	119	13.1
40-49세	177	19.5
50-59세	191	21.0
60-69세	199	21.9
70세 이상	136	14.9
평균(세)	52.6	.
생애주기별		
19-64세	682	74.9
65세 이상	228	25.1
결혼상태		
미혼	154	16.9
유배우	612	67.3
사별, 이혼, 별거	144	15.8
교육수준 ¹⁾		
무학	48	5.3
초등학교	80	8.8
중학교	73	8.1
고등학교	372	41.1
대학교 이상	333	36.8
직업		
전문행정관리직	119	13.1
사무직	79	8.7
판매·서비스직	108	11.9
농림어업	15	1.7
기능단순노무직	223	24.6
기타 ²⁾	362	40.0

1) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

2) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직



Ⅱ. 통계 추정방법

1. 가중치의 사용
2. 자료처리
3. 분산추정

II. 통계 추정방법

1

가중치의 사용

가. 소개

2022년 지역사회건강조사는 표본설계를 통하여 추출한 표본을 조사하여 설계 구조를 바탕으로 가중치를 부여함으로써 모집단의 건강수준 등을 추정하였다. 가중치는 가구단위 분석을 위한 가구가중치와 개인단위 분석을 위한 개인가중치로 분류하였다.

나. 가중치 산출 과정

가구가중치는 가구추출률과 조사적격 가구율을 반영하였고, 개인가중치는 가구가중치에 개인 응답률을 반영하였다. 추정에 쓰이는 보정가중치는 개인가중치를 성별, 연령별 인구구조(2022년 7월 주민등록인구)와 같도록 보정하여 산출하였다.

설계가중치		벤치마킹 가중치
가구가중치	→	개인가중치 → 보정가중치
· 가구추출률 · 조사적격가구율 · 주택유형별 가구 비율	· 개인 응답률	· 성별·연령별 인구보정 - 성별 : 남, 여 - 연령별 : 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+ - 주민등록인구 기준 (2022. 07)

〈그림 8〉 가중치 산출 과정

(1) 가구가중치

- 표본설계의 표본추출과정을 고려한 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율을 반영한 가중치

$$W_{hi} = \frac{M_{hi}}{n_{hi}} = \frac{e_{hi} \cdot N_{hi}}{n_{hi}}$$

- N_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 가구 수
- M_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 적격가구 수
- n_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사가구 수
- e_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사적격 가구율

〈표 11〉 가구가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 가구 수(③)	(2, 620)
①, ②의 조사된 가구 수(④)	(7)
①, ②의 조사접촉 가구 수(⑤)	(9)
①, ②의 조사적격 가구 수(⑥)	(8)
가구가중치(⑦) = ③ ÷ ④ × ⑥ ÷ ⑤	(332. 698 = 2620/7 × 8/9)
전체 가구가중치 합(⑧)	(8569. 456)
전체 ②의 가구 수 합(⑨)	(10, 356)
가구가중치 보정(⑩) = ⑦ × (⑨/⑧)	(402. 0583 = 332. 698 × 10, 356 / 8569. 456)

(2) 개인가중치

- 가구가중치에 개인 응답률을 반영한 가중치

$$W_{h j k l} = W_{h j k} \times \frac{P_{h j k}}{p_{h j k}}$$

- h : 읍·면/동, j : 표본지점
- k : 가구, l : 가구원
- $P_{h j k}$: 가구내 만 19세 이상 가구원수
- $p_{h j k}$: 가구내 만 19세 이상 조사 가구원수

〈표 12〉 개인가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 가구가중치(③)	(402.0583)
만 19세 이상 가구원수(④)	(4)
만 19세 이상 조사 가구원수(⑤)	(3)
개인가중치(⑥)=③×④/⑤	(536.0777=402.0583×4/3)

(3) 보정가중치

- 2022년 7월 주민등록인구 기준으로 성별, 연령별 인구구조를 보정한 가중치

$$- W'_{hijkl} = BF_d \cdot W_{hijkl}$$

$$- BF_d = \frac{d(\text{성별} \cdot \text{연령대별}) \text{ 주민등록인구수}}{\sum_h \sum_i \sum_{jkl} W_{hijkl} I_{d \in \text{성별} \cdot \text{연령대별}}}$$

〈표 13〉 보정가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 개인가중치(③)	(536.0777)
주민등록인구(④)	(14,693)
성·연령별 개인가중치 합(⑤)	(12,157.23)
성·연령별 보정비(⑥)=④/⑤	(1.208=14,693/12,157.23)
보정가중치(⑦)=③×⑥	(647.89=536.0777×1.208)

(4) 가중치의 이상치 제거

특정 조사대상자의 개인가중치가 다른 조사대상자의 개인가중치보다 월등히 클 경우, 해당 조사대상자의 응답값에 의해 조사결과에 바이어스(bias, 편향성)가 생길 수 있으므로 보정가중치의 이상치를 Raking Ratio 방법으로 제거하여 재보정 하였다.

$Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 보다 큰 가중치는 이상치로 정의하였으며, $Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 로 변경하였다.

$$- IQR: Q_3(W') - Q_1(W')$$

$$- Q_1(W') : \text{가중치 중 1사분위수}$$

$$- Q_3(W') : \text{가중치 중 3사분위수}$$

2

자료처리

가. 무응답처리

무응답은 대체하지 않았으며 지표 산출 시 제외하였다. 무응답은 개체 무응답과 항목 무응답으로 구분하는데 개체 무응답은 조사에 참여하지 않음으로써 모든 문항에 대해 발생한 결측치를 의미하고, 항목 무응답은 조사에 참여한 대상자가 일부항목에 응답하지 않아 발생한 결측치이다.

나. 사회경제적 특성분류

(1) 연령

연령은 2022년 8월 1일 기준으로 만 연령을 정의하였다. 연령분류는 10세 단위로 “19-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60-69세, 70세 이상”으로 분류하였고, 생애주기별 특성을 알아보기 위해 “19-64세, 65세 이상”의 연령구분을 추가하였다.

(2) 교육수준

교육수준은 <교육 및 경제활동> 영역에서 교육정도과 졸업여부 2개 문항으로 조사하였으며 최종 교육수준은 두 문항을 조합하여 “무학, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 이상”으로 구분하였다. 졸업여부가 ‘졸업’인 경우만 해당 교육수준을 의미하며 졸업여부가 ‘수료, 중퇴, 재학/휴학’인 경우에는 이전 단계의 교육수준으로 분류하였다.

〈표 14〉 교육수준분류

교육수준	졸업여부	분류
무학	-	무학
서당/한학	-	
초등학교	졸업	초등학교
중학교	졸업	중학교
고등학교	졸업	고등학교
2년/3년제 대학	졸업	대학교 이상
4년제 대학	졸업	
대학원 이상	전체	

(3) 직업

직업분류는 통계청 한국표준직업분류(KSCO, 제7차 개정)의 대분류 직업군에서 유사한 직업분류를 묶어서 6개 직업군으로 분류하였다.

〈표 15〉 직업분류

제7차 한국표준직업분류	직업분류 재구분
관리자	전문행정관리
전문가 및 관련 종사자	
사무 종사자	사무직
서비스 종사자	판매·서비스직
판매 종사자	
농림어업 숙련 종사자	농림어업
기능원 및 관련 기능 종사자	기능단순노무직
장치·기계 조작 및 조립 종사자	
단순노무 종사자	
군인	기타

(4) 가구소득

소득수준은 월 단위로 “100만원 미만, 100-200만원 미만, 200-300만원 미만, 300-400만원 미만, 400만원 이상”의 5개 그룹으로 분류하였다.

(5) 거주유형

거주유형은 “동”과 “읍·면”으로 구분하였다.

3

분산추정

지역사회건강조사에서는 모집단의 특성을 추정하기 위해 가중치를 적용한 표본가중평균을 제시하였다.

표본조사로 모집단의 특성을 추정할 때 일반적으로 표본오차(sampling error) 및 비표본오차(nonsampling error)가 수반된다. 표본오차는 표본이 모집단의 특성과 어긋나는 정도를 나타내며, 비표본오차는 표본추출 과정을 제외한 자료수집 과정이나 분석 과정에서 발생하는 오류를 말한다. 표준오차(standard error)로 표현되는 표본오차는 추정치의 신뢰도에 대한 척도가 되며 분산추정에 의해 측정할 수 있다. 울산광역시 울주군 지역사회건강조사는 SAS 9.4를 활용하여 분산을 추정하였다.

- 표본가중평균

$$\hat{Y} = \frac{\left(\sum_h \sum_j \sum_k \sum_l W_{h j k l} y_{h j k l} \right)}{W_{....}}$$

- h : 동/읍·면, j : 표본지점
- k : 가구, l : 가구원
- $W_{....} = \sum_{h=1} \sum_{j=1} \sum_{k=1} \sum_{l=1} W_{h j k l}$: 가중치 계
- $y_{h j k l}$: 해당 문항의 응답값

- 표본오차

$$SE(\hat{Y}) = \sqrt{\sum_{h=1} \sum_{j=1} \frac{n_{hj}(1-f_{hj})}{n_{hj}-1} \sum_{k=1}^{n_{hj}} (e_{hjk} - \overline{e_{hj}})^2}$$

$$\text{여기서 } e_{hjk} = \frac{\left(\sum_{l=1} W_{h j k l} (y_{h j k l} - \hat{Y}) \right)}{W_{...}} \text{이고,}$$

$$\overline{e_{hj}} = \left(\sum_{k=1} e_{hjk} \right) / n_{hj} \text{이다.}$$

- 상대표준오차

$$RSE(\hat{Y}) = \frac{SE(\hat{Y})}{\hat{Y}}$$




02

제2부 주요통계결과

- I. 건강행태
- II. 이환 및 의료이용
- III. 사고 및 중독
- IV. 사회 물리적 환경
- V. 심폐소생술
- VI. 코로나바이러스감염증-19

2022
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY



I . 건강행태

1. 흡연
2. 음주
3. 신체활동
4. 건강생활실천
5. 비만 및 체중조절
6. 식생활
7. 정신건강
8. 구강건강
9. 활동제한 및 삶의 질
10. 안전의식


I. 건강행태

1


흡연

가. 일반담배(궐련) 흡연율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 평생흡연율은 전체 43.6%로 울산광역시의 40.4%보다 3.2%p 높았다.
- 성별 : 남자가 77.2%로 여자 7.5%보다 69.7%p 높았다.
- 연령대별 : 60대가 48.4%로 가장 높았고, 50대가 47.0%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 43.6%로 2021년 38.8%에 비해 4.8%p 증가하였으며, 2018년 35.8%에 비해 7.8%p 증가하였다.
- 울산광역시와 비교 : 울주군의 남자 현재흡연율은 전체 38.9%로 울산광역시의 36.0%보다 2.9%p 높았다.
- 연령대별 : 40대가 45.8%로 가장 높았고, 20대가 45.1%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 38.9%로 2021년 37.3%에 비해 1.6%p 증가하였으며, 2018년 35.4%에 비해 3.5%p 증가하였다.
- 울산광역시와 비교 : 울주군의 현재흡연율은 전체 21.5%로 울산광역시의 19.9%보다 1.6%p 높았다.
- 성별 : 남자가 38.9%로 여자 2.9%보다 36.0%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 26.8%로 가장 높았고, 40대가 25.0%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 21.5%로 2021년 20.7%에 비해 0.8%p 증가하였으며, 2018년 18.9%에 비해 2.6%p 증가하였다.



〈그림 9〉 평생흡연율




〈그림 10〉 현재흡연율




〈그림 11〉 남자 현재흡연율

나. 껌련형 전자담배 흡연을

- 껌련형 전자담배 평생흡연율은 전체 6.3%였다.
 - 성별 : 남자가 11.8%로 여자 0.6%보다 11.2%p 높았다.
 - 연령대별 : 20대가 14.8%로 가장 높았고, 30대가 12.8%로 뒤를 이었다.
-
- 껌련형 전자담배 현재흡연율은 전체 2.6%였다.
 - 성별 : 남자가 4.7%로 여자 0.4%보다 4.3%p 높았다.
 - 연령대별 : 30대가 5.8%로 가장 높았고, 20대가 5.2%로 뒤를 이었다.




〈그림 12〉 궐련형 전자담배 평생흡연율




〈그림 13〉 궐련형 전자담배 현재흡연율

다. 액상형 전자담배 사용률

- 액상형 전자담배 평생사용률은 전체 6.0%였다.
 - 성별 : 남자가 10.8%로 여자 0.8%보다 10.0%p 높았다.
 - 연령대별 : 30대가 15.2%로 가장 높았고, 20대가 12.2%로 뒤를 이었다.
-
- 액상형 전자담배 현재사용률은 전체 2.4%였다.
 - 성별 : 남자가 4.5%로 여자 0.2%보다 4.3%p 높았다.
 - 연령대별 : 30대가 7.6%로 가장 높았고, 20대가 4.2%로 뒤를 이었다.



〈그림 14〉 액상형 전자담배 평생사용률




〈그림 15〉 액상형 전자담배 현재사용률

라. 금연시도율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 현재흡연자의 금연 시도율은 전체 63.5%로 울산광역시의 52.5%보다 11.0%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 70.4%로 가장 높았고, 30대가 65.8%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 63.5%로 2021년 27.3%에 비해 36.2%p 증가하였으며, 2018년 37.3%에 비해 26.2%p 증가하였다.

마. 간접흡연 노출률

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률은 전체 9.1%로 울산광역시의 15.4%보다 6.3%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 9.5%로 여자 8.8%보다 0.7%p 높았다.
- 연령대별 : 40대가 14.9%로 가장 높았고, 60대가 11.5%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 9.1%로 2021년 8.8%에 비해 0.3%p 증가하였으며, 2018년 7.5%에 비해 1.6%p 증가하였다.



〈그림 16〉 현재흡연자의 금연시도율




〈그림 17〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률

가. 월간음주율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 월간음주율은 전체 57.1%로 울산광역시의 58.7%보다 1.6%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 70.1%로 여자 43.2%보다 26.9%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 74.6%로 가장 높았고, 30대가 70.6%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 57.1%로 2021년 52.6%에 비해 4.5%p 증가하였으며, 2018년 58.2%에 비해 1.1%p 감소하였다.

나. 고위험음주율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 고위험음주율은 전체 13.6%로 울산광역시의 13.3%보다 0.3%p 높았다.
 - 성별 : 남자가 22.0%로 여자 4.5%보다 17.5%p 높았다.
 - 연령대별 : 40대가 19.5%로 가장 높았고, 30대가 15.8%로 뒤를 이었다.
 - 5년간 비교 : 2022년 13.6%로 2021년 9.8%에 비해 3.8%p 증가하였으며, 2018년 13.4%에 비해 0.2%p 증가하였다.
-
- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간음주자의 고위험음주율은 전체 18.6%로 울산광역시의 17.5%보다 1.1%p 높았다.
 - 성별 : 남자가 26.7%로 여자 7.2%보다 19.5%p 높았다.
 - 연령대별 : 40대가 24.4%로 가장 높았고, 60대가 22.1%로 뒤를 이었다.
 - 5년간 비교 : 2022년 18.6%로 2021년 14.6%에 비해 4.0%p 증가하였으며, 2018년 19.1%에 비해 0.5%p 감소하였다.



〈그림 18〉 월간음주율




〈그림 19〉 고위험음주율



〈그림 20〉 연간음주자의 고위험음주율

다. 월간폭음률


- 월간폭음률은 전체 36.7%였다.
- 성별 : 남자가 50.7%로 여자 21.7%보다 29.0%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 55.4%로 가장 높았고, 30대가 46.6%로 뒤를 이었다.




〈그림 21〉 월간폭음률

가. 신체활동 실천율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 격렬한 신체활동 실천율은 전체 15.7%로 울산광역시의 18.1%보다 2.4%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 20.3%로 여자 10.8%보다 9.5%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 29.6%로 가장 높았고, 30대가 17.3%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 15.7%로 2021년 5.2%에 비해 10.5%p 증가하였으며, 2019년 16.7%에 비해 1.0%p 감소하였다.
- 울산광역시와 비교 : 울주군의 중등도 이상 신체활동 실천율은 전체 20.7%로 울산광역시의 24.7%보다 4.0%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 27.0%로 여자 14.0%보다 13.0%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 35.0%로 가장 높았고, 30대가 23.0%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 20.7%로 2021년 15.5%에 비해 5.2%p 증가하였으며, 2019년 29.9%에 비해 9.2%p 감소하였다.
- 울산광역시와 비교 : 울주군의 중등도 신체활동 실천율은 전체 7.0%로 울산광역시의 11.2%보다 4.2%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 9.4%로 여자 4.4%보다 5.0%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 8.6%로 가장 높았고, 40대가 7.8%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 7.0%로 2021년 11.3%에 비해 4.3%p 감소하였으며, 2019년 18.8%에 비해 11.8%p 감소하였다.



〈그림 22〉 격렬한 신체활동 실천율




〈그림 23〉 중등도 신체활동 실천율



〈그림 24〉 중등도 이상 신체활동 실천율

나. 걷기 실천율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 걷기 실천율은 전체 35.8%로 울산광역시의 49.0%보다 13.2%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 39.4%로 여자 32.1%보다 7.3%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 42.2%로 가장 높았고, 40대가 38.3%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 35.8%로 2021년 35.0%에 비해 0.8%p 증가하였으며, 2018년 51.1%에 비해 15.3%p 감소하였다.



〈그림 25〉 겉기 실천율

가. 건강생활실천율

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 건강생활실천율은 전체 24.2%로 울산광역시의 34.8%보다 10.6%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 18.7%로 여자 30.2%보다 11.5%p 낮았다.
- 연령대별 : 60대와 70대 이상이 28.0%로 가장 높았고, 40대가 24.1%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 24.2%로 2021년 25.5%에 비해 1.3%p 감소하였으며, 2018년 40.2%에 비해 16.0%p 감소하였다.



〈그림 26〉 건강생활실천율

가. 비만을(자가보고)


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 비만을(자가보고)은 전체 36.6%로 울산광역시의 32.6%보다 4.0%p 높았다.
- 성별 : 남자가 47.6%로 여자 24.7%보다 22.9%p 높았다.
- 연령대별 : 30대가 47.3%로 가장 높았고, 40대가 39.2%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 36.6%로 2021년 27.7%에 비해 8.9%p 증가하였으며, 2018년 29.5%에 비해 7.1%p 증가하였다.

다. 연간 체중조절 시도율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간 체중조절 시도율은 전체 62.4%로 울산광역시의 66.3%보다 3.9%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 57.1%로 여자 68.0%보다 10.9%p 낮았다.
- 연령대별 : 30대가 73.5%로 가장 높았고, 40대가 71.9%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 62.4%로 2021년 49.8%에 비해 12.6%p 증가하였으며, 2018년 49.1%에 비해 13.3%p 증가하였다.

나. 주관적 비만인지율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 주관적 비만인지율은 전체 47.6%로 울산광역시의 43.5%보다 4.1%p 높았다.
- 성별 : 남자가 46.8%로 여자 48.5%보다 1.7%p 낮았다.
- 연령대별 : 40대가 56.3%로 가장 높았고, 30대가 55.3%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 47.6%로 2021년 33.7%에 비해 13.9%p 증가하였으며, 2018년 33.2%에 비해 14.4%p 증가하였다.



〈그림 27〉 비만율(자가보고)



〈그림 28〉 주관적 비만인지를



〈그림 29〉 연간 체중조절 시도율

가. 아침식사 빈도


- 아침식사 빈도는 주 5-7회가 57.2%로 가장 높았고, 거의 안한다(0일)가 24.0%로 뒤를 이었다.

나. 아침 식사 실천율


- 아침 식사 실천율은 전체 57.2%였다.
- 성별 : 남자가 56.5%로 여자 58.0%보다 1.5%p 낮았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 89.6%로 가장 높았고, 60대가 83.4%로 뒤를 이었다.

다. 영양표시 활용률


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 영양표시 활용률은 전체 84.0%로 울산광역시의 80.4%보다 3.6%p 높았다.
- 성별 : 남자가 82.4%로 여자 85.1%보다 2.7%p 낮았다.
- 연령대별 : 20대가 91.7%로 가장 높았고, 60대가 85.5%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 84.0%로 2021년 81.7%에 비해 2.3%p 증가하였으며, 2018년 84.1%에 비해 0.1%p 감소하였다.



〈그림 30〉 아침식사 빈도



〈그림 31〉 아침 식사 실천율




〈그림 32〉 영양표시 활용률

가. 스트레스 인지율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 스트레스 인지율은 전체 21.2%로 울산광역시의 20.5%보다 0.7%p 높았다.
- 성별 : 남자가 21.8%로 여자 20.6%보다 1.2%p 높았다.
- 연령대별 : 30대가 29.5%로 가장 높았고, 20대가 24.2%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 21.2%로 2021년 19.0%에 비해 2.2%p 증가하였으며, 2018년 20.1%에 비해 1.1%p 증가하였다.

나. 우울감 경험률

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 우울감 경험률은 전체 5.8%로 울산광역시의 8.1%보다 2.3%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 4.8%로 여자 7.0%보다 2.2%p 낮았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 10.7%로 가장 높았고, 30대가 7.3%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 5.8%로 2021년 2.4%에 비해 3.4%p 증가하였으며, 2018년 1.1%에 비해 4.7%p 증가하였다.



〈그림 33〉 스트레스 인지율



〈그림 34〉 우울감 경험률

가. 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 전체 30.0%로 울산광역시의 26.3%보다 3.7%p 높았다.
- 성별 : 남자가 31.5%로 여자 28.4%보다 3.1%p 높았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 50.0%로 가장 높았고, 60대가 42.0%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 30.0%로 2021년 18.1%에 비해 11.9%p 증가하였으며, 2018년 25.3%에 비해 4.7%p 증가하였다.

다. 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율은 전체 64.5%로 울산광역시의 70.1%보다 5.6%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 60.3%로 여자 69.1%보다 8.8%p 낮았다.
- 연령대별 : 30대가 70.1%로 가장 높았고, 20대가 67.6%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 64.5%로 2021년 57.0%에 비해 7.5%p 증가하였으며, 2018년 61.7%에 비해 2.8%p 증가하였다.

나. 저작불편호소율(≥65)


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 65세 이상 노인의 저작불편호소율은 전체 32.9%로 울산광역시의 31.4%보다 1.5%p 높았다.
- 성별 : 남자가 32.3%로 여자 33.4%보다 1.1%p 낮았다.
- 5년간 비교 : 2022년 32.9%로 2021년 28.2%에 비해 4.7%p 증가하였으며, 2018년 33.1%에 비해 0.2%p 감소하였다.



〈그림 35〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율




〈그림 36〉 저작불편호소율(≥65)



〈그림 37〉 어제 점심식사 후 첫술질 실천율

가. 주관적 건강인지율

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 주관적 건강인지율은 전체 45.4%로 울산광역시의 44.4%보다 1.0%p 높았다.
- 성별 : 남자가 51.2%로 여자 39.1%보다 12.1%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 70.0%로 가장 높았고, 30대가 52.4%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 45.4%로 2021년 49.4%에 비해 4.0%p 감소하였으며, 2018년 58.1%에 비해 12.7%p 감소하였다.



〈그림 38〉 주관적 건강인지율

가. 운전자석 안전벨트 착용률


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 운전자석 안전벨트 착용률은 전체 93.4%로 울산광역시의 91.8%보다 1.6%p 높았다.
- 성별 : 남자가 92.3%로 여자 95.3%보다 3.0%p 낮았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 98.9%로 가장 높았고, 60대가 97.8%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 93.4%로 2021년 96.8%에 비해 3.4%p 감소하였으며, 2018년 95.7%에 비해 2.3%p 감소하였다.

다. 음주운전 경험률


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률은 전체 1.0%로 울산광역시의 1.1%보다 0.1%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 1.1%로 여자 1.0%보다 0.1%p 높았다.
- 연령대별 : 40대가 2.9%로 가장 높았고, 60대가 1.3%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 1.0%로 2021년 1.5%에 비해 0.5%p 감소하였으며, 2018년 6.3%에 비해 5.3%p 감소하였다.

나. 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률은 전체 27.5%로 울산광역시의 27.4%보다 0.1%p 높았다.
- 성별 : 남자가 26.0%로 여자 29.1%보다 3.1%p 낮았다.
- 연령대별 : 40대가 31.8%로 가장 높았고, 60대가 31.0%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 27.5%로 2021년 32.6%에 비해 5.1%p 감소하였으며, 2018년 45.7%에 비해 18.2%p 감소하였다.



〈그림 39〉운전자석 안전벨트 착용률



〈그림 40〉동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률



〈그림 41〉자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률



Ⅱ. 이환 및 의료이용

1. 주요 질환별 진단 경험률 및 관리행태
2. 의료이용
3. 예방접종
4. 보건기관 이용


Ⅱ. 이환 및 의료이용

1


주요 질환별 진단 경험률 및 관리행태

가. 고혈압


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 혈압수치 인지율은 전체 52.8%로 울산광역시의 60.8%보다 8.0%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 58.5%로 여자 46.6%보다 11.9%p 높았다.
- 연령대별 : 50대가 68.7%로 가장 높았고, 60대가 61.6%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 52.8%로 2021년 34.8%에 비해 18.0%p 증가하였으며, 2018년 25.5%에 비해 27.3%p 증가하였다.
- 울산광역시와 비교 : 울주군의 고혈압 진단 경험률(≥ 30)은 전체 91.6%로 울산광역시의 91.4%보다 0.2%p 높았다.
- 성별 : 남자가 90.2%로 여자 93.2%보다 3.0%p 낮았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 95.3%로 가장 높았고, 50대가 91.0%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 91.6%로 2021년 95.4%에 비해 3.8%p 감소하였으며, 2018년 95.3%에 비해 3.7%p 감소하였다.
- 울산광역시와 비교 : 울주군의 고혈압 진단 경험률(≥ 30)은 전체 24.1%로 울산광역시의 23.0%보다 1.1%p 높았다.
- 성별 : 남자가 25.3%로 여자 23.0%보다 2.3%p 높았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 49.6%로 가장 높았고, 60대가 37.7%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 24.1%로 2021년 22.2%에 비해 1.9%p 증가하였으며, 2018년 21.4%에 비해 2.7%p 증가하였다.



〈그림 42〉 혈압수치 인지율




〈그림 43〉 고혈압 진단 경험률(≥30)




〈그림 44〉 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)

나. 당뇨병


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 혈당수치 인지율은 전체 12.8%로 울산광역시의 24.7%보다 11.9%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 14.1%로 여자 11.6%보다 2.5%p 높았다.
- 연령대별 : 60대가 21.6%로 가장 높았고, 50대가 20.2%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 12.8%로 2021년 12.6%에 비해 0.2%p 증가하였으며, 2018년 11.5%에 비해 1.3%p 증가하였다.
- 울산광역시와 비교 : 울주군의 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥ 30)은 전체 95.5%로 울산광역시의 94.5%보다 1.0%p 높았다.
- 성별 : 남자가 98.4%로 여자 92.7%보다 5.7%p 높았다.
- 연령대별 : 50대가 100.0%로 가장 높았고, 70대 이상이 93.8%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년과 2021년 95.5%로 변화 없었으며, 2018년 90.7%에 비해 4.8%p 증가하였다.
- 울산광역시와 비교 : 울주군의 당뇨병 진단 경험률(≥ 30)은 전체 10.5%로 울산광역시의 10.7%보다 0.2%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 10.1%로 여자 10.8%보다 0.7%p 낮았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 19.0%로 가장 높았고, 60대가 16.4%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 10.5%로 2021년 9.0%에 비해 1.5%p 증가하였으며, 2018년 10.3%에 비해 0.2%p 증가하였다.



〈그림 45〉 혈당수치 인지율




〈그림 46〉 당뇨병 진단 경험률(≥30)




〈그림 47〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30)

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥ 30)은 전체 29.6%로 울산광역시의 39.4%보다 9.8%p 낮았다.
 - 성별 : 남자가 26.8%로 여자 32.3%보다 5.5%p 낮았다.
 - 연령대별 : 60대가 43.2%로 가장 높았고, 50대가 18.2%로 뒤를 이었다.
 - 5년간 비교 : 2022년 29.6%로 2021년 55.3%에 비해 25.7%p 감소하였으며, 2018년 40.5%에 비해 10.9%p 감소하였다.
-
- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간 당뇨병 신장 질환 합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥ 30)은 전체 42.6%로 울산광역시의 45.6%보다 3.0%p 낮았다.
 - 성별 : 남자가 47.9%로 여자 37.6%보다 10.3%p 높았다.
 - 연령대별 : 60대가 55.4%로 가장 높았고, 70대 이상이 33.7%로 뒤를 이었다.
 - 5년간 비교 : 2022년 42.6%로 2021년 68.1%에 비해 25.5%p 감소하였으며, 2018년 59.2%에 비해 16.6%p 감소하였다.




〈그림 48〉 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥30)




〈그림 49〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥30)

다. 조기증상 인지

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 뇌졸중(중풍) 조기 증상 인지율은 전체 59.1%로 울산광역시의 59.2%보다 0.1%p 낮았다.
 - 성별 : 남자가 53.7%로 여자 64.9%보다 11.2%p 낮았다.
 - 연령대별 : 50대가 70.7%로 가장 높았고, 40대가 63.5%로 뒤를 이었다.
 - 5년간 비교 : 2022년 59.1%로 2021년 66.7%에 비해 7.6%p 감소하였으며, 2018년 82.9%에 비해 23.8%p 감소하였다.
-
- 울산광역시와 비교 : 울주군의 심근경색증 조기증상 인지율은 전체 50.9%로 울산광역시의 48.6%보다 2.3%p 높았다.
 - 성별 : 남자가 47.1%로 여자 55.1%보다 8.0%p 낮았다.
 - 연령대별 : 50대가 58.1%로 가장 높았고, 40대가 54.0%로 뒤를 이었다.
 - 5년간 비교 : 2022년 50.9%로 2021년 63.0%에 비해 12.1%p 감소하였으며, 2018년 77.6%에 비해 26.7%p 감소하였다.



〈그림 50〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율



〈그림 51〉 심근경색증 조기증상 인지율

가. 연간 미충족의료율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간 미충족의료율(병의원)은 전체 3.0%로 울산광역시의 4.3%보다 1.3%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 3.2%로 여자 2.8%보다 0.4%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 3.6%로 가장 높았고, 50대가 3.5%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 3.0%로 2021년 3.8%에 비해 0.8%p 감소하였으며, 2018년 4.2%에 비해 1.2%p 감소하였다.

가. 연간 인플루엔자 예방접종률


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간 인플루엔자 예방접종률은 전체 46.3%로 울산광역시의 47.8%보다 1.5%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 43.2%로 여자 49.6%보다 6.4%p 낮았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 91.7%로 가장 높았고, 60대가 55.7%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2022년 46.3%로 2021년 54.1%에 비해 7.8%p 감소하였으며, 2018년 39.9%에 비해 6.4%p 증가하였다.

가. 연간 보건기관 이용률


- 연간 보건기관 이용률은 전체 44.5%였다.
- 성별 : 남자가 41.6%로 여자 47.7%보다 6.1%p 낮았다.
- 연령대별 : 20대가 53.2%로 가장 높았고, 30대가 51.4%로 뒤를 이었다.



〈그림 52〉 연간 미충족의료율(병의원)



〈그림 53〉 연간 인플루엔자 예방접종률



〈그림 54〉 연간 보건기관 이용률



Ⅲ. 사고 및 중독


1. 사고 및 중독

Ⅲ. 사고 및 중독


1

사고 및 중독

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간 사고 및 중독 경험률은 전체 5.0%로 울산광역시의 5.7%보다 0.7%p 낮았다.
 - 성별 : 남자가 5.8%로 여자 4.2%보다 1.6%p 높았다.
 - 연령대별 : 70대 이상이 8.0%로 가장 높았고, 30대가 7.7%로 뒤를 이었다.
 - 5년간 비교 : 2022년 5.0%로 2021년 4.3%에 비해 0.7%p 증가하였으며, 2018년 3.0%에 비해 2.0%p 증가하였다.
-
- 연간 사고 및 중독 건수율은 전체 53.9건이었다.
 - 성별 : 남자가 63.5건으로 여자 43.7건보다 19.8건 많았다.
 - 연령대별 : 30대가 92.7건으로 가장 높았고, 70대 이상이 88.2건으로 뒤를 이었다.



〈그림 55〉 연간 사고 및 중독 경험률



〈그림 56〉 연간 사고 및 중독 건수율

/ IV /

IV. 사회 물리적 환경

1. 광역 시·도 거주기간
2. 시·군·구 거주기간

IV. 사회 물리적 환경

1


광역 시·도 거주기간

- 광역 시·도 거주기간은 20년 이상이 76.0%로 가장 높았고, 10~15년 미만 7.9%, 5년 미만 5.7%, 5~10년 미만 5.4% 순으로 나타났다.


2

시·군·구 거주기간

- 시·군·구 거주기간은 20년 이상이 53.4%로 가장 높았고, 5년 미만 14.8%, 10~15년 미만 12.8%, 5~10년 미만 11.1%, 순으로 나타났다.



〈그림 57〉 시도 거주기간



〈그림 58〉 시·군·구 거주기간



V. 심폐소생술

1. 심폐소생술 인지율
2. 심폐소생술 교육 경험률

V. 심폐소생술

1


심폐소생술 인지율

- 심폐소생술 인지율은 전체 96.4%였다.
- 성별 : 남자가 98.1%로 여자 94.6%에 비해 3.5%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 100.0%로 가장 높았고, 50대가 99.6%로 뒤를 이었다.


2

심폐소생술 교육 경험률

- 심폐소생술 교육경험률은 전체 27.1%였다.
- 성별 : 남자가 35.5%로 여자 18.1%에 비해 17.4%p 높았다.
- 연령대별 : 30대가 37.8%로 가장 높았고, 40대가 29.9%로 뒤를 이었다.



〈그림 59〉 심폐소생술 인지도



〈그림 60〉 심폐소생술 교육경험률



VI. 코로나바이러스감염증-19


1. 코로나19로 인한 심리적 영향
2. 코로나19 예방접종 경험
3. 코로나19 확진

VI. 코로나바이러스감염증-19


1

코로나19로 인한 심리적 영향


- 감염에 대한 염려는 전체 34.5%였다.
- 성별 : 남자가 29.3%로 여자 40.0%보다 10.7%p 낮았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 51.4%로 가장 높았고, 60대가 45.1%로 뒤를 이었다.
- 감염으로 인한 피해 염려는 전체 21.9%였다.
- 성별 : 남자가 19.1%로 여자 25.0%보다 5.9%p 낮았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 36.5%로 가장 높았고, 60대가 33.3%로 뒤를 이었다.
- 감염으로 인한 경제적 피해 염려는 전체 27.3%였다.
- 성별 : 남자가 25.6%로 여자 29.2%보다 3.6%p 낮았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 42.7%로 가장 높았고, 60대가 36.2%로 뒤를 이었다.



〈그림 61〉 감염에 대한 염려




〈그림 62〉 감염으로 인한 피해 염려




〈그림 63〉 감염으로 인한 경제적 피해 염려

- 코로나19 예방접종 경험률은 3차(부스터샷)가 59.5%로 가장 높았고, 2차(얀센 포함) 20.6%, 4차 이상 15.9%, 접종 안함 3.3%, 1차 0.7% 순으로 나타났다.




〈그림 64〉 코로나19 예방접종 경험률


- 코로나19 확진 경험률은 전체 42.8%였다.
- 성별 : 남자가 34.9%로 여자 51.2%보다 16.3%p 낮았다.
- 연령대별 : 20대가 55.4%로 가장 높았고, 30대가 53.8%로 뒤를 이었다.
- 코로나19 확진 시기는 2022년 01월~2022년 03월이 39.3%로 가장 높았고, 2022년 07월~2022년 10월 28.6%, 2022년 04월~2022년 06월 28.1%, 2021년 07월~2021년 12월 1.7%, 2021년 01월~2021년 06월 0.3% 순으로 나타났다.
- 코로나19 확진 시 치료장소는 자가(재택)가 99.6%로 가장 높았고, 의료기관 입원치료 0.4%로 뒤를 이었다.



〈그림 65〉 코로나19 확진 경험률




〈그림 66〉 코로나19 확진 시기




〈그림 67〉 코로나19 확진 시 치료장소


- 코로나19 후유증 경험률은 전체 21.7%였다.
- 성별 : 남자가 11.7%로 여자 28.9%보다 17.2%p 낮았다.
- 연령대별 : 40대가 30.0%로 가장 높았고, 20대가 28.8%로 뒤를 이었다.
- 코로나19 확진 후 4주이상 지속된 후유증 증상별 경험률은 기침, 가래가 54.7%로 가장 높았고, 피로감 25.5%, 미각상실 18.1%, 후각상실 14%, 월경(생리)불순 12.5%, 인후통 11.6%, 호흡곤란 10.3%, 근육통 9.8%, 관절통 8.5%, 가슴 두근거림 6.0%, 탈모 3.9%, 두통 3.1%, 가슴통증 2.8%, 구토, 설사 2.4%, 구강, 안구 건조증 1.1%, 눈충혈과 불안 또는 우울과 인지기능(기억력·집중력) 저하와 수면장애 1.0% 순으로 나타났다.



〈그림 68〉 코로나19 후유증 경험률




〈그림 69-1〉 코로나19 확진 후 4주이상 지속된 후유증 증상별 경험률




〈그림 69-2〉 코로나19 확진 후 4주이상 지속된 후유증 증상별 경험률

- 코로나19 확진 후 현재까지 지속된 후유증 증상별 경험률은 기침, 가래가 17.5%로 가장 높았고, 월경(생리)불순 10.2%, 미각상실 6.7%, 피로감 5.4%, 근육통 5.1%, 탈모 3.9%, 후각상실과 관절통 3.5%, 인후통 3.0%, 호흡곤란 2%, 가슴 통증과 두통과 구강, 안구 건조증 1.1%, 가슴 두근거림과 불안 또는 우울과 인지기능(기억력·집중력) 저하 1.0% 순으로 나타났다.



〈그림 70-1〉 코로나19 확진 후 현재까지 지속된 후유증 증상별 경험률



〈그림 70-2〉 코로나19 확진 후 현재까지 지속된 후유증 증상별 경험률



03

제3부 통계표

I. 통계표

2022
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY



I . 통계표

〈표 1〉 평생흡연율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	43.6(1.6)	3.6	445	77.2(2.0)	2.5	465	7.5(1.4)	19.2
연령									
19-29	88	36.9(4.4)	11.9	52	63.0(6.9)	10.9	36	2.7(2.7)	99.6
30-39	119	38.8(4.3)	11.1	54	60.5(6.3)	10.4	65	13.6(4.5)	33.3
40-49	177	45.9(4.1)	8.9	94	78.1(4.7)	6.0	83	12.0(3.5)	29.1
50-59	191	47.0(3.2)	6.9	86	83.1(4.1)	4.9	105	7.0(2.6)	36.8
60-69	199	48.4(3.1)	6.4	98	90.3(3.6)	4.0	101	5.8(2.3)	39.5
70 이상	136	39.1(3.5)	8.9	61	84.2(4.8)	5.7	75	3.5(2.1)	60.3
19-64	682	43.6(2.0)	4.5	341	75.0(2.3)	3.1	341	7.9(1.6)	20.3
65 이상	228	43.5(3.0)	6.9	104	88.0(3.3)	3.8	124	6.2(2.4)	38.7
교육수준 ²⁾									
무학	48	21.6(4.6)	21.4	8	-(-)	-	40	9.1(4.1)	44.7
초등학교	80	35.5(3.8)	10.8	29	96.4(3.5)	3.6	51	1.6(1.6)	101.2
중학교	73	47.8(5.1)	10.7	39	82.8(5.8)	7.0	34	5.7(3.7)	66.0
고등학교	372	50.6(2.9)	5.7	194	81.6(3.6)	4.4	178	12.4(2.7)	21.9
대학교 이상	333	38.8(2.5)	6.5	173	68.5(3.8)	5.5	160	3.9(1.3)	34.8
직업									
전문행정관리	119	37.3(4.2)	11.3	59	70.6(6.1)	8.7	60	2.5(1.7)	68.6
사무직	79	44.8(5.9)	13.3	45	70.5(7.1)	10.0	34	6.7(4.1)	61.4
판매·서비스직	108	30.2(5.0)	16.4	30	65.0(8.5)	13.1	78	15.6(4.2)	26.9
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	70.4(3.0)	4.3	178	82.1(2.9)	3.6	45	13.9(6.5)	46.8
기타 ³⁾	362	30.9(2.3)	7.4	120	79.7(4.1)	5.2	242	5.3(1.4)	25.6
월 가구소득									
100만원 미만	80	33.3(4.5)	13.4	28	92.0(5.5)	6.0	52	1.7(1.6)	99.1
100-200만원 미만	86	37.3(4.7)	12.6	36	80.3(7.5)	9.4	50	5.0(3.0)	59.8
200-300만원 미만	108	42.0(4.6)	11.0	52	74.5(6.2)	8.3	56	8.0(4.7)	59.2
300-400만원 미만	149	48.6(4.2)	8.6	80	74.7(5.6)	7.5	69	12.6(4.0)	32.0
400만원 이상	487	44.6(2.4)	5.4	249	77.0(2.9)	3.8	238	7.6(1.9)	24.6
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	45.1(2.4)	5.4	137	81.2(3.4)	4.2	149	8.1(2.3)	27.9
변함없다	448	42.0(2.0)	4.8	217	75.9(2.9)	3.8	231	7.0(1.9)	27.0
늘어났다	176	45.1(2.9)	6.4	91	74.6(4.7)	6.3	85	7.9(2.9)	36.3

주 1) 평생흡연율 : (평생 일반담배(궤련)를 5갑(100개비) 이상 피운 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 2〉 현재흡연율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	21.5(1.3)	6.0	445	38.9(2.2)	5.6	465	2.9(0.8)	28.8
연령									
19-29	88	26.8(4.2)	15.5	52	45.1(6.9)	15.3	36	2.7(2.7)	99.6
30-39	119	20.1(3.8)	18.7	54	32.7(6.1)	18.5	65	5.3(2.7)	50.5
40-49	177	25.0(3.1)	12.2	94	45.8(4.9)	10.7	83	3.1(1.8)	58.0
50-59	191	23.2(2.7)	11.6	86	41.9(4.4)	10.5	105	2.6(1.5)	56.9
60-69	199	20.5(3.0)	14.6	98	36.9(4.8)	13.0	101	3.9(1.9)	49.2
70 이상	136	9.0(2.3)	26.0	61	20.4(5.6)	27.3	75	0.0(0.0)	.
19-64	682	23.4(1.6)	6.7	341	41.2(2.6)	6.2	341	3.1(0.9)	29.9
65 이상	228	14.0(2.2)	15.7	104	27.7(4.2)	15.2	124	2.4(1.4)	57.5
교육수준 ²⁾									
무학	48	8.5(4.0)	46.6	8	-(-)	-	40	2.6(2.6)	100.1
초등학교	80	10.5(4.0)	38.4	29	26.5(9.4)	35.2	51	1.6(1.6)	101.2
중학교	73	22.3(5.1)	23.0	39	36.1(7.9)	22.0	34	5.7(3.7)	66.0
고등학교	372	28.5(2.6)	9.2	194	47.1(4.1)	8.6	178	5.6(1.7)	30.5
대학교 이상	333	17.0(2.1)	12.2	173	31.4(3.8)	12.1	160	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	119	11.1(2.8)	25.4	59	21.7(5.4)	24.9	60	0.0(0.0)	.
사무직	79	24.8(5.0)	20.1	45	41.4(7.1)	17.2	34	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	108	13.9(3.7)	26.6	30	26.3(7.5)	28.6	78	8.7(3.2)	36.7
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	40.5(3.6)	8.8	178	47.3(4.0)	8.5	45	7.6(3.5)	46.6
기타 ³⁾	362	13.9(2.0)	14.1	120	37.6(4.8)	12.8	242	1.5(0.7)	46.4
월 가구소득									
100만원 미만	80	15.5(4.7)	30.6	28	44.3(11.3)	25.5	52	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	86	11.5(3.9)	33.8	36	24.8(7.5)	30.1	50	1.6(1.6)	104.3
200-300만원 미만	108	20.8(4.7)	22.6	52	36.2(7.6)	20.9	56	4.6(3.1)	68.2
300-400만원 미만	149	26.1(3.1)	12.0	80	40.6(4.6)	11.3	69	6.3(2.7)	42.5
400만원 이상	487	22.5(1.9)	8.4	249	40.1(3.2)	7.9	238	2.4(0.9)	37.0
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	24.8(2.3)	9.3	137	44.3(3.7)	8.4	149	5.0(1.8)	37.0
변함없다	448	18.6(1.7)	9.1	217	34.8(3.1)	8.9	231	1.9(0.9)	44.9
늘어났다	176	23.6(2.8)	11.8	91	40.6(4.9)	12.0	85	2.1(1.5)	71.5

주 1) 현재흡연율 : (평생 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 3〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량¹⁾

(단위 : %, 개비)

구분	N ²⁾	10개비 미만		10-19개비		20-39개비		40개비 이상		평균	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	개비 (표준오차)	상대 표준오차
전체	166	10.2(2.5)	24.9	58.1(4.5)	7.8	30.1(4.1)	13.6	1.6(0.9)	59.4	14.2(0.5)	3.8
성											
남자	155	8.8(2.5)	28.3	57.8(4.7)	8.1	31.7(4.3)	13.6	1.7(1.0)	59.2	14.6(0.6)	3.8
여자	11	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
연령											
19-29	21	19.8(9.3)	47.1	65.9(11.1)	16.9	14.3(8.0)	55.8	0.0(0.0)	.	11.0(1.0)	8.8
30-39	19	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
40-49	43	4.0(2.8)	69.8	61.8(7.4)	12.0	31.8(6.7)	20.9	2.4(2.4)	100.1	15.3(0.9)	6.2
50-59	37	9.6(4.5)	47.1	62.1(8.1)	13.0	28.3(7.1)	25.1	0.0(0.0)	.	13.7(0.8)	6.1
60-69	37	7.8(4.1)	52.4	38.2(8.6)	22.4	48.4(9.5)	19.5	5.6(3.9)	70.2	17.8(1.5)	8.6
70 이상	9	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
19-64	141	8.4(2.6)	31.0	60.2(4.5)	7.5	29.6(4.0)	13.5	1.8(1.1)	59.7	14.3(0.6)	4.0
65 이상	25	23.6(9.1)	38.5	42.9(10.0)	23.2	33.5(10.4)	31.0	0.0(0.0)	.	13.6(1.4)	10.7
교육수준 ³⁾											
무학	3	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
초등학교	8	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
중학교	12	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
고등학교	90	11.6(3.5)	29.9	55.5(5.8)	10.4	31.9(5.5)	17.2	1.0(1.0)	100.6	14.2(0.7)	4.7
대학교 이상	52	4.1(2.4)	58.1	74.8(6.4)	8.6	19.5(5.7)	28.9	1.6(1.6)	100.0	13.3(0.7)	5.1
직업											
전문행정관리	14	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
사무직	17	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
판매·서비스직	14	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
농림어업	3	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
기능단순노무직	81	3.7(2.2)	59.8	60.3(6.2)	10.3	33.9(6.0)	17.7	2.1(1.5)	72.2	15.4(0.8)	5.1
기타 ⁴⁾	35	23.3(8.3)	35.8	40.7(9.1)	22.2	36.0(10.3)	28.7	0.0(0.0)	.	13.1(1.4)	10.4
월 가구소득											
100만원 미만	7	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
100-200만원 미만	8	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
200-300만원 미만	16	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
300-400만원 미만	34	10.8(5.1)	47.1	62.1(9.7)	15.6	27.2(8.9)	32.7	0.0(0.0)	.	12.7(1.0)	7.5
400만원 이상	101	10.6(3.1)	29.2	60.8(5.0)	8.1	26.9(4.7)	17.6	1.7(1.2)	72.1	14.1(0.7)	4.9
작년 대비 가구소득 변화											
줄어들었다	64	6.4(2.9)	45.4	61.8(7.4)	11.9	29.0(6.0)	20.7	2.8(2.0)	72.6	15.5(1.0)	6.2
변함없다	67	13.6(4.1)	30.1	59.7(5.5)	9.2	25.4(5.1)	20.1	1.3(1.3)	100.9	13.2(0.7)	5.0
늘어났다	35	10.3(4.7)	45.7	48.4(9.5)	19.6	41.3(9.5)	23.0	0.0(0.0)	.	14.2(1.1)	8.0

주 1) 매일흡연자의 하루 평균 흡연량 : 하루 평균 흡연 개비 수의 총 합 / 평생 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 매일흡연자 수

2) 평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일흡연자 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 4〉 궤련형 전자담배 평생흡연율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	6.3(1.0)	16.3	445	11.8(1.8)	15.6	465	0.6(0.3)	54.7
연령									
19-29	88	14.8(3.0)	20.6	52	26.0(5.5)	21.0	36	0.0(0.0)	.
30-39	119	12.8(3.4)	26.5	54	23.8(5.7)	24.1	65	0.0(0.0)	.
40-49	177	8.4(2.2)	25.9	94	14.5(3.6)	24.9	83	1.9(1.3)	70.1
50-59	191	3.9(1.6)	40.9	86	6.7(3.0)	44.8	105	0.9(0.9)	99.7
60-69	199	0.0(0.0)	.	98	0.0(0.0)	.	101	0.0(0.0)	.
70 이상	136	0.0(0.0)	.	61	0.0(0.0)	.	75	0.0(0.0)	.
19-64	682	7.9(1.3)	15.9	341	14.2(2.2)	15.3	341	0.7(0.4)	55.1
65 이상	228	0.0(0.0)	.	104	0.0(0.0)	.	124	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	48	0.0(0.0)	.	8	-(-)	-	40	0.0(0.0)	.
초등학교	80	0.0(0.0)	.	29	0.0(0.0)	.	51	0.0(0.0)	.
중학교	73	3.7(2.5)	66.7	39	6.8(4.5)	65.7	34	0.0(0.0)	.
고등학교	372	7.4(1.6)	21.9	194	12.5(2.6)	20.9	178	1.0(0.7)	65.6
대학교 이상	333	7.6(1.5)	19.1	173	13.7(2.8)	20.1	160	0.4(0.4)	99.5
직업									
전문행정관리	119	6.6(2.3)	35.3	59	12.9(4.3)	33.6	60	0.0(0.0)	.
사무직	79	3.9(2.1)	54.7	45	6.5(3.6)	54.8	34	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	108	6.6(2.8)	42.9	30	16.7(7.0)	41.9	78	2.3(1.5)	66.1
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	12.1(2.8)	23.3	178	14.6(3.3)	22.4	45	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	362	3.2(1.0)	33.2	120	8.6(2.9)	34.0	242	0.3(0.3)	100.3
월 가구소득									
100만원 미만	80	0.0(0.0)	.	28	0.0(0.0)	.	52	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	86	1.9(1.9)	98.6	36	4.4(4.3)	97.6	50	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	108	4.6(2.3)	49.8	52	9.0(4.6)	50.6	56	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	149	7.0(2.4)	34.4	80	11.1(4.1)	36.7	69	1.4(1.4)	98.0
400만원 이상	487	7.9(1.3)	16.7	249	14.3(2.3)	16.0	238	0.7(0.5)	71.6
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	4.5(1.3)	28.3	137	8.4(2.5)	30.1	149	0.6(0.6)	100.2
변함없다	448	6.3(1.4)	21.5	217	12.0(2.5)	20.9	231	0.3(0.3)	100.1
늘어났다	176	9.3(2.2)	24.0	91	15.8(3.6)	22.4	85	1.1(1.1)	100.1

주 1) 궤련형 전자담배 평생흡연율 : (평생 궤련형 전자담배를 흡연한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 5〉 궤련형 전자담배 현재흡연율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	2.6(0.6)	24.1	445	4.7(1.2)	25.0	465	0.4(0.3)	71.1
연령									
19-29	88	5.2(2.0)	39.1	52	9.1(3.7)	40.4	36	0.0(0.0)	.
30-39	119	5.8(2.6)	43.8	54	10.9(4.5)	41.7	65	0.0(0.0)	.
40-49	177	4.5(1.7)	38.2	94	8.0(3.1)	39.5	83	0.9(0.9)	99.9
50-59	191	1.0(0.7)	73.1	86	1.2(1.2)	100.2	105	0.9(0.9)	99.7
60-69	199	0.0(0.0)	.	98	0.0(0.0)	.	101	0.0(0.0)	.
70 이상	136	0.0(0.0)	.	61	0.0(0.0)	.	75	0.0(0.0)	.
19-64	682	3.3(0.8)	23.8	341	5.7(1.4)	24.8	341	0.5(0.3)	71.5
65 이상	228	0.0(0.0)	.	104	0.0(0.0)	.	124	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	48	0.0(0.0)	.	8	-(-)	-	40	0.0(0.0)	.
초등학교	80	0.0(0.0)	.	29	0.0(0.0)	.	51	0.0(0.0)	.
중학교	73	0.0(0.0)	.	39	0.0(0.0)	.	34	0.0(0.0)	.
고등학교	372	2.8(1.0)	34.7	194	4.6(1.6)	35.9	178	0.5(0.5)	101.0
대학교 이상	333	3.7(1.2)	32.3	173	6.5(2.2)	34.0	160	0.4(0.4)	99.5
직업									
전문행정관리	119	4.8(2.5)	52.3	59	9.4(4.7)	50.3	60	0.0(0.0)	.
사무직	79	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.	34	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	108	3.3(1.7)	51.7	30	8.3(4.8)	58.4	78	1.1(1.2)	101.0
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	3.9(1.4)	37.0	178	4.7(1.7)	36.5	45	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	362	1.5(0.7)	47.7	120	3.7(1.9)	52.3	242	0.3(0.3)	100.3
월 가구소득									
100만원 미만	80	0.0(0.0)	.	28	0.0(0.0)	.	52	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	86	0.0(0.0)	.	36	0.0(0.0)	.	50	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	108	0.0(0.0)	.	52	0.0(0.0)	.	56	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	149	4.4(2.3)	51.2	80	6.6(3.8)	57.6	69	1.4(1.4)	98.0
400만원 이상	487	3.4(0.9)	26.3	249	6.0(1.6)	27.0	238	0.3(0.3)	100.0
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	1.2(0.7)	56.5	137	1.8(1.3)	71.2	149	0.6(0.6)	100.2
변함없다	448	2.0(0.8)	37.9	217	3.6(1.4)	38.3	231	0.3(0.3)	100.1
늘어났다	176	6.3(1.9)	30.6	91	11.3(3.4)	29.7	85	0.0(0.0)	.

주 1) 궤련형 전자담배 현재흡연율 : (평생 궤련형 전자담배를 흡연한 적이 있는 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 6〉 액상형 전자담배 평생사용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	6.0(0.8)	13.9	445	10.8(1.4)	13.3	465	0.8(0.4)	45.6
연령									
19-29	88	12.2(3.3)	27.4	52	21.5(5.5)	25.7	36	0.0(0.0)	.
30-39	119	15.2(3.5)	22.7	54	25.6(5.3)	20.8	65	3.1(1.9)	62.4
40-49	177	8.2(2.0)	24.0	94	14.9(3.5)	23.4	83	1.0(1.0)	99.0
50-59	191	1.6(1.2)	74.7	86	2.2(2.2)	100.0	105	0.9(0.9)	100.8
60-69	199	1.5(1.0)	68.5	98	3.0(2.0)	67.5	101	0.0(0.0)	.
70 이상	136	0.0(0.0)	.	61	0.0(0.0)	.	75	0.0(0.0)	.
19-64	682	7.2(1.0)	14.4	341	12.7(1.7)	13.7	341	1.0(0.5)	45.4
65 이상	228	1.0(0.9)	97.3	104	2.1(2.0)	96.4	124	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	48	0.0(0.0)	.	8	-(-)	-	40	0.0(0.0)	.
초등학교	80	0.0(0.0)	.	29	0.0(0.0)	.	51	0.0(0.0)	.
중학교	73	5.1(2.6)	51.1	39	9.3(4.7)	50.2	34	0.0(0.0)	.
고등학교	372	6.7(1.5)	22.1	194	11.3(2.4)	21.1	178	1.0(0.6)	64.8
대학교 이상	333	7.1(1.5)	21.1	173	12.3(2.6)	21.1	160	1.1(0.7)	64.3
직업									
전문행정관리	119	4.8(1.9)	40.0	59	9.4(3.7)	38.7	60	0.0(0.0)	.
사무직	79	9.0(3.5)	38.4	45	15.1(5.6)	37.1	34	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	108	4.3(2.4)	55.4	30	9.1(5.3)	58.2	78	2.3(1.6)	70.6
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	9.2(2.2)	23.5	178	11.1(2.5)	22.3	45	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	362	4.3(1.2)	27.3	120	10.9(3.3)	30.3	242	0.8(0.5)	70.3
월 가구소득									
100만원 미만	80	2.2(2.1)	97.4	28	6.3(6.0)	96.1	52	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	86	1.3(1.3)	100.1	36	3.0(3.0)	99.1	50	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	108	6.7(2.9)	43.1	52	13.0(5.3)	40.5	56	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	149	4.4(2.0)	44.4	80	6.6(2.8)	42.4	69	1.4(1.4)	100.4
400만원 이상	487	7.4(1.4)	18.9	249	12.9(2.3)	17.7	238	1.1(0.6)	55.1
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	4.0(1.2)	30.8	137	7.9(2.4)	30.3	149	0.0(0.0)	.
변함없다	448	6.4(1.3)	19.9	217	11.5(2.3)	20.2	231	1.2(0.6)	55.1
늘어났다	176	7.9(2.2)	27.8	91	13.3(3.5)	26.5	85	1.1(1.1)	100.1

주 1) 액상형 전자담배 평생사용률 : (평생 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 7〉 액상형 전자담배 현재사용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	2.4(0.5)	21.7	445	4.5(1.0)	21.7	465	0.2(0.2)	99.8
연령									
19-29	88	4.2(2.1)	51.2	52	7.4(3.7)	49.8	36	0.0(0.0)	.
30-39	119	7.6(2.8)	36.2	54	12.8(4.5)	35.0	65	1.6(1.6)	100.4
40-49	177	3.5(1.3)	36.3	94	6.7(2.4)	35.8	83	0.0(0.0)	.
50-59	191	0.6(0.6)	100.7	86	1.1(1.1)	100.0	105	0.0(0.0)	.
60-69	199	0.0(0.0)	.	98	0.0(0.0)	.	101	0.0(0.0)	.
70 이상	136	0.0(0.0)	.	61	0.0(0.0)	.	75	0.0(0.0)	.
19-64	682	3.0(0.7)	21.8	341	5.4(1.2)	21.7	341	0.3(0.3)	99.8
65 이상	228	0.0(0.0)	.	104	0.0(0.0)	.	124	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	48	0.0(0.0)	.	8	-(-)	-	40	0.0(0.0)	.
초등학교	80	0.0(0.0)	.	29	0.0(0.0)	.	51	0.0(0.0)	.
중학교	73	1.8(1.8)	101.4	39	3.3(3.4)	100.9	34	0.0(0.0)	.
고등학교	372	2.4(0.9)	39.3	194	4.3(1.7)	39.0	178	0.0(0.0)	.
대학교 이상	333	3.2(1.0)	31.0	173	5.5(1.6)	29.6	160	0.5(0.5)	101.0
직업									
전문행정관리	119	0.9(0.9)	100.0	59	1.7(1.7)	98.2	60	0.0(0.0)	.
사무직	79	4.0(2.2)	55.7	45	6.8(3.6)	54.0	34	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	108	0.8(0.8)	101.2	30	2.8(2.8)	100.9	78	0.0(0.0)	.
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	4.4(1.4)	32.6	178	5.4(1.7)	31.9	45	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	362	1.8(0.8)	45.4	120	4.5(2.3)	51.0	242	0.4(0.4)	99.8
월 가구소득									
100만원 미만	80	2.2(2.1)	97.4	28	6.3(6.0)	96.1	52	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	86	0.0(0.0)	.	36	0.0(0.0)	.	50	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	108	2.4(1.7)	69.9	52	4.8(3.3)	69.2	56	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	149	3.0(1.7)	57.2	80	4.2(2.3)	54.5	69	1.4(1.4)	100.4
400만원 이상	487	2.6(0.8)	29.5	249	4.9(1.4)	29.1	238	0.0(0.0)	.
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	1.8(0.9)	48.9	137	3.6(1.8)	48.6	149	0.0(0.0)	.
변함없다	448	3.1(0.9)	29.1	217	5.6(1.6)	28.9	231	0.4(0.4)	100.9
늘어났다	176	1.7(1.0)	58.3	91	3.0(1.7)	58.2	85	0.0(0.0)	.

주 1) 액상형 전자담배 현재사용률 : (최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 8〉 현재흡연자의 금연시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	206	63.5(3.6)	5.7	189	61.7(3.9)	6.4	17	-(-)	-
연령									
19-29	27	70.4(10.2)	14.4	26	69.1(10.5)	15.2	1	-(-)	-
30-39	30	65.8(8.6)	13.1	25	61.5(9.9)	16.1	5	-(-)	-
40-49	55	59.1(6.7)	11.3	51	58.1(7.2)	12.4	4	-(-)	-
50-59	43	64.1(7.8)	12.2	40	62.2(8.1)	13.0	3	-(-)	-
60-69	39	60.5(8.6)	14.2	35	59.2(8.8)	14.8	4	-(-)	-
70 이상	12	-(-)	-	12	-(-)	-	0	-(-)	-
19-64	176	63.9(4.0)	6.3	162	61.9(4.3)	7.0	14	-(-)	-
65 이상	30	60.3(10.9)	18.2	27	59.9(11.7)	19.6	3	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	4	-(-)	-	3	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	9	-(-)	-	8	-(-)	-	1	-(-)	-
중학교	14	-(-)	-	12	-(-)	-	2	-(-)	-
고등학교	109	67.6(4.8)	7.1	98	65.5(5.1)	7.8	11	-(-)	-
대학교 이상	69	56.0(5.8)	10.4	67	55.0(5.9)	10.8	2	-(-)	-
직업									
전문행정관리	19	-(-)	-	19	-(-)	-	0	-(-)	-
사무직	20	87.3(6.4)	7.3	20	87.3(6.4)	7.3	0	-(-)	-
판매·서비스직	17	-(-)	-	10	-(-)	-	7	-(-)	-
농림어업	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	98	56.6(5.7)	10.0	94	56.2(5.7)	10.2	4	-(-)	-
기타 ³⁾	47	65.8(7.9)	12.0	41	64.0(8.8)	13.7	6	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	11	-(-)	-	11	-(-)	-	0	-(-)	-
100-200만원 미만	9	-(-)	-	8	-(-)	-	1	-(-)	-
200-300만원 미만	21	34.3(11.4)	33.4	19	-(-)	-	2	-(-)	-
300-400만원 미만	43	79.4(5.7)	7.2	37	79.1(6.3)	8.0	6	-(-)	-
400만원 이상	122	62.5(4.9)	7.8	114	60.6(5.2)	8.5	8	-(-)	-
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	69	58.8(6.5)	11.1	61	55.7(7.0)	12.6	8	-(-)	-
변함없다	91	61.1(5.1)	8.4	84	58.7(5.6)	9.6	7	-(-)	-
늘어났다	46	74.8(7.0)	9.4	44	75.7(7.3)	9.6	2	-(-)	-

주 1) 현재흡연자의 금연시도율 : (담배 종류와 상관없이 최근 1년 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 수 / 담배종류와 상관없이 현재흡연자(일반 담배(궐련) 및 궐련형 전자담배 “매일 피움” 또는 “가끔 피움”, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 “예”)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 9〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	206	4.1(1.5)	37.4	189	4.3(1.6)	37.4	17	-(-)	-
연령									
19-29	27	0.0(0.0)	.	26	0.0(0.0)	.	1	-(-)	-
30-39	30	10.1(7.1)	70.2	25	11.4(7.9)	69.4	5	-(-)	-
40-49	55	3.7(2.6)	71.6	51	3.9(2.8)	71.3	4	-(-)	-
50-59	43	7.0(3.9)	56.1	40	7.4(4.1)	56.0	3	-(-)	-
60-69	39	0.0(0.0)	.	35	0.0(0.0)	.	4	-(-)	-
70 이상	12	-(-)	-	12	-(-)	-	0	-(-)	-
19-64	176	4.6(1.7)	37.4	162	4.9(1.8)	37.3	14	-(-)	-
65 이상	30	0.0(0.0)	.	27	0.0(0.0)	.	3	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	4	-(-)	-	3	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	9	-(-)	-	8	-(-)	-	1	-(-)	-
중학교	14	-(-)	-	12	-(-)	-	2	-(-)	-
고등학교	109	3.8(1.9)	49.6	98	4.1(2.0)	49.4	11	-(-)	-
대학교 이상	69	5.9(3.6)	61.2	67	6.0(3.7)	61.2	2	-(-)	-
직업									
전문행정관리	19	-(-)	-	19	-(-)	-	0	-(-)	-
사무직	20	9.3(6.4)	68.9	20	9.3(6.4)	68.9	0	-(-)	-
판매·서비스직	17	-(-)	-	10	-(-)	-	7	-(-)	-
농림어업	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	98	3.4(2.0)	58.4	94	3.5(2.0)	58.4	4	-(-)	-
기타 ³⁾	47	0.0(0.0)	.	41	0.0(0.0)	.	6	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	11	-(-)	-	11	-(-)	-	0	-(-)	-
100-200만원 미만	9	-(-)	-	8	-(-)	-	1	-(-)	-
200-300만원 미만	21	0.0(0.0)	.	19	-(-)	-	2	-(-)	-
300-400만원 미만	43	10.3(5.2)	50.3	37	11.6(5.7)	49.5	6	-(-)	-
400만원 이상	122	3.2(1.5)	48.0	114	3.4(1.6)	47.9	8	-(-)	-
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	69	0.0(0.0)	.	61	0.0(0.0)	.	8	-(-)	-
변함없다	91	4.5(2.4)	53.9	84	4.8(2.6)	53.7	7	-(-)	-
늘어났다	46	8.9(4.3)	48.4	44	9.2(4.5)	48.5	2	-(-)	-

주 1) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률 : (담배 종류와 상관없이 1개월 내 금연계획이 있는 사람의 수 / 담배 종류와 상관없이 현재흡연자(일반담배 및 궤련형 전자담배 “매일 피움” 또는 “가끔 피움”, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 “예”)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 10〉 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	704	2.3(0.8)	37.2	256	1.1(0.7)	69.5	448	3.0(1.0)	33.3
연령									
19-29	61	3.3(3.2)	95.9	26	3.8(3.7)	98.1	35	3.0(2.8)	95.8
30-39	89	1.6(1.5)	97.5	29	4.0(3.7)	93.7	60	0.0(0.0)	.
40-49	122	3.0(1.6)	52.3	43	0.0(0.0)	.	79	4.6(2.4)	52.8
50-59	148	1.7(1.0)	58.9	46	0.0(0.0)	.	102	2.7(1.6)	58.2
60-69	160	2.5(1.1)	45.8	63	0.0(0.0)	.	97	4.2(1.9)	46.1
70 이상	124	1.6(1.1)	71.2	49	0.0(0.0)	.	75	2.6(1.8)	70.0
19-64	506	2.2(0.9)	42.0	179	1.4(0.9)	69.0	327	2.7(1.1)	40.1
65 이상	198	2.7(1.2)	44.0	77	0.0(0.0)	.	121	4.3(1.9)	43.2
교육수준 ²⁾									
무학	44	2.4(2.3)	98.6	5	-(-)	-	39	2.7(2.6)	98.3
초등학교	71	0.0(0.0)	.	21	0.0(0.0)	.	50	0.0(0.0)	.
중학교	59	1.9(1.9)	97.4	27	0.0(0.0)	.	32	3.5(3.3)	94.7
고등학교	263	3.2(1.6)	51.6	96	1.4(1.4)	99.8	167	4.3(1.9)	43.6
대학교 이상	264	1.9(0.9)	47.3	106	1.1(1.1)	98.2	158	2.5(1.3)	52.5
직업									
전문행정관리	100	0.0(0.0)	.	40	0.0(0.0)	.	60	0.0(0.0)	.
사무직	59	5.6(3.8)	68.0	25	0.0(0.0)	.	34	10.1(6.5)	64.6
판매·서비스직	91	1.7(1.2)	69.9	20	0.0(0.0)	.	71	2.3(1.6)	70.2
농림어업	12	-(-)	-	7	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	125	3.0(2.1)	70.8	84	3.1(2.1)	67.7	41	2.6(2.5)	95.9
기타 ³⁾	315	2.4(0.7)	30.6	79	0.0(0.0)	.	236	3.2(1.0)	30.6
월 가구소득									
100만원 미만	69	0.0(0.0)	.	17	-(-)	-	52	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	77	0.0(0.0)	.	28	0.0(0.0)	.	49	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	87	2.9(1.3)	43.2	33	0.0(0.0)	.	54	4.9(2.1)	43.2
300-400만원 미만	106	3.2(2.4)	75.3	43	3.0(3.0)	98.2	63	3.3(2.3)	69.0
400만원 이상	365	2.6(1.2)	47.1	135	1.0(1.0)	99.4	230	3.6(1.5)	41.2
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	217	2.7(1.2)	45.2	76	1.7(1.7)	97.0	141	3.3(1.3)	37.6
변함없다	357	1.2(0.6)	51.9	133	0.0(0.0)	.	224	2.0(1.0)	51.4
늘어났다	130	4.3(3.5)	81.7	47	2.8(2.8)	98.3	83	5.3(4.1)	76.2

주 1) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 : (담배 종류와 상관없이 현재비흡연자(과거흡연자 포함)가 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 11〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	387	9.1(1.4)	15.7	176	9.5(2.3)	24.2	211	8.8(2.1)	23.6
연령									
19-29	38	5.6(4.0)	70.9	16	-(-)	-	22	9.3(6.3)	68.1
30-39	61	8.0(3.8)	47.1	28	0.0(0.0)	.	33	17.2(7.4)	43.2
40-49	85	14.9(3.6)	24.2	41	26.4(6.8)	25.7	44	4.1(2.9)	70.1
50-59	110	7.3(2.9)	39.4	46	9.0(5.1)	56.1	64	5.6(2.8)	51.2
60-69	68	11.5(3.1)	27.3	37	8.0(4.0)	50.2	31	15.6(5.5)	35.1
70 이상	25	4.3(4.3)	100.0	8	-(-)	-	17	-(-)	-
19-64	337	9.5(1.6)	16.6	155	10.4(2.5)	24.4	182	8.7(2.2)	25.7
65 이상	50	5.7(3.3)	58.1	21	0.0(0.0)	.	29	9.6(5.4)	55.9
교육수준 ²⁾									
무학	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	17	-(-)	-	2	-(-)	-	15	-(-)	-
중학교	29	7.7(4.5)	58.4	14	-(-)	-	15	-(-)	-
고등학교	147	11.5(2.7)	23.3	67	14.3(4.7)	33.0	80	9.0(3.2)	35.1
대학교 이상	189	7.5(1.8)	23.5	91	6.8(2.7)	39.2	98	8.3(2.5)	30.0
직업									
전문행정관리	100	9.0(2.6)	29.4	40	12.3(5.3)	43.4	60	6.6(3.0)	45.7
사무직	59	7.5(3.0)	40.2	25	4.5(4.5)	98.9	34	9.9(4.0)	40.4
판매·서비스직	91	7.3(3.0)	40.5	20	0.0(0.0)	.	71	9.6(3.8)	39.8
농림어업	12	-(-)	-	7	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	125	11.2(2.5)	22.2	84	11.6(3.4)	29.0	41	10.2(4.9)	47.7
기타 ³⁾	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	9	-(-)	-	2	-(-)	-	7	-(-)	-
100-200만원 미만	22	4.2(4.0)	96.0	6	-(-)	-	16	-(-)	-
200-300만원 미만	46	9.5(3.7)	39.2	21	7.4(5.2)	70.2	25	11.6(4.9)	42.4
300-400만원 미만	58	7.2(3.1)	43.2	33	7.2(4.1)	56.5	25	7.1(5.0)	70.3
400만원 이상	252	9.8(1.9)	19.5	114	11.1(3.2)	28.5	138	8.7(2.6)	29.6
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	120	9.6(2.6)	27.5	56	14.7(4.8)	32.9	64	4.8(2.4)	50.4
변함없다	178	8.5(2.1)	24.9	82	5.0(2.5)	50.8	96	11.9(3.4)	28.3
늘어났다	89	9.9(3.3)	33.2	38	12.4(5.8)	47.0	51	7.7(3.9)	50.4

주 1) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 : (담배 종류와 상관없이 현재비흡연자(과거흡연자 포함)가 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 12〉 평생음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	85.2(1.5)	1.8	445	91.7(1.3)	1.5	465	78.2(2.3)	2.9
연령									
19-29	88	96.9(1.8)	1.8	52	96.5(2.4)	2.5	36	97.5(2.6)	2.6
30-39	119	95.5(2.1)	2.1	54	94.1(3.1)	3.2	65	97.0(2.1)	2.1
40-49	177	91.7(2.2)	2.4	94	94.1(2.0)	2.1	83	89.2(3.5)	3.9
50-59	191	87.3(2.5)	2.9	86	93.5(2.8)	3.0	105	80.6(3.8)	4.8
60-69	199	75.9(3.1)	4.1	98	88.3(3.2)	3.6	101	63.3(5.4)	8.5
70 이상	136	58.7(4.4)	7.5	61	78.2(5.7)	7.3	75	43.5(5.6)	12.9
19-64	682	90.0(1.3)	1.4	341	94.3(1.4)	1.5	341	85.2(2.1)	2.4
65 이상	228	65.6(3.4)	5.2	104	79.5(4.0)	5.0	124	53.8(4.5)	8.3
교육수준 ²⁾									
무학	48	46.9(6.7)	14.3	8	-(-)	-	40	40.8(6.6)	16.2
초등학교	80	61.4(5.6)	9.2	29	67.5(9.0)	13.3	51	58.1(7.2)	12.5
중학교	73	77.0(4.5)	5.9	39	86.9(5.1)	5.9	34	65.0(9.0)	13.9
고등학교	372	87.0(1.7)	2.0	194	92.2(1.9)	2.1	178	80.5(3.0)	3.8
대학교 이상	333	93.4(1.3)	1.4	173	95.3(1.5)	1.6	160	91.1(2.1)	2.3
직업									
전문행정관리	119	93.6(2.2)	2.3	59	93.9(3.0)	3.2	60	93.3(3.3)	3.5
사무직	79	98.3(1.6)	1.7	45	97.2(2.7)	2.8	34	100.0(0.0)	0.0
판매·서비스직	108	87.0(3.6)	4.1	30	100.0(0.0)	0.0	78	81.6(4.9)	6.1
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	89.9(1.9)	2.2	178	92.6(2.0)	2.2	45	77.3(6.5)	8.5
기타 ³⁾	362	74.8(2.4)	3.2	120	85.4(3.2)	3.7	242	69.2(3.1)	4.5
월 가구소득									
100만원 미만	80	54.2(5.6)	10.3	28	72.8(9.1)	12.5	52	44.1(6.5)	14.8
100-200만원 미만	86	69.3(5.0)	7.3	36	82.0(7.3)	8.9	50	59.7(7.8)	13.0
200-300만원 미만	108	82.1(4.1)	5.0	52	91.8(3.6)	4.0	56	71.9(7.0)	9.7
300-400만원 미만	149	87.9(3.0)	3.4	80	90.8(3.4)	3.7	69	83.8(4.7)	5.6
400만원 이상	487	91.1(1.6)	1.8	249	94.6(1.7)	1.8	238	87.2(2.2)	2.5
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	85.6(3.0)	3.5	137	92.4(2.4)	2.6	149	78.8(4.2)	5.3
변함없다	448	82.8(1.9)	2.3	217	89.0(2.2)	2.4	231	76.3(2.9)	3.8
늘어났다	176	90.7(2.2)	2.4	91	96.9(1.8)	1.8	85	82.8(4.4)	5.3

주 1) 평생음주율 : (지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 13〉 연간음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	72.8(1.9)	2.6	445	82.6(2.0)	2.4	465	62.3(2.8)	4.4
연령									
19-29	88	91.5(2.7)	2.9	52	92.8(3.4)	3.6	36	89.8(4.4)	4.9
30-39	119	88.3(3.0)	3.4	54	92.2(3.6)	3.9	65	83.7(4.5)	5.4
40-49	177	79.6(3.6)	4.5	94	86.5(3.3)	3.9	83	72.4(5.3)	7.3
50-59	191	74.9(3.7)	4.9	86	87.6(3.8)	4.4	105	60.9(5.3)	8.7
60-69	199	57.7(3.4)	5.9	98	71.3(4.2)	6.0	101	43.8(5.0)	11.3
70 이상	136	40.2(3.6)	8.8	61	53.7(6.7)	12.4	75	29.7(5.2)	17.7
19-64	682	79.5(1.9)	2.3	341	88.2(2.0)	2.3	341	69.7(3.0)	4.3
65 이상	228	45.4(3.2)	6.9	104	56.1(4.5)	8.1	124	36.5(4.2)	11.4
교육수준 ²⁾									
무학	48	23.8(5.4)	22.5	8	-(-)	-	40	21.4(5.3)	24.9
초등학교	80	43.7(4.7)	10.6	29	49.2(9.6)	19.6	51	40.7(7.4)	18.1
중학교	73	59.6(6.4)	10.8	39	66.6(7.6)	11.3	34	51.1(10.6)	20.7
고등학교	372	74.4(2.3)	3.1	194	84.8(2.7)	3.2	178	61.6(4.0)	6.6
대학교 이상	333	84.5(1.9)	2.2	173	88.8(2.4)	2.7	160	79.5(3.0)	3.8
직업									
전문행정관리	119	81.3(3.1)	3.8	59	88.3(3.6)	4.1	60	74.0(5.3)	7.1
사무직	79	91.1(4.1)	4.5	45	95.3(4.6)	4.8	34	84.8(5.4)	6.4
판매·서비스직	108	76.1(4.0)	5.3	30	87.9(6.1)	7.0	78	71.1(5.4)	7.6
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	82.1(2.4)	2.9	178	85.2(2.5)	3.0	45	67.0(8.0)	11.9
기타 ³⁾	362	57.5(2.8)	4.9	120	69.3(4.5)	6.4	242	51.3(3.6)	7.1
월 가구소득									
100만원 미만	80	38.2(5.0)	13.1	28	50.0(9.2)	18.4	52	31.9(5.8)	18.2
100-200만원 미만	86	49.9(5.3)	10.5	36	61.0(9.1)	15.0	50	41.6(7.3)	17.5
200-300만원 미만	108	62.7(5.8)	9.2	52	70.3(7.4)	10.5	56	54.9(8.6)	15.6
300-400만원 미만	149	77.6(3.5)	4.6	80	86.8(4.1)	4.7	69	65.0(5.0)	7.7
400만원 이상	487	81.0(2.3)	2.8	249	88.8(2.4)	2.7	238	72.0(3.4)	4.7
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	70.2(3.4)	4.9	137	80.8(3.1)	3.8	149	59.4(5.1)	8.5
변함없다	448	71.1(2.5)	3.6	217	79.5(3.0)	3.8	231	62.4(3.9)	6.3
늘어났다	176	81.1(2.7)	3.4	91	92.1(3.1)	3.3	85	67.2(4.6)	6.8

주 1) 연간음주율 : (최근 1년 동안 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 14〉 월간음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	57.1(2.2)	3.8	445	70.1(2.3)	3.2	465	43.2(2.9)	6.7
연령									
19-29	88	74.6(4.7)	6.3	52	77.1(5.3)	6.9	36	71.4(7.6)	10.7
30-39	119	70.6(4.9)	6.9	54	73.1(6.2)	8.4	65	67.7(6.7)	10.0
40-49	177	64.8(4.2)	6.4	94	75.6(4.2)	5.5	83	53.4(5.9)	11.0
50-59	191	58.8(4.2)	7.1	86	74.5(4.7)	6.2	105	41.5(5.7)	13.7
60-69	199	44.4(3.5)	8.0	98	63.3(4.9)	7.8	101	25.2(5.2)	20.6
70 이상	136	23.9(3.8)	16.1	61	45.7(7.1)	15.6	75	6.7(2.9)	42.6
19-64	682	63.5(2.4)	3.8	341	74.6(2.4)	3.2	341	50.9(3.5)	6.8
65 이상	228	31.0(3.2)	10.4	104	48.5(4.5)	9.3	124	16.4(3.8)	23.5
교육수준 ²⁾									
무학	48	19.3(5.1)	26.4	8	-(-)	-	40	16.0(4.5)	28.2
초등학교	80	23.4(4.5)	19.1	29	45.0(10.4)	23.2	51	11.4(4.9)	42.5
중학교	73	42.9(6.2)	14.5	39	49.7(8.5)	17.1	34	34.7(9.5)	27.3
고등학교	372	61.1(3.0)	4.9	194	74.8(3.1)	4.2	178	44.1(4.3)	9.9
대학교 이상	333	65.9(3.1)	4.7	173	72.7(3.6)	4.9	160	57.8(4.1)	7.2
직업									
전문행정관리	119	66.2(4.6)	6.9	59	76.5(5.2)	6.8	60	55.4(6.1)	10.9
사무직	79	76.0(5.4)	7.1	45	83.2(6.7)	8.0	34	65.3(8.5)	13.0
판매·서비스직	108	61.4(4.9)	7.9	30	77.3(7.6)	9.9	78	54.8(6.0)	11.0
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	66.6(3.1)	4.6	178	73.0(3.1)	4.2	45	36.0(8.5)	23.7
기타 ³⁾	362	41.1(3.0)	7.3	120	54.7(5.1)	9.4	242	34.1(3.4)	10.1
월 가구소득									
100만원 미만	80	28.1(5.1)	18.2	28	43.1(8.9)	20.7	52	20.0(6.4)	32.1
100-200만원 미만	86	29.6(5.1)	17.1	36	45.7(8.7)	19.0	50	17.4(6.2)	35.7
200-300만원 미만	108	51.6(5.6)	10.8	52	64.0(7.5)	11.7	56	38.6(7.7)	19.9
300-400만원 미만	149	56.9(4.5)	7.9	80	64.8(5.9)	9.1	69	45.9(6.0)	13.2
400만원 이상	487	65.7(2.5)	3.8	249	77.8(2.8)	3.5	238	52.0(3.6)	7.0
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	55.3(4.0)	7.3	137	68.9(4.0)	5.8	149	41.5(5.4)	13.0
변함없다	448	53.6(2.8)	5.3	217	67.0(3.3)	5.0	231	39.8(3.5)	8.8
늘어났다	176	68.4(3.0)	4.4	91	78.6(4.2)	5.3	85	55.6(4.8)	8.6

주 1) 월간음주율 : (최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 15〉 고위험음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	13.6(1.2)	8.8	445	22.0(1.8)	8.1	465	4.5(1.2)	27.2
연령									
19-29	88	13.0(3.8)	28.9	52	12.6(4.4)	34.8	36	13.6(6.0)	44.3
30-39	119	15.8(3.4)	21.7	54	20.0(5.4)	27.2	65	10.9(4.1)	38.0
40-49	177	19.5(3.0)	15.2	94	33.3(4.8)	14.5	83	4.9(2.2)	44.5
50-59	191	12.6(2.4)	18.7	86	23.2(4.4)	18.8	105	0.9(0.9)	99.7
60-69	199	12.8(2.4)	18.4	98	24.2(4.1)	17.1	101	1.1(1.1)	98.2
70 이상	136	5.4(1.9)	35.6	61	12.3(4.3)	35.0	75	0.0(0.0)	.
19-64	682	14.9(1.5)	10.3	341	23.2(2.3)	9.8	341	5.5(1.5)	27.7
65 이상	228	8.1(1.7)	21.5	104	16.7(3.6)	21.5	124	1.0(1.0)	100.4
교육수준 ²⁾									
무학	48	2.2(2.2)	98.9	8	-(-)	-	40	0.0(0.0)	.
초등학교	80	4.2(2.3)	56.0	29	11.7(6.3)	54.0	51	0.0(0.0)	.
중학교	73	11.1(4.1)	36.6	39	20.4(7.4)	36.1	34	0.0(0.0)	.
고등학교	372	15.0(1.7)	11.0	194	24.2(2.7)	11.2	178	3.7(1.5)	40.9
대학교 이상	333	15.6(2.2)	13.8	173	21.7(3.4)	15.7	160	8.3(2.5)	30.6
직업									
전문행정관리	119	15.2(3.1)	20.3	59	23.0(5.3)	23.2	60	7.2(3.9)	54.7
사무직	79	14.6(4.1)	28.0	45	20.8(5.9)	28.2	34	5.3(4.9)	93.6
판매·서비스직	108	15.0(3.3)	22.0	30	34.9(7.4)	21.2	78	6.6(3.0)	45.8
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	21.6(2.8)	13.0	178	25.4(3.4)	13.4	45	3.3(2.2)	67.4
기타 ³⁾	362	7.0(1.2)	17.7	120	14.2(2.8)	19.3	242	3.2(1.1)	35.5
월 가구소득									
100만원 미만	80	2.8(2.0)	68.6	28	8.1(5.3)	64.9	52	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	86	8.2(2.8)	34.2	36	16.7(6.3)	37.7	50	1.9(1.8)	97.6
200-300만원 미만	108	10.4(3.0)	28.5	52	14.2(4.3)	30.0	56	6.5(4.3)	67.0
300-400만원 미만	149	13.8(2.9)	20.7	80	19.6(4.3)	22.0	69	5.9(2.6)	43.4
400만원 이상	487	16.2(1.9)	11.5	249	26.1(2.9)	11.2	238	5.0(1.8)	36.4
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	16.0(1.9)	11.8	137	29.5(3.8)	13.0	149	2.2(1.2)	52.7
변함없다	448	11.3(1.7)	15.0	217	17.9(2.5)	13.8	231	4.4(1.8)	41.5
늘어났다	176	15.5(2.7)	17.5	91	20.9(3.8)	18.4	85	8.7(3.5)	40.0

주 1) 고위험음주율 : (최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔)이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 16〉 연간음주자의 고위험음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	631	18.6(1.5)	8.1	356	26.7(2.1)	7.8	275	7.2(1.9)	26.8
연령									
19-29	80	14.2(4.1)	29.1	48	13.5(4.8)	35.3	32	15.1(6.6)	43.3
30-39	104	17.9(3.8)	21.1	50	21.7(5.7)	26.4	54	13.0(4.9)	37.6
40-49	142	24.4(3.5)	14.3	81	38.5(5.3)	13.7	61	6.8(3.0)	44.3
50-59	139	16.8(3.0)	17.7	75	26.5(5.0)	18.9	64	1.4(1.4)	99.4
60-69	114	22.1(3.6)	16.2	70	33.9(5.6)	16.4	44	2.5(2.4)	95.7
70 이상	52	13.4(4.5)	33.6	32	22.9(7.5)	32.6	20	0.0(0.0)	.
19-64	534	18.8(1.8)	9.7	300	26.3(2.5)	9.6	234	7.9(2.2)	27.2
65 이상	97	17.9(3.5)	19.4	56	29.7(5.8)	19.5	41	2.6(2.6)	101.0
교육수준 ²⁾									
무학	10	-(-)	-	3	-(-)	-	7	-(-)	-
초등학교	33	9.6(5.3)	55.3	14	-(-)	-	19	-(-)	-
중학교	41	18.7(6.3)	33.9	24	30.6(10.4)	34.0	17	-(-)	-
고등학교	271	20.1(2.1)	10.6	163	28.5(3.2)	11.2	108	5.9(2.5)	41.7
대학교 이상	275	18.4(2.5)	13.4	151	24.4(3.6)	14.8	124	10.5(3.2)	30.5
직업									
전문행정관리	94	18.8(3.8)	20.1	51	26.1(5.8)	22.3	43	9.7(5.2)	53.6
사무직	71	16.0(4.3)	26.8	43	21.8(6.0)	27.5	28	6.2(5.7)	92.4
판매·서비스직	82	19.7(4.3)	21.9	27	39.7(9.0)	22.6	55	9.3(4.3)	46.0
농림어업	10	-(-)	-	7	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	181	26.3(3.3)	12.4	150	29.8(3.8)	12.9	31	5.0(3.2)	64.3
기타 ³⁾	190	12.2(2.1)	17.5	76	20.6(3.7)	17.8	114	6.2(2.2)	34.8
월 가구소득									
100만원 미만	27	7.4(5.2)	69.6	13	-(-)	-	14	-(-)	-
100-200만원 미만	41	16.5(5.8)	35.0	21	27.4(10.0)	36.4	20	4.5(4.2)	93.5
200-300만원 미만	67	16.6(4.5)	26.9	37	20.2(5.9)	29.0	30	11.8(7.5)	63.8
300-400만원 미만	112	17.8(3.5)	19.8	68	22.5(4.8)	21.2	44	9.1(3.9)	42.8
400만원 이상	384	20.0(2.1)	10.5	217	29.4(3.1)	10.5	167	6.9(2.4)	35.5
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	192	22.8(2.7)	11.9	108	36.6(4.6)	12.6	84	3.7(2.1)	55.3
변함없다	298	15.9(2.2)	13.9	164	22.6(2.9)	13.0	134	7.1(2.8)	39.9
늘어났다	141	19.1(3.1)	16.4	84	22.6(4.1)	18.0	57	13.0(5.2)	40.3

주 1) 연간음주자의 고위험음주율 : (최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔)이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 17〉 월간폭음률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	36.7(2.1)	5.6	445	50.7(2.6)	5.2	465	21.7(2.4)	11.0
연령									
19-29	88	55.4(6.3)	11.3	52	56.4(7.0)	12.5	36	53.9(8.7)	16.1
30-39	119	46.6(4.6)	9.8	54	53.2(6.9)	13.0	65	39.0(6.0)	15.5
40-49	177	38.7(4.1)	10.6	94	57.0(4.9)	8.7	83	19.5(4.5)	23.1
50-59	191	37.1(3.8)	10.4	86	53.4(5.4)	10.1	105	19.1(4.3)	22.5
60-69	199	25.6(3.1)	11.9	98	44.7(4.9)	11.0	101	6.2(2.5)	39.7
70 이상	136	15.1(3.0)	19.7	61	30.5(5.9)	19.5	75	3.0(2.0)	68.0
19-64	682	41.4(2.3)	5.6	341	54.7(2.9)	5.3	341	26.3(2.9)	10.9
65 이상	228	17.5(2.6)	14.6	104	32.0(4.0)	12.6	124	5.4(2.5)	46.3
교육수준 ²⁾									
무학	48	6.0(3.3)	55.9	8	-(-)	-	40	2.7(2.6)	96.0
초등학교	80	15.4(3.6)	23.7	29	33.9(9.8)	28.8	51	5.1(3.5)	69.4
중학교	73	26.2(6.0)	22.9	39	41.4(8.3)	20.0	34	7.8(5.9)	75.8
고등학교	372	41.6(2.9)	7.1	194	56.6(3.8)	6.7	178	23.0(3.4)	14.6
대학교 이상	333	40.8(2.8)	6.8	173	49.1(3.8)	7.8	160	30.9(3.4)	11.0
직업									
전문행정관리	119	41.7(4.1)	9.8	59	55.4(6.2)	11.2	60	27.4(5.5)	19.9
사무직	79	48.1(6.1)	12.6	45	57.3(7.7)	13.4	34	34.4(9.7)	28.1
판매·서비스직	108	41.8(4.2)	10.2	30	59.1(8.0)	13.5	78	34.5(5.3)	15.4
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	48.2(3.4)	7.1	178	55.5(3.5)	6.3	45	13.2(5.3)	40.3
기타 ³⁾	362	22.3(2.5)	11.2	120	35.4(4.9)	13.9	242	15.5(2.6)	16.7
월 가구소득									
100만원 미만	80	13.4(4.3)	31.6	28	28.8(9.2)	32.1	52	5.2(3.5)	67.9
100-200만원 미만	86	15.5(4.7)	30.5	36	28.5(8.2)	28.7	50	5.7(4.1)	71.4
200-300만원 미만	108	32.6(5.4)	16.5	52	46.2(7.7)	16.6	56	18.4(7.1)	38.7
300-400만원 미만	149	36.7(4.0)	10.8	80	48.3(5.5)	11.3	69	20.7(4.8)	23.2
400만원 이상	487	43.3(2.7)	6.3	249	56.6(3.8)	6.7	238	28.2(3.4)	11.9
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	36.7(3.4)	9.1	137	52.8(4.3)	8.2	149	20.4(4.0)	19.6
변함없다	448	34.2(2.7)	8.0	217	48.1(3.6)	7.4	231	19.9(3.1)	15.4
늘어났다	176	42.7(3.9)	9.1	91	53.8(5.4)	10.0	85	28.7(4.7)	16.4

주 1) 월간폭음률 : (최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 월 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 남성의 수 또는 한 번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 월 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 여성의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 18〉 연간 절주 또는 금주시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	631	13.5(1.6)	11.6	356	17.8(2.1)	11.6	275	7.3(1.8)	25.1
연령									
19-29	80	12.2(3.5)	28.5	48	12.1(3.8)	31.6	32	12.3(5.6)	45.8
30-39	104	13.5(4.0)	29.3	50	14.9(5.5)	37.2	54	11.7(5.0)	43.0
40-49	142	17.8(3.1)	17.5	81	23.4(4.3)	18.3	61	10.7(3.8)	35.2
50-59	139	11.7(2.7)	23.3	75	18.1(4.4)	24.4	64	1.4(1.5)	100.5
60-69	114	14.6(3.6)	25.0	70	21.8(5.2)	23.8	44	2.5(2.4)	95.7
70 이상	52	7.9(3.3)	42.2	32	13.5(5.5)	40.5	20	0.0(0.0)	.
19-64	534	14.4(1.7)	12.1	300	18.8(2.3)	12.3	234	8.1(2.1)	25.5
65 이상	97	7.3(2.4)	33.0	56	11.0(3.8)	34.2	41	2.6(2.6)	101.0
교육수준 ²⁾									
무학	10	-(-)	-	3	-(-)	-	7	-(-)	-
초등학교	33	9.1(4.6)	50.4	14	-(-)	-	19	-(-)	-
중학교	41	15.0(7.0)	46.7	24	24.5(10.1)	41.1	17	-(-)	-
고등학교	271	12.8(2.0)	15.9	163	18.0(2.8)	15.5	108	3.9(1.9)	48.9
대학교 이상	275	14.3(2.4)	16.9	151	15.8(3.0)	18.8	124	12.4(3.6)	28.7
직업									
전문행정관리	94	16.9(3.7)	21.8	51	17.3(4.3)	25.1	43	16.4(6.3)	38.4
사무직	71	19.3(5.3)	27.7	43	22.1(7.3)	33.0	28	14.5(6.4)	44.0
판매·서비스직	82	10.1(3.4)	33.5	27	23.9(7.6)	31.8	55	2.9(2.8)	98.0
농림어업	10	-(-)	-	7	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	181	15.0(2.8)	18.5	150	16.9(3.2)	19.1	31	3.0(2.7)	90.4
기타 ³⁾	190	9.7(2.4)	24.8	76	16.3(4.3)	26.3	114	5.0(2.1)	42.4
월 가구소득									
100만원 미만	27	17.5(6.8)	39.0	13	-(-)	-	14	-(-)	-
100-200만원 미만	41	8.3(4.6)	55.7	21	15.8(8.6)	54.6	20	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	67	19.7(4.3)	22.1	37	25.9(6.5)	25.0	30	11.4(6.3)	55.1
300-400만원 미만	112	8.9(2.7)	30.7	68	13.7(4.1)	30.1	44	0.0(0.0)	.
400만원 이상	384	14.0(2.0)	14.6	217	17.3(2.7)	15.6	167	9.2(2.5)	27.4
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	192	14.0(2.6)	18.5	108	20.3(3.3)	16.4	84	5.3(2.5)	47.6
변함없다	298	12.8(1.9)	14.7	164	16.4(2.8)	16.9	134	8.1(2.2)	26.6
늘어났다	141	14.4(4.2)	29.2	84	17.7(4.6)	26.2	57	8.6(5.1)	59.6

주 1) 연간 절주 또는 금주시도율 : (최근 1년 동안 절주나 금주를 시도한 적이 있는 사람의 수 / 최근 1년 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 19〉 운전자석 안전벨트 착용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	654	93.4(1.2)	1.3	382	92.3(1.5)	1.6	272	95.3(1.4)	1.4
연령									
19-29	59	93.0(3.3)	3.6	39	92.0(4.4)	4.8	20	94.9(5.1)	5.3
30-39	99	90.4(3.1)	3.4	49	91.9(3.9)	4.3	50	88.2(4.2)	4.7
40-49	160	91.4(2.1)	2.3	92	86.9(3.4)	3.9	68	97.4(1.9)	1.9
50-59	159	93.3(2.1)	2.3	81	91.6(3.0)	3.2	78	95.7(2.7)	2.8
60-69	135	97.8(1.3)	1.3	86	97.6(1.7)	1.7	49	98.1(1.9)	2.0
70 이상	42	98.9(1.1)	1.1	35	98.7(1.3)	1.4	7	-(-)	-
19-64	556	92.6(1.4)	1.5	309	91.1(1.8)	1.9	247	94.9(1.5)	1.6
65 이상	98	99.5(0.5)	0.5	73	99.4(0.6)	0.6	25	100.0(0.0)	0.0
교육수준 ²⁾									
무학	5	-(-)	-	4	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	18	-(-)	-	15	-(-)	-	3	-(-)	-
중학교	51	89.7(5.2)	5.8	32	89.9(6.1)	6.7	19	-(-)	-
고등학교	282	92.4(1.7)	1.9	168	90.1(2.4)	2.7	114	96.3(1.6)	1.7
대학교 이상	294	94.5(1.2)	1.3	161	94.1(1.7)	1.8	133	95.1(1.8)	1.9
직업									
전문행정관리	108	94.9(2.2)	2.3	58	96.9(2.3)	2.3	50	92.4(3.9)	4.2
사무직	77	97.7(1.7)	1.7	44	98.0(2.0)	2.0	33	97.3(2.8)	2.8
판매·서비스직	85	87.4(3.8)	4.4	27	81.0(7.9)	9.7	58	90.9(3.9)	4.3
농림어업	9	-(-)	-	7	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	188	89.4(2.3)	2.6	168	88.8(2.6)	2.9	20	95.8(4.2)	4.4
기타 ³⁾	184	98.1(1.1)	1.1	76	97.6(1.9)	2.0	108	98.4(1.1)	1.2
월 가구소득									
100만원 미만	22	100.0(0.0)	0.0	17	-(-)	-	5	-(-)	-
100-200만원 미만	43	99.0(1.0)	1.0	24	98.3(1.7)	1.8	19	-(-)	-
200-300만원 미만	65	89.6(4.0)	4.4	39	91.4(4.4)	4.8	26	86.8(7.7)	8.8
300-400만원 미만	117	95.5(1.8)	1.9	70	92.9(2.9)	3.1	47	100.0(0.0)	0.0
400만원 이상	407	92.7(1.7)	1.9	232	91.3(2.2)	2.4	175	94.8(1.8)	1.9
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	207	94.6(1.7)	1.8	120	92.3(2.7)	3.0	87	98.0(1.2)	1.2
변함없다	309	92.9(1.9)	2.0	181	91.3(2.4)	2.7	128	95.4(2.2)	2.3
늘어났다	138	93.0(2.3)	2.5	81	94.3(2.8)	3.0	57	91.0(4.2)	4.6

주 1) 운전자석 안전벨트 착용률 : (자동차 운전 시 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 자동차 운전을 한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 20〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	810	27.5(2.0)	7.1	385	26.0(2.6)	10.0	425	29.1(2.2)	7.7
연령									
19-29	85	24.0(4.6)	19.2	50	26.6(6.2)	23.3	35	20.6(6.3)	30.6
30-39	110	19.4(4.1)	21.4	49	13.7(5.4)	39.5	61	25.8(5.8)	22.5
40-49	158	31.8(4.2)	13.2	80	21.1(4.9)	23.1	78	41.8(5.2)	12.5
50-59	162	27.7(4.0)	14.5	73	26.2(5.3)	20.4	89	29.3(5.9)	20.0
60-69	172	31.0(3.9)	12.6	77	35.3(6.4)	18.1	95	27.2(3.9)	14.4
70 이상	123	29.4(4.8)	16.3	56	35.4(7.0)	19.7	67	24.7(5.5)	22.4
19-64	607	26.8(2.2)	8.2	295	23.6(2.9)	12.2	312	30.2(2.7)	9.1
65 이상	203	30.8(3.5)	11.3	90	37.8(5.5)	14.5	113	25.2(4.3)	17.2
교육수준 ²⁾									
무학	42	14.3(5.7)	40.0	8	-(-)	-	34	12.0(5.7)	47.2
초등학교	75	39.0(7.0)	17.9	26	50.5(11.0)	21.8	49	33.4(6.9)	20.8
중학교	65	26.0(6.0)	22.9	32	22.4(7.5)	33.3	33	29.6(7.1)	23.8
고등학교	327	28.1(3.0)	10.6	165	28.5(3.7)	12.9	162	27.6(4.0)	14.5
대학교 이상	297	26.6(2.7)	10.3	152	21.4(3.6)	17.0	145	32.4(3.4)	10.5
직업									
전문행정관리	102	26.8(4.8)	17.8	46	12.8(4.7)	36.6	56	38.7(6.7)	17.2
사무직	73	16.2(4.0)	24.5	42	11.1(4.5)	40.3	31	23.7(7.6)	32.1
판매·서비스직	94	26.1(5.3)	20.3	26	30.8(9.4)	30.4	68	24.2(6.6)	27.3
농림어업	13	-(-)	-	9	-(-)	-	4	-(-)	-
기능단순노무직	198	27.1(3.9)	14.3	154	26.5(4.1)	15.6	44	29.9(6.3)	21.0
기타 ³⁾	326	31.6(2.7)	8.6	105	36.9(4.9)	13.2	221	29.0(3.0)	10.4
월 가구소득									
100만원 미만	68	32.3(4.9)	15.2	25	37.5(9.2)	24.4	43	29.3(5.8)	19.9
100-200만원 미만	80	38.3(6.0)	15.7	33	48.4(9.3)	19.3	47	30.8(6.4)	20.7
200-300만원 미만	100	20.2(5.1)	25.3	44	17.7(6.1)	34.5	56	22.3(6.9)	30.7
300-400만원 미만	128	26.9(4.3)	16.1	68	19.6(4.7)	24.2	60	36.8(6.8)	18.6
400만원 이상	434	27.1(2.7)	9.9	215	25.9(3.4)	12.9	219	28.5(3.5)	12.1
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	250	31.0(4.0)	13.0	114	32.9(5.9)	17.9	136	29.2(3.9)	13.2
변함없다	400	27.7(2.4)	8.8	191	24.5(3.2)	13.2	209	30.9(3.4)	10.9
늘어났다	160	21.9(4.3)	19.8	80	20.1(5.6)	27.7	80	24.1(5.4)	22.5

주 1) 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 : (다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 동승차량 뒷좌석 탑승자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 21〉 오토바이 헬멧 착용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	34	68.4(5.7)	8.4	30	69.0(6.2)	9.1	4	-(-)	-
연령									
19-29	4	-(-)	-	4	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	7	-(-)	-	7	-(-)	-	0	-(-)	-
50-59	4	-(-)	-	3	-(-)	-	1	-(-)	-
60-69	11	-(-)	-	8	-(-)	-	3	-(-)	-
70 이상	7	-(-)	-	7	-(-)	-	0	-(-)	-
19-64	25	75.1(5.9)	7.9	22	77.4(6.3)	8.2	3	-(-)	-
65 이상	9	-(-)	-	8	-(-)	-	1	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	1	-(-)	-	0	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	6	-(-)	-	6	-(-)	-	0	-(-)	-
중학교	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
고등학교	18	-(-)	-	15	-(-)	-	3	-(-)	-
대학교 이상	6	-(-)	-	6	-(-)	-	0	-(-)	-
직업									
전문행정관리	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
사무직	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
판매·서비스직	4	-(-)	-	4	-(-)	-	0	-(-)	-
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	11	-(-)	-	10	-(-)	-	1	-(-)	-
기타 ³⁾	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
100-200만원 미만	4	-(-)	-	4	-(-)	-	0	-(-)	-
200-300만원 미만	9	-(-)	-	9	-(-)	-	0	-(-)	-
300-400만원 미만	7	-(-)	-	5	-(-)	-	2	-(-)	-
400만원 이상	12	-(-)	-	11	-(-)	-	1	-(-)	-
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	9	-(-)	-	9	-(-)	-	0	-(-)	-
변함없다	16	-(-)	-	13	-(-)	-	3	-(-)	-
늘어났다	9	-(-)	-	8	-(-)	-	1	-(-)	-

주 1) 오토바이 헬멧 착용률 : (오토바이를 탈 때 헬멧을 “항상 착용한다”에 응답한 사람의 수 / 오토바이 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 22〉 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	666	1.0(0.4)	33.6	392	1.1(0.4)	41.9	274	1.0(0.6)	57.6
연령									
19-29	60	0.0(0.0)	.	40	0.0(0.0)	.	20	0.0(0.0)	.
30-39	99	0.0(0.0)	.	49	0.0(0.0)	.	50	0.0(0.0)	.
40-49	161	2.9(1.2)	43.2	93	2.1(1.5)	69.9	68	4.0(2.2)	55.1
50-59	159	0.6(0.6)	100.9	81	1.1(1.1)	100.8	78	0.0(0.0)	.
60-69	140	1.3(0.9)	70.7	89	2.0(1.4)	71.2	51	0.0(0.0)	.
70 이상	47	0.0(0.0)	.	40	0.0(0.0)	.	7	-(-)	-
19-64	562	1.2(0.4)	33.7	314	1.3(0.5)	42.0	248	1.1(0.6)	57.8
65 이상	104	0.0(0.0)	.	78	0.0(0.0)	.	26	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	6	-(-)	-	4	-(-)	-	2	-(-)	-
초등학교	23	0.0(0.0)	.	20	0.0(0.0)	.	3	-(-)	-
중학교	52	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	19	-(-)	-
고등학교	287	1.3(0.6)	45.2	172	1.0(0.6)	58.3	115	1.7(1.2)	71.2
대학교 이상	294	1.1(0.6)	51.1	161	1.4(0.8)	59.3	133	0.7(0.7)	100.5
직업									
전문행정관리	108	2.2(1.2)	56.2	58	1.3(1.3)	99.9	50	3.3(2.2)	67.3
사무직	77	1.2(1.2)	101.1	44	2.0(2.0)	100.6	33	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	87	1.0(1.0)	99.4	29	0.0(0.0)	.	58	1.7(1.7)	101.0
농림어업	9	-(-)	-	7	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	189	0.9(0.7)	72.3	169	1.0(0.7)	72.3	20	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	193	0.4(0.4)	100.1	83	1.0(1.0)	99.6	110	0.0(0.0)	.
월 가구소득									
100만원 미만	23	0.0(0.0)	.	17	-(-)	-	6	-(-)	-
100-200만원 미만	47	0.0(0.0)	.	28	0.0(0.0)	.	19	-(-)	-
200-300만원 미만	69	1.2(1.2)	101.3	43	1.8(1.9)	101.7	26	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	119	1.7(1.2)	70.0	72	1.5(1.4)	98.0	47	2.1(2.1)	99.9
400만원 이상	408	1.0(0.4)	45.1	232	1.0(0.6)	58.1	176	1.0(0.7)	71.6
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	211	1.3(0.8)	58.6	124	1.4(1.0)	71.7	87	1.1(1.1)	100.6
변함없다	316	1.1(0.5)	46.0	186	1.3(0.7)	51.4	130	0.7(0.7)	100.6
늘어났다	139	0.6(0.6)	99.9	82	0.0(0.0)	.	57	1.7(1.7)	99.6

주 1) 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률 : (최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 수 / 자동차 또는 오토바이 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 23〉 개인형이동장치 헬멧 착용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	49	35.0(7.1)	20.3	37	35.2(7.8)	22.2	12	-(-)	-
연령									
19-29	8	-(-)	-	6	-(-)	-	2	-(-)	-
30-39	7	-(-)	-	3	-(-)	-	4	-(-)	-
40-49	14	-(-)	-	12	-(-)	-	2	-(-)	-
50-59	5	-(-)	-	4	-(-)	-	1	-(-)	-
60-69	10	-(-)	-	9	-(-)	-	1	-(-)	-
70 이상	5	-(-)	-	3	-(-)	-	2	-(-)	-
19-64	40	34.7(7.5)	21.7	30	33.5(8.9)	26.4	10	-(-)	-
65 이상	9	-(-)	-	7	-(-)	-	2	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	1	-(-)	-	0	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
중학교	6	-(-)	-	5	-(-)	-	1	-(-)	-
고등학교	15	-(-)	-	14	-(-)	-	1	-(-)	-
대학교 이상	24	39.6(11.5)	29.1	16	-(-)	-	8	-(-)	-
직업									
전문행정관리	6	-(-)	-	5	-(-)	-	1	-(-)	-
사무직	9	-(-)	-	7	-(-)	-	2	-(-)	-
판매·서비스직	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
농림어업	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	14	-(-)	-	14	-(-)	-	0	-(-)	-
기타 ³⁾	19	-(-)	-	10	-(-)	-	9	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
100-200만원 미만	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
200-300만원 미만	7	-(-)	-	5	-(-)	-	2	-(-)	-
300-400만원 미만	11	-(-)	-	9	-(-)	-	2	-(-)	-
400만원 이상	26	43.1(11.4)	26.5	20	37.0(12.7)	34.4	6	-(-)	-
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	17	-(-)	-	14	-(-)	-	3	-(-)	-
변함없다	24	49.6(12.2)	24.6	16	-(-)	-	8	-(-)	-
늘어났다	8	-(-)	-	7	-(-)	-	1	-(-)	-

주 1) 개인형이동장치 헬멧 착용률 : (개인형 이동장치를 탈 때 헬멧을 “항상 착용한다”에 응답한 사람의 수 / 개인형 이동장치 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 24〉 격렬한 신체활동 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	15.7(1.5)	9.6	444	20.3(2.2)	10.7	465	10.8(1.5)	13.9
연령									
19-29	88	29.6(5.8)	19.6	52	41.3(7.6)	18.4	36	14.1(6.3)	45.1
30-39	119	17.3(4.1)	23.5	54	21.5(6.7)	31.1	65	12.4(4.8)	38.5
40-49	176	15.6(3.1)	19.6	93	21.7(4.4)	20.4	83	9.3(3.3)	35.2
50-59	191	15.8(2.7)	17.2	86	14.9(4.0)	27.0	105	16.9(3.5)	20.7
60-69	199	10.7(2.5)	23.8	98	15.0(4.1)	27.2	101	6.2(2.2)	35.6
70 이상	136	4.4(2.1)	46.7	61	4.0(2.7)	67.9	75	4.8(2.2)	46.7
19-64	681	18.0(1.7)	9.5	340	22.5(2.5)	11.2	341	12.9(1.8)	14.4
65 이상	228	6.7(2.0)	29.6	104	10.1(3.3)	33.1	124	3.8(1.6)	42.2
교육수준 ²⁾									
무학	48	5.9(3.4)	57.7	8	-(-)	-	40	4.3(3.1)	71.4
초등학교	80	0.9(0.9)	101.0	29	0.0(0.0)	.	51	1.4(1.4)	101.9
중학교	73	7.7(3.4)	44.1	39	11.8(5.7)	48.4	34	2.8(2.7)	97.0
고등학교	371	18.7(2.1)	11.4	193	22.6(3.0)	13.4	178	13.9(2.6)	18.5
대학교 이상	333	17.6(2.4)	13.9	173	22.2(3.5)	15.8	160	12.2(3.0)	24.4
직업									
전문행정관리	119	15.7(3.2)	20.5	59	17.1(4.5)	26.4	60	14.4(4.9)	34.0
사무직	79	21.7(4.4)	20.1	45	21.3(5.7)	26.7	34	22.3(7.7)	34.6
판매·서비스직	108	14.9(3.6)	24.4	30	25.3(9.3)	36.8	78	10.5(4.0)	38.6
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	222	22.0(2.9)	13.2	177	25.7(3.5)	13.4	45	4.4(3.0)	68.3
기타 ³⁾	362	10.4(2.1)	20.4	120	11.9(3.2)	27.2	242	9.5(2.2)	22.6
월 가구소득									
100만원 미만	80	7.0(3.0)	42.9	28	11.6(7.9)	67.6	52	4.6(2.3)	50.0
100-200만원 미만	86	10.3(3.7)	35.9	36	10.2(5.7)	56.2	50	10.4(4.3)	41.4
200-300만원 미만	108	16.4(4.2)	25.7	52	21.1(5.6)	26.6	56	11.6(5.3)	45.6
300-400만원 미만	148	13.2(2.7)	20.5	79	16.9(3.9)	23.1	69	8.2(3.4)	40.9
400만원 이상	487	18.1(2.1)	11.8	249	23.1(3.2)	14.0	238	12.5(2.1)	17.2
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	14.2(2.5)	17.8	137	18.5(3.4)	18.4	149	9.9(2.9)	29.3
변함없다	447	17.3(1.7)	9.7	216	21.4(2.9)	13.4	231	13.1(2.1)	15.7
늘어났다	176	14.1(3.2)	22.6	91	20.5(4.3)	21.1	85	6.1(3.0)	49.9

주 1) 격렬한 신체활동 실천율 : (최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 25〉 중등도 신체활동 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	7.0(1.0)	14.1	445	9.4(1.4)	15.4	465	4.4(1.1)	25.1
연령									
19-29	88	8.6(2.5)	28.5	52	13.2(4.4)	33.3	36	2.7(2.7)	100.6
30-39	119	7.4(2.7)	36.2	54	12.5(4.8)	38.0	65	1.5(1.5)	101.1
40-49	177	7.8(2.3)	28.9	94	7.6(2.3)	30.9	83	8.0(4.1)	51.0
50-59	191	6.5(1.6)	25.0	86	7.8(2.7)	34.5	105	5.0(1.9)	38.0
60-69	199	6.6(1.8)	27.6	98	9.1(2.9)	31.6	101	4.0(1.6)	41.6
70 이상	136	4.9(1.6)	32.4	61	6.6(2.9)	44.2	75	3.6(2.1)	58.2
19-64	682	7.1(1.1)	16.0	341	9.2(1.6)	16.9	341	4.7(1.4)	29.4
65 이상	228	6.7(1.6)	23.3	104	10.3(2.9)	28.5	124	3.7(1.7)	45.9
교육수준 ²⁾									
무학	48	3.7(2.6)	71.4	8	-(-)	-	40	1.7(1.7)	100.1
초등학교	80	3.4(1.8)	54.1	29	6.4(4.3)	67.1	51	1.7(1.7)	98.9
중학교	73	7.9(3.1)	38.8	39	10.3(4.9)	47.7	34	5.0(3.6)	72.0
고등학교	372	7.6(1.3)	17.6	194	8.1(1.8)	22.3	178	7.0(1.8)	26.5
대학교 이상	333	7.3(1.6)	22.1	173	11.0(2.8)	24.9	160	2.9(1.4)	49.0
직업									
전문행정관리	119	11.0(3.3)	30.2	59	13.6(4.8)	35.1	60	8.4(3.9)	47.1
사무직	79	7.4(3.0)	40.7	45	7.4(4.1)	55.7	34	7.5(4.4)	59.6
판매·서비스직	108	3.9(1.9)	47.5	30	9.2(5.3)	57.6	78	1.7(1.3)	77.1
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	7.3(1.7)	23.8	178	7.3(1.9)	26.6	45	7.3(3.6)	49.6
기타 ³⁾	362	6.3(1.4)	21.9	120	12.4(3.2)	25.7	242	3.0(1.1)	37.4
월 가구소득									
100만원 미만	80	3.0(1.5)	50.9	28	6.1(4.5)	73.9	52	1.4(1.4)	101.4
100-200만원 미만	86	7.8(2.5)	32.5	36	8.2(4.1)	49.9	50	7.4(3.3)	44.3
200-300만원 미만	108	2.4(1.1)	46.1	52	1.7(1.7)	98.4	56	3.1(1.4)	44.2
300-400만원 미만	149	4.6(2.1)	46.2	80	7.9(3.6)	45.1	69	0.0(0.0)	.
400만원 이상	487	9.0(1.4)	15.8	249	11.8(1.9)	16.0	238	5.9(1.9)	32.0
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	6.1(1.8)	29.6	137	7.9(2.5)	31.8	149	4.3(1.8)	41.3
변함없다	448	6.4(1.1)	16.9	217	8.6(1.8)	21.1	231	4.1(1.2)	29.5
늘어났다	176	9.9(2.4)	23.8	91	13.3(3.7)	27.5	85	5.5(2.6)	46.3

주 1) 중등도 신체활동 실천율 : (최근 1주일 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 26〉 중등도 이상 신체활동 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	20.7(1.7)	8.4	444	27.0(2.5)	9.4	465	14.0(1.7)	12.0
연령									
19-29	88	35.0(5.8)	16.5	52	48.9(7.9)	16.2	36	16.7(6.9)	41.4
30-39	119	23.0(4.5)	19.5	54	32.1(7.0)	21.8	65	12.4(4.8)	38.5
40-49	176	20.1(3.3)	16.5	93	24.9(4.3)	17.4	83	15.2(4.9)	32.2
50-59	191	21.0(3.1)	14.8	86	21.6(4.6)	21.3	105	20.2(3.8)	18.7
60-69	199	15.3(2.9)	18.7	98	21.5(4.6)	21.3	101	9.1(2.7)	29.4
70 이상	136	8.8(2.6)	29.6	61	10.6(3.8)	36.0	75	7.4(2.9)	39.1
19-64	681	22.8(1.9)	8.5	340	28.8(2.8)	9.9	341	16.0(2.0)	12.7
65 이상	228	12.1(2.3)	18.7	104	18.3(3.7)	20.1	124	6.9(2.3)	32.6
교육수준 ²⁾									
무학	48	5.9(3.4)	57.7	8	-(-)	-	40	4.3(3.1)	71.4
초등학교	80	4.3(2.4)	55.9	29	6.4(4.3)	67.1	51	3.1(2.2)	71.4
중학교	73	15.6(4.6)	29.3	39	22.1(7.3)	33.2	34	7.7(4.1)	52.3
고등학교	371	23.4(2.3)	9.7	193	27.4(3.2)	11.6	178	18.4(2.6)	14.1
대학교 이상	333	23.3(2.9)	12.6	173	30.6(4.2)	13.8	160	14.6(3.1)	21.2
직업									
전문행정관리	119	24.4(4.1)	16.7	59	27.4(5.4)	19.7	60	21.3(5.6)	26.3
사무직	79	24.5(4.4)	18.0	45	26.0(5.8)	22.5	34	22.3(7.7)	34.6
판매·서비스직	108	18.2(4.0)	21.9	30	32.7(9.9)	30.5	78	12.1(4.2)	34.6
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	222	27.2(3.2)	11.8	177	30.4(3.8)	12.5	45	11.8(4.1)	34.7
기타 ³⁾	362	14.8(2.4)	15.9	120	21.1(3.9)	18.7	242	11.5(2.3)	19.7
월 가구소득									
100만원 미만	80	9.2(3.5)	37.8	28	17.7(8.9)	50.2	52	4.6(2.3)	50.0
100-200만원 미만	86	15.8(3.8)	24.1	36	15.6(6.3)	40.2	50	15.9(4.7)	29.6
200-300만원 미만	108	17.1(4.3)	24.9	52	21.1(5.6)	26.6	56	12.9(5.4)	41.9
300-400만원 미만	148	16.1(3.4)	20.9	79	21.8(4.7)	21.6	69	8.2(3.4)	40.9
400만원 이상	487	24.8(2.4)	9.7	249	31.7(3.6)	11.4	238	16.9(2.5)	14.5
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	18.2(3.2)	17.5	137	23.4(4.3)	18.3	149	12.9(3.2)	25.1
변함없다	447	21.8(1.8)	8.1	216	27.9(3.0)	10.7	231	15.5(2.1)	13.8
늘어났다	176	21.9(3.4)	15.5	91	30.0(5.1)	17.1	85	11.6(3.4)	29.4

주 1) 중등도 이상 신체활동 실천율 : (최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 27〉 걷기 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	35.8(1.9)	5.4	445	39.4(2.5)	6.4	465	32.1(2.2)	6.9
연령									
19-29	88	42.2(5.5)	13.1	52	47.0(6.4)	13.5	36	36.0(8.4)	23.3
30-39	119	35.5(4.7)	13.2	54	46.9(7.4)	15.8	65	22.3(5.2)	23.5
40-49	177	38.3(3.8)	10.0	94	40.6(5.3)	12.9	83	35.8(5.1)	14.2
50-59	191	31.4(3.1)	9.9	86	32.4(4.3)	13.1	105	30.3(4.5)	14.9
60-69	199	36.3(4.0)	10.9	98	34.9(5.1)	14.6	101	37.8(5.1)	13.6
70 이상	136	32.1(4.6)	14.4	61	38.7(6.0)	15.4	75	26.8(5.0)	18.6
19-64	682	36.4(2.1)	5.8	341	40.0(2.8)	7.0	341	32.3(2.5)	7.8
65 이상	228	33.8(3.6)	10.6	104	36.6(4.3)	11.7	124	31.4(4.3)	13.8
교육수준 ²⁾									
무학	48	32.9(6.3)	19.3	8	-(-)	-	40	29.2(6.1)	21.0
초등학교	80	29.8(6.9)	23.2	29	36.8(9.5)	25.7	51	25.9(6.8)	26.4
중학교	73	29.0(5.1)	17.7	39	27.2(7.1)	26.0	34	31.3(7.9)	25.3
고등학교	372	36.5(2.7)	7.4	194	39.3(3.8)	9.7	178	33.0(3.5)	10.5
대학교 이상	333	37.9(3.2)	8.3	173	41.4(4.2)	10.2	160	33.7(3.8)	11.4
직업									
전문행정관리	119	37.4(4.9)	13.1	59	38.6(7.2)	18.6	60	36.2(6.9)	19.0
사무직	79	33.7(5.9)	17.6	45	37.7(7.3)	19.3	34	27.8(8.2)	29.6
판매·서비스직	108	31.0(3.8)	12.1	30	35.4(7.6)	21.4	78	29.1(5.4)	18.6
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	40.0(2.8)	6.9	178	40.7(3.2)	7.9	45	36.7(6.5)	17.8
기타 ³⁾	362	33.8(2.9)	8.5	120	38.6(4.5)	11.7	242	31.3(3.4)	10.9
월 가구소득									
100만원 미만	80	28.7(5.2)	18.2	28	39.7(8.7)	21.9	52	22.7(5.6)	24.7
100-200만원 미만	86	40.7(5.6)	13.7	36	38.0(8.9)	23.5	50	42.8(6.7)	15.7
200-300만원 미만	108	37.0(4.7)	12.7	52	40.2(6.7)	16.7	56	33.6(6.4)	19.1
300-400만원 미만	149	27.9(4.1)	14.8	80	29.6(5.3)	17.8	69	25.4(6.9)	27.1
400만원 이상	487	38.0(2.5)	6.5	249	42.3(3.5)	8.3	238	33.1(3.0)	8.9
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	37.5(3.4)	9.1	137	43.3(4.7)	10.8	149	31.7(4.0)	12.8
변함없다	448	34.5(2.3)	6.8	217	34.9(3.3)	9.5	231	34.1(2.9)	8.4
늘어났다	176	36.7(4.0)	11.0	91	44.1(5.7)	12.9	85	27.3(5.1)	18.7

주 1) 걷기 실천율 : 최근 1주일 동안 1회 10분 이상, 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 28〉 아침식사빈도 및 아침 식사 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	N	0일		1-2일		3-4일		5-7일	
		%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	24.0(1.8)	7.3	7.7(1.1)	14.3	11.0(1.1)	9.9	57.2(2.3)	4.0
성									
남자	445	24.2(2.2)	9.1	8.2(1.6)	19.3	11.1(1.5)	13.9	56.5(2.7)	4.7
여자	465	23.9(2.4)	9.9	7.2(1.2)	16.8	10.9(1.7)	16.0	58.0(2.9)	5.1
연령									
19-29	88	43.3(5.8)	13.3	20.2(4.5)	22.4	11.8(3.2)	27.1	24.7(4.8)	19.3
30-39	119	40.6(5.7)	14.1	7.5(2.4)	31.5	17.2(3.8)	22.1	34.7(4.8)	13.8
40-49	177	31.2(4.1)	13.1	8.7(2.2)	24.8	15.7(3.2)	20.6	44.4(4.7)	10.5
50-59	191	18.1(2.7)	15.0	4.7(1.6)	34.7	13.0(2.6)	19.8	64.2(3.6)	5.6
60-69	199	8.1(2.0)	24.3	5.0(1.8)	36.6	3.5(1.1)	30.0	83.4(2.9)	3.5
70 이상	136	6.2(2.0)	32.6	0.8(0.8)	100.4	3.4(1.6)	47.2	89.6(2.6)	2.9
19-64	682	28.6(1.9)	6.8	9.3(1.3)	14.3	12.7(1.3)	10.4	49.5(2.3)	4.7
65 이상	228	5.5(1.5)	28.0	1.6(0.9)	58.6	4.3(1.2)	27.2	88.6(2.2)	2.5
교육수준 ²⁾									
무학	48	6.7(3.7)	55.7	2.2(2.2)	98.7	10.3(3.0)	29.5	80.8(4.8)	6.0
초등학교	80	3.7(2.1)	56.4	3.5(2.1)	58.6	0.9(0.9)	101.0	91.9(2.9)	3.2
중학교	73	16.1(4.5)	28.1	5.0(3.0)	59.7	3.0(2.1)	70.5	76.0(5.6)	7.4
고등학교	372	23.0(2.6)	11.1	8.1(1.5)	18.7	10.7(1.8)	17.1	58.2(3.2)	5.4
대학교 이상	333	31.9(2.9)	9.2	9.1(2.0)	21.6	14.9(2.3)	15.7	44.2(3.1)	7.1
직업									
전문행정관리	119	29.5(4.4)	15.0	11.2(3.3)	29.5	20.0(4.3)	21.6	39.3(4.9)	12.3
사무직	79	39.6(5.4)	13.6	4.5(2.6)	58.0	12.2(3.9)	32.3	43.7(6.3)	14.5
판매·서비스직	108	32.1(4.3)	13.2	6.1(2.4)	39.2	8.3(2.5)	29.9	53.5(4.8)	8.9
농림어업	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	223	23.5(2.9)	12.1	7.3(2.2)	29.8	11.3(2.0)	17.5	57.9(4.0)	7.0
기타 ³⁾	362	16.4(2.7)	16.2	7.8(1.6)	20.6	8.4(1.5)	18.4	67.4(3.3)	4.9
월 가구소득									
100만원 미만	80	11.0(3.9)	35.2	3.7(2.1)	57.3	7.2(2.2)	30.4	78.2(4.6)	5.9
100-200만원 미만	86	13.7(4.8)	34.7	2.2(1.5)	70.5	1.9(1.9)	98.6	82.2(5.7)	6.9
200-300만원 미만	108	26.7(5.0)	18.7	7.4(2.6)	35.9	11.0(3.9)	35.1	55.0(6.0)	10.9
300-400만원 미만	149	31.2(4.5)	14.4	10.2(2.8)	27.1	10.4(2.8)	27.0	48.2(5.0)	10.4
400만원 이상	487	24.5(2.1)	8.6	8.4(1.4)	16.9	12.9(1.5)	11.6	54.1(2.7)	5.0
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	18.3(2.6)	14.0	8.4(2.1)	25.4	7.7(1.7)	22.2	65.6(3.6)	5.4
변함없다	448	23.6(2.2)	9.5	7.4(1.4)	18.8	13.1(1.7)	13.0	55.9(3.0)	5.3
늘어났다	176	33.8(4.3)	12.6	7.8(1.8)	23.6	10.8(2.4)	22.5	47.6(4.4)	9.3

주 1) 아침 식사 실천율 : (최근 1년 동안 주평균 5일 이상 아침식사를 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 29〉 영양표시 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	63.0(2.9)	4.5	445	61.4(3.2)	5.2	465	64.7(3.1)	4.9
연령									
19-29	88	75.9(5.4)	7.1	52	73.5(6.5)	8.8	36	79.1(6.8)	8.6
30-39	119	79.0(4.4)	5.6	54	80.8(5.0)	6.2	65	76.8(5.4)	7.0
40-49	177	75.5(4.1)	5.5	94	71.5(4.8)	6.8	83	79.7(4.5)	5.7
50-59	191	63.3(4.2)	6.6	86	54.7(6.3)	11.5	105	72.8(4.5)	6.2
60-69	199	51.8(4.1)	7.9	98	50.0(5.3)	10.6	101	53.6(4.9)	9.1
70 이상	136	25.4(5.3)	20.9	61	32.5(6.5)	20.1	75	19.9(6.3)	31.5
19-64	682	70.1(3.1)	4.5	341	66.7(3.5)	5.2	341	73.9(3.5)	4.7
65 이상	228	34.2(3.9)	11.3	104	36.2(5.3)	14.6	124	32.6(4.2)	12.9
교육수준 ²⁾									
무학	48	9.8(7.4)	75.4	8	-(-)	-	40	8.6(6.2)	72.1
초등학교	80	28.9(6.8)	23.6	29	18.3(7.7)	42.1	51	34.8(7.9)	22.9
중학교	73	49.1(6.5)	13.3	39	48.8(8.3)	17.0	34	49.4(10.3)	20.8
고등학교	372	63.7(3.7)	5.8	194	59.1(4.6)	7.9	178	69.3(3.9)	5.7
대학교 이상	333	77.2(3.2)	4.1	173	73.5(3.7)	5.0	160	81.5(4.0)	4.9
직업									
전문행정관리	119	74.2(5.2)	7.0	59	65.4(6.0)	9.2	60	83.4(6.4)	7.7
사무직	79	76.0(5.9)	7.8	45	70.9(7.4)	10.5	34	83.6(6.7)	8.1
판매·서비스직	108	69.5(5.4)	7.8	30	72.2(9.0)	12.4	78	68.3(5.9)	8.6
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	62.6(4.0)	6.4	178	64.1(4.4)	6.8	45	55.3(8.7)	15.7
기타 ³⁾	362	54.8(3.5)	6.4	120	49.9(5.4)	10.7	242	57.4(3.5)	6.1
월 가구소득									
100만원 미만	80	27.9(5.4)	19.5	28	36.4(8.7)	24.0	52	23.3(5.2)	22.4
100-200만원 미만	86	40.8(7.1)	17.3	36	38.4(9.1)	23.8	50	42.6(7.4)	17.4
200-300만원 미만	108	55.9(5.9)	10.6	52	57.2(7.0)	12.2	56	54.6(7.4)	13.6
300-400만원 미만	149	65.7(5.1)	7.8	80	63.3(5.8)	9.2	69	69.0(5.5)	7.9
400만원 이상	487	71.1(3.8)	5.4	249	66.3(4.2)	6.4	238	76.6(4.2)	5.5
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	62.9(3.9)	6.2	137	61.3(4.1)	6.7	149	64.5(4.3)	6.6
변함없다	448	59.8(3.3)	5.5	217	56.2(3.9)	6.9	231	63.5(3.8)	5.9
늘어났다	176	71.1(5.6)	7.8	91	73.4(5.8)	7.9	85	68.2(6.7)	9.8

주 1) 영양표시 인지율 : ('영양표시'를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 30〉 영양표시 독해율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	24.6(1.7)	6.9	445	19.5(1.9)	9.6	465	30.0(2.5)	8.4
연령									
19-29	88	31.7(5.4)	17.1	52	29.2(5.7)	19.7	36	35.1(8.9)	25.4
30-39	119	30.0(4.5)	15.0	54	31.3(6.6)	21.2	65	28.4(6.7)	23.6
40-49	177	33.9(3.9)	11.6	94	21.5(4.0)	18.8	83	47.0(6.1)	13.0
50-59	191	23.7(3.3)	14.0	86	15.6(4.3)	27.8	105	32.6(4.6)	14.0
60-69	199	19.5(3.0)	15.4	98	12.8(3.6)	28.2	101	26.4(4.8)	18.1
70 이상	136	3.9(1.7)	44.3	61	5.0(2.9)	57.6	75	3.0(2.2)	71.0
19-64	682	28.1(2.0)	7.1	341	21.3(2.0)	9.6	341	35.9(3.0)	8.4
65 이상	228	10.0(2.1)	21.4	104	10.9(3.3)	29.9	124	9.2(2.8)	30.4
교육수준 ²⁾									
무학	48	0.0(0.0)	.	8	-(-)	-	40	0.0(0.0)	.
초등학교	80	6.3(2.6)	41.2	29	6.4(4.4)	68.4	51	6.3(3.4)	53.9
중학교	73	10.0(4.9)	49.2	39	8.3(5.9)	70.8	34	12.1(5.8)	47.6
고등학교	372	23.4(2.1)	9.2	194	17.7(2.7)	15.0	178	30.3(3.5)	11.6
대학교 이상	333	34.8(3.1)	8.8	173	25.9(3.7)	14.1	160	45.2(4.1)	9.0
직업									
전문행정관리	119	39.7(4.9)	12.2	59	29.0(5.1)	17.7	60	50.8(8.0)	15.7
사무직	79	27.6(5.6)	20.5	45	27.4(7.6)	27.7	34	27.9(7.1)	25.4
판매·서비스직	108	22.6(4.7)	20.8	30	14.5(5.7)	39.4	78	26.0(5.9)	22.6
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	16.8(2.7)	15.8	178	15.6(2.9)	18.9	45	22.4(6.3)	27.9
기타 ³⁾	362	24.4(2.7)	11.2	120	19.7(3.7)	18.8	242	26.9(3.5)	13.0
월 가구소득									
100만원 미만	80	7.7(3.5)	44.8	28	10.9(5.7)	52.8	52	6.0(3.3)	55.5
100-200만원 미만	86	19.3(5.6)	29.2	36	23.2(7.8)	33.5	50	16.3(5.2)	32.0
200-300만원 미만	108	26.9(5.2)	19.3	52	23.5(6.7)	28.4	56	30.5(7.2)	23.8
300-400만원 미만	149	21.3(3.1)	14.7	80	13.3(3.4)	25.9	69	32.3(6.0)	18.5
400만원 이상	487	27.8(2.4)	8.5	249	20.9(2.5)	11.8	238	35.8(3.4)	9.6
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	22.4(2.8)	12.6	137	19.1(3.4)	17.6	149	25.7(3.8)	14.7
변함없다	448	24.6(2.4)	9.7	217	16.4(2.6)	16.1	231	33.1(3.5)	10.4
늘어났다	176	27.8(3.8)	13.8	91	27.0(4.9)	18.2	85	28.8(5.8)	20.2

주 1) 영양표시 독해율 : (가공식품 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 31〉 영양표시 활용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	210	84.0(2.5)	2.9	81	82.4(3.8)	4.6	129	85.1(3.2)	3.8
연령									
19-29	28	91.7(5.3)	5.8	15	-()	-	13	-()	-
30-39	35	80.1(6.9)	8.6	17	-()	-	18	-()	-
40-49	58	78.6(5.4)	6.9	21	74.5(9.5)	12.7	37	80.5(6.0)	7.5
50-59	48	84.0(4.4)	5.2	14	-()	-	34	87.0(4.4)	5.1
60-69	36	85.5(5.2)	6.1	11	-()	-	25	92.0(3.7)	4.1
70 이상	5	-()	-	3	-()	-	2	-()	-
19-64	190	84.4(2.6)	3.1	72	84.1(4.0)	4.8	118	84.6(3.5)	4.1
65 이상	20	78.8(9.5)	12.0	9	-()	-	11	-()	-
교육수준 ²⁾									
무학	0	-()	-	0	-()	-	0	-()	-
초등학교	5	-()	-	2	-()	-	3	-()	-
중학교	7	-()	-	3	-()	-	4	-()	-
고등학교	87	80.1(4.2)	5.2	33	79.0(6.4)	8.1	54	80.9(5.4)	6.7
대학교 이상	111	86.2(3.2)	3.7	43	85.2(5.1)	6.0	68	86.8(4.0)	4.6
직업									
전문행정관리	46	91.1(3.4)	3.8	18	-()	-	28	95.0(3.3)	3.5
사무직	22	81.7(10.5)	12.9	12	-()	-	10	-()	-
판매·서비스직	23	71.4(7.7)	10.8	4	-()	-	19	-()	-
농림어업	2	-()	-	1	-()	-	1	-()	-
기능단순노무직	38	87.0(5.1)	5.9	28	86.1(6.1)	7.1	10	-()	-
기타 ³⁾	78	81.9(4.4)	5.3	18	-()	-	60	82.4(5.1)	6.2
월 가구소득									
100만원 미만	6	-()	-	3	-()	-	3	-()	-
100-200만원 미만	15	-()	-	7	-()	-	8	-()	-
200-300만원 미만	27	84.7(5.2)	6.1	12	-()	-	15	-()	-
300-400만원 미만	31	86.2(5.8)	6.7	10	-()	-	21	84.6(7.6)	9.0
400만원 이상	131	82.7(3.6)	4.3	49	82.8(5.4)	6.5	82	82.7(4.7)	5.6
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	63	87.1(3.8)	4.4	24	82.7(6.8)	8.2	39	90.3(3.4)	3.8
변함없다	99	83.1(4.0)	4.8	32	80.2(6.3)	7.8	67	84.6(5.5)	6.5
늘어났다	48	82.0(5.0)	6.1	25	85.1(6.5)	7.6	23	78.4(6.9)	8.7

주 1) 영양표시 활용률 : (영양표시 내용이 가공식품을 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수 / 가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 32〉 비만도 분포¹⁾ 및 비만을(자가보고)²⁾

(단위 : %)

구분	N	비만도 분포						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만을)		평균 (표준오차)	상대 표준오차
		%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차		
전체	899	4.0(0.8)	20.3	59.4(1.9)	3.2	36.6(1.7)	4.7	24.1(0.1)	0.5
연령									
19-29	88	8.0(3.2)	39.8	54.3(6.0)	11.0	37.8(5.0)	13.1	24.0(0.5)	1.9
30-39	119	2.0(1.2)	59.1	50.7(5.1)	10.2	47.3(5.1)	10.8	24.9(0.4)	1.6
40-49	177	2.2(1.1)	49.0	58.6(3.2)	5.4	39.2(3.2)	8.2	24.2(0.2)	1.0
50-59	191	1.4(0.9)	58.7	60.2(4.0)	6.6	38.3(4.1)	10.7	24.3(0.3)	1.0
60-69	197	1.9(1.0)	51.9	64.0(4.2)	6.5	34.1(3.9)	11.5	23.9(0.2)	0.9
70 이상	127	12.7(3.4)	26.8	68.9(4.8)	6.9	18.4(3.8)	20.8	22.8(0.3)	1.3
19-64	682	2.8(0.7)	25.4	57.7(2.3)	3.9	39.4(2.1)	5.4	24.3(0.1)	0.6
65 이상	217	8.8(2.3)	26.3	66.6(3.3)	5.0	24.6(2.8)	11.4	23.2(0.2)	0.8
교육수준 ³⁾									
무학	41	12.6(6.1)	48.3	73.2(6.3)	8.7	14.2(5.3)	37.2	22.6(0.5)	2.1
초등학교	77	7.4(3.5)	47.1	56.5(5.6)	9.8	36.0(5.5)	15.4	23.8(0.4)	1.5
중학교	73	4.0(2.1)	53.5	51.5(6.5)	12.6	44.6(6.5)	14.6	24.7(0.5)	2.0
고등학교	371	4.1(1.2)	28.6	58.0(3.2)	5.5	37.9(2.9)	7.5	24.3(0.2)	0.8
대학교 이상	333	2.4(1.0)	39.3	61.2(2.7)	4.4	36.4(2.8)	7.7	24.0(0.2)	0.9
직업									
전문행정관리	119	4.5(2.3)	52.3	58.9(4.4)	7.5	36.6(4.5)	12.2	23.7(0.3)	1.2
사무직	79	0.9(0.9)	101.1	49.8(6.1)	12.2	49.3(6.1)	12.4	24.9(0.4)	1.8
판매·서비스직	108	5.5(2.3)	42.4	61.6(5.0)	8.0	32.9(4.9)	15.0	24.0(0.4)	1.8
농림어업	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	223	2.0(0.9)	43.9	52.9(3.9)	7.4	45.2(3.9)	8.6	24.7(0.2)	0.9
기타 ⁴⁾	351	5.1(1.3)	26.0	65.2(2.6)	4.0	29.6(2.5)	8.3	23.6(0.2)	0.9
월 가구소득									
100만원 미만	75	14.3(5.0)	34.9	69.0(5.3)	7.7	16.7(4.4)	26.2	22.5(0.4)	1.9
100-200만원 미만	81	3.5(1.7)	48.7	63.4(5.4)	8.6	33.1(5.3)	15.9	23.6(0.4)	1.5
200-300만원 미만	108	3.8(1.8)	46.9	63.5(5.6)	8.9	32.7(5.4)	16.4	23.6(0.3)	1.4
300-400만원 미만	149	5.0(2.5)	50.8	55.8(4.8)	8.6	39.2(4.3)	10.8	24.0(0.3)	1.1
400만원 이상	486	2.6(0.8)	30.5	57.9(2.4)	4.1	39.5(2.4)	6.1	24.4(0.2)	0.8
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	284	3.0(1.1)	35.7	58.6(3.0)	5.1	38.4(3.0)	7.8	24.1(0.3)	1.3
변함없다	441	4.0(1.0)	24.1	62.1(2.4)	3.9	34.0(2.3)	6.8	23.9(0.2)	0.7
늘어났다	174	5.5(2.6)	47.9	54.0(4.6)	8.6	40.5(4.2)	10.3	24.5(0.3)	1.3

주 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만을(자가보고) : (체질량지수(kg/m²)가 25 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 33〉 남자 비만도 분포¹⁾ 및 비만을(자가보고)²⁾

(단위 : %)

구분	N	비만도 분포						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만을)		평균 (표준오차)	상대 표준오차
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차		
전체	444	2.7(1.0)	36.3	49.8(2.8)	5.7	47.6(2.7)	5.7	24.8(0.2)	0.7
연령									
19-29	52	3.8(2.6)	69.2	43.5(7.3)	16.8	52.7(7.0)	13.2	25.3(0.6)	2.3
30-39	54	0.0(0.0)	.	38.3(6.8)	17.8	61.7(6.8)	11.0	25.9(0.4)	1.5
40-49	94	2.2(1.5)	68.6	40.4(4.9)	12.2	57.4(4.9)	8.5	25.3(0.3)	1.2
50-59	86	0.0(0.0)	.	47.0(6.1)	13.0	53.0(6.1)	11.6	25.2(0.3)	1.2
60-69	98	2.0(1.4)	72.4	68.8(5.1)	7.4	29.2(5.0)	17.2	23.6(0.3)	1.3
70 이상	60	13.2(5.6)	42.9	65.6(7.2)	11.0	21.2(5.8)	27.3	23.1(0.4)	1.8
19-64	341	1.4(0.7)	45.6	45.8(3.1)	6.8	52.8(3.0)	5.8	25.2(0.2)	0.7
65 이상	103	8.5(3.4)	39.5	68.8(5.3)	7.7	22.7(4.3)	18.9	23.2(0.3)	1.1
교육수준 ³⁾									
무학	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	29	11.4(8.0)	70.0	60.2(8.9)	14.7	28.4(8.6)	30.3	23.0(0.6)	2.7
중학교	39	4.5(3.1)	68.3	43.9(7.7)	17.4	51.6(7.3)	14.2	24.9(0.6)	2.5
고등학교	193	2.5(1.2)	47.0	51.3(4.2)	8.2	46.2(4.1)	8.9	24.8(0.3)	1.1
대학교 이상	173	1.3(0.8)	58.8	46.4(3.9)	8.3	52.2(3.9)	7.4	25.1(0.2)	0.9
직업									
전문행정관리	59	0.0(0.0)	.	44.8(7.3)	16.2	55.2(7.3)	13.1	25.2(0.3)	1.2
사무직	45	0.0(0.0)	.	36.1(7.1)	19.6	63.9(7.1)	11.0	25.8(0.4)	1.6
판매·서비스직	30	0.0(0.0)	.	55.6(9.3)	16.7	44.4(9.3)	20.9	25.0(0.6)	2.5
농림어업	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	178	1.9(0.9)	48.6	49.9(4.4)	8.7	48.3(4.3)	8.9	25.0(0.3)	1.0
기타 ⁴⁾	119	6.3(2.7)	43.1	55.0(5.5)	10.0	38.7(5.2)	13.4	24.1(0.5)	1.9
월 가구소득									
100만원 미만	28	16.5(7.7)	46.9	66.9(9.5)	14.3	16.7(6.0)	36.3	22.6(0.6)	2.4
100-200만원 미만	35	5.2(3.7)	70.9	60.3(8.1)	13.4	34.5(8.4)	24.3	23.6(0.5)	2.0
200-300만원 미만	52	3.0(2.1)	70.1	64.1(7.2)	11.2	32.9(7.2)	22.0	24.0(0.5)	2.1
300-400만원 미만	80	2.5(1.9)	78.0	47.5(6.2)	13.0	50.0(6.0)	11.9	24.7(0.3)	1.3
400만원 이상	249	1.3(0.8)	61.9	45.0(3.3)	7.4	53.7(3.3)	6.2	25.4(0.2)	0.9
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	137	0.6(0.6)	98.3	49.7(4.3)	8.7	49.7(4.3)	8.6	24.9(0.3)	1.0
변함없다	216	3.4(1.2)	35.7	53.1(3.6)	6.8	43.6(3.5)	8.1	24.5(0.2)	0.9
늘어났다	91	4.0(2.8)	70.2	42.3(5.8)	13.7	53.6(5.4)	10.1	25.5(0.4)	1.6

주 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만을(자가보고) : (체질량지수(kg/m²)가 25 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 34〉 여자 비만도 분포¹⁾ 및 비만을(자가보고)²⁾

(단위 : %)

구분	N	비만도 분포						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만을)		평균 (표준오차)	상대 표준오차
		%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차		
전체	455	5.4(1.2)	22.2	69.9(2.3)	3.3	24.7(1.9)	7.6	23.2(0.2)	0.7
연령									
19-29	36	13.5(5.1)	37.9	68.4(8.9)	13.1	18.1(7.0)	38.7	22.4(0.7)	3.2
30-39	65	4.3(2.5)	58.1	65.1(6.3)	9.7	30.6(6.5)	21.1	23.7(0.7)	2.8
40-49	83	2.2(1.5)	70.4	77.8(4.7)	6.0	20.0(4.5)	22.5	23.0(0.4)	1.6
50-59	105	3.0(1.7)	57.2	74.8(4.2)	5.6	22.1(4.0)	18.3	23.2(0.3)	1.4
60-69	99	1.9(1.4)	74.3	59.0(5.6)	9.5	39.1(5.5)	14.1	24.2(0.3)	1.2
70 이상	67	12.3(4.1)	33.1	71.7(5.6)	7.8	16.0(4.2)	26.5	22.6(0.3)	1.4
19-64	341	4.4(1.2)	27.7	71.3(2.7)	3.8	24.3(2.3)	9.4	23.2(0.2)	0.9
65 이상	114	9.0(3.0)	33.8	64.7(4.3)	6.7	26.4(4.0)	15.0	23.3(0.3)	1.3
교육수준 ³⁾									
무학	33	13.3(6.8)	51.1	72.2(7.0)	9.8	14.5(6.1)	42.4	22.4(0.5)	2.2
초등학교	48	5.1(2.6)	51.2	54.4(8.2)	15.1	40.5(7.5)	18.4	24.3(0.4)	1.7
중학교	34	3.3(3.2)	95.2	60.5(9.2)	15.1	36.2(8.3)	22.8	24.5(0.7)	2.7
고등학교	178	6.1(1.8)	30.0	66.1(3.8)	5.8	27.8(3.3)	11.9	23.6(0.3)	1.1
대학교 이상	160	3.7(1.9)	49.9	78.6(3.2)	4.0	17.7(2.9)	16.4	22.6(0.3)	1.3
직업									
전문행정관리	60	9.2(4.6)	49.9	73.7(5.6)	7.6	17.1(4.7)	27.3	22.2(0.4)	1.6
사무직	34	2.3(2.3)	99.4	70.3(8.6)	12.2	27.5(8.5)	30.8	23.6(0.9)	3.7
판매·서비스직	78	7.8(3.3)	43.1	64.1(5.6)	8.7	28.1(5.6)	19.8	23.6(0.6)	2.4
농림어업	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	45	2.3(2.3)	98.5	67.4(5.4)	8.1	30.2(5.3)	17.7	23.5(0.5)	2.2
기타 ⁴⁾	232	4.5(1.5)	32.2	70.7(3.0)	4.2	24.8(2.8)	11.2	23.4(0.2)	0.8
월 가구소득									
100만원 미만	47	13.1(6.0)	46.1	70.3(6.3)	9.0	16.7(6.3)	37.8	22.4(0.6)	2.7
100-200만원 미만	46	2.2(2.2)	99.7	65.8(6.1)	9.2	32.0(6.1)	19.0	23.6(0.5)	2.1
200-300만원 미만	56	4.7(3.2)	67.9	62.8(8.0)	12.7	32.5(7.2)	22.2	23.3(0.4)	1.8
300-400만원 미만	69	8.4(3.8)	46.0	67.2(5.5)	8.2	24.5(4.4)	17.9	23.0(0.4)	1.8
400만원 이상	237	4.1(1.4)	35.5	72.7(3.2)	4.4	23.2(2.9)	12.6	23.4(0.3)	1.2
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	147	5.4(2.1)	37.8	67.8(4.2)	6.1	26.8(4.0)	14.8	23.3(0.5)	2.1
변함없다	225	4.6(1.5)	33.6	71.5(2.8)	4.0	23.9(2.6)	11.1	23.2(0.2)	0.9
늘어났다	83	7.3(3.5)	47.7	69.1(6.2)	8.9	23.5(4.9)	20.7	23.1(0.4)	1.7

주 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만을(자가보고) : (체질량지수(kg/m²)가 25 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 35〉 주관적 비만인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	47.6(1.9)	3.9	445	46.8(2.5)	5.3	465	48.5(2.3)	4.8
연령									
19-29	88	53.4(5.5)	10.3	52	51.1(6.8)	13.4	36	56.4(8.2)	14.6
30-39	119	55.3(4.5)	8.2	54	57.9(5.9)	10.2	65	52.2(6.4)	12.2
40-49	177	56.3(4.3)	7.7	94	57.8(5.0)	8.7	83	54.7(6.7)	12.2
50-59	191	48.7(3.8)	7.9	86	49.0(5.9)	12.1	105	48.3(4.4)	9.1
60-69	199	40.4(4.0)	9.9	98	31.4(5.4)	17.2	101	49.5(5.8)	11.7
70 이상	136	26.8(4.7)	17.5	61	26.5(6.1)	23.0	75	27.1(5.8)	21.5
19-64	682	51.9(2.1)	4.0	341	51.0(2.6)	5.1	341	53.0(2.8)	5.2
65 이상	228	29.9(2.9)	9.8	104	26.8(4.1)	15.3	124	32.5(4.3)	13.3
교육수준 ²⁾									
무학	48	19.1(5.0)	26.0	8	-(-)	-	40	13.7(5.2)	38.1
초등학교	80	38.1(5.8)	15.3	29	22.5(7.8)	34.9	51	46.7(7.1)	15.3
중학교	73	47.7(6.0)	12.7	39	44.2(7.6)	17.2	34	51.8(7.7)	14.8
고등학교	372	51.7(2.8)	5.4	194	49.4(3.5)	7.1	178	54.6(4.0)	7.4
대학교 이상	333	48.4(3.2)	6.6	173	47.6(4.1)	8.6	160	49.2(4.2)	8.5
직업									
전문행정관리	119	52.2(4.7)	9.1	59	51.7(7.1)	13.8	60	52.6(6.7)	12.8
사무직	79	58.6(5.5)	9.4	45	66.1(7.0)	10.6	34	47.3(9.3)	19.7
판매·서비스직	108	50.5(5.0)	9.8	30	44.3(9.8)	22.1	78	53.2(5.5)	10.4
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	48.1(3.7)	7.8	178	48.6(3.9)	8.0	45	45.6(7.9)	17.4
기타 ³⁾	362	43.4(3.0)	6.9	120	37.2(5.5)	14.9	242	46.7(2.9)	6.2
월 가구소득									
100만원 미만	80	28.5(5.1)	17.9	28	24.1(6.9)	28.8	52	30.9(6.4)	20.6
100-200만원 미만	86	33.4(5.7)	17.0	36	32.5(7.2)	22.3	50	34.1(6.7)	19.7
200-300만원 미만	108	39.0(5.0)	12.9	52	28.7(6.4)	22.3	56	49.7(6.9)	13.9
300-400만원 미만	149	50.3(3.7)	7.4	80	47.6(5.2)	10.9	69	54.0(5.4)	10.1
400만원 이상	487	53.0(2.3)	4.3	249	53.6(3.2)	5.9	238	52.2(3.1)	5.9
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	45.7(3.2)	7.0	137	42.9(4.0)	9.3	149	48.4(4.1)	8.6
변함없다	448	45.3(2.7)	5.9	217	44.1(3.6)	8.2	231	46.6(3.4)	7.2
늘어났다	176	56.2(4.1)	7.4	91	58.3(5.9)	10.1	85	53.6(4.9)	9.2

주 1) 주관적 비만인지율 : (“약간 비만임” 또는 “매우 비만임”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 36〉 연간 체증조절 시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	62.4(2.1)	3.3	445	57.1(2.6)	4.5	465	68.0(2.5)	3.7
연령									
19-29	88	69.1(4.8)	6.9	52	54.8(6.6)	12.1	36	87.8(4.6)	5.2
30-39	119	73.5(4.6)	6.3	54	76.7(6.5)	8.4	65	69.8(6.5)	9.3
40-49	177	71.9(3.8)	5.3	94	66.0(4.9)	7.4	83	78.2(5.7)	7.2
50-59	191	65.6(3.0)	4.6	86	60.6(5.3)	8.7	105	71.2(3.6)	5.1
60-69	199	55.0(3.3)	6.0	98	42.9(5.2)	12.1	101	67.3(4.3)	6.4
70 이상	136	31.1(4.6)	14.7	61	35.2(6.7)	18.9	75	28.0(5.6)	19.9
19-64	682	68.2(2.1)	3.1	341	61.5(2.8)	4.5	341	76.0(2.5)	3.3
65 이상	228	38.5(3.4)	8.8	104	36.6(4.0)	11.0	124	40.2(4.4)	11.0
교육수준 ²⁾									
무학	48	28.2(7.4)	26.2	8	-(-)	-	40	26.4(7.8)	29.5
초등학교	80	43.9(7.2)	16.4	29	41.7(10.4)	24.9	51	45.2(8.2)	18.2
중학교	73	39.5(5.4)	13.8	39	38.3(7.5)	19.6	34	40.9(8.6)	21.0
고등학교	372	65.0(2.6)	4.0	194	58.1(3.5)	6.1	178	73.7(3.7)	5.1
대학교 이상	333	71.1(3.0)	4.2	173	62.6(3.8)	6.1	160	81.1(3.3)	4.0
직업									
전문행정관리	119	71.3(5.1)	7.1	59	65.0(8.1)	12.5	60	77.9(5.7)	7.3
사무직	79	77.7(4.4)	5.7	45	77.7(6.0)	7.7	34	77.7(6.7)	8.6
판매·서비스직	108	71.8(4.6)	6.5	30	73.5(8.0)	10.9	78	71.1(5.4)	7.5
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	56.8(3.7)	6.4	178	55.1(4.0)	7.2	45	64.8(8.7)	13.4
기타 ³⁾	362	57.3(3.1)	5.3	120	44.6(4.8)	10.8	242	63.9(3.2)	5.1
월 가구소득									
100만원 미만	80	34.4(6.1)	17.9	28	35.2(10.0)	28.3	52	33.9(7.0)	20.7
100-200만원 미만	86	53.9(4.4)	8.2	36	40.3(8.5)	21.0	50	64.2(5.8)	9.1
200-300만원 미만	108	58.8(5.7)	9.6	52	52.6(6.6)	12.6	56	65.3(6.4)	9.8
300-400만원 미만	149	60.6(3.8)	6.2	80	56.9(5.1)	8.9	69	65.7(5.1)	7.8
400만원 이상	487	68.2(2.5)	3.7	249	61.8(3.3)	5.3	238	75.6(3.0)	3.9
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	59.3(3.2)	5.4	137	49.8(4.2)	8.3	149	69.1(4.2)	6.1
변함없다	448	59.8(2.7)	4.6	217	56.9(3.9)	6.8	231	62.8(3.6)	5.7
늘어났다	176	73.6(4.8)	6.5	91	68.0(6.2)	9.1	85	80.7(4.7)	5.9

주 1) 연간 체증조절 시도율 : (최근 1년 동안 체증을 "줄이거나" 또는 "유지"하려고 노력했던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 37〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	30.0(1.8)	6.2	445	31.5(2.1)	6.6	465	28.4(2.5)	8.7
연령									
19-29	88	18.0(4.1)	22.9	52	21.4(5.3)	24.8	36	13.5(6.1)	45.4
30-39	119	24.2(4.4)	18.3	54	21.6(5.8)	27.0	65	27.2(5.2)	19.3
40-49	177	21.9(2.8)	12.7	94	29.0(4.1)	14.2	83	14.4(4.3)	29.7
50-59	191	28.0(3.3)	11.8	86	30.6(4.1)	13.3	105	25.2(4.2)	16.8
60-69	199	42.0(3.8)	9.1	98	42.8(5.4)	12.6	101	41.2(5.3)	13.0
70 이상	136	50.0(4.6)	9.2	61	48.5(7.3)	15.0	75	51.1(6.1)	11.9
19-64	682	25.3(1.9)	7.3	341	27.8(2.2)	7.7	341	22.5(2.5)	11.2
65 이상	228	49.2(3.8)	7.7	104	49.5(5.1)	10.3	124	48.9(5.0)	10.3
교육수준 ²⁾									
무학	48	55.5(6.8)	12.3	8	-(-)	-	40	53.9(6.4)	11.8
초등학교	80	58.3(6.8)	11.7	29	71.9(8.0)	11.1	51	50.8(8.6)	16.9
중학교	73	40.4(6.6)	16.3	39	34.6(7.4)	21.3	34	47.3(9.3)	19.6
고등학교	372	28.4(2.6)	9.2	194	32.7(3.5)	10.7	178	23.2(3.2)	13.7
대학교 이상	333	21.7(2.6)	11.8	173	23.1(3.3)	14.1	160	20.1(3.3)	16.3
직업									
전문행정관리	119	20.1(3.8)	19.0	59	23.0(5.3)	23.0	60	17.1(4.5)	26.4
사무직	79	28.5(5.5)	19.3	45	31.2(7.1)	22.6	34	24.6(6.7)	27.2
판매·서비스직	108	24.6(4.4)	17.9	30	12.0(5.6)	46.5	78	29.9(5.4)	18.1
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	29.5(3.2)	10.9	178	31.0(3.5)	11.2	45	22.3(6.2)	27.5
기타 ³⁾	362	36.9(3.2)	8.7	120	44.0(5.6)	12.6	242	33.1(3.5)	10.6
월 가구소득									
100만원 미만	80	61.8(5.6)	9.0	28	69.4(9.6)	13.9	52	57.7(6.1)	10.5
100-200만원 미만	86	38.3(6.4)	16.7	36	35.7(8.4)	23.5	50	40.3(7.9)	19.6
200-300만원 미만	108	33.4(4.6)	13.8	52	37.5(6.7)	18.0	56	29.1(6.2)	21.3
300-400만원 미만	149	28.7(3.9)	13.7	80	26.4(5.4)	20.5	69	31.8(5.5)	17.3
400만원 이상	487	24.6(2.2)	8.9	249	28.4(2.4)	8.6	238	20.3(3.0)	14.7
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	31.7(2.4)	7.6	137	31.0(3.4)	11.1	149	32.5(3.8)	11.6
변함없다	448	30.4(2.6)	8.7	217	31.0(3.1)	10.1	231	29.7(3.6)	12.1
늘어났다	176	26.4(3.7)	14.0	91	33.4(5.0)	14.8	85	17.6(4.2)	23.9

주 1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 : (“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 38〉 저작불편호소율(65세 이상)¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	228	32.9(3.0)	9.2	104	32.3(4.9)	15.2	124	33.4(4.3)	12.9
교육수준 ²⁾									
무학	46	48.2(6.7)	13.8	8	—(—)	—	38	47.0(7.0)	15.0
초등학교	72	39.3(5.1)	12.9	26	56.6(8.1)	14.3	46	29.7(7.0)	23.7
중학교	33	26.0(6.2)	23.9	19	—(—)	—	14	—(—)	—
고등학교	53	17.2(4.8)	27.9	33	18.1(6.6)	36.6	20	15.6(8.6)	55.0
대학교 이상	23	25.8(7.5)	29.0	17	—(—)	—	6	—(—)	—
직업									
전문행정관리	7	—(—)	—	6	—(—)	—	1	—(—)	—
사무직	2	—(—)	—	0	—(—)	—	2	—(—)	—
판매·서비스직	12	—(—)	—	2	—(—)	—	10	—(—)	—
농림어업	7	—(—)	—	4	—(—)	—	3	—(—)	—
기능단순노무직	31	40.3(9.8)	24.3	18	—(—)	—	13	—(—)	—
기타 ³⁾	169	34.7(3.8)	11.0	74	32.3(6.9)	21.2	95	36.5(5.0)	13.7
월 가구소득									
100만원 미만	68	47.6(5.7)	11.9	24	55.4(10.2)	18.3	44	43.4(6.9)	15.9
100~200만원 미만	60	28.5(5.7)	19.9	28	28.3(8.1)	28.5	32	28.6(8.3)	29.1
200~300만원 미만	32	19.5(6.9)	35.2	14	—(—)	—	18	—(—)	—
300~400만원 미만	27	26.8(8.8)	33.0	15	—(—)	—	12	—(—)	—
400만원 이상	41	31.5(7.5)	23.9	23	19.1(7.5)	39.1	18	—(—)	—
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	74	25.6(4.9)	19.3	34	21.8(6.9)	31.6	40	28.9(7.6)	26.4
변함없다	136	34.4(4.2)	12.2	63	33.6(6.5)	19.4	73	35.1(5.7)	16.2
늘어났다	18	—(—)	—	7	—(—)	—	11	—(—)	—

주 1) 저작불편호소율(65세 이상) : (“매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 39〉 어제 점심식사 후 치솔질 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	64.5(1.6)	2.5	445	60.3(2.3)	3.8	465	69.1(2.3)	3.3
연령									
19-29	88	67.6(4.7)	6.9	52	71.4(6.4)	9.0	36	62.7(7.9)	12.6
30-39	119	70.1(5.2)	7.5	54	63.0(6.6)	10.4	65	78.3(6.1)	7.8
40-49	177	63.6(4.1)	6.4	94	59.6(5.0)	8.4	83	67.9(6.4)	9.4
50-59	191	67.3(4.1)	6.1	86	53.0(6.5)	12.2	105	83.0(3.6)	4.3
60-69	199	60.3(3.3)	5.5	98	60.2(4.8)	8.0	101	60.5(4.1)	6.8
70 이상	136	57.0(4.2)	7.4	61	56.9(5.9)	10.4	75	57.2(5.4)	9.4
19-64	682	66.2(1.9)	2.8	341	61.5(2.6)	4.2	341	71.6(2.8)	3.9
65 이상	228	57.6(3.5)	6.1	104	54.5(5.0)	9.2	124	60.3(4.3)	7.1
교육수준 ²⁾									
무학	48	59.5(6.9)	11.5	8	-(-)	-	40	63.4(6.9)	10.9
초등학교	80	45.0(6.1)	13.6	29	44.5(9.1)	20.4	51	45.3(7.1)	15.6
중학교	73	48.7(6.0)	12.4	39	46.8(8.7)	18.7	34	50.8(8.3)	16.4
고등학교	372	65.1(2.4)	3.7	194	60.6(3.4)	5.6	178	70.8(3.5)	4.9
대학교 이상	333	71.2(2.8)	3.9	173	65.6(3.9)	5.9	160	77.9(4.3)	5.5
직업									
전문행정관리	119	75.6(4.3)	5.6	59	67.0(6.4)	9.6	60	84.5(5.5)	6.5
사무직	79	74.9(4.6)	6.1	45	74.0(6.4)	8.6	34	76.3(6.7)	8.8
판매·서비스직	108	68.9(5.1)	7.4	30	56.9(9.6)	16.8	78	74.0(4.5)	6.1
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	54.3(3.2)	5.9	178	52.4(3.7)	7.0	45	63.9(6.9)	10.8
기타 ³⁾	362	64.0(2.6)	4.1	120	66.0(4.2)	6.4	242	62.9(3.3)	5.3
월 가구소득									
100만원 미만	80	53.9(6.5)	12.1	28	52.1(11.3)	21.7	52	54.9(5.9)	10.8
100-200만원 미만	86	60.8(5.2)	8.5	36	63.4(8.2)	12.9	50	58.9(7.4)	12.6
200-300만원 미만	108	64.7(5.1)	7.9	52	68.2(6.7)	9.9	56	61.0(7.0)	11.4
300-400만원 미만	149	62.4(4.3)	6.9	80	59.0(5.6)	9.6	69	67.2(6.4)	9.5
400만원 이상	487	66.9(2.1)	3.1	249	59.4(2.8)	4.8	238	75.4(3.1)	4.1
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	60.8(2.9)	4.7	137	52.6(4.6)	8.7	149	69.2(3.5)	5.1
변함없다	448	66.6(2.4)	3.5	217	65.9(3.5)	5.3	231	67.3(3.1)	4.6
늘어났다	176	65.1(3.5)	5.4	91	58.3(4.6)	7.8	85	73.7(5.2)	7.0

주 1) 어제 점심식사 후 치솔질 실천율 : (점심식사 후 치솔질 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 40〉 어제 저녁식사 후 또는 잠자기 전 칫솔질 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	94.0(0.9)	1.0	445	94.4(1.2)	1.3	465	93.6(1.1)	1.1
연령									
19-29	88	93.2(2.6)	2.8	52	94.5(3.1)	3.3	36	91.4(4.5)	4.9
30-39	119	97.1(1.7)	1.7	54	95.9(2.8)	2.9	65	98.4(1.6)	1.6
40-49	177	96.0(1.7)	1.8	94	95.9(2.1)	2.1	83	96.2(1.9)	2.0
50-59	191	98.4(0.9)	0.9	86	97.7(1.6)	1.6	105	99.2(0.8)	0.8
60-69	199	92.5(2.0)	2.2	98	91.9(3.1)	3.4	101	93.1(2.4)	2.6
70 이상	136	81.9(3.3)	4.0	61	85.5(3.5)	4.1	75	79.0(4.6)	5.8
19-64	682	96.0(0.8)	0.9	341	95.7(1.3)	1.3	341	96.4(0.9)	0.9
65 이상	228	85.8(2.4)	2.8	104	88.1(2.7)	3.1	124	84.0(3.4)	4.1
교육수준 ²⁾									
무학	48	75.6(6.2)	8.2	8	-(-)	-	40	75.4(6.9)	9.2
초등학교	80	83.8(3.9)	4.7	29	78.0(6.2)	8.0	51	87.0(4.3)	4.9
중학교	73	85.4(5.0)	5.8	39	83.0(5.9)	7.1	34	88.3(6.5)	7.3
고등학교	372	95.8(1.1)	1.1	194	95.9(1.6)	1.7	178	95.7(1.2)	1.2
대학교 이상	333	97.3(0.9)	1.0	173	97.1(1.3)	1.3	160	97.6(1.2)	1.2
직업									
전문행정관리	119	95.3(1.9)	2.0	59	94.2(2.8)	3.0	60	96.4(2.6)	2.7
사무직	79	99.2(0.8)	0.8	45	100.0(0.0)	0.0	34	98.0(2.1)	2.1
판매·서비스직	108	94.1(2.9)	3.0	30	96.2(3.8)	3.9	78	93.2(3.3)	3.6
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	94.0(1.9)	2.1	178	95.3(2.0)	2.1	45	87.5(5.6)	6.4
기타 ³⁾	362	92.3(1.4)	1.5	120	90.0(2.6)	2.9	242	93.5(1.5)	1.6
월 가구소득									
100만원 미만	80	82.8(4.0)	4.8	28	82.9(6.1)	7.3	52	82.7(4.7)	5.7
100-200만원 미만	86	88.5(4.6)	5.2	36	85.2(6.3)	7.4	50	91.0(4.6)	5.1
200-300만원 미만	108	94.7(2.1)	2.2	52	97.2(2.8)	2.9	56	92.2(3.0)	3.3
300-400만원 미만	149	92.1(2.1)	2.3	80	91.9(3.2)	3.5	69	92.2(1.9)	2.1
400만원 이상	487	96.5(1.0)	1.1	249	96.5(1.2)	1.3	238	96.6(1.2)	1.3
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	96.0(0.9)	1.0	137	96.8(1.4)	1.5	149	95.3(1.2)	1.2
변함없다	448	92.5(1.6)	1.7	217	92.2(2.1)	2.3	231	92.7(1.8)	2.0
늘어났다	176	94.6(2.1)	2.3	91	95.7(2.1)	2.2	85	93.1(2.8)	3.0

주 1) 어제 저녁식사 후 또는 잠자기 전 칫솔질 실천율 : (저녁식사 후 또는 잠자기 전 칫솔질 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 41〉 연간 미충족의료율(치과)¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	736	22.1(1.7)	7.8	359	22.3(2.1)	9.5	377	21.9(2.4)	11.1
연령									
19-29	63	21.4(4.9)	22.8	36	21.4(6.0)	28.1	27	21.4(7.3)	34.0
30-39	89	22.3(4.4)	19.6	40	16.4(5.8)	35.3	49	29.3(5.9)	20.1
40-49	144	23.6(4.2)	17.7	74	29.8(5.5)	18.5	70	17.7(5.0)	28.2
50-59	162	21.6(3.7)	17.1	76	25.0(4.9)	19.7	86	17.7(4.6)	25.7
60-69	168	23.8(3.9)	16.5	83	20.5(5.3)	25.8	85	27.2(4.2)	15.4
70 이상	110	18.1(4.5)	24.7	50	13.4(5.3)	39.8	60	22.0(5.7)	26.0
19-64	545	22.5(1.9)	8.4	271	23.9(2.4)	10.2	274	20.8(2.7)	13.1
65 이상	191	20.7(3.1)	15.0	88	15.0(3.9)	26.1	103	25.5(4.2)	16.3
교육수준 ²⁾									
무학	37	21.4(5.3)	24.9	5	-(-)	-	32	24.7(5.8)	23.5
초등학교	63	21.7(6.0)	27.6	23	14.8(8.1)	54.8	40	25.7(7.0)	27.1
중학교	59	27.1(7.8)	28.7	31	28.6(9.2)	32.2	28	25.4(10.5)	41.5
고등학교	311	24.9(2.7)	11.0	162	26.2(3.2)	12.4	149	23.3(4.1)	17.8
대학교 이상	262	18.0(2.4)	13.2	136	17.6(3.2)	18.2	126	18.5(3.1)	16.6
직업									
전문행정관리	92	14.9(3.8)	25.2	46	18.0(5.9)	32.5	46	11.8(4.4)	37.5
사무직	67	18.4(4.6)	25.2	39	19.7(6.2)	31.6	28	16.4(7.1)	43.2
판매·서비스직	91	28.7(4.6)	16.2	27	29.4(7.3)	24.8	64	28.3(6.1)	21.5
농림어업	13	-(-)	-	9	-(-)	-	4	-(-)	-
기능단순노무직	180	27.0(3.2)	12.0	141	26.3(3.7)	14.2	39	29.9(7.0)	23.4
기타 ³⁾	289	20.0(2.7)	13.4	94	16.0(4.1)	25.9	195	22.0(3.1)	14.3
월 가구소득									
100만원 미만	64	24.5(6.5)	26.7	22	25.4(10.4)	41.0	42	24.0(6.3)	26.1
100-200만원 미만	74	19.2(4.8)	24.8	30	10.1(5.6)	55.8	44	25.7(6.8)	26.4
200-300만원 미만	86	29.0(6.0)	20.6	42	33.2(9.2)	27.9	44	24.5(8.0)	32.5
300-400만원 미만	121	25.9(4.5)	17.4	67	27.3(5.2)	19.2	54	23.8(6.3)	26.4
400만원 이상	391	19.8(2.3)	11.8	198	19.7(2.8)	14.0	193	19.8(3.0)	15.1
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	229	24.1(3.2)	13.5	110	18.9(3.4)	17.7	119	29.3(5.0)	17.0
변함없다	362	19.6(2.1)	10.5	176	21.2(2.9)	13.9	186	17.8(2.8)	15.7
늘어났다	145	25.2(4.4)	17.6	73	29.3(6.2)	21.2	72	20.2(4.7)	23.2

주 1) 연간 미충족의료율(치과) : (최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 42〉 미충족의료 이유(치과)¹⁾

(단위 : %)

구분	N	시간이 없어서		증세가 가벼워서		경제적인 이유		교통편이 불편해서, 거리가 멀어서		병원에서 오래 기다리기 싫어서		병원 등에 예약을 하기 힘들어서		진료 받기가 무서워서		코로나19 유행상황 때문에		기타	
		% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차
전체	736	10.4(1.1)	10.7	4.7(1.0)	20.5	2.6(0.7)	25.6	0.2(0.1)	71.6	0.0(0.0)	.	0.2(0.2)	100.2	2.1(0.6)	26.3	1.3(0.4)	30.9	0.5(0.3)	52.2
성																			
남자	359	13.2(1.8)	13.7	5.0(1.2)	24.4	1.4(0.6)	45.8	0.2(0.2)	99.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.2(0.6)	50.3	0.9(0.5)	58.9	0.4(0.4)	100.2
여자	377	7.5(1.4)	19.0	4.4(1.2)	27.7	3.9(1.1)	28.0	0.2(0.2)	100.0	0.0(0.0)	.	0.4(0.4)	100.1	3.1(1.0)	32.1	1.7(0.6)	35.5	0.7(0.4)	57.8
연령																			
19-29	63	9.1(3.4)	37.2	6.0(3.6)	60.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.6(1.6)	100.7	3.2(2.2)	68.5	0.0(0.0)	.	1.5(1.5)	100.9
30-39	89	13.7(3.4)	24.6	5.5(2.2)	39.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.8(1.2)	70.7	1.4(1.4)	100.3	0.0(0.0)	.
40-49	144	14.4(2.7)	19.0	3.1(1.4)	43.3	1.1(0.8)	70.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.1(1.4)	45.9	1.8(1.1)	58.7	0.0(0.0)	.
50-59	162	14.0(3.0)	21.1	2.3(1.4)	62.9	1.4(0.8)	56.8	0.5(0.5)	100.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.2(1.1)	49.4	0.8(0.8)	98.5	0.4(0.4)	100.4
60-69	168	6.5(2.0)	31.3	6.5(2.0)	30.9	6.0(2.1)	35.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.2(0.9)	70.1	3.0(1.2)	39.8	0.6(0.6)	100.5
70 이상	110	1.0(1.0)	98.2	7.3(2.6)	35.0	7.5(3.0)	39.7	0.7(0.7)	101.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.8(0.8)	100.7	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	99.7
19-64	545	12.2(1.3)	10.9	4.1(1.2)	28.7	1.6(0.5)	32.5	0.1(0.1)	100.0	0.0(0.0)	.	0.3(0.3)	100.7	2.4(0.7)	28.2	1.2(0.5)	37.9	0.5(0.3)	60.8
65 이상	191	3.4(1.1)	31.7	7.1(1.7)	24.3	6.7(1.9)	28.9	0.4(0.4)	100.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.0(0.7)	70.9	1.6(0.8)	48.3	0.5(0.5)	99.0
교육수준 ²⁾																			
무학	37	6.3(0.9)	14.7	0.0(0.0)	.	12.5(5.3)	42.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.6(2.5)	95.8
초등학교	63	0.0(0.0)	.	10.0(4.7)	47.1	8.9(3.7)	41.4	1.2(1.2)	104.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.6(1.6)	102.2	0.0(0.0)	.
중학교	59	14.5(6.0)	41.6	6.2(3.3)	52.6	4.7(2.6)	54.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.7(1.7)	100.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
고등학교	311	12.2(1.8)	14.5	4.8(1.4)	28.7	2.2(0.9)	42.6	0.3(0.3)	100.2	0.0(0.0)	.	0.5(0.5)	100.1	2.5(0.8)	34.2	1.8(0.8)	42.8	0.7(0.5)	74.1
대학교 이상	262	10.0(1.9)	19.1	4.0(1.3)	31.8	0.3(0.3)	100.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.4(1.0)	41.8	1.1(0.6)	57.9	0.3(0.3)	100.7
직업																			
전문행정관리	92	12.6(3.6)	28.6	0.0(0.0)	.	0.7(0.7)	99.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.8(0.8)	100.4	0.0(0.0)	.	0.8(0.8)	100.6
사무직	67	14.9(4.2)	28.4	2.3(1.6)	70.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.2(1.2)	101.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	91	13.2(3.7)	27.9	4.1(2.6)	63.6	3.9(1.9)	47.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.7(1.7)	95.8	5.8(2.6)	44.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
농림어업	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	180	15.8(2.7)	17.2	5.8(1.6)	28.3	1.3(0.8)	57.6	0.4(0.4)	99.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.0(0.7)	70.8	1.9(1.1)	58.9	0.8(0.7)	99.4
기타 ³⁾	289	3.2(1.1)	32.7	6.4(1.9)	29.0	4.7(1.6)	34.1	0.2(0.2)	100.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.5(1.1)	43.6	2.3(0.8)	35.1	0.6(0.4)	69.6
월 가구소득																			
100만원 미만	64	3.7(0.5)	12.2	6.9(4.3)	62.4	11.1(5.2)	46.5	1.1(1.2)	103.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.5(1.5)	98.4
100-200만원 미만	74	3.2(2.1)	65.9	5.7(2.6)	44.8	9.0(4.0)	44.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.2(1.2)	98.6	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	86	14.3(4.6)	32.2	3.6(2.8)	75.8	1.1(1.1)	98.9	1.0(1.0)	98.9	0.0(0.0)	.	1.8(1.7)	95.3	6.1(2.0)	33.5	1.0(1.0)	99.7	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	121	13.5(3.1)	22.9	4.6(1.8)	38.4	2.8(1.3)	47.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.5(1.0)	71.5	2.2(1.3)	59.4	1.2(1.2)	99.5
400만원 이상	391	10.6(1.6)	14.6	4.6(1.6)	35.4	0.8(0.5)	61.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.0(0.8)	37.4	1.3(0.6)	45.4	0.4(0.3)	70.9
작년 대비 가구소득 변화																			
줄어들었다	229	10.7(2.1)	19.3	3.5(1.7)	48.3	3.8(1.5)	38.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.7(0.7)	98.9	3.7(1.4)	36.3	1.7(0.8)	48.2	0.0(0.0)	.
변함없다	362	7.7(1.5)	19.1	5.3(1.2)	23.4	2.2(0.9)	39.4	0.4(0.3)	71.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.8(0.7)	42.1	1.4(0.6)	44.0	0.8(0.5)	60.5
늘어났다	145	16.7(3.5)	21.1	5.2(2.1)	40.3	1.8(1.3)	73.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.5(0.4)	96.8	0.5(0.5)	104.5	0.5(0.5)	99.9

주 1) 미충족의료 이유(치과) : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사체계

제2부

주요통계결과

제3부

통계표

제4부

부록

〈표 43〉 하루 평균 수면시간(주중)¹⁾

(단위 : %, 시간)

구분	N	6시간 이하		7-8시간		9시간 이상		평균 수면	
		%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	시간 (표준오차)	상대 표준오차
전체	910	47.0(1.6)	3.3	49.6(1.5)	3.0	3.4(0.6)	16.6	6.6(0.0)	0.6
성									
남자	445	48.5(2.3)	4.8	48.0(2.2)	4.5	3.5(0.8)	22.6	6.5(0.1)	0.9
여자	465	45.5(2.4)	5.3	51.3(2.3)	4.6	3.3(0.7)	21.5	6.6(0.1)	0.9
연령									
19-29	88	39.2(5.2)	13.1	56.3(5.1)	9.1	4.4(1.7)	39.5	6.7(0.1)	1.5
30-39	119	40.9(4.5)	11.1	55.6(4.7)	8.5	3.5(1.5)	43.6	6.7(0.1)	1.4
40-49	177	45.8(3.6)	7.9	52.2(3.5)	6.7	2.0(0.9)	45.0	6.6(0.1)	1.3
50-59	191	53.7(4.2)	7.9	44.9(4.0)	9.0	1.4(0.8)	58.1	6.5(0.1)	1.6
60-69	199	51.5(3.6)	6.9	45.0(3.6)	7.9	3.5(1.3)	36.8	6.4(0.1)	1.6
70 이상	136	45.6(3.9)	8.6	46.3(4.0)	8.6	8.1(2.7)	33.4	6.6(0.1)	1.9
19-64	682	46.4(1.9)	4.2	51.0(1.9)	3.6	2.6(0.5)	20.4	6.6(0.0)	0.7
65 이상	228	49.7(2.9)	5.9	43.6(3.0)	6.9	6.7(2.0)	29.6	6.5(0.1)	1.5
교육수준 ²⁾									
무학	48	44.5(8.4)	18.8	44.6(8.8)	19.8	11.0(4.0)	36.7	6.6(0.2)	3.6
초등학교	80	47.5(6.2)	13.0	43.8(6.7)	15.2	8.7(3.8)	44.1	6.6(0.1)	2.2
중학교	73	52.7(6.4)	12.2	45.4(6.3)	13.9	1.9(1.4)	74.1	6.4(0.2)	3.2
고등학교	372	48.1(2.9)	6.0	48.9(2.7)	5.5	2.9(0.8)	27.2	6.5(0.1)	1.1
대학교 이상	333	44.7(2.6)	5.9	52.9(2.7)	5.0	2.4(0.8)	32.0	6.6(0.1)	0.8
직업									
전문행정관리	119	52.0(4.8)	9.1	46.1(4.8)	10.4	1.8(1.1)	58.6	6.4(0.1)	1.5
사무직	79	46.3(5.7)	12.4	53.7(5.7)	10.7	0.0(0.0)	.	6.6(0.1)	1.7
판매·서비스직	108	49.9(5.3)	10.5	48.1(5.4)	11.2	2.0(1.4)	71.6	6.5(0.1)	1.9
농림어업	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	223	52.1(3.2)	6.2	45.6(3.3)	7.3	2.3(0.8)	33.6	6.5(0.1)	1.0
기타 ³⁾	362	42.0(2.6)	6.3	51.7(2.7)	5.3	6.3(1.4)	21.6	6.7(0.1)	1.2
월 가구소득									
100만원 미만	80	39.4(4.4)	11.3	51.3(5.5)	10.6	9.3(3.7)	39.7	6.8(0.1)	2.1
100-200만원 미만	86	52.3(5.7)	10.8	39.6(5.7)	14.4	8.0(3.3)	41.5	6.5(0.2)	2.7
200-300만원 미만	108	49.7(5.5)	11.1	48.8(5.7)	11.7	1.5(1.0)	69.4	6.4(0.1)	1.9
300-400만원 미만	149	45.7(4.1)	8.9	52.2(3.9)	7.5	2.0(1.1)	56.0	6.6(0.1)	1.6
400만원 이상	487	47.0(2.1)	4.5	50.2(2.1)	4.1	2.8(0.6)	22.9	6.5(0.0)	0.8
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	47.7(2.9)	6.0	48.4(3.1)	6.3	3.8(1.1)	29.4	6.6(0.1)	1.1
변함없다	448	47.6(2.3)	4.8	48.5(2.4)	4.9	3.9(0.9)	24.1	6.5(0.1)	0.9
늘어났다	176	44.5(4.4)	10.0	53.9(4.2)	7.9	1.6(1.2)	76.3	6.6(0.1)	1.4

주 1) 하루 평균 수면시간(주중) : 주중(또는 일하는 날) 하루에 보통 자는 시간의 합 / 조사대상 응답자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 44〉 하루 평균 수면시간(주말)¹⁾

(단위 : %, 시간)

구분	N	6시간 이하		7-8시간		9시간 이상		평균 수면	
		%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	시간 (표준오차)	상대 표준오차
전체	910	34.5(1.6)	4.5	51.5(1.6)	3.2	13.9(1.3)	9.1	7.1(0.1)	0.7
성									
남자	445	33.9(2.3)	6.8	51.5(2.3)	4.4	14.7(1.7)	11.4	7.1(0.1)	1.0
여자	465	35.3(2.0)	5.8	51.6(2.2)	4.3	13.2(1.5)	11.2	7.0(0.1)	0.9
연령									
19-29	88	18.4(4.2)	22.9	56.4(6.3)	11.3	25.3(4.5)	17.8	7.8(0.1)	1.6
30-39	119	25.1(4.4)	17.6	50.9(5.7)	11.1	24.0(4.2)	17.5	7.6(0.1)	1.9
40-49	177	24.3(3.3)	13.4	58.4(3.9)	6.7	17.3(3.1)	17.7	7.3(0.1)	1.5
50-59	191	41.1(4.0)	9.8	51.2(3.5)	6.9	7.7(1.8)	23.6	6.8(0.1)	1.7
60-69	199	50.4(3.9)	7.7	44.7(4.0)	9.0	4.9(1.3)	27.3	6.5(0.1)	1.6
70 이상	136	44.1(3.9)	8.9	46.3(4.3)	9.2	9.6(2.8)	29.1	6.7(0.1)	1.8
19-64	682	31.1(1.9)	6.2	53.6(2.0)	3.7	15.3(1.5)	9.7	7.2(0.1)	0.8
65 이상	228	48.6(2.9)	5.9	42.9(3.4)	7.9	8.4(2.0)	24.0	6.6(0.1)	1.4
교육수준 ²⁾									
무학	48	44.5(8.4)	18.8	44.6(8.8)	19.8	11.0(4.0)	36.7	6.6(0.2)	3.6
초등학교	80	44.1(6.2)	14.0	46.2(6.9)	14.9	9.8(3.9)	40.4	6.7(0.2)	2.3
중학교	73	51.1(6.9)	13.5	42.4(6.7)	15.9	6.4(3.0)	46.4	6.6(0.2)	3.6
고등학교	372	34.4(2.4)	7.0	52.8(2.7)	5.2	12.8(2.0)	15.8	7.0(0.1)	1.1
대학교 이상	333	28.4(2.6)	9.1	53.8(2.8)	5.1	17.8(2.0)	11.2	7.3(0.1)	1.0
직업									
전문행정관리	119	30.0(5.0)	16.7	54.2(5.4)	10.0	15.8(2.9)	18.6	7.3(0.1)	1.6
사무직	79	24.1(5.3)	22.2	56.3(4.9)	8.7	19.6(4.5)	22.9	7.4(0.2)	2.0
판매·서비스직	108	38.4(5.6)	14.5	52.0(5.5)	10.6	9.6(3.0)	31.6	6.8(0.2)	2.2
농림어업	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	223	35.7(3.1)	8.7	47.4(3.7)	7.9	16.8(2.5)	15.0	7.2(0.1)	1.2
기타 ³⁾	362	37.7(2.5)	6.8	50.5(2.7)	5.4	11.9(1.9)	15.8	6.9(0.1)	1.2
월 가구소득									
100만원 미만	80	35.1(4.8)	13.8	51.5(5.8)	11.2	13.3(4.1)	30.4	7.0(0.1)	2.0
100-200만원 미만	86	53.5(5.6)	10.4	32.2(4.8)	14.8	14.3(4.0)	27.9	6.7(0.2)	3.2
200-300만원 미만	108	39.2(4.8)	12.4	43.3(5.3)	12.2	17.5(4.7)	27.1	7.1(0.2)	2.6
300-400만원 미만	149	31.3(4.0)	12.8	54.0(4.2)	7.7	14.8(3.2)	21.7	7.2(0.1)	1.8
400만원 이상	487	31.7(2.1)	6.5	55.3(2.2)	3.9	13.0(1.6)	12.7	7.1(0.1)	0.9
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	40.7(3.1)	7.6	45.8(3.4)	7.4	13.4(2.2)	16.6	7.0(0.1)	1.4
변함없다	448	34.5(2.1)	6.0	52.6(2.3)	4.3	12.8(1.6)	12.7	7.0(0.1)	1.0
늘어났다	176	25.1(3.2)	12.7	57.5(3.5)	6.0	17.5(2.9)	16.6	7.4(0.1)	1.4

주 1) 하루 평균 수면시간(주말) : 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날) 하루에 보통 자는 시간의 합 / 조사대상 응답자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 45〉 스트레스 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	21.2(1.2)	5.8	445	21.8(2.3)	10.3	465	20.6(1.8)	8.6
연령									
19-29	88	24.2(4.0)	16.5	52	24.5(6.1)	24.7	36	23.9(6.7)	28.2
30-39	119	29.5(3.9)	13.2	54	26.8(5.7)	21.4	65	32.6(5.6)	17.2
40-49	177	21.5(3.0)	13.9	94	20.9(4.1)	19.5	83	22.2(4.4)	19.8
50-59	191	17.8(2.6)	14.8	86	22.1(4.5)	20.5	105	13.1(3.2)	24.4
60-69	199	20.4(2.5)	12.4	98	20.1(4.4)	21.8	101	20.6(3.2)	15.5
70 이상	136	15.6(3.5)	22.1	61	14.5(4.3)	30.0	75	16.5(4.8)	29.0
19-64	682	22.6(1.5)	6.7	341	23.6(2.6)	11.1	341	21.5(2.2)	10.1
65 이상	228	15.6(2.8)	17.7	104	13.3(3.4)	25.6	124	17.6(3.5)	19.9
교육수준 ²⁾									
무학	48	22.9(5.8)	25.5	8	-(-)	-	40	25.5(6.7)	26.3
초등학교	80	15.0(3.5)	23.3	29	20.8(7.3)	34.9	51	11.8(4.3)	36.2
중학교	73	19.4(4.8)	24.7	39	21.8(7.1)	32.4	34	16.5(5.8)	35.2
고등학교	372	20.4(2.1)	10.1	194	17.6(3.1)	17.6	178	24.0(3.3)	13.6
대학교 이상	333	23.0(2.1)	9.0	173	26.8(3.4)	12.5	160	18.6(2.7)	14.7
직업									
전문행정관리	119	23.4(3.7)	15.8	59	30.9(6.6)	21.3	60	15.5(4.5)	28.8
사무직	79	25.8(5.2)	20.2	45	26.8(7.3)	27.4	34	24.3(8.4)	34.7
판매·서비스직	108	25.1(4.5)	17.8	30	17.1(6.8)	39.5	78	28.4(5.3)	18.6
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	20.7(2.8)	13.3	178	21.4(3.0)	14.1	45	17.5(5.2)	29.7
기타 ³⁾	362	18.7(1.8)	9.8	120	16.5(3.8)	23.0	242	19.9(2.4)	11.9
월 가구소득									
100만원 미만	80	22.0(5.0)	22.6	28	33.6(10.1)	30.2	52	15.7(4.2)	26.7
100-200만원 미만	86	10.9(3.9)	36.0	36	7.8(4.5)	57.5	50	13.2(4.8)	36.5
200-300만원 미만	108	27.8(5.7)	20.6	52	31.5(7.3)	23.0	56	23.9(6.8)	28.6
300-400만원 미만	149	27.8(3.3)	11.8	80	24.0(4.8)	19.9	69	33.1(5.3)	16.0
400만원 이상	487	19.4(1.7)	9.0	249	19.8(3.0)	15.4	238	18.8(2.5)	13.2
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	21.4(2.2)	10.1	137	19.4(3.3)	17.1	149	23.4(3.5)	15.1
변함없다	448	18.9(1.8)	9.6	217	20.8(3.1)	14.7	231	17.1(2.5)	14.6
늘어났다	176	26.6(3.8)	14.2	91	27.4(5.8)	21.1	85	25.6(4.1)	16.1

주 1) 스트레스 인지율 : (평소 일상생활 중 스트레스를 "대단히 많이 느낀다" 또는 "많이 느끼는 편이다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 46〉 우울감 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	5.8(0.8)	13.6	445	4.8(1.2)	24.1	465	7.0(1.0)	14.2
연령									
19-29	88	4.4(2.3)	51.2	52	3.6(2.5)	69.9	36	5.4(3.8)	69.4
30-39	119	7.3(2.4)	33.0	54	8.7(3.8)	43.9	65	5.7(2.8)	49.3
40-49	177	3.7(1.4)	39.0	94	3.2(2.3)	71.5	83	4.2(2.0)	47.0
50-59	191	4.3(1.3)	31.3	86	5.0(2.3)	45.9	105	3.5(1.6)	45.7
60-69	199	7.1(1.8)	25.4	98	2.2(1.6)	69.4	101	12.0(2.8)	23.5
70 이상	136	10.7(3.0)	27.9	61	8.5(4.5)	52.9	75	12.4(3.6)	28.8
19-64	682	4.7(0.8)	17.4	341	4.3(1.2)	28.2	341	5.2(1.0)	20.3
65 이상	228	10.5(2.4)	22.6	104	7.1(3.5)	48.6	124	13.3(2.6)	19.5
교육수준 ²⁾									
무학	48	21.9(4.9)	22.3	8	-(-)	-	40	26.1(5.6)	21.4
초등학교	80	6.7(3.6)	53.1	29	4.6(4.4)	97.0	51	7.9(3.7)	47.6
중학교	73	5.2(2.4)	47.1	39	7.1(3.9)	54.8	34	2.9(2.8)	96.4
고등학교	372	6.0(1.4)	23.7	194	5.9(1.9)	32.2	178	6.2(1.8)	29.1
대학교 이상	333	3.6(0.9)	24.1	173	3.4(1.3)	39.0	160	4.0(1.3)	31.7
직업									
전문행정관리	119	2.9(1.4)	49.1	59	3.0(2.2)	70.8	60	2.7(1.8)	68.3
사무직	79	4.3(2.0)	46.9	45	2.4(2.3)	97.3	34	7.2(3.8)	52.8
판매·서비스직	108	7.3(3.5)	48.4	30	3.8(3.7)	95.9	78	8.7(3.8)	43.1
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	5.8(1.9)	32.7	178	6.0(2.3)	37.3	45	4.7(3.2)	68.0
기타 ³⁾	362	7.3(1.3)	17.6	120	5.5(2.6)	46.9	242	8.2(1.5)	18.3
월 가구소득									
100만원 미만	80	16.1(4.6)	28.8	28	9.8(6.9)	71.1	52	19.5(5.2)	26.8
100-200만원 미만	86	7.1(3.4)	48.1	36	8.0(4.6)	57.2	50	6.5(3.7)	57.8
200-300만원 미만	108	11.1(3.8)	34.1	52	11.3(4.2)	37.6	56	11.0(4.7)	42.8
300-400만원 미만	149	5.1(1.8)	34.8	80	2.7(1.9)	70.2	69	8.4(3.4)	40.0
400만원 이상	487	3.5(0.8)	21.8	249	3.4(1.2)	35.0	238	3.7(1.2)	31.7
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	6.9(1.7)	24.2	137	5.3(1.9)	36.2	149	8.5(2.5)	29.0
변함없다	448	6.2(1.1)	17.9	217	4.3(1.5)	34.7	231	8.1(1.4)	16.7
늘어났다	176	3.3(1.2)	37.7	91	5.0(2.1)	41.9	85	1.1(1.1)	100.1

주 1) 우울감 경험률 : (최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 47〉 스트레스 및 우울증상으로 인한 정신상담률

(단위 : %)

구분	스트레스로 인한 정신상담률 ¹⁾			우울증상으로 인한 정신상담률 ²⁾		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	191	7.2(2.0)	27.4	56	14.5(4.6)	31.4
성						
남자	94	7.5(2.9)	39.3	21	16.3(7.3)	44.7
여자	97	6.9(2.7)	39.6	35	13.1(5.6)	42.9
연령						
19-29	22	4.2(4.2)	99.9	4	-(-)	-
30-39	36	9.6(5.2)	54.9	9	-(-)	-
40-49	41	6.0(3.4)	56.6	6	-(-)	-
50-59	34	0.0(0.0)	.	9	-(-)	-
60-69	37	20.2(7.4)	36.5	13	-(-)	-
70 이상	21	0.0(0.0)	.	15	-(-)	-
19-64	157	6.1(2.1)	34.1	33	18.3(6.2)	34.1
65 이상	34	13.5(5.5)	40.5	23	7.6(5.4)	70.8
교육수준 ³⁾						
무학	9	-(-)	-	10	-(-)	-
초등학교	13	-(-)	-	5	-(-)	-
중학교	14	-(-)	-	4	-(-)	-
고등학교	73	8.6(4.0)	46.9	22	15.5(7.4)	47.3
대학교 이상	80	8.7(2.6)	29.9	14	-(-)	-
직업						
전문행정관리	30	7.7(4.3)	56.4	4	-(-)	-
사무직	20	3.6(3.5)	98.4	4	-(-)	-
판매·서비스직	26	6.0(5.7)	96.3	7	-(-)	-
농림어업	1	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	47	5.1(3.0)	58.5	12	-(-)	-
기타 ⁴⁾	66	10.6(4.8)	45.3	29	19.0(7.9)	41.4
월 가구소득						
100만원 미만	16	-(-)	-	12	-(-)	-
100-200만원 미만	9	-(-)	-	6	-(-)	-
200-300만원 미만	28	12.5(8.0)	63.6	12	-(-)	-
300-400만원 미만	40	3.9(2.8)	71.9	8	-(-)	-
400만원 이상	98	7.1(2.5)	35.4	18	-(-)	-
작년 대비 가구소득 변화						
줄어들었다	62	4.3(2.5)	56.8	20	21.3(8.4)	39.6
변함없다	85	6.0(2.4)	40.7	30	12.9(6.5)	50.2
늘어났다	44	12.8(5.8)	45.2	6	-(-)	-

주 1) 스트레스로 인한 정신상담률 : (스트레스로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수 / 평소 일상생활 중 스트레스를 "대단히 많이 느낀다" 또는 "많이 느끼는 편이다"에 응답한 사람의 수) × 100

2) 우울증상으로 인한 정신상담률 : (우울증상으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수 / 최근 1년 동안 연속 적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 48〉 우울증상유병률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	1.7(0.4)	23.5	444	1.4(0.6)	42.7	465	2.0(0.6)	27.6
연령									
19-29	88	2.2(1.6)	72.5	52	1.8(1.8)	100.8	36	2.8(2.7)	98.5
30-39	119	1.8(1.1)	57.9	54	1.2(1.2)	99.6	65	2.5(1.8)	71.9
40-49	177	0.6(0.6)	100.3	94	1.1(1.1)	98.9	83	0.0(0.0)	.
50-59	191	0.5(0.0)	7.7	86	0.0(0.0)	.	105	1.0(0.1)	9.0
60-69	199	3.2(1.1)	33.1	98	2.2(1.6)	70.7	101	4.2(1.4)	33.2
70 이상	135	2.8(1.3)	48.4	60	3.1(2.2)	71.2	75	2.5(1.8)	70.8
19-64	682	1.0(0.4)	38.0	341	0.8(0.5)	59.5	341	1.2(0.6)	48.0
65 이상	227	4.7(1.4)	29.1	103	4.1(2.5)	61.3	124	5.1(1.6)	30.3
교육수준 ²⁾									
무학	48	6.6(1.9)	29.4	8	-(-)	-	40	7.8(2.3)	29.4
초등학교	79	4.4(2.4)	54.7	28	8.7(5.9)	67.2	51	2.0(2.0)	97.4
중학교	73	1.1(1.1)	98.7	39	2.0(2.0)	97.0	34	0.0(0.0)	.
고등학교	372	2.0(0.7)	35.6	194	1.0(0.8)	73.9	178	3.2(1.3)	39.5
대학교 이상	333	0.5(0.3)	71.0	173	0.9(0.6)	71.0	160	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	119	0.0(0.0)	.	59	0.0(0.0)	.	60	0.0(0.0)	.
사무직	79	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.	34	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	108	2.4(1.7)	70.8	30	3.0(3.0)	99.8	78	2.1(2.1)	96.5
농림어업	14	-(-)	-	9	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	0.6(0.4)	72.4	178	0.4(0.4)	100.6	45	1.3(1.3)	100.0
기타 ³⁾	362	3.4(0.9)	25.8	120	4.1(2.1)	51.9	242	3.1(0.8)	26.9
월 가구소득									
100만원 미만	80	7.6(2.7)	35.4	28	10.2(7.0)	68.4	52	6.2(1.9)	30.1
100-200만원 미만	85	2.4(1.7)	70.8	35	5.7(4.0)	70.5	50	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	108	2.2(1.2)	54.9	52	2.7(1.8)	67.8	56	1.6(1.6)	98.0
300-400만원 미만	149	0.4(0.4)	100.6	80	0.0(0.0)	.	69	0.9(0.9)	100.7
400만원 이상	487	1.2(0.5)	39.7	249	0.3(0.3)	98.6	238	2.1(0.9)	43.3
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	1.4(0.6)	45.6	137	0.0(0.0)	.	149	2.8(1.3)	45.8
변함없다	447	2.2(0.6)	28.5	216	2.2(1.0)	46.3	231	2.3(0.8)	32.7
늘어났다	176	0.8(0.6)	67.9	91	1.5(1.0)	68.9	85	0.0(0.0)	.

주 1) 우울증상유병률 : (우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 49〉 자살생각률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	5.7(0.9)	15.6	445	4.6(1.1)	22.9	465	6.8(1.3)	19.3
연령									
19-29	88	4.6(2.3)	49.6	52	1.8(1.8)	100.8	36	8.3(4.5)	54.1
30-39	119	8.3(3.2)	38.7	54	6.8(3.3)	48.2	65	9.9(4.3)	43.7
40-49	177	3.2(1.8)	55.7	94	3.2(3.1)	96.5	83	3.1(1.7)	55.7
50-59	191	3.1(1.4)	43.8	86	5.1(2.5)	48.4	105	0.9(0.9)	98.7
60-69	199	5.3(1.7)	31.0	98	3.9(1.9)	49.4	101	6.8(3.0)	45.0
70 이상	136	14.0(3.1)	22.4	61	9.1(3.1)	33.9	75	17.8(5.0)	28.2
19-64	682	4.1(0.8)	20.5	341	3.7(1.1)	31.0	341	4.6(1.2)	25.2
65 이상	228	12.3(2.6)	20.8	104	9.3(2.9)	31.5	124	14.7(4.0)	27.0
교육수준 ²⁾									
무학	48	27.2(6.5)	23.9	8	-(-)	-	40	28.0(8.1)	28.8
초등학교	80	7.7(3.7)	47.9	29	4.6(4.4)	97.0	51	9.5(4.1)	43.6
중학교	73	3.2(1.9)	57.6	39	5.9(3.2)	53.5	34	0.0(0.0)	.
고등학교	372	4.9(1.1)	22.0	194	2.8(1.3)	47.9	178	7.4(1.9)	25.9
대학교 이상	333	4.4(1.1)	24.8	173	5.9(1.9)	32.6	160	2.6(1.1)	41.5
직업									
전문행정관리	119	3.4(1.8)	51.5	59	5.5(3.4)	61.5	60	1.2(1.2)	99.8
사무직	79	5.7(2.4)	41.9	45	6.6(3.6)	54.2	34	4.3(2.9)	68.7
판매·서비스직	108	7.1(2.7)	37.7	30	3.7(3.6)	99.1	78	8.5(3.5)	41.5
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	2.6(1.2)	45.2	178	2.7(1.4)	50.3	45	2.2(2.2)	99.8
기타 ³⁾	362	8.5(1.8)	21.6	120	7.2(2.6)	36.7	242	9.3(2.4)	26.0
월 가구소득									
100만원 미만	80	20.0(4.9)	24.6	28	15.2(8.7)	57.6	52	22.6(6.6)	29.3
100-200만원 미만	86	5.8(2.6)	44.3	36	10.7(5.2)	49.1	50	2.1(2.1)	99.7
200-300만원 미만	108	8.0(2.5)	31.5	52	4.9(2.8)	56.9	56	11.4(3.9)	34.4
300-400만원 미만	149	3.8(1.2)	32.6	80	0.8(0.8)	100.5	69	7.8(3.1)	40.1
400만원 이상	487	4.0(1.1)	27.0	249	4.2(1.5)	36.4	238	3.7(1.1)	30.2
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	4.1(1.4)	33.4	137	2.6(1.5)	58.0	149	5.6(2.3)	41.0
변함없다	448	7.0(1.2)	17.4	217	5.9(1.7)	28.9	231	8.2(1.6)	19.9
늘어났다	176	4.8(2.1)	42.9	91	4.5(2.3)	51.3	85	5.2(2.5)	48.0

주 1) 자살생각률 : (최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 50〉 자살생각행동 원인¹⁾

(단위 : %)

구분	N	경제적 어려움 때문에		이성문제 때문에		질병 또는 장애 때문에		직장문제 때문에		외로움, 고독 때문에		가정불화로 인해		진로문제로 인해		기타	
		%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대
		(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차
전체	55	13.0(3.3)	25.2	0.0(0.0)	.	22.1(5.2)	23.3	7.3(5.4)	74.1	26.1(6.2)	23.8	6.4(3.7)	57.2	3.1(3.1)	99.2	21.9(6.3)	28.9
성																	
남자	21	11.7(5.6)	47.4	0.0(0.0)	.	18.1(8.8)	48.2	10.1(7.1)	69.7	25.6(11.3)	44.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	34.3(11.2)	32.6
여자	34	14.0(4.7)	33.6	0.0(0.0)	.	25.1(4.8)	19.1	5.2(5.1)	97.9	26.4(7.3)	27.4	11.1(6.2)	56.0	5.4(5.2)	96.6	12.8(5.5)	42.6
연령																	
19-29	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
60-69	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
70 이상	20	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	48.4(12.3)	25.3	0.0(0.0)	.	35.7(11.3)	31.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	16.0(9.8)	61.2
19-64	26	22.6(5.5)	24.5	0.0(0.0)	.	9.3(6.5)	69.4	9.1(8.8)	96.5	21.9(8.8)	40.1	11.2(6.5)	58.1	5.4(5.4)	98.9	20.4(7.0)	34.5
65 이상	29	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	39.5(8.7)	22.1	4.7(4.5)	94.5	31.8(7.8)	24.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	24.0(9.5)	39.8
교육수준 ²⁾																	
무학	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
대학교 이상	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
직업																	
전문행정관리	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
사무직	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
농림어업	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기타 ³⁾	35	11.6(4.3)	37.3	0.0(0.0)	.	33.3(6.7)	20.0	9.1(5.9)	65.2	32.5(7.9)	24.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	13.6(5.2)	38.4
월 가구소득																	
100만원 미만	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
300-400만원 미만	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
400만원 이상	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
작년 대비 가구소득 변화																	
줄어들었다	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
변함없다	36	8.8(4.3)	49.2	0.0(0.0)	.	28.2(6.7)	23.7	8.2(5.8)	70.5	21.4(6.9)	32.1	2.5(2.4)	97.5	5.1(5.0)	97.1	25.7(7.6)	29.5
늘어났다	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-

주 1) 자살생각행동 원인 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 51〉 자살시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	0.3(0.2)	60.2	445	0.3(0.3)	100.7	465	0.4(0.3)	70.7
연령									
19-29	88	1.0(1.0)	101.6	52	1.8(1.8)	100.8	36	0.0(0.0)	.
30-39	119	0.0(0.0)	.	54	0.0(0.0)	.	65	0.0(0.0)	.
40-49	177	0.0(0.0)	.	94	0.0(0.0)	.	83	0.0(0.0)	.
50-59	191	0.0(0.0)	.	86	0.0(0.0)	.	105	0.0(0.0)	.
60-69	199	1.0(0.7)	72.0	98	0.0(0.0)	.	101	2.0(1.4)	71.2
70 이상	136	0.0(0.0)	.	61	0.0(0.0)	.	75	0.0(0.0)	.
19-64	682	0.3(0.2)	73.2	341	0.4(0.4)	100.7	341	0.3(0.3)	100.0
65 이상	228	0.4(0.4)	99.2	104	0.0(0.0)	.	124	0.8(0.8)	99.2
교육수준 ²⁾									
무학	48	2.2(2.2)	97.9	8	-(-)	-	40	2.7(2.6)	97.3
초등학교	80	0.0(0.0)	.	29	0.0(0.0)	.	51	0.0(0.0)	.
중학교	73	0.0(0.0)	.	39	0.0(0.0)	.	34	0.0(0.0)	.
고등학교	372	0.6(0.4)	74.6	194	0.6(0.7)	100.8	178	0.4(0.4)	100.8
대학교 이상	333	0.0(0.0)	.	173	0.0(0.0)	.	160	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	119	0.0(0.0)	.	59	0.0(0.0)	.	60	0.0(0.0)	.
사무직	79	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.	34	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	108	0.0(0.0)	.	30	0.0(0.0)	.	78	0.0(0.0)	.
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	0.0(0.0)	.	178	0.0(0.0)	.	45	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	362	0.9(0.5)	60.0	120	1.2(1.2)	100.3	242	0.7(0.5)	70.9
월 가구소득									
100만원 미만	80	2.2(2.1)	97.4	28	6.3(6.0)	96.1	52	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	86	1.2(1.2)	99.4	36	0.0(0.0)	.	50	2.1(2.1)	99.7
200-300만원 미만	108	0.0(0.0)	.	52	0.0(0.0)	.	56	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	149	0.0(0.0)	.	80	0.0(0.0)	.	69	0.0(0.0)	.
400만원 이상	487	0.1(0.1)	100.5	249	0.0(0.0)	.	238	0.3(0.3)	100.8
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	0.3(0.3)	100.6	137	0.0(0.0)	.	149	0.6(0.6)	100.4
변함없다	448	0.5(0.4)	72.5	217	0.6(0.6)	100.6	231	0.4(0.4)	99.0
늘어났다	176	0.0(0.0)	.	91	0.0(0.0)	.	85	0.0(0.0)	.

주 1) 자살시도율 : (최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 52〉 자살생각 및 자살시도로 인한 정신상담률

(단위 : %)

구분	자살생각으로 인한 정신상담률 ¹⁾			자살시도로 인한 정신상담률 ²⁾		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	55	11.1(3.9)	34.8	3	-(-)	-
성						
남자	21	6.4(6.2)	97.1	1	-(-)	-
여자	34	14.5(4.6)	31.3	2	-(-)	-
연령						
19-29	4	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	10	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	5	-(-)	-	0	-(-)	-
50-59	5	-(-)	-	0	-(-)	-
60-69	11	-(-)	-	2	-(-)	-
70 이상	20	0.0(0.0)	.	0	-(-)	-
19-64	26	13.4(6.2)	45.9	2	-(-)	-
65 이상	29	7.9(3.3)	41.3	1	-(-)	-
교육수준 ³⁾						
무학	14	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	6	-(-)	-	0	-(-)	-
중학교	3	-(-)	-	0	-(-)	-
고등학교	17	-(-)	-	2	-(-)	-
대학교 이상	15	-(-)	-	0	-(-)	-
직업						
전문행정관리	4	-(-)	-	0	-(-)	-
사무직	5	-(-)	-	0	-(-)	-
판매·서비스직	6	-(-)	-	0	-(-)	-
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	5	-(-)	-	0	-(-)	-
기타 ⁴⁾	35	17.3(5.9)	34.0	3	-(-)	-
월 가구소득						
100만원 미만	17	-(-)	-	1	-(-)	-
100-200만원 미만	5	-(-)	-	1	-(-)	-
200-300만원 미만	9	-(-)	-	0	-(-)	-
300-400만원 미만	5	-(-)	-	0	-(-)	-
400만원 이상	19	-(-)	-	1	-(-)	-
작년 대비 가구소득 변화						
줄어들었다	11	-(-)	-	1	-(-)	-
변함없다	36	6.9(4.8)	70.3	2	-(-)	-
늘어났다	8	-(-)	-	0	-(-)	-

- 주 1) 자살생각으로 인한 정신상담률 : (자살생각으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수 / 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 사람의 수) × 100
- 2) 자살시도로 인한 정신상담률 : (자살시도로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수 / 최근 1년 동안 자살시도를 해 본 적이 있는 사람의 수) × 100
- 3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
- 4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 53〉 인지장애 경험률(50세 이상)¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	526	10.3(1.5)	14.2	245	9.1(2.0)	21.6	281	11.5(1.6)	14.3
연령									
50-59	191	6.7(2.4)	35.4	86	6.1(2.7)	43.6	105	7.3(2.9)	39.9
60-69	199	11.0(2.3)	21.0	98	11.4(3.5)	30.5	101	10.6(3.0)	27.9
70 이상	136	16.5(3.4)	20.4	61	12.1(3.8)	31.4	75	19.9(4.3)	21.6
교육수준 ²⁾									
무학	48	23.1(6.0)	26.2	8	-(-)	-	40	23.0(6.1)	26.5
초등학교	80	17.5(4.3)	24.7	29	27.7(8.4)	30.4	51	11.9(4.4)	37.4
중학교	67	9.6(4.3)	44.8	34	9.9(5.9)	59.4	33	9.3(4.3)	45.8
고등학교	226	8.6(1.8)	21.3	108	5.6(2.3)	40.2	118	11.8(3.0)	25.1
대학교 이상	102	5.5(2.3)	42.4	64	7.5(3.4)	45.9	38	1.6(1.6)	99.6
직업									
전문행정관리	41	6.5(3.2)	48.6	24	6.9(5.0)	72.3	17	-(-)	-
사무직	26	6.4(6.2)	96.9	20	7.7(7.4)	96.0	6	-(-)	-
판매·서비스직	69	8.4(3.8)	45.6	13	-(-)	-	56	7.0(3.2)	45.6
농림어업	14	-(-)	-	10	-(-)	-	4	-(-)	-
기능단순노무직	117	3.4(1.8)	53.2	84	2.8(2.1)	74.5	33	5.4(3.8)	70.8
기타 ³⁾	258	16.4(2.5)	15.1	93	18.2(4.3)	23.6	165	15.4(2.5)	16.5
월 가구소득									
100만원 미만	73	23.3(4.6)	19.9	26	21.5(8.4)	39.1	47	24.3(5.9)	24.2
100-200만원 미만	79	12.2(4.1)	33.4	32	21.2(7.9)	37.2	47	6.1(2.9)	47.0
200-300만원 미만	66	17.3(5.2)	30.0	29	20.5(8.2)	40.2	37	14.4(5.0)	35.0
300-400만원 미만	85	4.1(2.0)	49.8	42	2.0(2.0)	100.6	43	6.4(3.6)	56.1
400만원 이상	223	6.8(2.0)	28.8	116	4.2(1.9)	45.8	107	10.1(2.8)	27.9
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	172	8.8(2.3)	26.3	80	8.2(3.1)	37.5	92	9.3(3.0)	32.3
변함없다	284	11.8(2.1)	17.7	130	10.4(2.7)	25.8	154	13.2(2.4)	17.9
늘어났다	70	8.3(3.2)	39.1	35	6.7(4.6)	68.7	35	10.2(5.0)	49.0

주 1) 인지장애 경험률(50세 이상) : (최근 1년 동안 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있는 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 54〉 연간 인플루엔자 예방접종률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	46.3(2.2)	4.8	445	43.2(2.5)	5.8	464	49.6(2.7)	5.4
연령									
19-29	88	27.6(4.3)	15.7	52	25.9(4.6)	17.9	36	29.8(7.1)	23.9
30-39	119	41.6(5.0)	12.1	54	41.2(7.5)	18.2	65	42.2(6.4)	15.2
40-49	176	35.5(3.9)	10.9	94	33.8(4.2)	12.5	82	37.3(5.5)	14.8
50-59	191	39.3(4.5)	11.5	86	35.3(5.5)	15.6	105	43.7(5.3)	12.0
60-69	199	55.7(4.7)	8.5	98	52.3(5.5)	10.6	101	59.1(5.8)	9.8
70 이상	136	91.7(2.1)	2.3	61	94.2(2.9)	3.1	75	89.8(3.4)	3.8
19-64	681	36.8(2.4)	6.5	341	34.2(2.7)	7.9	340	39.8(2.9)	7.3
65 이상	228	84.7(2.6)	3.0	104	85.7(3.7)	4.3	124	83.9(3.4)	4.1
교육수준 ²⁾									
무학	48	80.9(5.1)	6.3	8	-(-)	-	40	77.2(5.9)	7.6
초등학교	80	81.2(6.5)	8.0	29	80.6(9.3)	11.5	51	81.5(7.0)	8.6
중학교	73	58.4(5.7)	9.7	39	57.4(8.4)	14.7	34	59.6(8.5)	14.3
고등학교	372	41.6(2.7)	6.6	194	39.2(3.3)	8.5	178	44.6(3.2)	7.1
대학교 이상	332	39.1(3.8)	9.7	173	38.7(4.4)	11.3	159	39.5(4.9)	12.4
직업									
전문행정관리	119	36.8(5.3)	14.4	59	31.0(6.0)	19.4	60	42.9(7.7)	18.0
사무직	79	45.1(5.4)	12.0	45	40.5(7.2)	17.8	34	51.9(8.7)	16.7
판매·서비스직	108	47.2(4.5)	9.5	30	56.8(8.6)	15.2	78	43.2(5.1)	11.9
농림어업	14	-(-)	-	10	-(-)	-	4	-(-)	-
기능단순노무직	223	40.5(3.3)	8.1	178	37.5(3.6)	9.6	45	55.1(7.9)	14.3
기타 ³⁾	362	54.1(3.4)	6.3	120	56.9(4.8)	8.5	242	52.6(3.6)	6.9
월 가구소득									
100만원 미만	80	68.1(5.6)	8.3	28	73.8(9.2)	12.4	52	65.1(6.1)	9.3
100-200만원 미만	86	75.0(6.1)	8.2	36	73.8(8.4)	11.4	50	75.9(6.9)	9.1
200-300만원 미만	108	48.2(5.1)	10.5	52	47.8(7.3)	15.4	56	48.6(6.7)	13.9
300-400만원 미만	149	43.2(5.2)	12.1	80	36.4(6.2)	16.9	69	52.5(6.7)	12.8
400만원 이상	486	40.0(3.2)	7.9	249	38.4(3.7)	9.7	237	41.9(3.6)	8.7
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	49.3(3.5)	7.1	137	42.6(4.7)	10.9	149	56.1(3.9)	6.9
변함없다	447	45.5(3.3)	7.2	217	44.7(3.7)	8.2	230	46.2(3.9)	8.4
늘어났다	176	43.7(4.5)	10.4	91	40.5(5.2)	12.9	85	47.7(6.5)	13.6

주 1) 연간 인플루엔자 예방접종률 : (최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 55〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	갑자기 한쪽 팔, 다리에 힘이 빠진다		갑자기 말이 어눌해지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못한다		갑자기 한쪽 눈이나 시아의 반이 보이지 않거나, 물체가 두 개로 보인다		갑자기 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘들다		갑자기 이제까지 경험하지 못한 심한 두통이 생긴다		뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	
	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	85.3(1.4)	1.7	87.5(1.2)	1.4	74.5(1.8)	2.4	84.9(1.0)	1.2	77.9(1.8)	2.3	59.1(1.9)	3.2
성												
남자	82.9(1.8)	2.2	84.7(1.8)	2.1	72.8(2.4)	3.3	84.0(1.4)	1.7	74.3(2.4)	3.2	53.7(2.7)	5.0
여자	87.7(1.9)	2.2	90.5(1.6)	1.8	76.2(2.4)	3.1	86.0(1.5)	1.7	81.9(2.2)	2.6	64.9(2.4)	3.7
연령												
19-29	77.8(5.8)	7.5	78.4(4.9)	6.3	59.6(6.2)	10.4	77.2(4.5)	5.8	70.9(5.5)	7.7	41.2(6.7)	16.3
30-39	86.0(3.2)	3.7	90.3(3.0)	3.3	75.7(4.2)	5.6	87.7(3.5)	3.9	76.6(4.6)	6.0	59.8(5.2)	8.6
40-49	87.8(2.6)	3.0	91.6(1.8)	2.0	76.9(3.4)	4.4	86.2(2.4)	2.8	82.1(2.9)	3.6	63.5(4.3)	6.8
50-59	93.7(1.8)	1.9	93.6(1.8)	1.9	83.8(3.1)	3.7	90.1(1.9)	2.1	83.8(2.9)	3.4	70.7(3.8)	5.4
60-69	84.8(3.0)	3.5	87.6(2.5)	2.9	79.3(2.7)	3.5	88.0(2.5)	2.8	78.7(3.0)	3.8	61.6(3.6)	5.9
70 이상	72.4(4.5)	6.2	76.1(3.9)	5.2	59.9(4.2)	7.1	73.8(4.5)	6.0	68.0(4.8)	7.0	44.7(5.9)	13.2
19-64	87.1(1.6)	1.8	89.3(1.2)	1.4	76.3(1.9)	2.5	86.4(1.0)	1.1	79.3(1.9)	2.3	60.9(2.1)	3.4
65 이상	77.4(3.2)	4.2	79.9(2.8)	3.5	66.5(3.2)	4.8	78.7(3.3)	4.2	72.0(3.6)	5.0	50.2(4.1)	8.2
교육수준 ²⁾												
무학	69.1(6.0)	8.7	69.0(7.1)	10.3	60.4(7.5)	12.4	66.7(6.5)	9.7	52.7(7.0)	13.2	26.1(6.5)	25.0
초등학교	68.7(5.8)	8.5	82.5(4.4)	5.3	63.0(5.7)	9.0	76.7(5.1)	6.7	75.9(5.7)	7.6	39.2(7.5)	19.3
중학교	79.4(4.9)	6.2	79.1(5.2)	6.5	75.3(6.1)	8.1	87.3(3.9)	4.5	72.4(6.5)	9.0	59.0(8.0)	13.6
고등학교	85.8(2.6)	3.1	86.8(2.0)	2.3	75.3(2.9)	3.8	87.0(1.9)	2.2	80.1(2.4)	3.0	62.1(3.0)	4.9
대학교 이상	90.2(2.0)	2.2	92.3(1.6)	1.7	76.4(2.8)	3.7	85.4(1.6)	1.9	79.2(2.5)	3.2	61.5(2.9)	4.7
직업												
전문행정관리	87.9(2.9)	3.3	94.3(2.2)	2.3	72.4(4.2)	5.8	84.9(3.2)	3.8	87.2(2.6)	3.0	64.9(3.8)	5.8
사무직	91.6(3.6)	4.0	87.5(4.3)	5.0	79.3(4.7)	5.9	86.4(4.5)	5.2	74.7(5.0)	6.6	60.6(5.3)	8.8
판매·서비스직	88.1(3.7)	4.2	92.7(2.4)	2.6	84.2(3.7)	4.3	91.5(1.7)	1.9	87.1(4.0)	4.6	74.4(4.9)	6.6
농림어업	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	83.9(2.2)	2.6	87.5(2.1)	2.4	76.3(3.2)	4.2	85.5(2.3)	2.7	75.1(3.1)	4.2	54.6(3.7)	6.7
기타 ³⁾	82.9(2.4)	2.9	84.1(2.4)	2.9	70.6(2.9)	4.1	82.0(2.4)	2.9	75.3(2.6)	3.5	55.7(3.5)	6.2
월 가구소득												
100만원 미만	73.5(5.2)	7.0	74.8(5.1)	6.8	56.2(5.4)	9.6	75.8(5.7)	7.5	64.6(6.2)	9.7	34.0(6.2)	18.1
100-200만원 미만	86.0(4.4)	5.1	84.7(5.1)	6.0	73.3(6.0)	8.2	83.9(4.8)	5.7	78.7(5.7)	7.2	57.3(7.8)	13.7
200-300만원 미만	84.9(4.1)	4.8	85.0(3.3)	3.9	75.9(5.1)	6.7	85.6(4.0)	4.6	84.8(4.1)	4.8	64.0(6.0)	9.4
300-400만원 미만	84.5(4.2)	4.9	85.4(3.4)	4.0	77.3(4.0)	5.2	83.5(3.4)	4.1	72.3(3.6)	5.0	54.4(4.8)	8.8
400만원 이상	86.8(2.3)	2.6	90.5(1.6)	1.7	75.6(2.3)	3.0	86.4(1.6)	1.9	79.4(2.8)	3.5	62.2(2.7)	4.4
작년 대비 가구소득 변화												
줄어들었다	84.5(2.2)	2.6	87.8(2.0)	2.3	73.3(3.0)	4.1	81.4(2.1)	2.6	74.4(3.3)	4.5	55.6(3.4)	6.0
변함없다	84.8(1.8)	2.1	86.5(1.7)	2.0	74.5(2.5)	3.4	85.8(1.8)	2.1	78.5(2.3)	2.9	57.9(2.8)	4.9
늘어났다	87.6(3.8)	4.4	89.5(2.7)	3.0	76.1(3.7)	4.9	88.0(3.1)	3.5	81.8(4.2)	5.2	66.8(4.9)	7.4

주 1) 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 : (증상을 모두 맞춘 응답자의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 56〉 심근경색증 조기증상 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	갑자기 턱, 목 또는 등쪽에 통증이나 답답함이 있다		갑자기 힘이 없으며, 어지럽고, 울렁거리거나 식은땀이 난다		갑자기 가슴에 통증이나 압박감 또는 짓누르는 느낌이 있다		갑자기 팔 또는 어깨에 통증이나 불편감이 있다		갑자기 숨이 찬다		심근경색증 조기증상 인지율	
	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	72.0(1.8)	2.5	79.4(1.5)	1.9	92.2(1.1)	1.2	60.9(2.0)	3.4	86.3(1.4)	1.7	50.9(2.0)	3.9
성												
남자	68.9(2.3)	3.3	78.2(2.0)	2.6	91.3(1.3)	1.4	58.3(2.8)	4.8	82.8(2.1)	2.5	47.1(2.6)	5.6
여자	75.4(2.4)	3.2	80.7(2.3)	2.9	93.2(1.5)	1.6	63.6(2.5)	3.9	90.1(1.7)	1.9	55.1(2.7)	4.8
연령												
19-29	66.6(5.5)	8.3	76.8(4.9)	6.4	89.4(4.5)	5.0	51.6(5.6)	10.9	80.2(4.9)	6.1	41.2(5.6)	13.6
30-39	70.5(4.1)	5.8	81.2(3.4)	4.2	96.0(2.3)	2.4	58.7(5.3)	9.1	86.2(3.7)	4.3	49.9(5.0)	10.1
40-49	71.6(4.1)	5.8	80.2(3.3)	4.1	94.4(1.7)	1.8	62.5(3.8)	6.1	90.5(2.1)	2.3	54.0(4.3)	8.0
50-59	76.2(3.2)	4.2	83.4(2.7)	3.3	96.7(1.1)	1.1	67.0(3.8)	5.7	91.9(1.7)	1.9	58.1(4.0)	6.8
60-69	76.1(4.0)	5.2	80.4(3.2)	4.0	90.6(2.5)	2.7	63.5(3.9)	6.2	86.2(3.1)	3.5	52.2(4.2)	8.0
70 이상	66.8(4.7)	7.1	69.4(4.7)	6.7	80.2(3.7)	4.6	56.8(5.5)	9.7	75.6(4.1)	5.4	43.9(6.4)	14.5
19-64	72.0(2.2)	3.0	81.0(1.7)	2.0	93.9(1.1)	1.2	60.9(2.3)	3.8	87.8(1.6)	1.8	51.3(2.2)	4.4
65 이상	72.3(3.1)	4.3	72.8(3.7)	5.1	84.8(2.4)	2.9	61.0(4.0)	6.6	80.1(3.0)	3.7	49.3(4.2)	8.6
교육수준 ²⁾												
무학	47.2(7.7)	16.3	63.2(6.7)	10.6	82.2(5.6)	6.8	49.0(7.2)	14.7	70.4(6.2)	8.9	22.3(6.6)	29.5
초등학교	70.1(5.0)	7.2	70.4(5.5)	7.8	82.6(3.6)	4.3	49.8(6.7)	13.5	83.6(4.4)	5.3	38.5(6.6)	17.3
중학교	68.6(6.4)	9.4	75.8(6.0)	8.0	90.6(3.0)	3.3	57.1(6.3)	10.9	82.0(4.8)	5.9	52.5(7.6)	14.5
고등학교	74.4(3.3)	4.5	83.0(2.4)	2.9	91.9(1.9)	2.1	61.8(3.4)	5.5	87.4(2.3)	2.7	53.8(3.5)	6.6
대학교 이상	72.3(2.7)	3.8	78.9(2.3)	2.9	95.3(1.2)	1.3	63.2(2.9)	4.6	87.9(1.9)	2.2	51.8(2.9)	5.6
직업												
전문행정관리	74.8(3.5)	4.6	81.4(3.5)	4.3	94.7(2.3)	2.5	66.5(4.8)	7.2	87.6(2.9)	3.3	58.5(4.4)	7.4
사무직	64.3(5.5)	8.5	74.5(5.2)	7.0	93.6(3.1)	3.4	56.0(5.8)	10.3	87.3(4.5)	5.2	39.7(5.7)	14.2
판매·서비스직	80.5(4.1)	5.1	84.4(3.1)	3.6	92.4(2.5)	2.8	64.1(5.2)	8.1	94.6(1.8)	1.9	59.4(4.8)	8.2
농림어업	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
기능단순노무직	71.1(2.9)	4.0	79.6(2.2)	2.8	91.8(1.6)	1.8	55.9(3.8)	6.8	83.0(2.6)	3.1	46.4(3.7)	8.1
기타 ³⁾	70.3(2.7)	3.8	77.7(2.5)	3.2	91.0(1.7)	1.9	61.6(2.8)	4.6	85.2(2.7)	3.2	50.4(2.9)	5.8
월 가구소득												
100만원 미만	64.8(6.0)	9.3	73.4(4.0)	5.5	81.3(5.0)	6.2	54.0(5.5)	10.2	78.0(5.2)	6.7	36.6(5.5)	15.2
100-200만원 미만	67.7(5.4)	8.0	80.1(6.1)	7.6	88.8(3.9)	4.4	57.6(6.9)	12.0	83.2(4.7)	5.6	46.3(6.9)	14.9
200-300만원 미만	73.6(4.5)	6.1	85.6(3.2)	3.7	90.8(2.9)	3.2	61.4(6.1)	9.9	86.5(4.2)	4.9	54.9(6.3)	11.5
300-400만원 미만	63.8(4.5)	7.0	74.8(4.4)	5.8	90.6(3.0)	3.3	59.2(5.0)	8.4	83.2(3.0)	3.5	43.1(4.9)	11.4
400만원 이상	75.3(2.6)	3.4	80.0(2.1)	2.6	94.6(1.6)	1.7	62.4(2.8)	4.5	88.5(1.9)	2.2	54.4(2.9)	5.4
작년 대비 가구소득 변화												
줄어들었다	68.7(3.3)	4.8	78.1(2.7)	3.4	92.5(1.7)	1.8	53.7(3.1)	5.7	87.0(2.6)	3.0	47.0(3.3)	7.0
변함없다	72.5(2.2)	3.0	79.7(2.2)	2.8	91.9(1.5)	1.6	63.4(2.9)	4.6	85.4(1.9)	2.2	50.8(2.7)	5.3
늘어났다	76.0(4.4)	5.8	80.8(4.0)	5.0	92.5(2.6)	2.8	65.6(4.9)	7.5	87.5(2.9)	3.4	57.1(5.1)	8.9

주 1) 심근경색증 조기증상 인지율 : (증상을 모두 맞춘 응답자의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사체계

제2부

주요통계결과

제3부

통계표

제4부

부록

〈표 57〉 혈압수치 및 혈당수치 인지율

(단위 : %)

구분	혈압수치 인지율 ¹⁾			혈당수치 인지율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	52.8(2.2)	4.1	909	12.8(1.1)	8.7
성						
남자	444	58.5(2.9)	5.0	444	14.1(1.8)	12.7
여자	465	46.6(2.3)	5.0	465	11.6(1.4)	12.2
연령						
19-29	88	38.3(5.3)	13.8	88	4.8(2.5)	50.9
30-39	119	49.3(5.5)	11.2	119	8.5(2.7)	32.3
40-49	176	50.0(4.4)	8.8	176	6.6(1.9)	28.1
50-59	191	68.7(4.0)	5.8	191	20.2(3.3)	16.3
60-69	199	61.6(3.9)	6.4	199	21.6(3.5)	16.0
70 이상	136	33.8(4.9)	14.4	136	9.5(2.9)	30.9
19-64	681	54.5(2.3)	4.3	681	12.1(1.2)	10.0
65 이상	228	45.7(4.0)	8.7	228	16.0(2.7)	16.9
교육수준 ³⁾						
무학	48	11.5(3.9)	34.3	48	4.5(3.0)	65.5
초등학교	80	41.8(5.7)	13.7	80	8.6(3.2)	37.3
중학교	73	48.6(5.9)	12.1	73	21.5(5.3)	24.7
고등학교	371	58.8(3.2)	5.4	371	13.3(2.1)	16.0
대학교 이상	333	53.9(3.3)	6.2	333	12.6(1.8)	14.4
직업						
전문행정관리	119	63.9(4.7)	7.3	119	17.1(3.5)	20.5
사무직	79	55.1(6.5)	11.8	79	11.3(3.6)	32.2
판매·서비스직	108	49.6(5.5)	11.0	108	10.2(3.3)	32.4
농림어업	15	-()	-	15	-()	-
기능단순노무직	223	59.3(3.9)	6.5	223	13.1(2.4)	18.1
기타 ⁴⁾	362	44.8(2.9)	6.5	362	12.2(1.6)	13.5
월 가구소득						
100만원 미만	80	36.4(5.1)	14.1	80	11.6(3.3)	28.8
100-200만원 미만	86	40.1(6.2)	15.4	86	12.5(3.3)	26.3
200-300만원 미만	108	50.0(5.7)	11.4	108	15.0(3.6)	24.2
300-400만원 미만	149	52.7(4.3)	8.1	149	11.2(2.6)	23.3
400만원 이상	486	57.1(2.7)	4.8	486	13.1(1.6)	12.1
작년 대비 가구소득 변화						
줄어들었다	285	47.6(3.4)	7.2	285	12.3(2.0)	15.9
변함없다	448	54.8(2.8)	5.1	448	13.2(1.6)	11.9
늘어났다	176	55.6(4.5)	8.1	176	12.8(3.1)	24.6

주 1) 혈압수치 인지율 : (본인의 혈압수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 혈당수치 인지율 : (본인의 혈당수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 58〉 고혈압 진단 경험률

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	910	20.7(1.6)	7.6	445	21.4(1.9)	8.8	465	19.9(1.9)	9.4
30세 이상 ²⁾	822	24.1(1.8)	7.5	393	25.3(2.1)	8.5	429	23.0(2.1)	9.3
연령									
19-29	88	1.0(1.0)	99.4	52	1.8(1.8)	97.9	36	0.0(0.0)	.
30-39	119	2.9(1.7)	58.7	54	3.5(2.5)	70.6	65	2.2(2.2)	100.7
40-49	177	7.6(1.7)	22.0	94	11.9(3.1)	25.6	83	3.0(1.7)	57.6
50-59	191	26.1(3.8)	14.7	86	29.8(5.1)	17.1	105	22.0(4.6)	20.9
60-69	199	37.7(3.8)	10.2	98	40.3(5.4)	13.4	101	35.0(5.0)	14.2
70 이상	136	49.6(4.7)	9.4	61	42.2(7.4)	17.5	75	55.4(5.6)	10.0
19-64	682	14.1(1.5)	10.6	341	16.6(2.1)	12.5	341	11.2(1.7)	15.3
65 이상	228	47.9(3.6)	7.6	104	44.6(4.4)	9.9	124	50.6(4.6)	9.0
교육수준 ³⁾									
무학	48	46.0(6.5)	14.1	8	-(-)	-	40	48.2(6.8)	14.2
초등학교	80	49.1(6.2)	12.6	29	37.9(9.4)	24.7	51	55.4(7.9)	14.3
중학교	73	40.6(6.3)	15.5	39	34.8(8.2)	23.6	34	47.6(9.0)	18.9
고등학교	372	20.8(2.3)	11.2	194	25.1(3.5)	14.1	178	15.5(2.5)	16.1
대학교 이상	333	9.1(1.8)	19.9	173	12.2(2.7)	21.9	160	5.3(1.9)	34.9
직업									
전문행정관리	119	8.9(2.7)	30.8	59	16.1(5.0)	30.8	60	1.4(1.4)	101.5
사무직	79	12.3(4.0)	32.7	45	15.9(5.5)	34.4	34	7.0(4.3)	61.0
판매·서비스직	108	21.9(4.1)	18.6	30	25.0(8.7)	34.8	78	20.6(3.9)	18.7
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	21.1(2.8)	13.1	178	20.0(2.9)	14.7	45	26.4(7.4)	28.0
기타 ⁴⁾	362	27.0(2.8)	10.3	120	29.3(4.1)	13.9	242	25.8(3.1)	12.2
월 가구소득									
100만원 미만	80	36.7(5.3)	14.5	28	29.2(8.5)	29.1	52	40.8(6.8)	16.6
100-200만원 미만	86	33.7(5.9)	17.6	36	26.0(6.6)	25.5	50	39.6(7.8)	19.6
200-300만원 미만	108	31.3(4.4)	14.0	52	30.9(6.7)	21.7	56	31.6(6.1)	19.2
300-400만원 미만	149	19.4(2.9)	15.2	80	23.3(4.6)	19.9	69	14.1(3.4)	24.5
400만원 이상	487	15.1(1.8)	12.0	249	17.8(2.5)	14.1	238	11.9(2.0)	16.8
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	21.9(2.7)	12.1	137	21.5(3.5)	16.4	149	22.3(3.4)	15.3
변함없다	448	21.5(2.0)	9.5	217	23.3(2.4)	10.4	231	19.6(2.6)	13.1
늘어났다	176	16.9(3.4)	20.0	91	17.1(4.5)	26.2	85	16.7(4.0)	23.7

주 1) 고혈압 진단 경험률 : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 고혈압 진단 경험률(30세 이상) : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 59〉 고혈압 최초 진단 시기¹⁾

(단위 : 세)

구분	전체			남자			여자		
	N	세(표준오차)	상대 표준오차	N	세(표준오차)	상대 표준오차	N	세(표준오차)	상대 표준오차
전체	213	53.9(0.8)	1.4	105	52.6(0.9)	1.8	108	55.4(1.2)	2.1
연령									
19-29	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	14	-(-)	-	11	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	49	49.2(0.9)	1.8	25	50.0(1.2)	2.4	24	48.1(1.2)	2.5
60-69	74	54.8(0.7)	1.3	38	55.4(1.0)	1.8	36	54.1(1.0)	1.9
70 이상	72	62.9(1.5)	2.4	28	62.2(1.5)	2.5	44	63.4(2.1)	3.3
19-64	100	48.8(0.7)	1.5	58	48.7(0.9)	1.9	42	49.0(1.0)	2.0
65 이상	113	60.0(1.2)	1.9	47	59.4(1.1)	1.9	66	60.4(1.8)	2.9
교육수준 ²⁾									
무학	24	65.3(3.3)	5.1	3	-(-)	-	21	65.4(3.8)	5.9
초등학교	41	60.7(1.6)	2.6	12	-(-)	-	29	59.5(1.4)	2.3
중학교	32	54.7(1.6)	2.9	16	-(-)	-	16	-(-)	-
고등학교	83	50.7(1.0)	2.0	51	51.2(1.3)	2.6	32	49.6(1.3)	2.5
대학교 이상	32	48.1(1.2)	2.5	22	48.8(1.2)	2.4	10	-(-)	-
직업									
전문행정관리	11	-(-)	-	10	-(-)	-	1	-(-)	-
사무직	10	-(-)	-	7	-(-)	-	3	-(-)	-
판매·서비스직	26	51.7(1.3)	2.6	8	-(-)	-	18	-(-)	-
농림어업	4	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	49	51.3(1.4)	2.7	37	49.2(1.3)	2.7	12	-(-)	-
기타 ³⁾	113	56.9(1.2)	2.2	41	58.5(1.9)	3.3	72	55.8(1.6)	2.9
월 가구소득									
100만원 미만	33	61.8(2.8)	4.5	10	-(-)	-	23	60.6(3.6)	6.0
100-200만원 미만	31	60.3(2.2)	3.6	10	-(-)	-	21	61.2(2.2)	3.7
200-300만원 미만	35	55.9(1.5)	2.7	16	-(-)	-	19	-(-)	-
300-400만원 미만	32	54.1(1.2)	2.3	21	54.3(1.7)	3.2	11	-(-)	-
400만원 이상	82	48.6(1.0)	2.0	48	48.7(1.1)	2.3	34	48.4(1.5)	3.1
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	68	53.0(1.2)	2.2	32	51.5(1.4)	2.7	36	54.4(1.9)	3.5
변함없다	113	55.2(1.2)	2.1	57	53.8(1.3)	2.3	56	56.9(1.9)	3.4
늘어났다	32	51.6(2.3)	4.4	16	-(-)	-	16	-(-)	-

주 1) 고혈압 최초 진단 시기 : 고혈압을 최초 진단받은 만 나이의 총합 / 의사진단을 받은 사람의 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 60〉 고혈압 현재치료를

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	213	96.8(1.5)	1.6	105	95.1(2.7)	2.9	108	98.8(1.1)	1.1
30세 이상 ²⁾	212	97.6(1.4)	1.5	104	96.4(2.5)	2.6	108	98.8(1.1)	1.1
연령									
19-29	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	14	-(-)	-	11	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	49	93.5(4.5)	4.9	25	89.2(7.4)	8.3	24	100.0(0.0)	0.0
60-69	74	100.0(0.0)	0.0	38	100.0(0.0)	0.0	36	100.0(0.0)	0.0
70 이상	72	98.1(1.9)	2.0	28	100.0(0.0)	0.0	44	96.9(3.0)	3.1
19-64	100	95.2(2.6)	2.8	58	92.3(4.2)	4.5	42	100.0(0.0)	0.0
65 이상	113	98.8(1.2)	1.2	47	100.0(0.0)	0.0	66	97.9(2.0)	2.0
교육수준 ³⁾									
무학	24	100.0(0.0)	0.0	3	-(-)	-	21	100.0(0.0)	0.0
초등학교	41	96.7(3.0)	3.1	12	-(-)	-	29	95.5(4.2)	4.4
중학교	32	100.0(0.0)	0.0	16	-(-)	-	16	-(-)	-
고등학교	83	96.7(2.2)	2.2	51	95.1(3.2)	3.4	32	100.0(0.0)	0.0
대학교 이상	32	92.7(7.0)	7.5	22	90.1(9.4)	10.4	10	-(-)	-
직업									
전문행정관리	11	-(-)	-	10	-(-)	-	1	-(-)	-
사무직	10	-(-)	-	7	-(-)	-	3	-(-)	-
판매·서비스직	26	100.0(0.0)	0.0	8	-(-)	-	18	-(-)	-
농림어업	4	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	49	92.8(4.9)	5.3	37	90.8(6.2)	6.8	12	-(-)	-
기타 ⁴⁾	113	97.3(1.8)	1.9	41	95.9(3.9)	4.1	72	98.2(1.7)	1.8
월 가구소득									
100만원 미만	33	100.0(0.0)	0.0	10	-(-)	-	23	100.0(0.0)	0.0
100-200만원 미만	31	100.0(0.0)	0.0	10	-(-)	-	21	100.0(0.0)	0.0
200-300만원 미만	35	97.0(2.8)	2.9	16	-(-)	-	19	-(-)	-
300-400만원 미만	32	87.5(8.2)	9.4	21	82.0(11.2)	13.7	11	-(-)	-
400만원 이상	82	98.2(1.7)	1.8	48	97.2(2.8)	2.8	34	100.0(0.0)	0.0
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	68	100.0(0.0)	0.0	32	100.0(0.0)	0.0	36	100.0(0.0)	0.0
변함없다	113	95.3(2.7)	2.8	57	93.4(4.6)	4.9	56	97.7(2.3)	2.3
늘어났다	32	95.4(4.2)	4.4	16	-(-)	-	16	-(-)	-

주 1) 고혈압 현재치료를 : (현재 고혈압을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 현재치료를(30세 이상) : (현재 고혈압을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 61〉 고혈압 진단 경험자의 치료율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	213	91.0(2.4)	2.7	105	89.0(3.6)	4.0	108	93.2(3.1)	3.3
30세 이상 ²⁾	212	91.6(2.4)	2.7	104	90.2(3.5)	3.9	108	93.2(3.1)	3.3
연령									
19-29	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	14	-(-)	-	11	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	49	91.0(4.9)	5.4	25	85.0(7.8)	9.2	24	100.0(0.0)	0.0
60-69	74	88.3(4.6)	5.2	38	87.6(6.0)	6.9	36	89.1(7.6)	8.5
70 이상	72	95.3(2.7)	2.8	28	97.0(3.0)	3.1	44	94.3(3.7)	4.0
19-64	100	88.3(4.1)	4.6	58	87.6(4.8)	5.5	42	89.4(6.5)	7.2
65 이상	113	94.2(2.5)	2.7	47	91.4(5.2)	5.7	66	96.2(2.5)	2.6
교육수준 ³⁾									
무학	24	95.2(4.7)	4.9	3	-(-)	-	21	94.6(5.3)	5.6
초등학교	41	87.7(7.2)	8.2	12	-(-)	-	29	85.5(9.6)	11.2
중학교	32	96.4(3.4)	3.5	16	-(-)	-	16	-(-)	-
고등학교	83	89.7(3.6)	4.0	51	86.2(5.0)	5.8	32	96.7(3.2)	3.3
대학교 이상	32	90.3(7.3)	8.1	22	86.6(9.8)	11.3	10	-(-)	-
직업									
전문행정관리	11	-(-)	-	10	-(-)	-	1	-(-)	-
사무직	10	-(-)	-	7	-(-)	-	3	-(-)	-
판매·서비스직	26	96.3(3.3)	3.4	8	-(-)	-	18	-(-)	-
농림어업	4	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	49	90.0(5.4)	5.9	37	87.3(6.6)	7.6	12	-(-)	-
기타 ⁴⁾	113	88.5(3.8)	4.3	41	86.7(6.4)	7.4	72	89.6(4.5)	5.1
월 가구소득									
100만원 미만	33	97.5(2.4)	2.5	10	-(-)	-	23	100.0(0.0)	0.0
100-200만원 미만	31	96.3(3.7)	3.9	10	-(-)	-	21	94.4(5.5)	5.8
200-300만원 미만	35	82.7(7.9)	9.5	16	-(-)	-	19	-(-)	-
300-400만원 미만	32	81.3(8.4)	10.3	21	73.1(11.5)	15.7	11	-(-)	-
400만원 이상	82	94.3(2.7)	2.9	48	92.8(3.9)	4.2	34	97.0(3.0)	3.1
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	68	95.7(2.2)	2.3	32	97.2(2.7)	2.8	36	94.3(3.8)	4.0
변함없다	113	87.5(3.9)	4.5	57	83.4(6.1)	7.4	56	92.4(5.3)	5.8
늘어났다	32	92.5(4.7)	5.1	16	-(-)	-	16	-(-)	-

주 1) 고혈압 진단 경험자의 치료율 : (현재 혈압조절약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 진단 경험자의 치료율(30세 이상) : (현재 혈압조절약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 62〉 고혈압 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	213	6.4(2.1)	33.3	105	9.7(3.5)	35.5	108	2.6(1.3)	51.0
30세 이상 ²⁾	212	6.5(2.1)	33.2	104	9.9(3.5)	35.4	108	2.6(1.3)	51.0
연령									
19-29	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	14	-(-)	-	11	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	49	12.4(5.1)	40.9	25	18.3(7.9)	42.9	24	3.6(3.7)	102.6
60-69	74	3.3(1.9)	58.8	38	2.8(2.8)	101.4	36	3.9(2.6)	67.8
70 이상	72	4.3(2.9)	66.7	28	9.7(6.5)	66.8	44	1.1(1.1)	96.9
19-64	100	8.5(3.1)	36.1	58	12.3(4.7)	38.0	42	2.0(2.1)	101.2
65 이상	113	4.0(2.4)	60.1	47	5.2(3.6)	69.7	66	3.0(1.7)	57.5
교육수준 ³⁾									
무학	24	0.0(0.0)	.	3	-(-)	-	21	0.0(0.0)	.
초등학교	41	6.0(3.4)	56.5	12	-(-)	-	29	6.6(3.7)	56.6
중학교	32	5.9(4.5)	77.0	16	-(-)	-	16	-(-)	-
고등학교	83	5.0(2.6)	53.0	51	6.0(3.7)	62.0	32	2.9(3.0)	102.1
대학교 이상	32	14.7(6.5)	44.4	22	20.2(8.5)	42.3	10	-(-)	-
직업									
전문행정관리	11	-(-)	-	10	-(-)	-	1	-(-)	-
사무직	10	-(-)	-	7	-(-)	-	3	-(-)	-
판매·서비스직	26	0.0(0.0)	.	8	-(-)	-	18	-(-)	-
농림어업	4	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	49	8.6(4.6)	53.8	37	11.0(5.9)	53.9	12	-(-)	-
기타 ⁴⁾	113	4.6(2.4)	51.4	41	5.6(3.9)	70.1	72	4.0(2.0)	50.6
월 가구소득									
100만원 미만	33	4.1(2.9)	71.7	10	-(-)	-	23	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	31	0.0(0.0)	.	10	-(-)	-	21	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	35	2.4(2.4)	98.7	16	-(-)	-	19	-(-)	-
300-400만원 미만	32	6.1(4.3)	71.0	21	3.0(2.8)	96.4	11	-(-)	-
400만원 이상	82	11.0(3.8)	34.9	48	15.1(5.8)	38.5	34	3.9(2.9)	73.0
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	68	3.6(2.6)	71.8	32	7.2(5.0)	69.3	36	0.0(0.0)	.
변함없다	113	7.1(3.4)	48.0	57	10.1(5.0)	49.8	56	3.5(2.0)	58.8
늘어났다	32	9.9(5.5)	56.1	16	-(-)	-	16	-(-)	-

주 1) 고혈압 관리교육 이수율 : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 관리교육 이수율(30세 이상) : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 63〉 당뇨병 진단 경험률

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	910	8.9(0.8)	9.3	445	8.5(1.3)	15.6	465	9.4(1.1)	11.8
30세 이상 ²⁾	822	10.5(1.0)	9.4	393	10.1(1.6)	15.8	429	10.8(1.2)	11.4
연령									
19-29	88	0.0(0.0)	.	52	0.0(0.0)	.	36	0.0(0.0)	.
30-39	119	1.0(1.0)	100.9	54	1.8(1.8)	100.9	65	0.0(0.0)	.
40-49	177	3.7(1.5)	41.4	94	3.0(1.8)	59.4	83	4.3(2.6)	60.2
50-59	191	12.3(2.4)	19.5	86	11.4(3.2)	28.1	105	13.4(3.1)	22.8
60-69	199	16.4(2.9)	17.8	98	19.0(4.7)	24.6	101	13.8(3.2)	23.3
70 이상	136	19.0(3.0)	15.8	61	15.8(5.2)	32.7	75	21.6(4.0)	18.4
19-64	682	5.9(0.9)	15.7	341	6.1(1.3)	22.0	341	5.6(1.2)	20.9
65 이상	228	21.4(2.5)	11.6	104	19.7(3.6)	18.3	124	22.8(3.5)	15.5
교육수준 ³⁾									
무학	48	25.1(5.7)	22.7	8	-(-)	-	40	17.4(5.9)	34.0
초등학교	80	19.9(4.6)	23.3	29	16.1(7.1)	43.9	51	22.0(5.5)	24.9
중학교	73	18.4(4.6)	25.2	39	12.8(5.4)	42.0	34	25.2(7.7)	30.6
고등학교	372	9.5(1.5)	15.9	194	9.7(2.3)	23.3	178	9.1(1.8)	20.1
대학교 이상	333	2.9(0.9)	31.3	173	3.6(1.3)	37.2	160	2.2(1.3)	62.5
직업									
전문행정관리	119	3.8(2.0)	54.5	59	4.7(2.8)	59.5	60	2.8(2.8)	99.8
사무직	79	3.7(1.9)	50.8	45	3.0(2.2)	72.0	34	4.6(3.4)	74.6
판매·서비스직	108	10.1(2.7)	26.8	30	4.0(3.9)	99.1	78	12.7(3.6)	28.4
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	9.1(1.8)	19.9	178	8.3(1.9)	23.2	45	12.9(4.6)	35.5
기타 ⁴⁾	362	11.5(1.6)	14.0	120	14.0(3.2)	22.9	242	10.1(1.6)	15.9
월 가구소득									
100만원 미만	80	19.6(4.8)	24.4	28	20.6(8.3)	40.1	52	19.1(4.7)	24.6
100-200만원 미만	86	15.9(2.7)	16.9	36	14.7(5.3)	35.7	50	16.8(4.7)	27.8
200-300만원 미만	108	12.7(3.0)	23.8	52	11.1(5.1)	46.2	56	14.4(4.4)	30.5
300-400만원 미만	149	8.8(2.4)	27.5	80	8.4(3.0)	35.4	69	9.4(3.5)	37.3
400만원 이상	487	5.9(1.1)	18.1	249	6.3(1.6)	25.0	238	5.4(1.4)	25.5
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	9.3(1.6)	17.1	137	9.6(2.2)	22.7	149	9.0(2.0)	21.9
변함없다	448	9.0(1.3)	14.6	217	8.7(1.8)	21.1	231	9.3(1.9)	20.3
늘어났다	176	8.1(2.1)	25.5	91	6.3(3.0)	47.3	85	10.4(3.0)	28.6

주 1) 당뇨병 진단 경험률 : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 당뇨병 진단 경험률(30세 이상) : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 64〉 당뇨병 최초 진단 시기¹⁾

(단위 : 세)

구분	전체			남자			여자		
	N	세(표준오차)	상대 표준오차	N	세(표준오차)	상대 표준오차	N	세(표준오차)	상대 표준오차
전체	91	55.3(1.2)	2.2	43	54.1(1.6)	3.0	48	56.5(1.4)	2.5
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	6	-(-)	-	3	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	24	51.4(0.8)	1.6	10	-(-)	-	14	-(-)	-
60-69	34	55.5(1.6)	2.9	19	-(-)	-	15	-(-)	-
70 이상	26	65.3(1.9)	2.8	10	-(-)	-	16	-(-)	-
19-64	41	49.8(0.9)	1.9	21	50.2(1.4)	2.7	20	49.4(1.1)	2.3
65 이상	50	61.4(1.7)	2.7	22	59.7(3.1)	5.3	28	62.6(1.6)	2.5
교육수준 ²⁾									
무학	12	-(-)	-	5	-(-)	-	7	-(-)	-
초등학교	17	-(-)	-	5	-(-)	-	12	-(-)	-
중학교	14	-(-)	-	6	-(-)	-	8	-(-)	-
고등학교	38	52.9(1.0)	1.9	20	52.3(1.3)	2.4	18	-(-)	-
대학교 이상	10	-(-)	-	7	-(-)	-	3	-(-)	-
직업									
전문행정관리	4	-(-)	-	3	-(-)	-	1	-(-)	-
사무직	4	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-
판매·서비스직	11	-(-)	-	1	-(-)	-	10	-(-)	-
농림어업	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	21	52.8(2.3)	4.4	15	-(-)	-	6	-(-)	-
기타 ³⁾	48	58.3(1.9)	3.2	20	58.4(3.1)	5.3	28	58.2(1.8)	3.1
월 가구소득									
100만원 미만	18	-(-)	-	7	-(-)	-	11	-(-)	-
100-200만원 미만	14	-(-)	-	6	-(-)	-	8	-(-)	-
200-300만원 미만	14	-(-)	-	5	-(-)	-	9	-(-)	-
300-400만원 미만	14	-(-)	-	7	-(-)	-	7	-(-)	-
400만원 이상	31	50.9(1.3)	2.5	18	-(-)	-	13	-(-)	-
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	28	55.2(2.1)	3.8	14	-(-)	-	14	-(-)	-
변함없다	49	56.0(1.7)	3.1	24	55.4(2.4)	4.4	25	56.5(2.1)	3.7
늘어났다	14	-(-)	-	5	-(-)	-	9	-(-)	-

주 1) 당뇨병 최초 진단 시기 : 당뇨병을 최초 진단받은 만 나이의 총합 / 의사진단을 받은 사람의 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 65〉 당뇨병 현재치료를

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	91	99.2(0.8)	0.8	43	100.0(0.0)	0.0	48	98.4(1.7)	1.7
30세 이상 ²⁾	91	99.2(0.8)	0.8	43	100.0(0.0)	0.0	48	98.4(1.7)	1.7
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	6	-(-)	-	3	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	24	100.0(0.0)	0.0	10	-(-)	-	14	-(-)	-
60-69	34	100.0(0.0)	0.0	19	-(-)	-	15	-(-)	-
70 이상	26	96.6(3.5)	3.6	10	-(-)	-	16	-(-)	-
19-64	41	100.0(0.0)	0.0	21	100.0(0.0)	0.0	20	100.0(0.0)	0.0
65 이상	50	98.2(1.8)	1.8	22	100.0(0.0)	0.0	28	97.0(3.0)	3.1
교육수준 ³⁾									
무학	12	-(-)	-	5	-(-)	-	7	-(-)	-
초등학교	17	-(-)	-	5	-(-)	-	12	-(-)	-
중학교	14	-(-)	-	6	-(-)	-	8	-(-)	-
고등학교	38	100.0(0.0)	0.0	20	100.0(0.0)	0.0	18	-(-)	-
대학교 이상	10	-(-)	-	7	-(-)	-	3	-(-)	-
직업									
전문행정관리	4	-(-)	-	3	-(-)	-	1	-(-)	-
사무직	4	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-
판매·서비스직	11	-(-)	-	1	-(-)	-	10	-(-)	-
농림어업	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	21	100.0(0.0)	0.0	15	-(-)	-	6	-(-)	-
기타 ⁴⁾	48	98.2(1.8)	1.8	20	100.0(0.0)	0.0	28	97.0(3.1)	3.2
월 가구소득									
100만원 미만	18	-(-)	-	7	-(-)	-	11	-(-)	-
100-200만원 미만	14	-(-)	-	6	-(-)	-	8	-(-)	-
200-300만원 미만	14	-(-)	-	5	-(-)	-	9	-(-)	-
300-400만원 미만	14	-(-)	-	7	-(-)	-	7	-(-)	-
400만원 이상	31	100.0(0.0)	0.0	18	-(-)	-	13	-(-)	-
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	28	100.0(0.0)	0.0	14	-(-)	-	14	-(-)	-
변함없다	49	98.3(1.7)	1.7	24	100.0(0.0)	0.0	25	96.7(3.3)	3.4
늘어났다	14	-(-)	-	5	-(-)	-	9	-(-)	-

주 1) 당뇨병 현재치료를 : (현재 당뇨병을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 현재치료를(30세 이상) : (현재 당뇨병을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 66〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	91	95.5(2.1)	2.2	43	98.4(1.6)	1.6	48	92.7(3.8)	4.1
30세 이상 ²⁾	91	95.5(2.1)	2.2	43	98.4(1.6)	1.6	48	92.7(3.8)	4.1
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	6	-(-)	-	3	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	24	100.0(0.0)	0.0	10	-(-)	-	14	-(-)	-
60-69	34	93.6(4.6)	4.9	19	-(-)	-	15	-(-)	-
70 이상	26	93.8(4.4)	4.7	10	-(-)	-	16	-(-)	-
19-64	41	98.5(1.5)	1.5	21	97.3(2.7)	2.8	20	100.0(0.0)	0.0
65 이상	50	92.1(3.7)	4.0	22	100.0(0.0)	0.0	28	86.4(6.6)	7.7
교육수준 ³⁾									
무학	12	-(-)	-	5	-(-)	-	7	-(-)	-
초등학교	17	-(-)	-	5	-(-)	-	12	-(-)	-
중학교	14	-(-)	-	6	-(-)	-	8	-(-)	-
고등학교	38	97.5(2.6)	2.6	20	100.0(0.0)	0.0	18	-(-)	-
대학교 이상	10	-(-)	-	7	-(-)	-	3	-(-)	-
직업									
전문행정관리	4	-(-)	-	3	-(-)	-	1	-(-)	-
사무직	4	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-
판매·서비스직	11	-(-)	-	1	-(-)	-	10	-(-)	-
농림어업	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	21	100.0(0.0)	0.0	15	-(-)	-	6	-(-)	-
기타 ⁴⁾	48	92.2(3.8)	4.2	20	100.0(0.0)	0.0	28	86.5(6.6)	7.6
월 가구소득									
100만원 미만	18	-(-)	-	7	-(-)	-	11	-(-)	-
100-200만원 미만	14	-(-)	-	6	-(-)	-	8	-(-)	-
200-300만원 미만	14	-(-)	-	5	-(-)	-	9	-(-)	-
300-400만원 미만	14	-(-)	-	7	-(-)	-	7	-(-)	-
400만원 이상	31	94.8(3.9)	4.1	18	-(-)	-	13	-(-)	-
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	28	93.2(4.7)	5.1	14	-(-)	-	14	-(-)	-
변함없다	49	95.3(2.7)	2.8	24	96.8(3.2)	3.3	25	93.9(4.4)	4.7
늘어났다	14	-(-)	-	5	-(-)	-	9	-(-)	-

- 주 1) 당뇨병 진단 경험자의 치료율 : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
- 2) 당뇨병 진단 경험자의 치료율(30세 이상) : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
- 3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
- 4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 67〉 당뇨병 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	91	5.2(1.8)	34.7	43	8.6(3.7)	42.9	48	1.9(0.2)	9.6
30세 이상 ²⁾	91	5.2(1.8)	34.7	43	8.6(3.7)	42.9	48	1.9(0.2)	9.6
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	6	-(-)	-	3	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	24	4.8(4.6)	97.1	10	-(-)	-	14	-(-)	-
60-69	34	4.9(2.1)	42.6	19	-(-)	-	15	-(-)	-
70 이상	26	4.7(3.2)	68.2	10	-(-)	-	16	-(-)	-
19-64	41	6.2(3.3)	52.7	21	7.9(5.9)	74.4	20	4.0(0.8)	19.5
65 이상	50	4.0(1.0)	26.2	22	9.5(2.7)	28.5	28	0.0(0.0)	.
교육수준 ³⁾									
무학	12	-(-)	-	5	-(-)	-	7	-(-)	-
초등학교	17	-(-)	-	5	-(-)	-	12	-(-)	-
중학교	14	-(-)	-	6	-(-)	-	8	-(-)	-
고등학교	38	0.0(0.0)	.	20	0.0(0.0)	.	18	-(-)	-
대학교 이상	10	-(-)	-	7	-(-)	-	3	-(-)	-
직업									
전문행정관리	4	-(-)	-	3	-(-)	-	1	-(-)	-
사무직	4	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-
판매·서비스직	11	-(-)	-	1	-(-)	-	10	-(-)	-
농림어업	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	21	5.9(5.7)	98.0	15	-(-)	-	6	-(-)	-
기타 ⁴⁾	48	6.0(1.2)	19.6	20	9.4(3.0)	31.7	28	3.5(0.5)	14.4
월 가구소득									
100만원 미만	18	-(-)	-	7	-(-)	-	11	-(-)	-
100-200만원 미만	14	-(-)	-	6	-(-)	-	8	-(-)	-
200-300만원 미만	14	-(-)	-	5	-(-)	-	9	-(-)	-
300-400만원 미만	14	-(-)	-	7	-(-)	-	7	-(-)	-
400만원 이상	31	8.7(4.3)	49.7	18	-(-)	-	13	-(-)	-
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	28	0.0(0.0)	.	14	-(-)	-	14	-(-)	-
변함없다	49	7.3(2.0)	27.3	24	10.9(4.2)	38.1	25	3.8(0.7)	18.4
늘어났다	14	-(-)	-	5	-(-)	-	9	-(-)	-

주 1) 당뇨병 관리교육 이수율 : (당뇨병 관리교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 관리교육 이수율(30세 이상) : (당뇨병 관리교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 68〉 당화혈색소 인지율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	91	73.5(5.2)	7.1	43	76.5(7.0)	9.1	48	70.7(6.3)	8.9
30세 이상 ²⁾	91	73.5(5.2)	7.1	43	76.5(7.0)	9.1	48	70.7(6.3)	8.9
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
40-49	6	-(-)	-	3	-(-)	-	3	-(-)	-
50-59	24	76.4(10.5)	13.7	10	-(-)	-	14	-(-)	-
60-69	34	83.1(5.8)	6.9	19	-(-)	-	15	-(-)	-
70 이상	26	46.7(10.3)	22.2	10	-(-)	-	16	-(-)	-
19-64	41	85.8(6.9)	8.1	21	84.2(8.7)	10.4	20	87.8(8.2)	9.3
65 이상	50	59.8(6.5)	10.8	22	65.1(10.9)	16.7	28	55.9(8.5)	15.3
교육수준 ³⁾									
무학	12	-(-)	-	5	-(-)	-	7	-(-)	-
초등학교	17	-(-)	-	5	-(-)	-	12	-(-)	-
중학교	14	-(-)	-	6	-(-)	-	8	-(-)	-
고등학교	38	82.7(7.6)	9.2	20	77.4(10.0)	13.0	18	-(-)	-
대학교 이상	10	-(-)	-	7	-(-)	-	3	-(-)	-
직업									
전문행정관리	4	-(-)	-	3	-(-)	-	1	-(-)	-
사무직	4	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-
판매·서비스직	11	-(-)	-	1	-(-)	-	10	-(-)	-
농림어업	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	21	67.6(12.6)	18.6	15	-(-)	-	6	-(-)	-
기타 ⁴⁾	48	68.2(6.7)	9.8	20	74.4(10.7)	14.4	28	63.7(8.9)	14.0
월 가구소득									
100만원 미만	18	-(-)	-	7	-(-)	-	11	-(-)	-
100-200만원 미만	14	-(-)	-	6	-(-)	-	8	-(-)	-
200-300만원 미만	14	-(-)	-	5	-(-)	-	9	-(-)	-
300-400만원 미만	14	-(-)	-	7	-(-)	-	7	-(-)	-
400만원 이상	31	92.7(4.5)	4.9	18	-(-)	-	13	-(-)	-
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	28	63.3(10.1)	16.0	14	-(-)	-	14	-(-)	-
변함없다	49	73.5(6.1)	8.3	24	74.7(8.5)	11.4	25	72.3(7.8)	10.8
늘어났다	14	-(-)	-	5	-(-)	-	9	-(-)	-

주 1) 당화혈색소 인지율 : (당화혈색소를 알고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당화혈색소 인지율(30세 이상) : (당화혈색소를 알고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 69〉 연간 당화혈색소 검사 횟수

(단위 : %)

구분	N	4회 이상		3회		2회		1회		측정 안함	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	66	17.4(3.7)	21.5	17.3(5.2)	30.2	29.5(6.4)	21.7	29.5(4.6)	15.5	6.4(2.6)	40.3
30세 이상 ²⁾	66	17.4(3.7)	21.5	17.3(5.2)	30.2	29.5(6.4)	21.7	29.5(4.6)	15.5	6.4(2.6)	40.3
성											
남자	32	11.4(4.9)	43.4	17.9(7.5)	42.1	29.5(9.5)	32.2	35.3(7.6)	21.6	6.0(3.9)	66.1
여자	34	23.6(5.5)	23.4	16.8(7.2)	43.1	29.4(7.4)	25.2	23.4(6.0)	25.6	6.8(3.5)	50.7
연령											
19-29	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
60-69	27	16.0(5.8)	36.1	14.7(6.2)	42.7	28.6(7.7)	27.0	28.0(6.7)	24.0	12.8(5.8)	45.3
70 이상	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
19-64	36	14.0(5.0)	35.5	20.7(7.3)	35.3	29.3(8.8)	30.1	31.8(7.0)	22.1	4.2(2.8)	68.0
65 이상	30	22.7(7.7)	33.8	11.9(6.7)	56.2	29.7(8.2)	27.5	25.7(6.1)	23.7	9.9(4.8)	48.8
교육수준 ³⁾											
무학	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	31	8.3(3.7)	44.5	18.3(7.8)	42.3	27.0(8.6)	31.7	38.9(8.8)	22.5	7.5(4.5)	60.2
대학교 이상	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
직업											
전문행정관리	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
사무직	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기타 ⁴⁾	33	24.3(4.7)	19.4	10.0(4.7)	47.1	23.6(6.8)	28.7	34.1(6.3)	18.6	8.0(3.9)	49.1
월 가구소득											
100만원 미만	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
300-400만원 미만	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
400만원 이상	28	13.3(5.7)	43.2	23.9(9.0)	37.6	28.3(10.3)	36.5	28.1(7.3)	26.0	6.4(4.3)	66.2
작년 대비 가구소득 변화											
줄어들었다	18	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
변함없다	35	19.9(4.5)	22.4	20.9(7.6)	36.3	37.3(8.9)	23.8	14.5(4.1)	28.1	7.4(3.9)	53.7
늘어났다	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-

주 1) 연간 당화혈색소 검사 횟수 : (응답보기별 응답자 수 / 의사진단을 받은 사람 중 당화혈색소에 대해 알고 있는 사람의 수) × 100

2) 연간 당화혈색소 검사 횟수(30세 이상) : (응답보기별 응답자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람 중 당화혈색소에 대해 알고 있는 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 70〉 연간 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 및 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율

(단위 : %)

구분	연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율			연간 당뇨병 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ^{1), 2)}	91	29.6(4.9)	16.5	91	42.6(5.9)	13.7
30세 이상 ^{3), 4)}	91	29.6(4.9)	16.5	91	42.6(5.9)	13.7
성						
남자	43	26.8(6.7)	25.1	43	47.9(8.8)	18.3
여자	48	32.3(6.0)	18.7	48	37.6(7.1)	18.9
연령						
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	6	-(-)	-	6	-(-)	-
50-59	24	18.2(9.0)	49.2	24	30.0(9.3)	31.1
60-69	34	43.2(8.4)	19.4	34	55.4(9.4)	17.0
70 이상	26	14.7(7.5)	50.9	26	33.7(9.9)	29.3
19-64	41	28.5(8.2)	28.6	41	40.2(8.8)	22.0
65 이상	50	30.8(6.6)	21.3	50	45.3(8.2)	18.2
교육수준 ⁵⁾						
무학	12	-(-)	-	12	-(-)	-
초등학교	17	-(-)	-	17	-(-)	-
중학교	14	-(-)	-	14	-(-)	-
고등학교	38	26.6(8.0)	30.2	38	34.3(8.7)	25.2
대학교 이상	10	-(-)	-	10	-(-)	-
직업						
전문행정관리	4	-(-)	-	4	-(-)	-
사무직	4	-(-)	-	4	-(-)	-
판매·서비스직	11	-(-)	-	11	-(-)	-
농림어업	3	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	21	9.1(6.5)	72.0	21	36.2(11.2)	31.0
기타 ⁶⁾	48	27.6(6.8)	24.6	48	41.7(8.6)	20.5
월 가구소득						
100만원 미만	18	-(-)	-	18	-(-)	-
100-200만원 미만	14	-(-)	-	14	-(-)	-
200-300만원 미만	14	-(-)	-	14	-(-)	-
300-400만원 미만	14	-(-)	-	14	-(-)	-
400만원 이상	31	37.7(9.5)	25.3	31	44.9(9.9)	22.0
작년 대비 가구소득 변화						
줄어들었다	28	30.2(8.1)	26.8	28	46.0(9.9)	21.6
변함없다	49	35.8(8.2)	23.0	49	50.8(7.9)	15.6
늘어났다	14	-(-)	-	14	-(-)	-

- 주 1) 연간 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
- 2) 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율 : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
- 3) 연간 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(30세 이상) : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
- 4) 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율(30세 이상) : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
- 5) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
- 6) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 71〉 연간 미충족의료율(병의원)¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	860	3.0(0.6)	21.3	420	3.2(0.9)	28.2	440	2.8(0.9)	32.9
연령									
19-29	81	3.6(2.1)	57.2	47	4.2(3.0)	71.2	34	2.8(2.8)	99.7
30-39	107	2.5(1.5)	59.5	49	1.9(1.9)	100.9	58	3.3(2.3)	70.5
40-49	168	2.6(1.2)	45.3	89	1.1(1.1)	100.1	79	4.2(2.1)	50.5
50-59	182	3.5(1.3)	37.4	85	5.9(2.3)	39.9	97	0.6(0.6)	99.8
60-69	192	2.6(1.2)	44.6	93	2.1(1.5)	69.0	99	3.1(1.9)	59.5
70 이상	130	3.1(1.5)	46.5	57	2.7(1.9)	70.3	73	3.5(1.8)	51.8
19-64	640	3.1(0.7)	22.9	322	3.6(1.1)	29.9	318	2.5(1.0)	38.1
65 이상	220	2.8(1.4)	47.9	98	1.5(1.1)	72.0	122	3.9(1.9)	48.9
교육수준 ²⁾									
무학	46	0.0(0.0)	.	7	-(-)	-	39	0.0(0.0)	.
초등학교	77	3.8(2.5)	67.7	27	0.0(0.0)	.	50	5.7(3.8)	66.7
중학교	71	2.3(1.6)	70.6	37	1.7(1.7)	97.7	34	2.9(2.8)	96.4
고등학교	354	3.2(0.9)	29.2	185	3.1(1.2)	37.9	169	3.4(1.5)	44.5
대학교 이상	308	3.1(1.0)	33.2	162	4.1(1.7)	41.0	146	2.0(1.3)	64.5
직업									
전문행정관리	113	3.2(1.9)	60.4	58	2.2(2.2)	100.0	55	4.2(3.1)	74.1
사무직	77	2.0(1.4)	72.8	44	1.7(1.8)	101.4	33	2.3(2.3)	99.4
판매·서비스직	101	4.2(2.6)	62.2	28	4.1(4.0)	98.3	73	4.3(3.4)	79.8
농림어업	14	-(-)	-	10	-(-)	-	4	-(-)	-
기능단순노무직	209	4.0(1.4)	35.8	167	3.9(1.5)	38.0	42	4.8(3.1)	64.4
기타 ³⁾	342	2.0(0.9)	43.6	110	2.5(1.6)	64.3	232	1.7(0.8)	49.8
월 가구소득									
100만원 미만	78	2.8(1.7)	60.5	26	0.0(0.0)	.	52	4.2(2.5)	59.0
100-200만원 미만	81	1.7(1.7)	100.1	34	4.0(3.9)	97.9	47	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	104	4.6(2.7)	58.4	49	4.6(3.1)	68.8	55	4.6(4.4)	95.7
300-400만원 미만	139	3.1(1.4)	45.7	73	1.6(1.1)	70.1	66	5.1(2.6)	51.7
400만원 이상	458	2.9(0.8)	26.6	238	3.5(1.2)	33.9	220	2.1(0.9)	45.8
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	274	4.3(1.5)	35.6	131	4.2(2.1)	49.5	143	4.3(2.1)	49.1
변함없다	422	2.6(0.8)	31.3	204	3.0(1.3)	42.2	218	2.2(1.0)	45.1
늘어났다	164	2.1(1.1)	53.8	85	2.3(1.6)	69.9	79	1.7(1.3)	77.0

주 1) 연간 미충족의료율(병의원) : (본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 72〉 미충족의료 이유(병의원)¹⁾

(단위 : %)

구분	N	시간이 없어서		증세가 가벼워서		경제적인 이유		교통편이 불편해서, 거리가 멀어서		병원에서 오래 기다리기 싫어서		병원 등에 예약을 하기가 힘들어서		진료 받기가 무서워서		코로나19 유행상황 때문에		기타	
		% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차
전체	860	1.9(0.5)	27.6	0.2(0.2)	70.4	0.1(0.1)	100.3	0.1(0.1)	50.2	0.0(0.0)	.	0.2(0.2)	76.5	0.0(0.0)	.	0.5(0.2)	52.9	0.0(0.0)	.
성																			
남자	420	1.8(0.7)	37.7	0.5(0.3)	70.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.3(0.3)	100.0	0.0(0.0)	.	0.6(0.4)	63.3	0.0(0.0)	.
여자	440	2.0(0.8)	41.7	0.0(0.0)	.	0.1(0.1)	100.3	0.3(0.1)	50.5	0.0(0.0)	.	0.1(0.1)	99.9	0.0(0.0)	.	0.3(0.2)	72.2	0.0(0.0)	.
연령																			
19-29	81	3.6(2.1)	57.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
30-39	107	2.5(1.5)	59.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
40-49	168	1.6(0.9)	57.6	0.6(0.6)	100.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.4(0.4)	100.7	0.0(0.0)	.
50-59	182	1.5(0.8)	56.1	0.5(0.5)	100.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.7(0.7)	100.6	0.0(0.0)	.	0.7(0.7)	98.1	0.0(0.0)	.
60-69	192	1.6(0.9)	56.5	0.0(0.0)	.	0.4(0.3)	99.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.3(0.3)	100.0	0.0(0.0)	.	0.4(0.3)	99.8	0.0(0.0)	.
70 이상	130	0.8(0.8)	99.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.1(0.6)	52.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.2(0.8)	70.9	0.0(0.0)	.
19-64	640	2.3(0.6)	27.0	0.3(0.2)	70.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.2(0.2)	100.1	0.0(0.0)	.	0.3(0.2)	74.0	0.0(0.0)	.
65 이상	220	0.5(0.5)	99.3	0.0(0.0)	.	0.3(0.3)	100.6	0.7(0.3)	51.1	0.0(0.0)	.	0.3(0.3)	99.7	0.0(0.0)	.	1.0(0.8)	74.9	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾																			
무학	46	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
초등학교	77	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	99.7	1.9(1.0)	54.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	99.7	0.0(0.0)	.
중학교	71	1.4(1.3)	98.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	100.0	0.0(0.0)	.
고등학교	354	1.9(0.8)	40.3	0.6(0.4)	70.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.7(0.5)	62.6	0.0(0.0)	.
대학교 이상	308	2.5(0.9)	36.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.6(0.4)	76.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
직업																			
전문행정관리	113	3.2(1.9)	60.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
사무직	77	2.0(1.4)	72.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	101	4.2(2.6)	62.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
농림어업	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	209	2.3(1.2)	51.1	0.4(0.4)	100.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.6(0.6)	99.3	0.0(0.0)	.	0.7(0.7)	100.4	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	342	0.5(0.5)	99.3	0.0(0.0)	.	0.2(0.2)	100.1	0.4(0.2)	50.9	0.0(0.0)	.	0.2(0.2)	99.7	0.0(0.0)	.	0.8(0.5)	60.9	0.0(0.0)	.
월 가구소득																			
100만원 미만	78	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	100.7	1.9(1.0)	54.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	81	1.7(1.7)	100.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	104	3.7(2.6)	69.3	0.9(0.9)	100.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	139	1.3(0.9)	70.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.9(1.1)	60.7	0.0(0.0)	.
400만원 이상	458	2.0(0.7)	34.2	0.2(0.2)	98.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.4(0.3)	76.5	0.0(0.0)	.	0.3(0.3)	97.6	0.0(0.0)	.
작년 대비 가구소득 변화																			
줄어들었다	274	3.4(1.3)	38.3	0.4(0.4)	99.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.5(0.5)	100.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
변함없다	422	1.3(0.6)	43.5	0.0(0.0)	.	0.1(0.1)	100.3	0.3(0.1)	50.0	0.0(0.0)	.	0.1(0.1)	99.9	0.0(0.0)	.	0.8(0.5)	59.9	0.0(0.0)	.
늘어났다	164	1.0(0.7)	74.0	0.6(0.6)	99.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.4(0.4)	105.3	0.0(0.0)	.

주 1) 미충족의료 이유(병의원) : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 73〉 연간 사고 및 중독 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	5.0(0.8)	15.6	445	5.8(1.0)	17.4	465	4.2(1.1)	27.5
연령									
19-29	88	5.6(2.4)	42.4	52	3.5(2.5)	69.9	36	8.3(4.6)	55.2
30-39	119	7.7(2.1)	27.9	54	11.7(4.2)	35.5	65	2.9(2.1)	72.3
40-49	177	4.7(1.7)	36.7	94	6.5(2.6)	40.1	83	2.9(1.6)	56.8
50-59	191	2.5(1.2)	46.6	86	2.3(1.1)	49.7	105	2.7(2.1)	75.7
60-69	199	4.2(1.3)	30.0	98	5.3(2.1)	39.8	101	3.0(1.6)	53.2
70 이상	136	8.0(2.4)	30.3	61	8.8(3.9)	44.4	75	7.3(2.9)	39.1
19-64	682	4.9(0.8)	17.2	341	5.6(1.1)	19.4	341	4.1(1.3)	31.1
65 이상	228	5.3(1.5)	27.5	104	6.4(2.4)	38.1	124	4.5(1.8)	39.8
교육수준 ²⁾									
무학	48	6.4(3.7)	57.7	8	-(-)	-	40	7.6(4.4)	57.4
초등학교	80	5.6(2.4)	43.3	29	7.5(4.9)	65.6	51	4.6(2.7)	57.6
중학교	73	9.4(3.5)	36.7	39	12.5(5.4)	43.4	34	5.7(4.1)	70.9
고등학교	372	4.2(1.1)	25.1	194	4.5(1.7)	37.3	178	3.9(1.9)	48.1
대학교 이상	333	4.8(1.2)	24.2	173	6.0(1.5)	25.0	160	3.5(1.4)	39.4
직업									
전문행정관리	119	1.2(0.9)	72.2	59	1.0(1.1)	101.0	60	1.3(1.3)	101.5
사무직	79	4.9(2.6)	53.1	45	6.5(3.3)	49.8	34	2.6(2.5)	98.0
판매·서비스직	108	6.6(2.8)	42.9	30	3.2(3.1)	99.2	78	8.1(3.8)	46.8
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	6.4(1.7)	26.0	178	7.0(1.9)	27.7	45	3.5(2.0)	58.0
기타 ³⁾	362	4.5(1.2)	26.9	120	5.1(2.0)	39.8	242	4.2(1.3)	30.2
월 가구소득									
100만원 미만	80	6.8(3.1)	46.0	28	3.7(3.6)	99.4	52	8.4(3.4)	39.9
100-200만원 미만	86	5.6(2.5)	44.2	36	10.4(5.2)	50.0	50	2.0(2.0)	98.4
200-300만원 미만	108	2.4(1.4)	57.5	52	4.7(2.7)	57.9	56	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	149	5.2(1.7)	33.5	80	5.1(1.8)	34.8	69	5.3(2.8)	52.5
400만원 이상	487	5.2(1.1)	22.1	249	5.8(1.6)	26.8	238	4.5(1.6)	35.3
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	6.7(1.9)	28.2	137	6.7(2.0)	30.3	149	6.7(2.5)	38.1
변함없다	448	3.2(0.9)	27.9	217	5.0(1.6)	32.9	231	1.3(0.8)	64.0
늘어났다	176	6.9(2.2)	32.3	91	6.2(2.5)	39.9	85	7.9(3.1)	39.8

주 1) 연간 사고 및 중독 경험률 : (연간 사고 및 중독 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 74〉 연간 사고 및 중독 건수율¹⁾

(단위 : 건/인구1,000명)

구분	전체			남자			여자		
	N	건(표준오차)	상대 표준오차	N	건(표준오차)	상대 표준오차	N	건(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	53.9(8.3)	15.4	445	63.5(11.2)	17.7	465	43.7(11.9)	27.3
연령									
19-29	88	55.7(23.6)	42.4	52	35.2(24.6)	69.9	36	82.6(45.6)	55.2
30-39	119	92.7(29.9)	32.3	54	147.6(57.6)	39.0	65	29.1(21.0)	72.3
40-49	177	51.8(19.1)	36.9	94	64.8(26.0)	40.1	83	38.1(23.1)	60.6
50-59	191	25.0(11.7)	46.6	86	23.1(11.5)	49.7	105	27.2(20.6)	75.7
60-69	199	41.8(12.5)	30.0	98	53.3(21.2)	39.8	101	30.2(16.0)	53.2
70 이상	136	88.2(27.6)	31.3	61	107.0(50.7)	47.3	75	73.5(28.7)	39.1
19-64	682	52.9(9.1)	17.2	341	61.2(12.1)	19.7	341	43.4(13.5)	31.0
65 이상	228	58.4(16.9)	28.9	104	74.7(30.8)	41.2	124	44.6(17.8)	39.8
교육수준 ²⁾									
무학	48	63.7(36.8)	57.7	8	-(-)	-	40	76.0(43.6)	57.4
초등학교	80	70.4(33.1)	47.0	29	114.0(79.8)	70.0	51	46.2(26.6)	57.6
중학교	73	94.0(34.5)	36.7	39	124.5(54.0)	43.4	34	57.2(40.6)	70.9
고등학교	372	42.3(10.6)	25.1	194	45.1(16.8)	37.3	178	38.8(18.7)	48.1
대학교 이상	333	56.1(13.6)	24.3	173	69.9(18.7)	26.7	160	39.8(16.2)	40.7
직업									
전문행정관리	119	11.8(8.5)	72.2	59	10.4(10.5)	101.0	60	13.3(13.5)	101.5
사무직	79	49.5(26.2)	53.1	45	65.3(32.5)	49.8	34	25.9(25.4)	98.0
판매·서비스직	108	73.6(30.8)	41.9	30	31.7(31.4)	99.2	78	91.2(41.7)	45.7
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	72.2(19.5)	27.0	178	80.0(23.8)	29.8	45	34.7(20.2)	58.0
기타 ³⁾	362	45.0(12.1)	26.9	120	51.4(20.5)	39.8	242	41.6(12.6)	30.2
월 가구소득									
100만원 미만	80	67.6(31.1)	46.0	28	36.6(36.4)	99.4	52	84.4(33.7)	39.9
100-200만원 미만	86	68.1(32.2)	47.3	36	131.7(70.8)	53.8	50	20.2(19.8)	98.4
200-300만원 미만	108	24.0(13.8)	57.5	52	46.9(27.1)	57.9	56	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	149	51.6(17.3)	33.5	80	50.8(17.7)	34.8	69	52.6(27.6)	52.5
400만원 이상	487	57.2(12.5)	21.9	249	65.1(17.4)	26.8	238	48.1(16.9)	35.1
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	67.2(18.9)	28.2	137	67.4(20.5)	30.3	149	66.9(25.5)	38.1
변함없다	448	33.5(9.4)	28.0	217	53.6(17.6)	32.9	231	12.8(8.2)	64.0
늘어났다	176	84.2(28.1)	33.4	91	80.6(36.3)	45.0	85	88.7(35.9)	40.5

주 1) 연간 사고 및 중독 건수율 : (연간 사고 및 중독 건수 / 조사대상 응답자 수) × 1,000

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 76〉 주 치료처별 사고 및 중독 분포¹⁾

(단위 : %)

구분	N	응급실		병의원 외래 이용		병의원 병실입원		기타	
		%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	45	29.1(6.7)	23.1	36.7(7.3)	19.8	26.7(7.3)	27.2	7.5(3.1)	40.5
성									
남자	27	27.6(8.3)	30.0	39.4(7.9)	20.0	25.9(7.2)	27.8	7.1(4.2)	58.7
여자	18	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
연령									
19-29	5	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
30-39	8	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
40-49	8	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
50-59	5	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
60-69	9	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
70 이상	10	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
19-64	33	32.1(8.6)	26.9	38.9(8.2)	21.2	23.9(9.2)	38.6	5.1(3.7)	71.7
65 이상	12	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
교육수준 ²⁾									
무학	3	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
초등학교	4	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
중학교	7	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
고등학교	15	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
대학교 이상	16	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
직업									
전문행정관리	2	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
사무직	5	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
판매·서비스직	4	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
농림어업	2	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
기능단순노무직	14	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
기타 ³⁾	18	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
월 가구소득									
100만원 미만	6	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
100-200만원 미만	4	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
200-300만원 미만	3	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
300-400만원 미만	8	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
400만원 이상	24	31.6(10.9)	34.5	51.8(8.1)	15.6	13.8(7.1)	51.8	2.9(2.9)	98.4
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	19	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
변함없다	15	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
늘어났다	11	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—

주 1) 주 치료처별 사고 및 중독 분포 : (주 치료처별 건수 / 사고 및 중독 건수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 77〉 주관적 건강인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	45.4(1.9)	4.1	445	51.2(2.8)	5.6	465	39.1(2.4)	6.0
연령									
19-29	88	70.0(5.5)	7.8	52	74.2(6.9)	9.3	36	64.4(6.8)	10.6
30-39	119	52.4(5.8)	11.0	54	61.6(7.3)	11.8	65	41.7(6.5)	15.7
40-49	177	47.4(4.0)	8.4	94	53.5(5.3)	10.0	83	40.9(5.6)	13.7
50-59	191	45.1(3.5)	7.8	86	48.5(6.2)	12.8	105	41.2(4.3)	10.4
60-69	199	32.8(3.8)	11.6	98	37.5(5.4)	14.5	101	28.0(4.6)	16.4
70 이상	136	23.4(4.2)	18.2	61	25.7(6.0)	23.1	75	21.5(5.1)	23.5
19-64	682	50.1(2.2)	4.3	341	55.1(3.3)	6.0	341	44.5(2.7)	6.1
65 이상	228	25.9(3.1)	11.9	104	32.4(4.2)	12.9	124	20.4(4.0)	19.8
교육수준 ²⁾									
무학	48	19.1(5.8)	30.1	8	-(-)	-	40	20.2(6.8)	33.7
초등학교	80	22.1(5.4)	24.5	29	29.0(9.9)	34.0	51	18.2(5.3)	29.0
중학교	73	29.9(5.4)	18.1	39	23.7(6.9)	29.2	34	37.4(9.3)	24.9
고등학교	372	48.3(2.9)	5.9	194	56.7(4.0)	7.0	178	37.9(3.5)	9.2
대학교 이상	333	51.7(3.5)	6.8	173	53.9(4.6)	8.6	160	49.2(4.8)	9.7
직업									
전문행정관리	119	53.0(5.4)	10.2	59	55.8(7.9)	14.1	60	50.2(7.0)	14.0
사무직	79	56.3(5.6)	9.9	45	56.9(7.2)	12.7	34	55.5(9.8)	17.6
판매·서비스직	108	40.9(5.4)	13.3	30	55.5(8.9)	16.0	78	34.7(5.9)	17.1
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	48.9(4.0)	8.3	178	51.7(4.4)	8.5	45	35.5(8.5)	23.9
기타 ³⁾	362	38.6(2.3)	6.0	120	45.5(4.3)	9.5	242	35.0(3.2)	9.2
월 가구소득									
100만원 미만	80	17.3(5.6)	32.2	28	20.5(8.1)	39.3	52	15.6(6.1)	39.1
100-200만원 미만	86	35.9(4.9)	13.7	36	42.8(7.8)	18.1	50	30.6(6.0)	19.6
200-300만원 미만	108	38.8(4.5)	11.7	52	47.5(6.1)	12.9	56	29.6(6.5)	22.1
300-400만원 미만	149	43.5(4.4)	10.1	80	47.3(6.2)	13.1	69	38.2(6.4)	16.7
400만원 이상	487	52.0(2.4)	4.6	249	56.5(3.9)	6.8	238	46.9(3.3)	7.1
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	44.1(3.4)	7.7	137	51.8(5.1)	9.8	149	36.2(3.7)	10.2
변함없다	448	45.7(2.4)	5.3	217	50.9(4.1)	8.0	231	40.2(3.2)	7.9
늘어났다	176	46.6(4.0)	8.7	91	50.8(5.1)	10.0	85	41.2(5.9)	14.3

주 1) 주관적 건강인지율 : (주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 78〉 행복감지수¹⁾

(단위 : 점)

구분	전체			남자			여자		
	N	점(표준오차)	상대 표준오차	N	점(표준오차)	상대 표준오차	N	점(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	6.7(0.1)	1.1	445	6.8(0.1)	1.3	465	6.6(0.1)	1.3
연령									
19-29	88	6.9(0.2)	2.8	52	6.8(0.2)	3.3	36	7.0(0.3)	4.3
30-39	119	7.0(0.2)	2.5	54	7.3(0.2)	3.1	65	6.6(0.3)	4.3
40-49	177	7.3(0.1)	1.5	94	7.3(0.2)	2.3	83	7.3(0.2)	2.3
50-59	191	6.8(0.1)	1.8	86	6.8(0.2)	2.6	105	6.8(0.1)	2.0
60-69	199	6.3(0.2)	2.5	98	6.3(0.2)	3.5	101	6.3(0.2)	2.7
70 이상	136	5.8(0.2)	2.8	61	6.1(0.3)	4.2	75	5.6(0.2)	3.2
19-64	682	6.9(0.1)	1.1	341	7.0(0.1)	1.3	341	6.9(0.1)	1.5
65 이상	228	5.9(0.1)	2.0	104	6.1(0.2)	3.2	124	5.8(0.1)	2.1
교육수준 ²⁾									
무학	48	5.2(0.2)	4.5	8	-(-)	-	40	5.0(0.3)	5.6
초등학교	80	5.6(0.2)	3.3	29	5.6(0.4)	7.9	51	5.7(0.2)	3.4
중학교	73	6.4(0.3)	4.1	39	6.1(0.3)	5.5	34	6.8(0.3)	4.9
고등학교	372	6.7(0.1)	1.5	194	6.9(0.1)	1.6	178	6.5(0.2)	2.4
대학교 이상	333	7.2(0.1)	1.3	173	7.1(0.1)	1.6	160	7.2(0.1)	1.6
직업									
전문행정관리	119	7.3(0.2)	2.2	59	7.2(0.2)	3.1	60	7.4(0.2)	2.4
사무직	79	7.3(0.2)	2.1	45	7.4(0.2)	2.5	34	7.1(0.3)	3.6
판매·서비스직	108	6.7(0.2)	2.6	30	7.4(0.3)	3.9	78	6.4(0.2)	3.3
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	6.7(0.1)	1.5	178	6.7(0.1)	1.6	45	6.7(0.3)	4.5
기타 ³⁾	362	6.4(0.1)	1.9	120	6.4(0.2)	3.5	242	6.4(0.1)	1.7
월 가구소득									
100만원 미만	80	5.3(0.2)	4.5	28	5.3(0.4)	7.7	52	5.4(0.2)	4.4
100-200만원 미만	86	6.2(0.2)	3.6	36	6.2(0.3)	4.9	50	6.2(0.3)	4.4
200-300만원 미만	108	6.3(0.2)	2.9	52	6.5(0.3)	4.4	56	6.2(0.2)	3.7
300-400만원 미만	149	6.6(0.2)	2.5	80	6.7(0.2)	3.2	69	6.4(0.2)	2.7
400만원 이상	487	7.1(0.1)	1.2	249	7.1(0.1)	1.5	238	7.1(0.1)	1.7
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	6.5(0.1)	1.9	137	6.6(0.1)	2.2	149	6.3(0.2)	2.8
변함없다	448	6.8(0.1)	1.3	217	6.8(0.1)	1.9	231	6.7(0.1)	1.3
늘어났다	176	7.0(0.2)	2.6	91	7.1(0.2)	3.0	85	6.8(0.2)	3.2

주 1) 행복감지수 : 행복지수의 총 합 / 조사대상 응답자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 79〉 삶의 질 지수(EQ-5D Index)¹⁾

(단위 : 점)

구분	전체			남자			여자		
	N	점(표준오차)	상대 표준오차	N	점(표준오차)	상대 표준오차	N	점(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	0.959(0.003)	0.3	445	0.970(0.003)	0.3	465	0.947(0.004)	0.5
연령									
19-29	88	0.987(0.004)	0.4	52	0.993(0.004)	0.4	36	0.978(0.007)	0.7
30-39	119	0.974(0.005)	0.5	54	0.980(0.005)	0.6	65	0.967(0.007)	0.7
40-49	177	0.978(0.004)	0.4	94	0.980(0.005)	0.5	83	0.977(0.006)	0.6
50-59	191	0.978(0.003)	0.3	86	0.978(0.005)	0.5	105	0.977(0.004)	0.4
60-69	199	0.941(0.008)	0.8	98	0.956(0.009)	1.0	101	0.925(0.010)	1.0
70 이상	136	0.868(0.015)	1.7	61	0.909(0.016)	1.8	75	0.835(0.020)	2.4
19-64	682	0.975(0.002)	0.2	341	0.979(0.003)	0.3	341	0.970(0.003)	0.3
65 이상	228	0.895(0.008)	0.9	104	0.929(0.010)	1.1	124	0.867(0.013)	1.5
교육수준 ²⁾									
무학	48	0.796(0.026)	3.3	8	-(-)	-	40	0.779(0.031)	4.0
초등학교	80	0.881(0.014)	1.6	29	0.878(0.018)	2.1	51	0.883(0.017)	2.0
중학교	73	0.947(0.011)	1.1	39	0.948(0.013)	1.4	34	0.945(0.018)	1.9
고등학교	372	0.974(0.003)	0.3	194	0.979(0.005)	0.5	178	0.969(0.005)	0.5
대학교 이상	333	0.976(0.003)	0.3	173	0.979(0.004)	0.4	160	0.973(0.004)	0.5
직업									
전문행정관리	119	0.984(0.004)	0.4	59	0.983(0.006)	0.6	60	0.986(0.005)	0.5
사무직	79	0.978(0.006)	0.6	45	0.980(0.007)	0.7	34	0.975(0.008)	0.8
판매·서비스직	108	0.970(0.006)	0.6	30	0.988(0.006)	0.6	78	0.962(0.008)	0.8
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	0.975(0.003)	0.3	178	0.978(0.003)	0.4	45	0.960(0.009)	0.9
기타 ³⁾	362	0.930(0.006)	0.6	120	0.941(0.008)	0.9	242	0.925(0.007)	0.8
월 가구소득									
100만원 미만	80	0.853(0.017)	2.0	28	0.898(0.022)	2.4	52	0.828(0.021)	2.6
100-200만원 미만	86	0.924(0.016)	1.7	36	0.934(0.019)	2.0	50	0.916(0.019)	2.1
200-300만원 미만	108	0.952(0.008)	0.8	52	0.959(0.012)	1.2	56	0.945(0.009)	1.0
300-400만원 미만	149	0.968(0.005)	0.5	80	0.973(0.006)	0.6	69	0.961(0.008)	0.8
400만원 이상	487	0.976(0.003)	0.3	249	0.982(0.003)	0.3	238	0.969(0.004)	0.4
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	0.965(0.004)	0.4	137	0.976(0.004)	0.4	149	0.955(0.007)	0.8
변함없다	448	0.954(0.004)	0.4	217	0.968(0.004)	0.4	231	0.939(0.006)	0.6
늘어났다	176	0.963(0.005)	0.6	91	0.968(0.006)	0.7	85	0.955(0.009)	0.9

주 1) 삶의 질 지수(EQ-5D Index) : 건강관련 삶의 질의 5가지 차원(운동능력, 자기관리, 일상 활동, 통증/불편, 불안/우울)의 기술체계를 종합한 지표

※ 삶의 질 조사도구(EQ-5D Index)의 질 가중치 추정연구(남해성, 2007)

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 80〉 연간 보건기관 이용률¹⁾

(단위 : 점)

구분	전체			남자			여자		
	N	점(표준오차)	상대 표준오차	N	점(표준오차)	상대 표준오차	N	점(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	44.5(2.1)	4.7	445	41.6(2.6)	6.3	465	47.7(2.8)	5.8
연령									
19-29	88	53.2(6.6)	12.5	52	39.3(7.5)	19.0	36	71.4(7.4)	10.3
30-39	119	51.4(4.9)	9.5	54	50.8(6.9)	13.5	65	52.1(5.7)	11.0
40-49	177	45.0(3.7)	8.3	94	37.7(4.8)	12.8	83	52.7(6.3)	12.0
50-59	191	34.9(3.5)	9.9	86	35.1(5.0)	14.3	105	34.7(4.4)	12.6
60-69	199	41.6(3.6)	8.7	98	44.9(5.2)	11.6	101	38.3(5.1)	13.2
70 이상	136	48.7(5.0)	10.2	61	49.0(7.0)	14.3	75	48.6(5.5)	11.2
19-64	682	44.4(2.4)	5.3	341	40.6(2.9)	7.3	341	48.7(3.1)	6.4
65 이상	228	45.2(4.2)	9.3	104	46.1(5.6)	12.2	124	44.4(5.3)	12.0
교육수준 ²⁾									
무학	48	41.3(6.6)	16.0	8	-(-)	-	40	46.7(7.6)	16.2
초등학교	80	44.7(6.9)	15.4	29	43.8(9.2)	21.1	51	45.3(7.9)	17.4
중학교	73	49.6(6.2)	12.5	39	46.4(7.7)	16.7	34	53.3(8.1)	15.2
고등학교	372	42.0(2.7)	6.5	194	41.6(3.6)	8.7	178	42.5(3.6)	8.5
대학교 이상	333	47.0(3.0)	6.5	173	41.2(3.7)	9.1	160	53.8(4.5)	8.4
직업									
전문행정관리	119	52.0(4.6)	8.8	59	43.4(6.1)	13.9	60	61.0(7.1)	11.7
사무직	79	39.3(5.9)	15.1	45	27.8(6.8)	24.5	34	56.3(8.2)	14.6
판매·서비스직	108	50.7(4.8)	9.5	30	51.9(9.8)	18.9	78	50.2(6.0)	12.0
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	40.6(3.8)	9.5	178	40.5(4.0)	9.8	45	40.9(7.7)	18.7
기타 ³⁾	362	42.5(2.9)	6.8	120	43.6(5.4)	12.3	242	42.0(3.1)	7.3
월 가구소득									
100만원 미만	80	35.9(6.0)	16.6	28	29.9(8.2)	27.5	52	39.2(6.4)	16.4
100-200만원 미만	86	44.0(5.8)	13.2	36	36.3(7.9)	21.9	50	49.8(7.1)	14.2
200-300만원 미만	108	50.8(5.4)	10.7	52	53.5(6.8)	12.8	56	47.9(7.3)	15.3
300-400만원 미만	149	34.9(4.2)	12.1	80	35.4(5.1)	14.3	69	34.2(5.7)	16.6
400만원 이상	487	47.1(3.1)	6.5	249	42.6(3.7)	8.6	238	52.2(3.8)	7.3
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	49.5(3.8)	7.6	137	46.7(4.7)	10.0	149	52.4(5.0)	9.5
변함없다	448	41.1(2.7)	6.7	217	38.4(3.4)	8.7	231	43.8(3.6)	8.2
늘어났다	176	45.6(4.5)	9.9	91	41.5(5.4)	12.9	85	50.7(6.0)	11.7

주 1) 연간 보건기관 이용률 : (최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 건강생활지원센터, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사
체계

제2부

주요
통계
결과

제3부

통계
표

제4부

부록

〈표 81〉 광역시도 거주기간¹⁾

(단위 : %)

구분	N	5년미만		5-10년미만		10-15년미만		15-20년미만		20년이상	
		%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	5.7(1.0)	17.6	5.4(0.8)	14.5	7.9(1.2)	15.3	4.9(0.9)	17.3	76.0(2.0)	2.6
성											
남자	445	5.8(1.4)	23.5	6.1(1.0)	17.0	7.4(1.5)	19.7	2.6(0.7)	28.6	78.1(2.4)	3.1
여자	465	5.7(1.2)	20.8	4.7(1.1)	22.7	8.4(1.4)	16.9	7.4(1.5)	20.6	73.7(2.5)	3.4
연령											
19-29	88	8.1(3.4)	42.7	7.0(2.4)	35.1	4.9(2.4)	48.4	7.1(3.4)	47.7	73.0(4.9)	6.7
30-39	119	13.2(3.6)	27.2	13.2(3.3)	24.9	11.6(2.7)	23.2	5.0(2.2)	42.9	56.8(5.1)	9.0
40-49	177	5.6(1.7)	30.5	7.8(2.0)	25.7	13.5(3.2)	23.6	10.2(2.4)	23.4	62.8(4.3)	6.8
50-59	191	3.0(1.3)	45.1	3.4(1.4)	40.2	7.5(2.0)	26.8	3.1(1.3)	41.9	83.0(2.7)	3.3
60-69	199	2.9(1.1)	38.5	2.2(1.3)	57.1	5.5(1.5)	27.1	3.0(1.7)	56.5	86.3(2.7)	3.1
70 이상	136	4.6(1.9)	41.0	0.0(0.0)	.	2.7(1.5)	54.6	0.0(0.0)	.	92.7(2.4)	2.6
19-64	682	6.1(1.2)	19.0	6.5(0.9)	14.4	8.9(1.5)	16.9	6.0(1.0)	17.3	72.5(2.3)	3.1
65 이상	228	4.3(1.3)	30.9	1.2(0.9)	73.9	3.8(1.1)	29.8	0.4(0.4)	99.3	90.2(2.2)	2.4
교육수준 ³⁾											
무학	48	7.6(4.4)	57.7	4.2(2.8)	65.9	4.9(3.6)	74.2	0.0(0.0)	.	83.3(6.1)	7.3
초등학교	80	2.7(2.2)	80.5	2.3(1.6)	70.3	0.9(0.9)	101.1	1.3(1.3)	97.3	92.8(3.0)	3.2
중학교	73	1.8(1.3)	74.0	6.7(3.3)	49.1	11.1(4.1)	37.3	2.8(1.7)	62.2	77.7(4.9)	6.3
고등학교	372	3.8(1.1)	28.3	5.6(1.4)	24.2	7.9(1.4)	17.8	6.8(1.5)	22.2	75.9(2.4)	3.2
대학교 이상	333	9.0(2.0)	22.4	5.8(1.4)	24.6	8.9(2.2)	24.7	4.0(1.0)	26.0	72.3(3.2)	4.5
직업											
전문행정관리	119	8.0(2.5)	30.9	6.5(2.0)	31.3	12.3(3.2)	25.8	5.1(2.5)	48.0	68.0(4.8)	7.1
사무직	79	2.3(1.7)	72.4	6.8(3.2)	46.6	7.7(2.6)	33.8	4.1(2.5)	60.3	79.2(4.4)	5.5
판매·서비스직	108	0.8(0.8)	100.4	9.6(3.6)	37.8	7.1(2.5)	35.2	12.0(3.6)	30.4	70.6(5.4)	7.6
농림어업	15	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-	-()	-
기능단순노무직	223	9.4(2.5)	26.7	4.6(1.4)	29.6	9.3(2.3)	24.7	4.1(1.5)	36.8	72.7(3.9)	5.4
기타 ⁴⁾	362	5.1(1.3)	25.0	4.2(1.2)	28.2	5.8(1.5)	26.2	3.3(1.0)	30.6	81.6(2.6)	3.2
월 가구소득											
100만원 미만	80	7.9(4.0)	50.5	6.2(2.9)	47.7	3.0(2.2)	72.0	0.0(0.0)	.	83.0(6.5)	7.8
100-200만원 미만	86	6.1(4.4)	72.4	2.1(2.0)	98.6	5.2(2.6)	50.8	2.3(1.6)	67.1	84.4(5.3)	6.3
200-300만원 미만	108	8.4(3.5)	41.5	6.5(2.3)	35.4	4.9(1.7)	33.8	6.0(3.0)	49.3	74.1(5.3)	7.1
300-400만원 미만	149	8.3(3.0)	36.3	5.7(2.0)	35.6	10.0(3.1)	30.7	2.3(1.4)	59.8	73.8(5.0)	6.7
400만원 이상	487	4.2(1.2)	28.2	5.6(1.1)	20.2	8.9(1.9)	21.5	6.4(1.2)	19.4	75.0(2.6)	3.4
작년 대비 가구소득 변화											
줄어들었다	286	5.3(1.6)	29.5	4.1(1.3)	32.4	5.6(1.4)	24.2	3.6(1.2)	31.9	81.4(2.7)	3.3
변함없다	448	5.6(1.3)	23.3	6.4(1.3)	20.8	7.2(1.9)	25.8	4.6(1.1)	23.5	76.1(2.9)	3.8
늘어났다	176	6.7(2.2)	32.7	5.0(1.8)	36.7	13.0(2.9)	22.0	7.7(2.5)	32.4	67.6(4.1)	6.1

주 1) 광역시도 거주기간: (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 82〉 시군구 거주기간¹⁾

(단위 : %)

구분	N	5년미만		5-10년미만		10-15년미만		15-20년미만		20년이상	
		%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	14.8(1.6)	10.9	11.1(1.7)	14.9	12.8(1.5)	11.7	7.8(1.1)	14.6	53.4(2.5)	4.7
성											
남자	445	16.6(2.0)	12.2	11.0(1.9)	17.7	11.6(1.7)	14.8	7.1(1.3)	18.6	53.7(3.1)	5.8
여자	465	12.9(1.7)	13.2	11.2(2.0)	17.7	14.1(1.8)	12.5	8.6(1.7)	19.3	53.2(2.7)	5.0
연령											
19-29	88	21.5(4.4)	20.6	9.2(3.2)	34.8	9.2(3.2)	34.6	9.8(3.6)	36.8	50.3(5.7)	11.2
30-39	119	30.9(5.0)	16.2	16.8(3.8)	22.5	12.7(3.1)	24.6	5.6(2.4)	43.0	34.0(4.7)	13.9
40-49	177	15.2(2.7)	17.9	13.5(2.7)	20.1	21.2(3.9)	18.4	12.2(2.6)	21.3	37.9(4.7)	12.3
50-59	191	11.1(2.7)	24.3	10.7(3.2)	30.3	14.0(3.3)	23.4	4.2(1.5)	36.2	60.0(4.4)	7.3
60-69	199	7.6(1.9)	24.5	10.3(2.5)	24.7	11.2(2.6)	23.6	8.5(2.5)	29.6	62.3(3.9)	6.2
70 이상	136	6.3(2.2)	35.8	5.5(2.8)	51.1	4.2(2.1)	49.6	6.4(2.5)	39.6	77.6(4.2)	5.4
19-64	682	16.6(1.9)	11.1	12.2(1.8)	14.8	14.1(1.8)	12.9	7.7(1.1)	14.5	49.3(3.0)	6.0
65 이상	228	7.5(1.8)	24.8	6.6(2.0)	31.2	7.5(1.6)	21.6	8.0(2.5)	31.9	70.5(3.4)	4.9
교육수준 ³⁾											
무학	48	14.7(4.8)	33.0	6.2(3.0)	48.0	7.1(4.3)	60.9	0.0(0.0)	.	72.1(7.0)	9.7
초등학교	80	2.7(2.2)	80.5	6.2(2.6)	42.4	1.8(0.9)	52.1	5.9(3.5)	58.6	83.4(4.6)	5.5
중학교	73	9.5(3.6)	38.1	12.4(5.1)	41.0	12.2(4.6)	37.6	4.1(3.0)	73.6	61.7(6.7)	10.9
고등학교	372	11.7(2.2)	18.6	11.3(2.1)	18.8	12.5(1.9)	15.5	11.4(1.8)	15.8	53.1(3.2)	6.0
대학교 이상	333	21.6(2.8)	13.1	12.3(2.7)	22.1	16.0(2.5)	15.7	5.2(1.5)	28.8	44.9(3.9)	8.8
직업											
전문행정관리	119	18.6(3.5)	19.0	16.5(4.4)	26.7	17.2(3.8)	22.1	5.9(2.7)	45.1	41.8(4.8)	11.5
사무직	79	13.6(4.3)	32.0	8.9(3.8)	42.0	18.9(4.4)	23.0	6.2(3.2)	51.5	52.4(6.0)	11.4
판매·서비스직	108	9.2(2.9)	31.2	14.9(4.0)	27.1	11.0(3.2)	28.6	12.8(3.8)	29.5	52.1(5.2)	9.9
농림어업	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	223	20.4(3.4)	16.5	9.1(1.9)	21.2	11.5(2.5)	21.4	8.9(2.0)	22.3	50.1(4.4)	8.7
기타 ⁴⁾	362	12.3(2.1)	16.9	10.3(2.4)	22.9	11.7(1.9)	16.0	6.6(1.3)	19.9	59.1(3.1)	5.3
월 가구소득											
100만원 미만	80	13.6(4.6)	33.6	7.4(3.1)	42.6	3.9(2.4)	60.6	1.4(1.3)	98.5	73.7(7.2)	9.8
100-200만원 미만	86	7.7(4.6)	60.6	9.8(4.2)	42.3	9.3(3.7)	39.9	11.7(4.6)	39.1	61.6(6.5)	10.6
200-300만원 미만	108	22.7(5.6)	24.5	9.3(2.9)	30.6	5.3(1.9)	36.0	13.2(4.1)	30.8	49.5(6.7)	13.6
300-400만원 미만	149	19.5(4.8)	24.7	13.4(3.4)	25.3	15.3(3.2)	21.0	4.0(1.7)	43.6	47.8(4.8)	10.1
400만원 이상	487	13.0(2.1)	16.3	11.5(2.2)	19.0	15.3(2.5)	16.6	7.9(1.4)	17.2	52.2(3.7)	7.2
작년 대비 가구소득 변화											
줄어들었다	286	17.2(3.1)	17.7	7.5(1.8)	24.7	9.1(2.2)	23.8	5.8(1.6)	27.3	60.3(3.5)	5.8
변함없다	448	12.2(1.7)	13.9	13.5(2.6)	19.2	13.5(2.1)	15.9	8.1(1.6)	19.9	52.7(3.2)	6.1
늘어났다	176	17.6(4.1)	23.1	10.9(3.0)	27.9	17.0(3.5)	20.4	10.0(3.2)	32.5	44.6(6.0)	13.5

주 1) 시군구 거주기간: (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 83〉 심폐소생술 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	96.4(0.5)	0.6	445	98.1(0.5)	0.5	464	94.6(0.8)	0.9
연령									
19-29	88	100.0(0.0)	0.0	52	100.0(0.0)	0.0	36	100.0(0.0)	0.0
30-39	119	98.9(1.1)	1.1	54	98.0(2.0)	2.0	65	100.0(0.0)	0.0
40-49	177	99.4(0.5)	0.5	94	98.9(1.1)	1.1	83	100.0(0.0)	0.0
50-59	191	99.6(0.4)	0.4	86	100.0(0.0)	0.0	105	99.1(0.9)	0.9
60-69	199	96.2(1.4)	1.5	98	99.0(1.0)	1.0	101	93.3(2.2)	2.4
70 이상	135	78.2(3.8)	4.8	61	87.4(3.5)	4.0	74	70.8(5.6)	7.9
19-64	682	99.5(0.3)	0.3	341	99.4(0.4)	0.4	341	99.5(0.3)	0.3
65 이상	227	84.0(2.2)	2.6	104	91.8(2.2)	2.4	123	77.5(3.4)	4.3
교육수준 ²⁾									
무학	48	59.7(7.4)	12.4	8	-(-)	-	40	56.4(7.9)	14.0
초등학교	79	83.9(3.4)	4.1	29	85.9(6.2)	7.2	50	82.8(4.8)	5.8
중학교	73	96.4(2.1)	2.2	39	95.7(3.0)	3.1	34	97.1(2.9)	3.0
고등학교	372	99.1(0.5)	0.5	194	99.1(0.7)	0.7	178	99.1(0.7)	0.7
대학교 이상	333	99.7(0.3)	0.3	173	99.5(0.5)	0.5	160	100.0(0.0)	0.0
직업									
전문행정관리	119	100.0(0.0)	0.0	59	100.0(0.0)	0.0	60	100.0(0.0)	0.0
사무직	79	100.0(0.0)	0.0	45	100.0(0.0)	0.0	34	100.0(0.0)	0.0
판매·서비스직	108	100.0(0.0)	0.0	30	100.0(0.0)	0.0	78	100.0(0.0)	0.0
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	99.3(0.5)	0.5	178	99.5(0.5)	0.5	45	98.1(1.8)	1.9
기타 ³⁾	361	91.4(1.3)	1.4	120	94.2(1.7)	1.8	241	90.0(1.5)	1.7
월 가구소득									
100만원 미만	79	69.2(5.7)	8.3	28	85.5(6.1)	7.2	51	60.2(6.2)	10.2
100-200만원 미만	86	92.7(2.3)	2.5	36	98.1(1.9)	1.9	50	88.6(3.7)	4.1
200-300만원 미만	108	96.1(1.8)	1.9	52	95.0(3.1)	3.2	56	97.3(1.9)	2.0
300-400만원 미만	149	99.6(0.4)	0.4	80	99.3(0.7)	0.7	69	100.0(0.0)	0.0
400만원 이상	487	99.4(0.3)	0.3	249	99.3(0.4)	0.5	238	99.5(0.4)	0.4
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	98.7(0.6)	0.6	137	98.9(0.8)	0.8	149	98.5(0.8)	0.8
변함없다	447	94.4(1.0)	1.1	217	97.2(0.9)	0.9	230	91.6(1.6)	1.8
늘어났다	176	97.8(0.9)	1.0	91	99.1(0.9)	0.9	85	96.3(1.8)	1.9

주 1) 심폐소생술 인지율 : (심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 84〉 심폐소생술 교육 경험률 및 심폐소생술 마네킹, 자동제세동기 실습 경험률

(단위 : %)

구분	N	심폐소생술 교육 경험률 ¹⁾		심폐소생술 마네킹 실습 경험률 ²⁾		심폐소생술 자동제세동기 실습 경험률 ³⁾	
		%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	27.1(1.5)	5.6	24.8(1.6)	6.6	15.3(1.3)	8.4
성							
남자	445	35.5(2.2)	6.3	31.7(2.3)	7.4	19.3(2.0)	10.6
여자	464	18.1(2.2)	12.1	17.3(2.2)	12.8	10.9(1.6)	15.0
연령							
19-29	88	42.6(5.6)	13.0	38.1(5.5)	14.4	25.0(4.6)	18.4
30-39	119	37.8(4.2)	11.2	35.3(4.5)	12.9	22.5(3.9)	17.4
40-49	177	29.9(3.4)	11.5	27.4(3.5)	12.9	18.2(2.9)	15.8
50-59	191	28.7(3.1)	10.8	26.4(3.1)	11.8	15.1(2.2)	14.4
60-69	199	15.6(2.3)	14.5	14.0(2.4)	17.2	8.0(1.6)	20.5
70 이상	135	5.6(1.9)	34.2	5.6(1.9)	34.2	1.7(1.2)	69.7
19-64	682	32.0(1.7)	5.3	29.2(1.9)	6.4	18.0(1.5)	8.4
65 이상	227	7.1(1.5)	21.2	6.5(1.6)	24.3	3.9(1.2)	31.9
교육수준 ⁴⁾							
무학	48	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
초등학교	79	7.1(3.0)	42.6	7.1(3.0)	42.6	3.7(2.0)	55.1
중학교	73	9.7(3.1)	32.3	8.3(3.0)	36.0	5.1(2.1)	40.3
고등학교	372	30.2(2.8)	9.2	26.4(3.0)	11.4	15.1(2.3)	15.0
대학교 이상	333	33.4(2.6)	7.8	31.8(2.7)	8.6	21.0(2.4)	11.6
직업							
전문행정관리	119	39.5(4.6)	11.6	38.3(4.6)	12.0	29.7(4.6)	15.4
사무직	79	34.4(5.9)	17.2	29.6(5.9)	19.9	17.4(4.2)	24.4
판매·서비스직	108	27.5(4.8)	17.4	27.5(4.8)	17.4	16.9(3.3)	19.6
농림어업	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	223	36.6(3.5)	9.5	32.3(3.6)	11.0	18.4(2.8)	15.4
기타 ⁵⁾	361	14.4(2.0)	13.8	12.7(2.0)	15.4	6.7(1.6)	23.2
월 가구소득							
100만원 미만	79	9.1(4.4)	47.8	6.3(3.0)	48.6	7.9(4.2)	52.8
100-200만원 미만	86	10.7(3.2)	29.5	10.7(3.2)	29.5	4.8(2.3)	47.9
200-300만원 미만	108	21.2(3.8)	18.1	19.8(3.7)	18.8	11.9(3.1)	26.0
300-400만원 미만	149	27.9(4.4)	15.7	24.8(4.4)	18.0	18.1(4.3)	23.6
400만원 이상	487	32.6(2.1)	6.5	30.1(2.2)	7.4	17.5(1.6)	9.1
작년 대비 가구소득 변화							
줄어들었다	286	25.9(2.8)	10.9	22.8(2.8)	12.4	13.3(2.3)	17.5
변함없다	447	26.6(1.8)	6.9	24.3(1.9)	7.7	15.1(1.5)	9.9
늘어났다	176	30.3(3.9)	13.0	29.0(3.9)	13.4	18.6(3.2)	17.4

주 1) 심폐소생술 교육 경험률 : (최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 심폐소생술 실습 경험률(마네킹) : (최근 2년 동안 마네킹을 이용한 심폐소생술 실습을 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 심폐소생술 실습경험률(자동제세동기) : (최근 2년 동안 자동제세동기 AED를 이용한 심폐소생술 실습을 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

4) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

5) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 85〉 심폐소생술 시행능력률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	73.1(1.5)	2.0	445	88.3(1.5)	1.7	464	56.8(2.6)	4.5
연령									
19-29	88	86.6(3.5)	4.1	52	96.9(2.2)	2.2	36	72.9(7.3)	10.0
30-39	119	81.1(3.2)	3.9	54	92.5(3.4)	3.7	65	68.0(6.0)	8.8
40-49	177	76.6(3.4)	4.4	94	95.7(2.1)	2.2	83	56.5(5.9)	10.5
50-59	191	79.2(2.5)	3.1	86	91.5(2.8)	3.0	105	65.7(4.3)	6.6
60-69	199	68.9(3.4)	4.9	98	83.9(4.0)	4.8	101	53.7(5.2)	9.8
70 이상	135	35.6(4.8)	13.6	61	54.9(6.7)	12.2	74	20.3(5.7)	28.1
19-64	682	79.2(1.5)	1.8	341	92.8(1.4)	1.5	341	63.7(3.0)	4.7
65 이상	227	48.2(3.6)	7.4	104	66.8(5.2)	7.8	123	32.4(4.3)	13.4
교육수준 ²⁾									
무학	48	6.9(3.7)	53.7	8	-(-)	-	40	2.7(2.6)	97.3
초등학교	79	40.4(6.2)	15.4	29	50.9(10.0)	19.7	50	34.5(7.2)	20.8
중학교	73	64.7(6.5)	10.0	39	65.8(7.8)	11.9	34	63.3(9.4)	14.8
고등학교	372	76.8(2.4)	3.2	194	91.8(1.9)	2.1	178	58.3(4.5)	7.7
대학교 이상	333	83.9(1.9)	2.2	173	94.8(1.6)	1.7	160	71.1(3.6)	5.0
직업									
전문행정관리	119	88.1(2.8)	3.1	59	93.4(3.1)	3.3	60	82.6(5.3)	6.4
사무직	79	86.8(3.6)	4.2	45	93.3(3.9)	4.1	34	77.2(6.6)	8.5
판매·서비스직	108	77.8(4.4)	5.6	30	96.9(3.2)	3.3	78	69.8(5.7)	8.2
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	86.0(2.3)	2.6	178	94.4(1.7)	1.8	45	45.2(9.3)	20.7
기타 ³⁾	361	53.7(3.0)	5.6	120	72.3(4.4)	6.0	241	43.9(3.6)	8.1
월 가구소득									
100만원 미만	79	35.8(5.6)	15.6	28	62.3(10.3)	16.5	51	21.3(6.4)	30.0
100-200만원 미만	86	55.9(5.3)	9.5	36	63.3(8.3)	13.1	50	50.3(5.8)	11.5
200-300만원 미만	108	63.5(4.7)	7.4	52	83.5(5.1)	6.1	56	42.7(6.4)	15.0
300-400만원 미만	149	73.3(3.5)	4.7	80	90.2(3.2)	3.5	69	50.1(6.5)	13.0
400만원 이상	487	81.9(1.7)	2.0	249	93.6(1.6)	1.7	238	68.6(3.2)	4.6
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	72.1(2.4)	3.3	137	87.5(2.6)	3.0	149	56.4(4.0)	7.0
변함없다	447	71.0(1.9)	2.6	217	87.5(1.9)	2.2	230	53.9(3.2)	5.9
늘어났다	176	79.9(3.1)	3.9	91	91.2(2.7)	2.9	85	65.7(6.0)	9.1

주 1) 심폐소생술 시행능력률 : (심폐소생술을 “정확하게” 또는 “대략” 시행할 수 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 86〉 코로나19로 인한 심리적 영향

(단위 : %)

구분	감염에 대한 염려 ¹⁾			감염으로 인한 피해 염려 ²⁾			감염으로 인한 경제적 피해 염려 ³⁾		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	34.5(1.8)	5.2	910	21.9(1.6)	7.3	910	27.3(1.8)	6.5
성									
남자	445	29.3(2.3)	8.0	445	19.1(2.2)	11.3	445	25.6(2.2)	8.7
여자	465	40.0(2.7)	6.7	465	25.0(2.0)	8.2	465	29.2(2.6)	8.9
연령									
19-29	88	23.2(4.1)	17.8	88	8.5(2.8)	33.5	88	20.0(4.0)	20.0
30-39	119	34.1(4.8)	14.1	119	19.8(4.5)	22.6	119	24.1(4.1)	16.9
40-49	177	24.6(3.3)	13.3	177	14.7(2.6)	17.4	177	21.0(3.2)	15.3
50-59	191	33.0(3.4)	10.4	191	21.3(3.4)	15.8	191	24.3(3.1)	12.9
60-69	199	45.1(3.8)	8.4	199	33.3(4.0)	11.9	199	36.2(4.4)	12.1
70 이상	136	51.4(4.3)	8.4	136	36.5(4.5)	12.2	136	42.7(4.2)	9.8
19-64	682	31.3(2.2)	7.0	682	17.8(1.7)	9.5	682	24.0(1.6)	6.7
65 이상	228	47.4(3.1)	6.5	228	38.7(3.9)	10.1	228	40.9(4.2)	10.2
교육수준 ⁴⁾									
무학	48	48.7(6.2)	12.7	48	33.3(6.9)	20.6	48	37.8(7.3)	19.4
초등학교	80	45.8(5.9)	12.9	80	43.4(6.2)	14.3	80	44.2(5.9)	13.4
중학교	73	45.7(6.1)	13.3	73	34.2(6.3)	18.5	73	40.0(7.0)	17.4
고등학교	372	30.1(2.9)	9.5	372	18.3(2.1)	11.4	372	28.7(2.8)	9.9
대학교 이상	333	33.5(3.0)	9.1	333	18.4(2.5)	13.7	333	19.3(2.3)	11.7
직업									
전문행정관리	119	28.6(4.2)	14.8	119	18.0(3.5)	19.7	119	16.8(3.3)	19.6
사무직	79	28.4(4.9)	17.2	79	13.5(3.7)	27.5	79	16.2(4.0)	24.8
판매·서비스직	108	36.1(4.7)	13.1	108	22.9(3.3)	14.6	108	26.1(3.6)	13.9
농림어업	15	-(-)	-	15	-(-)	-	15	-(-)	-
기능단순노무직	223	28.5(3.7)	12.8	223	21.7(3.0)	13.6	223	30.1(3.5)	11.7
기타 ⁵⁾	362	40.7(2.7)	6.5	362	25.4(2.2)	8.7	362	33.2(3.0)	8.9
월 가구소득									
100만원 미만	80	48.4(4.8)	10.0	80	37.4(5.7)	15.3	80	40.9(6.7)	16.4
100-200만원 미만	86	46.1(5.2)	11.4	86	35.6(5.8)	16.3	86	39.9(7.1)	17.9
200-300만원 미만	108	40.8(5.6)	13.7	108	24.6(4.4)	18.1	108	37.5(5.3)	14.2
300-400만원 미만	149	38.8(4.5)	11.5	149	26.4(5.0)	19.0	149	32.1(4.0)	12.4
400만원 이상	487	28.6(2.3)	8.1	487	16.4(1.7)	10.4	487	20.4(1.8)	9.0
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	40.8(2.8)	6.8	286	26.4(2.9)	10.8	286	36.3(3.6)	9.8
변함없다	448	32.6(2.3)	7.0	448	22.0(2.2)	10.0	448	24.1(2.1)	8.8
늘어났다	176	29.4(3.8)	12.8	176	14.8(2.1)	14.3	176	21.6(3.4)	15.7

- 주 1) 코로나19로 인한 심리적 영향(감염에 대한 염려) : (감염이 염려된다("매우 그렇다" 또는 "그렇다")고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
 2) 코로나19로 인한 심리적 영향(감염으로 인한 피해 염려) : (감염으로 인한 피해가 염려된다("매우 그렇다" 또는 "그렇다")고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
 3) 코로나19로 인한 심리적 영향(감염으로 인한 경제적 피해 염려) : (감염으로 인한 경제적 피해가 염려된다("매우 그렇다" 또는 "그렇다")고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
 4) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
 5) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 87〉 코로나19 예방접종 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	N	1차 접종		2차 접종(안센 포함)		3차 접종(부스터샷)		4차 이상 접종		접종하지 않음	
		%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	0.7(0.3)	38.7	20.6(1.5)	7.3	59.5(2.0)	3.4	15.9(1.5)	9.5	3.3(0.6)	18.8
성											
남자	445	0.5(0.4)	70.9	21.6(2.0)	9.4	58.0(2.3)	4.0	16.9(1.9)	11.2	3.0(0.8)	26.4
여자	464	0.9(0.4)	45.7	19.6(1.9)	9.7	61.0(2.4)	3.9	14.8(1.7)	11.2	3.7(0.9)	23.8
연령											
19-29	88	0.0(0.0)	.	39.3(4.4)	11.3	57.4(4.7)	8.2	1.1(1.1)	101.3	2.2(1.1)	48.1
30-39	119	2.2(1.3)	60.5	43.4(4.3)	9.9	47.7(4.3)	9.0	2.4(1.4)	60.4	4.3(1.9)	44.1
40-49	177	1.1(0.8)	70.0	27.6(3.7)	13.5	63.4(3.9)	6.2	1.7(0.8)	44.8	6.2(1.8)	28.1
50-59	191	0.6(0.6)	99.3	11.8(2.7)	22.9	73.1(3.4)	4.6	12.2(2.6)	21.2	2.3(1.1)	46.5
60-69	199	0.0(0.0)	.	6.0(1.5)	24.6	55.8(3.2)	5.8	35.5(3.4)	9.6	2.7(1.1)	40.7
70 이상	135	0.5(0.5)	99.7	0.3(0.3)	102.6	47.9(5.3)	11.0	49.2(5.3)	10.7	2.0(1.2)	58.6
19-64	682	0.8(0.3)	41.3	24.9(1.8)	7.3	61.5(2.1)	3.4	9.3(1.1)	11.7	3.5(0.7)	20.5
65 이상	227	0.3(0.3)	99.4	3.0(0.9)	28.9	51.1(3.8)	7.4	42.7(3.9)	9.1	2.8(1.1)	38.2
교육수준 ²⁾											
무학	48	1.5(1.5)	100.2	7.8(2.1)	27.3	45.4(6.7)	14.8	41.9(6.4)	15.2	3.5(2.5)	70.8
초등학교	79	0.0(0.0)	.	6.8(2.9)	42.6	43.9(6.6)	14.9	48.4(6.6)	13.7	0.9(0.9)	101.1
중학교	73	0.0(0.0)	.	8.1(3.6)	44.9	55.0(6.8)	12.4	33.5(6.1)	18.2	3.5(2.0)	57.8
고등학교	372	0.6(0.4)	71.5	20.2(2.2)	10.8	62.2(2.7)	4.3	13.7(2.0)	14.6	3.3(0.9)	28.9
대학교 이상	333	1.0(0.5)	51.1	27.4(2.3)	8.5	61.2(2.7)	4.5	6.5(1.2)	18.3	3.8(1.0)	25.0
직업											
전문행정관리	119	0.9(0.9)	101.0	22.7(3.7)	16.1	64.9(4.5)	7.0	8.9(2.5)	28.1	2.6(1.5)	59.2
사무직	79	0.0(0.0)	.	23.9(5.1)	21.2	68.8(5.5)	8.0	4.9(2.5)	51.7	2.3(1.7)	71.9
판매·서비스직	108	0.0(0.0)	.	19.0(3.5)	18.3	66.0(4.5)	6.8	15.0(3.5)	23.1	0.0(0.0)	.
농림어업	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	223	0.9(0.7)	70.7	20.9(3.0)	14.5	59.4(3.5)	5.9	15.2(2.9)	18.8	3.5(1.2)	34.8
기타 ³⁾	361	0.9(0.4)	50.9	19.7(2.4)	12.4	52.8(3.2)	6.0	21.9(2.5)	11.3	4.7(1.1)	22.7
월 가구소득											
100만원 미만	79	0.9(0.9)	99.8	9.2(3.8)	41.5	47.7(7.3)	15.2	34.0(5.5)	16.2	8.2(3.7)	44.7
100-200만원 미만	86	0.9(0.9)	100.1	13.1(4.5)	34.6	43.4(6.9)	15.9	40.4(7.4)	18.4	2.2(1.4)	64.0
200-300만원 미만	108	0.0(0.0)	.	13.2(4.5)	34.1	61.4(5.3)	8.6	22.1(4.1)	18.4	3.4(2.2)	64.2
300-400만원 미만	149	0.5(0.5)	99.1	26.5(4.9)	18.6	50.4(5.2)	10.3	20.8(4.3)	20.6	1.8(1.3)	72.7
400만원 이상	487	0.8(0.4)	50.7	22.9(2.1)	9.1	65.3(2.5)	3.8	7.6(1.3)	16.8	3.3(0.7)	22.1
작년 대비 가구소득 변화											
줄어들었다	286	1.3(0.7)	51.7	17.9(2.4)	13.3	60.7(3.4)	5.7	17.4(2.9)	16.4	2.6(1.0)	36.3
변함없다	447	0.4(0.3)	74.9	18.9(2.4)	12.5	58.8(2.9)	5.0	17.8(1.8)	10.2	4.1(0.9)	22.8
늘어났다	176	0.4(0.4)	97.2	28.9(3.8)	13.2	59.4(4.4)	7.3	8.8(2.6)	29.0	2.4(1.1)	45.0

주 1) 코로나19 예방접종 경험률 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 88〉 코로나19 확진 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	42.8(2.3)	5.5	445	34.9(2.6)	7.5	465	51.2(2.9)	5.6
연령									
19-29	88	55.4(5.2)	9.4	52	41.1(5.4)	13.2	36	74.2(8.6)	11.6
30-39	119	53.8(4.9)	9.1	54	48.2(6.9)	14.2	65	60.4(6.7)	11.1
40-49	177	47.7(3.8)	7.9	94	35.1(4.6)	13.0	83	61.0(6.1)	10.0
50-59	191	40.6(4.9)	12.0	86	31.4(6.7)	21.2	105	50.8(5.3)	10.4
60-69	199	32.7(3.5)	10.8	98	28.1(3.7)	13.1	101	37.4(5.2)	13.8
70 이상	136	26.6(4.0)	15.2	61	26.4(5.6)	21.1	75	26.7(5.2)	19.3
19-64	682	46.5(2.5)	5.4	341	36.8(2.9)	8.0	341	57.5(3.1)	5.5
65 이상	228	27.8(3.4)	12.4	104	25.8(4.0)	15.6	124	29.4(3.9)	13.2
교육수준 ²⁾									
무학	48	28.9(6.0)	20.9	8	-(-)	-	40	31.9(6.9)	21.6
초등학교	80	29.2(5.0)	17.0	29	31.9(8.8)	27.7	51	27.7(5.4)	19.5
중학교	73	31.3(6.0)	19.2	39	21.7(6.5)	30.1	34	42.9(8.4)	19.6
고등학교	372	42.4(3.4)	8.1	194	36.2(3.9)	10.8	178	50.0(4.2)	8.4
대학교 이상	333	49.2(3.2)	6.5	173	37.1(4.3)	11.6	160	63.4(4.1)	6.4
직업									
전문행정관리	119	54.0(4.7)	8.7	59	48.7(8.0)	16.4	60	59.5(6.4)	10.8
사무직	79	49.8(6.3)	12.7	45	38.2(7.3)	19.2	34	66.9(8.8)	13.1
판매·서비스직	108	50.0(5.6)	11.3	30	50.1(8.8)	17.5	78	49.9(6.3)	12.6
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	33.4(3.8)	11.4	178	32.6(4.0)	12.4	45	37.5(8.5)	22.7
기타 ³⁾	362	41.5(3.1)	7.5	120	26.2(3.9)	14.9	242	49.5(3.5)	7.1
월 가구소득									
100만원 미만	80	36.3(6.1)	16.7	28	29.9(9.5)	31.7	52	39.7(6.9)	17.5
100-200만원 미만	86	22.7(5.5)	24.0	36	17.1(7.2)	42.1	50	27.0(6.7)	25.0
200-300만원 미만	108	36.9(5.1)	13.8	52	31.4(6.2)	19.6	56	42.6(6.9)	16.2
300-400만원 미만	149	40.8(5.1)	12.4	80	34.7(6.4)	18.4	69	49.2(6.1)	12.4
400만원 이상	487	48.2(2.9)	5.9	249	38.0(3.2)	8.3	238	59.8(3.8)	6.3
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	45.4(4.5)	10.0	137	37.9(4.7)	12.3	149	53.1(5.3)	9.9
변함없다	448	38.2(3.2)	8.3	217	30.5(3.7)	12.2	231	46.2(4.2)	9.1
늘어났다	176	50.0(4.4)	8.8	91	40.6(5.4)	13.2	85	61.9(5.8)	9.3

주 1) 코로나19 확진 경험률 : (코로나19로 확진된 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 89〉 코로나19 확진 시기¹⁾

(단위 : %)

구분	N	2021년01월~2021년06월		2021년07월~2021년12월		2022년01월~2022년03월		2022년04월~2022년06월		2022년07월~2022년10월	
		%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	372	0.3(0.0)	6.6	1.7(0.7)	42.6	39.3(3.0)	7.7	28.1(2.7)	9.6	28.6(2.6)	9.0
성											
남자	149	0.0(0.0)	.	1.0(0.7)	70.8	38.4(4.3)	11.1	35.2(4.2)	12.0	22.9(3.2)	13.8
여자	223	0.4(0.0)	7.2	2.2(1.0)	46.2	40.0(3.5)	8.9	22.9(3.0)	13.3	32.8(3.2)	9.7
연령											
19~29	48	0.0(0.0)	.	2.2(2.1)	98.3	44.9(7.1)	15.9	20.6(5.3)	25.9	30.3(6.7)	22.0
30~39	65	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	49.3(6.5)	13.1	24.6(5.6)	22.9	26.1(5.4)	20.8
40~49	82	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	46.5(4.4)	9.6	21.9(4.3)	19.5	27.7(4.6)	16.5
50~59	77	1.1(0.2)	15.8	1.0(1.0)	101.7	31.0(6.6)	21.1	37.9(6.8)	18.0	28.9(5.8)	20.2
60~69	66	0.0(0.0)	.	4.6(2.6)	56.1	25.7(6.1)	23.8	32.9(6.2)	18.8	34.2(6.1)	17.7
70 이상	34	0.0(0.0)	.	6.3(4.2)	67.4	32.4(8.5)	26.4	35.1(8.8)	25.0	21.0(7.5)	35.6
19~64	312	0.3(0.0)	7.5	0.7(0.5)	74.5	41.0(3.3)	8.1	26.9(2.8)	10.5	29.7(2.8)	9.4
65 이상	60	0.0(0.0)	.	8.6(4.1)	48.0	27.8(7.6)	27.4	36.0(7.0)	19.5	21.8(6.9)	31.9
교육수준 ²⁾											
무학	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	23	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	30.5(12.0)	39.3	43.7(13.1)	30.0	16.4(8.1)	49.4
중학교	24	0.0(0.0)	.	8.6(5.9)	68.3	28.7(8.5)	29.5	19.9(8.0)	40.2	40.0(10.5)	26.4
고등학교	152	0.6(0.1)	10.6	1.0(0.7)	69.2	34.8(4.3)	12.4	28.4(3.9)	13.9	31.9(3.9)	12.1
대학교 이상	159	0.0(0.0)	.	1.4(1.0)	74.0	46.4(4.2)	9.0	26.1(4.0)	15.3	26.1(3.6)	14.0
직업											
전문행정관리	62	0.0(0.0)	.	3.4(2.5)	73.6	51.0(6.4)	12.6	23.8(6.6)	27.6	21.8(4.3)	19.6
사무직	39	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	48.9(8.4)	17.2	38.2(9.0)	23.5	12.9(4.9)	38.4
판매·서비스직	51	1.8(0.3)	15.4	0.0(0.0)	.	41.4(8.2)	19.9	21.3(6.0)	28.3	32.5(6.4)	19.8
농림어업	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	74	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	38.0(5.7)	14.9	30.8(5.1)	16.7	30.1(5.2)	17.4
기타 ³⁾	141	0.0(0.0)	.	3.1(1.6)	51.4	30.2(4.2)	13.8	28.0(4.0)	14.4	35.0(4.8)	13.8
월 가구소득											
100만원 미만	26	0.0(0.0)	.	3.8(3.8)	98.0	32.4(9.1)	28.0	41.3(10.4)	25.1	22.5(9.3)	41.4
100~200만원 미만	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200~300만원 미만	37	0.0(0.0)	.	4.4(4.3)	96.4	30.0(10.2)	34.0	21.1(8.1)	38.5	35.0(9.1)	25.9
300~400만원 미만	61	0.0(0.0)	.	1.4(1.4)	101.0	31.9(6.4)	20.0	40.1(6.6)	16.4	25.6(6.6)	25.8
400만원 이상	229	0.4(0.0)	9.9	1.3(0.8)	59.5	43.5(4.2)	9.6	24.7(3.5)	14.3	29.6(3.6)	12.1
작년 대비 가구소득 변화											
줄어들었다	121	0.0(0.0)	.	1.3(0.8)	63.8	37.9(5.3)	13.9	33.7(5.2)	15.5	25.5(4.7)	18.3
변함없다	162	0.6(0.1)	11.0	1.9(1.2)	61.4	38.8(5.0)	12.9	28.3(4.4)	15.7	27.8(4.2)	15.0
늘어났다	89	0.0(0.0)	.	1.9(1.9)	98.7	42.4(5.9)	13.9	19.7(3.4)	17.1	34.7(5.5)	15.9

주 1) 코로나19 확진 시기 : (시기별 코로나19로 확진된 적이 있는 사람의 수 / 코로나19로 확진된 적이 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 90〉 코로나19 확진 시 치료 장소¹⁾

(단위 : %)

구분	N	의료기관 입원 치료		생활치료센터 치료		자가(재택) 치료		기타	
		%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	372	0.4(0.3)	71.8	0.0(0.0)	.	99.6(0.3)	0.3	0.0(0.0)	.
성									
남자	149	0.9(0.7)	71.6	0.0(0.0)	.	99.1(0.7)	0.7	0.0(0.0)	.
여자	223	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.
연령									
19-29	48	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.
30-39	65	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.
40-49	82	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.
50-59	77	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.
60-69	66	1.5(1.5)	100.8	0.0(0.0)	.	98.5(1.5)	1.5	0.0(0.0)	.
70 이상	34	2.5(2.6)	101.3	0.0(0.0)	.	97.5(2.6)	2.6	0.0(0.0)	.
19-64	312	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.
65 이상	60	3.1(2.2)	72.4	0.0(0.0)	.	96.9(2.2)	2.3	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	23	3.8(3.8)	98.6	0.0(0.0)	.	96.2(3.8)	3.9	0.0(0.0)	.
중학교	24	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.
고등학교	152	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.
대학교 이상	159	0.5(0.5)	99.2	0.0(0.0)	.	99.5(0.5)	0.5	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	62	1.1(1.1)	99.2	0.0(0.0)	.	98.9(1.1)	1.1	0.0(0.0)	.
사무직	39	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	51	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.
농림어업	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	74	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	141	0.5(0.5)	101.1	0.0(0.0)	.	99.5(0.5)	0.5	0.0(0.0)	.
월 가구소득									
100만원 미만	26	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	37	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	61	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.
400만원 이상	229	0.6(0.4)	72.3	0.0(0.0)	.	99.4(0.4)	0.4	0.0(0.0)	.
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	121	0.6(0.6)	101.6	0.0(0.0)	.	99.4(0.6)	0.7	0.0(0.0)	.
변함없다	162	0.4(0.4)	101.1	0.0(0.0)	.	99.6(0.4)	0.4	0.0(0.0)	.
늘어났다	89	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0	0.0(0.0)	.

주 1) 코로나19 확진 시 치료 장소 : (응답보기별 응답자 수 / 코로나19로 확진된 적이 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 91〉 코로나19 후유증 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	372	21.7(2.6)	11.8	149	11.7(2.8)	23.8	223	28.9(3.3)	11.3
연령									
19-29	48	28.8(5.6)	19.5	22	13.4(6.8)	51.1	26	40.0(6.8)	17.1
30-39	65	17.5(4.7)	26.9	26	13.6(6.9)	50.5	39	21.2(7.1)	33.5
40-49	82	30.0(5.5)	18.4	32	14.9(6.1)	40.9	50	39.1(7.3)	18.7
50-59	77	13.2(3.8)	28.7	25	3.5(3.6)	102.2	52	19.9(6.0)	30.0
60-69	66	23.5(5.0)	21.1	29	18.0(7.2)	40.0	37	27.7(6.8)	24.6
70 이상	34	9.6(4.1)	43.1	15	-(-)	-	19	-(-)	-
19-64	312	22.8(2.9)	12.8	123	13.0(3.1)	23.9	189	29.9(3.7)	12.4
65 이상	60	14.1(3.3)	23.1	26	2.8(2.9)	103.6	34	22.5(5.5)	24.3
교육수준 ²⁾									
무학	12	-(-)	-	1	-(-)	-	11	-(-)	-
초등학교	23	18.1(8.6)	47.2	9	-(-)	-	14	-(-)	-
중학교	24	21.0(7.8)	37.1	9	-(-)	-	15	-(-)	-
고등학교	152	17.9(3.3)	18.5	69	14.2(4.4)	31.4	83	21.2(4.5)	21.1
대학교 이상	159	25.9(3.7)	14.1	61	10.2(3.8)	37.0	98	36.7(5.1)	13.9
직업									
전문행정관리	62	22.8(5.7)	24.9	27	10.6(5.5)	51.7	35	33.3(7.5)	22.5
사무직	39	28.5(7.7)	27.1	17	-(-)	-	22	41.4(12.0)	29.0
판매·서비스직	51	22.6(5.2)	23.0	14	-(-)	-	37	28.9(7.4)	25.5
농림어업	4	-(-)	-	3	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	74	17.3(4.7)	27.3	58	14.3(5.1)	35.3	16	-(-)	-
기타 ³⁾	141	20.5(3.6)	17.6	30	9.6(5.7)	59.1	111	23.5(4.4)	18.5
월 가구소득									
100만원 미만	26	14.4(5.1)	35.1	8	-(-)	-	18	-(-)	-
100-200만원 미만	19	-(-)	-	6	-(-)	-	13	-(-)	-
200-300만원 미만	37	27.7(7.1)	25.7	15	-(-)	-	22	37.4(11.8)	31.4
300-400만원 미만	61	26.4(6.3)	24.0	27	20.5(8.2)	39.8	34	32.1(9.3)	28.9
400만원 이상	229	20.0(3.4)	17.2	93	10.0(3.4)	33.8	136	27.3(4.6)	16.8
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	121	21.0(4.9)	23.2	49	11.0(5.7)	51.9	72	28.3(6.0)	21.1
변함없다	162	20.9(3.5)	16.7	62	13.5(4.1)	30.5	100	26.0(4.5)	17.2
늘어났다	89	24.0(4.2)	17.6	38	9.4(4.4)	47.0	51	36.0(6.4)	17.8

주 1) 코로나19 후유증 경험률 : (코로나19 확진으로 인해 새롭게 생긴 증상이 4주 이상 지속된 사람의 수 / 코로나19로 확진된 적이 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 92〉 코로나19 4주 이상 증상별 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	N	호흡관			가슴통증			기침, 기관지염			인후통			두통			허리통증			미각상실			눈 충혈			구토, 설사			기타 선행에		
		%	상대 표준 (표준오차)	오차	%	상대 표준 (표준오차)	오차	%	상대 표준 (표준오차)	오차	%	상대 표준 (표준오차)	오차	%	상대 표준 (표준오차)	오차	%	상대 표준 (표준오차)	오차	%	상대 표준 (표준오차)	오차	%	상대 표준 (표준오차)	오차	%	상대 표준 (표준오차)	오차	%	상대 표준 (표준오차)	오차
전체	81	10.3(3.7)	35.8	2.8(2.0)	71.5	6.0(3.0)	49.0	11.6(3.8)	32.8	54.7(5.4)	9.8	3.1(1.8)	59.8	14.0(4.1)	29.2	18.1(4.2)	23.2	1.0(1.1)	101.4	1.1(1.1)	100.4	2.4(1.7)	73.0	0.0(0.0)	.	.	.	.	.	.	.
성																															
남자	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
여자	62	13.4(4.6)	34.6	3.7(2.7)	72.3	7.8(3.8)	48.5	13.6(4.6)	33.9	58.3(6.1)	10.4	2.6(1.9)	71.9	13.1(4.0)	30.5	16.1(4.6)	28.7	1.3(1.4)	100.9	1.4(1.4)	100.4	1.3(1.3)	101.0	0.0(0.0)	.	.	.	.	.	.	.
연령																															
19-29	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	24	6.7(6.5)	97.0	0.0(0.0)	.	3.9(3.7)	94.5	6.7(6.5)	97.0	67.1(12.0)	17.9	0.0(0.0)	.	14.4(7.2)	50.1	21.7(9.7)	44.8	0.0(0.0)	.	3.7(3.6)	98.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	.	.	.	.	.	.
50-59	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
60-69	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
70 이상	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
19-64	73	11.3(4.1)	36.1	3.1(2.2)	71.5	5.5(3.0)	54.9	12.6(4.1)	32.9	55.6(5.9)	10.5	3.3(2.0)	60.0	15.3(4.4)	29.1	18.6(4.4)	23.8	1.1(1.1)	101.5	1.2(1.2)	99.4	1.5(1.5)	100.8	0.0(0.0)	.	.	.	.	.	.	.
65 이상	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
교육수준 ²⁾																															
무학	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	30	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.7(2.6)	96.6	8.6(4.2)	48.2	67.1(7.4)	11.1	3.0(3.1)	102.5	14.8(5.9)	39.7	16.7(6.4)	38.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	.	.	.	.	.	.
대학교 이상	40	19.4(6.9)	35.3	3.3(3.3)	99.8	7.7(4.8)	62.4	12.2(4.9)	40.3	53.2(7.6)	14.3	1.7(1.7)	99.2	16.7(5.9)	35.7	19.1(6.6)	34.6	1.9(2.0)	100.8	2.0(2.0)	98.6	2.6(2.6)	100.4	0.0(0.0)	.	.	.	.	.	.	.
직업																															
전문행정관리	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
사무직	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순무직	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기타 ³⁾	28	5.8(5.6)	96.4	3.2(3.2)	98.1	5.7(3.9)	69.3	11.8(5.9)	50.1	46.8(11.4)	24.4	3.2(3.2)	98.1	15.1(5.7)	37.6	24.4(7.8)	31.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.9(2.9)	99.4	0.0(0.0)	.	.	.	.	.	.	.
월 가구소득																															
100만원 미만	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
300-400만원 미만	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
400만원 이상	47	12.6(5.0)	40.0	2.9(2.9)	98.3	3.7(2.6)	71.7	12.8(4.8)	37.7	60.7(7.3)	12.1	1.8(1.8)	100.8	12.7(5.2)	40.8	12.4(4.9)	39.7	1.7(1.8)	101.8	1.8(1.8)	99.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	.	.	.	.	.	.
작년 대비 가구소득 변화																															
줄어들었다	23	11.7(6.3)	53.8	3.5(3.5)	101.6	6.8(4.9)	72.6	9.3(5.5)	59.4	51.4(10.5)	20.4	6.4(4.6)	71.8	3.5(3.7)	106.1	15.8(7.9)	50.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.2(3.2)	101.1	0.0(0.0)	.	.	.	.	.	.	.
변화없다	35	11.5(6.9)	59.7	0.0(0.0)	.	6.9(5.2)	75.4	9.3(5.1)	54.7	47.1(9.7)	20.5	2.5(2.5)	102.7	16.2(6.4)	39.8	18.7(6.3)	33.8	2.4(2.4)	100.7	2.5(2.5)	98.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	.	.	.	.	.	.
늘어났다	23	6.8(6.6)	98.4	6.8(6.6)	98.4	3.6(3.6)	99.1	18.1(7.9)	43.7	71.3(8.6)	12.0	0.0(0.0)	.	23.3(7.9)	33.9	19.9(8.6)	43.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	5.3(5.3)	98.7	0.0(0.0)	.	.	.	.	.	.	.

주 1) 코로나19 4주 이상 증상별 경험률 : (응답보기별 응답자 수 / 코로나19 확진으로 인해 새롭게 생긴 증상이 4주 이상 지속된 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 93〉 코로나19 4주 이상 증상별 경험률(계속)¹⁾

(단위 : %)

구분	N	발현 비율		피로감		근육통		불안 또는 우울		인지기능 (기억력, 집중력) 저하		수면장애		관절통		탈모		알레르기(비) 불순		기타	
		%	상대 (표준오차)	%	상대 (표준오차)	%	상대 (표준오차)	%	상대 (표준오차)	%	상대 (표준오차)	%	상대 (표준오차)	%	상대 (표준오차)	%	상대 (표준오차)	%	상대 (표준오차)	%	상대 (표준오차)
전체	81	0.0(0.0)	25.5(5.0)	19.8	9.8(3.6)	36.3	1.0(1.1)	101.4	1.0(1.1)	101.4	1.0(1.1)	97.1	8.5(2.4)	28.9	3.9(2.5)	65.4	12.5(4.7)	37.7	0.0(0.0)		
성																					
남자	19	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
여자	62	0.0(0.0)	30.7(5.9)	19.3	5.3(3.2)	61.2	1.3(1.4)	100.9	1.3(1.4)	100.9	1.3(1.3)	96.8	8.3(2.6)	31.4	5.0(3.3)	65.4	12.5(4.7)	37.5	0.0(0.0)		
연령																					
19-29	13	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
30-39	13	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
40-49	24	0.0(0.0)	22.4(11.3)	50.3	0.0(0.0)		0.0(0.0)		0.0(0.0)		0.0(0.0)		0.0(0.0)		10.9(7.8)	71.9	-(-)	-	0.0(0.0)		
50-59	12	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
60-69	15	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
70 이상	4	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
19-64	73	0.0(0.0)	21.9(5.3)	24.1	9.6(3.8)	39.0	1.1(1.1)	101.5	1.1(1.1)	101.5	1.1(1.1)	96.9	5.0(2.3)	47.2	4.2(2.8)	65.2	13.9(5.2)	37.0	0.0(0.0)		
65 이상	8	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
교육수준 ²⁾																					
무학	2	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
초등학교	4	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
중학교	5	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
고등학교	30	0.0(0.0)	27.0(7.5)	27.9	8.0(5.7)	71.7	0.0(0.0)		0.0(0.0)		3.0(2.8)	94.4	5.0(3.4)	68.1	1.9(2.0)	101.2	-(-)	-	0.0(0.0)		
대학교 이상	40	0.0(0.0)	17.2(7.0)	40.6	11.4(4.7)	41.4	1.9(2.0)	100.8	1.9(2.0)	100.8	0.0(0.0)		4.6(3.1)	67.4	6.0(4.4)	72.9	17.0(7.2)	42.6	0.0(0.0)		
직업																					
전문행정관리	14	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
사무직	12	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
판매·서비스직	12	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
농림어업	1	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
기능단순무직	13	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
기타 ³⁾	28	0.0(0.0)	36.3(7.1)	19.5	8.1(5.6)	69.5	0.0(0.0)		0.0(0.0)		0.0(0.0)		14.8(4.9)	33.3	11.4(7.3)	63.9	3.4(3.4)	98.8	0.0(0.0)		
월 가구소득																					
100만원 미만	3	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
100-200만원 미만	5	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
200-300만원 미만	10	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
300-400만원 미만	16	-(-)	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-
400만원 이상	47	0.0(0.0)	20.7(7.8)	37.7	9.8(5.2)	52.5	1.7(1.8)	101.8	1.7(1.8)	101.8	1.7(1.6)	94.6	3.5(2.3)	65.1	1.8(1.7)	99.2	16.3(6.5)	39.6	0.0(0.0)		
작년 대비 가구소득 변화																					
줄어들었다	23	0.0(0.0)	32.3(10.8)	33.5	8.2(3.6)	44.5	0.0(0.0)		0.0(0.0)		0.0(0.0)		6.6(4.8)	72.7	6.8(6.7)	98.8	-(-)	-	0.0(0.0)		
변함없다	35	0.0(0.0)	28.9(6.4)	22.3	17.0(7.3)	42.9	2.4(2.4)	100.7	2.4(2.4)	100.7	0.0(0.0)		12.5(4.3)	34.1	4.0(2.8)	70.5	10.1(5.9)	58.2	0.0(0.0)		
늘었다	23	0.0(0.0)	11.5(6.5)	56.4	0.0(0.0)		0.0(0.0)		0.0(0.0)		4.0(3.6)	88.3	4.0(3.6)				-(-)	-	0.0(0.0)		

주 1) 코로나19 4주 이상 증상별 경험률 : (응답보가별 응답자 수 / 코로나19 확진으로 인해 새롭게 생긴 증상이 4주 이상 지속된 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 94〉 코로나19 현재 후유증 증상별 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	N	호흡관		가슴통증		가슴 두근거림		인후통		기침, 가래		두통		후각상실		미각상실		눈 충혈		구강 건조증		구토, 설사		기타 소화에	
		%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	%	상대	%
전체	81	2.0(1.3)	67.0	1.1(1.1)	101.5	1.0(1.1)	101.4	3.0(1.7)	56.2	17.5(4.7)	26.9	1.1(1.1)	101.5	3.5(2.7)	76.8	6.7(3.5)	52.3	0.0(0.0)	1.1(1.1)	100.4	0.0(0.0)	1.1(1.1)	100.4	0.0(0.0)	0.0(0.0)
성																									
남자	19	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
여자	62	2.5(1.7)	66.3	1.4(1.4)	101.8	1.3(1.4)	100.9	3.8(2.2)	56.6	18.3(4.7)	25.6	1.4(1.4)	101.8	2.7(1.9)	71.8	6.8(3.5)	50.4	0.0(0.0)	1.4(1.4)	100.4	0.0(0.0)	1.4(1.4)	100.4	0.0(0.0)	0.0(0.0)
연령																									
19-29	13	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
30-39	13	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
40-49	24	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	38.2(14.4)	37.8	0.0(0.0)	0.0(0.0)	7.1(5.0)	71.1	14.4(8.4)	58.5	0.0(0.0)	3.7(3.6)	98.8	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)
50-59	12	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
60-69	15	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
70 이상	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
19-64	73	2.1(1.4)	66.9	1.2(1.2)	101.7	1.1(1.1)	101.5	3.2(1.8)	56.1	18.1(5.2)	28.7	1.2(1.2)	101.7	3.9(3.0)	76.8	7.4(3.9)	52.7	0.0(0.0)	1.2(1.2)	99.4	0.0(0.0)	1.2(1.2)	99.4	0.0(0.0)	0.0(0.0)
65 이상	8	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
교육수준 ²⁾																									
무학	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
초등학교	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
중학교	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
고등학교	30	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	18.3(6.1)	44.3	0.0(0.0)	0.0(0.0)	3.0(2.9)	99.2	3.0(2.9)	99.2	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)
대학교 이상	40	3.7(2.5)	67.9	0.0(0.0)	0.0(0.0)	1.9(2.0)	100.8	1.7(1.7)	99.2	19.1(5.9)	31.1	0.0(0.0)	0.0(0.0)	4.7(4.6)	97.8	8.7(6.0)	68.5	0.0(0.0)	2.0(2.0)	98.6	0.0(0.0)	2.0(2.0)	98.6	0.0(0.0)	0.0(0.0)
직업																									
전문행정관리	14	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
사무직	12	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
판매·서비스직	12	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
농림어업	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
기능·단순무직	13	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
기타 ³⁾	28	0.0(0.0)	0.0(0.0)	3.2(3.2)	98.1	0.0(0.0)	0.0(0.0)	6.0(4.2)	69.8	13.5(6.0)	44.8	3.2(3.2)	98.1	3.1(3.1)	99.2	9.4(7.0)	74.2	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)
월 가구소득																									
100만원 미만	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
100-200만원 미만	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
200-300만원 미만	10	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
300-400만원 미만	16	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
400만원 이상	47	3.3(2.2)	65.5	0.0(0.0)	0.0(0.0)	1.7(1.8)	101.8	1.6(1.5)	94.6	21.0(6.4)	30.7	0.0(0.0)	0.0(0.0)	4.2(4.2)	99.2	6.0(4.5)	75.6	0.0(0.0)	1.8(1.8)	99.9	0.0(0.0)	1.8(1.8)	99.9	0.0(0.0)	0.0(0.0)
작년 대비 가구소득 변화																									
줄어들었다	23	2.9(3.0)	101.4	3.5(3.5)	101.6	0.0(0.0)	0.0(0.0)	6.4(4.7)	73.0	16.3(6.6)	40.7	3.5(3.5)	101.6	0.0(0.0)	0.0(0.0)	6.8(6.7)	98.8	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)
변함없다	35	2.4(2.4)	100.7	0.0(0.0)	0.0(0.0)	2.4(2.4)	100.7	2.2(2.2)	101.4	16.1(6.4)	39.8	0.0(0.0)	0.0(0.0)	5.8(5.7)	97.0	5.8(5.7)	97.0	0.0(0.0)	2.5(2.5)	98.8	0.0(0.0)	2.5(2.5)	98.8	0.0(0.0)	0.0(0.0)
늘어났다	23	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	21.2(9.0)	42.4	0.0(0.0)	0.0(0.0)	4.0(4.0)	100.4	8.2(5.8)	70.6	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)

주 1) 코로나19 현재 후유증 증상별 경험률 : (응답보가별 응답자 수 / 코로나19 확진으로 인해 새롭게 생긴 증상이 4주 이상 지속된 사람의 수) × 100

주 2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

주 3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 95〉 코로나19 현재 후유증 증상별 경험률(계속)¹⁾

(단위 : %)

구분	N	발한, 발열		피로감		근육통		불안 또는 우울		인지능 (기억력, 집중력) 저하		수면장애		관절통		탈모		일명(성비) 불순		기타	
		%	상대 표준오차	%	상대 표준오차	%	상대 표준오차	%	상대 표준오차	%	상대 표준오차	%	상대 표준오차	%	상대 표준오차	%	상대 표준오차	%	상대 표준오차	%	상대 표준오차
전체	81	0.0(0.0)	-	5.4(2.5)	45.8	5.1(2.1)	40.7	1.0(1.1)	101.4	1.0(1.1)	101.4	0.0(0.0)	-	3.5(2.0)	58.0	3.9(2.5)	65.4	10.2(4.2)	41.2	0.0(0.0)	-
성																					
남자	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
여자	62	0.0(0.0)	-	6.9(3.1)	45.0	1.3(1.4)	100.9	1.3(1.4)	100.9	1.3(1.4)	100.9	0.0(0.0)	-	2.8(2.0)	72.7	5.0(3.3)	65.4	10.2(4.2)	41.3	0.0(0.0)	-
연령																					
19-29	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
30-39	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
40-49	24	0.0(0.0)	-	7.2(5.2)	72.3	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	10.9(7.8)	71.9	-	-	0.0(0.0)	-
50-59	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
60-69	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
70 이상	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
19-64	73	0.0(0.0)	-	5.8(2.7)	46.6	5.5(2.3)	40.8	1.1(1.1)	101.5	1.1(1.1)	101.5	0.0(0.0)	-	3.8(2.2)	58.2	4.2(2.8)	65.2	11.3(4.6)	40.4	0.0(0.0)	-
65 이상	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
교육수준 ²⁾																					
무학	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
초등학교	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
중학교	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
고등학교	30	0.0(0.0)	-	6.2(4.7)	75.8	3.0(3.1)	102.5	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	1.9(2.0)	101.2	-	-	0.0(0.0)	-
대학교 이상	40	0.0(0.0)	-	3.9(2.7)	68.9	7.5(3.1)	40.9	1.9(2.0)	100.8	1.9(2.0)	100.8	0.0(0.0)	-	4.6(3.1)	67.4	6.0(4.4)	72.9	12.8(6.4)	49.5	0.0(0.0)	-
직업																					
전문행정관리	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
사무직	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
판매·서비스직	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
기능단순·무직	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
기타 ³⁾	28	0.0(0.0)	-	6.5(4.4)	67.9	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	3.2(3.2)	98.1	11.4(7.3)	63.9	3.4(3.4)	98.8	0.0(0.0)	-
월 가구소득																					
100만원 미만	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
100-200만원 미만	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
200-300만원 미만	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
300-400만원 미만	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-	-	-	-	-(-)	-
400만원 이상	47	0.0(0.0)	-	3.5(2.6)	72.3	3.5(2.5)	72.5	1.7(1.8)	101.8	1.7(1.8)	101.8	0.0(0.0)	-	1.7(1.8)	101.8	1.8(1.7)	99.2	12.4(5.8)	46.4	0.0(0.0)	-
작년 대비 가구소득 변화																					
줄어들었다	23	0.0(0.0)	-	10.4(6.6)	63.8	5.0(1.3)	25.6	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	3.5(3.5)	101.6	6.8(6.7)	98.8	-	-	0.0(0.0)	-
변화없다	35	0.0(0.0)	-	4.9(3.4)	68.7	8.1(4.6)	56.4	2.4(2.4)	100.7	2.4(2.4)	100.7	0.0(0.0)	-	5.7(3.8)	66.6	4.0(2.8)	70.5	10.1(5.9)	58.2	0.0(0.0)	-
늘어났다	23	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	-	-	0.0(0.0)	-

주 1) 코로나19 현재 후유증 증상별 경험률 : (응답보거별 응답자 수 / 코로나19 확진으로 인해 새롭게 생긴 증상이 4주 이상 지속된 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 제학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 96〉 코로나19 후유증 증상 치료 장소¹⁾

(단위 : %)

구분	N	의료기관 입원 치료		의료기관 외래치료		의료기관 처방없이 약국만 이용		치료받은 적 없음		기타	
		%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	81	0.0(0.0)	.	41.0(5.1)	12.3	12.6(3.8)	30.2	42.6(5.0)	11.8	3.7(2.4)	65.6
성											
남자	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
여자	62	0.0(0.0)	.	42.1(5.5)	13.1	13.6(4.8)	35.5	40.4(5.8)	14.4	3.9(3.0)	76.2
연령											
19-29	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	24	0.0(0.0)	.	48.1(9.4)	19.5	7.6(4.8)	64.0	44.3(11.3)	25.4	0.0(0.0)	.
50-59	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
60-69	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
70 이상	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
19-64	73	0.0(0.0)	.	39.5(5.5)	13.9	12.7(4.0)	31.7	44.5(5.5)	12.4	3.3(2.5)	76.9
65 이상	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
교육수준 ²⁾											
무학	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	30	0.0(0.0)	.	35.3(6.5)	18.5	11.7(4.3)	36.5	47.8(8.5)	17.7	5.2(4.0)	77.1
대학교 이상	40	0.0(0.0)	.	40.9(7.1)	17.4	10.8(5.5)	51.1	44.8(7.6)	16.9	3.6(3.7)	102.4
직업											
전문행정관리	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
사무직	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기타 ³⁾	28	0.0(0.0)	.	42.3(8.8)	20.7	5.7(4.0)	70.6	46.7(8.5)	18.1	5.3(3.8)	71.5
월 가구소득											
100만원 미만	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
300-400만원 미만	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
400만원 이상	47	0.0(0.0)	.	36.7(6.6)	17.9	13.1(4.6)	35.5	50.2(6.9)	13.7	0.0(0.0)	.
작년 대비 가구소득 변화											
줄어들었다	23	0.0(0.0)	.	29.4(8.3)	28.1	15.6(5.6)	35.7	51.5(9.8)	19.0	3.5(3.7)	106.1
변함없다	35	0.0(0.0)	.	42.2(7.9)	18.8	9.4(5.7)	60.7	42.3(8.1)	19.3	6.1(4.9)	79.8
늘어났다	23	0.0(0.0)	.	53.4(10.3)	19.4	14.4(7.0)	48.5	32.2(10.6)	32.9	0.0(0.0)	.

주 1) 코로나19 후유증 증상 치료 장소 : (응답보기별 응답자 수 / 코로나19 확진으로 인해 새롭게 생긴 증상이 4주 이상 지속된 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제1부

조사체계

제2부

주요통계결과

제3부

통계표

제4부

부록

〈표 97〉 코로나19 후유증 증상으로 인한 일상생활 지장 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	N	많이 받음		조금 받음		전혀 받지 않음	
		%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	81	12.8(2.5)	19.2	69.5(5.3)	7.6	17.6(4.9)	27.7
성							
남자	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
여자	62	15.4(3.3)	21.2	70.6(5.6)	8.0	14.1(4.4)	31.3
연령							
19-29	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	24	6.8(4.7)	69.5	61.9(11.0)	17.7	31.3(11.1)	35.4
50-59	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
60-69	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
70 이상	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
19-64	73	10.5(2.3)	21.7	70.3(5.6)	8.0	19.2(5.2)	27.0
65 이상	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
교육수준 ²⁾							
무학	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	30	16.7(5.6)	33.4	60.7(8.8)	14.5	22.7(9.2)	40.5
대학교 이상	40	7.1(3.3)	46.2	74.6(6.6)	8.8	18.3(6.0)	32.7
직업							
전문행정관리	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
사무직	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기타 ³⁾	28	17.6(5.2)	29.6	64.0(10.5)	16.5	18.4(8.2)	44.5
월 가구소득							
100만원 미만	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
300-400만원 미만	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
400만원 이상	47	8.2(4.4)	53.1	69.9(6.0)	8.6	21.9(5.5)	25.2
작년 대비 가구소득 변화							
줄어들었다	23	19.1(6.8)	35.7	77.2(5.7)	7.3	3.7(3.0)	80.2
변함없다	35	9.0(2.2)	24.5	60.5(9.6)	16.0	30.5(8.7)	28.6
늘어났다	23	11.4(6.6)	57.4	75.1(7.8)	10.4	13.4(6.1)	45.7

주 1) 코로나19 후유증 증상으로 인한 일상생활 지장 경험률 : (응답보기별 응답자 수 / 코로나19 확진으로 인해 새롭게 생긴 증상이 4주 이상 지속된 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 98〉 코로나19 확진자의 기저질환 보유율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	372	16.1(2.4)	14.9	149	15.9(3.3)	20.9	223	16.2(2.5)	15.4
연령									
19-29	48	5.9(4.0)	68.3	22	9.0(6.2)	68.9	26	3.6(3.4)	93.8
30-39	65	10.8(4.0)	36.7	26	10.8(5.9)	54.9	39	10.8(5.4)	49.6
40-49	82	8.6(3.2)	37.2	32	3.1(3.0)	98.1	50	12.0(4.7)	38.9
50-59	77	24.4(7.3)	29.8	25	27.5(10.8)	39.5	52	22.3(6.7)	29.9
60-69	66	27.1(5.7)	21.0	29	28.2(9.1)	32.1	37	26.1(5.8)	22.1
70 이상	34	30.6(8.9)	29.2	15	-(-)	-	19	-(-)	-
19-64	312	15.0(2.2)	15.0	123	15.8(3.4)	21.6	189	14.4(2.3)	15.9
65 이상	60	23.7(6.3)	26.6	26	16.6(7.6)	45.8	34	28.9(7.3)	25.2
교육수준 ²⁾									
무학	12	-(-)	-	1	-(-)	-	11	-(-)	-
초등학교	23	29.5(11.9)	40.1	9	-(-)	-	14	-(-)	-
중학교	24	26.7(9.9)	37.1	9	-(-)	-	15	-(-)	-
고등학교	152	16.0(3.2)	20.3	69	14.6(4.9)	33.4	83	17.3(3.9)	22.3
대학교 이상	159	12.9(2.8)	21.5	61	15.8(4.6)	29.3	98	10.9(2.8)	25.7
직업									
전문행정관리	62	13.7(4.1)	29.7	27	14.7(6.9)	47.2	35	12.9(6.0)	46.4
사무직	39	12.8(5.5)	43.1	17	-(-)	-	22	3.0(3.0)	99.9
판매·서비스직	51	13.7(5.3)	38.6	14	-(-)	-	37	16.1(5.7)	35.4
농림어업	4	-(-)	-	3	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	74	16.8(4.9)	29.2	58	13.7(5.1)	37.3	16	-(-)	-
기타 ³⁾	141	19.4(3.4)	17.6	30	21.9(7.2)	33.1	111	18.7(3.6)	19.3
월 가구소득									
100만원 미만	26	19.1(9.0)	47.3	8	-(-)	-	18	-(-)	-
100-200만원 미만	19	-(-)	-	6	-(-)	-	13	-(-)	-
200-300만원 미만	37	6.8(3.8)	56.2	15	-(-)	-	22	12.0(6.7)	55.6
300-400만원 미만	61	20.0(5.3)	26.5	27	20.7(7.5)	36.2	34	19.3(7.0)	36.5
400만원 이상	229	14.8(2.6)	17.8	93	15.5(4.1)	26.7	136	14.3(2.6)	18.5
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	121	19.6(4.7)	24.0	49	17.2(6.1)	35.3	72	21.2(5.2)	24.4
변함없다	162	13.8(3.1)	22.7	62	14.6(4.8)	33.0	100	13.2(3.2)	23.8
늘어났다	89	15.6(4.7)	30.4	38	16.2(5.8)	36.0	51	15.0(5.9)	39.5

주 1) 코로나19 확진자의 기저질환 보유율 : (코로나19 확진 시 기저질환이 있던 사람의 수 / 코로나19로 확진된 적이 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 99〉 코로나19 확진자의 기저질환 종류¹⁾

(단위 : %)

구분	연령/기저질환			암			비만			고혈압			뇌혈관질환			그외질환			당뇨병			심장질환			만성폐쇄성질환			기타		
	N	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%		
(표준화) 표준화 (표준화)																														

주 1) 코로나19 확진자의 기저질환 종류 : (응답보거별 응답자 수 / 코로나19 확진 시 기저질환이 있던 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 100〉 건강생활실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	910	24.2(1.6)	6.4	445	18.7(1.8)	9.9	465	30.2(2.2)	7.3
연령									
19-29	88	23.2(4.8)	20.8	52	17.6(4.8)	27.5	36	30.5(8.0)	26.3
30-39	119	20.6(3.9)	19.1	54	22.8(6.0)	26.1	65	18.1(4.5)	24.9
40-49	177	24.1(3.2)	13.4	94	16.1(3.7)	23.1	83	32.7(5.1)	15.6
50-59	191	22.1(3.1)	14.1	86	14.7(3.9)	26.5	105	30.3(4.5)	14.9
60-69	199	28.0(3.4)	12.0	98	18.4(4.0)	21.7	101	37.8(5.1)	13.6
70 이상	136	28.0(4.3)	15.3	61	29.6(5.9)	20.0	75	26.8(5.0)	18.6
19-64	682	23.1(1.7)	7.5	341	17.2(2.1)	12.4	341	29.9(2.5)	8.4
65 이상	228	28.7(3.1)	10.9	104	25.5(3.5)	13.6	124	31.4(4.3)	13.8
교육수준 ²⁾									
무학	48	28.5(5.4)	19.0	8	-(-)	-	40	29.2(6.1)	21.0
초등학교	80	27.2(6.5)	23.9	29	29.6(9.0)	30.5	51	25.9(6.8)	26.4
중학교	73	21.6(4.1)	19.1	39	13.5(5.4)	40.0	34	31.3(7.9)	25.3
고등학교	372	21.1(2.2)	10.6	194	14.4(2.7)	19.0	178	29.2(3.5)	12.1
대학교 이상	333	27.5(2.4)	8.9	173	23.1(2.9)	12.7	160	32.7(3.7)	11.4
직업									
전문행정관리	119	28.2(4.6)	16.3	59	22.9(6.7)	29.3	60	33.7(6.7)	19.9
사무직	79	21.2(4.4)	20.9	45	16.7(4.9)	29.0	34	27.8(8.2)	29.6
판매·서비스직	108	21.2(3.8)	18.2	30	17.7(6.9)	39.2	78	22.6(5.4)	24.0
농림어업	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
기능단순노무직	223	17.3(2.4)	14.1	178	14.2(2.7)	18.8	45	32.4(6.7)	20.6
기타 ³⁾	362	28.9(2.7)	9.2	120	24.3(4.1)	16.8	242	31.3(3.4)	10.9
월 가구소득									
100만원 미만	80	24.9(5.4)	21.7	28	28.8(8.6)	29.7	52	22.7(5.6)	24.7
100-200만원 미만	86	33.9(4.8)	14.1	36	22.2(7.3)	32.9	50	42.8(6.7)	15.7
200-300만원 미만	108	25.4(4.2)	16.3	52	25.0(6.2)	24.7	56	25.9(5.7)	22.1
300-400만원 미만	149	21.1(4.0)	19.0	80	18.8(4.4)	23.6	69	24.2(6.8)	28.3
400만원 이상	487	23.4(1.9)	8.1	249	16.2(2.4)	14.9	238	31.8(2.9)	9.2
작년 대비 가구소득 변화									
줄어들었다	286	23.2(2.8)	11.9	137	16.7(3.4)	20.2	149	29.9(4.1)	13.6
변함없다	448	25.6(2.1)	8.2	217	18.9(2.5)	13.1	231	32.6(2.9)	8.8
늘어났다	176	22.3(3.3)	14.6	91	20.9(4.5)	21.6	85	24.2(5.0)	20.5

주 1) 건강생활실천율 : (현재 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

- 금연 실천자: 평생 흡연해 본 적이 없거나, 과거 흡연하였더라도 현재 금연하고 있는 사람

- 절주 실천자: 비음주자이거나, 최근 1년 동안 술을 마셨더라도 한 번의 술자리에서 남자는 7잔 미만, 여자는 5잔 미만으로 주 1회 이하로 마신 사람

- 걷기 실천자: 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직



04

제4부 부록

- I. 개인조사표
- II. 가구조사표
- III. 조사항목
- IV. 지표정의

2022
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY



I . 개인조사표

CHS

Community Health Survey

다음은 2022년 지역사회건강조사 개인조사표입니다. →



2022년 지역사회건강조사

이 조사표에 기재된
내용은 통계법
제33조에 의하여
비밀이 보장됩니다.

안녕하십니까?

질병관리청에서는 「지역보건법」 제4조(지역사회 건강실태조사), 동법시행령 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)에 의거하여 지역 건강통계를 생산하여 근거 중심의 보건사업 수행 기반을 마련하고자 매년 「지역사회건강조사」를 실시하오니 적극적인 협조를 부탁드립니다.

지역사회건강조사는 전국 258개 보건소에서 매년 8월부터 10월까지 실시하며, 만 19세 이상 성인을 대상으로 흡연, 음주, 신체활동 등의 건강행태, 의료이용, 삶의 질 등을 조사합니다.

조사 자료는 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며, 통계작성 외의 목적으로는 사용하지 않습니다. 정확한 응답을 위하여 반드시 조사대상자 본인이 성실하게 조사에 응답하여 주시기 바랍니다.

※ 통계법 제32조(통계응답자의 성실응답의무)

통계응답자는 통계의 작성에 관한 사무에 종사하는 자로부터 통계의 작성을 목적으로 질문 또는 자료제출 등의 요구를 받은 때에는 신뢰성 있는 통계가 작성될 수 있도록 조사 사항에 대하여 성실하게 응답하여야 한다.

※ 통계법 제33조(비밀의 보호)

- ① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
- ② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.



질병관리청

요약

제1부

조사체계

제2부

주요통계결과

제3부

통계표

제4부

부록



2022년 지역사회건강조사

이 조사표에 기재된
내용은 통계법
제33조에 의하여
비밀이 보장됩니다.

※ 조사대상자 번호를 정확히 기입하십시오.

시도번호		보건소번호							

표본지점번호					가구번호				가구원번호	

조 사 대 상 자

성명		주민등록 생년월일	
성별	① 남자 ② 여자		

가구명부의 주민등록상 생년월일과 동일한지 확인하십시오.
다른 경우 가구명부를 수정합니다.

요약

제1부

조사체계

제2부

주요통계결과

제3부

통계표

제4부

부록

활동제한 및 삶의 질

1. 평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

☐

흡연

※ 다음은 조사의 편의성을 높이고자 전자조사표에 구현된 사전질문입니다. 관련 세부 사항은 조사문항 지침서(p13)에 자세히 설명되어 있으므로 참고하시기 바랍니다.

사전 1. 지금까지 살아오는 동안 흡연하신 경험이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오(⇒ 6번 문항으로)

사전 1-1. 흡연하신 경험이 있다면 경험한 담배 종류는 무엇입니까?

1-1-1. 일반담배(궐련)	① 예 ② 아니오
1-1-2. 궐련형 전자담배	① 예 ② 아니오
1-1-3. 니코틴이 포함된 액상형 전자담배	① 예 ② 아니오

※ 다음은 담배사용과 관련된 질문입니다. 일반담배(궐련), 궐련형 전자담배(아이코스, 글로, 릴 등), 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 순으로 질문하오니 차례대로 응답해주시기 바랍니다.

※ 1~1-1번은 일반담배(궐련)에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

1. 지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(궐련)의 양은 총 얼마나 됩니까?

- ① 5갑(100개비) 미만
② 5갑(100개비) 이상
③ 피운 적 없다(⇒ 2번 문항으로)

☐


1-1. 현재 일반담배(궐련)를 피웁니까?

- ① 매일 피운다 ⇒ 1-1-1. 하루 평균 일반담배(궐련) 흡연량은 몇 개비입니까?

□□□개비 (⇒ 2번 문항으로)

888. 비해당(문항1/③: 평생 일반담배(궐련)을 피운 적 없음.

문항1-1/②, ③: 현재 담배를 가끔 피우거나 과거에는

피웠으나 현재 피우지 않음)

- ② 가끔 피운다
③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다
④ 비해당(문항 1/③: 평생 일반담배(궐련)을 피운 적 없음)

☐

8. 비해당

888. 비해당

※ 2~2-1번은 궐련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

2. 지금까지 궐련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)를 피운 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 3번 문항으로)

☐



2-1. 현재 **관련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)**를 피우니까?

- ① 매일 피운다
② 가끔 피운다
③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다
④ 비해당(문항2/②: 평생 **관련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)**를 피우지 않음)

☐

8. 비해당

※ 3~3-1번은 니코틴이 포함된 액상형 전자담배에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

3. **지금까지** 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 4번 문항으로)

☐


3-1. **최근 1달 동안** 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
④ 비해당(문항3/②: 평생 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 없음)

☐

8. 비해당

※ 4~5번은 금연시도 및 금연계획에 대한 질문입니다. 피워본 담배종류와 상관없이 질문에 응답해 주십시오.

4. **최근 1년 동안** 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
④ 비해당(문항1/③, 2/②, 3/②: 평생 일반담배(필련), **관련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)**, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 피운 적 없음, 문항1-1/③, 2-1/③: 일반담배(필련), **관련형 전자담배를 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음**, 문항3-1/②: 최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 없음)

☐

8. 비해당

5. **앞으로** 담배를 끊을 계획이 있습니까?

- ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다
④ 비해당(문항1/③, 2/②, 3/②: 평생 일반담배(필련), **관련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)**, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 피운 적 없음, 문항1-1/③, 2-1/③: 일반담배(필련), **관련형 전자담배를 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음**, 문항3-1/②: 최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 없음)

☐

8. 비해당

※ 6~7번은 간접흡연에 대한 질문입니다. 담배종류와 상관없이 질문에 응답해 주십시오.

6. **본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까?**

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 7번 문항으로)

☐


6-1. **최근 1주일 동안** 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
④ 비해당(문항6/②: 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 사람 없음)

☐

8. 비해당

7. **최근 1주일 동안** 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예
② 아니오
③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)

☐

음주

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다.

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「안전의식-자동차 운전」 1번 문항으로)

☐

2. 다음은 최근 1년 동안의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다.



2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까?

- ① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 (⇒ 「안전의식-자동차 운전」 1번 문항으로)
 ② 한 달에 1번 미만
 ③ 한 달에 1번 정도
 ④ 한 달에 2~4번 정도
 ⑤ 일주일에 2~3번 정도
 ⑥ 일주일에 4번 이상
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?

(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.5잔과 같습니다)

- ① 1~2잔 (⇒ 남성은 2~3번 문항으로,
 ② 3~4잔 여성은 2~4번 문항으로)
 ③ 5~6잔
 ④ 7~9잔
 ⑤ 10잔 이상 (⇒ 2-2-1번 문항으로)
 ⑧ 비해당(문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당



2-2-1. ('⑤ 10잔 이상' 응답자만 응답해 주십시오) 한 번에 술을 얼마나 마십니까?
 숫자로 기입해 주십시오.

※ 소주 1병은 7잔과 같습니다. □□잔

88. 비해당(문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음, 문항2-2/①, ②, ③, ④: 한 번에 술을 1~9잔까지 마심)

88. 비해당

2-3. (남성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다 ② 한 달에 1번 미만
 ③ 한 달에 1번 정도 ④ 일주일에 1번 정도
 ⑤ 거의 매일
 ⑧ 비해당(여성, 문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-4. (여성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다 ② 한 달에 1번 미만
 ③ 한 달에 1번 정도 ④ 일주일에 1번 정도
 ⑤ 거의 매일
 ⑧ 비해당(남성, 문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

2-5. 최근 1년 동안 절주(음주량을 줄임)나 금주를 시도한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

안전의식

【자동차 운전】

1. 자동차 운전할 때 안전벨트를 맵니까?

- ① 운전을 하지 않는다 (⇒ 2번 문항으로)
- ② 전혀 매지 않는다
- ③ 거의 매지 않는 편이다
- ④ 가끔 매는 편이다
- ⑤ 대체로 매는 편이다
- ⑥ 항상 맬다

☐


1-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
- ⑧ 비해당(문항1/①: 자동차 운전을 하지 않음,
「음주」 문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 뒷좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까?

- ① 다른 사람이 운전하는 자동차의 뒷좌석에 앉은 적이 없다
- ② 전혀 매지 않는다
- ③ 거의 매지 않는 편이다
- ④ 가끔 매는 편이다
- ⑤ 대체로 매는 편이다
- ⑥ 항상 맬다

☐

【오토바이 운전】

1. 오토바이를 운전할 때 헬멧을 착용합니까?

- ① 운전을 하지 않는다(⇒ 「개인형 이동장치 운전」 1번 문항으로)
- ② 전혀 착용하지 않는다
- ③ 거의 착용하지 않는 편이다
- ④ 가끔 착용하는 편이다
- ⑤ 대체로 착용하는 편이다
- ⑥ 항상 착용한다

☐


1-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
- ⑧ 비해당(문항1/①: 오토바이 운전을 하지 않음,
「음주」 문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적이 없음)

☐

8. 비해당

【개인형 이동장치 운전】

※ 개인형 이동장치

전동킥보드, 전동 이륜 평행 차, 전동기의 동력만으로 움직일 수 있는 자전거 등을 모두 포함

1. 개인형 이동장치를 운전할 때 헬멧을 착용합니까?

- ① 운전을 하지 않는다
- ② 전혀 착용하지 않는다
- ③ 거의 착용하지 않는 편이다
- ④ 가끔 착용하는 편이다
- ⑤ 대체로 착용하는 편이다
- ⑥ 항상 착용한다

신체활동

※ 격렬한(고강도) 신체활동

달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

1. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까? ☐ 일

일



- 1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 시간 분

88 88. 비해당(문항1/0일: 격렬한 신체활동 없음)

시간 분

88 88. 비해당

※ 중등도(중강도) 신체활동

천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

2. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다.) ☐ 일

일



- 2-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 시간 분

88 88. 비해당(문항2/0일: 중등도 신체활동 없음)

시간 분

88 88. 비해당

※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.

3. 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까? ☐ 일

일



- 3-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까?

하루에 시간 분

88 88. 비해당(문항3/0일: 걷기운동 없음)

시간 분

88 88. 비해당

식생활

1. 최근 1년 동안 아침식사를 일주일에 몇 회 하셨습니까?

- ① 주 5~7회
② 주 3~4회
③ 주 1~2회
④ 거의 안한다(주 0회)

☐

2. 가공식품에 '영양표시'를 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「비만 및 체중조절」 1번 문항으로)

☐


2-1. 가공식품을 사거나 고를 때, '영양표시'를 읽습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「비만 및 체중조절」 1번 문항으로)
⑧ 비해당(문항2/②: 영양표시를 모름)

☐

8. 비해당



2-1-1. 영양표시 내용이 가공식품을 고르는데 영향을 미칩니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항2/②: 영양표시를 모름, 문항2-1/②: 영양표시를 읽지 않음)

☐

8. 비해당

비만 및 체중조절

1. 현재 본인의 키와 몸무게는 얼마입니까?

1-1. 키(신장)	□□□. □cm
1-2. 몸무게(체중)	□□□. □kg

2. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까?

- ① 매우 마른 편임
② 약간 마른 편임
③ 보통임
④ 약간 비만임
⑤ 매우 비만임

☐

3. 최근 1년 동안 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다
② 몸무게를 유지하려고 노력했다
③ 몸무게를 늘리려고 노력했다
④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해 본 적 없다

☐

이환 I - 건강지식

【뇌졸중(중풍)】

1. 다음의 질문들은 뇌졸중(중풍) 초기증상을 정확히 알고 있는지 귀하의 지식을 묻는 문항으로, 뇌졸중(중풍) 증상이 맞다고 생각하면 “예”, 아니라고 생각하면 “아니오”를 응답해 주십시오.

1-1. 갑자기 한쪽 얼굴, 팔, 다리에 힘이 빠진다	① 예 ② 아니오	☐
1-2. 갑자기 말이 어눌해지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못한다	① 예 ② 아니오	☐
1-3. 갑자기 한쪽 눈이나 시야의 반이 보이지 않거나, 물체가 두 개로 보인다	① 예 ② 아니오	☐
1-4. 갑자기 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘들다	① 예 ② 아니오	☐
1-5. 갑자기 이제까지 경험하지 못한 심한 두통이 생긴다	① 예 ② 아니오	☐

【심근경색증】

1. 다음의 질문들은 심근경색증(심장발작) 초기증상을 정확히 알고 있는지 귀하의 지식을 묻는 문항으로, 심근경색증(심장발작) 증상이 맞다고 생각하면 “예”, 아니라고 생각하면 “아니오”를 응답해 주십시오.

1-1. 갑자기 턱, 목 또는 등쪽에 통증이나 답답함이 있다	① 예 ② 아니오	☐
1-2. 갑자기 힘이 없으며, 어지럽고, 울렁거리거나 식은땀이 난다	① 예 ② 아니오	☐
1-3. 갑자기 가슴에 통증이나 압박감 또는 짓누르는 느낌이 있다	① 예 ② 아니오	☐
1-4. 갑자기 팔 또는 어깨에 통증이나 불편감이 있다	① 예 ② 아니오	☐
1-5. 갑자기 숨이 찬다	① 예 ② 아니오	☐

구강건강

1. 스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각하십니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

☐

2. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느끼십니까?
(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.)

- ① 매우 불편하다
② 불편하다
③ 그저 그렇다
④ 별로 불편하지 않다
⑤ 전혀 불편하지 않다

☐

3. 어제 하루 동안 다음 시기에 칫솔질을 하였습니다습니까?

3-1. 점심식사 후에	① 예 ② 아니오 ③ 어제 점심식사 하지 않음
3-2. 저녁식사 후 또는 잠자기 전에	① 예 ② 아니오 ③ 어제 저녁식사 또는 잠자지 않음

☐
☐

4. 최근 1년 동안 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?

- ① 예
② 아니오 (▶「정신건강」 1번 문항으로)
③ 치과진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다 (▶「정신건강」 1번 문항으로)

☐


4-1. 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)
② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서)
③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)
④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
⑤ 병원에서 오래 기다리기 싫어서
⑥ 병원 등 예약을 하기가 힘들어서
⑦ 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서
⑧ 코로나19 유행상황 때문에
⑨ 기타()

☐

기
타

88. 비해당

88. 비해당(문항4/②, ③: 치과에 가지 못한 적이 없음, 치과 진료가 필요한 적이 없음)

정신건강

1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까?

1-1. 주중(또는 일하는 날)	시간
1-2. 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날)	시간

시간

시간

2. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

- ① 대단히 많이 느낀다
② 많이 느끼는 편이다
③ 조금 느끼는 편이다
④ 거의 느끼지 않는다
- (⇒ 2-1번 문항으로)
(⇒ 3번 문항으로)



2-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항2/③, ④: 평소 스트레스를 조금 느끼거나 거의 느끼지 않음)

8. 비해당

3. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 4번 문항으로)



3-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항3/②: 2주 이상 슬프거나 절망감을 느낀 적이 없음)

8. 비해당

4. 최근 2주 동안 아래 나열되는 증상들에 얼마나 자주 시달렸습니까?

4-1. 일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-2. 가라앉은 느낌, 우울감 혹은 절망감	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-3. 잠들기 어렵거나 자꾸 깨어남, 혹은 너무 많이 잠	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-4. 피곤함, 기력이 저하됨	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-5. 식욕 저하 혹은 과식	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-6. 내 자신이 나쁜 사람이라는 느낌 혹은 내 자신을 실패자 라고 느끼거나, 나 때문에 나 자신이란 내 가족이 불행 하게 되었다는 느낌	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-7. 신문을 읽거나 TV를 볼 때 집중하기 어려움	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-8. 남들이 알아챌 정도로 거동이나 말이 느림 또는 반대로 너무 초조하고 안절부절 하지 못해서 평소보다 많이 돌아다니고 서성거림	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-9. 나는 차라리 죽는 것이 낫겠다는 등의 생각 혹은 어떤 면에서건 당신 스스로에게 상처를 주는 생각들	① 전혀 아니다	② 여러날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일

5. **최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까?**

- ① 예 ② 아니오(→ 만 40세 이상 「인지장애」 1번 문항으로,
만 40세 미만 「예방접종」 1번 문항으로)

☐


5-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항5/②: 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 없음)

☐

8. 비해당

5-2. 죽고 싶다는 생각을 했던 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 경제적 어려움 때문에
② 이성 문제 때문에(실연, 파혼등)
③ 질병 또는 장애때문에
④ 직장 문제 때문에(실직, 미취업등)
⑤ 외로움, 고독때문에
⑥ 가정 불화로 인해
⑦ 진로 문제로 인해
⑧ 기타()

☐

기
타

88. 비해당

88. 비해당(문항5/②: 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 없음)

6. **최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?**

- ① 예 ② 아니오(→ 만 40세 이상 「인지장애」 1번 문항으로,
만 40세 미만 「예방접종」 1번 문항으로)
⑧ 비해당(문항5/②: 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 없음)

☐

8. 비해당



6-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항5/②: 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 없음,
문항6/②: 최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 없음)

☐

8. 비해당

【인지장애】

※ 다음은 귀하의 인지 기능에 대한 질문입니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용에 응답해주시기 바랍니다.

1. (만 40세 이상 응답해 주십시오) **최근 1년 동안 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있습니까?**

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(나이: 만 40세 미만)

☐

8. 비해당

예방접종

1. **최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?**

- ① 예 ② 아니오

☐

이환 II

※ 지금부터 우리나라 국민들이 많이 가지고 있는 질병에 대해서 질문하도록 하겠습니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용을 응답해 주시기 바랍니다.

【고혈압】

1. 본인의 혈압수치를 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

2. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「이환II-당뇨병」 1번 문항으로)

☐

2-1. 의사로부터 고혈압을 처음 진단받은 때는 언제입니까?

만 □□□세

888. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

888. 비해당

2-2. 혈압을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까?

2-2-1. 비약물요법(운동, 식이요법)	① 예 ② 아니오
2-2-2. 혈압약 복용	① 예 ⇒ 한 달에 □□일 ② 아니오

☐

□□ 한달에 □□ 일

2 00. 아니오

8 8 88. 비해당

8 8 88. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2-3. 고혈압을 관리하는 방법에 대해 교육을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

【당뇨병】

1. 본인의 혈당수치를 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

2. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「의료이용」 1번 문항으로)

☐

2-1. 의사로부터 당뇨병을 처음 진단받은 때는 언제입니까?

만 □□□세

888. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

888. 비해당

2-2. 혈당을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까?

2-2-1. 비약물요법(운동, 식이요법)	① 예 ② 아니오
2-2-2. 당뇨병약(경구 혈당강하제 또는 주사제)	① 예 ② 아니오
2-2-3. 인슐린 주사(인슐린 펌프 포함)	① 예 ② 아니오

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

8 8 8. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2-3. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해 교육을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐
8. 비해당

2-4. 최근 1년 동안 당화혈색소 검사를 몇 번이나 했습니까?

- ① 당화혈색소가 무엇인지 모름
② 4회 이상
③ 3회
④ 2회
⑤ 1회
⑥ 측정 안함
⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐
8. 비해당

2-5. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈검사(안저 검사)를 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐
8. 비해당

2-6. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 스팩검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐
8. 비해당

의료이용

1. 최근 1년 동안 본인이 병원(치과 제외) 진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「사고 및 중독」 1번 문항으로)
 ③ 병원 진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다 (⇒ 「사고 및 중독」 1번 문항으로)

☐


1-1. 진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)
 ② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서)
 ③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)
 ④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
 ⑤ 병원에서 오래 기다리기 싫어서
 ⑥ 병원 등 예약을 하기가 힘들어서
 ⑦ 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서
 ⑧ 코로나19 유행상황 때문에
 ⑨ 기타()

☐

기
타

88. 비해당

88. 비해당(문항1/②, ③: 병원(치과 제외)에 가지 못한 적이 없음, 병원 진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없음)

사고 및 중독

1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ☐ 회 ☐ 회
(※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외)
2 0. 아니오
- ① 예 → ☐ 회 ② 아니오 (⇒ 「활동제한 및 삶의 질」 1번 문항으로)

※ 여러 번 발생했다면, 각각의 손상 및 사고중독에 대해 1-1~1-2번 문항을 반복합니다.

1-1. 이 사고 또는 중독은 어떻게 발생했습니까?

- ① 운수사고
- ② 추락
- ③ 낙상(미끄러짐, 헛디딤, 주저앉음 포함)
- ④ 부딪힘(충돌 포함)
- ⑤ 자상 및 관통상(절임 포함)
- ⑥ 화상(전기, 열, 불로 인한)
- ⑦ 익수
- ⑧ 질식
- ⑨ 중독
- ⑩ 감전
- ⑪ 개에게 물림
- ⑫ 고양이에게 물림
- ⑬ 뱀에게 물림
- ⑭ 벌에 쏘임
- ⑮ 기타()

88. 비해당(문항1/②: 최근 1년 동안 사고나 중독이 발생한 적이 없음)

1-2. 이 사고 또는 중독으로 입은 손상을 어디에서 치료를 받았습니까?

- ① 응급실
- ② 병원 외래 이용
- ③ 병원 병실입원
- ④ 기타()

8. 비해당(문항1/②: 최근 1년 동안 사고나 중독이 발생한 적이 없음)

사고 및 중독 응답표				
1회	2회	3회	4회	5회
☐ 회 기 타	☐ 회 기 타	☐ 회 기 타	☐ 회 기 타	☐ 회 기 타
88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당
☐ 회 기 타	☐ 회 기 타	☐ 회 기 타	☐ 회 기 타	☐ 회 기 타
8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당

활동제한 및 삶의 질

※ 다음은 귀하의 삶에 대해 얼마나 만족하고 있는지를 알아보기 위한 질문입니다. 매우 만족하는 경우를 '10'으로, 매우 불만족하는 경우를 '1'로 생각하시고 다음 질문에 응답해 주십시오.

1. 모든 사항을 고려할 때, 최근 귀하의 삶에 (대체로) 어느 정도 만족합니까?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

매우 불만족 매우 만족

☐ ☐

※ 아래의 각 문항에서 오늘 귀하의 건강상태를 가장 잘 설명해주는 하나의 항목에 표시해 주십시오.

2-1. 운동능력

- ① 나는 걷는데 지장이 없다
- ② 나는 걷는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 종일 누워 있어야 한다

☐

2-2. 자기관리

- ① 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다
- ② 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다

☐

2-3. 일상 활동(예: 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가활동)

- ① 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다
- ② 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 일상 활동을 할 수가 없다

☐

2-4. 통증/불편

- ① 나는 통증이나 불편감이 없다
- ② 나는 다소 통증이나 불편감이 있다
- ③ 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다

☐

2-5. 불안/우울

- ① 나는 불안하거나 우울하지 않다
- ② 나는 다소 불안하거나 우울하다
- ③ 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다

☐

보건기관 이용

1. 최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 건강생활지원센터, 보건진료소를 이용한 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

☐

사회 물리적 환경

1. 현재 살고 있는 광역 시·도에서 얼마나 오래 살았습니까?

- ① 5년 미만
- ② 5-10년 미만
- ③ 10-15년 미만
- ④ 15-20년 미만
- ⑤ 20년 이상

☐

2. 현재 살고 있는 시·군·구에서 얼마나 오래 살았습니까?

- ① 5년 미만
- ② 5-10년 미만
- ③ 10-15년 미만
- ④ 15-20년 미만
- ⑤ 20년 이상

☐

심폐소생술

1. 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오 (→ 「교육 및 경제활동」 1번 문항으로)

☐


1-1. 심폐소생술 교육을 받은 경험이 있습니까?

- ① 최근 2년간 교육을 받은 적이 있다 (→ 1-1-1번 문항으로)
- ② 과거에는 있었지만, 최근 2년간 없다 (→ 2번 문항으로)
- ③ 교육을 받은 적이 없다 (→ 2번 문항으로)
- ④ 비해당(문항1/②: 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음)

☐

8. 비해당



1-1-1. 최근 2년 동안 심폐소생술 실습 시 경험한 교육을 모두 응답해 주십시오.

1-1-1-1. 마네킹	① 예 ② 아니오
1-1-1-2. 자동제세동기(AED)	① 예 ② 아니오

④ 비해당(문항1/②: 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음,
문항1-1/②: 과거에는 있었지만, 최근 2년간 없음,
문항1-1/③: 교육을 받은 적이 없음)

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

2. 심장마비(심정지) 환자를 목격한 경우 심폐소생술을 시행할 수 있습니까?

- ① 정확하게 시행할 수 있다
- ② 대략 시행할 수 있다
- ③ 시행할 수 없다
- ④ 비해당(문항 1/②: 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음)

☐

8. 비해당

교육 및 경제활동

1. 귀하는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

- ① 무학 (➡ 2번 문항으로) ② 서당/한학 (➡ 2번 문항으로) ③ 초등학교
④ 중학교 ⑤ 고등학교 ⑥ 2년/3년제 대학
⑦ 4년제 대학 ⑧ 대학원 이상

☐


1-1. 귀하는 그 학교를 졸업하셨습니다? 졸업 여부를 말씀해 주십시오.

- ① 졸업
② 수료
③ 중퇴
④ 재학/휴학 중
⑧ 비해당(문항1/①, ②: 무학, 서당/한학)

☐

8. 비해당

2. 귀하께서는 최근 1주일 동안 수입을 목적으로 1시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급 가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태도 일을 하신 경우에 포함됩니다.

- ① 예 ② 아니오 (➡ 4번 문항으로)

☐

3. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해 주십시오.
(예를 들면, 은행에서 출납 일을 함, 건설현장에서 교통정리를 함, 벽지 도배 등)

일의 종류		
직 업 분 류	① 관리자	② 전문가 및 관련종사자
	③ 사무종사자	④ 서비스종사자
	⑤ 판매종사자	⑥ 농·림·어업종사자
	⑦ 기능원 및 관련기능종사자	⑧ 장치, 기계조작 및 조립종사자
	⑨ 단순노무종사자	⑩ 군인(직업군인)

일의
종류

☐

88. 비해당

88. 비해당(문항2/②: 최근 1주일 동안 일을 하지 않음)



3-1. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?

- ① 고용주 및 자영업자(내 사업을 한다)
② 임금근로자(타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다)
③ 무급가족종사자(가족, 친척의 일을 돈을 받지 않고 돕는다)
⑧ 비해당(문항2/②: 최근 1주일 동안 일을 하지 않음)

☐

8. 비해당

4. 귀하의 현재 혼인상태는 다음 중 무엇에 해당합니까?

- ① 배우자 있으며, 함께 살고 있다(사실혼 포함)
② 배우자 있으나, 함께 살고 있지 않는다(출장 등의 일시적 상태 제외)
③ 배우자 사망으로 배우자가 없다
④ 이혼으로 배우자가 없다
⑤ 미혼으로 배우자가 없다

☐

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)

※ 다음은 2020년 1월 이후 코로나19 유행과 관련된 질문입니다.

1. 코로나19 유행으로 다음 상황에 대하여 얼마나 염려가 되십니까?

1-1. 나는 코로나19에 (다시) 감염될까 봐 염려된다	①매우 그렇다 ②그렇다 ③보통 이다 ④그렇지 않다 ⑤전혀 그렇지 않다
1-2. 나는 코로나19에 감염되면 그 이유로 주변으로부터 비난이나 피해를 받을 것 같아서 염려된다	①매우 그렇다 ②그렇다 ③보통 이다 ④그렇지 않다 ⑤전혀 그렇지 않다
1-3. 코로나19 유행으로 나와 우리 가족에게 경제적 피해가 올까 봐(일자리를 잃거나 구하기 어려움 등 포함) 염려된다	①매우 그렇다 ②그렇다 ③보통 이다 ④그렇지 않다 ⑤전혀 그렇지 않다

2. 코로나19 예방접종을 받은 적이 있습니까?

- ① 예, 1차 접종까지 받았습니다
 ② 예, 2차 접종까지 받았습니다(안센 포함)
 ③ 예, 3차 접종(부스터샷)까지 받았습니다
 ④ 예, 4차 이상 접종 받았습니다
 ⑤ 아니오, 접종을 받지 않았습니다

※ 다음은 코로나19 확진자의 기본정보와 관련된 질문입니다.

3. 코로나19로 확진된 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (➡ 개인조사 종료)



3-1. 최근 확진된 시기는 언제입니까?

□□□□년 □□월

8888 88 비해당(문항3/②: 코로나19에 확진된 적 없음)

3-2. 코로나19 확진 시 치료받은 장소는 어디에 해당하십니까?

- ① 의료기관 입원 치료
 ② 생활치료센터 치료
 ③ 자가(자택) 치료
 ④ 기타()
 ⑧ 비해당(문항3/②: 코로나19에 확진된 적 없음)

☐
☐
☐
☐
☐
년

월

8888 88. 비해당

☐

기
타

8. 비해당

※ 다음은 코로나19 확진자의 후유증 및 치료와 관련된 질문입니다.

3-3. 코로나19 확진으로 인해 새롭게 생긴 증상이 4주 이상 지속되었습니까?

- ① 예 (⇒ 3-3-1번 문항으로)
 ② 아니오, 확진 후 4주 이상 지속된 증상이 없었다 (⇒ 3-4번 문항으로)
 ③ 아니오, 확진 후 4주 이상이 지나지 않았다 (⇒ 3-4 번 문항으로)
 ⑧ 비해당(문항3/②: 코로나19에 확진된 적 없음)

3-3-1. 4주 이상 지속되었거나 현재까지도 남아있는 증상은 무엇입니까? 모두
 응답해 주십시오.

증상	확진 후 4주 이상	현재	증상	확진 후 4주 이상	현재
호흡기계·심혈관계			전신증상·정신증상		
☐ 호흡곤란	☐	☐	☐ 발한, 발열	☐	☐
☐ 가슴통증	☐	☐	☐ 피로감	☐	☐
☐ 가슴 두근거림	☐	☐	☐ 근육통	☐	☐
안·이비인후·중추신경계			☐ 불안 또는 우울	☐	☐
☐ 인후통	☐	☐	☐ 인지기능(기억력, 집중력) 저하	☐	☐
☐ 기침, 가래	☐	☐	☐ 수면장애	☐	☐
☐ 두통	☐	☐	기타		
☐ 후각상실	☐	☐	☐ 관절통	☐	☐
☐ 미각상실	☐	☐	☐ 탈모	☐	☐
☐ 눈 충혈	☐	☐	☐ 월경(생리)불순	☐	☐
☐ 구강, 안구 건조증	☐	☐	☐ 기타()	☐	☐
소화기계			-		
☐ 구토, 설사	☐	☐			
☐ 기타 소화장애	☐	☐			

⑧ 비해당(문항3/②: 코로나19에 확진된 적 없음,
 문항3-3/②, ③: 코로나19 확진 후 4주 이상이 지나지 않음,
 4주 이상 지속된 증상 없음)

3-3-2. 위 증상으로 치료를 받았다면 다음 중 어디에 해당되십니까?

- ① 의료기관 입원치료
 ② 의료기관 외래치료
 ③ 의료기관 처방없이 약국만 이용
 ④ 치료받은 적 없음
 ⑤ 기타()
 ⑧ 비해당(문항3/②: 코로나19에 확진된 적 없음,
 문항3-3/②, ③: 코로나19 확진 후 4주 이상이 지나지 않음,
 4주 이상 지속된 증상 없음)

3-3-3. 위 증상으로 일상생활을 하는데 지장을 받은 적이 있습니까?

- ① 예, 많이 받았습니다
 ② 예, 조금 받았습니다
 ③ 아니오, 전혀 받지 않았습니다
 ⑧ 비해당(문항3/②: 코로나19에 확진된 적 없음,
 문항3-3/②, ③: 코로나19 확진 후 4주 이상이 지나지 않음,
 4주 이상 지속된 증상 없음)

☐

8. 비해당

☐

기
타

8. 비해당

☐

기
타

8. 비해당

☐

8. 비해당

※ 다음은 코로나19 확진자의 후유증과 관련이 있다고 알려진 기저질환 여부를 확인하기 위한 질문입니다.

3-4. 코로나19 확진 시 이미 가지고 있던(의사로부터 진단받은) 질환이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (➡ 개인조사 종료)
 ⑧ 비해당(문항3/②: 코로나19에 확진된 적 없음)

☐

8. 비해당



3-4-1. 코로나19 확진 시 이미 가지고 있던(의사로부터 진단받은) 질환은 무엇
 입니까? 모두 응답해 주십시오.

☐

기
타

8. 비해당

☐ 알레르기 비염	☐ 만성콩팥병	☐ 암	☐ 비만
☐ 고지혈증	☐ 빈혈	☐ 뇌혈관질환	☐ 고혈압
☐ 당뇨병	☐ 심장질환	☐ 만성폐쇄성폐질환	☐ 기타 폐질환
☐ 기타()			

- ⑧ 비해당(문항3/②: 코로나19에 확진된 적 없음,
 문항3-4/②: 코로나19 확진 시 이미 가지고 있던 질환 없음)



지역사회건강조사 Community Health Survey

문의 : 질병관리청 만성질환관리과

☎ 043-719-7389 / 7388 / 7399



Ⅱ. 가구조사표

CHS

Community Health Survey

다음은 2022년 지역사회건강조사 가구조사표입니다. →

가구조사

※ 가구대표 1명만 가구조사에 참여해 주시기 바랍니다.

1. 세대 유형은 다음 중 무엇에 해당합니까?

1세대	① 1인 가구
	② 부부(응답자 + 배우자)
	③ 기타 : 상기를 제외한 모든 1세대 가구
2세대	④ 부부 + 미혼자녀
	⑤ 편부모 + 미혼자녀
	⑥ 기타 : 상기를 제외한 모든 2세대 가구
3세대	⑦ 모든 3세대 이상 가구

☐ ☐

2. 귀 가구는 현재 기초생활 수급자(구. 생활보호대상자 혹은 영세민)입니까?

- ① 그렇다
② 지금은 아니지만, 과거에 수급자였던 적이 있다
③ 아니다

☐

3. 임금, 부동산 소득, 연금, 이자, 정부 보조금, 친척이나 자녀들의 용돈 등 모든 수입을 합쳐 최근 1년 동안 가구의 총 소득은 대략 얼마입니까? 만일 연간 소득을 대답하기 어려운 경우 월 평균 액수를 말씀해 주십시오.

 (연/월)
 만원

(기준기간)

- ① 연
② 월

(소득액)

만원

4. 다음 중 최근 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?

- ① 우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다
② 우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다
③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다
④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다

☐

5. 귀 가구는 작년(2021년)과 비교하여 가구의 총 소득에 변화가 있었습니까?

- ① 줄어들었다
② 변함없다
③ 늘어났다

☐

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.



지역사회건강조사
Community Health Survey

문의 : 질병관리청 만성질환관리과

☎ 043-719-7389 / 7388 / 7399



Ⅲ. 조사항목

(2018~2022 전국공통)

Ⅲ. 조사항목 (2018~2022 전국 공통)

조사영역	조사항목	2018	2019	2020	2021	2022
흡연	일반담배(궐련) 평생흡연(100개비 이상) 여부	○	○	○	○	○
	일반담배(궐련) 흡연시작연령	○	○	-	-	-
	일반담배(궐련) 현재흡연여부	○	○	○	○	○
	일반담배(궐련) (매일 피우는 흡연자의) 하루 흡연량	○	○	-	○	○
	일반담배(궐련) (가끔 피우는 흡연자의) 하루 흡연량 및 흡연일수	○	○	-	-	-
	일반담배(궐련) 과거흡연자의 흡연기간/ 하루 흡연량	○	○	-	-	-
	일반담배(궐련) 과거흡연자의 금연기간	○	○	-	-	-
	일반담배(궐련) 현재흡연자의 금연계획 여부	○	○	-	-	-
	일반담배(궐련) 현재흡연자의 금연시도 여부	○	○	-	-	-
	일반담배(궐련) 현재흡연자의 금연시도 이유	-	○	-	-	-
	일반담배(궐련) 현재흡연자의 금연방법	-	○	-	-	-
	일반담배(궐련) 가정실내 간접흡연자 여부	○	○	-	-	-
	일반담배(궐련) 가정실내 간접흡연 경험 여부	○	○	-	-	-
	일반담배(궐련) 직장실내 간접흡연 경험 여부	○	○	-	-	-
	일반담배(궐련) 공공장소 간접흡연 경험 여부	-	○	-	-	-
	현재흡연자의 의료인 금연권고 경험 여부	-	-	-	-	-
	연간 금연캠페인 경험 여부	-	-	-	-	-
	연간 금연교육 경험 여부	-	-	-	-	-
	금연구역 인지 여부	-	○	-	-	-
	현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험 여부	-	○	-	-	-
	금연구역 법률 인지 여부	-	○	-	-	-
	궐련형 전자담배 평생흡연 여부	-	○	○	○	○
	궐련형 전자담배 현재흡연 여부	-	○	○	○	○
	궐련형 전자담배 (매일 피우는 흡연자의) 하루 흡연량	-	○	-	-	-
	궐련형 전자담배 (가끔 피우는 흡연자의) 하루 흡연량 및 흡연일수	-	○	-	-	-
	궐련형 전자담배 현재흡연자의 금연시도 여부	-	○	-	-	-
	궐련형 전자담배 현재흡연자의 금연계획 여부	-	○	-	-	-
	평생 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 흡연 여부	○	○	○	○	○
	현재 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 흡연 여부	○	○	○	○	○
	평생 기타 담배 제품 사용 경험 여부	○	○	-	-	-
	현재 기타 담배 제품 사용 경험 여부	○	○	-	-	-
	담뱃값 인상 영향 경험 여부	-	-	-	-	-
	담뱃값 인상 영향	-	-	-	-	-
	금연정책 강화 필요영역	-	○	-	-	-
	모든담배 현재흡연자의 금연계획 여부	-	-	-	○	○
	모든담배 현재흡연자의 금연시도 여부	-	-	○	○	○
	모든담배 가정실내 간접흡연자 여부	-	-	-	○	○

조사영역	조사항목	2018	2019	2020	2021	2022
	모든담배 가정실내 간접흡연 경험 여부	-	-	-	○	○
	모든담배 직장실내 간접흡연 경험 여부	-	-	○	○	○
	모든담배 공공장소 간접흡연 경험 여부	-	○	-	○	-
음주	평생음주 여부	○	○	○	○	○
	음주시작연령	-	○	-	○	-
	음주시작동기	-	○	-	-	-
	연간 음주 여부	○	○	○	○	○
	연간(연간) 음주 빈도	○	○	○	○	○
	연간 음주량	○	○	○	○	○
	10잔 이상 응답자의 음주량	-	-	-	○	○
	(남성) 폭음빈도	-	○	○	○	○
	(여성) 폭음빈도	-	○	○	○	○
	연간 절주 및 금주 시도 여부	-	○	○	○	○
	연간 음주폐해 경험 여부	○	○	-	○	-
	현재 알코올 홍조반응	-	○	-	-	-
	과거 알코올 홍조반응	-	○	-	-	-
안전의식	자동차 운전 여부	○	○	○	○	○
	자동차 안전벨트 착용 여부	○	○	○	○	○
	자동차 음주운전 경험 여부	○	○	○	○	○
	앞좌석 안전벨트 착용 여부	○	○	-	-	-
	뒷좌석 안전벨트 착용 여부	○	○	○	○	○
	버스 안전벨트 착용 여부	○	○	-	-	-
	음주운전자량 동승 경험 여부	○	○	-	-	-
	오토바이 운전 여부	○	○	○	○	○
	오토바이 헬멧 착용 여부	○	○	-	-	○
	오토바이 음주운전 경험 여부	○	○	○	○	○
	자전거 운전 여부	○	○	-	-	-
	자전거 헬멧 착용 여부	○	○	-	-	-
	연간 자전거 음주운전 경험 여부	○	○	-	-	-
	개인형 이동장치 운전 여부	-	-	-	-	○
	개인형 이동장치 헬멧 착용 여부	-	-	-	-	○
	연간 스쿨존 과속운전 경험 여부	-	○	-	-	-
신체활동	격렬한 신체활동 일수 및 시간	-	○	○	○	○
	중등도 신체활동 일수 및 시간	-	○	○	○	○
	걷기 실천 일수 및 시간	○	○	○	○	○
	유연성 운동 실천 일수	-	○	-	○	-
	근력운동 실천 일수	-	-	-	○	-
	지역사회 내 운동시설 접근성	○	-	-	-	-
	주중 여가시간에 앉아서 보내는 시간	-	-	-	-	-
	주말 여가시간에 앉아서 보내는 시간	-	-	-	-	-
	일과 관련된 고강도 신체활동 여부 / 주당일수 / 하루시간	○	-	-	-	-
	일과 관련된 중강도 신체활동 여부 / 주당일수 / 하루시간	○	-	-	-	-
	이동 중 걷기 및 자전거 이용 여부 / 주당일수 / 하루시간	○	-	-	-	-

요약

제1부

조사체계

제2부

주요통계결과

제3부

통계표

제4부

부록

조사영역	조사항목	2018	2019	2020	2021	2022
	운동 및 여가 중 고강도 신체활동 여부 / 주당일수 / 하루시간	○	-	-	-	-
	운동 및 여가 중 중강도 신체활동 여부 / 주당일수 / 하루시간	○	-	-	-	-
	앉아서 하는 활동 하루 시간	○	-	-	-	-
식생활	연간 아침식사 일수	○	○	○	○	○
	평상시 소금섭취 수준(저염선택)	-	○	-	-	-
	영양표시 인지 여부	○	○	○	○	○
	영양표시 독해 여부	○	○	○	○	○
	영양표시 활용 여부	○	○	○	○	○
비만 및 체중조절	본인인지 키(신장) 자가보고	○	-	○	○	○
	본인인지 몸무게(체중) 자가보고	○	-	○	○	○
	본인인지 체형	○	○	-	○	○
	연간 체중조절 경험 여부	○	○	○	○	○
	체중 조절방법	-	-	-	-	-
구강건강	주관적 구강건강 수준	○	○	○	○	○
	저작불편 경험 여부	○	○	○	○	○
	탈음불편경험 여부	-	-	-	-	-
	틀니이용행태(50세 이상)	-	-	-	-	-
	주관적 틀니 필요 여부	-	-	-	-	-
	어제 아침식사 후 칫솔질 실천 여부	○	○	-	-	-
	어제 점심식사 후 칫솔질 실천 여부	○	○	○	○	○
	어제 저녁식사 후 칫솔질 실천 여부	○	○	-	-	-
	어제 잠자기 전 칫솔질 실천 여부	○	○	-	○	-
	어제 저녁식사 후 또는 잠자기 전 칫솔질 실천 여부	-	-	-	-	○
	연간 구강검진 수진 여부	-	-	-	-	-
	연간 스케일링(치석제거) 경험 여부	-	-	-	-	-
	연간 미충족의료(치과)	○	○	-	○	○
	미충족의료 이유(치과)	○	○	-	○	○
	주관적 치주조작(잇몸) 건강 수준	-	-	-	-	-
정신건강	스트레스 인지	○	○	○	○	○
	스트레스로 인한 정신상담 여부	○	○	○	○	○
	우울감 경험 여부	○	○	○	○	○
	우울증상으로 인한 정신상담 여부	○	○	○	○	○
	수면시간	○	○	○	○	○
	자살생각 경험 여부	-	-	-	○	○
	자살생각으로 인한 정신상담 여부	-	-	-	○	○
	자살생각행동 원인	-	-	-	○	○
	자살시도 경험 여부	-	-	-	○	○
	자살시도로 인한 정신상담 여부	-	-	-	○	○
	인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 일상생활 지장 정도	-	-	-	-	-
	인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험 여부	-	-	-	-	-
	우울증상유병(PHQ-9)	○	○	○	○	○
	정신문제로 인한 상담 경험 여부	○	-	-	-	-
	피츠버그 수면의 질	○	-	-	-	-

조사영역	조사항목	2018	2019	2020	2021	2022
	치매 상담콜센터 인지 여부	○	-	-	-	-
	치매 상담콜센터 이용 여부	○	-	-	-	-
	치매 상담콜센터 미이용 이유	○	-	-	-	-
	인지장애 경험 여부	○	○	-	○	○
	인지장애로 인한 일상생활 지장 정도	○	○	-	-	-
	인지장애로 인한 도움 필요 정도	○	○	-	-	-
	일상생활 도움 수혜 정도	○	○	-	-	-
	인지장애로 인한 사회활동 지장 정도	○	○	-	-	-
	인지장애 상담 여부	○	○	-	-	-
	연간 치매 선별 검사 수진 여부	○	○	-	-	-
	치매선별검사 장소	○	○	-	-	-
예방접종 및 검진	연간 인플루엔자 예방접종 여부	○	○	○	○	○
	연간 인플루엔자 예방접종 횟수	-	-	-	-	-
	연간 인플루엔자 예방접종 시기	-	-	-	-	-
	연간 인플루엔자 예방접종 장소	-	-	-	-	-
	건강검진 수진 경험 여부	-	○	-	○	-
	건강검진 후 상담 경험 여부	-	-	-	-	-
	건강검진 미수진 이유	-	-	-	-	-
	암 검진 수진 경험 여부	-	○	-	○	-
	수검 암 검진 종류	-	-	-	-	-
	암 검진 후 상담 경험 여부	-	-	-	-	-
	암 검진 미수진 이유	-	-	-	-	-
질환 및 사고중독	최근 2주간 만성, 급성질환 및 사고중독 경험 여부	-	-	-	-	-
	최근 2주간 만성, 급성질환 및 사고중독 일수	-	-	-	-	-
고혈압	혈압수치 인지 여부	-	○	○	○	○
	고혈압 진단 경험 여부	○	○	○	○	○
	고혈압 최초 진단시기	○	○	○	○	○
	본인 인지 혈압조절 여부	○	-	-	-	-
	고혈압 현재 치료 여부	○	○	○	○	○
	혈압관리 치료 방법 및 혈압조절약 복용일수	○	○	○	○	○
	고혈압 약 복용 여부	-	○	-	-	-
	고혈압 관리교육 이수 여부	○	○	-	○	○
	고혈압 관리교육 장소	○	○	-	-	-
당뇨병	혈당수치 인지 여부	○	○	○	○	○
	당뇨병 진단 경험 여부	○	○	○	○	○
	당뇨병 최초 진단 시기	○	○	○	○	○
	본인인지 혈당조절 여부	○	-	-	-	-
	당뇨병 현재치료 여부	○	○	○	○	○
	당뇨병 치료방법	○	○	○	○	○
	당뇨병 관리교육 이수 여부	○	○	-	○	○
	당뇨병 관리교육 장소	○	○	-	-	-
	당화혈색소 인지 여부	○	○	○	○	○
	당화혈색소 검사 경험 횟수	○	○	○	○	○
	당뇨병 안질환 합병증검사 수검 여부	○	○	○	○	○
	당뇨병 신장질환 합병증검사 수검 여부	○	○	○	○	○

조사영역	조사항목	2018	2019	2020	2021	2022
이상지질혈증 (고지혈증 포함)	이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험 여부	-	-	-	-	-
	이상지질혈증(고지혈증 포함) 현재치료여부	-	-	-	-	-
	이상지질혈증(고지혈증 포함) 치료방법 및 약물 복용 여부/일수	-	-	-	-	-
	총 콜레스테롤수치 인지 여부	-	-	-	-	-
뇌졸중	뇌졸중 진단 경험 여부	-	-	-	-	-
	뇌졸중 현재치료 여부	-	-	-	-	-
	뇌졸중 후유증 이환 여부	-	-	-	-	-
	뇌졸중 조기증상 인지	○	○	○	○	○
	뇌졸중 증상 대처 방법	○	○	-	-	-
심근경색증	심근경색증 진단 경험 여부	-	-	-	-	-
	심근경색증 현재치료 여부	-	-	-	-	-
	심근경색증 조기증상 인지	○	○	○	○	○
	심근경색증 증상 대처 방법	○	○	-	-	-
협심증	협심증 진단 경험 여부	-	-	-	-	-
	협심증 현재치료 여부	-	-	-	-	-
심근경색증 및 협심증	심근경색증, 협심증 평생의사진단 경험 여부	-	-	-	-	-
	심근경색증, 협심증 현재치료 여부	-	-	-	-	-
관절염	관절염 진단 경험 여부	-	-	-	-	-
	관절염 현재치료 여부	-	-	-	-	-
	관절염 관리교육 장소	-	-	-	-	-
골다공증	골다공증 진단 경험 여부	-	-	-	-	-
	골다공증 현재치료 여부	-	-	-	-	-
	신체 부위별(엉덩이, 척추, 손목) 골다공증 골절 진단 여부	-	-	-	-	-
천식	천식 진단 경험 여부	-	-	-	-	-
	천식 현재치료 여부	-	-	-	-	-
알레르기 비염	알레르기비염 진단 경험 여부	-	-	-	-	-
	알레르기비염 현재치료 여부	-	-	-	-	-
아토피 피부염	아토피피부염 진단 경험 여부	-	-	-	-	-
	아토피피부염 현재치료 여부	-	-	-	-	-
백내장	백내장 평생의사진단 경험 여부	-	-	-	-	-
	백내장 현재치료 여부	-	-	-	-	-
건강정보 이해능력	건강정보 이해능력	-	-	-	○	-
의료이용	연간 미충족 의료 여부	○	○	○	○	○
	미충족 의료 이유	○	○	○	○	○
사고 및 중독	연간 사고중독 경험 여부	○	○	○	○	○
	연간 사고중독 경험 건수	○	○	○	○	○
	계절별 사고중독 경험 건수	○	○	-	-	-
	연간 사고중독 원인분포	○	○	○	○	○
	의도성 및 비의도성 사고 분포	○	-	-	-	-
	사고 및 중독 치료 장소	○	○	○	○	○
	연간 낙상 경험 여부	-	○	-	○	-
	연간 낙상 건수	-	○	-	○	-
	연간 낙상치료 경험 여부	-	○	-	○	-
	장소별 낙상 분포	-	-	-	-	-
	원인별 낙상 분포	-	-	-	-	-
	낙상에 대한 두려움	-	-	-	-	-

조사영역	조사항목	2018	2019	2020	2021	2022
활동제한 및 삶의 질	주관적 건강 수준	○	○	○	○	○
	침상와병 경험 여부	-	○	-	-	-
	침상와병 일수	-	○	-	-	-
	결근결석 경험 여부	-	○	-	-	-
	결근결석 일수	-	○	-	-	-
	삶의 질 지수(EQ-5D Index)	○	○	-	○	○
	행복감지수	-	○	-	○	○
보건기관 이용	보건기관 이용 여부	○	○	-	-	○
사회 물리적 환경	지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도	-	○	-	○	-
	현재 체감 환경	○	-	-	-	-
	사회적 연결망(친척, 이웃, 친구)	-	○	-	-	-
	사회적 활동 참여 여부	-	○	-	-	-
	광역 시·도 거주기간	○	○	○	○	○
	시·군·구 거주기간	○	○	○	○	○
심폐소생술	심폐소생술 인지 여부	○	-	○	-	○
	심폐소생술 교육경험 여부	○	-	○	-	○
	심폐소생술 마네킹 실습경험 여부	○	-	○	-	○
	심폐소생술 자동제세동기(AED) 실습경험 여부	-	-	○	-	○
	심폐소생술 시행능력 정도	○	-	○	-	○
개인위생	손 씻기 감염병 예방 인지 여부	-	○	-	-	-
	식사 전 손 씻기 실천 여부	-	○	○	○	-
	화장실 다녀온 후 손 씻기 실천 여부	-	○	○	○	-
	외출 후 손 씻기 실천 여부	-	○	○	○	-
	평소 손 씻기 실천 여부	-	-	○	-	-
	집 밖에서의 손 소독제 사용 횟수	-	-	○	-	-
	비누 혹은 손 세정제 사용 여부	-	○	○	○	-
	손 씻기 교육 및 홍보 경험 여부	-	○	-	-	-
여성건강	현재 월경 경험 여부	-	○	-	-	-
	현재 임신 여부	○	○	-	-	-
	최근 출산 경험 여부	○	-	-	-	-
	모유수유 경험	○	-	-	-	-
교육 및 경제활동	최근 1주일 동안 경제활동 여부	○	○	○	○	○
	최근 1주일 동안 경제활동 비참여자 상태	-	-	-	-	-
	일의 종류 및 직업분류	○	○	○	○	○
	종사상 지위	○	○	○	○	○
	코로나19로 인한 일자리 변화	-	-	-	○	-
	교육 수준	○	○	○	○	○
	졸업 여부	○	○	○	○	○
	혼인 상태	○	○	○	○	○
가구조사	세대유형	○	○	○	○	○
	기초생활수급 여부	○	○	○	○	○
	연간 가구소득	○	○	○	○	○
	다문화 가구 여부	-	○	-	-	-

요약

제1부

조사체계

제2부

주요통계결과

제3부

통계표

제4부

부록

조사영역	조사항목	2018	2019	2020	2021	2022
	가구 식품 안정성 여부	○	○	-	-	○
	치매환자 가족 가구	○	○	-	-	-
	치매환자 가족 관계	○	○	-	-	-
	치매환자 동거 가구 여부	○	○	-	-	-
	비동거 치매환자의 거주상태	○	○	-	-	-
	시설거주 치매환자 비용 부담자	○	○	-	-	-
	시설 외 거주 치매환자의 주 돌봄자	○	○	-	-	-
	시설 외 거주 치매환자 돌봄자의 관계	○	○	-	-	-
	치매 질병 부담 이유	○	○	-	-	-
	(코로나19로 인한) 가구소득 변화	-	-	-	○	○
	코로나19로 인한 가구 필수 소비지출 변화	-	-	-	○	-
코로나 바이러스 감염증-19	코로나19 관련 격리 혹은 입원	-	-	○	-	-
	코로나19 관련 격리 혹은 입원 장소	-	-	○	-	-
	코로나19 관련 유증상 경험 여부	-	-	○	-	-
	코로나19 관련 유증상자 행동수칙 수행 여부	-	-	○	-	-
	코로나19 관련 증상 시작 시 적절한 행동수칙 인지	-	-	○	-	-
	코로나19 관련 증상 지속 시 적절한 행동수칙 인지	-	-	○	-	-
	코로나19 관련 유증상자 행동수칙 준수 여부	-	-	○	○	-
	코로나19 관련 유증상자 행동수칙 미준수 이유	-	-	○	-	-
	방역수칙 실천 여부	-	-	○	○	-
	사회적 거리두기(또는 생활 속 거리두기) 실천 여부	-	-	○	○	-
	손 씻기 실천 여부(개인위생 영역의 세부 항목 참고)	-	-	○	-	-
	코로나19 유행으로 인한 일상생활 영향	-	-	○	○	-
	코로나19 유행으로 인한 세부적 일상생활 변화	-	-	○	○	-
	코로나19로 인한 심리적 영향	-	-	○	○	○
	기관별 코로나19 대응에 대한 신뢰도	-	-	○	-	-
	코로나19 관련 사회적 지지	-	-	○	-	-
	코로나19 예방접종 여부	-	-	-	○	○
	코로나19 예방접종 의향	-	-	-	○	-
	코로나19 예방접종 희망자의 미접종 이유	-	-	-	○	-
	코로나19 예방접종 미희망자의 미접종 이유	-	-	-	○	-
	코로나19 확진 후 후유증 관련 문항(9문항)	-	-	-	-	○

/ IV /

IV. 지표정의

IV. 지표정의

1. 흡연

(1) 평생흡연율

지표정의		평생(지금까지) 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람의 분율
관련문항		1. <u>지금까지</u> 살아오는 동안 피운 일반담배(궐련)의 양은 총 얼마나 됩니까? ① 5갑(100개비) 미만 ② 5갑(100개비) 이상 ③ 피운 적 없다
산출식	분자	평생(지금까지) 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 현재흡연율

지표정의		평생(지금까지) 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율
관련문항		1. <u>지금까지</u> 살아오는 동안 피운 일반담배(궐련)의 양은 총 얼마나 됩니까? ① 5갑(100개비) 미만 ② 5갑(100개비) 이상 ③ 피운 적 없다 1-1. 현재 일반담배(궐련)를 피웁니까? ① 매일 피운다 ② 가끔 피운다 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다
산출식	분자	평생(지금까지) 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 매일흡연자의 하루 평균 흡연량

지표정의		평생 일반담배(궐련)를 5갑(100개비)이상 흡연한 사람으로서 매일 흡연하는 사람의 하루 평균 흡연량
관련문항		1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 현재 담배를 피웁니까? ① 매일 피움 → 2-1-1. 하루 평균 일반담배(궐련) 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 ② 가끔 피움 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음
산출식	분자	하루 평균 흡연 개비 수의 총합
	분모	평생 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 매일흡연자 수
단위		개비
조사주기		1년

(4) 궐련형 전자담배 평생흡연율

지표정의		평생(지금까지) 궐련형 전자담배를 흡연한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 궐련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)를 피운 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	평생(지금까지) 궐련형 전자담배를 흡연한 적이 있는 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 궐련형 전자담배 현재흡연율

지표정의		평생(지금까지) 궐련형 전자담배를 흡연한 적이 있는 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율
관련문항		1. 지금까지 궐련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)를 피운 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-1. 현재 궐련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)를 피웁니까? ① 매일 피운다 ② 가끔 피운다 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다
산출식	분자	평생(지금까지) 궐련형 전자담배를 흡연한 적이 있는 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(6) 액상형 전자담배 평생사용률

지표정의		평생(지금까지) 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. <u>지금까지</u> 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	평생(지금까지) 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(7) 액상형 전자담배 현재사용률

지표정의		최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용하는 사람의 분율
관련문항		1. <u>지금까지</u> 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. <u>최근 1달 동안</u> 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(8) 현재흡연자의 금연시도율

지표정의		담배 종류와 상관없이 현재흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 현재 일반담배(궐련)를 피웁니까? ① 매일 파운다 ② 가끔 파운다 ③ 과거에는 피웠으나 현재 파우지 않는다
		2. 현재 궐련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)를 피웁니까? ① 매일 파운다 ② 가끔 파운다 ③ 과거에는 피웠으나 현재 파우지 않는다
		3. 최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		4. 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	담배 종류와 상관없이 최근 1년 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 수
	분모	담배 종류와 상관없이 현재흡연자(일반담배(궐련) 및 궐련형 전자담배 “매일 파움” 또는 “가끔 파움”, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 “예”)의 수
단위		%
조사주기		1년

(9) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률

지표정의		담배 종류와 상관없이 현재흡연자 중 1개월 내에 금연할 계획이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 현재 일반담배(궐련)를 피웁니까? ① 매일 피운다 ② 가끔 피운다 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다
		2. 현재 궐련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)를 피웁니까? ① 매일 피운다 ② 가끔 피운다 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다
		3. 최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		4. 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		5. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까? ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다 ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다 ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다 ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다
산출식	분자	담배 종류와 상관없이 1개월 내 금연계획이 있는 사람의 수
	분모	담배 종류와 상관없이 현재흡연자(일반담배(궐련) 및 궐련형 전자담배 “매일 피움” 또는 “가끔 피움”, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 “예”)의 수
단위		%
조사주기		1년

(10) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률

지표정의		담배 종류와 상관없이 현재비흡연자(과거흡연자 포함)가 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. <u>본인을 제외한</u> 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. <u>최근 1주일 동안</u> 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	담배 종류와 상관없이 현재비흡연자(과거흡연자 포함)가 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수
	분모	현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수
단위		%
조사주기		1년

(11) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률

지표정의		담배 종류와 상관없이 현재비흡연자(과거흡연자 포함)가 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1주일 동안</u> 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)
산출식	분자	담배 종류와 상관없이 현재 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)가 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수
	분모	일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수 (③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음) 대상자 제외)
단위		%
조사주기		1년

2. 음주

(1) 평생음주율

지표정의		지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. <u>지금까지</u> 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 연간음주율

지표정의		최근 1년 동안 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. <u>지금까지</u> 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 2. 다음은 최근 1년 동안의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다. 2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 ② 한 달에 1번 미만 ③ 한 달에 1번 정도 ④ 한 달에 2-4번 정도 ⑤ 일주일에 2-3번 정도 ⑥ 일주일에 4번 이상
산출식	분자	최근 1년 동안 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수(2-1. 응답보기 ②,③,④,⑤,⑥)
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 월간음주율

지표정의		최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 2. 다음은 최근 1년 동안의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다. 2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 ② 한 달에 1번 미만 ③ 한 달에 1번 정도 ④ 한 달에 2-4번 정도 ⑤ 일주일에 2-3번 정도 ⑥ 일주일에 4번 이상
산출식	분자	최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수(2-1. 응답보기 ③,④,⑤,⑥)
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 고위험음주율

지표정의		최근 1년 동안 남자는 한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상, 여자는 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 주 2회 이상 마시는 사람의 분율
관련문항		1. 다음은 최근 1년 동안의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다. 1-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 ② 한 달에 1번 미만 ③ 한 달에 1번 정도 ④ 한 달에 2-4번 정도 ⑤ 일주일에 2-3번 정도 ⑥ 일주일에 4번 이상 1-2 한 번에 술을 얼마나 마십니까?(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다.) ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
산출식	분자	최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 연간음주자의 고위험음주율

지표정의		최근 1년 동안 음주한 사람 중에서 남자는 한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상, 여자는 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 주 2회 이상 마시는 사람의 분율
관련문항		1. 다음은 최근 1년 동안의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다. 1-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 ② 한 달에 1번 미만 ③ 한 달에 1번 정도 ④ 한 달에 2-4번 정도 ⑤ 일주일에 2-3번 정도 ⑥ 일주일에 4번 이상 1-2 한 번에 술을 얼마나 마십니까?(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다.) ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
산출식	분자	최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수
	분모	최근 1년 동안 음주한 사람의 수(1-1. 응답보기 ②,③,④,⑤,⑥)
단위		%
조사주기		1년

(6) 월간폭음률

지표정의		최근 1년 동안 월 1회 이상 한 번의 술자리에서 남자의 경우 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상, 여자의 경우 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상 음주한 분율
관련문항		1. 다음은 최근 1년 동안의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다. 1-1. (남성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까? ① 전혀 없다 ② 한 달에 1번 미만 ③ 한 달에 1번 정도 ④ 일주일에 1번 정도 ⑤ 거의 매일 1. 다음은 최근 1년 동안의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다. 1-1. (여성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까? ① 전혀 없다 ② 한 달에 1번 미만 ③ 한 달에 1번 정도 ④ 일주일에 1번 정도 ⑤ 거의 매일
산출식	분자	최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 월 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 남성 또는 한 번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 월 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 여성의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

3. 신체활동

(1) 격렬한 신체활동 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. (※ 격렬한(고강도) 신체활동: 달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동) 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 <u>10분 이상</u> 했던 날은 며칠입니까? ☐일 1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 시간 분
산출식	분자	최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 중등도 신체활동 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. (※ 중등도(중강도) 신체활동: 천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동) 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 <u>10분 이상</u> 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다.) ☐일 1-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 시간 분
산출식	분자	최근 1주일 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 중등도 이상 신체활동 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 또는 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. (※ 격렬한(고강도) 신체활동: 달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동) 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 <u>10분 이상</u> 했던 날은 며칠입니까? ☐일
		1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 시간 분
		2. (※ 중등도(중강도) 신체활동: 천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동) 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 <u>10분 이상</u> 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다.) ☐일
		2-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 시간 분
산출식	분자	최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 걷기 실천율

지표정의		최근 1주일 동안 1회 10분 이상, 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
관련문항		1. (※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.) 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 <u>10분 이상</u> 걸었던 날은 며칠입니까? ☐일
		1-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까? 하루에 시간 분
산출식	분자	최근 1주일 동안 1회 10분 이상, 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

4. 건강생활실천

(1) 건강생활실천율

지표정의		금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 비율
관련문항		[흡연] 1. 지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(궤련)의 양은 총 얼마나 됩니까? ① 5갑(100개비) 미만 ② 5갑(100개비) 이상 ③ 피운 적 없다 1-1. 현재 일반담배(궤련)를 피웁니까? ① 매일 피운다 ② 가끔 피운다 ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다
		[음주] 1. 다음은 최근 1년 동안의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다. 1-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? ① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 ② 한 달에 1번 미만 ③ 한 달에 1번 정도 ④ 한 달에 2-4번 정도 ⑤ 일주일에 2-3번 정도 ⑥ 일주일에 4번 이상 1-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다.) ① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
		[신체활동] 1. (※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.) 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까? □일 1-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까? 하루에 □□시간 □□분
	산출식	현재 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년
비고		- 금연 실천자: 평생 흡연해 본 적이 없거나, 과거 흡연하였더라도 현재 금연하고 있는 사람 - 절주 실천자: 바음주자이거나, 최근 1년 동안 술을 마셨더라도 한 번의 술자리에서 남자는 7잔 미만, 여자는 5잔 미만으로 주 1회 이하로 마신 사람 - 걷기 실천자: 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람

5. 비만 및 체중조절

(1) 비만율(자가보고)

지표정의		체질량지수(kg/m ²)가 25 이상인 사람의 분율
관련문항		1. 현재 본인의 키와 몸무게는 얼마입니까? 1-1. 키(신장) □□□.□cm 1-2. 몸무게(체중) □□□.□kg
산출식	분자	체질량지수(kg/m ²)가 25 이상인 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년
비고		비만도 분포: 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

(2) 주관적 비만인지율

지표정의		주관적으로 “약간 비만” 또는 “매우 비만”이라고 생각하는 사람의 분율
관련문항		1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까? ① 매우 마른 편임 ② 약간 마른 편임 ③ 보통임 ④ 약간 비만임 ⑤ 매우 비만임
산출식	분자	“약간 비만임” 또는 “매우 비만임”에 응답한 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 연간 체중조절 시도율

지표정의		최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까? ① 몸무게를 줄이려고 노력했다 ② 몸무게를 유지하려고 노력했다 ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다 ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해 본 적 없다
산출식	분자	최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

6. 식생활

(1) 아침식사빈도

지표정의		최근 1년 동안 주평균 아침식사빈도
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 아침식사를 일주일에 몇 회 하셨습니까? ① 주 5~7회 ② 주 3~4회 ③ 주 1~2회 ④ 거의 안한다(주 0회)
산출식	분자	응답보기별 응답자 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 아침 식사 실천율

지표정의		최근 1년 동안 주평균 아침식사를 5일 이상 한 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 아침식사를 일주일에 몇 회 하셨습니까? ① 주 5~7회 ② 주 3~4회 ③ 주 1~2회 ④ 거의 안한다(주 0회)
산출식	분자	최근 1년 동안 주평균 5일 이상 아침식사를 한 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 영양표시 인지율

지표정의		‘영양표시’를 알고 있는 사람의 분율
관련문항		1. 가공식품에 ‘영양표시’를 알고 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	‘영양표시’를 알고 있는 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 영양표시 독해율

지표정의		가공식품을 사거나 고를 때 ‘영양표시’를 읽는 사람의 분율
관련문항		1. 가공식품에 ‘영양표시’를 알고 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 가공식품을 사거나 고를 때, ‘영양표시’를 읽습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	가공식품을 사거나 고를 때 ‘영양표시’를 읽는 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 영양표시 활용률

지표정의		영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 분율
관련문항		1. 가공식품에 ‘영양표시’를 알고 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 가공식품을 사거나 고를 때, ‘영양표시’를 읽습니까? ① 예 ② 아니오 1-2. 영양표시 내용이 가공식품을 고르는데 영향을 미칩니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	영양표시 내용이 가공식품을 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수
	분모	가공식품을 사거나 고를 때 “영양표시”를 읽는 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

7. 정신건강

(1) 하루 평균 수면시간(주중)

지표정의		주중(또는 일하는 날) 하루에 보통 자는 시간
관련문항		1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까? 1-1. 주중(또는 일하는 날) □□시간
산출식	분자	1) 주중(또는 일하는 날) 하루에 보통 자는 시간의 합 2) 주중(또는 일하는 날) 하루에 보통 자는 시간의 구간(6시간 이하, 7-8시간, 9시간 이상)별 응답자 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		시간
조사주기		1년

(2) 하루 평균 수면시간(주말)

지표정의		주말(또는 일하지 않는 전날) 하루에 보통 자는 시간
관련문항		1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까? 1-1. 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날) □□시간
산출식	분자	1) 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날) 하루에 보통 자는 시간의 합 2) 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날) 하루에 보통 자는 시간의 구간(6시간 이하, 7-8시간, 9시간 이상)별 응답자 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		시간
조사주기		1년

(3) 스트레스 인지율

지표정의		평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이” 또는 “많이” 느끼는 사람의 분율
관련문항		1. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까? ① 대단히 많이 느낀다 ② 많이 느끼는 편이다 ③ 조금 느끼는 편이다 ④ 거의 느끼지 않는다
산출식	분자	평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 스트레스로 인한 정신상담률

지표정의		스트레스로 인해 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까? ① 대단히 많이 느낀다 ② 많이 느끼는 편이다 ③ 조금 느끼는 편이다 ④ 거의 느끼지 않는다 1-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	스트레스로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수
	분모	평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 우울감 경험률

지표정의		최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(6) 우울증상으로 인한 정신상담률

지표정의		우울증상으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	우울증상으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수
	분모	최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(7) 우울증상유병률

지표정의		우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율
관련문항		1. 최근 2주 동안 아래 나열되는 증상들에 얼마나 자주 시달렸습니까? 1-1. 일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음 ① 전혀 아니다 ② 여러 날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일 1-2. 가라앉은 느낌, 우울감 혹은 절망감 ① 전혀 아니다 ② 여러 날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일 1-3. 잠들기 어렵거나 자꾸 깨어남, 혹은 너무 많이 잠 ① 전혀 아니다 ② 여러 날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일 1-4. 피곤함, 기력이 저하됨 ① 전혀 아니다 ② 여러 날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일 1-5. 식욕 저하 혹은 과식 ① 전혀 아니다 ② 여러 날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일 1-6. 내 자신이 나쁜 사람이라는 느낌 혹은 내 자신을 실패자라고 느끼거나, 나 때문에 나 자신이랑 내 가족이 불행하게 되었다는 느낌 ① 전혀 아니다 ② 여러 날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일 1-7. 신문을 읽거나 TV를 볼 때 집중하기 어려움 ① 전혀 아니다 ② 여러 날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일 1-8. 남들이 알아챌 정도로 거동이나 말이 느림 또는 반대로 너무 초조하고 안절부절 하지 못해서 평소보다 많이 돌아다니고 서성거림 ① 전혀 아니다 ② 여러 날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일 1-9. 나는 차라리 죽는 것이 낫겠다는 등의 생각 혹은 어떤 면에서건 당신 스스로에게 상처를 주는 생각들 ① 전혀 아니다 ② 여러 날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일
산출식	분자	우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 수 (전혀 아니다 0점, 여러날 동안 1점, 일주일 이상 2점, 거의 매일 3점)
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(8) 자살생각률

지표정의		최근 1년 동안 자살을 생각해 본 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(9) 자살생각으로 인한 정신상담률

지표정의		자살생각으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	자살생각으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수
	분모	최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(10) 자살생각행동 원인

지표정의		자살생각을 했던 주된 이유
관련문항		1. 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-2. 죽고 싶다는 생각을 했던 주된 이유는 무엇입니까? ① 경제적 어려움 때문에 ② 이성 문제 때문에(실연, 파혼 등) ③ 질병 또는 장애 때문에 ④ 직장문제 때문에(실직, 미취업 등) ⑤ 외로움, 고독 때문에 ⑥ 가정불화로 인해 ⑦ 진로문제로 인해 ⑧ 기타()
산출식	분자	응답보기별 응답자 수
	분모	최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(11) 자살시도율

지표정의		최근 1년 동안 실제로 자살을 시도해 본 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있는 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(12) 자살시도로 인한 정신상담률

지표정의		자살시도로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	자살시도로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수
	분모	최근 1년 동안 자살시도를 해 본 적이 있는 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(13) 인지장애 경험률(50세 이상)

지표정의		최근 1년 동안 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있는 50세 이상 사람의 분율
관련문항		1. (만 40세 이상 응답해 주십시오) 최근 1년 동안 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있는 사람의 수
	분모	50세 이상 조사대상 응답자의 수
단위		%
조사주기		1년

8. 구강건강

(1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

지표정의		주관적으로 구강건강이 나쁘다고 인식하는 사람의 분율
관련문항		1. 스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각하십니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨
산출식	분자	“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 저작불편호소율(65세 이상)

지표정의		현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 불편하다고 인식하는 65세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느끼니까? (※ 틀니를 사용하는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.) ① 매우 불편하다 ② 불편하다 ③ 그저 그렇다 ④ 별로 불편하지 않다 ⑤ 전혀 불편하지 않다
산출식	분자	“매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 수
	분모	65세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율

지표정의		점심식사 후 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. 어제 하루 동안 다음의 시기에 칫솔질을 하였습니다니까? 1-1. 점심식사 후에 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 점심식사 하지 않음
산출식	분자	점심식사 후 칫솔질 한 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(4) 어제 저녁식사 후 또는 잠자기 전 칫솔질 실천율

지표정의		저녁식사 후 또는 잠자기 전 칫솔질 한 사람의 분율
관련문항		1. <u>어제 하루 동안</u> 다음의 시기에 칫솔질을 하였습니다か? 1-1. 저녁식사 후 또는 잠자기 전에 ① 예 ② 아니오 ③ 어제 저녁식사 또는 잠자지 않음
산출식	분자	저녁식사 후 또는 잠자기 전 칫솔질 한 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 연간 미충족의료율(치과)

지표정의		최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ③ 치과진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다
산출식	분자	최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(6) 미충족의료 이유(치과)

지표정의		치과진료를 받지 못한 주된 이유
관련문항		1. 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나, 받지 못한 주된 이유는 무엇입니까? ① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장을 바울 수가 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등) ② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서) ③ 경제적인 이유(진료비가 부담이 되어서) ④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서 ⑤ 병원에서 오래 기다리기 싫어서 ⑥ 병원 등 예약을 하기가 힘들어서 ⑦ 진료(검사 또는 치료) 받기가 무거워서 ⑧ 코로나19 유행상화 때문에 ⑨ 기타()
산출식	분자	응답보기별 응답자 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

9. 활동제한 및 삶의 질

(1) 주관적 건강인지율

지표정의		평소에 본인의 건강이 “매우 좋음” 또는 “좋음”이라고 응답한 사람의 비율
관련문항		1. 평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까? ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨
산출식	분자	주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”에 응답한 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 행복감지수

지표정의		현재 수준에서의 삶에 대한 전반적인 만족도									
관련문항		1. 모든 사항을 고려할 때, 최근 귀하의 삶에 (대체로) 어느 정도 만족합니까?									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		매우 불만족 매우 만족									
산출식	분자	행복지수의 총합									
	분모	조사대상 응답자 수									
단위		점									
조사주기		1년									

(3) 삶의 질 지수(EQ-5D Index)

지표정의		건강관련 삶의 질의 5가지 차원(운동능력, 자기관리, 일상 활동, 통증/불편, 불안/우울)의 기술체계를 종합한 지표
관련문항		1-1. 운동능력 ① 나는 걷는데 지장이 없다 ② 나는 걷는데 다소 지장이 있다 ③ 나는 종일 누워 있어야 한다 1-2. 자기관리 ① 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다 ② 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다 ③ 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다 1-3. 일상활동(예 : 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가활동) ① 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다 ② 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다 ③ 나는 일상 활동을 할 수가 없다 1-4. 통증/불편 ① 나는 통증이나 불편감이 없다 ② 나는 다소 통증이나 불편감이 있다 ③ 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다 1-5. 불안/우울 ① 나는 불안하거나 우울하지 않다 ② 나는 다소 불안하거나 우울하다 ③ 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다
	산출식	
	분자	-
	분모	-
	단위	점
조사주기		1년

10. 안전의식

(1) 운전자석 안전벨트 착용률

지표정의		자동차 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항		1. 자동차 운전할 때 안전벨트를 맵니까? ① 운전을 하지 않는다 ② 전혀 매지 않는다 ③ 거의 매지 않는 편이다 ④ 가끔 매는 편이다 ⑤ 대체로 매는 편이다 ⑥ 항상 맨다
산출식	분자	자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수
	분모	자동차 운전자 수(응답보기 ②,③,④,⑤,⑥)
단위		%
조사주기		1년

(2) 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률

지표정의		자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항		1. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 뒷좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까? ① 다른 사람이 운전하는 자동차의 뒷좌석에 앉은 적이 없다 ② 전혀 매지 않는다 ③ 거의 매지 않는 편이다 ④ 가끔 매는 편이다 ⑤ 대체로 매는 편이다 ⑥ 항상 맨다
산출식	분자	다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수
	분모	동승차량 뒷좌석 탑승자 수(응답보기 ②,③,④,⑤,⑥)
단위		%
조사주기		1년

(3) 오토바이 헬멧 착용률

지표정의		오토바이 운전 시 헬멧을 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항		1. 오토바이를 운전할 때 헬멧을 착용합니까? ① 운전을 하지 않는다 ② 전혀 착용하지 않는다 ③ 거의 착용하지 않는 편이다 ④ 가끔 착용하는 편이다 ⑤ 대체로 착용하는 편이다 ⑥ 항상 착용한다
산출식	분자	오토바이를 탈 때 헬멧을 “항상 착용한다”에 응답한 사람의 수
	분모	오토바이 운전자 수(응답보기 ②,③,④,⑤,⑥)
단위		%
조사주기		1년

(4) 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률

지표정의		최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 수
	분모	자동차 또는 오토바이 운전자 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 개인형이동장치 헬멧 착용률

지표정의		개인형이동장치를 탈 때 헬멧을 항상 착용하는 사람의 분율
관련문항		1. 개인형이동장치를 운전할 때 헬멧을 착용합니까? ① 운전을 하지 않는다 ② 전혀 착용하지 않는다 ③ 거의 착용하지 않는 편이다 ④ 가끔 착용하는 편이다 ⑤ 대체로 착용하는 편이다 ⑥ 항상 착용한다
산출식	분자	개인형이동장치를 탈 때 헬멧을 “항상 착용한다”에 응답한 사람의 수
	분모	개인형이동장치 운전자 수(응답보기 ②,③,④,⑤,⑥)
단위		%
조사주기		1년

11. 이환

(1) 혈압수치 인지율

지표정의		본인의 혈압수치를 알고 있는 사람의 분율
관련문항		1. 본인의 혈압수치를 알고 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	본인의 혈압수치를 알고 있는 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 고혈압 진단 경험률(30세 이상)

지표정의		의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수
	분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(3) 고혈압 최초 진단 시기

지표정의		고혈압을 최초 진단받은 평균 만 나이
관련문항		1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-1. 의사로부터 고혈압을 처음 진단받은 때는 언제입니까? 만 □□□세
산출식	분자	고혈압을 최초 진단받은 만 나이의 총합
	분모	의사진단을 받은 사람의 수
단위		세
조사주기		1년

(4) 고혈압 현재치료율(30세 이상)

지표정의		고혈압을 현재 치료받고 있는 30세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-1. 혈압을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까? 1-1-1. 비약물요법(운동, 식이요법) ① 예 ② 아니오 1-1-2. 혈압약 복용 ① 예 → 한 달에 □□일 ② 아니오
산출식	분자	현재 고혈압을 치료받고 있는 사람(비약물요법 및 혈압약 복용에서 “예”)의 수
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(5) 고혈압 진단 경험자의 치료율(30세 이상)

지표정의		의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람 중 현재 혈압조절약을 “한 달에 20일 이상 복용”한 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-1. 혈압을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까? 모두 응답해 주십시오. 1-1-1. 비약물요법(운동, 식이요법) ① 예 ② 아니오 1-1-2. 혈압약 복용 ① 예 → 한 달에 □□일 ② 아니오
산출식	분자	현재 혈압조절약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(6) 고혈압 관리교육 이수율(30세 이상)

지표정의		의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람 중 고혈압 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-1. 고혈압을 관리하는 방법에 대해 교육을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	고혈압 관리교육을 받은 사람의 수
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(7) 혈당수치 인지율

지표정의		본인의 혈당수치를 알고 있는 사람의 분율
관련문항		1. 본인의 혈당수치를 알고 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	본인의 혈당수치를 알고 있는 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(8) 당뇨병 진단 경험률(30세 이상)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수
	분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(9) 당뇨병 최초 진단 시기

지표정의		당뇨병을 최초 진단받은 평균 만 나이
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-1. 의사로부터 당뇨병을 처음 진단받은 때는 언제입니까? 만 □□□세
산출식	분자	당뇨병을 최초 진단받은 만 나이의 총합
	분모	의사진단을 받은 사람의 수
단위		세
조사주기		1년

(10) 당뇨병 현재치료율(30세 이상)

지표정의		당뇨병을 현재 치료받고 있는 30세 이상 사람의 분율
관련문항	1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	
	1-1. 혈당을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까? 모든 응답해 주십시오.	
	1-1-1. 비약물요법(운동, 식이요법)	① 예 ② 아니오
	1-1-2. 당뇨병 약(경구 혈당강하제 또는 주사제)	① 예 ② 아니오
	1-1-3. 인슐린 주사(인슐린 펌프 포함)	① 예 ② 아니오
산출식	분자	현재 당뇨병을 치료받고 있는 사람(비약물요법 및 당뇨병 약, 인슐린 주사에서 “예”라고 응답한 사람)의 수
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(11) 당뇨병 진단 경험자의 치료율(30세 이상)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 혈당을 관리하기 위해 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 치료 받고 있는 사람의 분율
관련문항	1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	
	1-1. 혈당을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까? 모든 응답해 주십시오.	
	1-1-1. 비약물요법(운동, 식이요법)	① 예 ② 아니오
	1-1-2. 당뇨병 약(경구 혈당강하제 또는 주사제)	① 예 ② 아니오
	1-1-3. 인슐린 주사(인슐린 펌프 포함)	① 예 ② 아니오
산출식	분자	현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(12) 당뇨병 관리교육 이수율(30세 이상)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 당뇨병 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율
관련문항	1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	
	2. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해 교육을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	
산출식	분자	당뇨병 관리교육을 받은 사람의 수
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(13) 당화혈색소 인지율(30세 이상)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 당화혈색소에 대해 알고 있는 사람의 분율
관련문항	1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	
	1-1. 최근 1년 동안 당화혈색소 검사를 몇 번이나 했습니까? ① 당화혈색소가 무엇인지 모름 ② 4회 이상 ③ 3회 ④ 2회 ⑤ 1회 ⑥ 측정 안함	
산출식	분자	당화혈색소를 알고 있는 사람의 수
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(14) 연간 당화혈색소 검사 횟수(30세 이상)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 당화혈색소 인지자의 최근 1년 동안 당화혈색소 검사 횟수별 분포
관련문항	1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오	
	1-1. 최근 1년 동안 당화혈색소 검사를 몇 번이나 했습니까? ① 당화혈색소가 무엇인지 모름 ② 4회 이상 ③ 3회 ④ 2회 ⑤ 1회 ⑥ 측정 안함	
산출식	분자	응답보기별 응답자 수
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람 중 당화혈색소에 대해 알고 있는 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(15) 연간 당뇨병성 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율(30세 이상)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년 동안 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. <u>최근 1년</u> 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(16) 연간 당뇨병성 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율(30세 이상)

지표정의		의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년 동안 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. <u>최근 1년</u> 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수
	분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(17) 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율

지표정의		뇌졸중(중풍) 조기증상에 대해 모두 맞춘 사람의 분율
관련문항		1. 다음의 질문들은 뇌졸중(중풍) 조기증상을 정확히 알고 있는지 귀하의 지식을 묻는 문항으로, 뇌졸중(중풍) 증상이 맞다고 생각하면 “예”, 아니라고 생각하면 “아니오”를 응답해 주십시오. 1-1. 갑자기 한쪽 얼굴, 팔, 다리에 힘이 빠진다 ① 예 ② 아니오 1-2. 갑자기 말이 어눌해지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못한다 ① 예 ② 아니오 1-3. 갑자기 한쪽 눈이나 시야의 반이 보이지 않거나, 물체가 두 개로 보인다 ① 예 ② 아니오 1-4. 갑자기 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘들다 ① 예 ② 아니오 1-5. 갑자기 이제까지 경험하지 못한 심한 두통이 생긴다 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	증상을 모두 맞춘 응답자 수(정답: 모두 ‘예’)
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(18) 심근경색증 조기증상 인지율

지표정의		심근경색증 조기증상에 대해 모두 맞춘 사람의 분율
관련문항		1. 다음의 질문들은 심근경색증(심장발작) 조기증상을 정확히 알고 있는지 귀하의 지식을 묻는 문항으로, 심근경색증(심장발작) 증상이 맞다고 생각하면 “예”, 아니라고 생각하면 “아니오”를 응답해 주십시오. 1-1. 갑자기 턱, 목 또는 등쪽에 통증이나 답답함이 있다 ① 예 ② 아니오 1-2. 갑자기 힘이 없으며, 어지럽고, 울렁거리거나 식은땀이 난다 ① 예 ② 아니오 1-3. 갑자기 가슴에 통증이나 압박감 또는 짓누르는 느낌이 있다 ① 예 ② 아니오 1-4. 갑자기 팔 또는 어깨에 통증이나 불편감이 있다 ① 예 ② 아니오 1-5. 갑자기 숨이 찬다 ① 예 ② 아니오
산출식	분자	증상을 모두 맞춘 응답자 수(정답: 모두 ‘예’)
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

12. 의료이용

(1) 연간 미충족의료율(병의원)

지표정의		최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 본인이 병의원(치과 미포함) 진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ③ 병의원 진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다
산출식	분자	본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 미충족의료 이유(병의원)

지표정의		최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 이유
관련문항		1. <u>최근 1년 동안</u> 본인이 병의원(치과 미포함) 진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 ③ 병의원 진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다 1-1. 진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 주된 이유는 무엇입니까? ① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장을 바울 수가 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등) ② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서) ③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서) ④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서 ⑤ 병원에서 오래 기다리기 싫어서 ⑥ 병원 등 예약을 하기 힘들어서 ⑦ 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서 ⑧ 기타()
산출식	분자	응답보기별 응답자 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		보기별 %
조사주기		1년

13. 예방접종 및 검진

(1) 연간 인플루엔자 예방접종률

지표정의		최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

14. 보건기관 이용

(1) 연간 보건기관 이용률

지표정의		최근 1년 동안 보건기관을 이용한 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 건강생활지원센터, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

15. 사고 및 중독

(1) 연간 사고 및 중독 경험률

지표정의		최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 적이 있는 사람의 분율
관련문항		1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? (※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외) ① 예 → □회 ② 아니오
산출식	분자	연간 사고 및 중독 경험자 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 연간 사고 및 중독 건수율

지표정의		최근 1년 동안 사고 및 중독으로 병의원이나 응급실에서 치료를 받아야 했던 평균 사고중독 횟수
관련문항		1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? (※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외) ① 예 → □회 ② 아니오
산출식	분자	연간 사고 및 중독 건수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		건/인구 1,000명
조사주기		1년

(3) 사고 및 중독 원인

지표정의		최근 1년 동안 경험한 사고 및 중독의 원인별 분포
관련문항	1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? (※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외) ① 예 → □회 ② 아니오	
	1-1. 이 사고 또는 중독은 어떻게 발생했습니까? ① 운수사고 ② 추락 ③ 낙상(미끄러짐, 헛디딤, 주저앉음 포함) ④ 부딪힘(충돌 포함) ⑤ 자상 및 관통상(찔림 포함) ⑥ 화상(전기, 열, 불로 인한) ⑦ 익수 ⑧ 질식 ⑨ 중독 ⑩ 감전 ⑪ 개에게 물림 ⑫ 고양이에게 물림 ⑬ 뱀에게 물림 ⑭ 벌에 쏘임 ⑮ 기타()	
산출식	분자	원인별 사고 및 중독 건수
	분모	사고 및 중독 건수
단위		보기별 %
조사주기		1년

(4) 주 치료처별 사고 및 중독 분포

지표정의		최근 1년 동안 경험한 사고 및 중독의 주 치료처별 건수 분포
관련문항	1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? (※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외) ① 예 → □회 ② 아니오	
	1-1. 이 사고 또는 중독으로 입은 손상을 어디에서 치료를 받았습니까? ① 응급실 ② 병의원 외래 이용 ③ 병의원 병실입원 ④ 기타()	
산출식	분자	주 치료처별 건수
	분모	사고 및 중독 건수
단위		보기별 %
조사주기		1년

16. 사회 물리적 환경

(1) 광역시도 거주기간

지표정의		광역시도 거주기간의 분포
관련문항		1. 현재 살고 있는 광역시도에서 얼마나 오래 살았습니까? ① 5년 미만 ② 5-10년 미만 ③ 10-15년 미만 ④ 15-20년 미만 ⑤ 20년 이상
산출식	분자	응답보기별 응답자 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 시군구 거주기간

지표정의		시군구 거주기간의 분포
관련문항		1. 현재 살고 있는 시군구에서 얼마나 오래 살았습니까? ① 5년 미만 ② 5-10년 미만 ③ 10-15년 미만 ④ 15-20년 미만 ⑤ 20년 이상
산출식	분자	응답보기별 응답자 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

17. 심폐소생술

(1) 심폐소생술 인지율

지표정의	심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 분율
관련문항	1. 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수
	분모 조사대상 응답자 수
단위	%
조사주기	2년

(2) 심폐소생술 교육 경험률

지표정의	최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 사람의 분율
관련문항	1. 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 심폐소생술 교육을 받은 경험이 있습니까? ① 최근 2년간 교육을 받은 적이 있다 ② 과거에는 있었지만, 최근 2년간 없다 ③ 교육을 받은 적이 없다
산출식	분자 최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 적이 있는 사람의 수
	분모 조사대상 응답자 수
단위	%
조사주기	2년

(3) 심폐소생술 실습 경험률(마네킹)

지표정의	최근 2년 동안 마네킹을 이용한 심폐소생술 실습을 한 사람의 분율
관련문항	1. 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오 1-1. 심폐소생술 교육을 받은 경험이 있습니까? ① 최근 2년간 교육을 받은 적이 있다 ② 과거에는 있었지만, 최근 2년간 없다 ③ 교육을 받은 적이 없다 1-1-1. 최근 2년 동안 심폐소생술 실습 시 경험한 교육을 모두 응답해 주십시오. 1-1-1-1. 마네킹 ① 예 ② 아니오
산출식	분자 최근 2년 동안 마네킹을 이용한 심폐소생술 실습을 한 사람의 수
	분모 조사대상 응답자 수
단위	%
조사주기	2년

(4) 심폐소생술 실습 경험률(자동제세동기)

지표정의		최근 2년 동안 자동제세동기(AED)를 이용한 심폐소생술 실습을 한 사람의 분율
관련문항		1. 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		1-1. 심폐소생술 교육을 받은 경험이 있습니까? ① 최근 2년간 교육을 받은 적이 있다 ② 과거에는 있었지만, 최근 2년간 없다 ③ 교육을 받은 적이 없다
		1-1-1. 최근 2년 동안 심폐소생술 실습 시 경험한 교육을 모두 응답해 주십시오. 1-1-1-1. 자동제세동기(AED) ① 예 ② 아니오
산출식	분자	최근 2년 동안 자동제세동기(AED)를 이용한 심폐소생술 실습을 한 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		2년

(5) 심폐소생술 시행능력률

지표정의		심폐소생술을 “정확하게” 또는 “대략” 시행할 수 있는 사람의 분율
관련문항		1. 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오
		2. 심장마비(심정지) 환자를 목격한 경우 심폐소생술을 시행할 수 있습니까? ① 정확하게 시행할 수 있다 ② 대략 시행할 수 있다 ③ 시행할 수 없다
산출식	분자	심폐소생술을 “정확하게” 또는 “대략” 시행할 수 있는 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		2년

18. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)

(1) 코로나19로 인한 심리적 영향

지표정의		1-1. 코로나19 유행으로 인해 감염에 대한 염려를 하는 사람의 분율 1-2. 코로나19 유행으로 인해 감염으로 인한 피해를 염려하는 사람의 분율 1-3. 코로나19 유행으로 인해 감염으로 인한 경제적 피해를 염려하는 사람의 분율
관련문항		1. 코로나19 유행으로 다음 사항에 대하여 얼마나 염려가 되십니까? 1-1. 나는 코로나19에 (다시) 감염될까 봐 염려된다. ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다 1-2. 나는 코로나19에 감염되면 그 이유로 주변으로 부터 비난이나 피해를 받을 것 같아서 염려된다. ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다 1-3. 코로나19 유행으로 나와 우리 가족에게 경제적 피해가 올까 봐(일자리를 잃거나 구하기 어려움 등 포함) 염려된다. ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다
산출식	분자	1-1. 감염이 염려된다(“매우 그렇다” 또는 “그렇다”)고 응답한 사람의 수 1-2. 감염으로 인한 피해가 염려된다(“매우 그렇다” 또는 “그렇다”)고 응답한 사람의 수 1-3. 감염으로 인한 경제적 피해가 염려된다(“매우 그렇다” 또는 “그렇다”)고 응답한 사람의 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

(2) 코로나19 예방접종 경험률

지표정의		코로나19 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 분포
관련문항		1. 코로나19 예방접종을 받은 적이 있습니까? ① 예, 1차 접종까지 받았습니다 ② 예, 2차 접종까지 받았습니다(얀센 포함) ③ 예, 3차 접종(부스터샷)까지 받았습니다 ④ 예, 4차 이상 접종 받았습니다 ⑤ 아니요, 접종을 받지 않았습니다
산출식	분자	응답보기별 응답자 수
	분모	조사대상 응답자 수
단위		%
조사주기		1년

요약

조사체계

주요통계결과

(6) 코로나19 후유증 경험률

지표정의		코로나19 확진으로 인해 새롭게 생긴 증상이 4주 이상 지속된 사람의 분율(2회 이상 코로나19로 확진된 경우 마지막으로 확진된 시기를 기준)
관련문항		1. 코로나19 확진으로 인해 새롭게 생긴 증상이 4주 이상 지속되었습니까? ① 예 ② 아니오, 확진 후 4주 이상 지속된 증상이 없었다 ③ 아니오, 확진 후 4주 이상이 지나지 않았다
산출식	분자	코로나19 확진으로 인해 새롭게 생긴 증상이 4주 이상 지속된 사람의 수
	분모	코로나19로 확진된 적이 있는 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(7) 코로나19 후유증 증상별 경험률

지표정의		1-1. 코로나19 확진 후 4주 이상 지속된 후유증 경험자 중 각 증상 경험이 있는 사람의 분율 (2회 이상 코로나19로 확진된 경우 마지막으로 확진된 시기를 기준) 1-2. 코로나19 확진 후 현재까지 지속된 후유증 경험자 중 각 증상 경험이 있는 사람의 분율 (2회 이상 코로나19로 확진된 경우 마지막으로 확진된 시기를 기준)																																																																																										
관련문항		1. 4주 이상 지속되었거나 현재까지도 남아있는 증상은 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오. <table><tr><td>증상</td><td>확진 후 4주 이상</td><td>현재</td><td>증상</td><td>확진 후 4주 이상</td><td>현재</td></tr><tr><td colspan="3">호흡기계·심혈관계</td><td colspan="3">전신증상·정신증상</td></tr><tr><td>☐ 호흡곤란</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐ 발한, 발열</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐ 가슴통증</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐ 피로감</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐ 가슴 두근거림</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐ 근육통</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td colspan="3">안·이비인후·중추신경계</td><td>☐ 불안 또는 우울</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐ 인후통</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐ 인지기능(기억력·집중력)저하</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐ 기침, 가래</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐ 수면장애</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐ 두통</td><td>☐</td><td>☐</td><td colspan="3">기타</td></tr><tr><td>☐ 후각상실</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐ 관절통</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐ 미각상실</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐ 탈모</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐ 눈 충혈</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐ 월경(생리)불순</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐ 구강, 안구 건조증</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐ 기타()</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td colspan="3">소화기계</td><td colspan="3" rowspan="3">-</td></tr><tr><td>☐ 구토, 설사</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐ 기타 소화장애</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>	증상	확진 후 4주 이상	현재	증상	확진 후 4주 이상	현재	호흡기계·심혈관계			전신증상·정신증상			☐ 호흡곤란	☐	☐	☐ 발한, 발열	☐	☐	☐ 가슴통증	☐	☐	☐ 피로감	☐	☐	☐ 가슴 두근거림	☐	☐	☐ 근육통	☐	☐	안·이비인후·중추신경계			☐ 불안 또는 우울	☐	☐	☐ 인후통	☐	☐	☐ 인지기능(기억력·집중력)저하	☐	☐	☐ 기침, 가래	☐	☐	☐ 수면장애	☐	☐	☐ 두통	☐	☐	기타			☐ 후각상실	☐	☐	☐ 관절통	☐	☐	☐ 미각상실	☐	☐	☐ 탈모	☐	☐	☐ 눈 충혈	☐	☐	☐ 월경(생리)불순	☐	☐	☐ 구강, 안구 건조증	☐	☐	☐ 기타()	☐	☐	소화기계			-			☐ 구토, 설사	☐	☐	☐ 기타 소화장애	☐	☐
증상	확진 후 4주 이상	현재	증상	확진 후 4주 이상	현재																																																																																							
호흡기계·심혈관계			전신증상·정신증상																																																																																									
☐ 호흡곤란	☐	☐	☐ 발한, 발열	☐	☐																																																																																							
☐ 가슴통증	☐	☐	☐ 피로감	☐	☐																																																																																							
☐ 가슴 두근거림	☐	☐	☐ 근육통	☐	☐																																																																																							
안·이비인후·중추신경계			☐ 불안 또는 우울	☐	☐																																																																																							
☐ 인후통	☐	☐	☐ 인지기능(기억력·집중력)저하	☐	☐																																																																																							
☐ 기침, 가래	☐	☐	☐ 수면장애	☐	☐																																																																																							
☐ 두통	☐	☐	기타																																																																																									
☐ 후각상실	☐	☐	☐ 관절통	☐	☐																																																																																							
☐ 미각상실	☐	☐	☐ 탈모	☐	☐																																																																																							
☐ 눈 충혈	☐	☐	☐ 월경(생리)불순	☐	☐																																																																																							
☐ 구강, 안구 건조증	☐	☐	☐ 기타()	☐	☐																																																																																							
소화기계			-																																																																																									
☐ 구토, 설사	☐	☐																																																																																										
☐ 기타 소화장애	☐	☐																																																																																										
산출식	분자	응답보기별 응답자 수																																																																																										
	분모	코로나19 확진으로 인해 새롭게 생긴 증상이 4주 이상 지속된 사람의 수																																																																																										
단위		%																																																																																										
조사주기		1년																																																																																										

(8) 코로나19 후유증 증상 치료 장소

지표정의		코로나19 확진자의 후유증 증상 치료 장소 분포(2회 이상 코로나19로 확진된 경우 마지막으로 확진된 시기를 기준)
관련문항		1. 위 증상으로 치료를 받았다면 다음 중 어디에 해당되십니까? ① 의료기관 입원치료 ② 의료기관 외래치료 ③ 의료기관 처방없이 약국만 이용 ④ 치료받은 적 없음 ⑤ 기타()
산출식	분자	응답보기별 응답자 수
	분모	코로나19 확진으로 인해 새롭게 생긴 증상이 4주 이상 지속된 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(9) 코로나19 후유증 증상으로 인한 일상생활 지장 경험률

지표정의		코로나19 후유증 증상으로 인한 일상생활 지장 경험 분포
관련문항		1. 위 증상으로 일상생활을 하는데 지장을 받은 적이 있습니까? ① 예, 많이 받았습니다 ② 예, 조금 받았습니다 ③ 아니오, 전혀 받지 않았습니다
산출식	분자	응답보기별 응답자 수
	분모	코로나19 확진으로 인해 새롭게 생긴 증상이 4주 이상 지속된 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(10) 코로나19 확진자의 기저질환 보유율

지표정의		코로나19 확진 시 기저질환이 있던 사람의 분율
관련문항		1. 코로나19 확진 시 이미 가지고 있던(의사로부터 진단받은) 질환이 있습니까? ① 예 ② 아니오
산출식	분자	코로나19 확진 시 기저질환이 있던 사람의 수
	분모	코로나19로 확진된 적이 있는 사람의 수
단위		%
조사주기		1년

(11) 코로나19 확진자의 기저질환 종류

지표정의		코로나19 확진자의 기저질환 종류의 분포			
관련문항		1. 코로나19 확진 시 이미 가지고 있던(의사로부터 진단받은) 질환은 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.			
		☐ 알레르기 비염	☐ 만성콩팥병	☐ 암	☐ 비만
		☐ 고지혈증	☐ 빈혈	☐ 뇌혈관질환	☐ 고혈압
		☐ 당뇨병	☐ 심장질환	☐ 만성폐쇄성폐질환	☐ 기타 폐질환
		☐ 기타()			
산출식	분자	응답보기별 응답자 수			
	분모	코로나19 확진 시 기저질환이 있던 사람의 수			
단위		%			
조사주기		1년			

참고문헌

1. 질병관리본부. 삶의 질 조사도구(EQ-5D)의 질 가중치 추정 연구 보고서. 2007.
2. 질병관리청. 2021 지역건강통계 한눈에 보기. 2022.

참여연구진

지역 책임 교수	이 중 정	계 명 대 학 교
지역 부 책임 교수	옥 민 수	울산대학교병원
	우 형 택	계 명 대 학 교
지역 담당 연구원	김 영 미	계 명 대 학 교
	정 여 진	계 명 대 학 교
	최 연 수	계 명 대 학 교
	최 정 예	계 명 대 학 교
조사 관리 담당관	김 인 혜	울주군보건소
지역 조사원	이 숙 경	울주군보건소
	박 미 경	울주군보건소
	이 채 빈	울주군보건소
	조 숙 희	울주군보건소



2022년 울산광역시 울주군 지역사회 건강통계

발 행 : 2023. 3.

발 행 인 : 이 순 걸 (울산광역시 울주군수)

편 집 인 : 이 중 정 (계명대학교)

발 행 처 : 기 관 명 울산광역시 울주군 보건소

누 리 집 <https://www.ulju.ulsan.kr/health>

주 소 (44950) 울산광역시 울주군 삼남읍 서향교1길 67-12

전화번호 (052) 204-2713

팩 스 (052) 204-2719

이 책은 울산광역시 울주군보건소에 소유권이 있습니다. 울산광역시 울주군 승인 없이 상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.