

ISSN 2092-2876

발 간 등 록 번 호

11-1790387-100126-10



승인번호
제 117075 호



COMMUNITY HEALTH SURVEY

2024 지역사회 건강통계

울산광역시 | 울주군



2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024

발간사 _ 보건소장



안녕하십니까. 울주군 보건소장 유점숙입니다.

우리 사회의 건강을 지키고 증진하기 위한 노력은 날로 중요해지고 있습니다. 이제 보건의료 분야는 단순히 질병 치료를 넘어서 예방, 건강 관리, 그리고 삶의 질 향상에 이르기까지 광범위한 영역을 아우르고 있습니다. 지역 주민들이 건강하고 행복한 삶을 영위하기 위해서는 건강의 상태와 관련된 다양한 정보를 체계적으로 수집하고 분석하는 것이 필수적입니다.

우리 지역의 건강통계라 할 수 있는 본 통계집은 인구학적 특성 및 건강행태, 신체활동, 예방접종과 건강검진, 각종 질병이환 및 의료이용 그리고 사고와 중독 등 다양한 보건통계자료가 수록되어 있습니다. 현재의 보건 수준뿐만 아니라 최근 몇 년 간의 변화 양상을 한눈에 파악하고 주민의 건강 수준에 대한 신뢰성 있는 근거자료를 제시하여 근거지 중심의 보건사업 수행의 기반을 마련할 수 있습니다. 울주군 「2024 지역사회 건강통계」는 우리 군민의 각종 건강 문제에 대한 대응 방안을 모색하기 위한 중요한 자료로 활용될 것입니다.

울주군 보건소는 군민의 건강을 최우선 가치에 두고 삶의 질을 높이기 위해 최선을 다해 왔습니다. 앞으로도 군민의 건강행태와 건강수준을 더욱 명확히 파악하여 실질적인 보건사업을 계획하고 체계적인 보건정책을 시행해 나갈 수 있도록 노력하겠습니다.

끝으로 본 조사를 위해 귀한 시간을 할애하여 적극적으로 참여해 주신 군민 여러분과 힘든 여건 속에서 최선을 다해 조사를 수행하신 조사원 그리고 이 조사의 성공적인 수행을 위해 노력해 주신 계명대학교 관계자 여러분께 진심을 담아 감사의 마음을 전합니다.

감사합니다.

2025. 2.

울산광역시 울주군보건소장 유 점 숙

발간에 즈음하여 _ 책임대학 교수

우리 지역사회의 건강과 복지를 위한 소중한 지표가 되어온 지역사회건강조사가 올해로 17번째 통계집을 발간하게 되었습니다. 지난 17년간 이 조사는 지역 주민들의 건강 수준과 생활 변화를 면밀히 분석하고, 지역사회 의료 현황을 파악하는 중요한 역할을 수행해왔습니다. 특히 조사 결과는 실효성 있는 보건정책을 수립하고 건강증진사업을 추진하는 데 필수적인 기초자료로 활용되면서 그 가치와 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

코로나19 팬데믹을 지나오면서 건강이 개인의 삶뿐만 아니라 지역사회와 국가 전체의 지속 가능성을 좌우하는 중요한 요소임을 다시 한번 실감했습니다. 사회 전반에 걸쳐 건강과 의료에 대한 관심이 높아진 지금, 지역사회건강조사는 단순한 통계를 넘어 지역 주민의 삶을 향상시키고, 건강 불평등을 해소하며, 지역 맞춤형 보건의료 정책을 설계하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

이러한 의미 있는 통계 자료가 발간되기까지 많은 분들의 노고가 있었습니다. 조사에 성실히 응답해 주신 지역 주민 여러분, 현장에서 꼼꼼하게 조사를 수행해 주신 조사원 여러분, 신뢰도 높은 자료를 수집하고 분석하기 위해 노력해 주신 연구진, 그리고 조사가 원활히 진행될 수 있도록 적극적으로 지원해 주신 보건소 관계자 여러분께 깊이 감사드립니다.

앞으로도 지역사회건강조사가 보다 정교한 데이터와 분석을 통해 지역 주민의 건강 수준을 향상시키고, 건강하고 행복한 지역사회를 만드는 데 기여할 수 있기를 기대합니다.



2025. 2.

계명대학교 의과대학 책임교수 이 중 정

이용자를 위하여

- ❖ 본 통계집은 2024. 5. 16. - 2024. 7. 31. 울산광역시 울주군에서 실시된 지역사회건강조사 결과를 수록한 자료입니다.
- ❖ 본 통계집에 제시된 추정치는 가중치를 적용한 결과(조율)이며, 가중치는 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율, 개인응답률, 당해 연도 모집단 성·연령별 인구 구성비를 반영하여 산출하였습니다.
- ❖ 제2부 주요통계결과에서는 2020-2024년 비교 가능한 지표(조율)에 대해서 당해 연도의 전체·성·연령별 그래프와 함께 울주군 및 울산광역시의 연도별 추이 그래프를 제시하였으며(연도별 데이터가 없는 경우 구별 데이터만 제시), 증감 현황을 기술하였습니다.
- ❖ 제3부 통계표에서는 당해 연도에 선정된 주요지표의 상세분석결과를 제시하였으며, 주요지표를 포함한 모든 산출지표의 통계표는 엑셀파일 형태로 지역사회건강조사 누리집(<http://chs.kdca.go.kr>) 자료실에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
- ❖ 본 자료 중 2024년 이전 연도의 수치는 응답의 이상치와 논리적 오류를 수정하여 산출된 결과로 기 발간된 보고서의 수치와 일부 다를 수 있습니다.
- ❖ 분석대상자 수(N)가 20명 미만인 경우 제2부 주요통계결과에서 제시하지 않았으며 제3부 통계표에서 해당 값을 하이픈(-)으로 처리하였습니다. 상대표준오차(Relative Standard Error, RSE)가 30%이상인 경우 추정치의 신뢰도가 낮다는 것을 의미하므로 결과해석 시 주의 하시기 바랍니다.
- ❖ 통계표에 수록된 숫자는 소수점 두 번째 자리에서 반올림되었으며, 반올림된 수치의 총계가 일치하지 않을 수 있으나 이는 통계표의 오류가 아닙니다.
- ❖ 본 통계집 및 조사표, 지침서 등 기타 지역사회건강조사 관련 자료는 지역사회건강조사 누리집에서 다운로드 받으실 수 있으며, 2008년부터 2023까지의 지역사회건강조사 원시자료는 누리집을 통해 제공하고 있습니다.
- ❖ 수록된 자료 및 지역사회건강조사에 관한 문의는 울주군보건소(☎052-204-2715), 계명대학교(☎053-258-7467)로 해주시기 바랍니다.

용어정의

1 | 통계

① 모집단(Population)

조사대상이 되는 집단 전체

② 표본(Sample)

모집단 중 조사를 위해 추출된 일부 집단

③ 표본오차(Sampling Error)

모집단 중 일부를 표본으로 선정하여 조사함에 따라 발생하는 오차로서 표본조사의 정확성을 나타내는 척도

④ 비표본오차(Non-Sampling Error)

표본추출을 제외한 조사 설계, 조사 수행, 자료 집계 및 분석 과정에서 발생하는 오차로서 불명확한 조사개념, 조사문항의 객관성 결여, 조사지 구성의 논리적 오류, 면접방법, 조사원의 자질, 조사원을 감독하는 관리자의 태도, 조사대상자의 무응답, 자료 코딩 등이 비표본오차의 주요 발생 원인에 해당

⑤ 조율(Crude Rate)

총 발생건수를 전체 모집단으로 나눈 값으로, 해당 지역 모집단의 성·연령별 등의 인구 집단 특성을 반영한 통계치

⑥ 표준화율(Standardized Rate)

비교하고자 하는 집단 간 인구 구조 차이를 표준화 인구를 기준으로 보정한 통계치

⑦ 표준오차 (Standard Error, SE)

각 표본들의 평균이 모집단의 평균과 얼마만큼의 차이가 있는지 나타내는 값

⑧ 상대표준오차 (Relative Standard Error, RSE)

표준오차를 평균으로 나눈 값($\text{표준오차}/\text{추정치} \times 100$)으로 통계치의 신뢰도를 나타내는 척도이며, 상대표준오차와 통계치의 신뢰도는 반비례 관계

⑨ 가중치 (Weight)

전체집단에서 개별 구성요소가 차지하는 비중이나 중요도를 수치로 나타내는 값

2 | 조사

① CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

컴퓨터를 이용하여 조사 자료를 수집하는 방식으로, 조사원이 전자조사표가 설치된 기기(노트북, 태블릿 PC 등)로 면접조사를 수행 시, 조사현장에서 직접 자료입력, 수정, 저장 및 전송 가능

② 순환조사체계

2010년부터 지역사회건강조사에 도입된 조사체계로서, 산출지표의 활용도 및 사회적 관심 등을 고려하여 조사문항 및 산출지표의 주기를 1년, 2년, 4년으로 구분하고, 순환주기는 총 4년으로 구성

③ 지역보건지표뱅크

지역사회에서 보건사업 추진 시 활용 가능한 조사문항 및 산출지표를 수집·정리한 것으로 지표별 조사문항 및 응답보기, 지표정의, 산출식, 조사주기 등 상세정보 포함

목차

발간사 _ 보건소장	
발간에 즈음하여 _ 책임대학 교수	
이용자를 위하여	
용어정의	
요약	
2024년 울산광역시 울주군 주요 건강지표 요약	2
우리 지역사회의 주요 건강이슈	6

제1부 조사체계

I. 조사개요	13
1. 조사목적	14
2. 조사방법	14
3. 조사내용	14
4. 표본설계	16
5. 조사체계	17
6. 자료관리	19
7. 조사현황	20
II. 통계 추정방법	23
1. 가중치의 사용	24
2. 자료처리	25
3. 분산추정	26

제2부 주요통계결과

I. 건강행태	29
1. 흡연	30
2. 음주	38
3. 신체활동	42
4. 건강생활실천	46
5. 비만 및 체중조절	48
6. 식생활	50
7. 정신건강	52
8. 구강건강	54
9. 활동제한 및 삶의 질	56
10. 안전의식	58
II. 이환 및 의료이용	61
1. 주요 질환별 진단 경험률 및 관리행태	62
2. 의료이용	70
3. 예방접종 및 검진	72
4. 보건기관 이용	74
5. 심폐소생술	76
III. 사고 및 중독	79
1. 사고 및 중독	80

목차

제3부 통계표

I. 통계표	85
--------------	----

제4부 부록

I. 개인조사표	185
II. 가구조사표	215
III. 주요지표정의	219

참고문헌	222
참여연구진	223

표 목 차

[표목차]

〈표 1〉 2024년 지역사회건강조사 주요지표 결과	2
〈표 2〉 2024년 지역사회건강조사 주요지표 결과	4
〈표 3〉 2024년 전국 시군구별 표준화율과 울주군 표준화율의 비교	6
〈표 4〉 지역사회건강조사 순환조사체계	14
〈표 5〉 2024년 지역사회건강조사 조사항목	15
〈표 6〉 읍면별 표본지점 분포	16
〈표 7〉 조사현황	20
〈표 8〉 가구당 조사인원 수	20
〈표 9〉 2024년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성	21
〈표 10〉 2024년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성 ..	22
〈표 11〉 가구가중치 산출 예	24
〈표 12〉 개인가중치 산출 예	25
〈표 13〉 보정가중치 산출 예	25
〈표 14〉 교육수준분류	25
〈표 15〉 직업분류	26

그림 목 차

[그림목차]

〈그림 1〉 2024년 주요지표 결과 비교 - 긍정적 지표 ... 7	〈그림 32〉 아침 식사 실천율 51
〈그림 2〉 2024년 주요지표 결과 비교 - 부정적 지표 ... 8	〈그림 33〉 영양표시 활용률 51
〈그림 3〉 황금다이어몬드를 이용한 보건사업 우선순위 ... 9	〈그림 34〉 스트레스 인지율 53
〈그림 4〉 지역사회건강조사 표본선정과정 16	〈그림 35〉 우울감 경험률 53
〈그림 5〉 지역사회건강조사 수행체계 17	〈그림 36〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 55
〈그림 6〉 지역사회건강조사 수행과정 18	〈그림 37〉 저작불편호소율(≥65) 55
〈그림 7〉 전화점검 절차 19	〈그림 38〉 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 55
〈그림 8〉 가중치 산출 과정 24	〈그림 39〉 주관적 건강인지율 57
〈그림 9〉 평생흡연율 31	〈그림 40〉 운전자석 안전벨트 착용률 59
〈그림 10〉 현재흡연율 31	〈그림 41〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 59
〈그림 11〉 남자 현재흡연율 31	〈그림 42〉 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률 59
〈그림 12〉 궤련형 전자담배 평생흡연율 33	〈그림 43〉 혈압수치 인지율 63
〈그림 13〉 궤련형 전자담배 현재흡연율 33	〈그림 44〉 고혈압 진단 경험률(≥30) 63
〈그림 14〉 액상형 전자담배 평생사용률 35	〈그림 45〉 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30) 63
〈그림 15〉 액상형 전자담배 현재사용률 35	〈그림 46〉 혈당수치 인지율 65
〈그림 16〉 담배제품 현재사용률 35	〈그림 47〉 당뇨병 진단 경험률(≥30) 65
〈그림 17〉 현재흡연자의 금연시도율 37	〈그림 48〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30) 65
〈그림 18〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 ... 37	〈그림 49〉 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사 (안저검사) 수진율(≥30) 67
〈그림 19〉 월간음주율 39	〈그림 50〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사 (미세단백뇨검사) 수진율(≥30) 67
〈그림 20〉 고위험음주율 39	〈그림 51〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 69
〈그림 21〉 연간음주자의 고위험음주율 39	〈그림 52〉 심근경색증 조기증상 인지율 69
〈그림 22〉 월간폭음률 41	〈그림 53〉 연간 미충족의료율(병의원) 71
〈그림 23〉 고강도 신체활동 실천율 43	〈그림 54〉 연간 인플루엔자 예방접종률 73
〈그림 24〉 중강도 신체활동 실천율 43	〈그림 55〉 연간 보건기관 이용률 75
〈그림 25〉 중강도 이상 신체활동 실천율 43	〈그림 56〉 심폐소생술 인지율 77
〈그림 26〉 걷기 실천율 45	〈그림 57〉 연간 사고 및 중독 경험률 81
〈그림 27〉 건강생활실천율 47	〈그림 58〉 연간 사고 및 중독 건수율 81
〈그림 28〉 비만율(자기보고) 49	
〈그림 29〉 주관적 비만인지율 49	
〈그림 30〉 연간 체중조절 시도율 49	
〈그림 31〉 아침식사 빈도 51	

통계표목차

[통계표목차]

〈표 1〉 평생흡연율	86	〈표 30〉 비만도 분포 및 비만율(자가보고)	115
〈표 2〉 현재흡연율	87	〈표 31〉 남자 비만도 분포 및 비만율(자가보고)	116
〈표 3〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량	88	〈표 32〉 여자 비만도 분포 및 비만율(자가보고)	117
〈표 4〉 과거 흡연자의 금연기간	89	〈표 33〉 주관적 비만인지를	118
〈표 5〉 궤련형 전자담배 평생흡연율	90	〈표 34〉 연간 체중조절 시도를	119
〈표 6〉 궤련형 전자담배 현재흡연율	91	〈표 35〉 체중조절 시도 방법	120
〈표 7〉 액상형 전자담배 평생사용률	92	〈표 36〉 아침식사번도 및 아침 식사 실천율	121
〈표 8〉 액상형 전자담배 현재사용률	93	〈표 37〉 영양표시 인지를	122
〈표 9〉 평생 기타담배 사용 경험률	94	〈표 38〉 영양표시 독해율	123
〈표 10〉 담배제품 현재사용률	95	〈표 39〉 영양표시 활용률	124
〈표 11〉 현재흡연자의 금연시도를	96	〈표 40〉 하루 평균 수면시간(주중)	125
〈표 12〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률	97	〈표 41〉 하루 평균 수면시간(주말)	126
〈표 13〉 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률	98	〈표 42〉 스트레스 인지를	127
〈표 14〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률	99	〈표 43〉 우울감 경험률	128
〈표 15〉 평생음주율	100	〈표 44〉 스트레스 및 우울증상으로 인한 정신상담률	129
〈표 16〉 연간음주율	101	〈표 45〉 우울증상양병률	130
〈표 17〉 월간음주율	102	〈표 46〉 자살생각률	131
〈표 18〉 고위험음주율	103	〈표 47〉 자살생각으로 인한 정신상담률	132
〈표 19〉 연간음주자의 고위험음주율	104	〈표 48〉 인지장애 경험률(50세 이상)	133
〈표 20〉 월간폭음률	105	〈표 49〉 인지장애 경험률(65세 이상)	134
〈표 21〉 절주·금주 계획을	106	〈표 50〉 인지장애로 인한 지장(50세 이상)	135
〈표 22〉 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 홍보 노출 경험률	107	〈표 51〉 인지장애 상담률(50세 이상)	136
〈표 23〉 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 교육 경험률	108	〈표 52〉 연간 치매 선별 검사 수진율(50세 이상)	137
〈표 24〉 고강도 신체활동 실천율	109	〈표 53〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	138
〈표 25〉 중강도 신체활동 실천율	110	〈표 54〉 저작불편호소율(65세 이상)	139
〈표 26〉 중강도 이상 신체활동 실천율	111	〈표 55〉 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율	140
〈표 27〉 걷기 실천율	112	〈표 56〉 어제 점심식사 후 칫솔질 미실천 이유	141
〈표 28〉 근력운동 실천율	113	〈표 57〉 어제 저녁식사 후 또는 잠자기 전 칫솔질 실천율	142
〈표 29〉 건강생활실천율	114	〈표 58〉 연간 미충족의료율(치과)	143
		〈표 59〉 미충족의료 이유(치과)	144

통계표목차

[통계표목차]

〈표 60〉 연간 스케일링 경험률	145	〈표 89〉 연간 보건기관 이용률	174
〈표 61〉 주관적 건강인지를	146	〈표 90〉 심폐소생술 인지를	175
〈표 62〉 행복감지수	147	〈표 91〉 심폐소생술 교육 경험률 및 심폐소생술 매네킹, 자동제세동기 실습 경험률	176
〈표 63〉 삶의 질 지수(EQ-5D Index)	148	〈표 92〉 심폐소생술 시행능력률	177
〈표 64〉 운전자석 안전벨트 착용률	149	〈표 93〉 연간 사고 및 중독 경험률	178
〈표 65〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	150	〈표 94〉 연간 사고 및 중독 건수를	179
〈표 66〉 연간 음주운전차량 동승경험률	151	〈표 95〉 사고 및 중독 원인	180
〈표 67〉 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	152	〈표 96〉 식품 안정성 확보율	181
〈표 68〉 자전거 헬멧 착용률	153	〈표 97〉 치매환자 가족 가구율 및 동거 가구율	182
〈표 69〉 혈압수치 및 혈당수치 인지를	154		
〈표 70〉 본인 인지 혈압 및 혈당 조절률	155		
〈표 71〉 고혈압 진단 경험률	156		
〈표 72〉 고혈압 현재치료를	157		
〈표 73〉 고혈압 진단 경험자의 치료율	158		
〈표 74〉 고혈압 관리교육 이수율	159		
〈표 75〉 고혈압 관리교육 장소	160		
〈표 76〉 당뇨병 진단 경험률	161		
〈표 77〉 당뇨병 현재치료를	162		
〈표 78〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율	163		
〈표 79〉 당뇨병 관리교육 이수율	164		
〈표 80〉 당뇨병 관리교육 장소	165		
〈표 81〉 당화혈색소 인지를	166		
〈표 82〉 연간 당화혈색소 검사 횟수	167		
〈표 83〉 연간 당뇨병성 안질환 합병증검사 수진율 및 연간 당뇨병성 신장질환 합병증검사 수진율	168		
〈표 84〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지를	169		
〈표 85〉 심근경색증 조기증상 인지를	170		
〈표 86〉 연간 미충족의료율(병원)	171		
〈표 87〉 미충족의료 이유(병원)	172		
〈표 88〉 연간 인플루엔자 예방접종률	173		



요약

2024 COMMUNITY HEALTH SURVEY

2024년 울산광역시 울주군 주요 건강지표 요약

울산광역시 울주군의 2020년부터 2024년까지 지역사회건강조사 주요지표와 울산광역시를 비교한 결과는 <표 1>과 같다.

<표 1> 2024년 지역사회건강조사 주요지표 결과 (단위 : %, 조율(표준오차))

영역	산출지표	울산광역시 울주군					울산광역시
		2020	2021	2022	2023	2024	2024
건강행태							
흡연	현재흡연율	20.5(1.4)	20.7(1.5)	21.5(1.3)	22.2(1.6)	18.9(1.4)	18.7(0.6)
	남자 현재흡연율	38.2(2.5)	37.3(2.7)	38.9(2.2)	38.8(2.7)	34.9(2.4)	33.6(1.1)
음주	월간음주율	52.6(1.9)	52.6(1.9)	57.1(2.2)	53.3(2.2)	57.1(1.8)	58.6(0.8)
	고위험음주율	7.9(1.1)	9.8(0.9)	13.6(1.2)	14.3(1.5)	12.6(1.1)	13.3(0.6)
	연간음주자의 고위험음주율	11.1(1.5)	14.6(1.4)	18.6(1.5)	20.1(1.9)	16.2(1.4)	17.5(0.7)
신체활동	중강도 이상 신체활동 실천율 ¹⁾	23.8(1.4)	15.5(1.4)	20.7(1.7)	21.4(1.6)	24.4(1.7)	27.4(0.8)
	걷기 실천율	37.0(1.6)	35.0(2.2)	35.8(1.9)	43.0(1.9)	53.0(2.4)	55.1(0.9)
건강생활실천	건강생활실천율 ²⁾	28.1(1.3)	25.5(1.8)	24.2(1.6)	30.5(1.7)	38.5(2.0)	40.6(0.8)
비만 및 체중조절	비만율(자가보고) ³⁾	29.0(1.6)	27.7(1.9)	36.6(1.7)	34.5(1.7)	33.4(2.2)	33.7(0.8)
	연간 체중조절 시도율	47.2(2.2)	49.8(2.0)	62.4(2.1)	64.9(1.8)	56.6(2.1)	65.2(0.8)
식생활	아침식사 실천율 ⁴⁾	65.4(2.5)	61.3(2.4)	57.2(2.3)	55.0(2.4)	56.7(2.4)	54.0(0.9)
	영양표시 활용률 ⁵⁾	81.8(2.8)	81.7(3.1)	84.0(2.5)	83.8(2.4)	83.1(2.1)	83.7(0.9)
정신건강	스트레스 인지율	18.6(1.6)	19.0(1.6)	21.2(1.2)	21.5(1.3)	17.5(1.5)	20.3(0.6)
	우울감 경험률	1.4(0.4)	2.4(0.5)	5.8(0.8)	9.2(1.2)	7.5(0.9)	7.5(0.4)
	우울증상유병률 ⁶⁾	1.0(0.3)	1.5(0.4)	1.7(0.4)	3.0(0.7)	2.4(0.6)	3.8(0.3)
구강건강	저작불편호소율(≥65)	29.6(2.8)	28.2(3.4)	32.9(3.0)	26.4(2.7)	26.5(3.1)	30.0(1.6)
	어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 ⁷⁾	61.0(2.3)	57.0(2.4)	64.5(1.6)	61.0(1.8)	64.8(1.9)	69.7(0.8)
활동제한 및 삶의 질	주관적 건강인지율	54.2(1.8)	49.4(2.2)	45.4(1.9)	43.4(2.1)	43.6(1.9)	41.9(0.8)
안전의식	운전자석 안전벨트 착용률	98.0(0.6)	96.8(1.1)	93.4(1.2)	89.7(1.5)	89.7(1.3)	91.4(0.5)
	동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 ⁵⁾	29.7(2.0)	32.6(2.7)	27.5(2.0)	26.6(2.1)	28.1(2.0)	27.9(0.8)
	자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	1.5(0.5)	1.5(0.6)	1.0(0.4)	4.5(0.9)	2.1(0.6)	1.3(0.2)
이환 및 의료이용							
고혈압	혈압수치 인지율 ⁸⁾	31.9(1.8)	34.8(1.7)	52.8(2.2)	63.3(2.1)	62.4(1.8)	63.0(0.8)
	고혈압 진단 경험률(≥30)	20.5(1.5)	22.2(1.5)	24.1(1.8)	28.8(1.7)	28.9(2.0)	25.6(0.8)
	고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)	96.4(1.4)	95.4(1.5)	91.6(2.4)	89.8(2.2)	92.9(1.6)	94.2(0.8)

영역	산출지표	울산광역시 울주군					울산광역시
		2020	2021	2022	2023	2024	2024
당뇨병	혈당수치 인지율 ⁸⁾	11.8(1.0)	12.6(1.4)	12.8(1.1)	23.8(1.6)	26.7(2.0)	25.5(0.7)
	당뇨병 진단 경험률(≥ 30)	10.9(1.1)	9.0(1.0)	10.5(1.0)	12.7(1.3)	11.0(1.1)	11.2(0.5)
	당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥ 30)	100.0(0.0)	95.5(2.3)	95.5(2.1)	89.0(3.7)	92.5(2.7)	94.5(0.9)
	연간 당뇨병성 안질환 합병증검사 수진율(≥ 30)	42.3(5.5)	55.3(5.4)	29.6(4.9)	39.4(5.4)	36.8(4.7)	42.7(2.2)
	연간 당뇨병성 신장질환 합병증검사 수진율(≥ 30) ⁹⁾	52.7(6.5)	68.1(4.9)	42.6(5.9)	54.1(4.2)	48.3(5.4)	46.2(2.4)
건강지식	뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 ¹⁰⁾	74.8(1.9)	66.7(1.8)	59.1(1.9)	60.4(2.3)	64.5(1.9)	58.4(0.8)
	심근경색증 조기증상 인지율 ¹⁰⁾	68.0(2.4)	63.0(2.0)	50.9(2.0)	48.4(1.7)	49.7(1.9)	48.5(0.8)
의료이용	연간 미충족의료율(병의원) ¹¹⁾	4.4(0.6)	3.8(0.6)	3.0(0.6)	5.3(0.9)	6.0(0.8)	6.9(0.4)
예방접종	연간 인플루엔자 예방접종률	43.2(2.4)	54.1(2.1)	46.3(2.2)	50.5(2.0)	49.0(2.2)	48.6(1.0)

주 : 1) 중강도 이상 신체활동 실천율 : 2018년 조사 미수행

2) 건강생활실천율 : 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 분율(복합지표)

3) 비만율(자가보고) : 2019년 조사 미수행

4) 아침식사 실천율 : 2019년 응답보기 변경, 2022년 지표명 변경(기존 지표명: 아침결식 예방인구비율)

5) 영양표시 활용률, 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 : 2014년 신규 도입

6) 우울증상유병률 : 2017년 신규 도입

7) 어제 점심식사 후 치솔질 실천율 : 2014년부터 설문문항 및 응답보기 변경

8) 혈압수치 인지율, 혈당수치 인지율 : 2011년 신규 도입, 2016년부터 매년 조사

9) 연간 당뇨병성 신장질환 합병증검사 수진율 : 2011년부터 설문문항 변경

10) 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율, 심근경색증 조기증상 인지율 : 2017년 신규 도입, 2019년 설문문항 변경

11) 연간 미충족의료율 : 2019년부터 설문문항 및 응답보기 변경

2024년 지역사회건강조사 울산광역시 울주군 및 울산광역시, 전국 사분위수의 주요지표를 표준화율로 비교한 결과는 <표 2>와 같다.

<표 2> 2024년 지역사회건강조사 주요지표 결과

(단위 : %, 표준화율)

영역	산출지표	2024년		전국(2024년)*		
		울주군	울산광역시	1사분위	2사분위	3사분위
건강행태						
흡연	현재흡연율	18.9	19.2	16.5	18.9	21.3
	남자 현재흡연율	36.1	35.4	29.9	34.0	38.1
음주	월간음주율	61.1	62.4	55.5	58.3	61.1
	고위험음주율	12.0	13.8	10.9	12.6	14.5
	연간음주자의 고위험음주율	14.4	17.0	14.3	16.6	19.4
신체활동	중강도 이상 신체활동 실천율 ¹⁾	26.7	29.2	22.4	26.6	30.0
	걷기 실천율	52.8	54.5	42.4	49.7	58.6
건강생활실천	건강생활실천율 ²⁾	37.9	39.4	29.8	36.2	43.7
비만 및 체중조절	비만율(자가보고) ³⁾	33.5	34.7	32.3	34.4	36.9
	연간 체중조절 시도율	60.2	68.3	60.6	65.0	68.7
식생활	아침식사 실천율 ⁴⁾	44.5	44.5	44.5	47.5	50.7
	영양표시 활용률 ⁵⁾	83.5	85.6	82.3	86.0	89.0
정신건강	스트레스 인지율	18.1	22.2	21.0	23.7	25.8
	우울감 경험률	6.8	7.2	4.8	6.2	7.5
	우울증상유병률 ⁶⁾	2.3	4.1	2.5	3.5	4.8
구강건강	저작불편호소율(≥65)	26.2	30.0	24.2	27.7	31.7
	어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 ⁷⁾	67.8	71.6	67.8	71.1	74.4
활동제한 및 삶의 질	주관적 건강인지율	48.2	46.1	44.6	48.2	52.1
안전의식	운전자석 안전벨트 착용률	88.3	89.7	83.6	90.7	95.4
	동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 ⁵⁾	27.3	26.5	25.9	30.2	34.6
	자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	1.8	1.3	0.9	1.7	3.0
이환 및 의료이용						
고혈압	혈압수치 인지율 ⁸⁾	57.1	57.7	55.2	61.2	67.7
	고혈압 진단 경험률(≥30)	20.9	19.3	19.4	21.1	23.0
	고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)	93.2	93.7	91.3	93.5	95.3
당뇨병	혈당수치 인지율 ⁸⁾	23.6	21.5	22.4	28.2	35.3
	당뇨병 진단 경험률(≥30)	8.4	8.4	8.3	9.4	10.6
	당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30)	88.1	93.9	90.0	93.4	95.9
	연간 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)	35.1	42.4	30.9	38.3	46.8
	연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30) ⁹⁾	45.3	46.9	39.5	50.1	59.4
건강지식	뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 ¹⁰⁾	62.1	55.5	53.2	59.2	65.6
	심근경색증 조기증상 인지율 ¹⁰⁾	47.1	45.7	43.2	49.7	58.7

영역	산출지표	2024년		전국(2024년)*		
		울주군	울산광역시	1사분위	2사분위	3사분위
의료이용	연간 미충족의료율(병의원) ¹¹⁾	6.3	7.6	3.4	4.9	7.0
예방접종	연간 인플루엔자 예방접종률	39.5	43.1	40.6	43.6	46.7

- 주 : 1) 중강도 이상 신체활동 실천율 : 2018년 조사 미수행
 2) 건강생활실천율 : 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 분율(복합지표)
 3) 비만율(자가보고) : 2019년 조사 미수행
 4) 아침식사 실천율 : 2019년 응답보기 변경, 2022년 지표명 변경(기존 지표명: 아침결식 예방인구비율)
 5) 영양표시 활용률, 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 : 2014년 신규 도입
 6) 우울증상유병률 : 2017년 신규 도입
 7) 어제 점심식사 후 치솔질 실천율 : 2014년부터 설문문항 및 응답보기 변경
 8) 혈압수치 인지율, 혈당수치 인지율 : 2011년 신규 도입, 2016년부터 매년 조사
 9) 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 : 2011년부터 설문문항 변경
 10) 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율, 심근경색증 조기증상 인지율 : 2017년 신규 도입, 2019년 설문문항 변경
 11) 연간 미충족의료율 : 2019년부터 설문문항 및 응답보기 변경

우리 지역사회의 주요 건강이슈

1 2024년 전국 시·군·구별 표준화율과 울주군의 표준화율의 비교


전국 수준에 대비한 울산광역시 울주군의 건강수준을 파악하기 위하여 <표 3>과 같이 요약하였다. 주요지표 결과를 분율(%)이 높을수록 긍정적인 지표와 부정적인 지표로 구분하였으며, 2024년 지역사회건강조사 전국 시·군·구별 표준화율 사분위수와 울산광역시 울주군의 표준화율을 비교하여 제시하였다.

<표 3> 2024년 전국 시군구별 표준화율과 울주군 표준화율의 비교

1. 분율(%)이 높을수록 좋은 지표			
제1사분위수 미만	제1사분위수 이상, 제2사분위수 미만	제2사분위수 이상, 제3사분위수 미만	제3사분위수 이상
- 연간 체중조절 시도율 - 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30) - 연간 인플루엔자 예방접종률	- 아침식사 실천율 - 영양표시 활용률 - 어제 점심식사 후 치솔질 실천율 - 운전자석 안전벨트 착용률 - 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 - 혈압수치 인지율 - 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30) - 혈당수치 인지율 - 연간 당뇨병 안정질환 합병증검사 수진율(≥30) - 연간 당뇨병 산장질환 합병증검사 수진율(≥30) - 심근경색증 조기증상 인지율	- 중강도 이상 신체활동 실천율 - 걷기 실천율 - 건강생활실천율 - 주관적 건강인지율 - 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	
2. 분율(%)이 낮을수록 좋은 지표			
제1사분위수 미만	제1사분위수 이상, 제2사분위수 미만	제2사분위수 이상, 제3사분위수 미만	제3사분위수 이상
- 스트레스 인지율 - 우울증상유병률	- 고위험음주율 - 연간음주자의 고위험음주율 - 비만율(자가보고)_비만 - 저작불편호소율(≥65) - 고혈압 진단 경험률(≥30) - 당뇨병 진단 경험률(≥30)	- 현재흡연율 - 남자 현재흡연율 - 우울감 경험률 - 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률 - 연간 미충족의료율(병의원)	월간음주율


2 울주군과 울산광역시의 주요지표 비교

2024년 울주군 지역사회건강조사의 주요지표 결과를 울산광역시와 비교(조율)하였다. <그림 1>과 <그림 2>는 각각 긍정적 지표와 부정적 지표에 대하여 울주군과 울산광역시를 비교한 방사형 그래프이다. 긍정적 지표는 높은 값을 긍정적으로 해석할 수 있는 지표이며, 부정적 지표는 높은 값을 부정적으로 해석할 수 있는 지표이다. 각 지표의 울산광역시를 1로 환산하였을 때 울주군의 상대적인 지표값(비)을 제시하였다.¹⁾



〈그림 1〉 2024년 주요지표 결과 비교 - 긍정적 지표

1) 긍정적 지표는 비의 값이 1.2를 초과하는 경우 ' 좋음'으로 0.8 미만인 경우 '나쁨'으로 해석하며, 부정적인 지표는 비의 값이 0.8 미만인 경우 ' 좋음'으로 1.2를 초과하는 경우 '나쁨'으로 해석. 지표값이 매우 작은 경우에는 두 지표의 차이가 과대평가 될 수 있으므로 결과 해석 시 주의 필요



〈그림 2〉 2024년 주요지표 결과 비교 - 부정적 지표


3

황금다이아몬드를 이용한 보건사업 우선순위 지역사회건강지표

사업의 우선순위를 선정하기 위해 황금다이아몬드법(golden diamond)을 이용하였다. 2024년 울주군의 표준화율과 전국의 사분위수(표준화율)를 비교하여 제1사분위수 미만 혹은 제3사분위수 이상인 지표는 ‘ 좋음 ’ 또는 ‘ 나쁨 ’, 제1사분위수 이상 이면서 제3사분위수 미만인 지표는 ‘ 보통 ’으로 분류하였고, 울주군의 최근 5년간 (2020-2024) 변화 추세는 기준연도인 2020년과 2024년 결과(조율)의 95% 신뢰구간을 비교하여 ‘ 좋아짐 ’, ‘ 비슷함 ’, ‘ 나빠짐 ’으로 분류하였다. 분류결과 기준으로 우선순위를 선정하여 제시하였다<그림 3>. 단, 기준 연도에 조사되지 않은 지표나 보건학적 의미가 낮은 지표 등은 우선순위 선정에서 제외하였다.²⁾

변화 추세는 다음과 같은 방법을 통해 판단하였다.

1. 울산광역시 5개구 115개 지표의 조율을 단순선형분석을 이용하여 회귀계수 산출
2. 산출된 회귀계수를 각 지표 조율의 평균으로 나눠 일종의 표준화 된 형태의 계수 산출
3. 표준화 된 계수에 대해 절대값을 취한 후 이 값들의 중앙값(median) 산출
4. 각 지표의 표준화 된 계수가 3번에서 구한 중앙값 보다 클 경우 변화 추세가 있는 것으로 판단



〈그림 3〉 황금다이아몬드를 이용한 보건사업 우선순위

2) 기준연도 결과 값이 없는 지표(신규 지표 포함), 복합요인으로 구성된 지표, 연도별 변동의 폭이 커서 신뢰도가 떨어지는 지표 등




01

제1부 조사체계

- I. 조사개요
- II. 통계 추정방법

2024
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY



I. 조사개요

1. 조사목적
2. 조사방법
3. 조사내용
4. 표본설계
5. 조사체계
6. 자료관리
7. 조사현황

I. 조사개요

1 조사목적

지역사회건강조사는 「지역보건법」 제4조(지역사회 건강실태조사) 및 동법시행령 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)에 의거하여 지역보건의료 계획 수립 및 평가를 위한 지역건강통계를 생산하는 것이 목적이다. 또한 이를 바탕으로 근거 중심의 보건사업 수행의 기반을 마련하고 지역 간 비교 가능하도록 조사지표 및 수행체계를 표준화하여 지방자치단체 보건사업 평가지표를 생산하는데 목적을 두고 있다.

2 조사방법

가. 조사대상

조사시점 표본가구에 거주하는 만 19세 이상 가구원 (2005년 4월 30일 이전 출생자)

나. 조사시기

2024년 5월 16일 - 7월 31일

다. 조사방법

훈련된 조사원이 표본가구를 직접 방문하여 일대일 면접 조사를 실시하며, 설문 응답 내용을 조사원이 태블릿 PC에 직접 입력하는 방식으로 진행

3 조사내용

지역사회건강조사에서는 2010년부터 4년을 하나의 조사주기로 설정하고 지표의 중요도와 활용성, 표본의 크기 등을 고려하여 각각의 조사항목을 1년, 2년, 4년 주기로 구분하여 조사한다(1기 순환조사: 2010-2013년, 2기 순환조사: 2014-2017년, 3기 순환조사: 2018-2021년, 4기 순환조사: 2022-2025년).

〈표 4〉 지역사회건강조사 순환조사체계

주기	지역사회건강조사 제4기(2022-2025년) 순환조사			
	2022	2023	2024	2025
1년	○	○	○	○
2년	●		●	
		■		■
4년	◎			
		◆		
			■	
				●

2024년 지역사회건강조사에서는 총 17개 영역, 172개 문항으로 전국 공통 조사표를 구성하였다. 아울러 가구원 대표 1인이 참여하는 가구조사와 만 19세 이상 가구원이 참여하는 개인조사로 구성하였다.

개인조사 영역에는 흡연, 음주, 안전의식, 신체활동, 식생활, 비만 및 체중조절, 구강건강, 정신건강, 예방접종 및 검진, 이환, 의료이용, 사고 및 중독, 활동제한 및 삶의 질, 심폐소생술, 교육 및 경제활동이 포함되었다.

〈표 5〉 2024년 지역사회건강조사 조사항목

영역		조사항목
설문조사	가구조사 (*가구대표 1인 참여)	세대유형, 기초생활수급 여부, 가구소득, 가구 식품 안정성, 치매환자 동거여부
	개인조사	흡연 평생흡연(일반, 궤련형, 액상형, 기타), 현재흡연(일반, 궤련형, 액상형, 기타), 모든 담배 금연시도·계획, 간접흡연(가정실내, 직장실내)
		음주 평생음주, 음주 경험 및 빈도, 음주량, 10잔 이상 응답자의 음주량, 폭음빈도, 절주 또는 금주 계획, 음주폐해예방 또는 절주에 대한 홍보노출 경험·교육경험, 금주구역 인지율
		안전의식 안전벨트 착용(자동차), 헬멧착용(오토바이, 자전거), 음주운전 경험(자동차, 오토바이)
		신체활동 고강도 신체활동 실천, 중강도 신체활동 실천, 걷기 실천, 근력운동 실천
		식생활 아침식사 일수, 영양표시 인지·독해·활용
		비만 및 체중조절 본인인지 키(신장) 및 몸무게(체중) 자가보고, 본인인지 체형, 체중조절 시도
		구강건강 주관적 구강건강, 저작불편, 어제 하루 칫솔질 여부, 치과 미충족 의료 경험·이유, 스케일링 경험
		정신건강 수면시간, 스트레스 인지, 우울감 및 정신상담, 우울증상유병, 자살생각 경험 및 정신상담, 수면의 질, 치매 및 인지장애
		예방접종 및 검진 인플루엔자 예방접종
		이환 뇌졸중 및 심근경색증 조기증상 인지, 고혈압, 당뇨병
		의료이용 미충족 의료 여부, 미충족 의료 이유
		사고 및 중독 사고·중독 경험 및 건수, 사고·중독 원인
		활동제한 및 삶의 질 주관적 건강수준, 행복감 지수, EQ-5D
		보건기관 이용 연간 보건기관 이용
		심폐소생술 심폐소생술 인지, 심폐소생술 교육 경험, 심폐소생술 실습 경험(마네킹, AED), 심폐소생술 시행능력 정도
		교육 및 경제활동 최종학력 및 졸업상태, 경제활동 참여, 직업 및 종사상지위, 혼인상태

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

4 표본설계

가. 모집단

(1) 목표 모집단은 2024년 4월 기준으로 시·군·구에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.

(2) 조사 모집단은 시·군·구의 동·읍·면 내 통·반/리의 표본지점을 1차 추출단위로 하며, 선정된 통·반/리의 표본지점 내 주거용 주택(아파트, 일반주택)에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.

나. 표본추출

(1) 1차 추출(표본지점)

통·반/리 내 주택유형별 가구 수를 기준으로 주민등록인구자료와 주택자료를 연계하여 작성된 표본추출틀에서 각 동·읍·면 별로 할당된 표본지점을 추출하는데, 이때 통·반/리를 행정동(법정동) 코드 기준으로 정렬한 후 가구 수 크기를 고려하여 추출확률이 비례하도록 추출하였다.

(2) 2차 추출(표본가구)

표본가구는 표본지점으로 선정된 통·반/리의 가구 수를 파악하여 계통추출법으로 선정하였다. 이 때 통·반/리의 규모가 커서 2개 이상의 표본지점이 할당된 경우 표본오차를 최소화하기 위해 표본가구가 가능한 고르게 분포하도록 하였다. 최종적으로 표본지점별로 평균 5개 가구를 표본가구로 선정하였다.

모집단 정의 주민등록기준 만 19세 이상 성인(2005. 4. 30.)

분석 및 층화 동·읍·면, 주택유형별 층화

표본 크기 결정 표본 크기 결정 보건소별 평균 900명, 목표오차 $\pm 3\%$

동·읍·면 할당 동·읍·면 최소 1개 이상 표본지점 할당

표본지점 추출 통·반/리 확률비례계통추출 (1차추출)

표본가구 추출 계통추출 (2차추출)

〈그림 4〉 지역사회건강조사 표본선정과정

〈표 6〉 읍·면별 표본지점 분포


읍면	전체 가구 수			표본지점 수		
	일반	아파트	합계	일반	아파트	합계
읍·면지역	37,491	52,608	90,099	41	50	91
두동면	1,785	10	1,795	3	.	3
두서면	1,474	8	1,482	2	.	2
범서읍	3,822	20,460	24,282	3	19	22
삼남읍	3,773	6,122	9,895	4	6	10
삼동면	789	.	789	2	.	2
상북면	2,643	1,039	3,682	3	1	4
서생면	3,565	437	4,002	4	1	5
연양읍	3,934	7,864	11,798	4	7	11
온산읍	6,777	2,475	9,252	7	2	9
온양읍	4,279	7,473	11,752	4	7	11
웅촌면	2,120	1,503	3,623	2	2	4
청량읍	2,530	5,217	7,747	3	5	8
합계	37,491	52,608	90,099	41	50	91

5 조사체계

가. 수행체계

질병관리청은 지역사회건강조사 사업계획을 수립하여 시·도에 배포하고, 표본설계, 조사문항 및 지침 표준화, 교육 및 홍보물 개발 등의 사업수행과 관련한 기술지원을 하였다. 사업 관련 주요 현안에 대한 검토 및 심의는 시·도 및 책임대학교 위원회, 전문분과위원회로 구성된 운영위원회를 통해 이루어졌다.

시·도는 권역대표대학교를 지정하여 지역사회건강조사 수행을 위한 지역 거점센터를 운영하고, 중앙정부로부터 사업예산을 받아 시·군·구 보건소로 배정하는 역할을 담당하여 수행하였다. 시·군·구 보건소는 책임대학교와 협약을 체결하고, 조사수행 관련한 행정지원을 하였다.



〈그림 5〉 지역사회건강조사 수행체계

요
약

제 1 부
조
사
체
계

제 2 부
주
요
통
계
결
과


제 3 부
통
계
표

제 4 부
부
록

나. 수행과정

질병관리청에서 설문지 개발 및 표본추출을 담당하였고, 책임대학교에서 조사원 교육을 실시하였다. 조사원은 가구선정안내서 발송 1-2주 후 표본가구를

방문하여 조사를 진행한 후 조사자료를 중앙서버로 전송하였다. 이후 책임대학교에서 조사자료 확인 및 자료분석 절차를 거쳐 통계집을 발간하였다.



〈그림 6〉 지역사회건강조사 수행과정

6


자료관리

가. 콜센터 운영

2024년 지역사회건강조사에서는 조사원에게 표준화된 조사수행 및 조사문항지침을 전달하고자 책임대학교 단위의 콜센터를 운영하였다. 콜센터에서는 표본가구 및 가구원 선정, 가구대체, 조사문항, 조사장비 관련 질의사항을 처리하고, 담당자는 질의사항에 대한 조치 내역을 질병보건통합관리시스템에 매일 등록하였다.

나. 자료검증

2024년 지역사회건강조사에서는 조사완료자 중 13%를 무작위로 추출하여 제3기관을 통해 전화점검을 실시하였다. 전화점검은 조사완료 후 평균 2일 이내 실시하였으며, 책임대학교에서 전화점검 결과에 대해 확인 후 최종적으로 조사자료의 사용여부를 결정하였다.



〈그림 7〉 전화점검 절차

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

7

조사현황

가. 조사현황

조사현황은 <표 7>과 같다. 총 조사가구 수는 519 가구였고, 조사완료자 수는 909명이었다. 가구당 평균 1.7명이 조사되었다.

<표 7> 조사현황

	조사가구 수			조사완료자 수(명)		
	일반	아파트	합계	일반	아파트	합계
읍·면지역	239	280	519	413	496	909
두동면	15	.	15	25	.	25
두서면	10	.	10	18	.	18
범서읍	19	97	116	28	190	218
삼남읍	24	34	58	40	54	94
삼동면	12	.	12	23	.	23
상북면	17	7	24	35	15	50
서생면	22	5	27	37	7	44
언양읍	24	47	71	42	87	129
온산읍	45	12	57	73	17	90
온양읍	22	37	59	39	61	100
웅촌면	10	10	20	22	13	35
청량읍	19	31	50	31	52	83
합계	239	280	519	413	496	909

<표 8> 가구당 조사인원 수

	일반	아파트	계
읍·면지역	1.7	1.8	1.7
계	1.7	1.8	1.7

나. 조사가구 및 인구 특성

2024년 지역사회건강조사 대상자의 가구원수는 2명인 경우가 38.7%로 가장 많았고, 평균은 2.3명이었다.

월 가구소득은 400만원 이상이 50.4%로 가장 많았고, 다음이 100-200만원 미만 14.9%의 순이었다.

성별분포는 남자가 49.8%, 여자가 50.2%이었다. 연령은 60대가 24.5%로 가장 높았고, 다음이 50대 24.0%의 순이었다. 대상자의 평균연령은 55세였다.

결혼 상태는 배우자가 있는 경우가 67.2%이고, 교육수준은 고등학교 졸업이 41.4%로 가장 많았고, 다음이 대학교 이상 34.2% 순이었다.

〈표 9〉 2024년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성 (단위 : 가구, %)

조사대상 가구특성(N=519)		
	N	(%)
가구원 수		
1명	145	27.9
2명	201	38.7
3명	86	16.6
4명	65	12.5
5명	16	3.1
6명	6	1.2
7명 이상	.	.
평균(명)	2.3	.
세대유형		
1세대	311	59.9
2세대	194	37.4
3세대	14	2.7
기초생활수급자 여부		
현재 수급자	27	5.2
과거 수급자	1	0.2
미수급자	491	94.6
월 가구소득		
100만원 미만	41	7.9
100~200만원 미만	77	14.9
200~300만원 미만	67	12.9
300~400만원 미만	72	13.9
400만원 이상	261	50.4
거주유형		
읍·면	519	100.0

〈표 10〉 2024년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성

(단위 : 명, %)

조사대상 인구특성(N=909)		
	N	(%)
성별		
남자	453	49.8
여자	456	50.2
연령(10세 간격)		
19-29세	67	7.4
30-39세	103	11.3
40-49세	134	14.7
50-59세	218	24.0
60-69세	223	24.5
70세 이상	164	18.0
평균(세)	55	.
생애주기별		
19-64세	643	70.7
65세 이상	266	29.3
결혼상태		
미혼	145	16.0
유배우	611	67.2
사별, 이혼, 별거	153	16.8
교육수준 ¹⁾		
무학	33	3.6
초등학교	88	9.7
중학교	101	11.1
고등학교	376	41.4
대학교 이상	311	34.2
직업		
전문행정관리직	136	15.0
사무직	81	8.9
판매·서비스직	115	12.7
농림어업	45	5.0
기능단순노무직	226	24.9
기타 ²⁾	306	33.7

1) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

2) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직



Ⅱ. 통계 추정방법

1. 가중치의 사용
2. 자료처리
3. 분산추정

II. 통계 추정방법

1 가중치의 사용

가. 소개

2024년 지역사회건강조사는 표본설계를 통하여 추출한 표본을 조사하여 설계 구조를 바탕으로 가중치를 부여함으로써 모집단의 건강수준 등을 추정하였다. 가중치는 가구단위 분석을 위한 가구가중치와 개인단위 분석을 위한 개인가중치로 분류하였다.

나. 가중치 산출 과정

가구가중치는 가구추출률과 조사적격 가구율을 반영하였고, 개인가중치는 가구가중치에 개인 응답률을 반영하였다. 추정에 쓰이는 보정가중치는 개인가중치를 성별, 연령별 인구구조(2024년 4월 주민등록인구)와 같도록 보정하여 산출하였다.

설계가중치		벤치마킹 가중치
가구가중치	→	개인가중치 → 보정가중치
· 가구추출률 · 조사적격가구율 · 주택유형별 가구 비율	· 개인 응답률	· 성별·연령별 인구보정 - 성별 : 남, 여 - 연령별 : 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+ - 주민등록인구 기준 (2024. 04)

〈그림 8〉 가중치 산출 과정

(1) 가구가중치

- 표본설계의 표본추출과정을 고려한 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율을 반영한 가중치

$$W_{hi} = \frac{M_{hi}}{n_{hi}} = \frac{e_{hi} \cdot N_{hi}}{n_{hi}}$$

- N_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 가구 수
- M_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 적격가구 수
- n_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사가가구 수
- e_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사적격 가구율

〈표 11〉 가구가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 가구 수(③)	(2, 620)
①, ②의 조사된 가구 수(④)	(7)
①, ②의 조사접촉 가구 수(⑤)	(9)
①, ②의 조사적격 가구 수(⑥)	(8)
가구가중치(⑦) = ③ ÷ ④ × ⑥ ÷ ⑤	(332. 698 = 2620/7 × 8/9)
전체 가구가중치 합(⑧)	(8569. 456)
전체 ②의 가구 수 합(⑨)	(10, 356)
가구가중치 보정(⑩) = ⑦ × (⑨/⑧)	(402. 0583 = 332. 698 × 10, 356 / 8569. 456)

(2) 개인가중치

- 가구가중치에 개인 응답률을 반영한 가중치

$$W_{hjl} = W_{hjk} \times \frac{P_{hjk}}{p_{hjk}}$$

- h : 읍·면/동, j : 표본지점
- k : 가구, l : 가구원
- P_{hjk} : 가구내 만 19세 이상 가구원수
- p_{hjk} : 가구내 만 19세 이상 조사 가구원수

〈표 12〉 개인가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 가구가중치(③)	(402.0583)
만 19세 이상 가구원수(④)	(4)
만 19세 이상 조사 가구원수(⑤)	(3)
개인가중치(⑥)=③×④/⑤	(536.0777=402.0583×4/3)

(3) 보정가중치

- 2024년 4월 주민등록인구 기준으로 성별, 연령별 인구구조를 보정한 가중치

$$- W'_{ijkl} = BF_d \cdot W_{ijkl}$$

$$- BF_d = \frac{d(\text{성별} \cdot \text{연령대별}) \text{ 주민등록인구수}}{\sum_h \sum_i \sum_{jkl} W_{ijkl} I_{d \in \text{성별} \cdot \text{연령대별}}}$$

〈표 13〉 보정가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 개인가중치(③)	(536.0777)
주민등록인구(④)	(14,693)
성·연령별 개인가중치 합(⑤)	(12,157.23)
성·연령별 보정비(⑥)=④/⑤	(1.208=14,693/12,157.23)
보정가중치(⑦)=③×⑥	(647.89=536.0777×1.208)

(4) 가중치의 이상치 제거

특정 조사대상자의 개인가중치가 다른 조사대상자의 개인가중치보다 월등히 클 경우, 해당 조사대상자의 응답값에 의해 조사결과에 바이어스(bias, 편향성)가 생길 수 있으므로 보정가중치의 이상치를 Raking Ratio 방법으로 제거하여 재보정 하였다.

$Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 보다 큰 가중치는 이상치로 정의하였으며, $Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 로 변경하였다.

$$- IQR: Q_3(W') - Q_1(W')$$

$$- Q_1(W') : \text{가중치 중 1사분위수}$$

$$- Q_3(W') : \text{가중치 중 3사분위수}$$

2 자료처리

가. 무응답처리

무응답은 대체하지 않았으며 지표 산출 시 제외하였다. 무응답은 개체 무응답과 항목 무응답으로 구분하는데 개체 무응답은 조사에 참여하지 않음으로써 모든 문항에 대해 발생한 결측치를 의미하고, 항목 무응답은 조사에 참여한 대상자가 일부항목에 응답하지 않아 발생한 결측치이다.

나. 사회경제적 특성분류

(1) 연령

연령은 2024년 5월 1일 기준으로 만 연령을 정의하였다. 연령분류는 10세 단위로 “19-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60-69세, 70세 이상”으로 분류하였고, 생애주기별 특성을 알아보기 위해 “19-64세, 65세 이상”의 연령구분을 추가하였다.

(2) 교육수준

교육수준은 <교육 및 경제활동> 영역에서 교육정도와 졸업여부 2개 문항으로 조사하였으며 최종 교육수준은 두 문항을 조합하여 “무학, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 이상”으로 구분하였다. 졸업여부가 “졸업”인 경우만 해당 교육수준을 의미하며 졸업여부가 “수료, 중퇴, 재학/휴학”인 경우에는 이전 단계의 교육수준으로 분류하였다.

〈표 14〉 교육수준분류

교육수준	졸업여부	분류
무학	-	무학
서당/한학	-	
초등학교	졸업	초등학교
중학교	졸업	중학교
고등학교	졸업	고등학교
2년/3년제 대학	졸업	대학교 이상
4년제 대학	졸업	
대학원 이상	전체	

(3) 직업

직업분류는 통계청 한국표준직업분류(KSCO, 제7차 개정)의 대분류 직업군에서 유사한 직업분류를 묶어서 6개 직업군으로 분류하였다.

〈표 15〉 직업분류

제7차 한국표준직업분류	직업분류 재구분
관리자	전문행정관리
전문가 및 관련 종사자	
사무 종사자	사무직
서비스 종사자	판매·서비스직
판매 종사자	
농림어업 숙련 종사자	농림어업
기능원 및 관련 기능 종사자	기능단순노무직
장치·기계 조작 및 조립 종사자	
단순노무 종사자	
군인	기타

(4) 가구소득

소득수준은 월 단위로 “100만원 미만, 100-200만원 미만, 200-300만원 미만, 300-400만원 미만, 400만원 이상”의 5개 그룹으로 분류하였다.

(5) 거주유형

거주유형은 “동”과 “읍·면”으로 구분하였다.

3

분산추정

지역사회건강조사에서는 모집단의 특성을 추정하기 위해 가중치를 적용한 표본가중평균을 제시하였다.

표본조사로 모집단의 특성을 추정할 때 일반적으로 표본오차(sampling error) 및 비표본오차(nonsampling error)가 수반된다. 표본오차는 표본이 모집단의 특성과 어긋나는 정도를 나타내며, 비표본오차는 표본추출 과정을 제외한 자료수집 과정이나 분석 과정에서 발생하는 오류를 말한다. 표준오차(standard error)로 표현되는 표본오차는 추정치의 신뢰도에 대한 척도가 되며 분산추정에 의해 측정할 수 있다. 울산광역시 울주군 지역사회건강조사는 SAS 9.4를 활용하여 분산을 추정하였다.

• 표본가중평균

$$\hat{Y} = \frac{\left(\sum_h \sum_j \sum_k \sum_l W_{h j k l} y_{h j k l} \right)}{W_{....}}$$

– h : 동/읍·면, j : 표본지점

– k : 가구, l : 가구원

– $W_{....} = \sum_{h=1} \sum_{j=1} \sum_{k=1} \sum_{l=1} W_{h j k l}$: 가중치 계

– $y_{h j k l}$: 해당 문항의 응답값

• 표본오차

$$SE(\hat{Y}) = \sqrt{\sum_{h=1} \sum_{j=1} \frac{n_{h j} (1 - f_{h j})}{n_{h j} - 1} \sum_{k=1}^{n_{h j}} (e_{h j k} - \overline{e_{h j}})^2}$$

여기서 $e_{h j k} = \frac{\left(\sum_{l=1} W_{h j k l} (y_{h j k l} - \hat{Y}) \right)}{W_{....}}$ 이고,

$\overline{e_{h j}} = \left(\sum_{k=1} e_{h j k} \right) / n_{h j}$ 이다.

• 상대표준오차

$$RSE(\hat{Y}) = \frac{SE(\hat{Y})}{\hat{Y}}$$



02

제2부 주요통계결과

- I. 건강행태
- II. 이환 및 의료이용
- III. 사고 및 중독

2024
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY



I. 건강행태

1. 흡연
2. 음주
3. 신체활동
4. 건강생활실천
5. 비만 및 체중조절
6. 식생활
7. 정신건강
8. 구강건강
9. 활동제한 및 삶의 질
10. 안전의식

I. 건강행태

1 흡연

가. 일반담배(궐련) 흡연율

(1) 평생흡연율


- 일반담배(궐련) 평생흡연율은 전체 40.6%였다.
- 성별 : 남자가 73.1%로 여자 5.8%보다 67.3%p 높았다.
- 연령대별 : 50대가 49.9%로 가장 높았고, 40대가 48.5%로 뒤를 이었다.

(2) 현재흡연율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 현재흡연율은 전체 18.9%로 울산광역시의 18.7%보다 0.2%p 높았다.
- 성별 : 남자가 34.9%로 여자 1.8%보다 33.1%p 높았다.
- 연령대별 : 50대가 25.2%로 가장 높았고, 40대가 25.0%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 18.9%로 2023년 22.2%에 비해 3.3%p 감소하였으며, 2020년 20.5%에 비해 1.6%p 감소하였다.

(3) 남자 현재흡연율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 남자 현재흡연율은 전체 34.9%로 울산광역시의 33.6%보다 1.3%p 높았다.
- 연령대별 : 50대가 45.3%로 가장 높았고, 40대가 44.9%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 34.9%로 2023년 38.8%에 비해 3.9%p 감소하였으며, 2020년 38.2%에 비해 3.3%p 감소하였다.



〈그림 9〉 평생흡연율



〈그림 10〉 현재흡연율



〈그림 11〉 남자 현재흡연율


나. 궤련형 전자담배 흡연율

(1) 평생흡연율


- 궤련형 전자담배 평생흡연율은 전체 11.1%였다.
- 성별 : 남자가 20.0%로 여자 1.5%보다 18.5%p 높았다.
- 연령대별 : 30대가 22.9%로 가장 높았고, 50대가 14.5%로 뒤를 이었다.

(2) 현재흡연율

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 궤련형 전자담배 현재흡연율은 전체 4.4%로 울산광역시의 5.7%보다 1.3%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 8.5%였다.
- 연령대별 : 40대가 7.2%로 가장 높았고, 20대가 6.3%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 4.4%로 2023년 4.6%에 비해 0.2%p 감소하였으며, 2020년 1.6%에 비해 2.8%p 증가하였다.



〈그림 12〉 궐련형 전자담배 평생흡연율



〈그림 13〉 궐련형 전자담배 현재흡연율

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

다. 액상형 전자담배 사용률

(1) 평생사용률


- 액상형 전자담배 평생사용률은 전체 7.8%였다.
- 성별 : 남자가 13.7%로 여자 1.5%보다 12.2%p 높았다.
- 연령대별 : 30대가 15.0%로 가장 높았고, 20대가 14.3%로 뒤를 이었다.

(2) 현재사용률


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 액상형 전자담배 현재흡연율은 전체 2.4%로 울산광역시의 3.6%보다 1.2%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 4.3%로 여자 0.4%보다 3.9%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 5.2%로 가장 높았고, 30대가 3.8%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 2.4%로 2023년 4.2%에 비해 1.8%p 감소하였으며, 2020년 0.2%에 비해 2.2%p 증가하였다.

라. 담배제품 현재사용률


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 담배제품 현재 사용률은 전체 20.5%로 울산광역시의 21.4%보다 0.9%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 38.0%로 여자 1.8%보다 36.2%p 높았다.
- 연령대별 : 40대가 28.7%로 가장 높았고, 50대가 28.1%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 20.5%로 2023년 23.6%에 비해 3.1%p 감소하였으며, 2020년 21.4%에 비해 0.9%p 감소하였다.



〈그림 14〉 액상형 전자담배 평생사용률



〈그림 15〉 액상형 전자담배 현재사용률




〈그림 16〉 담배제품 현재사용률

마. 금연시도율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 현재흡연자의 금연 시도율은 전체 40.2%로 울산광역시의 45.5%보다 5.3%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 40.2%였다.
- 연령대별 : 50대가 44.1%로 가장 높았고, 40대가 43.3%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 40.2%로 2023년 49.9%에 비해 9.7%p 감소하였으며, 2020년 36.6%에 비해 3.6%p 증가하였다.

바. 간접흡연 노출률

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 현재비흡연자의 직장살내 간접흡연 노출률은 전체 11.1%로 울산광역시의 12.9%보다 1.8%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 17.4%로 여자 5.9%보다 11.5%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 18.3%로 가장 높았고, 50대가 14.9%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 11.1%로 2023년 14.6%에 비해 3.5%p 감소하였으며, 2020년 6.0%에 비해 5.1%p 증가하였다.



〈그림 17〉 현재흡연자의 금연시도율



〈그림 18〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률

요약

제 1 부 조사체계

제 2 부 주요통계결과

제 3 부 통계표

제 4 부 부록

2 음주

가. 월간음주율

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 월간음주율은 전체 57.1%로 울산광역시의 58.6%보다 1.5%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 71.2%로 여자 41.9%보다 29.3%p 높았다.
- 연령대별 : 40대가 69.8%로 가장 높았고, 20대가 67.8%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 57.1%로 2023년 53.3%에 비해 3.8%p 증가하였으며, 2020년 52.6%에 비해 4.5%p 증가하였다.


나. 고위험음주율

(1) 고위험음주율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 고위험음주율은 전체 12.6%로 울산광역시의 13.3%보다 0.7%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 20.5%로 여자 4.0%보다 16.5%p 높았다.
- 연령대별 : 40대가 19.4%로 가장 높았고, 50대가 16.9%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 12.6%로 2023년 14.3%에 비해 1.7%p 감소하였으며, 2020년 7.9%에 비해 4.7%p 증가하였다.

(2) 연간음주자의 고위험음주율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간음주자의 고위험음주율은 전체 16.2%로 울산광역시의 17.5%보다 1.3%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 24.1%로 여자 5.8%보다 18.3%p 높았다.
- 연령대별 : 40대가 21.6%로 가장 높았고, 50대가 21.3%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 16.2%로 2023년 20.1%에 비해 3.9%p 감소하였으며, 2020년 11.1%에 비해 5.1%p 증가하였다.



〈그림 19〉 월간음주율




〈그림 20〉 고위험음주율



〈그림 21〉 연간음주자의 고위험음주율

다. 월간폭음률

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 월간폭음률은 전체 34.5%로 울산광역시의 37.5%보다 3.0%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 50.0%로 여자 17.8%보다 32.2%p 높았다.
- 연령대별 : 30대, 40대가 45.7%로 가장 높았고, 50대가 39.1%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 34.5%로 2023년 34.7%에 비해 0.2%p 감소하였으며, 2020년 29.0%에 비해 5.5%p 증가하였다.



〈그림 22〉 월간폭음률

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

3 신체활동

가. 신체활동 실천율

(1) 고강도 신체활동 실천율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 고강도 신체활동 실천율은 전체 17.0%로 울산광역시의 20.1%보다 3.1%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 21.1%로 여자 12.7%보다 8.4%p 높았다.
- 연령대별 : 30대가 26.7%로 가장 높았고, 20대가 23.4%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 17.0%로 2023년 16.4%에 비해 0.6%p 증가하였으며, 2020년 10.2%에 비해 6.8%p 증가하였다.

(3) 중강도 이상 신체활동 실천율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 중강도 이상 신체활동 실천율은 전체 24.4%로 울산광역시의 27.4%보다 3.0%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 29.2%로 여자 19.2%보다 10.0%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 32.6%로 가장 높았고, 30대가 31.6%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 24.4%로 2023년 21.4%에 비해 3.0%p 증가하였으며, 2020년 23.8%에 비해 0.6%p 증가하였다.

(2) 중강도 신체활동 실천율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 중강도 신체활동 실천율은 전체 12.1%로 울산광역시의 13.4%보다 1.3%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 14.4%로 여자 9.6%보다 4.8%p 높았다.
- 연령대별 : 40대가 13.8%로 가장 높았고, 60대가 13.5%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 12.1%로 2023년 8.5%에 비해 3.6%p 증가하였으며, 2020년 17.2%에 비해 5.1%p 감소하였다.



〈그림 23〉 고강도 신체활동 실천율




〈그림 24〉 중강도 신체활동 실천율



〈그림 25〉 중강도 이상 신체활동 실천율

나. 걷기 실천율

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 걷기 실천율은 전체 53.0%로 울산광역시의 55.1%보다 2.1%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 55.6%로 여자 50.2%보다 5.4%p 높았다.
- 연령대별 : 60대가 59.3%로 가장 높았고, 20대가 54.7%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 53.0%로 2023년 43.0%에 비해 10.0%p 증가하였으며, 2020년 37.0%에 비해 16.0%p 증가하였다.



〈그림 26〉 건기 실천율

요약

제 1 부
조사체계


제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

가. 건강생활실천율

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 건강생활실천율은 전체 38.5%로 울산광역시의 40.6%보다 2.1%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 29.9%로 여자 47.8%보다 17.9%p 낮았다.
- 연령대별 : 60대가 45.8%로 가장 높았고, 20대가 43.7%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 38.5%로 2023년 30.5%에 비해 8.0%p 증가하였으며, 2020년 28.1%에 비해 10.4%p 증가하였다.



〈그림 27〉 건강생활실천율

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

5 비만 및 체중조절

가. 비만율(자가보고)


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 비만율(자가보고)은 전체 33.4%로 울산광역시의 33.7%보다 0.3%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 42.0%로 여자 24.1%보다 17.9%p 높았다.
- 연령대별 : 30대가 40.0%로 가장 높았고, 60대가 35.3%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 33.4%로 2023년 34.5%에 비해 1.1%p 감소하였으며, 2020년 29.0%에 비해 4.4%p 증가하였다.

다. 연간 체중조절 시도율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간 체중조절 시도율은 전체 56.6%로 울산광역시의 65.2%보다 8.6%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 51.0%로 여자 62.6%보다 11.6%p 낮았다.
- 연령대별 : 30대가 66.3%로 가장 높았고, 20대가 64.4%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 56.6%로 2023년 64.9%에 비해 8.3%p 감소하였으며, 2020년 47.2%에 비해 9.4%p 증가하였다.

나. 주관적 비만인지율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 주관적 비만인지율은 전체 46.6%로 울산광역시의 44.9%보다 1.7%p 높았다.
- 성별 : 남자가 46.0%로 여자 47.3%보다 1.3%p 낮았다.
- 연령대별 : 50대가 54.7%로 가장 높았고, 40대가 49.9%로 뒤를 이었다.
- 4년간 비교 : 2024년 46.6%로 2023년 42.3%에 비해 4.3%p 증가하였으며, 2021년 33.7%에 비해 12.9%p 증가하였다.



〈그림 28〉 비만을(자각보고)



〈그림 29〉 주관적 비만인식



〈그림 30〉 연간 체중조절 시도율

요약

제 1 부 조사체계

제 2 부 주요통계결과

제 3 부 통계표

제 4 부 부록

6 식생활

가. 아침식사 빈도


- 아침식사 빈도는 주 5-7회가 56.7%로 가장 높았고, 거의 안한다(0일)가 24.2%로 뒤를 이었다.

나. 아침식사 실천율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 아침식사 실천율은 전체 56.7%로 울산광역시의 54.0%보다 2.7%p 높았다.
- 성별 : 남자가 56.8%로 여자 56.6%보다 0.2%p 높았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 92.8%로 가장 높았고, 60대가 86.7%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 56.7%로 2023년 55.0%에 비해 1.7%p 증가하였으며, 2020년 65.4%에 비해 8.7%p 감소하였다.

다. 영양표시 활용률


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 영양표시 활용률은 전체 83.1%로 울산광역시의 83.7%보다 0.6%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 80.8%로 여자 84.5%보다 3.7%p 낮았다.
- 연령대별 : 30대가 89.5%로 가장 높았고, 60대가 86.4%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 83.1%로 2023년 83.8%에 비해 0.7%p 감소하였으며, 2020년 81.8%에 비해 1.3%p 증가하였다.



〈그림 31〉 아침식사 빈도



〈그림 32〉 아침 식사 실천율



〈그림 33〉 영양표시 활용률

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록


7 정신건강

가. 스트레스 인지율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 스트레스 인지율은 전체 17.5%로 울산광역시의 20.3%보다 2.8%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 15.1%로 여자 20.2%보다 5.1%p 낮았다.
- 연령대별 : 40대가 24.4%로 가장 높았고, 30대가 18.6%로 뒤를 이었다
- 5년간 비교 : 2024년 17.5%로 2023년 21.5%에 비해 4.0%p 감소하였으며, 2020년 18.6%에 비해 1.1%p 감소하였다.

나. 우울감 경험률

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 우울감 경험률은 전체 7.5%로 울산광역시와 같았다.
- 성별 : 남자가 5.5%로 여자 9.7%보다 4.2%p 낮았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 16.0%로 가장 높았고, 50대가 7.6%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 7.5%로 2023년 9.2%에 비해 1.7%p 감소하였으며, 2020년 1.4%에 비해 6.1%p 증가하였다.



〈그림 34〉 스트레스 인지율



〈그림 35〉 우울감 경험률

8 구강건강

가. 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 전체 26.2%로 울산광역시의 25.3%보다 0.9%p 높았다.
- 성별 : 남자가 28.5%로 여자 23.8%보다 4.7%p 높았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 41.0%로 가장 높았고, 50대가 29.8%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 26.2%로 2023년 28.2%에 비해 2.0%p 감소하였으며, 2020년 17.9%에 비해 8.3%p 증가하였다.

다. 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율은 전체 64.8%로 울산광역시의 69.7%보다 4.9%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 56.9%로 여자 73.2%보다 16.3%p 낮았다.
- 연령대별 : 30대가 74.0%로 가장 높았고, 20대가 71.5%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 64.8%로 2020년, 2023년 61.0%에 비해 3.8%p 증가하였다.

나. 저작불편호소율(65세 이상)


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 65세 이상 노인의 저작불편호소율은 전체 26.5%로 울산광역시의 30.0%보다 3.5%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 26.4%로 여자 26.5%보다 0.1%p 낮았다.
- 5년간 비교 : 2024년 26.5%로 2023년 26.4%에 비해 0.1%p 증가하였으며, 2020년 29.6%에 비해 3.1%p 감소하였다.



〈그림 36〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율



〈그림 37〉 저작불편호소율(≥65)




〈그림 38〉 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율

9 활동제한 및 삶의 질

가. 주관적 건강인지율

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 주관적 건강인지율은 전체 43.6%로 울산광역시의 41.9%보다 1.7%p 높았다.
- 성별 : 남자가 48.6%로 여자 38.2%보다 10.4%p 높았다.
- 연령대별 : 30대가 60.0%로 가장 높았고, 20대가 54.2%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 43.6%로 2023년 43.4%에 비해 0.2%p 증가하였으며, 2020년 54.2%에 비해 10.6%p 감소하였다.



〈그림 39〉 주관적 건강인지율

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

10 안전의식

가. 운전자석 안전벨트 착용률


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 운전자석 안전벨트 착용률은 전체 89.7%로 울산광역시의 91.4%보다 1.7%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 87.1%로 여자 93.6%보다 6.5%p 낮았다.
- 연령대별 : 60대가 94.2%로 가장 높았고, 20대가 91.6%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 89.7%로 2023년과 같았으며, 2020년 98.0%에 비해 8.3%p 감소하였다.

다. 음주운전 경험률


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률은 전체 2.1%로 울산광역시의 1.3%보다 0.8%p 높았다.
- 성별 : 남자가 3.6%였다.
- 연령대별 : 70대 이상이 4.9%로 가장 높았고, 60대가 3.5%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 2.1%로 2023년 4.5%에 비해 2.4%p 감소하였으며, 2020년 1.5%에 비해 0.6%p 증가하였다.

나. 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률은 전체 28.1%로 울산광역시의 27.9%보다 0.2%p 높았다.
- 성별 : 남자가 25.6%로 여자 30.6%보다 5.0%p 낮았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 36.0%로 가장 높았고, 40대가 33.9%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 28.1%로 2023년 26.6%에 비해 1.5%p 증가하였으며, 2020년 29.7%에 비해 1.6%p 감소하였다.



〈그림 40〉 운전자석 안전벨트 착용률



〈그림 41〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률



〈그림 42〉 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률



II. 이환 및 의료이용

1. 주요 질환별 진단 경험률 및 관리행태
2. 의료이용
3. 예방접종 및 검진
4. 보건기관 이용
5. 심폐소생술

II. 이환 및 의료이용

1 주요 질환별 진단 경험을 및 관리행태

가. 고혈압

(1) 혈압수치 인지율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 혈압수치 인지율은 전체 62.4%로 울산광역시의 63.0%보다 0.6%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 67.9%로 여자 56.4%보다 11.5%p 높았다.
- 연령대별 : 50대가 76.4%로 가장 높았고, 60대가 70.2%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 62.4%로 2023년 63.3%에 비해 0.9%p 감소하였으며, 2020년 31.9%에 비해 30.5%p 증가하였다.

(3) 고혈압 진단 경험자의 치료율(30세 이상)


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥ 30)은 전체 92.9%로 울산광역시의 94.2%보다 1.3%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 92.1%로 여자 93.7%보다 1.6%p 낮았다.
- 연령대별 : 60대가 95.5%로 가장 높았고, 70대 이상이 95.1%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 92.9%로 2023년 89.8%에 비해 3.1%p 증가하였으며, 2020년 96.4%에 비해 3.5%p 감소하였다.

(2) 고혈압 진단 경험률(30세 이상)


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 고혈압 진단 경험률(≥ 30)은 전체 28.9%로 울산광역시의 25.6%보다 3.3%p 높았다.
- 성별 : 남자가 27.7%로 여자 30.1%보다 2.4%p 낮았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 60.1%로 가장 높았고, 60대가 40.5%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 28.9%로 2023년 28.8%에 비해 0.1%p 증가하였으며, 2020년 20.5%에 비해 8.4%p 증가하였다.



〈그림 43〉 혈압수치 인지율



〈그림 44〉 고혈압 진단 경험률(≥30)



〈그림 45〉 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30)

나. 당뇨병

(1) 혈당수치 인지율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 혈당수치 인지율은 전체 26.7%로 울산광역시의 25.5%보다 1.2%p 높았다.
- 성별 : 남자가 26.9%로 여자 26.5%보다 0.4%p 높았다.
- 연령대별 : 50대가 37.3%로 가장 높았고, 60대가 32.0%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 26.7%로 2023년 23.8%에 비해 2.9%p 증가하였으며, 2020년 11.8%에 비해 14.9%p 증가하였다.

(3) 당뇨병 진단 경험자의 치료율(30세 이상)


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥ 30)은 전체 92.5%로 울산광역시의 94.5%보다 2.0%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 92.9%로 여자 91.8%보다 1.1%p 높았다.
- 연령대별 : 60대가 100.0%로 가장 높았고, 70대 이상이 94.9%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 92.5%로 2023년 89.0%에 비해 3.5%p 증가하였으며, 2020년 100.0%에 비해 7.5%p 감소하였다.

(2) 당뇨병 진단 경험률(30세 이상)


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 당뇨병 진단 경험률(≥ 30)은 전체 11.0%로 울산광역시의 11.2%보다 0.2%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 13.2%로 여자 8.6%보다 4.6%p 높았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 22.0%로 가장 높았고, 60대가 16.1%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 11.0%로 2023년 12.7%에 비해 1.7%p 감소하였으며, 2020년 10.9%에 비해 0.1%p 증가하였다.



〈그림 46〉 혈당수치 인지율



〈그림 47〉 당뇨병 진단 경험률(≥30)



〈그림 48〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30)

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표


제 4 부
부록

(4) 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사
수진율(30세 이상))


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥ 30)은 전체 36.8%로 울산광역시의 42.7%보다 5.9%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 39.9%로 여자 31.8%보다 8.1%p 높았다.
- 연령대별 : 50대가 48.8%로 가장 높았고, 60대가 42.1%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 36.8%로 2023년 39.4%에 비해 2.6%p 감소하였으며, 2020년 42.3%에 비해 5.5%p 감소하였다.

(5) 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사(미세
단백뇨검사) 수진율(30세 이상)

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥ 30)은 전체 48.3%로 울산광역시의 46.2%보다 2.1%p 높았다.
- 성별 : 남자가 49.7%로 여자 46.1%보다 3.6%p 높았다.
- 연령대별 : 60대가 57.2%로 가장 높았고, 50대가 48.4%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 48.3%로 2023년 54.1%에 비해 5.8%p 감소하였으며, 2020년 52.7%에 비해 4.4%p 감소하였다.



〈그림 49〉 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율(≥30)



〈그림 50〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥30)

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록


다. 건강지식

(1) 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 뇌졸중(중풍) 조기 증상 인지율은 전체 64.5%로 울산광역시의 58.4%보다 6.1%p 높았다.
- 성별 : 남자가 59.4%로 여자 69.7%보다 10.3%p 낮았다.
- 연령대별 : 60대가 73.2%로 가장 높았고, 50대가 67.4%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 64.5%로 2023년 60.4%에 비해 4.1%p 증가하였으며, 2020년 74.8%에 비해 10.3%p 감소하였다.

(2) 심근경색증 조기증상 인지율

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 심근경색증 조기증상 인지율은 전체 49.7%로 울산광역시의 48.5%보다 1.2%p 높았다.
- 성별 : 남자가 45.0%로 여자 54.7%보다 9.7%p 낮았다.
- 연령대별 : 60대가 58.2%로 가장 높았고, 50대가 51.5%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 49.7%로 2023년 48.4%에 비해 1.3%p 증가하였으며, 2020년 68.0%에 비해 18.3%p 감소하였다.



〈그림 51〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율




〈그림 52〉 심근경색증 조기증상 인지율

2 의료이용

가. 연간 미충족의료율

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간 미충족의료율 (병의원)은 전체 6.0%로 울산광역시의 6.9%보다 0.9%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 5.6%로 여자 6.5%보다 0.9%p 낮았다.
- 연령대별 : 40대가 10.5%로 가장 높았고, 50대가 6.3%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 6.0%로 2023년 5.3%에 비해 0.7%p 증가하였으며, 2020년 4.4%에 비해 1.6%p 증가하였다.



〈그림 53〉 연간 미충족의료율(병의원)

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과


제 3 부
통계표

제 4 부
부록

3 예방접종 및 검진

가. 연간 인플루엔자 예방접종률

- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간 인플루엔자 예방접종률은 전체 49.0%로 울산광역시의 48.6%보다 0.4%p 높았다.
- 성별 : 남자가 46.4%로 여자 51.8%보다 5.4%p 낮았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 94.1%로 가장 높았고, 60대가 72.1%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 49.0%로 2023년 50.5%에 비해 1.5%p 감소하였으며, 2020년 43.2%에 비해 5.8%p 증가하였다.



〈그림 54〉 연간 인플루엔자 예방접종률


요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

4 보건기관 이용

가. 보건기관 이용률

- 연간 보건기관 이용률은 전체 23.8%였다.
- 성별 : 남자가 15.8%로 여자 32.5%보다 16.7%p 낮았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 46.9%로 가장 높았고, 60대가 27.7%로 뒤를 이었다.



〈그림 55〉 연간 보건기관 이용률

요
약

제 1
부
조사
체
계

제 2
부
주
요
통
계
결
과


제 3
부
통
계
표

제 4
부
부
록

5 심폐소생술

가. 심폐소생술 인지율

- 심폐소생술 인지율은 전체 97.4%였다.
- 성별 : 남자가 98.7%로 여자 96.0%에 비해 2.7%p 높았다.
- 연령대별 : 20대가 100.0%로 가장 높았고, 30대가 99.2%로 뒤를 이었다.



〈그림 56〉 심폐소생술 인지율

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록



Ⅲ. 사고 및 중독

1. 사고 및 중독

Ⅲ. 사고 및 중독


1 사고 및 중독

가. 연간 사고 및 중독 경험률


- 울산광역시와 비교 : 울주군의 연간 사고 및 중독 경험률은 전체 6.1%로 울산광역시의 7.0%보다 0.9%p 낮았다.
- 성별 : 남자가 6.5%로 여자 5.6%보다 0.9%p 높았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 9.3%로 가장 높았고, 30대가 7.0%로 뒤를 이었다.
- 5년간 비교 : 2024년 6.1%로 2023년 7.2%에 비해 1.1%p 감소하였으며, 2020년 3.6%에 비해 2.5%p 증가하였다.

나. 연간 사고 및 중독 건수율

- 연간 사고 및 중독 건수율은 전체 67.8건이었다.
- 성별 : 남자가 75.6건으로 여자 59.4건보다 16.2건 많았다.
- 연령대별 : 70대 이상이 116.4건으로 가장 높았고, 30대가 93.6건으로 뒤를 이었다.



〈그림 57〉 연간 사고 및 중독 경험률



〈그림 58〉 연간 사고 및 중독 건수를




03

제3부 통계표

I. 통계표

2024
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY



I. 통계표

I. 통계표

〈표 1〉 평생흡연율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	40.6(1.5)	3.7	453	73.1(2.5)	3.5	456	5.8(1.2)	21.3
연령									
19-29	67	15.7(4.3)	27.2	33	23.0(6.6)	28.6	34	6.1(4.0)	66.7
30-39	103	37.9(4.7)	12.3	51	63.5(7.0)	11.1	52	6.8(3.6)	53.1
40-49	134	48.5(3.8)	7.9	68	83.1(4.1)	5.0	66	11.1(3.7)	33.4
50-59	218	49.9(2.8)	5.5	108	91.7(2.8)	3.1	110	5.0(2.3)	45.0
60-69	223	42.3(2.7)	6.4	115	83.6(3.6)	4.3	108	1.8(1.3)	68.4
70 이상	164	39.2(3.5)	8.8	78	77.6(5.9)	7.5	86	4.8(2.4)	49.9
19-64	643	40.8(1.9)	4.6	322	71.1(2.9)	4.1	321	6.7(1.5)	22.9
65 이상	266	40.3(2.6)	6.5	131	80.7(4.1)	5.0	135	2.9(1.5)	50.5
교육수준 ²⁾									
무학	33	21.6(6.3)	29.3	5	—(—)	—	28	6.6(4.6)	69.4
초등학교	88	38.2(4.9)	12.7	35	85.7(6.3)	7.3	53	3.3(2.3)	71.4
중학교	101	30.7(4.4)	14.3	38	73.4(7.5)	10.2	63	4.8(2.5)	52.7
고등학교	376	44.1(2.6)	5.9	199	77.1(3.9)	5.1	177	6.0(1.8)	30.7
대학교 이상	311	41.1(3.0)	7.3	176	66.8(4.2)	6.2	135	6.3(2.1)	33.2
직업									
전문행정관리	136	41.7(4.4)	10.4	76	66.5(5.9)	8.9	60	8.6(3.6)	42.1
사무직	81	44.9(5.8)	13.0	50	71.4(6.8)	9.5	31	6.0(4.3)	71.1
판매·서비스직	115	36.3(4.8)	13.2	34	87.9(6.2)	7.1	81	10.6(3.3)	30.8
농림어업	45	47.0(7.3)	15.4	25	89.3(7.5)	8.3	20	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	226	63.2(3.5)	5.6	161	84.7(3.0)	3.6	65	4.2(3.1)	73.9
기타 ³⁾	306	23.4(2.2)	9.5	107	55.0(5.0)	9.0	199	3.5(1.5)	44.2
월 가구소득									
100만원 미만	49	28.4(5.1)	17.8	18	—(—)	—	31	3.0(2.9)	97.6
100-200만원 미만	116	41.0(3.6)	8.8	56	72.6(7.3)	10.1	60	7.8(3.2)	41.5
200-300만원 미만	107	42.4(4.1)	9.7	53	75.2(4.9)	6.6	54	10.4(4.5)	43.1
300-400만원 미만	114	41.5(5.0)	12.0	57	74.5(6.0)	8.1	57	6.2(3.6)	58.4
400만원 이상	521	40.9(2.2)	5.3	267	73.0(3.1)	4.3	254	4.7(1.6)	34.2

주 : 1) 평생흡연율 : (평생 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 2〉 현재흡연율¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	18.9(1.4)	7.4	453	34.9(2.4)	6.9	456	1.8(0.7)	40.2
연령									
19-29	67	14.3(4.2)	29.1	33	23.0(6.6)	28.6	34	3.0(2.9)	96.4
30-39	103	23.2(4.3)	18.7	51	42.3(7.1)	16.9	52	0.0(0.0)	.
40-49	134	25.0(4.3)	17.1	68	44.9(6.3)	14.1	66	3.6(2.5)	71.4
50-59	218	25.2(3.0)	12.0	108	45.3(5.1)	11.3	110	3.5(1.9)	56.2
60-69	223	14.2(2.1)	14.8	115	28.6(3.9)	13.7	108	0.0(0.0)	.
70 이상	164	7.8(2.0)	25.4	78	16.4(4.3)	26.0	86	0.0(0.0)	.
19-64	643	21.7(1.8)	8.4	322	39.0(3.0)	7.7	321	2.4(1.0)	40.3
65 이상	266	9.3(1.6)	17.7	131	19.4(3.5)	17.9	135	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	33	10.3(4.4)	43.0	5	-(-)	-	28	0.0(0.0)	.
초등학교	88	13.1(3.3)	25.0	35	30.9(6.8)	21.8	53	0.0(0.0)	.
중학교	101	15.2(3.7)	24.1	38	38.2(8.6)	22.5	63	1.3(0.2)	12.7
고등학교	376	20.8(2.2)	10.4	199	36.7(3.6)	9.7	177	2.6(1.4)	55.0
대학교 이상	311	19.5(2.5)	12.9	176	32.6(3.7)	11.4	135	1.8(1.3)	73.5
직업									
전문행정관리	136	21.2(3.5)	16.5	76	35.2(5.8)	16.5	60	2.4(2.5)	100.5
사무직	81	19.7(5.2)	26.6	50	31.1(7.7)	24.8	31	2.9(3.0)	102.0
판매·서비스직	115	19.7(4.1)	20.6	34	57.5(7.5)	13.1	81	0.9(0.9)	100.4
농림어업	45	8.8(3.6)	40.4	25	16.8(7.4)	44.1	20	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	226	31.7(3.2)	10.1	161	41.7(4.1)	9.8	65	4.2(3.1)	73.9
기타 ³⁾	306	9.2(1.7)	18.9	107	21.9(3.8)	17.4	199	1.1(0.8)	66.6
월 가구소득									
100만원 미만	49	9.6(4.5)	47.0	18	-(-)	-	31	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	116	17.1(3.2)	18.5	56	33.4(6.2)	18.5	60	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	107	18.4(4.1)	22.1	53	32.2(6.7)	20.8	54	5.0(3.6)	72.8
300-400만원 미만	114	18.4(4.0)	21.9	57	33.1(6.6)	19.9	57	2.7(2.6)	96.7
400만원 이상	521	19.9(2.2)	10.8	267	36.2(3.5)	9.5	254	1.6(0.8)	50.9

주 : 1) 현재흡연율 : (평생 일반담배(필련)를 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 3〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량¹⁾

(단위: %, 개비)

구분	N	10개비 미만		10-19개비		20-39개비		40개비 이상		평균	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	개비 (표준오차)	상대 표준오차
전체	152	11.8(2.8)	23.7	46.9(4.0)	8.5	39.0(4.1)	10.6	2.2(1.3)	56.1	15.3(0.6)	4.2
성											
남자	146	11.8(2.9)	24.5	45.7(4.0)	8.7	40.2(4.2)	10.5	2.3(1.3)	55.9	15.5(0.7)	4.2
여자	6	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
연령											
19-29	9	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
30-39	20	17.3(7.4)	42.5	69.2(9.5)	13.8	13.5(7.0)	51.8	0.0(0.0)	.	12.1(0.9)	7.3
40-49	31	5.5(5.3)	96.5	62.3(10.3)	16.5	28.8(10.0)	34.6	3.3(3.3)	98.1	14.7(1.7)	11.6
50-59	50	15.0(4.8)	31.7	31.6(6.7)	21.1	48.7(6.4)	13.0	4.7(3.2)	68.7	16.9(1.2)	7.2
60-69	31	13.8(6.6)	47.5	22.5(8.5)	37.9	63.7(10.0)	15.8	0.0(0.0)	.	17.1(1.5)	8.5
70 이상	11	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
19-64	129	12.6(3.1)	25.0	48.6(4.0)	8.3	36.3(4.2)	11.6	2.5(1.4)	56.5	15.1(0.7)	4.4
65 이상	23	5.6(3.7)	65.9	33.2(10.0)	30.2	61.2(11.2)	18.3	0.0(0.0)	.	17.2(1.7)	9.6
교육수준 ²⁾											
무학	3	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
초등학교	9	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
중학교	13	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
고등학교	71	14.4(4.6)	31.8	43.3(6.3)	14.5	42.3(6.2)	14.7	0.0(0.0)	.	14.9(0.8)	5.4
대학교 이상	56	8.9(3.2)	36.3	56.3(6.6)	11.8	31.3(6.7)	21.5	3.6(2.4)	67.8	15.0(0.9)	6.1
직업											
전문행정관리	27	19.8(7.5)	37.9	55.1(8.8)	15.9	20.9(7.8)	37.1	4.2(4.0)	95.4	13.8(1.4)	10.3
사무직	17	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
판매·서비스직	18	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
농림어업	4	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
기능단순노무직	61	8.1(3.3)	40.8	41.3(6.6)	16.0	48.5(7.7)	15.8	2.0(2.0)	100.6	16.4(1.1)	6.7
기타 ³⁾	25	8.7(5.2)	60.1	54.0(11.4)	21.1	37.3(10.6)	28.3	0.0(0.0)	.	14.7(1.0)	6.8
월 가구소득											
100만원 미만	6	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
100-200만원 미만	18	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
200-300만원 미만	15	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
300-400만원 미만	17	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—	—(—)	—
400만원 이상	96	10.3(3.2)	31.0	45.6(4.9)	10.8	42.0(5.4)	12.9	2.1(1.4)	67.3	15.7(0.8)	4.9

주 : 1) 매일흡연자의 하루 평균 흡연량 : (하루 평균 흡연 개비 수의 총 합 / 평생 일반담배(궤련)를 5갑(100개비) 이상 피운 매일흡연자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 4〉 과거 흡연자의 금연기간¹⁾ (단위 : %)

구분	N	1년 미만		1년~5년 미만		5년~10년 미만		10년~15년 미만		15년~20년 미만		20년 이상	
		%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대
		(표준오차)	(표준오차)	(표준오차)	(표준오차)	(표준오차)	(표준오차)	(표준오차)	(표준오차)	(표준오차)	(표준오차)	(표준오차)	(표준오차)
전체	217	5.5(1.7)	31.4	14.6(2.7)	18.6	14.0(2.4)	17.3	12.0(2.2)	18.5	15.0(2.7)	17.9	38.7(3.4)	8.7
성													
남자	199	6.1(1.9)	31.1	14.2(2.6)	18.1	13.6(2.6)	19.3	11.5(2.1)	18.7	14.9(2.7)	18.3	39.7(3.7)	9.2
여자	18	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
연령													
19-29	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	32	17.1(6.7)	39.1	15.5(6.8)	43.8	20.1(7.0)	34.7	17.3(6.4)	37.1	21.8(7.7)	35.2	8.2(4.5)	54.4
50-59	51	5.0(2.5)	49.6	18.5(6.6)	35.7	11.6(4.0)	34.7	18.0(5.0)	27.8	20.2(4.9)	24.4	26.8(7.8)	29.1
60-69	68	1.8(1.4)	74.9	8.2(3.9)	46.8	10.4(4.0)	38.1	4.7(2.5)	54.6	13.2(4.5)	33.7	61.6(7.1)	11.5
70 이상	52	0.0(0.0)	.	9.7(5.2)	53.8	3.3(2.4)	72.0	4.6(2.8)	60.3	8.8(3.2)	36.1	73.6(6.2)	8.4
19-64	131	7.5(2.5)	33.3	16.2(3.7)	22.8	18.2(3.5)	19.5	15.7(3.2)	20.3	16.2(3.5)	21.5	26.2(3.8)	14.6
65 이상	86	1.5(1.1)	74.9	11.4(4.1)	36.4	5.3(2.2)	42.4	4.2(2.2)	51.7	12.6(3.2)	25.5	65.1(5.5)	8.5
교육수준 ²⁾													
무학	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	23	3.8(3.7)	98.1	18.6(10.5)	56.4	7.3(5.0)	68.6	3.9(3.9)	101.3	10.4(6.9)	66.3	56.1(11.0)	19.5
중학교	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	100	6.9(2.9)	42.9	11.2(3.7)	33.1	15.5(3.8)	24.5	12.7(3.4)	26.3	13.7(3.5)	25.5	40.0(5.0)	12.6
대학교 이상	74	5.6(2.5)	45.4	19.7(5.1)	25.8	14.7(4.2)	28.7	15.5(4.5)	29.0	17.5(5.3)	30.2	27.0(5.8)	21.3
직업													
전문행정관리	33	4.0(4.0)	100.5	13.6(6.9)	50.8	15.5(6.4)	41.5	10.6(5.9)	55.7	21.8(5.9)	27.0	34.5(8.9)	25.7
사무직	20	14.5(8.0)	54.9	20.7(10.7)	51.4	18.2(9.8)	53.5	13.1(7.3)	56.2	18.6(8.3)	44.6	14.8(8.4)	56.6
판매·서비스직	21	3.2(3.1)	98.9	5.1(5.0)	96.9	42.5(11.9)	28.1	14.4(8.2)	57.0	7.7(6.2)	81.1	27.1(9.2)	34.0
농림어업	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	73	8.0(4.0)	50.4	12.5(4.3)	34.8	8.3(2.9)	34.8	18.4(4.7)	25.7	17.3(5.4)	31.2	35.5(5.8)	16.4
기타 ³⁾	51	0.0(0.0)	.	19.3(6.6)	34.3	6.9(4.2)	60.5	4.9(3.3)	67.2	5.5(3.2)	58.1	63.4(7.7)	12.1
월 가구소득													
100만원 미만	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100~200만원 미만	28	2.6(2.7)	101.7	20.6(9.0)	43.5	5.1(3.6)	70.3	6.0(3.7)	62.4	7.6(5.3)	68.8	58.1(10.3)	17.8
200~300만원 미만	29	0.0(0.0)	.	6.6(4.2)	64.6	15.7(7.6)	48.4	9.2(6.0)	65.2	17.7(6.2)	34.9	50.9(10.3)	20.2
300~400만원 미만	27	3.0(0.6)	19.3	16.6(9.2)	55.3	2.6(2.6)	100.2	20.6(8.2)	39.8	17.9(10.2)	56.9	39.3(10.3)	26.3
400만원 이상	123	8.0(2.8)	35.1	15.4(3.9)	25.6	18.1(3.5)	19.6	12.7(3.1)	24.7	16.3(3.7)	22.9	29.5(3.9)	13.2

주 : 1) 과거 흡연자의 금연기간 : (응답보가별 응답자 수 / 평생 5갑(100개비) 이상 피웠고 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는 사람의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 5〉 궤련형 전자담배 평생흡연율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	11.1(1.3)	11.8	453	20.0(2.4)	11.9	456	1.5(0.7)	44.8
연령									
19-29	67	14.3(4.2)	29.1	33	23.0(6.6)	28.6	34	3.0(2.9)	96.4
30-39	103	22.9(4.6)	20.2	51	39.3(7.1)	18.2	52	3.0(3.0)	98.0
40-49	134	13.2(2.8)	21.4	68	22.2(5.0)	22.5	66	3.5(2.5)	70.7
50-59	218	14.5(2.4)	16.5	108	27.3(4.5)	16.7	110	0.7(0.7)	99.1
60-69	223	1.9(0.9)	46.8	115	3.9(1.8)	46.6	108	0.0(0.0)	.
70 이상	164	1.6(1.0)	62.3	78	3.3(2.1)	62.5	86	0.0(0.0)	.
19-64	643	13.9(1.6)	11.4	322	24.5(2.8)	11.4	321	2.0(0.9)	44.5
65 이상	266	1.4(0.7)	51.4	131	3.0(1.5)	51.8	135	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	33	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	28	0.0(0.0)	.
초등학교	88	0.0(0.0)	.	35	0.0(0.0)	.	53	0.0(0.0)	.
중학교	101	1.7(1.2)	71.8	38	4.4(3.2)	70.9	63	0.0(0.0)	.
고등학교	376	12.1(2.0)	16.8	199	21.4(3.6)	16.9	177	1.3(1.0)	71.7
대학교 이상	311	15.1(2.2)	14.3	176	24.2(3.2)	13.1	135	2.8(1.6)	58.3
직업									
전문행정관리	136	17.4(3.0)	17.4	76	28.5(4.6)	16.1	60	2.4(2.5)	100.5
사무직	81	17.5(4.9)	27.8	50	29.5(7.6)	25.8	31	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	115	13.8(4.4)	32.2	34	33.1(10.5)	31.8	81	4.1(2.4)	58.4
농림어업	45	3.4(2.4)	69.2	25	6.5(4.7)	73.0	20	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	226	14.6(3.1)	21.5	161	18.9(4.0)	21.4	65	2.9(2.9)	98.9
기타 ³⁾	306	3.1(1.2)	39.7	107	8.1(3.1)	37.9	199	0.0(0.0)	.
월 가구소득									
100만원 미만	49	0.0(0.0)	.	18	-(-)	-	31	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	116	4.9(2.2)	44.5	56	9.5(4.3)	45.3	60	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	107	7.2(3.1)	43.2	53	11.1(5.3)	47.9	54	3.4(3.3)	96.4
300-400만원 미만	114	6.7(2.6)	38.1	57	11.1(4.3)	38.9	57	2.0(2.0)	100.2
400만원 이상	521	14.5(1.9)	13.2	267	26.0(3.2)	12.3	254	1.5(0.9)	59.8

주 : 1) 궤련형 전자담배 평생흡연율 : (평생 궤련형 전자담배를 흡연한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 6〉 궤련형 전자담배 현재흡연율¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	4.4(0.9)	19.6	453	8.5(1.6)	19.2	456	0.0(0.0)	.
연령									
19-29	67	6.3(3.0)	47.3	33	11.1(5.3)	48.2	34	0.0(0.0)	.
30-39	103	5.9(2.8)	47.9	51	10.8(5.0)	46.1	52	0.0(0.0)	.
40-49	134	7.2(2.3)	32.2	68	13.8(4.4)	31.8	66	0.0(0.0)	.
50-59	218	5.9(1.8)	30.3	108	11.3(3.4)	30.2	110	0.0(0.0)	.
60-69	223	1.0(0.7)	69.5	115	2.0(1.4)	69.4	108	0.0(0.0)	.
70 이상	164	0.0(0.0)	.	78	0.0(0.0)	.	86	0.0(0.0)	.
19-64	643	5.7(1.1)	19.1	322	10.8(2.0)	18.7	321	0.0(0.0)	.
65 이상	266	0.0(0.0)	.	131	0.0(0.0)	.	135	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	33	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	28	0.0(0.0)	.
초등학교	88	0.0(0.0)	.	35	0.0(0.0)	.	53	0.0(0.0)	.
중학교	101	0.0(0.0)	.	38	0.0(0.0)	.	63	0.0(0.0)	.
고등학교	376	5.5(1.4)	25.3	199	10.2(2.6)	25.1	177	0.0(0.0)	.
대학교 이상	311	5.5(1.5)	28.0	176	9.5(2.5)	26.7	135	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	136	6.0(2.0)	33.4	76	10.6(3.6)	33.8	60	0.0(0.0)	.
사무직	81	8.9(4.1)	46.0	50	15.0(6.6)	44.2	31	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	115	2.9(1.7)	58.3	34	8.8(5.0)	57.3	81	0.0(0.0)	.
농림어업	45	0.0(0.0)	.	25	0.0(0.0)	.	20	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	226	6.7(2.0)	29.1	161	9.1(2.5)	27.9	65	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	306	1.7(1.0)	61.4	107	4.4(2.7)	60.8	199	0.0(0.0)	.
월 가구소득									
100만원 미만	49	0.0(0.0)	.	18	-(-)	-	31	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	116	3.0(1.8)	60.4	56	5.9(3.6)	61.7	60	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	107	0.0(0.0)	.	53	0.0(0.0)	.	54	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	114	2.2(2.1)	97.1	57	4.2(3.9)	92.7	57	0.0(0.0)	.
400만원 이상	521	6.1(1.2)	20.2	267	11.6(2.3)	19.7	254	0.0(0.0)	.

주 : 1) 궤련형 전자담배 현재흡연율 : (평생 궤련형 전자담배를 흡연한 적이 있는 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
 2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
 3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 7〉 액상형 전자담배 평생사용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	7.8(1.1)	13.5	453	13.7(1.9)	13.9	456	1.5(0.8)	50.0
연령									
19-29	67	14.3(4.2)	29.1	33	19.6(6.2)	31.4	34	7.4(4.8)	64.7
30-39	103	15.0(3.6)	24.0	51	27.3(6.1)	22.2	52	0.0(0.0)	.
40-49	134	9.8(2.4)	24.6	68	15.6(4.3)	27.7	66	3.5(2.5)	70.7
50-59	218	7.7(1.7)	22.3	108	14.8(3.5)	23.5	110	0.0(0.0)	.
60-69	223	2.2(0.9)	43.4	115	4.4(1.9)	43.5	108	0.0(0.0)	.
70 이상	164	0.5(0.5)	99.4	78	1.1(1.1)	99.7	86	0.0(0.0)	.
19-64	643	10.0(1.3)	13.1	322	17.2(2.3)	13.7	321	2.0(1.0)	49.9
65 이상	266	0.3(0.3)	100.3	131	0.6(0.7)	101.1	135	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	33	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	28	0.0(0.0)	.
초등학교	88	0.9(0.9)	99.9	35	2.2(2.3)	101.7	53	0.0(0.0)	.
중학교	101	1.7(0.8)	48.8	38	4.5(2.1)	48.1	63	0.0(0.0)	.
고등학교	376	10.1(1.9)	19.1	199	17.0(3.2)	18.9	177	2.2(1.5)	69.3
대학교 이상	311	8.7(1.7)	19.4	176	13.7(2.7)	19.8	135	1.8(1.3)	72.5
직업									
전문행정관리	136	7.8(2.4)	31.1	76	11.8(3.5)	29.6	60	2.4(2.5)	100.5
사무직	81	7.1(3.2)	44.2	50	12.0(5.1)	42.1	31	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	115	10.8(4.2)	39.0	34	24.4(9.9)	40.8	81	4.1(3.0)	73.3
농림어업	45	2.8(2.8)	100.0	25	5.4(5.3)	97.8	20	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	226	14.9(2.8)	18.8	161	19.2(3.6)	18.8	65	2.9(2.9)	98.9
기타 ³⁾	306	2.3(1.0)	42.8	107	6.0(2.5)	41.3	199	0.0(0.0)	.
월 가구소득									
100만원 미만	49	0.0(0.0)	.	18	-(-)	-	31	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	116	4.0(2.1)	51.8	56	7.8(4.1)	52.9	60	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	107	6.7(2.9)	43.9	53	10.0(5.0)	49.4	54	3.4(3.3)	96.4
300-400만원 미만	114	5.8(2.0)	34.7	57	9.4(3.5)	37.4	57	2.0(2.0)	100.2
400만원 이상	521	9.6(1.5)	15.3	267	16.9(2.5)	14.8	254	1.5(1.1)	71.3

주 : 1) 액상형 전자담배 평생사용률 : (평생 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 8〉 액상형 전자담배 현재사용률¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	2.4(0.6)	25.0	453	4.3(1.0)	24.0	456	0.4(0.4)	98.9
연령									
19-29	67	5.2(2.9)	56.4	33	6.9(4.5)	65.1	34	3.0(2.9)	96.4
30-39	103	3.8(1.9)	49.2	51	7.0(3.4)	48.4	52	0.0(0.0)	.
40-49	134	2.8(1.6)	58.1	68	5.4(3.3)	60.1	66	0.0(0.0)	.
50-59	218	2.7(1.1)	41.5	108	5.2(2.2)	42.6	110	0.0(0.0)	.
60-69	223	0.5(0.5)	100.4	115	1.0(1.0)	100.7	108	0.0(0.0)	.
70 이상	164	0.0(0.0)	.	78	0.0(0.0)	.	86	0.0(0.0)	.
19-64	643	3.1(0.8)	24.8	322	5.4(1.3)	23.8	321	0.5(0.5)	98.6
65 이상	266	0.0(0.0)	.	131	0.0(0.0)	.	135	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	33	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	28	0.0(0.0)	.
초등학교	88	0.0(0.0)	.	35	0.0(0.0)	.	53	0.0(0.0)	.
중학교	101	0.8(0.8)	100.7	38	2.1(2.1)	98.8	63	0.0(0.0)	.
고등학교	376	3.6(1.2)	33.2	199	6.0(1.9)	31.5	177	0.9(0.9)	96.2
대학교 이상	311	2.1(0.9)	43.1	176	3.6(1.6)	43.3	135	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	136	5.3(2.2)	41.9	76	7.4(3.3)	44.3	60	2.4(2.5)	100.5
사무직	81	2.1(1.3)	64.6	50	3.5(2.2)	64.0	31	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	115	2.0(2.0)	101.0	34	5.9(5.6)	94.8	81	0.0(0.0)	.
농림어업	45	2.8(2.8)	100.0	25	5.4(5.3)	97.8	20	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	226	3.5(1.5)	44.0	161	4.7(2.0)	43.1	65	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	306	0.4(0.4)	100.1	107	0.9(0.9)	98.8	199	0.0(0.0)	.
월 가구소득									
100만원 미만	49	0.0(0.0)	.	18	-(-)	-	31	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	116	1.1(1.0)	98.2	56	2.1(2.0)	97.5	60	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	107	1.7(1.7)	98.9	53	0.0(0.0)	.	54	3.4(3.3)	96.4
300-400만원 미만	114	2.6(1.5)	58.2	57	5.0(2.9)	57.4	57	0.0(0.0)	.
400만원 이상	521	2.9(0.7)	25.2	267	5.4(1.4)	25.3	254	0.0(0.0)	.

주 : 1) 액상형 전자담배 현재사용률 : (최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부 조사체계

제 2 부 주요통계결과

제 3 부 통계표

제 4 부 부록

I. 통계표

〈표 9〉 평생 기타담배 사용 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	0.8(0.4)	44.7	453	1.3(0.6)	51.5	456	0.4(0.4)	98.9
연령									
19-29	67	2.6(1.8)	69.4	33	2.2(2.2)	99.1	34	3.0(2.9)	96.4
30-39	103	1.2(1.2)	97.2	51	2.2(2.0)	94.0	52	0.0(0.0)	.
40-49	134	0.0(0.0)	.	68	0.0(0.0)	.	66	0.0(0.0)	.
50-59	218	1.4(0.8)	58.3	108	2.8(1.6)	58.5	110	0.0(0.0)	.
60-69	223	0.0(0.0)	.	115	0.0(0.0)	.	108	0.0(0.0)	.
70 이상	164	0.0(0.0)	.	78	0.0(0.0)	.	86	0.0(0.0)	.
19-64	643	1.1(0.5)	44.8	322	1.6(0.8)	51.7	321	0.5(0.5)	98.6
65 이상	266	0.0(0.0)	.	131	0.0(0.0)	.	135	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	33	0.0(0.0)	.	5	-()	-	28	0.0(0.0)	.
초등학교	88	0.0(0.0)	.	35	0.0(0.0)	.	53	0.0(0.0)	.
중학교	101	0.8(0.8)	100.7	38	2.1(2.1)	98.8	63	0.0(0.0)	.
고등학교	376	1.2(0.7)	56.0	199	1.4(1.0)	71.2	177	0.9(0.9)	96.2
대학교 이상	311	0.7(0.5)	70.9	176	1.2(0.8)	71.3	135	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	136	1.0(1.1)	100.4	76	0.0(0.0)	.	60	2.4(2.5)	100.5
사무직	81	1.2(1.2)	101.0	50	1.9(1.9)	100.1	31	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	115	1.1(1.1)	98.5	34	3.3(3.1)	94.5	81	0.0(0.0)	.
농림어업	45	0.0(0.0)	.	25	0.0(0.0)	.	20	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	226	1.0(1.0)	99.4	161	1.4(1.4)	99.1	65	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	306	0.5(0.5)	99.0	107	1.2(1.2)	98.0	199	0.0(0.0)	.
월 가구소득									
100만원 미만	49	0.0(0.0)	.	18	-()	-	31	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	116	1.5(1.5)	99.4	56	3.0(3.0)	100.2	60	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	107	1.7(1.7)	98.9	53	0.0(0.0)	.	54	3.4(3.3)	96.4
300-400만원 미만	114	0.0(0.0)	.	57	0.0(0.0)	.	57	0.0(0.0)	.
400만원 이상	521	0.8(0.4)	51.0	267	1.5(0.7)	50.9	254	0.0(0.0)	.

주 : 1) 평생 기타담배 사용 경험률 : (평생 기타담배를 사용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 10〉 담배제품 현재사용률¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	20.5(1.4)	6.8	453	38.0(2.4)	6.4	456	1.8(0.7)	40.2
연령									
19-29	67	14.3(4.2)	29.1	33	23.0(6.6)	28.6	34	3.0(2.9)	96.4
30-39	103	25.2(4.1)	16.3	51	46.0(6.6)	14.5	52	0.0(0.0)	.
40-49	134	28.7(4.4)	15.2	68	52.0(6.6)	12.6	66	3.6(2.5)	71.4
50-59	218	28.1(2.9)	10.4	108	51.0(5.1)	9.9	110	3.5(1.9)	56.2
60-69	223	14.2(2.1)	14.8	115	28.6(3.9)	13.7	108	0.0(0.0)	.
70 이상	164	7.8(2.0)	25.4	78	16.4(4.3)	26.0	86	0.0(0.0)	.
19-64	643	23.8(1.8)	7.5	322	42.9(3.0)	7.0	321	2.4(1.0)	40.3
65 이상	266	9.3(1.6)	17.7	131	19.4(3.5)	17.9	135	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	33	10.3(4.4)	43.0	5	—(—)	—	28	0.0(0.0)	.
초등학교	88	13.1(3.3)	25.0	35	30.9(6.8)	21.8	53	0.0(0.0)	.
중학교	101	15.2(3.7)	24.1	38	38.2(8.6)	22.5	63	1.3(0.2)	12.7
고등학교	376	23.6(2.3)	9.7	199	41.8(3.8)	9.0	177	2.6(1.4)	55.0
대학교 이상	311	20.7(2.5)	12.2	176	34.6(3.7)	10.8	135	1.8(1.3)	73.5
직업									
전문행정관리	136	22.5(3.4)	14.9	76	37.6(5.5)	14.6	60	2.4(2.5)	100.5
사무직	81	22.2(5.3)	23.7	50	35.4(7.9)	22.4	31	2.9(3.0)	102.0
판매·서비스직	115	20.8(4.2)	20.1	34	60.6(7.5)	12.4	81	0.9(0.9)	100.4
농림어업	45	11.7(4.3)	36.6	25	22.2(8.5)	38.4	20	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	226	35.3(3.5)	10.0	161	46.7(4.2)	9.0	65	4.2(3.1)	73.9
기타 ³⁾	306	9.2(1.7)	18.9	107	21.9(3.8)	17.4	199	1.1(0.8)	66.6
월 가구소득									
100만원 미만	49	9.6(4.5)	47.0	18	—(—)	—	31	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	116	17.1(3.2)	18.5	56	33.4(6.2)	18.5	60	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	107	18.4(4.1)	22.1	53	32.2(6.7)	20.8	54	5.0(3.6)	72.8
300-400만원 미만	114	19.1(4.0)	20.8	57	34.4(6.5)	18.9	57	2.7(2.6)	96.7
400만원 이상	521	22.3(2.0)	9.1	267	40.7(3.2)	7.9	254	1.6(0.8)	50.9

주 : 1) 담배제품 현재사용률 : (평생 일반담배(궐련) 5갑(100개비) 이상 피웠고, 현재 일반담배(궐련)를 피운다고 응답한 사람 또는 현재 궐련형 전자담배를 사용한다고 응답한 사람 또는 최근 한 달 동안 액상형 전자담배를 사용한 적이 있다고 응답한 사람 또는 최근 한 달 동안 기타 담배를 사용한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 11〉 현재흡연자의 금연시도율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	175	40.2(4.4)	11.0	168	40.2(4.6)	11.4	7	-(-)	-
연령									
19-29	9	-(-)	-	8	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	24	36.6(10.6)	28.9	24	36.6(10.6)	28.9	0	-(-)	-
40-49	37	43.3(8.7)	20.0	35	43.6(8.4)	19.3	2	-(-)	-
50-59	60	44.1(6.9)	15.7	56	43.1(7.4)	17.1	4	-(-)	-
60-69	32	35.0(10.1)	28.9	32	35.0(10.1)	28.9	0	-(-)	-
70 이상	13	-(-)	-	13	-(-)	-	0	-(-)	-
19-64	150	39.5(4.6)	11.7	143	39.5(4.8)	12.1	7	-(-)	-
65 이상	25	46.3(10.6)	23.0	25	46.3(10.6)	23.0	0	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
초등학교	9	-(-)	-	9	-(-)	-	0	-(-)	-
중학교	15	-(-)	-	14	-(-)	-	1	-(-)	-
고등학교	85	49.2(5.7)	11.6	81	49.3(6.1)	12.3	4	-(-)	-
대학교 이상	63	27.9(6.4)	23.1	61	27.5(6.5)	23.6	2	-(-)	-
직업									
전문행정관리	30	34.0(8.7)	25.7	29	35.7(8.9)	25.0	1	-(-)	-
사무직	21	24.2(12.3)	50.9	20	19.9(9.8)	49.1	1	-(-)	-
판매·서비스직	19	-(-)	-	18	-(-)	-	1	-(-)	-
농림어업	5	-(-)	-	5	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	71	38.6(6.4)	16.7	69	39.8(6.6)	16.6	2	-(-)	-
기타 ³⁾	29	59.2(8.6)	14.5	27	58.6(9.8)	16.8	2	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	6	-(-)	-	6	-(-)	-	0	-(-)	-
100-200만원 미만	21	56.0(12.3)	21.9	21	56.0(12.3)	21.9	0	-(-)	-
200-300만원 미만	15	-(-)	-	13	-(-)	-	2	-(-)	-
300-400만원 미만	21	54.2(10.7)	19.8	20	50.9(10.9)	21.5	1	-(-)	-
400만원 이상	111	36.4(5.7)	15.6	107	36.1(5.7)	15.8	4	-(-)	-

주 : 1) 현재흡연자의 금연시도율 : (일반담배, 궤련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배의 현재흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 수 / 일반담배, 궤련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배의 현재흡연자(일반담배 및 궤련형 전자담배 “매일 피움” 또는 “가끔 피움”, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 “1일이상”)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 12〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	175	3.5(1.3)	36.7	168	3.0(1.2)	40.5	7	-(-)	-
연령									
19-29	9	-(-)	-	8	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	24	4.7(4.6)	97.5	24	4.7(4.6)	97.5	0	-(-)	-
40-49	37	3.2(2.4)	75.0	35	0.9(0.9)	100.3	2	-(-)	-
50-59	60	3.2(2.7)	84.3	56	3.4(2.8)	84.3	4	-(-)	-
60-69	32	1.5(0.2)	16.5	32	1.5(0.2)	16.5	0	-(-)	-
70 이상	13	-(-)	-	13	-(-)	-	0	-(-)	-
19-64	150	3.0(1.3)	43.9	143	2.5(1.3)	50.3	7	-(-)	-
65 이상	25	7.4(5.2)	71.1	25	7.4(5.2)	71.1	0	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
초등학교	9	-(-)	-	9	-(-)	-	0	-(-)	-
중학교	15	-(-)	-	14	-(-)	-	1	-(-)	-
고등학교	85	2.8(1.5)	55.8	81	2.9(1.6)	55.6	4	-(-)	-
대학교 이상	63	3.6(2.5)	69.8	61	2.2(2.2)	100.1	2	-(-)	-
직업									
전문행정관리	30	0.0(0.0)	.	29	0.0(0.0)	.	1	-(-)	-
사무직	21	8.9(5.1)	57.0	20	3.8(0.9)	24.9	1	-(-)	-
판매·서비스직	19	-(-)	-	18	-(-)	-	1	-(-)	-
농림어업	5	-(-)	-	5	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	71	2.1(2.0)	95.2	69	2.1(2.1)	97.3	2	-(-)	-
기타 ³⁾	29	11.6(5.5)	47.4	27	12.6(5.8)	46.2	2	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	6	-(-)	-	6	-(-)	-	0	-(-)	-
100-200만원 미만	21	3.9(3.8)	97.3	21	3.9(3.8)	97.3	0	-(-)	-
200-300만원 미만	15	-(-)	-	13	-(-)	-	2	-(-)	-
300-400만원 미만	21	3.6(3.6)	100.2	20	3.8(3.8)	100.3	1	-(-)	-
400만원 이상	111	2.5(1.4)	54.7	107	1.7(1.1)	66.4	4	-(-)	-

주 : 1) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률 : (일반담배, 궤련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배의 현재흡연자 중 1개월 내 금연계획이 있는 사람의 수 / 일반담배, 궤련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배의 현재흡연자(일반담배 및 궤련형 전자담배 “매일 피움” 또는 “가끔 피움”, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 “1일이상”)의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 13〉 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	734	2.2(0.8)	38.4	285	0.5(0.5)	100.8	449	3.4(1.2)	36.8
연령									
19-29	58	1.5(1.5)	99.3	25	0.0(0.0)	.	33	3.1(3.0)	98.4
30-39	79	1.6(1.6)	100.3	27	4.0(4.0)	99.5	52	0.0(0.0)	.
40-49	97	2.9(2.1)	70.7	33	0.0(0.0)	.	64	4.5(3.1)	69.3
50-59	158	3.6(1.8)	48.6	52	0.0(0.0)	.	106	5.6(2.7)	47.9
60-69	191	1.7(1.0)	58.0	83	0.0(0.0)	.	108	2.9(1.7)	58.3
70 이상	151	1.3(1.3)	97.8	65	0.0(0.0)	.	86	2.3(2.2)	95.7
19-64	493	2.5(1.0)	39.2	179	0.6(0.6)	100.9	314	3.8(1.4)	36.7
65 이상	241	1.3(0.9)	71.5	106	0.0(0.0)	.	135	2.2(1.6)	70.9
교육수준 ²⁾									
무학	30	6.4(6.2)	97.4	2	-(-)	-	28	6.9(6.7)	97.1
초등학교	79	1.1(1.1)	100.9	26	0.0(0.0)	.	53	1.7(1.7)	102.8
중학교	86	2.4(1.7)	72.2	24	0.0(0.0)	.	62	3.2(2.3)	72.1
고등학교	291	1.7(0.8)	47.5	118	0.0(0.0)	.	173	2.9(1.4)	47.0
대학교 이상	248	2.5(1.3)	51.0	115	1.0(1.0)	100.6	133	3.9(1.9)	49.8
직업									
전문행정관리	106	3.5(2.2)	63.3	47	0.0(0.0)	.	59	6.4(4.0)	62.2
사무직	60	2.1(2.1)	99.3	30	0.0(0.0)	.	30	4.2(4.1)	98.4
판매·서비스직	96	1.6(1.6)	99.8	16	-(-)	-	80	2.0(2.0)	99.3
농림어업	40	3.2(3.0)	93.0	20	0.0(0.0)	.	20	6.0(5.3)	89.5
기능단순노무직	155	1.0(0.7)	70.9	92	0.0(0.0)	.	63	2.5(1.8)	71.8
기타 ³⁾	277	2.4(1.2)	48.8	80	1.5(1.5)	100.7	197	2.8(1.3)	45.2
월 가구소득									
100만원 미만	43	0.0(0.0)	.	12	-(-)	-	31	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	95	1.1(1.1)	101.0	35	0.0(0.0)	.	60	1.9(1.9)	101.1
200-300만원 미만	92	3.3(3.3)	99.2	40	0.0(0.0)	.	52	5.6(5.4)	96.4
300-400만원 미만	93	0.8(0.8)	98.8	37	0.0(0.0)	.	56	1.4(1.3)	97.4
400만원 이상	410	2.7(1.3)	47.8	160	0.8(0.8)	101.0	250	4.0(1.8)	46.5

주 : 1) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 : (담배 종류와 상관없이 현재비흡연자(과거흡연자 포함)가 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 14〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	457	11.1(1.9)	17.3	205	17.4(3.2)	18.4	252	5.9(1.6)	27.3
연령									
19-29	29	18.3(7.4)	40.5	8	-(-)	-	21	16.4(8.7)	53.2
30-39	63	4.3(2.5)	58.4	25	9.8(5.5)	55.8	38	0.0(0.0)	.
40-49	79	10.7(4.6)	43.2	31	17.1(7.5)	43.7	48	6.4(3.7)	58.2
50-59	123	14.9(3.4)	23.1	51	25.6(6.3)	24.8	72	6.3(2.5)	39.1
60-69	114	9.7(2.7)	27.5	65	14.1(4.5)	32.3	49	4.3(2.8)	64.9
70 이상	49	5.6(3.9)	69.2	25	11.2(7.3)	65.3	24	0.0(0.0)	.
19-64	357	11.9(2.2)	18.1	149	18.8(3.5)	18.7	208	6.8(1.8)	27.0
65 이상	100	6.5(2.7)	41.1	56	12.0(4.8)	40.1	44	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	8	-(-)	-	0	-(-)	-	8	-(-)	-
초등학교	32	2.8(2.8)	98.7	15	-(-)	-	17	-(-)	-
중학교	43	8.9(3.8)	43.0	13	-(-)	-	30	3.1(3.1)	100.0
고등학교	188	12.0(2.9)	24.1	82	15.1(4.8)	32.1	106	10.0(3.3)	32.9
대학교 이상	186	11.7(2.9)	25.0	95	19.5(4.4)	22.7	91	3.2(2.2)	68.6
직업									
전문행정관리	106	14.2(4.5)	32.0	47	20.7(7.4)	36.0	59	8.7(4.4)	50.3
사무직	60	0.0(0.0)	.	30	0.0(0.0)	.	30	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	96	4.1(2.2)	53.0	16	-(-)	-	80	4.1(2.5)	60.2
농림어업	40	11.3(4.9)	43.1	20	12.0(8.1)	67.2	20	10.6(6.3)	59.6
기능단순노무직	155	18.8(3.3)	17.5	92	26.0(5.1)	19.6	63	7.7(3.3)	42.8
기타 ³⁾	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	12	-(-)	-	4	-(-)	-	8	-(-)	-
100-200만원 미만	39	7.1(4.2)	58.9	16	-(-)	-	23	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	55	13.6(5.1)	37.7	24	20.6(9.3)	45.3	31	8.7(6.3)	71.7
300-400만원 미만	54	17.6(5.9)	33.3	27	24.8(10.7)	43.0	27	9.9(5.4)	54.9
400만원 이상	296	10.3(2.3)	22.2	133	16.4(3.9)	23.6	163	5.3(1.9)	36.2

주 : 1) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 : (담배 종류와 상관없이 현재비흡연자가 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요
약

제 1
부
조
사
체
계

제 2
부
주
요
통
계
결
과

제 3
부
통
계
표

제 4
부
부
록

I. 통계표

〈표 15〉 평생음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	92.6(0.8)	0.8	453	97.0(1.0)	1.1	456	87.8(1.3)	1.5
연령									
19-29	67	95.7(2.4)	2.5	33	94.0(4.1)	4.4	34	98.1(1.9)	1.9
30-39	103	96.8(1.9)	1.9	51	95.7(3.0)	3.2	52	98.1(1.9)	1.9
40-49	134	98.8(0.9)	0.9	68	100.0(0.0)	0.0	66	97.4(1.9)	1.9
50-59	218	95.0(1.4)	1.4	108	98.4(1.2)	1.2	110	91.4(2.5)	2.7
60-69	223	88.7(2.2)	2.5	115	96.3(1.8)	1.9	108	81.1(4.0)	5.0
70 이상	164	78.7(3.2)	4.0	78	95.8(2.1)	2.2	86	63.3(6.1)	9.6
19-64	643	95.3(0.9)	0.9	322	97.4(1.2)	1.3	321	92.9(1.4)	1.5
65 이상	266	83.3(2.0)	2.3	131	95.4(1.6)	1.7	135	72.1(3.6)	5.0
교육수준 ²⁾									
무학	33	70.1(6.2)	8.8	5	—(—)	—	28	64.4(7.1)	11.0
초등학교	88	82.9(4.0)	4.8	35	98.2(1.8)	1.8	53	71.6(6.5)	9.1
중학교	101	86.5(3.7)	4.3	38	96.2(2.7)	2.8	63	80.7(5.8)	7.2
고등학교	376	93.2(1.3)	1.4	199	96.5(1.6)	1.7	177	89.3(2.0)	2.3
대학교 이상	311	96.7(1.1)	1.1	176	97.3(1.5)	1.5	135	95.9(1.7)	1.8
직업									
전문행정관리	136	96.7(1.6)	1.7	76	97.1(2.1)	2.2	60	96.3(2.7)	2.8
사무직	81	99.2(0.8)	0.8	50	100.0(0.0)	0.0	31	98.0(2.0)	2.1
판매·서비스직	115	94.3(2.3)	2.4	34	96.0(2.6)	2.7	81	93.5(3.0)	3.2
농림어업	45	90.3(3.6)	4.0	25	94.4(2.8)	3.0	20	85.7(7.1)	8.3
기능단순노무직	226	95.1(1.4)	1.5	161	97.9(1.1)	1.1	65	87.3(4.0)	4.6
기타 ³⁾	306	86.0(1.9)	2.3	107	94.9(2.7)	2.8	199	80.5(2.7)	3.4
월 가구소득									
100만원 미만	49	85.1(4.6)	5.4	18	—(—)	—	31	82.9(5.9)	7.2
100-200만원 미만	116	78.2(3.0)	3.9	56	93.4(4.3)	4.6	60	62.3(5.2)	8.3
200-300만원 미만	107	93.5(2.2)	2.4	53	100.0(0.0)	0.0	54	87.2(4.2)	4.8
300-400만원 미만	114	92.2(2.8)	3.0	57	94.9(3.6)	3.7	57	89.3(4.4)	5.0
400만원 이상	521	95.5(0.9)	0.9	267	97.8(1.0)	1.0	254	92.8(1.6)	1.7

주 : 1) 평생음주율 : (지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 16〉 연간음주율¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	77.4(1.5)	2.0	453	85.2(1.6)	1.9	456	69.0(2.5)	3.6
연령									
19-29	67	91.2(3.0)	3.3	33	94.0(4.1)	4.4	34	87.5(4.7)	5.4
30-39	103	88.4(3.2)	3.6	51	91.6(4.2)	4.6	52	84.7(4.9)	5.8
40-49	134	89.6(2.6)	2.9	68	94.9(2.3)	2.4	66	83.9(4.8)	5.7
50-59	218	79.0(2.5)	3.2	108	86.7(3.1)	3.5	110	70.6(4.0)	5.7
60-69	223	66.8(2.9)	4.3	115	75.0(3.3)	4.5	108	58.7(5.2)	8.8
70 이상	164	50.1(4.1)	8.1	78	66.7(4.8)	7.2	86	35.2(5.8)	16.6
19-64	643	83.6(1.6)	1.9	322	89.8(1.8)	2.0	321	76.6(2.5)	3.2
65 이상	266	56.1(3.3)	5.9	131	67.8(3.7)	5.4	135	45.2(4.9)	10.9
교육수준 ²⁾									
무학	33	30.0(7.1)	23.6	5	-(-)	-	28	31.7(9.5)	29.9
초등학교	88	56.2(5.8)	10.3	35	71.2(7.3)	10.2	53	45.2(7.6)	16.8
중학교	101	63.6(5.4)	8.4	38	76.4(5.4)	7.1	63	55.9(6.8)	12.1
고등학교	376	80.1(2.0)	2.5	199	87.4(2.1)	2.4	177	71.7(3.8)	5.2
대학교 이상	311	85.0(2.3)	2.7	176	87.6(2.6)	3.0	135	81.6(3.4)	4.2
직업									
전문행정관리	136	89.0(2.6)	2.9	76	90.1(3.2)	3.6	60	87.6(3.7)	4.2
사무직	81	91.2(3.3)	3.6	50	94.0(3.4)	3.7	31	87.0(4.8)	5.6
판매·서비스직	115	82.0(3.8)	4.6	34	85.4(5.3)	6.2	81	80.3(5.0)	6.2
농림어업	45	61.1(8.2)	13.4	25	68.8(9.9)	14.3	20	52.5(11.6)	22.0
기능단순노무직	226	84.0(2.6)	3.1	161	89.8(2.4)	2.7	65	68.0(5.9)	8.6
기타 ³⁾	306	62.4(3.5)	5.6	107	73.6(4.5)	6.2	199	55.3(4.2)	7.5
월 가구소득									
100만원 미만	49	62.9(7.1)	11.3	18	-(-)	-	31	58.5(9.7)	16.7
100-200만원 미만	116	55.3(4.6)	8.3	56	68.0(7.1)	10.4	60	42.0(5.7)	13.6
200-300만원 미만	107	66.7(4.9)	7.3	53	75.8(5.7)	7.5	54	57.8(6.5)	11.2
300-400만원 미만	114	80.1(4.0)	5.0	57	84.7(5.7)	6.7	57	75.3(6.4)	8.5
400만원 이상	521	83.4(1.8)	2.1	267	90.2(1.9)	2.1	254	75.6(3.0)	3.9

주 : 1) 연간음주율 : (최근 1년 동안 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요
약

제 1
부
조
사
체
계

제 2
부
주
요
통
계
결
과

제 3
부
통
계
표

제 4
부
부
록

I. 통계표

〈표 17〉 월간음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	57.1(1.8)	3.1	453	71.2(2.2)	3.1	456	41.9(2.6)	6.2
연령									
19-29	67	67.8(5.5)	8.1	33	75.8(6.3)	8.4	34	57.3(9.0)	15.8
30-39	103	65.6(5.2)	8.0	51	69.1(6.5)	9.3	52	61.4(7.5)	12.2
40-49	134	69.8(4.0)	5.8	68	84.6(4.3)	5.1	66	53.8(6.1)	11.3
50-59	218	60.5(3.3)	5.5	108	75.3(4.1)	5.4	110	44.5(4.6)	10.3
60-69	223	47.3(2.8)	5.9	115	66.2(3.9)	5.9	108	28.7(4.4)	15.5
70 이상	164	30.3(3.3)	10.8	78	48.9(5.5)	11.2	86	13.7(2.8)	20.3
19-64	643	63.9(2.0)	3.2	322	76.0(2.5)	3.3	321	50.4(2.9)	5.8
65 이상	266	33.8(2.6)	7.6	131	53.4(3.9)	7.3	135	15.6(2.9)	18.3
교육수준 ²⁾									
무학	33	17.1(5.1)	29.6	5	—(—)	—	28	16.3(5.1)	31.6
초등학교	88	37.3(5.9)	15.9	35	60.9(8.6)	14.1	53	19.9(5.7)	28.6
중학교	101	40.9(5.1)	12.6	38	61.6(6.7)	10.8	63	28.5(6.9)	24.1
고등학교	376	58.3(2.7)	4.6	199	72.3(2.8)	3.8	177	42.2(4.5)	10.6
대학교 이상	311	66.2(3.0)	4.6	176	74.1(3.4)	4.6	135	55.4(4.2)	7.5
직업									
전문행정관리	136	70.5(4.3)	6.0	76	79.5(4.6)	5.8	60	58.5(6.4)	10.9
사무직	81	61.6(6.4)	10.4	50	72.8(7.0)	9.6	31	45.2(9.7)	21.4
판매·서비스직	115	58.6(4.7)	8.0	34	71.6(8.1)	11.3	81	52.1(6.2)	11.9
농림어업	45	43.2(7.5)	17.4	25	57.3(11.2)	19.6	20	27.5(10.0)	36.4
기능단순노무직	226	66.2(3.1)	4.6	161	75.0(3.1)	4.2	65	41.8(5.4)	12.9
기타 ³⁾	306	43.2(3.4)	7.8	107	61.1(5.0)	8.2	199	32.0(3.7)	11.4
월 가구소득									
100만원 미만	49	35.3(5.2)	14.7	18	—(—)	—	31	18.5(6.5)	34.9
100-200만원 미만	116	34.0(4.7)	13.9	56	48.0(7.7)	16.1	60	19.3(4.7)	24.5
200-300만원 미만	107	49.1(5.8)	11.8	53	61.5(7.2)	11.7	54	37.1(7.7)	20.7
300-400만원 미만	114	54.4(5.8)	10.7	57	66.1(6.9)	10.5	57	42.0(7.7)	18.3
400만원 이상	521	64.2(2.3)	3.6	267	77.6(2.6)	3.4	254	49.0(3.5)	7.1

주 : 1) 월간음주율 : (최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 18〉 고위험음주율¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	12.6(1.1)	9.0	453	20.5(1.9)	9.1	456	4.0(1.0)	25.2
연령									
19-29	67	9.7(3.9)	39.9	33	14.7(6.2)	41.9	34	3.0(3.0)	98.4
30-39	103	8.8(3.0)	33.5	51	13.3(4.6)	34.5	52	3.4(2.4)	71.0
40-49	134	19.4(3.9)	19.9	68	26.1(5.9)	22.8	66	12.2(4.0)	33.2
50-59	218	16.9(2.6)	15.4	108	29.1(4.7)	16.1	110	3.7(1.8)	50.1
60-69	223	12.9(1.9)	14.7	115	25.1(3.7)	14.6	108	1.0(1.0)	96.6
70 이상	164	1.9(0.9)	48.1	78	4.0(2.0)	48.9	86	0.0(0.0)	.
19-64	643	15.0(1.5)	9.9	322	23.6(2.4)	10.2	321	5.3(1.3)	25.0
65 이상	266	4.2(1.1)	25.6	131	8.8(2.3)	26.3	135	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	33	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	28	0.0(0.0)	.
초등학교	88	7.9(3.6)	44.8	35	18.7(7.5)	40.3	53	0.0(0.0)	.
중학교	101	8.4(2.4)	27.8	38	18.7(5.7)	30.5	63	2.2(2.2)	98.6
고등학교	376	17.0(2.2)	12.7	199	27.1(3.7)	13.5	177	5.2(2.0)	37.3
대학교 이상	311	10.6(1.8)	17.4	176	15.0(2.7)	17.8	135	4.7(1.7)	37.0
직업									
전문행정관리	136	9.1(2.5)	26.9	76	13.6(3.6)	26.7	60	3.2(2.3)	70.8
사무직	81	18.8(5.0)	26.3	50	25.5(6.4)	25.0	31	9.0(5.1)	56.5
판매·서비스직	115	12.6(3.1)	24.8	34	25.3(7.4)	29.4	81	6.3(2.8)	44.8
농림어업	45	7.3(3.9)	53.0	25	13.9(7.3)	52.8	20	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	226	21.7(2.6)	12.2	161	27.8(3.4)	12.4	65	5.0(3.4)	67.6
기타 ³⁾	306	6.4(1.4)	22.6	107	12.9(3.4)	26.2	199	2.3(1.1)	50.1
월 가구소득									
100만원 미만	49	9.3(3.4)	37.0	18	-(-)	-	31	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	116	3.9(1.7)	43.8	56	7.7(3.4)	44.5	60	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	107	13.3(3.8)	28.2	53	18.2(6.2)	34.1	54	8.5(4.9)	57.5
300-400만원 미만	114	13.7(3.0)	22.0	57	23.0(4.8)	21.0	57	3.9(2.7)	71.0
400만원 이상	521	14.1(1.5)	10.9	267	22.7(2.5)	11.1	254	4.3(1.2)	28.4

주 : 1) 고위험음주율 : (최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔)이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요
약

제 1
부
조
사
체
계

제 2
부
주
요
통
계
결
과

제 3
부
통
계
표

제 4
부
부
록

I. 통계표

〈표 19〉 연간음주자의 고위험음주율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	670	16.2(1.4)	8.8	372	24.1(2.2)	9.3	298	5.8(1.4)	25.0
연령									
19-29	60	10.6(4.3)	40.4	31	15.6(6.8)	43.4	29	3.5(3.4)	98.1
30-39	90	10.0(3.4)	33.8	47	14.5(5.0)	34.4	43	4.0(2.9)	72.0
40-49	119	21.6(4.3)	19.7	64	27.5(6.3)	22.9	55	14.5(4.7)	32.3
50-59	168	21.3(3.1)	14.7	92	33.5(5.1)	15.3	76	5.2(2.6)	50.2
60-69	151	19.4(3.0)	15.3	87	33.4(4.8)	14.2	64	1.8(1.7)	95.5
70 이상	82	3.8(1.8)	48.5	51	6.0(2.9)	48.0	31	0.0(0.0)	.
19-64	522	17.9(1.7)	9.7	284	26.3(2.7)	10.2	238	6.9(1.7)	24.8
65 이상	148	7.5(1.9)	24.6	88	13.0(3.2)	24.7	60	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	10	-(-)	-	1	-(-)	-	9	-(-)	-
초등학교	49	14.1(6.8)	48.1	25	26.3(11.5)	43.6	24	0.0(0.0)	.
중학교	63	13.3(3.8)	28.9	27	24.5(7.8)	31.8	36	4.0(3.9)	96.6
고등학교	289	21.2(2.6)	12.5	169	31.0(4.2)	13.4	120	7.3(2.7)	36.9
대학교 이상	259	12.5(2.1)	17.2	150	17.1(3.1)	18.2	109	5.8(2.1)	36.5
직업									
전문행정관리	119	10.3(2.7)	26.6	67	15.1(4.0)	26.2	52	3.6(2.6)	71.1
사무직	73	20.6(5.5)	26.6	47	27.1(6.8)	24.9	26	10.3(6.0)	57.9
판매·서비스직	88	15.4(3.7)	24.2	27	29.6(8.7)	29.5	61	7.8(3.4)	43.3
농림어업	28	12.0(5.8)	48.2	17	-(-)	-	11	-(-)	-
기능단순노무직	185	25.9(3.0)	11.7	141	31.0(3.8)	12.3	44	7.4(4.8)	65.2
기타 ³⁾	177	10.2(2.3)	22.6	73	17.4(4.7)	26.8	104	4.1(2.1)	50.3
월 가구소득									
100만원 미만	30	14.8(5.8)	39.4	13	-(-)	-	17	-(-)	-
100-200만원 미만	62	7.1(3.0)	42.0	37	11.3(4.8)	42.6	25	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	68	19.9(5.2)	26.0	38	24.0(7.8)	32.7	30	14.7(7.8)	53.3
300-400만원 미만	89	17.1(3.8)	22.0	48	27.1(5.7)	21.2	41	5.1(3.6)	70.6
400만원 이상	419	16.9(1.8)	10.7	234	25.2(2.8)	11.1	185	5.7(1.6)	28.2

주 : 1) 연간음주자의 고위험음주율 : (최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 20〉 월간폭염률¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	34.5(1.7)	4.9	453	50.0(2.4)	4.8	456	17.8(2.2)	12.2
연령									
19-29	67	36.7(6.2)	17.0	33	44.4(8.3)	18.6	34	26.7(9.1)	34.0
30-39	103	45.7(5.7)	12.5	51	52.2(7.4)	14.2	52	37.9(7.6)	20.0
40-49	134	45.7(4.1)	8.9	68	62.4(6.8)	10.9	66	27.7(5.5)	19.9
50-59	218	39.1(3.1)	7.8	108	60.9(4.9)	8.0	110	15.6(3.3)	21.0
60-69	223	27.7(2.1)	7.6	115	48.9(4.2)	8.7	108	6.9(3.3)	47.4
70 이상	164	8.9(2.4)	27.4	78	17.7(5.0)	28.2	86	1.1(1.1)	95.7
19-64	643	40.3(2.1)	5.1	322	55.8(2.9)	5.2	321	22.7(2.6)	11.5
65 이상	266	14.7(2.1)	14.2	131	28.1(4.0)	14.2	135	2.4(1.8)	74.1
교육수준 ²⁾									
무학	33	3.5(3.7)	107.6	5	—(—)	—	28	0.0(0.0)	.
초등학교	88	20.8(4.3)	20.9	35	49.1(8.4)	17.0	53	0.0(0.0)	.
중학교	101	24.5(4.2)	17.1	38	34.6(7.0)	20.3	63	18.4(6.0)	32.7
고등학교	376	38.9(2.5)	6.5	199	55.6(3.7)	6.7	177	19.7(3.6)	18.3
대학교 이상	311	36.9(2.8)	7.5	176	47.6(3.6)	7.5	135	22.4(3.3)	14.8
직업									
전문행정관리	136	37.7(4.4)	11.6	76	49.6(5.7)	11.5	60	21.8(5.1)	23.6
사무직	81	44.4(6.6)	14.8	50	53.2(8.5)	16.0	31	31.4(8.8)	27.9
판매·서비스직	115	37.4(4.7)	12.6	34	61.0(9.5)	15.6	81	25.6(6.2)	24.2
농림어업	45	23.8(7.1)	29.9	25	40.1(12.2)	30.4	20	5.7(5.9)	102.5
기능단순노무직	226	47.6(3.1)	6.5	161	56.9(3.4)	6.0	65	22.0(4.8)	21.9
기타 ³⁾	306	20.4(2.5)	12.4	107	37.1(5.2)	14.1	199	9.8(2.5)	25.7
월 가구소득									
100만원 미만	49	12.2(4.0)	33.1	18	—(—)	—	31	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	116	18.7(4.2)	22.3	56	29.4(7.1)	24.3	60	7.4(4.1)	54.9
200-300만원 미만	107	30.8(4.9)	15.8	53	47.5(7.4)	15.5	54	14.6(6.5)	44.3
300-400만원 미만	114	29.5(4.2)	14.1	57	47.1(6.1)	12.9	57	10.6(4.0)	37.6
400만원 이상	521	40.5(2.4)	5.8	267	55.9(2.9)	5.2	254	23.2(3.0)	13.1

주 : 1) 월간폭염률 : (최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 월 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 남성 또는 한 번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 월 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 여성의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 21〉 절주·금주 계획률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	599	11.3(1.1)	10.1	306	11.4(2.0)	17.3	293	11.1(1.9)	17.1
연령									
19-29	60	11.3(3.8)	33.3	31	3.4(3.4)	99.1	29	22.3(7.3)	32.6
30-39	87	19.5(4.4)	22.5	45	25.2(6.6)	26.1	42	12.3(5.3)	43.5
40-49	107	7.3(2.5)	33.9	54	5.9(2.7)	45.3	53	8.8(4.1)	47.0
50-59	144	10.4(2.4)	23.5	69	12.0(3.8)	32.0	75	8.8(3.5)	40.1
60-69	130	8.5(2.9)	34.1	67	10.3(4.3)	41.4	63	6.6(3.8)	56.7
70 이상	71	13.8(4.2)	30.3	40	16.6(5.9)	35.5	31	10.2(5.8)	57.3
19-64	468	11.2(1.2)	11.1	235	11.0(2.1)	18.8	233	11.5(2.1)	18.0
65 이상	131	11.6(3.1)	26.9	71	13.8(4.2)	30.2	60	9.1(4.4)	48.5
교육수준 ²⁾									
무학	9	-(-)	-	0	-(-)	-	9	-(-)	-
초등학교	44	10.0(3.8)	38.5	20	14.5(5.9)	41.1	24	6.2(4.8)	76.8
중학교	54	10.1(4.7)	46.4	18	-(-)	-	36	11.0(6.4)	58.3
고등학교	258	11.3(1.9)	17.0	141	11.9(3.1)	26.0	117	10.5(3.0)	28.9
대학교 이상	234	11.7(2.1)	17.7	127	11.0(2.5)	22.9	107	12.6(3.1)	24.4
직업									
전문행정관리	109	13.5(3.5)	26.2	57	11.9(4.3)	36.2	52	15.4(4.9)	31.6
사무직	64	15.4(4.5)	29.5	39	21.0(7.2)	34.1	25	7.2(4.9)	67.6
판매·서비스직	82	11.0(4.0)	36.3	24	4.4(4.0)	89.9	58	14.2(5.4)	37.9
농림어업	24	18.5(7.5)	40.4	13	-(-)	-	11	-(-)	-
기능단순노무직	155	11.0(2.6)	23.6	112	9.8(2.7)	27.5	43	14.5(5.8)	40.1
기타 ³⁾	165	7.6(2.3)	29.8	61	9.6(3.7)	38.0	104	6.0(2.9)	47.4
월 가구소득									
100만원 미만	25	12.2(5.7)	46.3	8	-(-)	-	17	-(-)	-
100-200만원 미만	54	15.4(5.1)	32.9	29	14.4(6.9)	48.0	25	16.7(8.8)	52.5
200-300만원 미만	61	8.3(2.9)	35.2	31	8.7(4.3)	49.4	30	7.9(4.4)	55.3
300-400만원 미만	76	2.3(1.4)	59.8	37	2.2(2.3)	101.9	39	2.4(2.4)	99.5
400만원 이상	381	12.8(1.6)	12.5	199	12.7(2.5)	19.9	182	13.0(2.5)	19.3

주 : 1) 절주·금주 계획률 : (절주 또는 금주를 1개월 내 또는 6개월 내에 계획하는 사람의 수 / 최근 1년 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 22〉 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 홍보 노출 경험률¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	45.1(1.8)	4.0	453	43.4(2.3)	5.3	456	47.0(2.6)	5.6
연령									
19-29	67	41.8(5.2)	12.3	33	36.8(6.6)	17.9	34	48.3(7.2)	14.8
30-39	103	38.8(5.5)	14.2	51	37.4(7.1)	19.0	52	40.5(7.5)	18.6
40-49	134	43.5(4.9)	11.2	68	44.3(6.3)	14.3	66	42.8(7.1)	16.7
50-59	218	48.2(3.6)	7.4	108	44.5(5.1)	11.5	110	52.3(4.5)	8.6
60-69	223	52.5(3.5)	6.7	115	46.6(4.5)	9.7	108	58.2(5.2)	9.0
70 이상	164	40.1(4.6)	11.5	78	49.2(6.6)	13.3	86	31.9(5.6)	17.6
19-64	643	45.0(2.1)	4.6	322	42.0(2.6)	6.3	321	48.5(2.9)	6.0
65 이상	266	45.3(3.6)	8.0	131	48.6(4.7)	9.6	135	42.4(5.6)	13.2
교육수준 ²⁾									
무학	33	16.6(7.0)	42.0	5	-(-)	-	28	12.5(6.6)	52.5
초등학교	88	48.2(6.1)	12.7	35	60.7(9.1)	15.1	53	39.1(7.2)	18.4
중학교	101	57.3(5.1)	8.9	38	57.9(8.3)	14.3	63	57.0(6.7)	11.8
고등학교	376	42.4(2.8)	6.7	199	39.4(3.7)	9.4	177	45.8(4.0)	8.7
대학교 이상	311	46.6(3.0)	6.4	176	42.7(3.5)	8.1	135	51.9(4.4)	8.5
직업									
전문행정관리	136	49.7(4.4)	8.9	76	46.4(5.3)	11.5	60	54.1(6.8)	12.7
사무직	81	44.7(6.1)	13.7	50	49.4(7.7)	15.6	31	37.9(9.1)	24.1
판매·서비스직	115	53.5(5.3)	10.0	34	45.0(9.5)	21.0	81	57.7(6.2)	10.7
농림어업	45	47.1(8.8)	18.6	25	46.7(11.5)	24.5	20	47.5(11.3)	23.9
기능단순노무직	226	43.0(3.4)	8.0	161	43.9(3.9)	8.8	65	40.4(7.2)	18.0
기타 ³⁾	306	40.7(3.2)	7.8	107	36.2(4.3)	11.8	199	43.5(4.1)	9.4
월 가구소득									
100만원 미만	49	28.2(6.4)	22.8	18	-(-)	-	31	26.3(8.9)	33.8
100-200만원 미만	116	48.2(5.0)	10.4	56	48.2(7.1)	14.8	60	48.3(7.4)	15.4
200-300만원 미만	107	45.9(5.2)	11.2	53	44.8(5.3)	11.9	54	46.9(8.0)	17.0
300-400만원 미만	114	48.3(5.7)	11.8	57	46.2(7.8)	16.8	57	50.5(7.7)	15.2
400만원 이상	521	45.2(2.3)	5.0	267	42.9(3.0)	7.0	254	47.9(3.3)	6.9

주 : 1) 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 홍보 노출 경험률 : ("예"라고 응답한 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 23〉 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 교육 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	6.3(1.1)	17.4	453	7.4(1.4)	19.1	456	5.2(1.3)	24.9
연령									
19-29	67	10.3(3.9)	38.0	33	12.0(5.0)	42.0	34	8.0(4.5)	56.7
30-39	103	10.5(3.1)	29.3	51	12.7(4.6)	35.9	52	7.9(3.9)	49.3
40-49	134	6.8(2.3)	34.7	68	6.1(2.7)	43.9	66	7.5(3.5)	47.2
50-59	218	4.2(1.9)	45.5	108	4.1(2.5)	61.9	110	4.4(2.4)	54.0
60-69	223	6.7(1.9)	29.2	115	9.4(3.3)	34.9	108	4.0(2.0)	50.3
70 이상	164	1.2(0.8)	70.7	78	1.2(1.2)	103.3	86	1.1(1.1)	95.7
19-64	643	7.4(1.4)	18.4	322	8.8(1.7)	19.5	321	5.8(1.6)	28.3
65 이상	266	2.7(1.2)	42.3	131	2.0(1.5)	75.2	135	3.4(1.8)	51.5
교육수준 ²⁾									
무학	33	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	28	0.0(0.0)	.
초등학교	88	1.3(1.4)	108.0	35	3.1(3.5)	112.1	53	0.0(0.0)	.
중학교	101	4.2(1.8)	42.4	38	2.2(2.2)	103.2	63	5.5(2.6)	47.9
고등학교	376	5.5(1.4)	25.4	199	7.5(2.1)	27.9	177	3.2(1.6)	49.4
대학교 이상	311	9.1(2.0)	22.2	176	8.8(2.2)	25.5	135	9.5(3.2)	33.8
직업									
전문행정관리	136	8.0(2.4)	29.4	76	7.5(3.1)	40.9	60	8.6(3.3)	38.1
사무직	81	12.8(4.9)	38.8	50	13.9(5.7)	40.8	31	11.1(7.6)	68.5
판매·서비스직	115	5.1(2.1)	42.2	34	5.8(4.1)	71.4	81	4.7(2.5)	53.2
농림어업	45	0.0(0.0)	.	25	0.0(0.0)	.	20	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	226	4.3(1.6)	38.5	161	4.4(1.9)	44.7	65	4.1(2.9)	71.1
기타 ³⁾	306	6.3(1.8)	29.0	107	10.1(3.3)	32.5	199	3.8(1.5)	38.6
월 가구소득									
100만원 미만	49	0.0(0.0)	.	18	-(-)	-	31	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	116	2.1(1.1)	52.8	56	1.3(1.3)	101.3	60	2.9(2.1)	72.0
200-300만원 미만	107	4.4(2.1)	46.5	53	5.0(3.4)	68.1	54	3.9(2.8)	72.2
300-400만원 미만	114	8.1(3.1)	38.5	57	10.9(5.0)	45.7	57	5.1(3.6)	71.1
400만원 이상	521	7.5(1.5)	20.3	267	8.6(1.9)	22.4	254	6.4(1.9)	30.6

주 : 1) 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 교육 경험률 : ("예"라고 응답한 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 24〉 고강도 신체활동 실천율¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	17.0(1.4)	8.1	453	21.1(2.1)	9.9	456	12.7(1.7)	13.5
연령									
19-29	67	23.4(5.9)	25.0	33	28.8(8.3)	29.0	34	16.4(6.3)	38.3
30-39	103	26.7(5.3)	19.7	51	33.7(7.6)	22.7	52	18.2(5.8)	31.9
40-49	134	21.6(3.7)	17.3	68	24.5(5.9)	24.1	66	18.4(4.4)	23.7
50-59	218	16.3(2.3)	14.2	108	20.8(4.0)	19.4	110	11.5(2.8)	24.8
60-69	223	12.8(2.8)	22.1	115	13.7(3.9)	28.6	108	12.0(4.4)	36.4
70 이상	164	3.1(1.3)	42.6	78	5.4(2.1)	38.1	86	1.1(1.1)	98.8
19-64	643	19.8(1.5)	7.8	322	24.0(2.5)	10.2	321	15.1(2.1)	13.7
65 이상	266	7.5(2.2)	30.0	131	9.9(3.4)	33.9	135	5.2(2.8)	53.6
교육수준 ²⁾									
무학	33	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	28	0.0(0.0)	.
초등학교	88	10.4(4.2)	40.3	35	18.8(8.3)	44.4	53	4.2(3.0)	70.5
중학교	101	8.1(3.3)	41.4	38	13.4(6.9)	51.7	63	4.9(2.8)	57.7
고등학교	376	14.3(1.8)	12.6	199	16.7(2.6)	15.5	177	11.6(2.6)	22.0
대학교 이상	311	24.4(2.6)	10.5	176	27.3(3.6)	13.3	135	20.5(3.7)	18.3
직업									
전문행정관리	136	26.5(4.2)	15.7	76	27.8(5.5)	19.8	60	24.9(5.9)	23.6
사무직	81	17.9(4.3)	23.9	50	22.2(6.2)	27.8	31	11.5(5.7)	50.0
판매·서비스직	115	19.0(3.7)	19.6	34	29.4(8.5)	29.0	81	13.8(3.9)	27.8
농림어업	45	9.1(4.3)	47.4	25	12.0(7.8)	64.7	20	5.8(5.0)	86.0
기능단순노무직	226	14.7(2.2)	15.2	161	17.3(3.1)	17.9	65	7.4(3.0)	40.8
기타 ³⁾	306	13.7(3.0)	21.5	107	19.2(4.9)	25.6	199	10.3(2.9)	28.3
월 가구소득									
100만원 미만	49	4.6(3.2)	70.7	18	-(-)	-	31	7.1(4.9)	69.2
100-200만원 미만	116	6.8(2.6)	38.9	56	11.4(4.7)	40.8	60	1.9(1.9)	100.2
200-300만원 미만	107	10.3(3.9)	37.6	53	15.8(6.2)	39.4	54	4.9(2.7)	55.4
300-400만원 미만	114	17.0(4.1)	23.8	57	23.7(5.7)	24.1	57	9.8(4.9)	50.0
400만원 이상	521	20.5(1.8)	8.7	267	23.5(2.8)	11.7	254	17.1(2.5)	14.4

주 : 1) 고강도 신체활동 실천율 : (최근 1주일 동안 고강도 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요
약

제 1
부
조
사
체
계

제 2
부
주
요
통
계
결
과

제 3
부
통
계
표

제 4
부
부
록

I. 통계표

〈표 25〉 중강도 신체활동 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	12.1(1.2)	10.0	453	14.4(1.8)	12.4	456	9.6(1.5)	15.8
연령									
19-29	67	11.0(4.3)	39.0	33	14.0(6.6)	47.4	34	7.1(4.4)	62.8
30-39	103	13.0(3.6)	28.1	51	16.8(5.1)	30.5	52	8.2(4.2)	50.6
40-49	134	13.8(3.7)	26.7	68	17.2(5.2)	30.0	66	10.0(4.2)	41.6
50-59	218	12.6(2.4)	19.2	108	14.9(3.9)	26.0	110	10.0(3.0)	29.6
60-69	223	13.5(2.6)	19.1	115	12.3(3.4)	27.5	108	14.7(3.4)	23.2
70 이상	164	7.3(2.4)	32.4	78	10.9(4.3)	39.5	86	4.1(1.9)	46.9
19-64	643	12.9(1.4)	11.0	322	14.8(2.0)	13.7	321	10.7(1.9)	17.4
65 이상	266	9.4(2.2)	23.8	131	13.0(3.7)	28.2	135	6.1(2.3)	37.2
교육수준 ²⁾									
무학	33	2.3(2.4)	102.5	5	—(—)	—	28	2.8(2.9)	102.8
초등학교	88	8.6(3.0)	34.3	35	13.5(5.0)	37.1	53	5.1(2.9)	58.0
중학교	101	5.9(2.3)	38.7	38	3.7(2.6)	71.0	63	7.2(3.2)	44.7
고등학교	376	11.3(1.6)	13.9	199	12.7(2.6)	20.4	177	9.6(1.9)	20.2
대학교 이상	311	15.8(2.5)	16.1	176	18.2(3.0)	16.6	135	12.4(3.5)	27.8
직업									
전문행정관리	136	14.5(2.7)	18.3	76	17.3(4.2)	24.3	60	10.8(4.1)	38.4
사무직	81	7.7(3.4)	44.4	50	13.0(5.6)	43.0	31	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	115	17.6(4.8)	27.2	34	29.0(9.8)	33.8	81	11.9(4.9)	41.7
농림어업	45	18.3(6.8)	37.0	25	21.7(10.1)	46.6	20	14.5(8.5)	59.0
기능단순노무직	226	12.5(2.4)	19.3	161	12.5(2.7)	21.9	65	12.4(3.9)	31.4
기타 ³⁾	306	8.9(1.8)	20.1	107	9.3(3.0)	32.5	199	8.7(2.2)	25.1
월 가구소득									
100만원 미만	49	11.4(4.1)	36.3	18	—(—)	—	31	12.5(5.9)	47.3
100-200만원 미만	116	8.2(2.6)	32.0	56	11.5(4.1)	35.8	60	4.7(2.6)	56.1
200-300만원 미만	107	8.8(3.6)	40.9	53	11.5(4.8)	42.2	54	6.2(3.8)	62.3
300-400만원 미만	114	8.3(2.7)	33.2	57	13.4(4.9)	36.4	57	2.8(2.0)	71.8
400만원 이상	521	13.9(1.6)	11.7	267	15.5(2.4)	15.4	254	12.1(2.3)	18.7

주 : 1) 중강도 신체활동 실천율 : (최근 1주일 동안 중강도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 26〉 중강도 이상 신체활동 실천율¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	24.4(1.7)	7.0	453	29.2(2.6)	8.8	456	19.2(2.0)	10.6
연령									
19-29	67	32.6(6.7)	20.6	33	42.7(9.6)	22.4	34	19.4(6.0)	31.2
30-39	103	31.6(5.6)	17.8	51	37.4(7.5)	20.1	52	24.6(7.3)	29.5
40-49	134	26.2(4.2)	16.0	68	28.9(6.1)	21.2	66	23.3(5.5)	23.8
50-59	218	24.9(3.0)	12.0	108	30.5(4.9)	15.9	110	18.9(3.9)	20.7
60-69	223	22.9(3.7)	16.3	115	22.2(4.9)	21.9	108	23.5(4.8)	20.5
70 이상	164	8.3(2.3)	28.0	78	13.0(4.2)	32.7	86	4.1(1.9)	46.9
19-64	643	27.4(1.9)	6.9	322	32.3(3.0)	9.4	321	22.0(2.5)	11.4
65 이상	266	14.0(2.8)	19.9	131	17.7(4.0)	22.9	135	10.6(3.4)	31.7
교육수준 ²⁾									
무학	33	2.3(2.4)	102.5	5	—(—)	—	28	2.8(2.9)	102.8
초등학교	88	15.0(4.2)	27.7	35	25.3(7.9)	31.4	53	7.5(3.8)	50.5
중학교	101	13.2(3.7)	28.3	38	15.0(7.0)	46.7	63	12.1(4.1)	33.9
고등학교	376	21.3(2.1)	9.8	199	23.9(3.2)	13.2	177	18.2(3.2)	17.5
대학교 이상	311	33.6(3.2)	9.4	176	37.7(4.3)	11.3	135	28.0(4.6)	16.4
직업									
전문행정관리	136	33.5(4.1)	12.3	76	34.0(5.7)	16.7	60	32.8(5.5)	16.7
사무직	81	21.8(5.1)	23.2	50	28.9(7.4)	25.7	31	11.5(5.7)	50.0
판매·서비스직	115	29.8(4.9)	16.3	34	46.0(9.3)	20.2	81	21.7(5.5)	25.4
농림어업	45	23.7(6.3)	26.6	25	26.8(9.8)	36.6	20	20.3(8.8)	43.2
기능단순노무직	226	22.2(3.2)	14.6	161	24.8(4.0)	16.3	65	15.0(4.1)	27.0
기타 ³⁾	306	19.9(3.2)	16.1	107	26.3(5.3)	20.0	199	15.9(3.1)	19.7
월 가구소득									
100만원 미만	49	15.9(5.1)	31.9	18	—(—)	—	31	19.6(7.4)	37.6
100-200만원 미만	116	12.4(3.3)	26.5	56	18.0(5.4)	29.8	60	6.6(3.1)	47.9
200-300만원 미만	107	17.5(4.7)	26.5	53	25.7(6.8)	26.5	54	9.6(4.4)	45.4
300-400만원 미만	114	22.6(4.2)	18.5	57	32.0(6.2)	19.5	57	12.6(5.1)	40.7
400만원 이상	521	28.0(2.0)	7.0	267	31.1(3.1)	10.0	254	24.5(2.8)	11.6

주 : 1) 중강도 이상 신체활동 실천율 : (최근 1주일 동안 고강도 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일 동안 중강도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 27〉 걷기 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	53.0(2.4)	4.4	453	55.6(3.0)	5.3	456	50.2(3.1)	6.1
연령									
19-29	67	54.7(6.1)	11.2	33	51.4(9.2)	17.8	34	58.9(9.8)	16.7
30-39	103	53.9(4.5)	8.4	51	64.3(6.1)	9.5	52	41.3(6.6)	16.1
40-49	134	50.7(5.7)	11.3	68	61.0(6.1)	10.0	66	39.6(7.0)	17.6
50-59	218	51.0(3.7)	7.2	108	46.8(4.7)	10.1	110	55.6(5.3)	9.5
60-69	223	59.3(3.7)	6.2	115	60.5(4.9)	8.0	108	58.0(4.9)	8.4
70 이상	164	47.5(4.0)	8.5	78	52.4(6.1)	11.7	86	43.0(5.3)	12.3
19-64	643	53.6(2.7)	5.1	322	55.6(3.4)	6.0	321	51.3(3.8)	7.4
65 이상	266	50.8(3.3)	6.6	131	55.4(5.2)	9.4	135	46.5(4.5)	9.6
교육수준 ²⁾									
무학	33	40.4(9.8)	24.1	5	—(—)	—	28	35.9(10.5)	29.1
초등학교	88	43.3(5.8)	13.5	35	42.7(10.5)	24.5	53	43.7(7.0)	16.0
중학교	101	51.7(5.2)	10.0	38	46.6(7.2)	15.4	63	54.8(6.3)	11.6
고등학교	376	55.0(3.1)	5.7	199	57.1(3.6)	6.3	177	52.7(4.9)	9.3
대학교 이상	311	53.8(3.5)	6.6	176	57.0(4.1)	7.2	135	49.4(5.6)	11.4
직업									
전문행정관리	136	52.1(4.9)	9.4	76	58.6(6.1)	10.4	60	43.4(7.6)	17.6
사무직	81	55.6(6.0)	10.7	50	51.7(6.9)	13.3	31	61.4(9.9)	16.2
판매·서비스직	115	54.7(4.7)	8.6	34	59.2(9.3)	15.6	81	52.6(5.6)	10.6
농림어업	45	54.8(6.9)	12.5	25	57.8(9.1)	15.7	20	51.5(12.0)	23.3
기능단순노무직	226	53.4(3.5)	6.6	161	55.1(4.3)	7.9	65	48.5(6.4)	13.3
기타 ³⁾	306	51.4(3.3)	6.4	107	54.1(5.2)	9.6	199	49.7(3.7)	7.4
월 가구소득									
100만원 미만	49	40.5(6.6)	16.3	18	—(—)	—	31	49.5(9.4)	18.9
100-200만원 미만	116	45.3(4.8)	10.6	56	44.9(7.0)	15.6	60	45.7(7.1)	15.6
200-300만원 미만	107	53.0(5.7)	10.7	53	52.9(7.5)	14.2	54	53.1(7.8)	14.6
300-400만원 미만	114	59.9(5.8)	9.6	57	63.1(7.3)	11.6	57	56.4(7.6)	13.5
400만원 이상	521	53.9(3.2)	6.0	267	58.0(3.6)	6.3	254	49.3(4.3)	8.8

주 : 1) 걷기 실천율 : (최근 1주일 동안 1회 10분 이상, 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 28〉 근력운동 실천율¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	28.7(1.7)	6.0	453	37.0(2.3)	6.1	456	19.7(2.0)	10.0
연령									
19-29	67	39.4(6.1)	15.6	33	55.3(8.5)	15.3	34	18.5(6.2)	33.5
30-39	103	34.1(5.2)	15.1	51	46.3(7.7)	16.7	52	19.3(6.0)	30.8
40-49	134	26.8(3.6)	13.6	68	32.5(5.2)	15.9	66	20.6(4.4)	21.4
50-59	218	21.8(3.1)	14.1	108	26.2(3.9)	15.0	110	17.1(4.0)	23.5
60-69	223	34.9(3.5)	10.0	115	39.1(4.8)	12.3	108	30.7(4.6)	15.0
70 이상	164	18.5(2.6)	14.3	78	29.2(5.2)	18.0	86	8.9(3.1)	35.1
19-64	643	29.4(1.9)	6.6	322	37.3(2.6)	6.9	321	20.6(2.3)	11.2
65 이상	266	26.2(3.2)	12.1	131	35.9(4.5)	12.5	135	17.2(3.8)	22.0
교육수준 ²⁾									
무학	33	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	28	0.0(0.0)	.
초등학교	88	21.6(4.4)	20.2	35	36.9(8.0)	21.8	53	10.4(4.4)	42.3
중학교	101	26.8(5.1)	19.1	38	22.2(7.1)	31.9	63	29.6(5.9)	20.0
고등학교	376	26.4(2.4)	9.0	199	36.4(3.5)	9.7	177	15.0(2.9)	19.4
대학교 이상	311	34.9(2.9)	8.4	176	40.7(3.5)	8.6	135	27.1(4.1)	15.3
직업									
전문행정관리	136	28.4(3.6)	12.7	76	31.6(5.5)	17.3	60	24.2(5.2)	21.5
사무직	81	31.4(5.3)	16.9	50	40.9(7.7)	18.7	31	17.5(6.3)	36.0
판매·서비스직	115	26.1(4.5)	17.2	34	42.6(7.7)	18.2	81	17.9(6.0)	33.4
농림어업	45	26.3(5.6)	21.2	25	34.7(8.5)	24.5	20	16.9(7.2)	42.4
기능단순노무직	226	25.8(3.0)	11.5	161	30.6(3.6)	11.6	65	12.5(4.6)	36.6
기타 ³⁾	306	31.5(3.4)	10.7	107	46.7(5.3)	11.3	199	22.0(3.5)	15.7
월 가구소득									
100만원 미만	49	14.9(4.9)	32.8	18	-(-)	-	31	13.5(6.3)	46.6
100-200만원 미만	116	20.7(4.0)	19.6	56	29.3(5.9)	20.0	60	11.6(4.6)	39.6
200-300만원 미만	107	22.7(4.9)	21.4	53	29.9(6.4)	21.3	54	15.7(5.7)	36.3
300-400만원 미만	114	31.6(4.3)	13.8	57	43.4(6.8)	15.7	57	19.0(4.7)	25.0
400만원 이상	521	31.0(2.3)	7.5	267	38.3(2.9)	7.6	254	22.7(2.8)	12.4

주 : 1) 근력운동 실천율 : (최근 1주일 동안 2일 이상 근력운동을 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요
약

제 1
부
조
사
체
계

제 2
부
주
요
통
계
결
과

제 3
부
통
계
표

제 4
부
부
록

I. 통계표

〈표 29〉 건강생활실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	38.5(2.0)	5.2	453	29.9(2.3)	7.8	456	47.8(3.1)	6.4
연령									
19-29	67	43.7(5.3)	12.1	33	34.4(8.6)	24.9	34	55.8(9.3)	16.7
30-39	103	36.0(4.4)	12.2	51	31.7(6.5)	20.3	52	41.3(6.6)	16.1
40-49	134	27.8(4.7)	17.1	68	22.3(6.1)	27.5	66	33.6(6.4)	19.1
50-59	218	37.0(3.3)	8.9	108	22.6(3.9)	17.2	110	52.6(5.3)	10.0
60-69	223	45.8(4.0)	8.8	115	34.5(5.0)	14.4	108	57.0(5.1)	8.9
70 이상	164	41.6(4.0)	9.7	78	40.1(5.7)	14.2	86	43.0(5.3)	12.3
19-64	643	37.3(2.4)	6.3	322	27.6(2.9)	10.6	321	48.2(3.7)	7.7
65 이상	266	42.6(3.2)	7.5	131	38.4(4.3)	11.1	135	46.5(4.5)	9.6
교육수준 ²⁾									
무학	33	30.2(8.9)	29.4	5	—(—)	—	28	35.9(10.5)	29.1
초등학교	88	36.3(5.2)	14.5	35	26.2(6.3)	24.1	53	43.7(7.0)	16.0
중학교	101	47.1(4.8)	10.1	38	34.4(6.1)	17.9	63	54.8(6.3)	11.6
고등학교	376	36.3(3.0)	8.3	199	25.9(3.1)	12.1	177	48.3(5.1)	10.6
대학교 이상	311	39.9(3.3)	8.2	176	34.2(3.7)	10.8	135	47.6(5.5)	11.6
직업									
전문행정관리	136	33.5(4.5)	13.5	76	29.0(5.4)	18.6	60	39.5(7.4)	18.6
사무직	81	45.4(7.0)	15.3	50	34.6(7.1)	20.6	31	61.4(9.9)	16.2
판매·서비스직	115	41.8(4.5)	10.8	34	26.9(7.0)	26.2	81	49.2(5.3)	10.7
농림어업	45	45.9(7.9)	17.2	25	40.8(11.1)	27.2	20	51.5(12.0)	23.3
기능단순노무직	226	27.6(2.9)	10.4	161	22.3(3.3)	14.9	65	42.3(7.4)	17.5
기타 ³⁾	306	44.7(3.0)	6.8	107	38.1(5.0)	13.1	199	48.9(3.7)	7.6
월 가구소득									
100만원 미만	49	39.5(6.6)	16.7	18	—(—)	—	31	49.5(9.4)	18.9
100-200만원 미만	116	34.5(4.5)	13.0	56	23.8(5.9)	24.6	60	45.7(7.1)	15.6
200-300만원 미만	107	39.0(5.4)	13.9	53	34.3(6.3)	18.2	54	43.6(8.2)	18.8
300-400만원 미만	114	41.2(5.3)	13.0	57	31.2(5.8)	18.4	57	51.8(7.8)	15.0
400만원 이상	521	38.9(2.7)	6.9	267	30.7(3.2)	10.3	254	48.1(4.1)	8.5

주 : 1) 건강생활실천율 : (현재 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

— 금연 실천자: 평생 흡연해 본 적이 없거나, 과거 흡연하였더라도 현재 금연하고 있는 사람

— 절주 실천자: 비음주자이거나, 최근 1년 동안 술을 마셨더라도 한 번의 술자리에서 남자는 7잔 미만, 여자는 5잔 미만으로 주 1회 이하로 마신 사람

— 걷기 실천자: 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 30〉 비만도 분포¹⁾ 및 비만율(자가보고)²⁾ (단위 : %, kg/m²)

구분	N	비만도 분포						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율)			
		% (표준오차)	상대표준오차	% (표준오차)	상대표준오차	% (표준오차)	상대표준오차	평균(표준오차)	상대표준오차
전체	900	3.2(0.6)	19.9	63.4(2.1)	3.3	33.4(2.2)	6.5	24.0(0.2)	0.7
연령									
19-29	66	10.2(3.6)	35.0	58.1(5.9)	10.2	31.7(5.7)	18.1	24.2(0.7)	2.9
30-39	103	2.9(1.5)	51.9	57.1(5.3)	9.4	40.0(5.3)	13.2	24.2(0.4)	1.5
40-49	133	4.2(1.5)	35.5	63.7(5.2)	8.1	32.1(5.0)	15.6	23.8(0.3)	1.4
50-59	217	0.0(0.0)	.	66.6(3.1)	4.7	33.4(3.1)	9.4	24.0(0.2)	0.7
60-69	223	1.6(0.8)	51.0	63.1(3.6)	5.7	35.3(3.4)	9.8	24.2(0.2)	0.9
70 이상	158	3.2(1.5)	47.1	69.1(4.0)	5.8	27.7(4.1)	14.6	23.5(0.3)	1.2
19-64	640	3.5(0.8)	22.9	62.0(2.5)	4.1	34.5(2.6)	7.4	24.1(0.2)	0.8
65 이상	260	2.1(0.9)	43.5	68.2(3.5)	5.2	29.7(3.6)	12.1	23.7(0.2)	1.0
교육수준 ³⁾									
무학	30	13.5(7.6)	56.2	69.8(7.9)	11.3	16.7(5.9)	35.6	22.4(0.6)	2.8
초등학교	84	0.8(0.8)	100.6	67.7(5.7)	8.4	31.5(5.7)	18.2	24.2(0.4)	1.6
중학교	101	2.7(1.5)	56.7	62.3(6.2)	10.0	35.0(5.9)	16.8	24.1(0.3)	1.3
고등학교	374	3.5(1.2)	33.2	65.5(2.9)	4.5	31.0(2.8)	9.0	23.7(0.2)	0.8
대학교 이상	311	2.8(0.9)	32.5	60.2(3.4)	5.6	37.0(3.5)	9.5	24.3(0.3)	1.2
직업									
전문행정관리	136	2.4(1.3)	55.4	63.4(4.5)	7.0	34.2(4.3)	12.7	24.4(0.4)	1.7
사무직	81	3.6(2.1)	57.7	68.8(4.7)	6.8	27.5(4.9)	17.8	24.0(0.5)	1.9
판매·서비스직	115	5.9(2.6)	44.3	52.3(5.6)	10.6	41.8(5.6)	13.5	24.1(0.4)	1.8
농림어업	44	1.5(1.5)	102.3	63.6(7.7)	12.2	34.9(7.7)	22.0	24.3(0.5)	2.1
기능단순노무직	224	1.5(0.7)	43.8	58.9(3.4)	5.8	39.5(3.5)	8.9	24.4(0.2)	0.9
기타 ⁴⁾	300	3.8(1.4)	37.8	69.5(3.2)	4.6	26.6(3.2)	12.1	23.4(0.2)	1.0
월 가구소득									
100만원 미만	47	8.7(4.2)	47.8	52.4(8.8)	16.8	38.9(8.0)	20.6	23.8(0.5)	2.2
100-200만원 미만	109	1.4(1.0)	71.5	69.7(4.9)	7.0	28.9(4.9)	17.0	23.9(0.4)	1.7
200-300만원 미만	107	1.7(1.2)	70.6	59.1(4.6)	7.9	39.2(4.9)	12.6	24.3(0.4)	1.5
300-400만원 미만	114	0.7(0.1)	12.2	58.9(5.1)	8.6	40.3(5.1)	12.6	24.3(0.3)	1.2
400만원 이상	521	3.9(1.0)	24.7	64.3(2.7)	4.1	31.8(2.7)	8.5	23.9(0.2)	0.9

주 : 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)
2) 비만율(자가보고) : (체질량지수(kg/m²)가 25 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 31〉 남자 비만도 분포¹⁾ 및 비만을(자가보고)²⁾

(단위 : %, kg/m²)

구분	N	비만도 분포						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만을)		평균(표준오차)	상대표준오차
		%(표준오차)	상대표준오차	%(표준오차)	상대표준오차	%(표준오차)	상대표준오차		
전체	452	1.4(0.6)	45.6	56.7(2.5)	4.4	42.0(2.6)	6.2	24.8(0.2)	0.8
연령									
19-29	32	3.5(3.5)	99.3	57.0(8.3)	14.5	39.5(8.1)	20.6	25.7(0.9)	3.5
30-39	51	1.7(1.7)	100.1	46.8(7.2)	15.3	51.5(7.2)	14.0	25.3(0.4)	1.7
40-49	68	1.1(1.1)	100.4	54.1(6.7)	12.3	44.8(6.7)	15.1	24.8(0.4)	1.5
50-59	108	0.0(0.0)	.	60.3(4.5)	7.5	39.7(4.5)	11.4	24.7(0.2)	0.9
60-69	115	1.4(1.0)	71.2	53.9(5.4)	10.1	44.8(5.4)	12.1	24.7(0.3)	1.3
70 이상	78	1.5(1.5)	101.2	68.0(5.5)	8.1	30.6(5.4)	17.7	23.7(0.4)	1.5
19-64	321	1.4(0.8)	55.2	54.5(3.0)	5.4	44.1(3.1)	7.0	25.0(0.2)	1.0
65 이상	131	1.4(1.0)	74.4	64.7(4.9)	7.6	33.9(4.8)	14.2	23.9(0.3)	1.3
교육수준 ³⁾									
무학	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	35	1.8(1.8)	99.9	61.2(8.3)	13.5	37.0(8.3)	22.5	24.6(0.6)	2.4
중학교	38	2.2(2.2)	100.4	54.9(9.9)	18.1	42.9(9.4)	21.9	23.8(0.5)	2.3
고등학교	198	1.7(1.3)	75.7	61.2(3.0)	4.9	37.1(3.0)	8.1	24.4(0.2)	1.0
대학교 이상	176	0.5(0.5)	101.1	51.8(4.3)	8.4	47.7(4.3)	9.1	25.4(0.3)	1.4
직업									
전문행정관리	76	0.0(0.0)	.	49.9(6.6)	13.2	50.1(6.6)	13.1	26.2(0.6)	2.3
사무직	50	1.7(1.7)	100.1	64.0(6.5)	10.1	34.2(6.5)	19.0	24.4(0.4)	1.8
판매·서비스직	34	0.0(0.0)	.	48.9(10.5)	21.4	51.1(10.5)	20.5	25.2(0.6)	2.5
농림어업	25	2.8(2.9)	102.6	55.9(10.4)	18.7	41.3(10.4)	25.0	24.4(0.6)	2.4
기능단순노무직	160	1.1(0.8)	72.1	54.6(4.2)	7.8	44.3(4.3)	9.7	24.7(0.3)	1.0
기타 ⁴⁾	107	2.8(2.2)	76.4	64.1(4.8)	7.5	33.1(4.7)	14.1	23.9(0.4)	1.5
월 가구소득									
100만원 미만	18	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	55	2.7(1.9)	69.0	70.4(6.8)	9.7	26.9(7.0)	25.9	23.7(0.7)	2.8
200-300만원 미만	53	0.0(0.0)	.	52.5(6.6)	12.6	47.5(6.6)	13.9	25.0(0.5)	1.9
300-400만원 미만	57	0.0(0.0)	.	57.1(7.2)	12.5	42.9(7.2)	16.7	24.7(0.4)	1.5
400만원 이상	267	1.5(0.9)	62.8	55.1(3.0)	5.5	43.4(3.2)	7.3	25.0(0.3)	1.1

주 : 1) 남자 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 남자 비만을(자가보고) : (체질량지수(kg/m²)가 25 이상인 사람의 수 / 남자 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 32〉 여자 비만도 분포¹⁾ 및 비만율(자가보고)²⁾

(단위 : %, kg/m²)

구분	N	비만도 분포						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율)			
		%(표준오차)	상대표준오차	%(표준오차)	상대표준오차	%(표준오차)	상대표준오차	평균(표준오차)	상대표준오차
전체	448	5.2(1.1)	21.2	70.7(2.8)	3.9	24.1(2.8)	11.6	23.1(0.2)	0.9
연령									
19-29	34	18.7(6.2)	33.0	59.6(6.5)	10.9	21.7(7.2)	33.1	22.3(0.8)	3.6
30-39	52	4.3(2.5)	58.3	69.6(7.3)	10.4	26.1(6.9)	26.2	22.9(0.6)	2.5
40-49	65	7.6(2.9)	38.3	74.1(6.1)	8.2	18.3(5.4)	29.8	22.7(0.5)	2.1
50-59	109	0.0(0.0)	.	73.5(4.6)	6.3	26.5(4.6)	17.5	23.2(0.3)	1.2
60-69	108	1.8(1.3)	72.0	72.2(4.1)	5.7	26.0(3.9)	14.9	23.8(0.3)	1.1
70 이상	80	4.8(2.4)	49.7	70.2(4.5)	6.4	25.0(4.5)	18.1	23.4(0.4)	1.6
19-64	319	5.9(1.4)	23.5	70.5(3.3)	4.7	23.6(3.3)	14.0	23.0(0.3)	1.1
65 이상	129	2.8(1.4)	51.5	71.5(3.7)	5.1	25.7(3.7)	14.3	23.5(0.3)	1.1
교육수준 ³⁾									
무학	25	11.8(8.1)	68.5	72.5(8.7)	12.0	15.6(6.6)	42.3	22.3(0.6)	2.7
초등학교	49	0.0(0.0)	.	72.8(6.4)	8.8	27.2(6.4)	23.6	23.8(0.4)	1.8
중학교	63	3.1(2.2)	70.2	66.8(6.1)	9.1	30.2(5.7)	19.0	24.2(0.4)	1.6
고등학교	176	5.6(2.1)	37.7	70.5(5.0)	7.1	24.0(4.7)	19.4	23.0(0.3)	1.4
대학교 이상	135	6.0(2.0)	33.5	71.6(4.5)	6.2	22.5(4.5)	19.9	22.9(0.4)	1.6
직업									
전문행정관리	60	5.5(2.9)	52.9	81.6(4.7)	5.8	12.9(4.5)	34.9	22.0(0.3)	1.5
사무직	31	6.4(4.6)	72.8	75.9(7.0)	9.2	17.7(6.2)	35.0	23.3(0.8)	3.5
판매·서비스직	81	8.9(3.9)	43.4	54.0(6.0)	11.1	37.2(6.1)	16.4	23.5(0.5)	2.2
농림어업	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	64	2.6(1.3)	49.5	70.7(6.2)	8.7	26.7(6.1)	22.7	23.5(0.4)	1.8
기타 ⁴⁾	193	4.5(1.5)	33.6	73.1(3.9)	5.4	22.5(4.0)	17.9	23.1(0.3)	1.2
월 가구소득									
100만원 미만	29	10.8(5.9)	54.9	60.1(10.6)	17.6	29.1(8.7)	29.8	22.9(0.7)	3.0
100-200만원 미만	54	0.0(0.0)	.	68.9(5.9)	8.5	31.1(5.9)	18.9	24.0(0.5)	2.0
200-300만원 미만	54	3.3(2.4)	71.6	65.6(6.6)	10.1	31.1(6.9)	22.2	23.7(0.5)	2.2
300-400만원 미만	57	1.5(0.2)	14.4	60.9(6.6)	10.9	37.6(6.6)	17.5	23.9(0.4)	1.6
400만원 이상	254	6.7(1.7)	25.2	74.7(3.6)	4.8	18.7(3.5)	18.6	22.7(0.3)	1.3

주 : 1) 여자 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)
2) 여자 비만율(자가보고) : (체질량지수(kg/m²)가 25 이상인 사람의 수 / 여자 조사대상 응답자 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 33〉 주관적 비만인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	46.6(2.2)	4.7	453	46.0(2.8)	6.0	456	47.3(2.5)	5.3
연령									
19-29	67	44.4(5.8)	13.0	33	45.5(8.4)	18.5	34	43.0(8.3)	19.3
30-39	103	49.8(5.2)	10.5	51	51.5(7.3)	14.2	52	47.9(8.0)	16.7
40-49	134	49.9(4.6)	9.3	68	46.6(6.4)	13.7	66	53.4(6.5)	12.1
50-59	218	54.7(3.6)	6.6	108	50.2(4.5)	9.1	110	59.6(4.7)	8.0
60-69	223	45.6(3.4)	7.6	115	47.8(5.3)	11.0	108	43.5(4.8)	11.1
70 이상	164	28.8(4.2)	14.7	78	28.9(5.1)	17.6	86	28.7(4.7)	16.6
19-64	643	50.5(2.5)	5.0	322	48.7(3.4)	6.9	321	52.5(2.8)	5.3
65 이상	266	33.2(3.5)	10.5	131	35.5(4.6)	12.9	135	31.1(4.0)	12.9
교육수준 ²⁾									
무학	33	25.2(9.0)	35.6	5	—(—)	—	28	25.9(8.0)	30.7
초등학교	88	36.0(5.8)	16.1	35	42.4(7.5)	17.6	53	31.3(6.4)	20.3
중학교	101	47.0(4.5)	9.6	38	41.7(7.5)	18.1	63	50.1(6.0)	11.9
고등학교	376	42.0(2.5)	6.1	199	39.1(3.1)	7.8	177	45.4(3.9)	8.6
대학교 이상	311	54.9(3.3)	6.1	176	54.3(4.4)	8.0	135	55.6(4.0)	7.2
직업									
전문행정관리	136	52.6(3.9)	7.5	76	62.4(5.2)	8.3	60	39.5(5.4)	13.7
사무직	81	50.9(6.3)	12.3	50	42.5(8.0)	18.9	31	63.2(9.4)	14.8
판매·서비스직	115	50.3(4.6)	9.2	34	40.6(9.7)	23.9	81	55.1(5.4)	9.8
농림어업	45	35.2(8.9)	25.3	25	34.1(10.8)	31.5	20	36.3(11.4)	31.4
기능단순노무직	226	50.5(3.9)	7.7	161	49.2(4.5)	9.1	65	54.1(6.3)	11.7
기타 ³⁾	306	39.2(3.4)	8.6	107	34.4(4.8)	13.9	199	42.2(4.0)	9.5
월 가구소득									
100만원 미만	49	34.5(6.6)	19.1	18	—(—)	—	31	26.8(7.8)	29.2
100-200만원 미만	116	37.6(5.7)	15.1	56	32.6(7.5)	23.1	60	42.8(6.7)	15.6
200-300만원 미만	107	42.8(6.0)	14.1	53	45.4(8.5)	18.6	54	40.2(8.1)	20.2
300-400만원 미만	114	42.8(4.8)	11.2	57	38.8(6.6)	17.0	57	47.2(6.8)	14.4
400만원 이상	521	50.7(2.8)	5.5	267	50.2(3.5)	7.0	254	51.2(3.2)	6.2

주 : 1) 주관적 비만인지율 : (“약간 비만임” 또는 “매우 비만임”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 34〉 연간 체중조절 시도율¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	56.6(2.1)	3.7	453	51.0(2.6)	5.0	456	62.6(2.5)	3.9
연령									
19-29	67	64.4(5.3)	8.3	33	59.7(8.1)	13.5	34	70.5(6.2)	8.8
30-39	103	66.3(4.7)	7.1	51	66.1(7.0)	10.6	52	66.6(7.4)	11.0
40-49	134	59.5(4.8)	8.0	68	47.6(6.1)	12.9	66	72.4(6.6)	9.2
50-59	218	61.7(3.8)	6.2	108	52.6(5.0)	9.5	110	71.5(4.9)	6.9
60-69	223	57.2(3.5)	6.1	115	52.2(4.3)	8.3	108	62.1(4.8)	7.7
70 이상	164	26.1(3.9)	15.1	78	24.2(4.8)	19.7	86	27.7(4.9)	17.7
19-64	643	62.2(2.2)	3.6	322	55.0(3.0)	5.5	321	70.4(2.5)	3.6
65 이상	266	37.2(3.9)	10.4	131	36.0(4.7)	12.9	135	38.4(4.4)	11.5
교육수준 ²⁾									
무학	33	13.6(5.6)	41.2	5	-(-)	-	28	16.2(6.5)	40.0
초등학교	88	35.4(4.3)	12.1	35	36.6(7.7)	21.0	53	34.5(5.5)	15.8
중학교	101	52.5(6.2)	11.9	38	50.0(10.1)	20.2	63	54.0(6.2)	11.5
고등학교	376	55.5(2.9)	5.3	199	46.2(4.2)	9.1	177	66.3(3.5)	5.3
대학교 이상	311	65.7(3.0)	4.6	176	58.9(3.7)	6.4	135	75.0(4.2)	5.6
직업									
전문행정관리	136	67.1(4.4)	6.6	76	64.9(5.2)	8.0	60	70.1(7.0)	10.0
사무직	81	62.9(5.8)	9.2	50	61.8(7.4)	11.9	31	64.4(9.5)	14.8
판매·서비스직	115	63.6(5.0)	7.9	34	50.3(11.4)	22.8	81	70.2(4.7)	6.6
농림어업	45	45.9(8.9)	19.4	25	49.0(10.5)	21.4	20	42.5(10.9)	25.7
기능단순노무직	226	48.6(3.6)	7.3	161	47.0(4.0)	8.6	65	53.0(5.7)	10.9
기타 ³⁾	306	53.4(3.6)	6.7	107	41.4(5.6)	13.4	199	61.0(3.8)	6.2
월 가구소득									
100만원 미만	49	44.7(7.7)	17.2	18	-(-)	-	31	48.0(10.1)	21.0
100-200만원 미만	116	40.6(5.0)	12.4	56	35.7(7.3)	20.4	60	45.7(7.2)	15.8
200-300만원 미만	107	44.6(5.9)	13.1	53	47.6(7.1)	14.8	54	41.7(7.5)	18.1
300-400만원 미만	114	65.3(4.0)	6.1	57	60.3(6.0)	9.9	57	70.5(6.1)	8.6
400만원 이상	521	60.5(2.6)	4.3	267	52.9(3.2)	6.1	254	69.2(3.4)	4.9

주 : 1) 연간 체중조절 시도율 : (최근 1년 동안 체중을 "줄이거나" 또는 "유지"하려고 노력했던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 35〉 체중조절 시도 방법¹⁾

(단위 : %)

구분	N	운동		단식 (24시간 이상)		식량감소 또는 식단조절		결식 (식사를 거름)		의사 처방 없이 임의로 살빼는 방법		의사 처방을 받아서 살빼는 방법		한약 복용		건강기능식품		원푸드 다이어트		기타	
		%	상대 %	%	상대 %	%	상대 %	%	상대 %	%	상대 %	%	상대 %	%	상대 %	%	상대 %	%	상대 %	%	상대 %
전체	483	82.4(1.8)	2.2	5.1(1.1)	22.3	79.7(1.9)	2.4	22.2(2.7)	12.3	1.6(0.6)	37.3	3.0(0.9)	29.1	2.0(0.8)	38.9	10.3(1.8)	17.3	1.6(0.6)	39.7	0.0(0.0)	.
성																					
남자	217	85.8(2.5)	3.0	4.4(1.6)	35.3	73.7(3.5)	4.8	20.4(3.6)	17.5	1.1(0.8)	67.2	1.4(0.8)	56.8	1.2(0.9)	73.7	9.2(2.4)	26.4	1.6(1.1)	72.4	0.0(0.0)	.
여자	276	79.4(2.6)	3.2	5.7(1.7)	29.8	84.9(2.1)	2.4	23.8(3.1)	13.0	2.1(1.0)	47.9	4.4(1.5)	34.2	2.8(1.3)	45.7	11.2(2.1)	18.7	1.7(0.9)	52.0	0.0(0.0)	.
연령																					
19-29	44	83.2(5.5)	6.6	4.5(3.1)	69.6	85.9(5.0)	5.9	35.8(8.9)	24.8	0.0(0.0)	.	2.0(2.1)	100.8	4.4(3.1)	70.6	9.3(4.3)	46.1	3.0(3.0)	100.0	0.0(0.0)	.
30-39	66	79.0(4.9)	6.3	13.5(4.5)	33.1	74.9(5.1)	6.8	28.9(7.5)	25.8	7.7(3.6)	46.7	6.1(3.3)	54.5	2.5(2.4)	96.6	15.7(4.6)	29.0	3.9(2.7)	68.5	0.0(0.0)	.
40-49	81	82.4(5.0)	6.1	10.4(3.8)	36.8	83.6(3.5)	4.2	28.2(5.0)	17.7	2.1(1.4)	66.5	6.8(3.1)	45.1	4.5(2.7)	60.8	15.6(5.0)	32.2	1.2(1.2)	99.7	0.0(0.0)	.
50-59	134	76.1(4.5)	5.9	2.0(1.0)	52.3	76.2(3.5)	4.6	17.8(2.9)	16.3	0.0(0.0)	.	1.4(1.0)	70.3	0.0(0.0)	.	8.7(2.9)	33.6	0.9(0.9)	97.8	0.0(0.0)	.
60-69	123	91.7(2.5)	2.8	0.0(0.0)	.	78.1(3.7)	4.8	7.1(2.4)	34.1	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	99.7	0.9(0.9)	99.7	6.5(2.2)	33.8	0.7(0.7)	100.3	0.0(0.0)	.
70 이상	45	84.5(5.0)	5.9	0.0(0.0)	.	83.2(4.7)	5.7	21.0(6.0)	28.5	2.0(2.0)	99.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.2(2.2)	100.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
19-64	395	81.1(2.1)	2.5	6.0(1.3)	22.0	79.7(2.0)	2.5	23.9(3.1)	13.1	1.8(0.7)	39.6	3.5(1.0)	29.4	2.4(0.9)	38.8	10.9(2.0)	18.7	1.9(0.8)	40.0	0.0(0.0)	.
65 이상	98	89.7(2.8)	3.1	0.0(0.0)	.	79.3(3.4)	4.3	12.6(3.4)	26.8	0.9(0.9)	100.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	6.6(2.7)	41.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾																					
무학	5	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)
초등학교	29	80.4(9.0)	11.2	0.0(0.0)	.	86.7(5.8)	6.7	17.9(6.7)	37.5	2.7(2.7)	99.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	13.1(7.8)	59.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
중학교	51	80.2(5.6)	6.9	1.6(0.3)	16.6	94.7(2.6)	2.8	14.6(7.2)	49.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.7(2.4)	65.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
고등학교	205	77.9(2.9)	3.8	4.9(1.7)	34.2	75.3(3.1)	4.2	21.2(3.7)	17.3	1.8(1.0)	53.2	2.7(1.4)	52.9	0.4(0.4)	99.7	9.4(2.5)	26.5	1.0(0.7)	74.2	0.0(0.0)	.
대학교 이상	203	87.2(2.0)	2.3	6.5(2.0)	31.3	80.1(3.2)	4.0	24.7(3.9)	15.7	1.7(1.1)	63.8	4.2(1.5)	35.1	4.1(1.7)	41.0	11.8(2.6)	21.8	2.7(1.3)	47.5	0.0(0.0)	.
직업																					
전문행정관리	90	89.0(3.8)	4.3	5.1(2.7)	51.9	86.1(4.6)	5.3	25.2(5.1)	20.4	0.0(0.0)	.	2.1(1.5)	70.2	2.9(2.1)	72.9	14.3(4.3)	30.3	4.6(2.7)	58.9	0.0(0.0)	.
사무직	48	84.3(5.4)	6.5	15.2(5.9)	38.8	80.2(5.1)	6.3	32.2(6.7)	20.8	6.4(4.3)	67.9	7.6(4.5)	58.8	7.2(3.5)	48.1	11.8(5.8)	49.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	76	72.7(6.1)	8.4	4.2(2.3)	54.4	81.6(4.5)	5.5	21.6(5.7)	26.5	0.8(0.8)	99.0	3.3(2.3)	71.0	3.3(2.3)	71.0	12.3(5.4)	44.0	2.0(2.0)	98.8	0.0(0.0)	.
농림어업	20	86.6(7.8)	9.0	0.0(0.0)	.	71.8(12.0)	16.7	11.9(10.4)	87.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	7.9(6.9)	87.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	107	75.0(4.8)	6.4	1.0(1.0)	98.6	73.9(4.6)	6.2	14.7(3.7)	25.1	1.8(1.3)	72.1	2.2(2.1)	97.2	0.0(0.0)	.	10.7(3.2)	30.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	152	86.7(3.4)	3.9	5.1(1.9)	37.1	78.9(3.6)	4.5	22.9(4.6)	20.0	1.4(1.0)	70.0	2.6(1.3)	48.3	0.6(0.6)	100.2	6.0(2.0)	32.6	1.3(0.9)	71.9	0.0(0.0)	.
월 가구소득																					
100만원 미만	19	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)	-(⁻)
100-200만원 미만	46	86.5(4.6)	5.4	4.3(3.0)	69.6	81.7(6.6)	8.1	34.1(8.0)	23.4	1.6(1.6)	103.1	0.0(0.0)	.	4.6(4.4)	96.4	8.4(4.7)	55.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	44	84.6(7.9)	9.3	0.0(0.0)	.	75.2(6.3)	8.4	11.6(6.4)	54.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	4.4(3.1)	70.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	71	82.1(5.6)	6.9	3.5(2.5)	72.4	73.4(6.8)	9.3	13.2(5.0)	38.1	0.0(0.0)	.	1.5(1.5)	99.2	1.3(1.3)	100.2	3.5(2.0)	57.5	2.2(2.3)	102.0	0.0(0.0)	.
400만원 이상	312	81.7(2.1)	2.6	6.4(1.6)	25.0	81.4(2.1)	2.6	24.6(3.6)	14.7	2.3(0.9)	39.3	4.2(1.3)	30.3	2.2(0.9)	42.0	12.9(2.6)	20.5	2.0(0.9)	46.9	0.0(0.0)	.

주 : 1) 체중조절 시도 방법 : (각 체중조절 시도 방법 / 체중을 "줄이거나" 또는 "유지"하려고 노력했던 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 36〉 아침식사빈도 및 아침 식사 실천율¹⁾ (단위 : %)

구분	N	0일		1-2일		3-4일		5-7일 (아침식사실천율)	
		%(표준오차)	상대표준오차	%(표준오차)	상대표준오차	%(표준오차)	상대표준오차	%(표준오차)	상대표준오차
전체	909	24.2(1.9)	8.0	9.2(1.3)	14.1	9.8(1.1)	11.5	56.7(2.4)	4.2
성									
남자	453	26.2(2.6)	10.0	6.9(1.4)	20.7	10.1(1.7)	16.3	56.8(3.1)	5.4
여자	456	22.1(2.2)	10.1	11.8(1.9)	16.1	9.5(1.5)	16.0	56.6(2.8)	4.9
연령									
19-29	67	43.4(6.7)	15.4	17.8(5.4)	30.0	11.5(4.1)	35.3	27.2(6.2)	22.9
30-39	103	31.8(5.7)	18.0	18.9(4.1)	21.6	19.3(3.8)	19.9	30.0(5.2)	17.2
40-49	134	40.7(4.7)	11.5	13.2(2.8)	21.5	10.9(2.8)	26.0	35.2(4.8)	13.7
50-59	218	23.6(3.4)	14.5	7.5(1.7)	22.3	10.5(2.2)	21.2	58.4(3.9)	6.6
60-69	223	7.5(2.1)	28.4	1.5(0.9)	56.2	4.3(1.4)	31.8	86.7(2.5)	2.8
70 이상	164	1.6(1.2)	74.1	0.9(0.9)	99.6	4.8(1.8)	37.0	92.8(2.2)	2.3
19-64	643	30.3(2.3)	7.6	11.8(1.6)	13.7	11.4(1.4)	12.6	46.5(2.7)	5.8
65 이상	266	3.4(1.4)	40.1	0.5(0.5)	100.1	4.4(1.4)	30.8	91.7(2.0)	2.1
교육수준 ²⁾									
무학	33	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0
초등학교	88	6.4(2.8)	44.0	1.3(1.3)	100.6	3.5(1.9)	54.5	88.8(3.5)	3.9
중학교	101	10.2(3.3)	32.4	3.4(2.1)	59.9	6.9(2.5)	36.9	79.5(4.3)	5.4
고등학교	376	25.2(2.8)	11.1	10.3(2.1)	20.3	7.2(1.5)	21.1	57.4(3.0)	5.2
대학교 이상	311	31.5(3.1)	9.9	11.7(2.3)	20.1	15.2(2.3)	15.0	41.6(3.2)	7.7
직업									
전문행정관리	136	33.7(4.4)	13.1	11.2(2.8)	24.9	14.6(3.2)	21.9	40.5(4.2)	10.3
사무직	81	36.1(6.2)	17.2	9.2(3.5)	38.6	17.7(4.9)	27.9	37.0(6.5)	17.5
판매·서비스직	115	29.3(5.4)	18.3	14.7(4.1)	27.9	5.4(1.9)	35.5	50.6(4.9)	9.6
농림어업	45	6.3(3.8)	60.1	8.0(4.8)	59.7	0.0(0.0)	.	85.7(5.5)	6.5
기능단순노무직	226	21.6(3.2)	14.9	7.9(2.1)	25.8	9.8(2.4)	24.9	60.7(4.5)	7.5
기타 ³⁾	306	17.5(2.8)	16.1	7.1(2.1)	30.1	8.0(1.7)	21.7	67.4(3.5)	5.1
월 가구소득									
100만원 미만	49	4.5(3.1)	67.9	2.4(2.2)	92.0	10.5(5.5)	52.4	82.6(5.9)	7.2
100-200만원 미만	116	10.3(2.8)	27.6	7.1(3.2)	45.1	5.0(2.6)	51.9	77.6(5.2)	6.7
200-300만원 미만	107	16.9(4.1)	24.4	5.6(2.4)	43.6	7.3(2.3)	30.9	70.3(5.2)	7.4
300-400만원 미만	114	20.0(5.7)	28.5	6.9(3.0)	43.8	13.9(3.4)	24.5	59.2(6.3)	10.7
400만원 이상	521	30.1(2.5)	8.5	11.2(1.8)	15.9	10.0(1.5)	14.6	48.8(3.0)	6.1

주 : 1) 아침 식사 실천율 : (최근 1년 동안 주평균 5일 이상 아침식사를 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요
약

제 1
부 조
사 체
계

제 2
부 주
요 통
계 결
과

제 3
부 통
계 표

제 4
부 부
록

I. 통계표

〈표 37〉 영양표시 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	908	82.1(1.3)	1.6	452	80.4(1.7)	2.1	456	83.8(1.9)	2.3
연령									
19-29	67	94.7(2.6)	2.8	33	96.6(3.4)	3.5	34	92.3(4.2)	4.6
30-39	103	93.8(3.3)	3.5	51	96.5(2.6)	2.7	52	90.6(4.8)	5.3
40-49	134	92.5(2.1)	2.3	68	89.0(3.8)	4.3	66	96.3(2.0)	2.1
50-59	218	87.5(2.1)	2.4	108	82.5(2.9)	3.5	110	92.9(2.7)	2.9
60-69	223	74.1(2.9)	3.9	115	68.3(4.5)	6.6	108	79.8(4.3)	5.3
70 이상	163	46.6(4.1)	8.8	77	45.5(5.1)	11.2	86	47.5(5.7)	12.1
19-64	643	88.9(1.1)	1.3	322	87.0(1.6)	1.9	321	91.1(1.6)	1.8
65 이상	265	58.5(3.5)	6.1	130	55.5(4.3)	7.8	135	61.2(4.9)	8.0
교육수준 ²⁾									
무학	33	22.9(5.9)	25.9	5	—(—)	—	28	19.1(5.8)	30.6
초등학교	88	43.6(6.3)	14.4	35	35.0(8.5)	24.4	53	49.9(8.2)	16.4
중학교	101	68.9(4.5)	6.5	38	65.7(7.2)	11.0	63	70.9(5.6)	8.0
고등학교	375	87.1(1.9)	2.2	198	82.0(3.1)	3.8	177	92.9(2.1)	2.3
대학교 이상	311	91.3(1.7)	1.8	176	88.2(2.3)	2.6	135	95.5(2.0)	2.1
직업									
전문행정관리	136	94.2(1.7)	1.8	76	93.6(2.7)	2.9	60	95.1(2.8)	3.0
사무직	81	92.8(3.2)	3.4	50	94.1(3.0)	3.2	31	90.9(6.5)	7.1
판매·서비스직	115	86.1(3.9)	4.5	34	77.4(7.2)	9.2	81	90.4(3.8)	4.2
농림어업	45	56.5(8.7)	15.5	25	60.1(9.4)	15.6	20	52.5(11.4)	21.7
기능단순노무직	226	77.6(2.8)	3.7	161	77.8(3.2)	4.1	65	77.1(5.3)	6.9
기타 ³⁾	305	77.1(2.7)	3.5	106	71.9(4.4)	6.1	199	80.4(3.3)	4.1
월 가구소득									
100만원 미만	49	53.9(7.8)	14.4	18	—(—)	—	31	54.3(10.6)	19.6
100-200만원 미만	116	64.4(4.5)	7.0	56	67.4(5.6)	8.4	60	61.3(6.4)	10.5
200-300만원 미만	107	74.1(3.8)	5.1	53	72.8(5.3)	7.2	54	75.3(6.0)	8.0
300-400만원 미만	114	80.8(3.4)	4.2	57	69.6(6.1)	8.8	57	92.9(2.9)	3.1
400만원 이상	520	88.5(1.4)	1.6	266	86.8(1.6)	1.9	254	90.3(2.1)	2.3

주 : 1) 영양표시 인지율 : (영양표시를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 38〉 영양표시 독해율¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	908	33.0(1.8)	5.4	452	24.6(2.3)	9.3	456	42.0(2.5)	5.9
연령									
19-29	67	43.8(6.0)	13.6	33	43.8(7.8)	17.9	34	43.9(9.6)	21.9
30-39	103	36.3(4.9)	13.4	51	27.7(6.6)	23.7	52	46.7(7.5)	16.1
40-49	134	37.8(4.0)	10.6	68	24.5(5.2)	21.2	66	52.1(5.6)	10.8
50-59	218	38.5(3.8)	9.9	108	27.1(4.6)	17.1	110	50.8(5.3)	10.5
60-69	223	28.6(3.3)	11.5	115	17.9(4.2)	23.7	108	39.1(4.7)	12.1
70 이상	163	9.5(2.0)	20.9	77	3.7(2.1)	57.7	86	14.7(3.1)	21.2
19-64	643	37.5(2.2)	5.8	322	28.3(2.8)	9.8	321	48.0(3.1)	6.5
65 이상	265	17.4(2.6)	14.9	130	10.7(2.8)	26.7	135	23.6(3.6)	15.3
교육수준 ²⁾									
무학	33	5.5(4.3)	77.5	5	—(—)	—	28	2.5(2.4)	95.3
초등학교	88	10.4(3.6)	34.7	35	10.2(6.0)	58.4	53	10.5(4.2)	39.4
중학교	101	21.4(4.4)	20.7	38	15.6(6.8)	43.5	63	25.0(5.1)	20.5
고등학교	375	32.0(2.3)	7.2	198	20.6(2.8)	13.5	177	45.0(3.9)	8.6
대학교 이상	311	43.0(3.2)	7.5	176	32.0(4.2)	13.2	135	57.9(4.5)	7.7
직업									
전문행정관리	136	44.2(4.7)	10.6	76	34.1(6.1)	18.0	60	57.6(6.5)	11.3
사무직	81	29.8(4.4)	14.9	50	27.0(6.3)	23.5	31	33.8(7.9)	23.3
판매·서비스직	115	37.3(5.6)	15.1	34	18.7(6.8)	36.1	81	46.5(6.9)	14.8
농림어업	45	20.0(7.0)	35.2	25	13.8(7.6)	55.0	20	26.8(11.4)	42.7
기능단순노무직	226	23.2(2.8)	12.1	161	19.7(3.2)	16.0	65	33.0(5.9)	17.9
기타 ³⁾	305	35.1(2.8)	8.0	106	26.8(4.5)	16.9	199	40.3(3.6)	8.8
월 가구소득									
100만원 미만	49	24.8(5.7)	22.9	18	—(—)	—	31	31.5(8.4)	26.8
100-200만원 미만	116	22.5(4.8)	21.2	56	25.9(7.3)	28.3	60	18.9(4.9)	26.2
200-300만원 미만	107	28.9(4.5)	15.6	53	17.6(5.6)	31.5	54	39.9(6.0)	14.9
300-400만원 미만	114	35.0(5.8)	16.6	57	28.6(6.6)	23.1	57	41.8(8.1)	19.4
400만원 이상	520	35.2(2.3)	6.5	266	24.2(2.7)	11.3	254	47.7(3.8)	8.0

주 : 1) 영양표시 독해율 : (가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 39〉 영양표시 활용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	278	83.1(2.1)	2.6	95	80.8(3.6)	4.5	183	84.5(2.9)	3.4
연령									
19-29	30	82.8(6.3)	7.6	15	-()	-	15	-()	-
30-39	38	89.5(5.1)	5.7	14	-()	-	24	86.4(7.2)	8.3
40-49	50	82.7(6.2)	7.5	16	-()	-	34	86.1(6.4)	7.4
50-59	83	79.9(3.9)	4.9	28	77.5(8.6)	11.1	55	81.3(5.3)	6.6
60-69	60	86.4(4.8)	5.6	19	-()	-	41	96.5(2.6)	2.7
70 이상	17	-()	-	3	-()	-	14	-()	-
19-64	233	83.4(2.2)	2.7	82	83.2(3.8)	4.5	151	83.6(3.2)	3.8
65 이상	45	80.7(5.7)	7.1	13	-()	-	32	90.3(4.7)	5.2
교육수준 ²⁾									
무학	2	-()	-	1	-()	-	1	-()	-
초등학교	9	-()	-	3	-()	-	6	-()	-
중학교	23	87.5(7.6)	8.7	5	-()	-	18	-()	-
고등학교	113	77.4(4.4)	5.7	34	64.0(8.6)	13.4	79	84.4(4.6)	5.4
대학교 이상	131	88.6(2.9)	3.3	52	92.2(3.2)	3.5	79	85.8(4.4)	5.1
직업									
전문행정관리	57	92.2(3.3)	3.5	22	89.0(6.3)	7.1	35	94.6(3.5)	3.7
사무직	24	91.7(5.7)	6.2	13	-()	-	11	-()	-
판매·서비스직	44	81.7(5.9)	7.2	6	-()	-	38	84.8(6.0)	7.1
농림어업	8	-()	-	3	-()	-	5	-()	-
기능단순노무직	51	75.6(7.4)	9.8	31	80.2(6.9)	8.5	20	68.1(13.8)	20.3
기타 ³⁾	94	79.9(4.2)	5.3	20	80.4(8.9)	11.1	74	79.7(5.5)	6.9
월 가구소득									
100만원 미만	9	-()	-	1	-()	-	8	-()	-
100-200만원 미만	24	83.6(7.2)	8.6	11	-()	-	13	-()	-
200-300만원 미만	30	75.7(8.7)	11.6	9	-()	-	21	65.2(11.6)	17.7
300-400만원 미만	35	78.5(7.5)	9.5	13	-()	-	22	80.0(10.0)	12.5
400만원 이상	178	84.6(2.9)	3.4	59	78.5(4.9)	6.3	119	88.0(3.4)	3.9

주 : 1) 영양표시 활용률 : (영양표시 내용이 가공식품을 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수 / 가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 40〉 하루 평균 수면시간(주중)¹⁾ (단위: %, 시간)

구분	N	6시간 이하		7-8시간		9시간 이상		평균 수면	
		%(표준오차)	상대표준오차	%(표준오차)	상대표준오차	%(표준오차)	상대표준오차	시간(표준오차)	상대표준오차
전체	909	48.2(2.2)	4.5	49.1(2.1)	4.4	2.6(0.6)	23.1	6.6(0.1)	0.8
성									
남자	453	47.5(2.9)	6.0	51.6(2.9)	5.6	1.0(0.6)	59.7	6.6(0.1)	0.9
여자	456	49.1(2.6)	5.3	46.5(2.6)	5.6	4.5(1.2)	26.9	6.6(0.1)	1.1
연령									
19-29	67	39.8(5.9)	14.8	54.8(6.1)	11.2	5.4(2.6)	48.9	6.9(0.1)	2.0
30-39	103	49.4(5.5)	11.2	46.1(5.7)	12.4	4.5(1.9)	42.3	6.6(0.1)	2.0
40-49	134	44.3(4.7)	10.7	53.4(5.0)	9.3	2.3(1.3)	57.1	6.6(0.1)	1.6
50-59	218	52.7(3.6)	6.8	45.3(3.7)	8.2	2.0(1.1)	53.3	6.5(0.1)	1.2
60-69	223	51.5(3.9)	7.5	47.6(4.0)	8.3	0.9(0.7)	71.8	6.5(0.1)	1.3
70 이상	164	48.2(4.9)	10.1	49.6(4.7)	9.5	2.2(1.1)	50.4	6.4(0.1)	2.0
19-64	643	46.8(2.4)	5.2	50.3(2.4)	4.9	2.9(0.8)	26.1	6.6(0.1)	0.9
65 이상	266	53.3(3.9)	7.4	45.1(4.0)	8.8	1.6(0.7)	44.1	6.4(0.1)	1.4
교육수준 ²⁾									
무학	33	64.1(7.5)	11.7	31.0(7.4)	24.0	5.0(3.5)	70.7	6.1(0.2)	4.1
초등학교	88	50.7(5.3)	10.6	48.4(5.2)	10.8	0.9(0.9)	101.3	6.3(0.1)	2.1
중학교	101	50.3(6.3)	12.6	48.9(6.6)	13.5	0.8(0.8)	99.0	6.4(0.1)	1.9
고등학교	376	44.1(3.3)	7.6	53.2(3.4)	6.4	2.7(0.9)	31.0	6.7(0.1)	1.2
대학교 이상	311	50.6(3.3)	6.5	46.3(3.3)	7.1	3.1(1.0)	33.2	6.5(0.1)	1.2
직업									
전문행정관리	136	59.1(4.9)	8.4	40.9(4.9)	12.1	0.0(0.0)	.	6.3(0.1)	1.7
사무직	81	50.3(5.7)	11.3	48.7(5.6)	11.5	0.9(0.9)	100.4	6.6(0.1)	2.1
판매·서비스직	115	48.5(6.0)	12.3	48.3(6.3)	13.1	3.2(1.9)	58.7	6.5(0.1)	1.8
농림어업	45	52.9(7.3)	13.8	44.2(6.9)	15.6	2.8(2.6)	91.2	6.5(0.2)	3.2
기능단순노무직	226	48.4(4.3)	8.9	50.4(4.2)	8.2	1.2(0.9)	70.9	6.6(0.1)	1.4
기타 ³⁾	306	41.2(2.9)	7.1	53.5(3.0)	5.7	5.3(1.4)	26.5	6.8(0.1)	1.2
월 가구소득									
100만원 미만	49	49.2(9.3)	18.9	45.0(7.7)	17.2	5.8(3.1)	52.2	6.5(0.3)	3.9
100-200만원 미만	116	52.1(5.2)	10.1	44.1(4.7)	10.7	3.8(1.7)	44.9	6.5(0.2)	2.4
200-300만원 미만	107	50.3(5.4)	10.8	49.7(5.4)	10.9	0.0(0.0)	.	6.5(0.1)	2.1
300-400만원 미만	114	57.3(5.1)	9.0	40.9(5.0)	12.3	1.8(1.8)	99.6	6.5(0.1)	2.0
400만원 이상	521	45.1(2.7)	5.9	52.1(2.6)	5.0	2.8(0.9)	31.0	6.6(0.1)	1.0

주 : 1) 하루 평균 수면시간(주중) : 주중(또는 일하는 날) 하루에 보통 자는 시간의 합 / 조사대상 응답자 수
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 41〉 하루 평균 수면시간(주말)¹⁾

(단위: %, 시간)

구분	N	6시간 이하		7-8시간		9시간 이상		평균 수면	
		%(표준오차)	상대표준오차	%(표준오차)	상대표준오차	%(표준오차)	상대표준오차	시간(표준오차)	상대표준오차
전체	909	32.2(1.9)	6.0	52.9(2.0)	3.7	14.9(1.4)	9.2	7.2(0.1)	0.8
성									
남자	453	30.6(2.5)	8.2	55.5(2.8)	5.1	13.9(1.8)	13.1	7.2(0.1)	1.0
여자	456	33.9(2.5)	7.4	50.2(2.4)	4.7	15.9(2.0)	12.6	7.1(0.1)	1.1
연령									
19-29	67	9.4(4.0)	42.3	50.9(5.9)	11.6	39.7(5.7)	14.4	8.3(0.2)	2.1
30-39	103	25.2(4.7)	18.6	57.7(5.9)	10.3	17.0(4.1)	23.8	7.4(0.1)	1.9
40-49	134	21.6(4.0)	18.4	54.7(4.6)	8.5	23.7(4.1)	17.1	7.6(0.1)	2.0
50-59	218	37.2(3.5)	9.4	53.9(3.8)	7.0	8.8(1.9)	21.4	6.9(0.1)	1.3
60-69	223	46.2(3.8)	8.2	49.4(3.8)	7.8	4.3(1.3)	29.0	6.6(0.1)	1.3
70 이상	164	46.2(4.9)	10.6	51.6(4.7)	9.1	2.2(1.1)	50.4	6.6(0.2)	2.6
19-64	643	27.1(2.0)	7.5	54.3(2.2)	4.1	18.6(1.6)	8.8	7.4(0.1)	0.8
65 이상	266	49.8(3.8)	7.6	48.2(3.8)	7.9	2.1(1.0)	48.9	6.5(0.1)	1.7
교육수준 ²⁾									
무학	33	57.7(8.2)	14.3	37.4(8.5)	22.7	5.0(3.5)	70.7	6.2(0.2)	4.0
초등학교	88	49.3(5.2)	10.5	49.8(5.1)	10.2	0.9(0.9)	101.3	6.4(0.1)	2.2
중학교	101	44.2(5.8)	13.1	53.7(6.1)	11.4	2.2(1.6)	72.3	6.6(0.1)	1.9
고등학교	376	29.5(2.9)	9.8	52.2(3.1)	5.9	18.3(2.3)	12.7	7.3(0.1)	1.2
대학교 이상	311	27.3(2.7)	9.8	55.2(3.0)	5.5	17.5(2.5)	14.3	7.4(0.1)	1.2
직업									
전문행정관리	136	32.3(4.1)	12.7	47.4(4.5)	9.4	20.3(3.7)	18.1	7.4(0.1)	2.0
사무직	81	27.9(5.2)	18.5	62.3(5.8)	9.4	9.8(3.6)	36.8	7.3(0.1)	2.0
판매·서비스직	115	28.8(4.3)	14.9	53.6(5.3)	9.8	17.6(4.2)	23.9	7.2(0.1)	2.1
농림어업	45	52.9(7.3)	13.8	44.2(6.9)	15.6	2.8(2.6)	91.2	6.5(0.2)	3.2
기능단순노무직	226	29.8(3.2)	10.7	56.6(3.5)	6.2	13.6(2.5)	18.0	7.2(0.1)	1.3
기타 ³⁾	306	34.2(3.0)	8.8	51.0(3.0)	6.0	14.8(2.3)	15.5	7.1(0.1)	1.6
월 가구소득									
100만원 미만	49	40.2(8.4)	20.9	53.9(7.1)	13.2	5.8(3.1)	52.2	7.0(0.5)	6.5
100-200만원 미만	116	45.5(4.9)	10.7	47.3(4.5)	9.6	7.2(3.4)	47.8	6.7(0.2)	2.7
200-300만원 미만	107	38.4(4.6)	11.9	56.0(4.8)	8.7	5.6(2.6)	45.5	6.9(0.2)	2.3
300-400만원 미만	114	38.8(5.0)	12.9	51.7(5.8)	11.1	9.5(3.4)	36.0	7.0(0.1)	2.0
400만원 이상	521	27.0(2.3)	8.6	53.6(2.3)	4.3	19.5(1.8)	9.4	7.4(0.1)	1.0

주 : 1) 하루 평균 수면시간(주말) : 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날) 하루에 보통 자는 시간의 합 / 조사대상 응답자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 42〉 스트레스 인지율¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	17.5(1.5)	8.4	453	15.1(1.7)	11.0	456	20.2(2.3)	11.3
연령									
19-29	67	12.8(4.5)	35.2	33	9.2(5.2)	56.1	34	17.6(6.8)	39.0
30-39	103	18.6(3.3)	17.8	51	11.7(4.2)	35.9	52	27.0(6.0)	22.3
40-49	134	24.4(3.9)	16.1	68	20.4(4.3)	21.2	66	28.7(6.3)	22.0
50-59	218	16.9(2.6)	15.4	108	14.9(3.2)	21.2	110	19.1(4.2)	21.9
60-69	223	16.3(2.4)	14.4	115	15.0(2.7)	18.2	108	17.7(4.3)	24.2
70 이상	164	15.0(3.0)	19.8	78	18.5(5.2)	28.4	86	11.8(3.2)	27.1
19-64	643	17.7(1.9)	10.4	322	14.6(1.9)	13.2	321	21.3(2.8)	13.0
65 이상	266	16.8(2.5)	15.1	131	16.9(3.8)	22.4	135	16.8(3.5)	20.8
교육수준 ²⁾									
무학	33	22.7(6.0)	26.5	5	-(-)	-	28	19.7(5.6)	28.2
초등학교	88	12.1(3.6)	29.5	35	15.8(7.1)	45.1	53	9.3(3.9)	42.2
중학교	101	19.8(4.2)	21.2	38	25.8(7.3)	28.5	63	16.3(5.1)	31.1
고등학교	376	16.2(2.2)	13.3	199	13.6(2.7)	20.1	177	19.2(3.2)	16.7
대학교 이상	311	19.1(2.8)	14.8	176	14.4(2.5)	17.3	135	25.5(5.0)	19.7
직업									
전문행정관리	136	19.5(4.0)	20.6	76	12.9(4.0)	30.9	60	28.4(6.6)	23.1
사무직	81	16.3(4.2)	25.7	50	17.6(5.3)	30.0	31	14.5(6.8)	46.7
판매·서비스직	115	21.4(4.0)	18.6	34	20.4(6.4)	31.4	81	22.0(5.5)	25.0
농림어업	45	11.2(5.2)	46.1	25	1.5(1.6)	101.1	20	22.0(10.5)	47.6
기능단순노무직	226	13.9(2.4)	17.0	161	15.1(2.6)	17.0	65	10.8(4.6)	43.0
기타 ³⁾	306	18.6(2.9)	15.5	107	15.8(4.5)	28.7	199	20.3(3.3)	16.1
월 가구소득									
100만원 미만	49	19.0(6.0)	31.6	18	-(-)	-	31	16.8(6.1)	36.5
100-200만원 미만	116	19.7(4.0)	20.4	56	22.3(6.8)	30.7	60	17.1(5.6)	32.6
200-300만원 미만	107	7.7(2.6)	33.7	53	8.1(3.5)	42.9	54	7.4(3.6)	49.3
300-400만원 미만	114	17.6(2.8)	16.0	57	10.1(4.0)	39.3	57	25.6(5.7)	22.2
400만원 이상	521	18.8(2.1)	11.3	267	15.7(2.2)	14.1	254	22.2(3.3)	14.6

주 : 1) 스트레스 인지율 : (평균 일상생활 중 스트레스를 "대단히 많이 느낀다" 또는 "많이 느끼는 편이다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 43〉 우울감 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	7.5(0.9)	12.5	453	5.5(1.0)	18.6	456	9.7(1.5)	15.9
연령									
19-29	67	4.4(2.4)	55.0	33	3.2(3.1)	95.9	34	5.9(4.0)	67.2
30-39	103	6.5(2.1)	32.5	51	4.3(2.8)	64.3	52	9.1(3.8)	41.6
40-49	134	5.9(2.1)	36.1	68	5.3(2.7)	50.0	66	6.4(3.7)	57.6
50-59	218	7.6(1.8)	23.3	108	5.0(1.9)	37.3	110	10.3(2.9)	28.3
60-69	223	6.0(1.6)	26.1	115	4.7(2.0)	43.6	108	7.4(2.5)	34.7
70 이상	164	16.0(3.7)	22.9	78	11.8(4.0)	34.0	86	19.8(5.4)	27.2
19-64	643	6.2(1.0)	16.6	322	4.9(1.1)	23.1	321	7.7(1.8)	23.8
65 이상	266	12.0(2.5)	21.1	131	7.6(2.5)	32.8	135	16.1(3.7)	23.1
교육수준 ²⁾									
무학	33	27.0(8.7)	32.1	5	—(—)	—	28	28.5(9.1)	32.0
초등학교	88	8.8(2.9)	32.8	35	9.0(3.2)	35.5	53	8.5(4.4)	51.4
중학교	101	7.9(2.4)	30.7	38	4.8(0.9)	19.0	63	9.9(3.7)	37.7
고등학교	376	8.7(1.7)	19.4	199	6.5(1.9)	29.2	177	11.1(2.8)	25.0
대학교 이상	311	4.6(1.2)	26.5	176	3.8(1.4)	37.2	135	5.7(2.0)	35.6
직업									
전문행정관리	136	5.3(1.9)	35.2	76	3.5(2.1)	59.6	60	7.7(3.5)	45.8
사무직	81	2.8(2.0)	73.0	50	1.7(1.7)	100.7	31	4.4(4.3)	99.1
판매·서비스직	115	7.9(2.7)	33.7	34	2.0(2.0)	99.7	81	10.9(3.9)	35.8
농림어업	45	5.7(3.5)	60.6	25	7.7(5.5)	71.6	20	3.5(3.5)	100.5
기능단순노무직	226	5.1(1.3)	25.0	161	4.8(1.5)	30.9	65	6.0(2.8)	46.5
기타 ³⁾	306	12.0(2.1)	17.4	107	10.7(3.2)	29.6	199	12.8(2.4)	18.8
월 가구소득									
100만원 미만	49	16.9(5.0)	29.4	18	—(—)	—	31	20.3(7.5)	36.9
100-200만원 미만	116	14.3(3.6)	25.2	56	15.5(5.7)	36.6	60	13.0(4.5)	34.4
200-300만원 미만	107	9.2(2.8)	30.2	53	7.0(3.4)	48.7	54	11.3(4.2)	37.5
300-400만원 미만	114	6.9(2.2)	31.8	57	4.5(2.2)	47.7	57	9.4(4.2)	44.2
400만원 이상	521	5.6(1.1)	18.8	267	3.6(1.0)	27.6	254	8.0(2.0)	25.5

주 : 1) 우울감 경험률 : (최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 44〉 스트레스 및 우울증상으로 인한 정신상담률 (단위: %)

구분	스트레스로 인한 정신상담률 ¹⁾			우울증상으로 인한 정신상담률 ²⁾		
	N	%(표준오차)	상대표준오차	N	%(표준오차)	상대표준오차
전체	156	10.3(2.6)	24.9	74	23.2(4.9)	21.2
성						
남자	70	9.1(3.4)	37.5	28	23.1(9.2)	39.7
여자	86	11.2(3.9)	34.7	46	23.3(6.9)	29.7
연령						
19-29	9	-(-)	-	3	-(-)	-
30-39	20	11.1(7.5)	68.0	7	-(-)	-
40-49	33	5.3(3.7)	69.2	7	-(-)	-
50-59	36	12.2(5.3)	43.9	18	-(-)	-
60-69	36	12.5(5.6)	44.5	14	-(-)	-
70 이상	22	13.2(9.3)	70.1	25	22.4(9.5)	42.4
19-64	114	9.4(2.8)	29.3	42	26.3(7.1)	27.0
65 이상	42	13.3(6.0)	45.5	32	17.6(7.3)	41.2
교육수준 ³⁾						
무학	8	-(-)	-	8	-(-)	-
초등학교	11	-(-)	-	9	-(-)	-
중학교	18	-(-)	-	8	-(-)	-
고등학교	60	4.7(3.8)	80.9	35	21.0(5.5)	26.1
대학교 이상	59	11.5(4.1)	35.5	14	-(-)	-
직업						
전문행정관리	28	11.1(5.6)	50.6	7	-(-)	-
사무직	14	-(-)	-	2	-(-)	-
판매·서비스직	23	2.6(2.6)	102.4	10	-(-)	-
농림어업	6	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	33	7.7(3.8)	48.7	14	-(-)	-
기타 ⁴⁾	52	15.1(5.5)	36.2	38	22.7(6.9)	30.4
월 가구소득						
100만원 미만	10	-(-)	-	8	-(-)	-
100-200만원 미만	21	17.0(9.6)	56.9	17	-(-)	-
200-300만원 미만	10	-(-)	-	10	-(-)	-
300-400만원 미만	19	-(-)	-	8	-(-)	-
400만원 이상	96	10.1(2.8)	27.4	31	21.2(8.1)	38.2

주 : 1) 스트레스로 인한 정신상담률 : (스트레스로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수 / 평소 일상생활 중 스트레스를 "대단히 많이 느낀다" 또는 "많이 느끼는 편이다"에 응답한 사람의 수) × 100
 2) 우울증상으로 인한 정신상담률 : (우울증상으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수 / 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수) × 100
 3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
 4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 45〉 우울증상유병률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	2.4(0.6)	24.5	453	2.0(0.6)	30.9	456	2.8(0.9)	31.4
연령									
19-29	67	1.3(1.3)	101.3	33	0.0(0.0)	.	34	3.0(3.1)	100.7
30-39	103	3.9(1.9)	48.1	51	4.3(2.8)	64.3	52	3.3(2.3)	69.8
40-49	134	0.6(0.6)	100.5	68	1.1(1.1)	100.2	66	0.0(0.0)	.
50-59	218	0.8(0.6)	72.7	108	1.6(1.1)	73.1	110	0.0(0.0)	.
60-69	223	2.2(1.1)	49.7	115	0.8(0.8)	100.1	108	3.6(2.0)	55.9
70 이상	164	7.5(2.4)	31.5	78	5.6(2.4)	43.8	86	9.2(3.9)	42.9
19-64	643	1.4(0.5)	34.3	322	1.4(0.7)	45.6	321	1.4(0.8)	53.1
65 이상	266	5.7(1.6)	28.3	131	4.0(1.6)	40.9	135	7.3(2.6)	35.9
교육수준 ²⁾									
무학	33	8.4(6.2)	74.3	5	-()	-	28	10.0(7.4)	73.6
초등학교	88	7.1(2.4)	33.1	35	4.5(0.8)	18.5	53	9.1(3.8)	42.3
중학교	101	0.9(0.9)	99.8	38	0.0(0.0)	.	63	1.4(1.4)	100.7
고등학교	376	2.9(0.9)	31.5	199	2.9(1.2)	41.6	177	2.9(1.3)	45.0
대학교 이상	311	0.9(0.5)	59.0	176	1.1(0.8)	73.0	135	0.6(0.6)	99.7
직업									
전문행정관리	136	0.6(0.6)	99.7	76	1.1(1.1)	100.1	60	0.0(0.0)	.
사무직	81	2.9(2.1)	73.3	50	1.9(1.9)	101.7	31	4.4(4.3)	99.1
판매·서비스직	115	1.3(1.0)	72.4	34	0.0(0.0)	.	81	2.0(1.4)	73.1
농림어업	45	2.1(2.1)	101.0	25	3.9(3.9)	99.6	20	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	226	0.3(0.3)	100.2	161	0.5(0.5)	100.2	65	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	306	5.2(1.4)	27.2	107	5.2(2.0)	37.9	199	5.1(1.8)	35.7
월 가구소득									
100만원 미만	49	6.1(3.2)	53.7	18	-()	-	31	6.3(4.3)	67.3
100-200만원 미만	116	7.1(2.3)	32.4	56	8.1(3.5)	42.6	60	6.1(3.2)	52.0
200-300만원 미만	107	0.8(0.8)	99.9	53	1.6(1.5)	97.9	54	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	114	4.6(2.0)	43.8	57	0.0(0.0)	.	57	9.5(4.2)	44.6
400만원 이상	521	1.2(0.5)	45.4	267	1.2(0.7)	57.6	254	1.2(0.7)	60.3

주 : 1) 우울증상유병률 : (우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 46〉 자살생각률¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	7.5(0.9)	11.7	453	5.6(0.9)	16.2	456	9.4(1.6)	17.0
연령									
19-29	67	7.1(2.9)	41.5	33	3.2(3.1)	95.9	34	12.1(5.4)	44.8
30-39	103	4.4(1.8)	41.3	51	2.2(2.0)	94.0	52	7.2(3.5)	48.5
40-49	134	5.8(2.4)	41.7	68	5.3(2.5)	47.8	66	6.3(3.0)	47.8
50-59	218	7.0(1.7)	23.8	108	4.7(1.8)	38.3	110	9.4(3.1)	33.2
60-69	223	7.0(1.8)	25.7	115	7.6(2.4)	32.0	108	6.4(2.4)	37.6
70 이상	164	14.3(3.5)	24.5	78	11.4(3.0)	26.6	86	17.0(5.7)	33.7
19-64	643	6.3(0.9)	13.8	322	4.7(1.1)	22.5	321	8.1(1.5)	18.9
65 이상	266	11.4(2.3)	20.5	131	9.0(2.2)	24.1	135	13.6(3.9)	28.5
교육수준 ²⁾									
무학	33	24.4(6.6)	27.2	5	—(—)	—	28	25.9(7.5)	29.0
초등학교	88	11.2(3.8)	33.7	35	9.0(3.2)	35.5	53	12.8(6.2)	48.0
중학교	101	10.1(2.7)	26.2	38	12.2(3.9)	32.2	63	8.9(3.4)	38.5
고등학교	376	7.3(1.4)	19.4	199	5.9(1.7)	29.2	177	8.8(2.4)	27.1
대학교 이상	311	5.2(1.2)	24.1	176	3.7(1.3)	35.9	135	7.1(2.3)	32.2
직업									
전문행정관리	136	4.7(2.1)	43.5	76	2.9(2.0)	68.5	60	7.2(3.3)	45.6
사무직	81	1.8(1.8)	99.2	50	0.0(0.0)	.	31	4.4(4.3)	99.1
판매·서비스직	115	8.2(2.7)	33.4	34	6.4(3.8)	58.4	81	9.0(3.6)	39.7
농림어업	45	4.7(2.8)	58.6	25	3.9(3.9)	99.6	20	5.6(4.1)	72.4
기능단순노무직	226	5.3(1.3)	25.3	161	6.0(1.6)	25.8	65	3.5(2.6)	75.0
기타 ³⁾	306	12.2(2.1)	16.8	107	9.9(2.7)	26.8	199	13.7(3.1)	22.6
월 가구소득									
100만원 미만	49	18.3(6.1)	33.4	18	—(—)	—	31	25.8(8.8)	34.3
100-200만원 미만	116	17.1(3.8)	22.4	56	22.5(6.0)	26.8	60	11.5(4.4)	38.4
200-300만원 미만	107	6.6(2.3)	34.6	53	6.7(3.2)	47.7	54	6.4(3.8)	59.9
300-400만원 미만	114	7.6(2.6)	34.8	57	4.0(1.6)	39.8	57	11.4(5.1)	44.8
400만원 이상	521	5.2(1.0)	18.8	267	3.0(0.9)	29.7	254	7.8(1.7)	22.3

주 : 1) 자살생각률 : (최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요
약

제 1
부
조
사
체
계

제 2
부
주
요
통
계
결
과

제 3
부
통
계
표

제 4
부
부
록

I. 통계표

〈표 47〉 자살생각으로 인한 정신상담률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	72	22.1(4.8)	21.8	29	23.3(9.2)	39.4	43	21.3(6.1)	28.8
연령									
19-29	5	-(-)	-	1	-(-)	-	4	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	1	-(-)	-	4	-(-)	-
40-49	8	-(-)	-	4	-(-)	-	4	-(-)	-
50-59	15	-(-)	-	6	-(-)	-	9	-(-)	-
60-69	15	-(-)	-	8	-(-)	-	7	-(-)	-
70 이상	24	15.1(7.7)	50.8	9	-(-)	-	15	-(-)	-
19-64	40	25.7(7.2)	28.0	17	-(-)	-	23	26.8(9.6)	36.0
65 이상	32	15.3(6.6)	43.5	12	-(-)	-	20	11.2(7.6)	67.5
교육수준 ²⁾									
무학	8	-(-)	-	1	-(-)	-	7	-(-)	-
초등학교	11	-(-)	-	4	-(-)	-	7	-(-)	-
중학교	11	-(-)	-	5	-(-)	-	6	-(-)	-
고등학교	26	29.4(11.0)	37.4	12	-(-)	-	14	-(-)	-
대학교 이상	16	-(-)	-	7	-(-)	-	9	-(-)	-
직업									
전문행정관리	6	-(-)	-	2	-(-)	-	4	-(-)	-
사무직	1	-(-)	-	0	-(-)	-	1	-(-)	-
판매·서비스직	10	-(-)	-	3	-(-)	-	7	-(-)	-
농림어업	3	-(-)	-	1	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	13	-(-)	-	11	-(-)	-	2	-(-)	-
기타 ³⁾	39	28.4(7.7)	27.0	12	-(-)	-	27	24.3(9.7)	39.7
월 가구소득									
100만원 미만	10	-(-)	-	1	-(-)	-	9	-(-)	-
100-200만원 미만	19	-(-)	-	12	-(-)	-	7	-(-)	-
200-300만원 미만	7	-(-)	-	4	-(-)	-	3	-(-)	-
300-400만원 미만	8	-(-)	-	3	-(-)	-	5	-(-)	-
400만원 이상	28	21.6(7.4)	34.4	9	-(-)	-	19	-(-)	-

주 : 1) 자살생각으로 인한 정신상담률 : (자살생각으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수 / 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 48〉 인지장애 경험률(50세 이상)¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	605	19.4(2.0)	10.1	301	18.2(2.1)	11.6	304	20.5(2.6)	12.6
연령									
50-59	218	19.4(2.9)	14.9	108	17.5(3.8)	21.7	110	21.6(4.1)	19.1
60-69	223	14.1(3.1)	21.8	115	15.0(4.0)	26.8	108	13.2(3.6)	27.2
70 이상	164	27.0(3.8)	14.0	78	24.6(4.6)	18.8	86	29.3(4.9)	16.7
교육수준 ²⁾									
무학	33	28.8(9.4)	32.7	5	—(—)	—	28	34.3(10.6)	31.0
초등학교	86	15.0(3.3)	22.2	35	14.1(6.1)	43.1	51	15.6(4.8)	30.9
중학교	97	19.9(4.4)	22.4	37	16.3(5.9)	36.4	60	22.0(5.6)	25.4
고등학교	268	17.2(2.5)	14.7	142	19.0(2.9)	15.4	126	15.3(3.5)	22.8
대학교 이상	121	23.7(4.5)	19.2	82	20.2(4.0)	20.1	39	30.4(8.4)	27.6
직업									
전문행정관리	62	18.7(6.0)	32.1	42	18.6(6.2)	33.4	20	19.1(10.1)	52.6
사무직	32	6.1(4.3)	70.3	25	8.2(5.8)	70.2	7	—(—)	—
판매·서비스직	69	22.0(4.9)	22.3	17	—(—)	—	52	22.4(5.9)	26.3
농림어업	42	16.5(7.3)	44.3	23	28.7(10.2)	35.5	19	—(—)	—
기능단순노무직	160	15.8(2.9)	18.7	111	16.0(3.8)	23.5	49	15.1(5.0)	33.1
기타 ³⁾	240	23.7(3.2)	13.6	83	21.4(4.7)	21.9	157	24.8(3.7)	14.8
월 가구소득									
100만원 미만	45	32.6(6.8)	20.9	16	—(—)	—	29	34.6(9.1)	26.3
100-200만원 미만	101	27.5(5.6)	20.4	48	29.9(6.4)	21.5	53	25.1(6.4)	25.6
200-300만원 미만	88	14.8(4.3)	28.8	44	16.5(5.8)	35.1	44	13.1(4.8)	36.8
300-400만원 미만	84	20.7(4.3)	20.9	42	18.1(6.3)	34.5	42	23.1(6.9)	29.7
400만원 이상	286	16.2(2.9)	17.8	150	14.5(2.8)	19.5	136	17.9(4.2)	23.6

주 : 1) 인지장애 경험률(50세 이상) : (최근 1년 동안 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있는 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 49〉 인지장애 경험률(65세 이상)¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	266	22.7(3.1)	13.7	131	21.6(3.7)	16.9	135	23.8(3.9)	16.3
교육수준 ²⁾									
무학	31	27.4(10.0)	36.4	5	—(—)	—	26	33.0(11.5)	34.8
초등학교	73	18.1(3.9)	21.3	29	18.0(7.6)	42.1	44	18.1(5.4)	29.8
중학교	61	26.8(5.9)	22.0	25	21.4(7.4)	34.6	36	30.4(8.0)	26.5
고등학교	80	19.0(5.2)	27.4	52	23.3(6.9)	29.6	28	12.4(5.9)	47.8
대학교 이상	21	32.2(9.6)	29.7	20	28.2(9.1)	32.4	1	—(—)	—
직업									
전문행정관리	7	—(—)	—	7	—(—)	—	0	—(—)	—
사무직	3	—(—)	—	3	—(—)	—	0	—(—)	—
판매·서비스직	15	—(—)	—	5	—(—)	—	10	—(—)	—
농림어업	29	17.5(9.8)	56.3	17	—(—)	—	12	—(—)	—
기능단순노무직	57	17.7(5.5)	31.0	35	17.8(6.9)	38.8	22	17.4(7.8)	44.6
기타 ³⁾	155	25.4(4.1)	16.3	64	24.2(5.2)	21.4	91	26.3(4.8)	18.1
월 가구소득									
100만원 미만	37	31.6(8.1)	25.5	12	—(—)	—	25	36.6(10.3)	28.2
100~200만원 미만	80	30.0(5.9)	19.5	38	30.2(6.9)	22.9	42	29.8(6.9)	23.3
200~300만원 미만	52	9.5(4.4)	46.5	28	10.5(6.0)	57.6	24	8.4(5.9)	70.4
300~400만원 미만	35	20.6(6.3)	30.8	17	—(—)	—	18	—(—)	—
400만원 이상	62	20.3(6.2)	30.8	36	16.5(5.9)	35.8	26	25.1(9.4)	37.4

주 : 1) 인지장애 경험률(65세 이상) : (최근 1년 동안 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있는 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 50〉 인지장애로 인한 지장(50세 이상) (단위: %)

구분	인지장애로 인한 일상생활 지장률 ¹⁾			인지장애로 인한 사회활동 지장률 ²⁾		
	N	%(표준오차)	상대표준오차	N	%(표준오차)	상대표준오차
전체	115	6.4(2.0)	31.2	115	6.4(2.0)	31.2
성						
남자	53	6.9(3.1)	44.6	53	6.9(3.1)	44.6
여자	62	5.9(3.0)	50.6	62	5.9(3.0)	50.6
연령						
50-59	41	0.0(0.0)	.	41	0.0(0.0)	.
60-69	32	0.0(0.0)	.	32	0.0(0.0)	.
70 이상	42	19.2(5.2)	27.1	42	19.2(5.2)	27.1
교육수준 ³⁾						
무학	10	-(-)	-	10	-(-)	-
초등학교	13	-(-)	-	13	-(-)	-
중학교	19	-(-)	-	19	-(-)	-
고등학교	47	5.0(3.5)	71.0	47	5.0(3.5)	71.0
대학교 이상	26	0.0(0.0)	.	26	0.0(0.0)	.
직업						
전문행정관리	11	-(-)	-	11	-(-)	-
사무직	2	-(-)	-	2	-(-)	-
판매·서비스직	14	-(-)	-	14	-(-)	-
농림어업	6	-(-)	-	6	-(-)	-
기능단순노무직	25	0.0(0.0)	.	25	0.0(0.0)	.
기타 ⁴⁾	57	13.4(3.9)	28.9	57	13.4(3.9)	28.9
월 가구소득						
100만원 미만	15	-(-)	-	15	-(-)	-
100-200만원 미만	28	14.2(5.7)	40.2	28	14.2(5.7)	40.2
200-300만원 미만	14	-(-)	-	14	-(-)	-
300-400만원 미만	16	-(-)	-	16	-(-)	-
400만원 이상	42	5.8(3.9)	68.6	42	5.8(3.9)	68.6

주 : 1) 인지장애로 인한 일상생활 지장률(50세 이상) : (“항상” 또는 “대체로”에 응답한 사람의 수 / 인지장애 경험이었다고 응답한 50세 이상 사람의 수) × 100
2) 인지장애로 인한 사회활동 지장률(50세 이상) : (“항상” 또는 “대체로”에 응답한 사람의 수 / 인지장애 경험이었다고 응답한 50세 이상 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 51〉 인지장애 상담률(50세 이상)¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	115	10.7(3.0)	28.1	53	10.5(4.7)	44.4	62	10.9(4.6)	42.4
연령									
50-59	41	9.3(5.9)	63.2	19	-()	-	22	10.2(9.6)	93.6
60-69	32	0.0(0.0)	.	17	-()	-	15	-()	-
70 이상	42	20.7(5.4)	26.1	17	-()	-	25	18.6(7.4)	39.9
교육수준 ²⁾									
무학	10	-()	-	0	-()	-	10	-()	-
초등학교	13	-()	-	5	-()	-	8	-()	-
중학교	19	-()	-	6	-()	-	13	-()	-
고등학교	47	7.0(3.7)	53.1	26	12.3(6.6)	53.6	21	0.0(0.0)	.
대학교 이상	26	11.1(7.8)	69.9	16	-()	-	10	-()	-
직업									
전문행정관리	11	-()	-	8	-()	-	3	-()	-
사무직	2	-()	-	2	-()	-	0	-()	-
판매·서비스직	14	-()	-	4	-()	-	10	-()	-
농림어업	6	-()	-	5	-()	-	1	-()	-
기능단순노무직	25	6.1(3.2)	53.0	17	-()	-	8	-()	-
기타 ³⁾	57	11.6(3.8)	32.9	17	-()	-	40	6.6(3.4)	50.9
월 가구소득									
100만원 미만	15	-()	-	4	-()	-	11	-()	-
100-200만원 미만	28	14.4(5.8)	40.5	14	-()	-	14	-()	-
200-300만원 미만	14	-()	-	8	-()	-	6	-()	-
300-400만원 미만	16	-()	-	6	-()	-	10	-()	-
400만원 이상	42	11.1(5.6)	50.6	21	8.3(5.4)	65.2	21	13.6(9.9)	72.9

주 : 1) 인지장애 상담률(50세 이상) : (정신 혼란이나 기억력 감소 때문에 본인이나 다른 사람이 전문가의 상담을 받은 적이 있는 사람의 수 / 인지장애 경험 있다고 응답한 50세 이상 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 52〉 연간 치매 선별 검사 수진율(50세 이상)¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	604	15.4(1.6)	10.1	301	12.9(2.2)	17.2	303	18.0(1.9)	10.7
연령									
50-59	218	2.5(1.1)	45.1	108	2.4(1.7)	70.4	110	2.7(1.6)	58.4
60-69	223	10.5(2.1)	20.5	115	6.7(2.5)	37.5	108	14.2(3.2)	22.7
70 이상	163	45.4(4.3)	9.4	78	42.6(6.4)	15.1	85	47.8(5.1)	10.6
교육수준 ²⁾									
무학	32	31.0(7.3)	23.7	5	-(-)	-	27	37.1(8.1)	21.9
초등학교	86	34.8(5.1)	14.5	35	21.4(5.5)	25.9	51	45.2(7.8)	17.3
중학교	97	29.9(5.1)	17.2	37	28.2(7.8)	27.6	60	31.0(6.0)	19.2
고등학교	268	6.9(1.5)	22.0	142	8.5(2.5)	28.8	126	5.1(1.9)	37.1
대학교 이상	121	8.1(2.7)	33.3	82	11.1(3.8)	34.3	39	2.4(2.4)	98.7
직업									
전문행정관리	62	3.2(2.2)	67.8	42	4.7(3.2)	68.0	20	0.0(0.0)	.
사무직	32	6.3(4.3)	68.3	25	8.5(5.7)	66.6	7	-(-)	-
판매·서비스직	69	8.4(3.3)	39.8	17	-(-)	-	52	8.3(3.6)	43.8
농림어업	42	25.4(7.6)	30.1	23	28.9(8.4)	29.2	19	-(-)	-
기능단순노무직	160	12.5(2.9)	23.4	111	6.1(2.3)	38.3	49	28.7(6.3)	22.1
기타 ³⁾	239	22.8(2.6)	11.2	83	26.2(4.8)	18.3	156	21.0(3.2)	15.4
월 가구소득									
100만원 미만	45	42.0(8.3)	19.8	16	-(-)	-	29	52.7(9.4)	17.9
100-200만원 미만	101	30.8(5.3)	17.2	48	28.0(7.4)	26.2	53	33.5(5.9)	17.6
200-300만원 미만	88	17.2(3.2)	18.7	44	22.4(5.6)	24.9	44	11.8(3.6)	30.1
300-400만원 미만	84	14.9(4.3)	29.1	42	13.2(6.2)	47.2	42	16.6(5.5)	33.1
400만원 이상	285	6.3(1.4)	22.4	150	4.1(1.7)	41.1	135	8.8(2.2)	25.1

주 : 1) 연간 치매 선별 검사 수진율(50세 이상) : (최근 1년 동안 치매 선별검사를 받은 적이 있는 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 53〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	26.2(1.8)	6.9	453	28.5(2.3)	8.2	456	23.8(2.3)	9.7
연령									
19-29	67	16.4(4.6)	27.8	33	15.6(6.7)	43.1	34	17.5(5.8)	33.0
30-39	103	17.4(4.2)	24.2	51	20.0(5.9)	29.4	52	14.3(4.9)	34.2
40-49	134	26.9(3.9)	14.7	68	37.9(5.7)	15.0	66	15.0(4.6)	31.0
50-59	218	29.8(3.4)	11.4	108	30.4(4.7)	15.5	110	29.3(4.6)	15.9
60-69	223	23.6(2.8)	12.1	115	26.9(4.2)	15.7	108	20.4(4.1)	20.1
70 이상	164	41.0(4.9)	12.0	78	38.7(7.1)	18.2	86	43.1(5.9)	13.7
19-64	643	24.3(2.1)	8.5	322	27.8(2.8)	10.0	321	20.3(2.6)	12.6
65 이상	266	32.9(3.3)	9.9	131	31.1(4.4)	14.2	135	34.5(4.2)	12.1
교육수준 ²⁾									
무학	33	53.8(8.3)	15.4	5	—(—)	—	28	53.2(8.8)	16.6
초등학교	88	32.6(4.3)	13.1	35	32.5(7.2)	22.1	53	32.6(5.8)	17.7
중학교	101	26.8(5.4)	20.1	38	25.8(7.4)	28.6	63	27.4(7.0)	25.5
고등학교	376	27.7(2.4)	8.8	199	31.7(3.5)	11.1	177	23.2(3.0)	12.8
대학교 이상	311	21.4(2.7)	12.7	176	24.7(3.4)	13.9	135	16.9(3.6)	21.5
직업									
전문행정관리	136	14.7(3.3)	22.3	76	20.3(4.6)	22.9	60	7.2(3.7)	51.5
사무직	81	23.4(5.7)	24.4	50	22.5(5.6)	25.0	31	24.6(9.4)	38.0
판매·서비스직	115	24.3(4.1)	17.0	34	31.0(7.2)	23.2	81	21.0(4.8)	22.8
농림어업	45	36.4(7.5)	20.6	25	31.2(10.2)	32.6	20	42.2(9.9)	23.4
기능단순노무직	226	31.6(3.3)	10.6	161	35.8(3.9)	10.8	65	20.0(5.8)	28.8
기타 ³⁾	306	28.8(3.1)	10.8	107	26.3(4.7)	18.0	199	30.4(3.4)	11.3
월 가구소득									
100만원 미만	49	42.4(7.1)	16.9	18	—(—)	—	31	46.5(10.2)	21.8
100-200만원 미만	116	31.1(4.9)	15.7	56	35.1(6.9)	19.7	60	26.9(6.6)	24.4
200-300만원 미만	107	29.8(4.7)	15.7	53	28.7(6.1)	21.1	54	30.8(7.8)	25.3
300-400만원 미만	114	26.5(4.6)	17.4	57	23.1(5.2)	22.7	57	30.1(6.6)	22.0
400만원 이상	521	23.9(2.2)	9.4	267	28.4(3.2)	11.1	254	18.8(2.6)	13.8

주 : 1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 : (“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 54〉 저작불편호소율(65세 이상)¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	266	26.5(3.1)	11.7	131	26.4(4.0)	15.4	135	26.5(4.0)	14.9
교육수준 ²⁾									
무학	31	41.9(8.9)	21.3	5	—(—)	—	26	38.9(8.9)	22.9
초등학교	73	33.5(5.6)	16.7	29	37.4(7.6)	20.3	44	30.8(6.6)	21.3
중학교	61	26.7(5.6)	20.9	25	23.5(8.3)	35.4	36	28.8(8.0)	27.9
고등학교	80	18.9(4.6)	24.5	52	25.4(6.7)	26.2	28	8.9(5.2)	57.6
대학교 이상	21	8.3(6.2)	74.9	20	8.8(6.6)	75.2	1	—(—)	—
직업									
전문행정관리	7	—(—)	—	7	—(—)	—	0	—(—)	—
사무직	3	—(—)	—	3	—(—)	—	0	—(—)	—
판매·서비스직	15	—(—)	—	5	—(—)	—	10	—(—)	—
농림어업	29	9.0(4.9)	54.0	17	—(—)	—	12	—(—)	—
기능단순노무직	57	19.3(5.2)	26.8	35	22.8(7.3)	32.0	22	13.4(6.4)	48.0
기타 ³⁾	155	32.2(4.3)	13.3	64	31.9(6.4)	20.2	91	32.4(5.2)	16.0
월 가구소득									
100만원 미만	37	28.7(9.1)	31.6	12	—(—)	—	25	33.5(10.4)	31.0
100~200만원 미만	80	39.6(5.0)	12.6	38	43.4(6.2)	14.3	42	36.0(6.4)	17.9
200~300만원 미만	52	20.6(5.7)	27.7	28	27.8(7.9)	28.4	24	12.6(7.2)	57.6
300~400만원 미만	35	10.7(5.2)	48.6	17	—(—)	—	18	—(—)	—
400만원 이상	62	22.0(6.7)	30.6	36	14.3(6.9)	48.1	26	31.8(9.5)	29.8

주 : 1) 저작불편호소율(65세 이상) : (“매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요
약

제 1
부
조
사
체
계

제 2
부
주
요
통
계
결
과

제 3
부
통
계
표

제 4
부
부
록

I. 통계표

〈표 55〉 어제 점심식사 후 치솔질 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	883	64.8(1.9)	3.0	440	56.9(2.6)	4.6	443	73.2(2.6)	3.6
연령									
19-29	61	71.5(5.3)	7.4	29	62.6(8.5)	13.5	32	82.5(6.0)	7.3
30-39	99	74.0(4.4)	5.9	48	68.5(6.9)	10.0	51	80.3(5.9)	7.3
40-49	131	63.3(4.5)	7.0	67	47.4(6.2)	13.1	64	80.8(4.7)	5.8
50-59	214	67.6(3.4)	5.0	108	62.2(4.6)	7.3	106	73.7(4.9)	6.6
60-69	220	60.5(3.8)	6.2	114	51.8(5.1)	9.9	106	69.2(5.5)	8.0
70 이상	158	53.2(4.7)	8.8	74	49.6(6.9)	14.0	84	56.3(5.5)	9.7
19-64	624	67.5(2.0)	3.0	313	58.3(3.0)	5.1	311	77.9(2.7)	3.4
65 이상	259	55.4(3.6)	6.5	127	51.4(4.6)	8.9	132	59.0(4.9)	8.4
교육수준 ²⁾									
무학	31	53.0(8.1)	15.3	4	—(—)	—	27	58.1(8.0)	13.8
초등학교	85	49.1(6.0)	12.1	34	39.0(9.8)	25.1	51	56.7(7.7)	13.6
중학교	99	59.2(5.8)	9.8	37	44.8(10.2)	22.7	62	67.9(6.4)	9.5
고등학교	367	63.7(2.6)	4.0	196	56.8(3.6)	6.3	171	71.6(4.2)	5.9
대학교 이상	301	71.0(2.7)	3.8	169	61.9(4.1)	6.6	132	83.2(3.4)	4.1
직업									
전문행정관리	133	75.3(3.8)	5.0	73	65.0(6.1)	9.4	60	88.4(3.9)	4.4
사무직	80	68.1(6.2)	9.2	50	61.5(8.0)	13.0	30	78.1(8.9)	11.4
판매·서비스직	109	70.5(4.0)	5.7	33	59.0(10.5)	17.9	76	76.4(5.3)	6.9
농림어업	43	54.5(7.2)	13.2	24	66.1(9.2)	13.9	19	—(—)	—
기능단순노무직	223	54.3(3.6)	6.5	159	50.9(4.4)	8.7	64	63.9(6.6)	10.3
기타 ³⁾	295	64.9(3.2)	5.0	101	54.6(5.8)	10.6	194	71.1(3.5)	4.9
월 가구소득									
100만원 미만	47	40.4(7.9)	19.4	17	—(—)	—	30	50.5(10.3)	20.3
100-200만원 미만	114	58.8(4.9)	8.3	54	55.1(7.0)	12.6	60	62.5(7.2)	11.6
200-300만원 미만	104	57.1(5.3)	9.3	52	44.6(6.4)	14.4	52	69.7(7.8)	11.3
300-400만원 미만	112	54.6(5.6)	10.2	57	48.4(6.6)	13.6	55	61.4(7.8)	12.8
400만원 이상	504	70.4(2.2)	3.2	258	61.7(3.0)	4.8	246	80.2(3.2)	3.9

주 : 1) 어제 점심식사 후 치솔질 실천율 : (점심식사 후 치솔질 한 사람의 수 / 점심식사를 한 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 56〉 어제 점심식사 후 칫솔질 미실천 이유¹⁾

(단위 : %)

구분	N	시간이 없어서		칫솔질 할 장소가 없어서		주변에 칫솔질을 하는사람이없어서		필요성을 느끼지 못해서		기타	
		%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	883	8.2(1.0)	11.9	8.9(1.0)	11.2	0.9(0.4)	45.8	13.4(1.2)	9.2	3.9(0.8)	20.5
성											
남자	440	10.9(1.4)	12.8	10.8(1.6)	15.0	1.4(0.8)	54.6	16.2(1.9)	11.5	3.9(0.9)	22.7
여자	443	5.2(1.1)	20.3	6.9(1.3)	18.5	0.4(0.3)	72.5	10.4(1.5)	14.8	3.8(1.1)	29.0
연령											
19-29	61	2.7(1.9)	71.2	15.1(3.9)	26.2	1.8(1.7)	98.3	7.5(3.3)	43.5	1.4(1.3)	95.2
30-39	99	7.4(2.7)	36.1	5.4(2.3)	43.0	1.1(1.1)	99.0	8.4(2.9)	34.6	3.7(1.7)	47.6
40-49	131	6.9(2.0)	29.3	12.3(2.5)	20.6	0.8(0.8)	99.5	14.0(3.6)	25.7	2.6(1.7)	63.6
50-59	214	13.1(2.6)	19.5	7.2(1.6)	22.7	1.4(0.8)	57.5	7.9(2.1)	26.3	2.9(1.4)	47.7
60-69	220	9.1(2.1)	22.9	8.1(2.2)	26.7	0.0(0.0)	.	16.0(2.5)	15.8	6.3(1.8)	29.2
70 이상	158	5.3(1.9)	36.7	6.2(1.8)	29.1	0.6(0.6)	100.8	28.6(4.2)	14.8	6.1(1.9)	30.2
19-64	624	8.4(1.1)	13.0	9.9(1.2)	12.5	1.1(0.5)	49.2	10.2(1.2)	12.2	3.0(0.8)	26.2
65 이상	259	7.5(2.1)	27.4	5.6(1.3)	23.2	0.3(0.3)	100.5	24.3(3.0)	12.5	6.9(2.1)	30.2
교육수준 ²⁾											
무학	31	2.8(0.7)	23.5	3.0(3.1)	101.7	0.0(0.0)	.	34.4(9.6)	28.0	6.8(5.1)	75.3
초등학교	85	13.3(5.0)	37.2	5.8(2.3)	40.0	1.1(1.0)	99.3	22.7(6.1)	27.0	7.9(3.1)	38.6
중학교	99	7.6(2.8)	36.8	8.6(2.8)	32.9	0.0(0.0)	.	19.4(4.2)	21.7	5.1(2.5)	47.9
고등학교	367	9.1(1.4)	15.2	11.1(1.6)	14.2	1.5(0.8)	51.9	12.4(2.1)	16.7	2.3(0.9)	39.2
대학교 이상	301	6.7(1.4)	20.5	7.7(1.5)	19.7	0.5(0.4)	70.7	9.9(1.5)	15.4	4.2(1.2)	27.7
직업											
전문행정관리	133	4.4(1.6)	37.6	8.2(2.6)	31.8	1.6(1.1)	70.5	10.0(3.0)	29.7	0.5(0.5)	101.2
사무직	80	9.0(3.2)	35.3	8.0(3.3)	40.9	2.1(1.5)	71.0	7.2(2.8)	39.5	5.7(3.1)	54.1
판매·서비스직	109	11.8(3.3)	27.7	7.4(2.7)	36.6	0.9(0.9)	101.1	5.0(2.0)	39.5	4.4(2.1)	47.3
농림어업	43	9.9(3.5)	35.2	13.6(5.0)	36.9	0.0(0.0)	.	19.4(6.2)	31.9	2.6(2.6)	100.1
기능단순노무직	223	14.4(2.4)	16.8	11.0(2.1)	19.3	0.0(0.0)	.	17.3(2.9)	17.0	3.0(1.2)	40.8
기타 ³⁾	295	3.5(1.1)	32.3	8.1(1.6)	19.6	0.9(0.7)	77.9	16.9(2.6)	15.1	5.7(1.5)	26.9
월 가구소득											
100만원 미만	47	11.0(4.7)	42.6	6.9(2.2)	31.8	0.0(0.0)	.	32.9(8.1)	24.4	8.8(5.0)	57.2
100-200만원 미만	114	2.2(1.1)	52.3	7.0(3.2)	45.8	0.0(0.0)	.	24.8(4.1)	16.5	7.2(3.2)	44.3
200-300만원 미만	104	14.8(4.4)	29.7	9.0(2.9)	31.8	0.0(0.0)	.	16.2(3.2)	20.0	2.9(2.0)	69.4
300-400만원 미만	112	15.7(3.4)	21.6	14.9(3.4)	22.7	0.7(0.6)	99.1	11.2(2.9)	26.1	3.0(2.3)	75.5
400만원 이상	504	6.6(1.2)	18.1	8.3(1.4)	16.6	1.3(0.6)	48.5	10.2(1.4)	13.7	3.3(1.0)	31.4

주 : 1) 어제 점심식사 후 칫솔질 미실천 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 점심식사를 한 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 57〉 어제 저녁식사 후 또는 잠자기 전 치솔질 실천율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	96.4(0.8)	0.8	453	95.0(1.2)	1.3	456	98.0(0.6)	0.6
연령									
19-29	67	96.6(2.3)	2.4	33	94.0(4.0)	4.3	34	100.0(0.0)	0.0
30-39	103	96.3(1.9)	2.0	51	96.1(2.6)	2.7	52	96.5(2.5)	2.6
40-49	134	98.7(1.0)	1.0	68	98.5(1.5)	1.5	66	98.9(1.2)	1.2
50-59	218	96.0(1.6)	1.6	108	93.9(2.9)	3.1	110	98.4(0.8)	0.8
60-69	223	97.0(1.2)	1.2	115	94.0(2.4)	2.5	108	100.0(0.0)	0.0
70 이상	164	93.2(2.1)	2.2	78	93.5(2.9)	3.1	86	92.9(3.2)	3.4
19-64	643	96.9(0.9)	0.9	322	95.2(1.4)	1.4	321	98.7(0.5)	0.5
65 이상	266	94.9(1.2)	1.3	131	94.1(1.9)	2.0	135	95.7(2.0)	2.1
교육수준 ²⁾									
무학	33	94.1(3.6)	3.8	5	—(—)	—	28	93.0(4.3)	4.6
초등학교	88	89.9(4.0)	4.5	35	81.3(7.6)	9.3	53	96.3(3.7)	3.8
중학교	101	94.7(2.3)	2.4	38	91.2(5.1)	5.6	63	96.8(2.2)	2.3
고등학교	376	96.2(1.2)	1.3	199	94.0(1.9)	2.0	177	98.6(0.8)	0.8
대학교 이상	311	98.5(0.7)	0.7	176	98.3(1.0)	1.0	135	98.7(0.9)	0.9
직업									
전문행정관리	136	99.6(0.4)	0.4	76	99.2(0.8)	0.8	60	100.0(0.0)	0.0
사무직	81	99.1(0.9)	0.9	50	98.5(1.5)	1.6	31	100.0(0.0)	0.0
판매·서비스직	115	98.7(0.9)	1.0	34	100.0(0.0)	0.0	81	98.0(1.4)	1.4
농림어업	45	93.2(4.0)	4.3	25	90.2(6.4)	7.1	20	96.5(3.5)	3.7
기능단순노무직	226	95.7(1.8)	1.9	161	95.3(2.0)	2.1	65	96.9(2.1)	2.2
기타 ³⁾	306	93.9(1.3)	1.4	107	88.6(2.9)	3.3	199	97.3(1.0)	1.0
월 가구소득									
100만원 미만	49	91.7(3.6)	3.9	18	—(—)	—	31	93.8(4.3)	4.5
100-200만원 미만	116	95.4(1.7)	1.8	56	94.6(2.7)	2.9	60	96.3(2.4)	2.5
200-300만원 미만	107	92.5(2.1)	2.3	53	88.5(4.0)	4.6	54	96.5(2.5)	2.5
300-400만원 미만	114	99.0(1.0)	1.0	57	98.1(1.9)	1.9	57	100.0(0.0)	0.0
400만원 이상	521	97.3(1.0)	1.1	267	96.2(1.7)	1.7	254	98.5(0.7)	0.7

주 : 1) 어제 저녁식사 후 또는 잠자기 전 치솔질 실천율 : (저녁식사 후 또는 잠자기 전 치솔질 한 사람의 수 / 저녁식사 또는 잠을 잔 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 58〉 연간 미충족의료율(치과)¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	739	21.1(1.8)	8.6	367	20.9(2.2)	10.5	372	21.3(2.6)	12.2
연령									
19-29	46	19.9(5.6)	28.4	21	13.5(7.2)	53.5	25	27.1(9.3)	34.2
30-39	80	20.6(4.2)	20.6	38	21.1(5.7)	26.9	42	19.9(6.2)	31.2
40-49	110	24.7(4.1)	16.6	57	27.0(5.3)	19.6	53	22.0(6.1)	27.7
50-59	181	23.7(3.4)	14.4	86	28.2(5.4)	19.2	95	19.2(3.7)	19.2
60-69	191	15.3(2.6)	17.2	101	13.2(3.1)	23.3	90	17.5(4.2)	24.2
70 이상	131	22.0(4.6)	21.0	64	17.4(5.2)	30.2	67	26.4(7.7)	29.3
19-64	519	22.2(2.2)	9.8	254	23.7(2.8)	12.0	265	20.6(2.9)	14.2
65 이상	220	17.5(3.0)	17.2	113	11.6(3.2)	27.9	107	23.4(5.2)	22.4
교육수준 ²⁾									
무학	23	25.6(9.8)	38.2	4	-(-)	-	19	-(-)	-
초등학교	65	25.3(5.6)	22.3	25	18.8(7.5)	39.9	40	30.0(8.0)	26.8
중학교	87	27.1(4.6)	16.8	31	32.4(7.9)	24.2	56	24.1(5.5)	23.0
고등학교	314	21.4(2.7)	12.8	166	21.5(3.4)	16.0	148	21.3(3.8)	17.8
대학교 이상	250	18.2(2.3)	12.4	141	19.1(3.2)	16.6	109	16.9(3.3)	19.5
직업									
전문행정관리	117	17.9(3.9)	21.9	67	15.9(5.0)	31.6	50	20.7(5.4)	26.2
사무직	61	19.9(5.8)	29.0	38	21.7(6.9)	31.9	23	17.1(8.4)	49.1
판매·서비스직	95	24.7(4.8)	19.3	24	30.8(10.2)	33.3	71	22.1(5.4)	24.4
농림어업	39	17.8(6.8)	38.2	22	21.1(9.8)	46.5	17	-(-)	-
기능단순노무직	177	26.0(3.8)	14.7	128	26.1(4.1)	15.7	49	25.5(7.7)	30.1
기타 ³⁾	250	18.7(3.1)	16.5	88	14.2(4.2)	29.3	162	21.3(3.9)	18.4
월 가구소득									
100만원 미만	43	32.5(7.6)	23.4	18	-(-)	-	25	48.3(9.9)	20.5
100-200만원 미만	88	24.9(4.7)	19.0	45	25.9(6.5)	25.0	43	23.6(7.1)	30.3
200-300만원 미만	91	25.8(5.2)	20.1	45	29.6(7.9)	26.6	46	22.2(5.9)	26.4
300-400만원 미만	94	20.6(5.1)	24.7	46	17.3(6.4)	36.9	48	24.0(6.1)	25.6
400만원 이상	422	19.0(2.3)	11.9	212	20.1(3.0)	14.7	210	17.8(3.0)	16.6

주 : 1) 연간 미충족의료율(치과) : (최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 수 / 치과진료가 필요했던 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부 조사체계

제 2 부 주요통계결과

제 3 부 통계표

제 4 부 부록

I. 통계표

〈표 59〉 미충족의료 이유(치과)¹⁾

(단위 : %)

구분	N	시간이 없어서		증세가 가벼워서		경제적인 이유		교통편이 불편해서, 거리가 멀어서		병원에서 오래 기다리기 싫어서		병원 등 예약을 하기가 힘들어서		진료 받기가 무서워서		기타	
		% (표준 오차)	상대 표준 오차	% (표준 오차)	상대 표준 오차	% (표준 오차)	상대 표준 오차	% (표준 오차)	상대 표준 오차	% (표준 오차)	상대 표준 오차	% (표준 오차)	상대 표준 오차	% (표준 오차)	상대 표준 오차	% (표준 오차)	상대 표준 오차
전체	739	8.3(1.2)	14.8	5.9(1.0)	16.3	2.5(0.5)	21.9	0.8(0.3)	37.2	0.1(0.1)	100.1	0.2(0.1)	70.8	2.6(0.7)	25.9	0.8(0.3)	40.2
성																	
남자	367	9.9(1.5)	15.2	5.7(1.2)	21.7	3.2(1.0)	30.6	0.3(0.2)	99.2	0.2(0.2)	99.7	0.0(0.0)	.	1.2(0.5)	42.2	0.6(0.4)	71.3
여자	372	6.5(1.6)	24.9	6.1(1.4)	22.9	1.8(0.6)	35.5	1.4(0.6)	41.4	0.0(0.0)	.	0.4(0.3)	70.8	4.0(1.2)	29.1	1.0(0.5)	48.1
연령																	
19-29	46	11.4(4.8)	42.3	4.7(3.2)	67.7	1.9(1.9)	99.0	2.0(1.9)	96.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
30-39	80	11.7(3.3)	28.7	2.1(1.4)	69.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	4.4(2.1)	47.8	2.4(1.7)	72.2
40-49	110	10.6(3.7)	34.7	8.4(2.7)	31.9	2.2(1.4)	62.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.8(1.6)	56.0	0.8(0.7)	96.8
50-59	181	9.0(2.2)	24.8	8.1(2.1)	26.1	3.0(1.2)	40.0	0.3(0.3)	99.8	0.4(0.4)	100.4	0.0(0.0)	.	2.4(1.1)	44.5	0.4(0.4)	100.7
60-69	191	5.9(1.6)	26.6	4.3(1.4)	32.3	1.4(0.7)	50.1	1.0(0.8)	72.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.1(1.2)	54.9	0.6(0.6)	99.5
70 이상	131	1.6(1.1)	67.2	5.5(2.3)	42.7	6.6(2.6)	39.8	2.3(1.2)	51.2	0.0(0.0)	.	1.4(0.9)	69.7	3.6(1.6)	45.1	1.0(1.0)	100.2
19-64	519	10.2(1.6)	15.6	6.2(1.1)	17.6	2.1(0.6)	27.0	0.6(0.3)	61.3	0.1(0.1)	100.0	0.0(0.0)	.	2.3(0.7)	29.6	0.7(0.4)	50.9
65 이상	220	2.0(0.9)	43.0	4.7(1.5)	32.7	3.8(1.5)	39.6	1.7(0.8)	46.0	0.0(0.0)	.	0.8(0.5)	70.9	3.4(1.3)	37.2	1.1(0.8)	68.9
교육수준 ²⁾																	
무학	23	0.0(0.0)	.	13.3(8.2)	61.4	9.3(5.2)	55.6	3.0(2.9)	97.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
초등학교	65	1.8(1.8)	99.5	2.7(2.7)	100.5	6.9(3.7)	53.4	4.7(2.4)	50.1	0.0(0.0)	.	2.7(1.9)	71.9	4.6(2.5)	55.3	1.9(1.9)	98.2
중학교	87	9.2(3.5)	37.7	8.3(3.5)	41.7	2.2(1.5)	69.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	6.1(2.8)	46.4	1.3(1.3)	100.4
고등학교	314	8.3(1.8)	22.1	8.1(1.7)	21.1	2.5(0.9)	38.0	0.5(0.4)	71.5	0.2(0.2)	99.7	0.0(0.0)	.	1.5(0.8)	53.9	0.2(0.2)	99.6
대학교 이상	250	9.6(2.1)	21.8	2.9(1.0)	33.0	1.4(0.6)	42.7	0.6(0.6)	98.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.6(1.0)	37.3	1.1(0.6)	56.5
직업																	
전문행정관리	117	8.0(3.2)	39.8	6.1(2.2)	36.2	1.6(1.1)	68.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.5(1.0)	71.2	0.8(0.8)	99.5
사무직	61	15.5(4.6)	29.6	3.0(2.1)	71.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.5(1.5)	100.6
판매·서비스직	95	12.3(3.8)	30.6	7.8(3.5)	44.5	0.9(0.9)	100.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.7(0.7)	99.2	1.8(1.2)	70.1	1.2(1.2)	99.0
농림어업	39	6.8(4.2)	62.6	4.2(4.1)	98.3	0.0(0.0)	.	3.1(3.0)	97.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.8(3.0)	79.9	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	177	11.4(2.7)	23.6	7.1(2.0)	28.5	2.9(1.3)	46.0	0.0(0.0)	.	0.4(0.4)	98.3	0.0(0.0)	.	4.2(1.8)	42.6	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	250	2.7(1.3)	47.9	5.2(1.6)	30.5	4.4(1.3)	29.8	2.1(0.9)	42.3	0.0(0.0)	.	0.3(0.3)	99.9	2.9(1.0)	35.1	1.1(0.6)	56.9
월 가구소득																	
100만원 미만	43	13.0(5.8)	44.9	2.8(2.6)	93.8	5.7(3.1)	55.0	4.6(2.8)	60.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	6.5(3.8)	58.5	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	88	2.8(1.6)	59.1	5.6(2.7)	47.8	10.1(3.7)	36.3	0.8(0.8)	101.0	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	102.4	4.7(2.5)	52.3	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	91	12.0(4.1)	34.5	7.7(3.7)	48.7	2.7(1.8)	66.9	2.1(1.3)	59.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.3(1.3)	99.0	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	94	9.9(3.5)	35.0	4.2(1.9)	44.0	1.6(1.1)	66.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.8(1.9)	49.3	1.0(1.0)	99.4
400만원 이상	422	7.9(1.6)	19.7	6.2(1.3)	20.9	1.1(0.5)	42.7	0.5(0.4)	75.2	0.2(0.2)	99.9	0.1(0.1)	99.3	1.9(0.7)	34.6	1.1(0.5)	44.6

주 : 1) 미충족의료 이유(치과) : (응답보기별 응답자 수 / 치과진료가 필요했던 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 60〉 연간 스케일링 경험률¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	49.1(2.0)	4.1	453	47.1(2.6)	5.6	456	51.3(2.4)	4.7
연령									
19-29	67	50.2(7.2)	14.4	33	39.7(9.2)	23.2	34	64.0(8.8)	13.7
30-39	103	50.4(5.2)	10.3	51	46.4(7.4)	15.9	52	55.1(6.5)	11.9
40-49	134	53.1(4.1)	7.6	68	45.8(5.3)	11.5	66	61.0(6.0)	9.9
50-59	218	51.1(4.3)	8.4	108	47.1(5.2)	11.0	110	55.4(5.4)	9.7
60-69	223	53.8(3.7)	6.9	115	59.1(5.0)	8.5	108	48.5(5.2)	10.7
70 이상	164	31.3(3.9)	12.4	78	39.7(6.0)	15.0	86	23.7(4.8)	20.4
19-64	643	51.5(2.3)	4.4	322	46.9(2.9)	6.1	321	56.8(2.8)	4.9
65 이상	266	40.8(3.7)	9.0	131	47.8(4.8)	10.0	135	34.4(4.7)	13.6
교육수준 ²⁾									
무학	33	3.5(3.7)	107.6	5	-(-)	-	28	0.0(0.0)	.
초등학교	88	26.8(6.1)	22.8	35	26.6(8.5)	31.9	53	27.0(6.8)	25.2
중학교	101	41.5(5.0)	12.0	38	31.4(8.1)	25.8	63	47.5(6.5)	13.6
고등학교	376	52.1(2.6)	5.0	199	50.1(3.5)	7.1	177	54.4(3.4)	6.3
대학교 이상	311	55.2(3.2)	5.8	176	49.8(4.0)	8.0	135	62.4(3.8)	6.1
직업									
전문행정관리	136	63.6(4.7)	7.4	76	56.3(6.5)	11.6	60	73.5(5.1)	6.9
사무직	81	52.3(6.4)	12.3	50	48.9(7.6)	15.6	31	57.2(11.1)	19.3
판매·서비스직	115	53.4(5.1)	9.6	34	47.3(8.2)	17.3	81	56.4(5.9)	10.5
농림어업	45	38.8(7.5)	19.5	25	45.7(10.0)	21.9	20	31.1(11.0)	35.3
기능단순노무직	226	45.0(3.2)	7.1	161	44.0(4.0)	9.2	65	47.8(5.4)	11.4
기타 ³⁾	306	43.1(3.8)	8.7	107	43.5(5.8)	13.3	199	42.8(4.2)	9.8
월 가구소득									
100만원 미만	49	38.7(9.2)	23.9	18	-(-)	-	31	40.5(10.5)	26.0
100-200만원 미만	116	35.2(4.5)	12.8	56	42.1(6.6)	15.6	60	28.0(5.8)	20.6
200-300만원 미만	107	39.8(4.8)	12.0	53	36.1(6.6)	18.4	54	43.4(6.5)	14.9
300-400만원 미만	114	54.7(4.6)	8.5	57	53.8(6.9)	12.8	57	55.6(6.4)	11.5
400만원 이상	521	52.7(2.8)	5.3	267	48.7(3.5)	7.2	254	57.2(3.3)	5.9

주 : 1) 연간 스케일링 경험률 : (최근 1년 동안 스케일링을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요
약

제 1 부
조
사
체
계

제 2 부
주
요
통
계
결
과

제 3 부
통
계
표

제 4 부
부
록

I. 통계표

〈표 61〉 주관적 건강인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	43.6(1.9)	4.5	453	48.6(2.6)	5.3	456	38.2(2.4)	6.3
연령									
19-29	67	54.2(6.3)	11.6	33	58.7(8.7)	14.8	34	48.2(8.0)	16.5
30-39	103	60.0(5.5)	9.1	51	67.8(6.9)	10.1	52	50.5(7.6)	15.1
40-49	134	49.3(5.1)	10.4	68	56.0(5.8)	10.4	66	42.1(8.3)	19.6
50-59	218	38.3(3.0)	8.0	108	41.2(4.2)	10.2	110	35.1(4.7)	13.3
60-69	223	41.1(2.9)	7.0	115	39.1(4.2)	10.8	108	43.1(5.6)	13.0
70 이상	164	23.3(3.0)	13.0	78	34.0(4.6)	13.4	86	13.6(3.5)	25.7
19-64	643	48.0(2.3)	4.8	322	52.3(3.0)	5.7	321	43.2(3.0)	7.0
65 이상	266	28.6(2.8)	9.6	131	34.9(3.8)	10.7	135	22.8(4.0)	17.4
교육수준 ²⁾									
무학	33	14.7(5.4)	36.5	5	—(—)	—	28	13.5(5.2)	38.6
초등학교	88	27.9(4.8)	17.3	35	36.4(5.5)	15.0	53	21.7(6.1)	28.3
중학교	101	27.6(5.5)	20.1	38	26.4(7.3)	27.7	63	28.3(6.5)	22.8
고등학교	376	46.0(2.5)	5.5	199	48.2(3.6)	7.4	177	43.5(3.9)	9.0
대학교 이상	311	49.8(3.3)	6.7	176	54.7(3.7)	6.8	135	43.2(4.7)	10.8
직업									
전문행정관리	136	52.5(4.0)	7.7	76	53.2(5.1)	9.6	60	51.6(6.8)	13.1
사무직	81	41.8(6.3)	15.1	50	48.7(7.5)	15.5	31	31.8(10.0)	31.6
판매·서비스직	115	47.6(5.7)	11.9	34	58.6(7.4)	12.5	81	42.2(7.1)	16.8
농림어업	45	35.5(7.7)	21.6	25	32.5(9.7)	30.0	20	38.9(9.1)	23.3
기능단순노무직	226	46.5(3.3)	7.2	161	48.1(4.3)	8.9	65	41.9(6.0)	14.2
기타 ³⁾	306	36.8(3.3)	9.0	107	44.9(6.1)	13.7	199	31.7(3.5)	11.1
월 가구소득									
100만원 미만	49	22.6(5.6)	25.0	18	—(—)	—	31	17.8(7.9)	44.2
100-200만원 미만	116	27.9(4.2)	15.0	56	32.7(5.7)	17.5	60	22.9(6.6)	28.7
200-300만원 미만	107	38.1(5.0)	13.1	53	38.0(7.4)	19.4	54	38.3(7.1)	18.6
300-400만원 미만	114	51.3(4.9)	9.6	57	61.2(5.9)	9.7	57	40.6(6.3)	15.6
400만원 이상	521	46.8(2.8)	6.0	267	50.8(3.3)	6.4	254	42.4(3.8)	9.0

주 : 1) 주관적 건강인지율 : (주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 62〉 행복감지수¹⁾ (단위 : 점)

구분	전체			남자			여자		
	N	점(표준오차)	상대 표준오차	N	점(표준오차)	상대 표준오차	N	점(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	7.0(0.1)	1.0	453	7.1(0.1)	1.3	456	6.9(0.1)	1.4
연령									
19-29	67	7.4(0.2)	2.2	33	7.5(0.2)	2.8	34	7.2(0.2)	3.4
30-39	103	7.2(0.2)	2.9	51	7.4(0.3)	3.5	52	7.0(0.3)	4.6
40-49	134	7.0(0.2)	2.8	68	7.0(0.2)	3.5	66	7.1(0.3)	3.8
50-59	218	7.0(0.1)	1.8	108	6.9(0.2)	2.5	110	7.1(0.2)	2.5
60-69	223	6.9(0.1)	1.8	115	7.1(0.2)	2.3	108	6.7(0.2)	2.5
70 이상	164	6.4(0.2)	2.5	78	6.4(0.2)	3.3	86	6.3(0.2)	3.0
19-64	643	7.1(0.1)	1.1	322	7.1(0.1)	1.4	321	7.1(0.1)	1.5
65 이상	266	6.6(0.1)	1.7	131	6.8(0.1)	2.2	135	6.3(0.1)	2.0
교육수준 ²⁾									
무학	33	5.7(0.5)	8.0	5	-()	-	28	5.8(0.5)	8.7
초등학교	88	6.5(0.2)	3.0	35	6.5(0.3)	4.7	53	6.4(0.2)	3.5
중학교	101	6.6(0.2)	3.4	38	6.4(0.4)	5.9	63	6.7(0.2)	3.7
고등학교	376	6.9(0.1)	1.6	199	7.0(0.1)	2.1	177	6.8(0.1)	2.1
대학교 이상	311	7.3(0.1)	1.3	176	7.3(0.1)	1.4	135	7.3(0.2)	2.2
직업									
전문행정관리	136	7.3(0.1)	1.9	76	7.3(0.2)	2.1	60	7.2(0.2)	3.0
사무직	81	7.3(0.2)	2.5	50	7.4(0.2)	2.7	31	7.2(0.3)	4.0
판매·서비스직	115	6.9(0.2)	2.3	34	7.1(0.2)	3.0	81	6.9(0.2)	3.2
농림어업	45	6.7(0.3)	4.6	25	6.5(0.3)	5.4	20	7.0(0.4)	5.8
기능단순노무직	226	6.9(0.2)	2.3	161	7.0(0.2)	2.6	65	6.5(0.3)	4.3
기타 ³⁾	306	6.8(0.1)	1.8	107	6.9(0.2)	3.3	199	6.8(0.1)	2.0
월 가구소득									
100만원 미만	49	5.5(0.3)	6.0	18	-()	-	31	5.5(0.4)	7.1
100-200만원 미만	116	6.3(0.2)	2.8	56	6.3(0.3)	4.5	60	6.3(0.2)	3.3
200-300만원 미만	107	6.6(0.2)	2.8	53	6.6(0.3)	4.9	54	6.7(0.2)	2.9
300-400만원 미만	114	6.7(0.2)	2.6	57	7.0(0.2)	2.5	57	6.5(0.3)	4.1
400만원 이상	521	7.3(0.1)	1.1	267	7.4(0.1)	1.4	254	7.2(0.1)	1.6

주 : 1) 행복감지수 : 행복지수의 총 합 / 조사대상 응답자 수
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 63〉 삶의 질 지수(EQ-5D Index)¹⁾

(단위 : 점)

구분	전체			남자			여자		
	N	점(표준오차)	상대 표준오차	N	점(표준오차)	상대 표준오차	N	점(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	0.962(0.004)	0.4	453	0.969(0.005)	0.5	456	0.954(0.005)	0.6
연령									
19-29	67	0.982(0.005)	0.6	33	0.989(0.007)	0.7	34	0.973(0.009)	0.9
30-39	103	0.969(0.013)	1.3	51	0.973(0.020)	2.0	52	0.964(0.015)	1.5
40-49	134	0.985(0.004)	0.4	68	0.987(0.006)	0.6	66	0.984(0.005)	0.5
50-59	218	0.979(0.003)	0.4	108	0.981(0.005)	0.5	110	0.977(0.005)	0.5
60-69	223	0.959(0.006)	0.6	115	0.969(0.008)	0.8	108	0.949(0.008)	0.9
70 이상	164	0.877(0.015)	1.7	78	0.894(0.021)	2.4	86	0.862(0.021)	2.4
19-64	643	0.979(0.003)	0.3	322	0.982(0.004)	0.4	321	0.974(0.004)	0.4
65 이상	266	0.904(0.011)	1.2	131	0.920(0.014)	1.5	135	0.889(0.014)	1.6
교육수준 ²⁾									
무학	33	0.797(0.034)	4.3	5	—(—)	—	28	0.792(0.038)	4.8
초등학교	88	0.929(0.012)	1.3	35	0.930(0.015)	1.6	53	0.928(0.014)	1.5
중학교	101	0.928(0.014)	1.5	38	0.932(0.019)	2.1	63	0.926(0.019)	2.1
고등학교	376	0.970(0.005)	0.5	199	0.970(0.007)	0.8	177	0.971(0.005)	0.5
대학교 이상	311	0.978(0.005)	0.5	176	0.982(0.007)	0.7	135	0.972(0.006)	0.6
직업									
전문행정관리	136	0.988(0.004)	0.4	76	0.987(0.006)	0.6	60	0.989(0.004)	0.4
사무직	81	0.978(0.008)	0.8	50	0.976(0.010)	1.1	31	0.980(0.010)	1.1
판매·서비스직	115	0.965(0.013)	1.3	34	0.958(0.027)	2.8	81	0.968(0.009)	1.0
농림어업	45	0.955(0.014)	1.4	25	0.964(0.020)	2.1	20	0.946(0.022)	2.4
기능단순노무직	226	0.980(0.004)	0.4	161	0.984(0.004)	0.4	65	0.969(0.007)	0.7
기타 ³⁾	306	0.929(0.009)	0.9	107	0.936(0.013)	1.4	199	0.925(0.011)	1.1
월 가구소득									
100만원 미만	49	0.869(0.019)	2.1	18	—(—)	—	31	0.850(0.029)	3.4
100-200만원 미만	116	0.906(0.015)	1.6	56	0.891(0.024)	2.7	60	0.922(0.012)	1.4
200-300만원 미만	107	0.955(0.011)	1.2	53	0.953(0.013)	1.4	54	0.957(0.017)	1.7
300-400만원 미만	114	0.969(0.007)	0.8	57	0.986(0.006)	0.6	57	0.951(0.011)	1.2
400만원 이상	521	0.977(0.004)	0.4	267	0.985(0.004)	0.5	254	0.968(0.006)	0.6

주 : 1) 삶의 질 지수(EQ-5D Index) : 건강관련 삶의 질의 5가지 차원(운동능력, 자기관리, 일상 활동, 통증/불편, 불안/우울)의 기술체계를 종합한 지표

※ 삶의 질 조사도구(EQ-5D Index)의 질 가중치 추정연구(남해성, 2007)

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 64〉 운전자석 안전벨트 착용률¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	678	89.7(1.3)	1.5	398	87.1(1.7)	1.9	280	93.6(1.6)	1.8
연령									
19-29	43	91.6(4.2)	4.6	23	91.9(5.6)	6.1	20	91.0(5.9)	6.5
30-39	91	86.5(3.9)	4.5	50	83.5(5.2)	6.2	41	91.1(5.1)	5.6
40-49	125	88.8(2.9)	3.3	67	83.2(4.6)	5.5	58	95.7(3.0)	3.2
50-59	193	88.0(2.1)	2.4	104	84.1(2.9)	3.5	89	92.9(2.8)	3.0
60-69	168	94.2(1.3)	1.4	105	94.0(2.0)	2.1	63	94.6(2.3)	2.4
70 이상	58	91.1(3.0)	3.3	49	89.2(3.8)	4.2	9	-(-)	-
19-64	549	88.9(1.5)	1.7	299	85.8(2.0)	2.4	250	93.0(1.8)	2.0
65 이상	129	95.1(1.6)	1.7	99	93.4(2.1)	2.3	30	100.0(0.0)	0.0
교육수준 ²⁾									
무학	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	30	77.3(9.8)	12.7	21	69.4(11.8)	17.0	9	-(-)	-
중학교	56	90.1(3.7)	4.2	30	90.6(5.3)	5.9	26	89.4(5.5)	6.2
고등학교	312	89.4(1.7)	1.9	181	86.6(2.5)	2.9	131	93.5(2.2)	2.3
대학교 이상	278	91.1(2.1)	2.4	165	88.7(2.7)	3.0	113	94.6(2.5)	2.6
직업									
전문행정관리	128	90.4(3.5)	3.9	72	93.9(2.8)	3.0	56	85.8(5.4)	6.3
사무직	75	93.5(2.9)	3.2	49	90.9(4.0)	4.4	26	97.7(2.3)	2.3
판매·서비스직	98	89.1(2.8)	3.1	33	83.8(6.5)	7.8	65	92.3(3.1)	3.3
농림어업	30	73.9(8.1)	11.0	23	64.3(10.6)	16.5	7	-(-)	-
기능단순노무직	189	84.2(3.2)	3.9	153	81.6(3.7)	4.5	36	97.0(2.9)	3.0
기타 ³⁾	158	96.0(1.6)	1.7	68	95.2(3.0)	3.1	90	96.8(1.6)	1.6
월 가구소득									
100만원 미만	15	-(-)	-	11	-(-)	-	4	-(-)	-
100-200만원 미만	53	90.8(3.2)	3.5	35	88.7(4.5)	5.1	18	-(-)	-
200-300만원 미만	72	88.7(3.8)	4.3	44	88.8(4.3)	4.9	28	88.4(7.0)	7.9
300-400만원 미만	87	92.0(3.1)	3.3	55	92.4(4.0)	4.4	32	91.2(4.3)	4.7
400만원 이상	449	89.4(1.7)	1.9	251	85.8(2.3)	2.7	198	94.3(1.8)	1.9

주 : 1) 운전자석 안전벨트 착용률 : (자동차 운전 시 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 자동차 운전자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 65〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	801	28.1(2.0)	7.0	378	25.6(2.2)	8.7	423	30.6(2.5)	8.1
연령									
19-29	66	32.1(6.2)	19.2	32	31.8(7.2)	22.6	34	32.5(8.0)	24.6
30-39	96	15.4(3.4)	21.9	44	10.9(4.4)	40.3	52	20.1(5.7)	28.4
40-49	118	33.9(4.4)	13.0	55	24.0(5.8)	24.1	63	43.1(6.2)	14.3
50-59	187	27.2(3.8)	14.0	87	26.8(4.5)	16.9	100	27.5(5.3)	19.1
60-69	184	23.6(3.1)	13.3	88	23.0(4.2)	18.2	96	24.1(4.5)	18.6
70 이상	150	36.0(4.1)	11.3	72	35.5(5.6)	15.8	78	36.5(5.8)	16.0
19-64	572	26.9(2.2)	8.1	269	24.2(2.4)	10.0	303	29.6(2.9)	9.7
65 이상	229	32.3(3.3)	10.3	109	30.5(4.6)	15.0	120	33.8(4.5)	13.3
교육수준 ²⁾									
무학	30	33.5(9.5)	28.5	4	—(—)	—	26	31.2(9.6)	30.7
초등학교	74	35.9(5.8)	16.0	26	28.8(11.0)	38.2	48	40.6(6.1)	15.1
중학교	94	32.5(5.1)	15.7	37	32.5(8.3)	25.4	57	32.5(6.5)	20.0
고등학교	320	24.1(2.8)	11.5	159	22.3(3.5)	15.8	161	25.9(4.6)	17.8
대학교 이상	283	29.4(3.2)	10.8	152	26.6(3.5)	13.0	131	32.7(4.2)	12.9
직업									
전문행정관리	125	26.5(3.8)	14.2	67	28.3(5.8)	20.5	58	24.3(6.0)	24.7
사무직	68	17.4(4.5)	26.1	38	11.0(5.2)	47.4	30	24.8(7.5)	30.3
판매·서비스직	101	27.8(5.3)	19.2	28	13.5(5.7)	42.3	73	34.6(6.6)	19.2
농림어업	38	19.9(5.9)	29.9	20	21.9(9.4)	43.0	18	—(—)	—
기능단순노무직	188	21.8(2.9)	13.2	127	21.4(3.5)	16.2	61	22.7(5.6)	24.8
기타 ³⁾	281	37.0(3.7)	10.0	98	38.5(5.9)	15.4	183	36.1(4.2)	11.6
월 가구소득									
100만원 미만	45	43.0(7.2)	16.8	16	—(—)	—	29	36.7(7.9)	21.4
100-200만원 미만	103	30.9(5.2)	16.7	47	30.0(8.0)	26.6	56	31.7(6.7)	21.3
200-300만원 미만	91	27.9(5.8)	20.7	42	27.5(7.2)	26.1	49	28.1(7.0)	24.8
300-400만원 미만	101	32.8(5.5)	16.8	47	32.6(6.6)	20.3	54	33.0(7.2)	21.9
400만원 이상	459	26.0(2.5)	9.6	224	22.3(2.8)	12.7	235	29.8(3.1)	10.6

주 : 1) 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 : (다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 동승차량 뒷좌석 탑승자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 66〉 연간 음주운전차량 동승경험률¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	2.1(0.4)	21.3	453	2.5(0.6)	25.3	456	1.6(0.7)	42.4
연령									
19-29	67	1.9(1.8)	95.7	33	0.0(0.0)	.	34	4.3(4.1)	94.1
30-39	103	0.0(0.0)	.	51	0.0(0.0)	.	52	0.0(0.0)	.
40-49	134	0.6(0.6)	101.2	68	1.2(1.2)	99.6	66	0.0(0.0)	.
50-59	218	4.0(1.2)	29.8	108	6.7(2.3)	33.9	110	1.2(0.9)	70.8
60-69	223	2.3(1.0)	43.3	115	2.5(1.4)	55.8	108	2.1(1.4)	69.9
70 이상	164	2.3(1.4)	60.9	78	2.4(1.7)	70.4	86	2.3(1.6)	70.9
19-64	643	2.1(0.5)	25.7	322	2.7(0.8)	29.1	321	1.4(0.8)	57.2
65 이상	266	2.1(1.0)	46.4	131	1.9(1.1)	57.7	135	2.2(1.2)	56.2
교육수준 ²⁾									
무학	33	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-	28	0.0(0.0)	.
초등학교	88	1.2(1.2)	99.7	35	0.0(0.0)	.	53	2.0(2.0)	99.1
중학교	101	0.0(0.0)	.	38	0.0(0.0)	.	63	0.0(0.0)	.
고등학교	376	4.1(0.9)	23.1	199	4.6(1.3)	27.8	177	3.5(1.6)	46.3
대학교 이상	311	0.7(0.4)	57.7	176	1.3(0.7)	57.4	135	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	136	0.8(0.7)	97.0	76	1.3(1.3)	96.8	60	0.0(0.0)	.
사무직	81	0.9(0.9)	98.5	50	1.5(1.5)	99.7	31	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	115	2.9(2.0)	67.0	34	1.7(1.8)	100.5	81	3.5(2.8)	80.6
농림어업	45	4.3(2.9)	66.5	25	2.8(2.7)	98.4	20	6.0(5.3)	89.5
기능단순노무직	226	3.9(1.1)	28.9	161	4.4(1.5)	32.9	65	2.6(1.7)	67.0
기타 ³⁾	306	1.1(0.5)	45.8	107	1.5(0.8)	52.9	199	0.9(0.6)	69.9
월 가구소득									
100만원 미만	49	4.2(2.9)	69.6	18	-(-)	-	31	3.4(3.4)	99.4
100-200만원 미만	116	0.0(0.0)	.	56	0.0(0.0)	.	60	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	107	1.7(1.2)	72.7	53	2.2(2.3)	101.4	54	1.2(1.2)	100.2
300-400만원 미만	114	4.0(1.9)	47.5	57	3.7(2.2)	58.7	57	4.3(2.6)	59.8
400만원 이상	521	2.0(0.6)	31.1	267	2.7(0.8)	31.3	254	1.2(0.9)	76.2

주 : 1) 연간 음주운전차량 동승경험률 : (최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 탄 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요
약

제 1
부
조
사
체
계

제 2
부
주
요
통
계
결
과

제 3
부
통
계
표

제 4
부
부
록

I. 통계표

〈표 67〉 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	685	2.1(0.6)	26.9	404	3.6(1.0)	26.6	281	0.0(0.0)	.
연령									
19-29	43	0.0(0.0)	.	23	0.0(0.0)	.	20	0.0(0.0)	.
30-39	92	1.1(1.1)	100.7	50	1.8(1.8)	100.7	42	0.0(0.0)	.
40-49	125	1.9(1.5)	77.3	67	3.5(2.7)	75.8	58	0.0(0.0)	.
50-59	194	2.2(1.1)	50.2	105	3.9(1.9)	50.6	89	0.0(0.0)	.
60-69	169	3.5(1.3)	37.2	106	5.8(2.1)	36.3	63	0.0(0.0)	.
70 이상	62	4.9(2.8)	55.9	53	5.9(3.2)	54.7	9	-(-)	-
19-64	552	2.0(0.6)	30.2	301	3.5(1.0)	30.0	251	0.0(0.0)	.
65 이상	133	3.0(1.5)	50.8	103	4.1(2.0)	49.9	30	0.0(0.0)	.
교육수준 ²⁾									
무학	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	33	9.0(5.1)	56.5	24	11.8(6.3)	53.2	9	-(-)	-
중학교	56	0.0(0.0)	.	30	0.0(0.0)	.	26	0.0(0.0)	.
고등학교	314	2.5(1.0)	39.9	182	4.2(1.7)	39.7	132	0.0(0.0)	.
대학교 이상	279	1.6(0.7)	40.8	166	2.7(1.1)	39.6	113	0.0(0.0)	.
직업									
전문행정관리	128	0.6(0.7)	101.0	72	1.1(1.1)	100.3	56	0.0(0.0)	.
사무직	75	2.1(1.5)	69.8	49	3.3(2.4)	70.5	26	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	98	0.5(0.5)	100.3	33	1.3(1.3)	100.4	65	0.0(0.0)	.
농림어업	31	3.7(3.5)	94.8	24	5.0(4.8)	97.6	7	-(-)	-
기능단순노무직	191	4.8(1.7)	35.6	154	5.8(2.1)	35.7	37	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	162	1.3(0.8)	58.4	72	2.8(1.6)	58.7	90	0.0(0.0)	.
월 가구소득									
100만원 미만	16	-(-)	-	12	-(-)	-	4	-(-)	-
100-200만원 미만	57	3.1(2.2)	70.2	39	4.4(3.1)	69.3	18	-(-)	-
200-300만원 미만	72	2.5(1.9)	74.2	44	4.2(3.0)	73.0	28	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	87	1.9(1.3)	70.6	55	2.9(2.0)	70.6	32	0.0(0.0)	.
400만원 이상	451	1.9(0.7)	35.3	252	3.4(1.2)	35.1	199	0.0(0.0)	.

주 : 1) 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률 : (최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 수 / 자동차 또는 오토바이 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 68〉 자전거 헬멧 착용률¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	161	36.4(5.3)	14.5	119	38.6(5.3)	13.7	42	30.4(9.1)	30.0
연령									
19-29	16	-(-)	-	8	-(-)	-	8	-(-)	-
30-39	19	-(-)	-	13	-(-)	-	6	-(-)	-
40-49	29	50.1(10.1)	20.1	20	51.1(10.8)	21.1	9	-(-)	-
50-59	31	56.3(9.1)	16.1	24	58.0(9.4)	16.1	7	-(-)	-
60-69	38	35.7(9.1)	25.4	30	39.6(8.4)	21.2	8	-(-)	-
70 이상	28	17.2(8.4)	49.0	24	19.7(9.0)	45.9	4	-(-)	-
19-64	117	38.0(5.7)	15.1	83	39.7(6.1)	15.5	34	33.7(10.0)	29.7
65 이상	44	30.3(8.4)	27.6	36	34.7(8.8)	25.3	8	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	3	-(-)	-	1	-(-)	-	2	-(-)	-
초등학교	15	-(-)	-	15	-(-)	-	0	-(-)	-
중학교	20	35.0(11.9)	34.1	13	-(-)	-	7	-(-)	-
고등학교	59	40.7(7.8)	19.1	45	47.0(8.3)	17.6	14	-(-)	-
대학교 이상	64	37.0(7.1)	19.1	45	35.8(7.4)	20.8	19	-(-)	-
직업									
전문행정관리	24	52.7(9.8)	18.5	18	-(-)	-	6	-(-)	-
사무직	19	-(-)	-	16	-(-)	-	3	-(-)	-
판매·서비스직	15	-(-)	-	5	-(-)	-	10	-(-)	-
농림어업	10	-(-)	-	8	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	49	41.3(8.5)	20.5	41	41.5(8.5)	20.5	8	-(-)	-
기타 ³⁾	44	21.2(8.1)	38.4	31	23.6(10.0)	42.3	13	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	8	-(-)	-	6	-(-)	-	2	-(-)	-
100-200만원 미만	22	27.8(11.2)	40.2	17	-(-)	-	5	-(-)	-
200-300만원 미만	21	8.9(6.5)	73.4	16	-(-)	-	5	-(-)	-
300-400만원 미만	20	30.0(13.0)	43.4	16	-(-)	-	4	-(-)	-
400만원 이상	89	46.7(6.3)	13.5	63	49.7(6.3)	12.6	26	39.4(11.9)	30.2

주 : 1) 자전거 헬멧 착용률 : (자전거를 탈 때 헬멧을 “항상 착용한다”에 응답한 사람의 수 / 자전거 운전자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 69〉 혈압수치 및 혈당수치 인지율

(단위 : %)

구분	혈압수치 인지율 ¹⁾			혈당수치 인지율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	상대표준오차	N	%(표준오차)	상대표준오차
전체	909	62.4(1.8)	3.0	909	26.7(2.0)	7.6
성						
남자	453	67.9(2.3)	3.4	453	26.9(2.4)	8.8
여자	456	56.4(3.0)	5.3	456	26.5(2.5)	9.3
연령						
19-29	67	44.1(6.5)	14.7	67	11.1(3.3)	29.9
30-39	103	46.9(4.6)	9.7	103	24.3(4.6)	18.8
40-49	134	66.1(3.6)	5.4	134	23.2(4.3)	18.4
50-59	218	76.4(2.8)	3.7	218	37.3(3.5)	9.4
60-69	223	70.2(3.5)	5.0	223	32.0(4.0)	12.5
70 이상	164	54.1(4.3)	8.0	164	23.0(3.5)	15.4
19-64	643	62.9(2.0)	3.2	643	27.0(2.3)	8.4
65 이상	266	60.7(3.4)	5.7	266	25.8(3.3)	12.6
교육수준 ³⁾						
무학	33	10.0(4.1)	40.8	33	2.1(2.0)	96.2
초등학교	88	45.2(6.1)	13.5	88	20.9(4.7)	22.7
중학교	101	61.5(6.0)	9.8	101	19.2(4.5)	23.3
고등학교	376	65.4(2.8)	4.4	376	25.9(2.6)	10.1
대학교 이상	311	66.3(2.7)	4.0	311	32.1(3.4)	10.5
직업						
전문행정관리	136	74.3(3.7)	4.9	136	38.0(3.8)	9.9
사무직	81	60.7(6.7)	11.0	81	32.7(6.9)	21.0
판매·서비스직	115	60.0(5.0)	8.3	115	25.6(3.8)	15.0
농림어업	45	51.6(8.9)	17.2	45	17.5(5.2)	29.8
기능단순노무직	226	66.2(3.0)	4.5	226	24.0(3.1)	13.1
기타 ⁴⁾	306	56.2(3.9)	6.9	306	22.5(2.9)	12.8
월 가구소득						
100만원 미만	49	49.8(9.3)	18.6	49	21.6(7.0)	32.6
100-200만원 미만	116	48.2(5.6)	11.6	116	12.7(3.9)	30.4
200-300만원 미만	107	57.7(4.5)	7.9	107	25.9(5.2)	20.2
300-400만원 미만	114	72.1(4.3)	6.0	114	24.2(3.7)	15.3
400만원 이상	521	64.8(2.6)	4.0	521	30.4(2.5)	8.4

주 : 1) 혈압수치 인지율 : (본인의 혈압수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 혈당수치 인지율 : (본인의 혈당수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 70〉 본인 인지 혈압 및 혈당 조절률 (단위 : %)

구분	본인 인지 혈압 조절률 ¹⁾			본인 인지 혈당조절률 ²⁾		
	N	%(표준오차)	상대표준오차	N	%(표준오차)	상대표준오차
전체	263	93.7(1.6)	1.8	105	92.5(2.4)	2.6
성						
남자	125	91.6(3.0)	3.2	61	92.7(3.4)	3.6
여자	138	95.9(1.5)	1.6	44	92.2(3.3)	3.6
연령						
19-29	3	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	6	-(-)	-	5	-(-)	-
40-49	14	-(-)	-	5	-(-)	-
50-59	52	98.1(1.9)	1.9	20	97.1(2.9)	3.0
60-69	91	96.8(1.8)	1.8	37	91.6(4.9)	5.3
70 이상	97	91.1(2.8)	3.0	38	91.9(4.0)	4.4
19-64	126	94.3(2.6)	2.7	52	94.6(3.1)	3.3
65 이상	137	93.0(2.1)	2.3	53	89.7(4.2)	4.7
교육수준 ³⁾						
무학	24	86.6(7.0)	8.1	6	-(-)	-
초등학교	45	93.7(3.4)	3.6	18	-(-)	-
중학교	44	96.4(2.6)	2.6	16	-(-)	-
고등학교	109	97.7(1.2)	1.2	41	91.0(4.4)	4.9
대학교 이상	41	86.6(6.5)	7.5	24	91.0(6.6)	7.2
직업						
전문행정관리	16	-(-)	-	7	-(-)	-
사무직	14	-(-)	-	8	-(-)	-
판매·서비스직	29	100.0(0.0)	0.0	16	-(-)	-
농림어업	21	95.0(3.9)	4.1	7	-(-)	-
기능단순노무직	61	96.8(2.3)	2.3	27	95.8(4.1)	4.3
기타 ⁴⁾	122	90.4(3.1)	3.4	40	94.0(3.1)	3.3
월 가구소득						
100만원 미만	29	87.6(5.4)	6.2	10	-(-)	-
100-200만원 미만	50	95.5(2.6)	2.7	17	-(-)	-
200-300만원 미만	50	95.0(2.9)	3.1	19	-(-)	-
300-400만원 미만	33	99.0(1.0)	1.0	12	-(-)	-
400만원 이상	101	92.2(3.3)	3.6	47	92.8(4.1)	4.4

주 : 1) 본인 인지 혈압 조절률 : (혈압이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 본인 인지 혈당 조절률 : (혈당이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 71〉 고혈압 진단 경험률

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	909	25.8(1.9)	7.2	453	25.1(2.3)	9.1	456	26.5(2.3)	8.8
30세 이상 ²⁾	842	28.9(2.0)	7.0	420	27.7(2.4)	8.7	422	30.1(2.7)	8.9
연령									
19-29	67	5.8(3.2)	55.6	33	10.3(5.4)	52.7	34	0.0(0.0)	.
30-39	103	5.9(2.4)	40.3	51	9.9(4.3)	43.3	52	1.1(1.1)	99.6
40-49	134	12.3(2.9)	23.7	68	14.6(5.0)	34.3	66	9.7(4.1)	41.9
50-59	218	26.0(2.8)	10.6	108	25.3(4.2)	16.4	110	26.7(4.5)	16.8
60-69	223	40.5(3.7)	9.1	115	37.4(4.4)	11.9	108	43.5(5.4)	12.4
70 이상	164	60.1(5.0)	8.3	78	55.4(6.6)	11.9	86	64.3(5.7)	8.9
19-64	643	18.6(1.8)	9.9	322	19.7(2.7)	13.7	321	17.3(2.2)	12.6
65 이상	266	50.4(4.1)	8.1	131	45.5(4.9)	10.7	135	54.8(5.4)	9.9
교육수준 ³⁾									
무학	33	71.9(7.4)	10.3	5	—(—)	—	28	70.5(7.6)	10.8
초등학교	88	50.2(5.8)	11.5	35	33.5(6.3)	19.0	53	62.5(7.5)	12.0
중학교	101	42.5(5.2)	12.1	38	48.2(8.9)	18.4	63	39.0(5.5)	14.1
고등학교	376	25.9(2.6)	10.1	199	28.5(3.5)	12.3	177	22.8(3.5)	15.2
대학교 이상	311	13.9(2.1)	14.9	176	16.1(3.0)	18.8	135	11.0(3.0)	26.8
직업									
전문행정관리	136	11.9(3.2)	26.9	76	12.8(4.1)	31.9	60	10.6(4.8)	44.9
사무직	81	17.5(4.4)	24.9	50	23.7(6.2)	26.1	31	8.4(4.8)	57.1
판매·서비스직	115	24.0(4.3)	18.0	34	25.4(7.9)	31.2	81	23.3(4.8)	20.4
농림어업	45	45.6(10.2)	22.4	25	32.1(10.5)	32.8	20	60.7(14.9)	24.5
기능단순노무직	226	24.9(2.7)	10.9	161	26.3(3.4)	13.0	65	21.1(4.6)	21.7
기타 ⁴⁾	306	34.5(3.5)	10.1	107	32.4(4.9)	15.0	199	35.8(4.0)	11.3
월 가구소득									
100만원 미만	49	54.4(6.1)	11.1	18	—(—)	—	31	59.5(8.8)	14.8
100-200만원 미만	116	40.6(4.8)	11.9	56	38.5(7.0)	18.3	60	42.8(7.1)	16.6
200-300만원 미만	107	42.5(6.7)	15.8	53	34.4(7.0)	20.5	54	50.5(8.6)	17.1
300-400만원 미만	114	27.7(4.1)	14.7	57	36.3(5.4)	15.0	57	18.5(5.5)	29.6
400만원 이상	521	18.3(1.9)	10.5	267	18.8(2.8)	15.0	254	17.8(2.5)	13.9

주 : 1) 고혈압 진단 경험률 : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 고혈압 진단 경험률(30세 이상) : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 72〉 고혈압 현재치료를 (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	263	93.4(2.1)	2.2	125	90.3(3.8)	4.2	138	96.5(1.5)	1.6
30세 이상 ²⁾	260	95.2(1.4)	1.4	122	93.9(2.4)	2.5	138	96.5(1.5)	1.6
연령									
19-29	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	6	-(-)	-	5	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	14	-(-)	-	9	-(-)	-	5	-(-)	-
50-59	52	90.0(4.7)	5.2	24	89.1(7.5)	8.4	28	90.9(5.2)	5.7
60-69	91	97.7(1.5)	1.6	42	97.6(2.4)	2.4	49	97.8(2.1)	2.1
70 이상	97	96.9(1.7)	1.8	42	95.1(3.4)	3.6	55	98.3(1.7)	1.7
19-64	126	90.4(3.6)	4.0	65	87.5(5.8)	6.6	61	94.2(2.9)	3.1
65 이상	137	97.0(1.4)	1.4	60	94.8(3.0)	3.1	77	98.8(1.2)	1.2
교육수준 ³⁾									
무학	24	100.0(0.0)	0.0	4	-(-)	-	20	100.0(0.0)	0.0
초등학교	45	93.2(3.7)	4.0	12	-(-)	-	33	97.1(2.8)	2.9
중학교	44	97.8(2.2)	2.3	19	-(-)	-	25	100.0(0.0)	0.0
고등학교	109	96.1(1.9)	2.0	63	97.6(2.2)	2.3	46	93.8(3.7)	3.9
대학교 이상	41	82.6(7.2)	8.7	27	76.4(9.9)	12.9	14	-(-)	-
직업									
전문행정관리	16	-(-)	-	10	-(-)	-	6	-(-)	-
사무직	14	-(-)	-	11	-(-)	-	3	-(-)	-
판매·서비스직	29	93.8(4.5)	4.7	9	-(-)	-	20	90.5(6.7)	7.4
농림어업	21	95.5(4.1)	4.3	9	-(-)	-	12	-(-)	-
기능단순노무직	61	93.1(4.2)	4.5	44	91.1(5.3)	5.8	17	-(-)	-
기타 ⁴⁾	122	94.5(2.7)	2.9	42	88.9(6.7)	7.5	80	97.6(1.6)	1.6
월 가구소득									
100만원 미만	29	100.0(0.0)	0.0	9	-(-)	-	20	100.0(0.0)	0.0
100-200만원 미만	50	97.8(2.2)	2.3	23	95.4(4.5)	4.7	27	100.0(0.0)	0.0
200-300만원 미만	50	96.2(2.3)	2.4	20	95.1(4.9)	5.2	30	97.0(2.6)	2.7
300-400만원 미만	33	87.7(6.9)	7.8	21	90.1(8.7)	9.6	12	-(-)	-
400만원 이상	101	90.9(4.0)	4.4	52	86.1(6.6)	7.7	49	96.5(2.5)	2.6

주 : 1) 고혈압 현재치료를 : (비약물요법 및 혈압약 복용에서 '예'라고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 고혈압 현재치료를(30세 이상) : (비약물요법 및 혈압약 복용에서 '예'라고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 73〉 고혈압 진단 경험자의 치료율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	263	90.1(2.2)	2.4	125	86.6(3.9)	4.5	138	93.7(2.1)	2.3
30세 이상 ²⁾	260	92.9(1.6)	1.7	122	92.1(2.6)	2.9	138	93.7(2.1)	2.3
연령									
19-29	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	6	-(-)	-	5	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	14	-(-)	-	9	-(-)	-	5	-(-)	-
50-59	52	88.2(4.9)	5.6	24	89.1(7.5)	8.4	28	87.4(6.1)	7.0
60-69	91	95.5(2.4)	2.5	42	97.6(2.4)	2.4	49	93.8(4.3)	4.6
70 이상	97	95.1(2.1)	2.2	42	93.1(3.9)	4.2	55	96.6(2.4)	2.4
19-64	126	85.6(4.1)	4.8	65	82.4(6.3)	7.7	61	89.7(4.1)	4.6
65 이상	137	95.8(1.6)	1.7	60	93.4(3.2)	3.5	77	97.6(1.6)	1.7
교육수준 ³⁾									
무학	24	100.0(0.0)	0.0	4	-(-)	-	20	100.0(0.0)	0.0
초등학교	45	89.3(4.7)	5.3	12	-(-)	-	33	94.2(3.9)	4.1
중학교	44	97.8(2.2)	2.3	19	-(-)	-	25	100.0(0.0)	0.0
고등학교	109	90.6(3.5)	3.8	63	91.2(4.8)	5.3	46	89.8(5.1)	5.6
대학교 이상	41	80.6(7.3)	9.1	27	76.4(9.9)	12.9	14	-(-)	-
직업									
전문행정관리	16	-(-)	-	10	-(-)	-	6	-(-)	-
사무직	14	-(-)	-	11	-(-)	-	3	-(-)	-
판매·서비스직	29	80.2(9.4)	11.8	9	-(-)	-	20	82.1(9.6)	11.7
농림어업	21	95.5(4.1)	4.3	9	-(-)	-	12	-(-)	-
기능단순노무직	61	93.1(4.2)	4.5	44	91.1(5.3)	5.8	17	-(-)	-
기타 ⁴⁾	122	93.2(2.8)	3.0	42	87.2(6.8)	7.8	80	96.5(1.9)	1.9
월 가구소득									
100만원 미만	29	100.0(0.0)	0.0	9	-(-)	-	20	100.0(0.0)	0.0
100-200만원 미만	50	96.2(2.7)	2.8	23	92.2(5.5)	6.0	27	100.0(0.0)	0.0
200-300만원 미만	50	96.2(2.3)	2.4	20	95.1(4.9)	5.2	30	97.0(2.6)	2.7
300-400만원 미만	33	87.7(6.9)	7.8	21	90.1(8.7)	9.6	12	-(-)	-
400만원 이상	101	84.1(4.7)	5.6	52	79.5(7.3)	9.1	49	89.6(4.5)	5.1

주 : 1) 고혈압 진단 경험자의 치료율 : (현재 혈압조절약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 진단 경험자의 치료율(30세 이상) : (현재 혈압조절약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 74〉 고혈압 관리교육 이수율 (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	263	15.6(2.8)	17.7	125	23.7(4.3)	18.3	138	7.3(2.5)	33.7
30세 이상 ²⁾	260	14.0(2.7)	19.5	122	20.9(4.4)	21.2	138	7.3(2.5)	33.7
연령									
19-29	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	6	-(-)	-	5	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	14	-(-)	-	9	-(-)	-	5	-(-)	-
50-59	52	17.9(5.8)	32.4	24	23.8(9.6)	40.2	28	11.9(6.9)	58.2
60-69	91	14.0(4.5)	32.5	42	21.2(7.1)	33.6	49	7.8(4.5)	58.2
70 이상	97	6.9(2.6)	37.9	42	11.4(5.1)	44.6	55	3.3(2.2)	66.7
19-64	126	23.6(4.3)	18.2	65	32.3(6.1)	18.8	61	12.4(4.4)	35.5
65 이상	137	5.5(1.9)	33.6	60	9.6(3.6)	37.2	77	2.3(1.6)	68.2
교육수준 ³⁾									
무학	24	3.6(3.6)	99.8	4	-(-)	-	20	4.4(4.3)	99.2
초등학교	45	6.2(3.5)	55.6	12	-(-)	-	33	6.0(3.9)	64.7
중학교	44	1.9(2.0)	102.9	19	-(-)	-	25	0.0(0.0)	.
고등학교	109	21.4(4.6)	21.4	63	27.9(6.1)	21.7	46	12.0(5.2)	43.5
대학교 이상	41	24.6(7.6)	30.9	27	32.3(9.9)	30.7	14	-(-)	-
직업									
전문행정관리	16	-(-)	-	10	-(-)	-	6	-(-)	-
사무직	14	-(-)	-	11	-(-)	-	3	-(-)	-
판매·서비스직	29	0.0(0.0)	.	9	-(-)	-	20	0.0(0.0)	.
농림어업	21	17.5(9.6)	55.0	9	-(-)	-	12	-(-)	-
기능단순노무직	61	18.3(6.3)	34.4	44	21.4(7.7)	36.1	17	-(-)	-
기타 ⁴⁾	122	11.7(4.6)	39.1	42	19.9(8.6)	43.1	80	7.1(2.9)	41.6
월 가구소득									
100만원 미만	29	8.6(5.9)	68.4	9	-(-)	-	20	5.7(5.5)	97.0
100-200만원 미만	50	11.8(6.2)	52.9	23	6.6(5.0)	75.2	27	16.7(7.8)	46.8
200-300만원 미만	50	9.3(4.5)	48.7	20	12.9(9.0)	69.5	30	6.9(5.0)	72.6
300-400만원 미만	33	25.9(9.0)	34.7	21	38.2(11.5)	30.0	12	-(-)	-
400만원 이상	101	17.9(4.6)	25.8	52	28.5(7.6)	26.7	49	5.3(3.8)	71.6

주 : 1) 고혈압 관리교육 이수율 : (고혈압 관리교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 고혈압 관리교육 이수율(30세 이상) : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 75〉 고혈압 관리교육 장소

(단위 : %)

구분	N	병원		보건소, 보건지소		기타	
		%(표준오차)	상대표준오차	%(표준오차)	상대표준오차	%(표준오차)	상대표준오차
전체 ¹⁾	263	11.5(2.0)	17.1	3.0(1.4)	46.0	3.1(1.5)	49.1
30세 이상 ²⁾	260	9.7(2.0)	20.5	3.1(1.4)	45.9	3.2(1.6)	49.3
성							
남자	125	17.3(3.2)	18.7	3.0(1.9)	62.4	6.2(3.0)	48.1
여자	138	5.5(2.2)	40.7	3.0(1.5)	51.2	0.0(0.0)	.
연령							
19-29	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	52	17.9(5.8)	32.4	0.0(0.0)	.	2.4(2.4)	99.9
60-69	91	9.8(3.3)	33.3	4.2(2.4)	58.6	0.0(0.0)	.
70 이상	97	5.9(2.7)	45.0	2.8(1.4)	48.0	0.0(0.0)	.
19-64	126	16.7(3.1)	18.7	3.8(2.3)	60.9	5.6(2.7)	47.9
65 이상	137	4.8(1.9)	39.3	2.0(1.0)	48.6	0.0(0.0)	.
교육수준 ³⁾							
무학	24	3.6(3.6)	99.8	3.6(3.6)	99.8	0.0(0.0)	.
초등학교	45	4.0(2.7)	67.9	4.3(2.9)	65.8	0.0(0.0)	.
중학교	44	1.9(2.0)	102.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
고등학교	109	12.2(3.5)	28.9	5.1(2.6)	51.0	6.1(2.9)	47.1
대학교 이상	41	24.6(7.6)	30.9	0.0(0.0)	.	2.6(2.7)	101.0
직업							
전문행정관리	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
사무직	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	29	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
농림어업	21	13.1(9.3)	70.8	8.5(5.3)	62.8	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	61	10.6(4.8)	45.3	5.4(4.0)	74.2	6.1(4.4)	71.1
기타 ⁴⁾	122	9.6(3.7)	38.5	2.8(1.7)	59.1	0.0(0.0)	.
월 가구소득							
100만원 미만	29	8.6(5.9)	68.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	50	6.6(3.9)	59.3	6.8(4.0)	59.8	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	50	9.3(4.5)	48.7	1.8(1.9)	101.7	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	33	20.6(8.6)	41.8	5.3(3.7)	70.0	0.0(0.0)	.
400만원 이상	101	12.1(3.6)	29.9	1.9(1.9)	98.7	7.0(3.3)	47.6

주 : 1) 고혈압 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 관리교육 장소(30세 이상) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 76〉 당뇨병 진단 경험률 (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	909	9.5(1.0)	10.5	453	11.3(1.4)	12.4	456	7.6(1.2)	16.2
30세 이상 ²⁾	842	11.0(1.1)	10.3	420	13.2(1.7)	12.6	422	8.6(1.4)	15.7
연령									
19-29	67	0.0(0.0)	.	33	0.0(0.0)	.	34	0.0(0.0)	.
30-39	103	5.9(3.1)	52.6	51	7.8(4.6)	58.5	52	3.6(2.6)	70.3
40-49	134	3.6(1.5)	43.4	68	4.5(2.5)	55.9	66	2.6(1.9)	72.7
50-59	218	8.7(2.2)	24.7	108	12.6(3.5)	27.9	110	4.5(1.9)	42.2
60-69	223	16.1(2.6)	16.0	115	19.2(3.9)	20.4	108	13.0(3.2)	24.5
70 이상	164	22.0(3.1)	13.9	78	23.8(5.2)	21.9	86	20.4(3.7)	18.2
19-64	643	6.9(1.1)	16.2	322	8.5(1.6)	19.0	321	5.2(1.3)	24.4
65 이상	266	18.3(1.9)	10.5	131	21.8(3.2)	14.5	135	15.1(2.6)	16.9
교육수준 ³⁾									
무학	33	16.6(5.1)	30.9	5	-(-)	-	28	19.8(6.3)	31.6
초등학교	88	19.6(3.5)	18.1	35	21.8(6.3)	29.0	53	18.0(4.7)	26.4
중학교	101	14.0(3.6)	25.8	38	8.9(4.1)	45.7	63	17.0(4.9)	28.7
고등학교	376	9.0(1.5)	17.1	199	11.6(2.2)	19.2	177	5.9(1.8)	30.0
대학교 이상	311	6.7(1.4)	21.2	176	10.1(2.2)	21.8	135	2.0(1.1)	56.5
직업									
전문행정관리	136	5.1(2.1)	40.3	76	8.0(3.5)	44.0	60	1.3(1.3)	99.8
사무직	81	10.3(3.8)	36.7	50	15.9(5.9)	37.4	31	2.0(2.0)	100.8
판매·서비스직	115	9.0(2.5)	28.1	34	8.0(3.4)	42.5	81	9.5(3.2)	33.7
농림어업	45	13.6(3.7)	27.2	25	22.4(7.4)	33.1	20	3.9(3.7)	95.3
기능단순노무직	226	10.2(2.0)	19.6	161	11.3(2.6)	23.4	65	7.5(3.0)	40.6
기타 ⁴⁾	306	10.8(1.9)	17.3	107	11.1(3.2)	28.6	199	10.6(2.1)	19.6
월 가구소득									
100만원 미만	49	19.6(4.9)	24.9	18	-(-)	-	31	16.4(7.4)	45.3
100-200만원 미만	116	13.3(3.3)	24.6	56	12.2(4.2)	34.3	60	14.4(4.2)	29.0
200-300만원 미만	107	16.1(4.2)	25.8	53	14.2(4.5)	32.1	54	18.0(5.4)	30.2
300-400만원 미만	114	8.0(2.2)	27.5	57	9.0(3.4)	37.5	57	7.0(3.2)	45.2
400만원 이상	521	7.5(1.2)	15.7	267	10.7(1.8)	16.9	254	3.8(1.1)	28.6

주 : 1) 당뇨병 진단 경험률 : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 당뇨병 진단 경험률(30세 이상) : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 77〉 당뇨병 현재치료를

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	105	95.7(2.3)	2.4	61	96.4(2.7)	2.8	44	94.4(4.1)	4.3
30세 이상 ²⁾	105	95.7(2.3)	2.4	61	96.4(2.7)	2.8	44	94.4(4.1)	4.3
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	3	-(-)	-	2	-(-)	-
40-49	5	-(-)	-	3	-(-)	-	2	-(-)	-
50-59	20	100.0(0.0)	0.0	14	-(-)	-	6	-(-)	-
60-69	37	100.0(0.0)	0.0	22	100.0(0.0)	0.0	15	-(-)	-
70 이상	38	94.9(3.6)	3.8	19	-(-)	-	19	-(-)	-
19-64	52	95.1(3.4)	3.5	31	96.0(4.0)	4.2	21	93.5(6.3)	6.8
65 이상	53	96.3(2.6)	2.7	30	97.0(3.0)	3.1	23	95.4(4.5)	4.7
교육수준 ³⁾									
무학	6	-(-)	-	0	-(-)	-	6	-(-)	-
초등학교	18	-(-)	-	8	-(-)	-	10	-(-)	-
중학교	16	-(-)	-	4	-(-)	-	12	-(-)	-
고등학교	41	100.0(0.0)	0.0	28	100.0(0.0)	0.0	13	-(-)	-
대학교 이상	24	90.0(6.8)	7.5	21	93.9(6.0)	6.4	3	-(-)	-
직업									
전문행정관리	7	-(-)	-	6	-(-)	-	1	-(-)	-
사무직	8	-(-)	-	7	-(-)	-	1	-(-)	-
판매·서비스직	16	-(-)	-	5	-(-)	-	11	-(-)	-
농림어업	7	-(-)	-	6	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	27	100.0(0.0)	0.0	21	100.0(0.0)	0.0	6	-(-)	-
기타 ⁴⁾	40	92.1(4.7)	5.1	16	-(-)	-	24	90.3(6.9)	7.6
월 가구소득									
100만원 미만	10	-(-)	-	5	-(-)	-	5	-(-)	-
100-200만원 미만	17	-(-)	-	8	-(-)	-	9	-(-)	-
200-300만원 미만	19	-(-)	-	8	-(-)	-	11	-(-)	-
300-400만원 미만	12	-(-)	-	7	-(-)	-	5	-(-)	-
400만원 이상	47	97.0(3.0)	3.1	33	96.1(3.9)	4.1	14	-(-)	-

주 : 1) 당뇨병 현재치료를 : (비약물요법 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제) 또는 인슐린 주사에 '예'라고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 현재치료를(30세 이상) : (비약물요법 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제) 또는 인슐린 주사에 '예'라고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 78〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율 (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	105	92.5(2.7)	3.0	61	92.9(3.7)	4.0	44	91.8(4.2)	4.5
30세 이상 ²⁾	105	92.5(2.7)	3.0	61	92.9(3.7)	4.0	44	91.8(4.2)	4.5
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	3	-(-)	-	2	-(-)	-
40-49	5	-(-)	-	3	-(-)	-	2	-(-)	-
50-59	20	89.8(6.7)	7.4	14	-(-)	-	6	-(-)	-
60-69	37	100.0(0.0)	0.0	22	100.0(0.0)	0.0	15	-(-)	-
70 이상	38	94.9(3.6)	3.8	19	-(-)	-	19	-(-)	-
19-64	52	89.5(4.4)	4.9	31	90.1(5.8)	6.4	21	88.3(7.4)	8.4
65 이상	53	96.3(2.6)	2.7	30	97.0(3.0)	3.1	23	95.4(4.5)	4.7
교육수준 ³⁾									
무학	6	-(-)	-	0	-(-)	-	6	-(-)	-
초등학교	18	-(-)	-	8	-(-)	-	10	-(-)	-
중학교	16	-(-)	-	4	-(-)	-	12	-(-)	-
고등학교	41	94.9(3.4)	3.6	28	96.4(3.5)	3.6	13	-(-)	-
대학교 이상	24	85.6(7.6)	8.8	21	88.9(7.5)	8.4	3	-(-)	-
직업									
전문행정관리	7	-(-)	-	6	-(-)	-	1	-(-)	-
사무직	8	-(-)	-	7	-(-)	-	1	-(-)	-
판매·서비스직	16	-(-)	-	5	-(-)	-	11	-(-)	-
농림어업	7	-(-)	-	6	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	27	100.0(0.0)	0.0	21	100.0(0.0)	0.0	6	-(-)	-
기타 ⁴⁾	40	92.1(4.7)	5.1	16	-(-)	-	24	90.3(6.9)	7.6
월 가구소득									
100만원 미만	10	-(-)	-	5	-(-)	-	5	-(-)	-
100-200만원 미만	17	-(-)	-	8	-(-)	-	9	-(-)	-
200-300만원 미만	19	-(-)	-	8	-(-)	-	11	-(-)	-
300-400만원 미만	12	-(-)	-	7	-(-)	-	5	-(-)	-
400만원 이상	47	92.6(4.0)	4.4	33	90.2(5.5)	6.1	14	-(-)	-

주 : 1) 당뇨병 진단 경험자의 치료율 : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 당뇨병 진단 경험자의 치료율(30세 이상) : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 79〉 당뇨병 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	105	26.7(4.7)	17.8	61	28.3(6.1)	21.6	44	24.1(6.6)	27.6
30세 이상 ²⁾	105	26.7(4.7)	17.8	61	28.3(6.1)	21.6	44	24.1(6.6)	27.6
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	3	-(-)	-	2	-(-)	-
40-49	5	-(-)	-	3	-(-)	-	2	-(-)	-
50-59	20	49.1(11.2)	22.9	14	-(-)	-	6	-(-)	-
60-69	37	27.8(7.1)	25.5	22	24.8(9.4)	37.9	15	-(-)	-
70 이상	38	13.2(5.3)	40.5	19	-(-)	-	19	-(-)	-
19-64	52	33.3(6.5)	19.6	31	36.2(7.8)	21.5	21	28.0(10.3)	36.9
65 이상	53	18.1(5.4)	29.7	30	16.7(6.6)	39.4	23	19.8(9.2)	46.5
교육수준 ³⁾									
무학	6	-(-)	-	0	-(-)	-	6	-(-)	-
초등학교	18	-(-)	-	8	-(-)	-	10	-(-)	-
중학교	16	-(-)	-	4	-(-)	-	12	-(-)	-
고등학교	41	34.8(7.2)	20.8	28	33.8(9.4)	27.9	13	-(-)	-
대학교 이상	24	34.8(10.6)	30.5	21	34.4(11.3)	32.8	3	-(-)	-
직업									
전문행정관리	7	-(-)	-	6	-(-)	-	1	-(-)	-
사무직	8	-(-)	-	7	-(-)	-	1	-(-)	-
판매·서비스직	16	-(-)	-	5	-(-)	-	11	-(-)	-
농림어업	7	-(-)	-	6	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	27	24.0(9.3)	38.9	21	25.7(11.2)	43.8	6	-(-)	-
기타 ⁴⁾	40	17.2(5.7)	33.2	16	-(-)	-	24	21.8(9.2)	42.3
월 가구소득									
100만원 미만	10	-(-)	-	5	-(-)	-	5	-(-)	-
100-200만원 미만	17	-(-)	-	8	-(-)	-	9	-(-)	-
200-300만원 미만	19	-(-)	-	8	-(-)	-	11	-(-)	-
300-400만원 미만	12	-(-)	-	7	-(-)	-	5	-(-)	-
400만원 이상	47	34.0(8.1)	23.9	33	37.7(9.3)	24.6	14	-(-)	-

주 : 1) 당뇨병 관리교육 이수율 : (당뇨병 관리교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 관리교육 이수율(30세 이상) : (당뇨병 관리교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 80〉 당뇨병 관리교육 장소 (단위 : %)

구분	N	병원		보건소, 보건지소		기타	
		%(표준오차)	상대표준오차	%(표준오차)	상대표준오차	%(표준오차)	상대표준오차
전체 ¹⁾	105	23.6(5.0)	21.4	2.0(1.5)	72.8	1.1(1.1)	100.5
30세 이상 ²⁾	105	23.6(5.0)	21.4	2.0(1.5)	72.8	1.1(1.1)	100.5
성							
남자	61	25.0(6.4)	25.8	3.3(2.3)	71.1	0.0(0.0)	.
여자	44	21.3(6.6)	30.8	0.0(0.0)	.	2.8(2.8)	99.6
연령							
19-29	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	20	43.4(12.3)	28.3	5.6(5.3)	94.4	0.0(0.0)	.
60-69	37	27.8(7.1)	25.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
70 이상	38	7.0(4.1)	58.4	2.6(2.7)	102.0	3.5(3.3)	95.2
19-64	52	31.2(6.8)	21.9	2.1(2.1)	99.5	0.0(0.0)	.
65 이상	53	13.7(5.1)	37.6	1.9(1.9)	99.4	2.5(2.4)	96.7
교육수준 ³⁾							
무학	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	18	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	41	32.7(7.3)	22.3	2.1(2.0)	97.6	0.0(0.0)	.
대학교 이상	24	30.4(11.1)	36.5	4.4(4.2)	96.2	0.0(0.0)	.
직업							
전문행정관리	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
사무직	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
농림어업	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	27	24.0(9.3)	38.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
기타 ⁴⁾	40	14.3(5.8)	40.4	0.0(0.0)	.	2.9(2.9)	97.8
월 가구소득							
100만원 미만	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
300-400만원 미만	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
400만원 이상	47	31.6(8.3)	26.4	2.5(2.4)	98.6	0.0(0.0)	.

주 : 1) 당뇨병 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 당뇨병 관리교육 장소(30세 이상) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 81〉 당화혈색소 인지율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	105	89.6(3.9)	4.3	61	93.0(3.9)	4.2	44	84.2(5.0)	5.9
30세 이상 ²⁾	105	89.6(3.9)	4.3	61	93.0(3.9)	4.2	44	84.2(5.0)	5.9
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	3	-(-)	-	2	-(-)	-
40-49	5	-(-)	-	3	-(-)	-	2	-(-)	-
50-59	20	100.0(0.0)	0.0	14	-(-)	-	6	-(-)	-
60-69	37	97.3(2.6)	2.7	22	95.4(4.3)	4.6	15	-(-)	-
70 이상	38	73.0(8.3)	11.4	19	-(-)	-	19	-(-)	-
19-64	52	96.4(2.5)	2.6	31	97.5(2.4)	2.5	21	94.4(5.4)	5.7
65 이상	53	80.7(6.4)	8.0	30	86.3(8.1)	9.4	23	73.2(8.7)	11.9
교육수준 ³⁾									
무학	6	-(-)	-	0	-(-)	-	6	-(-)	-
초등학교	18	-(-)	-	8	-(-)	-	10	-(-)	-
중학교	16	-(-)	-	4	-(-)	-	12	-(-)	-
고등학교	41	98.5(1.5)	1.6	28	97.8(2.2)	2.2	13	-(-)	-
대학교 이상	24	92.7(5.1)	5.5	21	96.2(3.8)	3.9	3	-(-)	-
직업									
전문행정관리	7	-(-)	-	6	-(-)	-	1	-(-)	-
사무직	8	-(-)	-	7	-(-)	-	1	-(-)	-
판매·서비스직	16	-(-)	-	5	-(-)	-	11	-(-)	-
농림어업	7	-(-)	-	6	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	27	95.6(4.4)	4.6	21	100.0(0.0)	0.0	6	-(-)	-
기타 ⁴⁾	40	76.7(6.7)	8.7	16	-(-)	-	24	80.8(6.5)	8.0
월 가구소득									
100만원 미만	10	-(-)	-	5	-(-)	-	5	-(-)	-
100-200만원 미만	17	-(-)	-	8	-(-)	-	9	-(-)	-
200-300만원 미만	19	-(-)	-	8	-(-)	-	11	-(-)	-
300-400만원 미만	12	-(-)	-	7	-(-)	-	5	-(-)	-
400만원 이상	47	94.6(3.0)	3.2	33	97.6(2.4)	2.5	14	-(-)	-

주 : 1) 당화혈색소 인지율 : (당화혈색소를 알고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당화혈색소 인지율(30세 이상) : (당화혈색소를 알고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 82〉 연간 당화혈색소 검사 횟수

(단위 : %)

구분	N	4회 이상		3회		2회		1회		측정 안함	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	94	37.7(5.8)	15.4	12.8(4.2)	32.9	34.5(5.0)	14.6	8.8(2.6)	29.8	6.3(2.8)	45.1
30세 이상 ²⁾	94	37.7(5.8)	15.4	12.8(4.2)	32.9	34.5(5.0)	14.6	8.8(2.6)	29.8	6.3(2.8)	45.1
성											
남자	57	39.9(7.1)	17.8	14.8(4.9)	33.0	32.7(6.5)	19.8	10.1(3.7)	36.8	2.6(2.6)	101.1
여자	37	33.8(7.5)	22.1	9.2(5.3)	57.8	37.6(7.7)	20.4	6.6(3.6)	54.5	12.8(6.0)	46.9
연령											
19-29	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
50-59	20	38.9(9.7)	25.0	4.8(4.7)	97.6	48.8(10.3)	21.0	7.5(5.2)	70.2	0.0(0.0)	.
60-69	36	36.5(8.4)	22.9	11.0(6.5)	59.4	35.2(7.4)	21.1	14.9(6.1)	40.9	2.3(2.4)	103.7
70 이상	29	48.8(9.4)	19.3	10.3(5.9)	57.5	29.5(8.9)	30.1	6.6(4.6)	69.2	4.8(4.7)	98.7
19-64	50	34.0(7.5)	22.1	13.2(5.5)	41.5	36.5(7.1)	19.3	7.9(3.2)	40.3	8.3(4.3)	51.9
65 이상	44	43.5(8.2)	18.9	12.0(5.1)	42.7	31.2(7.2)	23.0	10.2(4.8)	47.6	3.1(3.0)	99.5
교육수준 ³⁾											
무학	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	40	30.7(6.4)	20.7	12.6(5.6)	44.0	47.7(7.0)	14.7	6.3(3.4)	54.6	2.7(2.6)	98.5
대학교 이상	22	32.5(11.7)	36.0	14.2(7.9)	55.8	30.3(9.1)	30.2	12.3(7.3)	59.4	10.8(7.3)	67.7
직업											
전문행정관리	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
사무직	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	16	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
농림어업	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	26	29.6(9.8)	32.9	17.3(7.7)	44.5	30.3(7.7)	25.5	19.8(7.5)	38.1	3.1(3.1)	98.8
기타 ⁴⁾	31	47.3(8.7)	18.3	12.0(5.8)	48.7	29.8(7.4)	24.8	2.4(2.4)	99.1	8.4(5.7)	68.0
월 가구소득											
100만원 미만	7	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
300-400만원 미만	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
400만원 이상	44	26.2(8.0)	30.3	16.5(6.1)	36.9	42.1(6.8)	16.1	8.0(3.9)	48.5	7.1(4.3)	60.2

주 : 1) 연간 당화혈색소 검사 횟수 : (응답보기별 응답자 수 / 의사진단을 받은 사람 중 당화혈색소에 대해 알고 있는 사람의 수) × 100
2) 연간 당화혈색소 검사 횟수(30세 이상) : (응답보기별 응답자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람 중 당화혈색소에 대해 알고 있는 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 83〉 연간 당뇨병성 안질환 합병증검사 수진율 및 연간 당뇨병성 신장질환 합병증검사 수진율

(단위 : %)

구분	연간 당뇨병성 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율			연간 당뇨병성 신장질환 합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율		
	N	%(표준오차)	상대표준오차	N	%(표준오차)	상대표준오차
전체 ¹⁾²⁾	105	36.8(4.7)	12.8	104	48.3(5.4)	11.2
30세 이상 ³⁾⁴⁾	105	36.8(4.7)	12.8	104	48.3(5.4)	11.2
성						
남자	61	39.9(6.1)	15.2	60	49.7(7.6)	15.2
여자	44	31.8(5.1)	15.9	44	46.1(6.8)	14.7
연령						
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	5	-(-)	-	5	-(-)	-
40-49	5	-(-)	-	5	-(-)	-
50-59	20	48.8(9.3)	19.0	20	48.4(11.0)	22.7
60-69	37	42.1(6.2)	14.8	37	57.2(6.2)	10.8
70 이상	38	31.6(6.8)	21.4	37	39.3(6.4)	16.4
19-64	52	34.9(5.9)	16.9	52	47.4(7.6)	16.1
65 이상	53	39.2(6.4)	16.2	52	49.5(6.6)	13.2
교육수준 ⁵⁾						
무학	6	-(-)	-	6	-(-)	-
초등학교	18	-(-)	-	18	-(-)	-
중학교	16	-(-)	-	16	-(-)	-
고등학교	41	51.8(8.1)	15.6	41	47.0(7.9)	16.9
대학교 이상	24	29.0(8.6)	29.8	23	50.2(10.4)	20.8
직업						
전문행정관리	7	-(-)	-	7	-(-)	-
사무직	8	-(-)	-	8	-(-)	-
판매·서비스직	16	-(-)	-	16	-(-)	-
농림어업	7	-(-)	-	7	-(-)	-
기능단순노무직	27	49.2(10.0)	20.4	27	58.6(10.4)	17.8
기타 ⁶⁾	40	28.5(6.0)	21.0	39	42.6(6.2)	14.6
월 가구소득						
100만원 미만	10	-(-)	-	10	-(-)	-
100-200만원 미만	17	-(-)	-	17	-(-)	-
200-300만원 미만	19	-(-)	-	19	-(-)	-
300-400만원 미만	12	-(-)	-	11	-(-)	-
400만원 이상	47	43.2(7.5)	17.4	47	56.6(7.3)	12.9

주 : 1) 연간 당뇨병성 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율 : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 연간 당뇨병성 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율 : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 연간 당뇨병성 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율(30세 이상) : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 연간 당뇨병성 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율(30세 이상) : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

5) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

6) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 84〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	N	갑자기 한쪽 팔, 다리에 힘이 빠진다		갑자기 말이 어눌해지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못한다		갑자기 한쪽 눈이나 시아의 반이 보이지 않거나, 물체가 두 개로 보인다		갑자기 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘들다		갑자기 이제까지 경험하지 못한 심한 두통이 생긴다		뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	
		%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대
		(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차
전체	865	89.8(1.2)	1.3	93.5(0.8)	0.9	80.4(1.5)	1.8	90.1(1.1)	1.3	77.1(1.5)	1.9	64.5(1.9)	2.9
성													
남자	427	89.9(1.6)	1.8	93.0(1.0)	1.1	77.0(2.0)	2.6	88.9(1.6)	1.8	73.3(2.4)	3.2	59.4(2.6)	4.4
여자	438	89.7(1.6)	1.8	94.1(1.3)	1.4	84.0(2.0)	2.4	91.3(1.7)	1.9	81.0(2.1)	2.6	69.7(2.8)	4.0
연령													
19-29	57	92.2(3.2)	3.5	98.4(0.2)	0.2	75.5(6.6)	8.7	86.5(4.8)	5.5	74.9(5.1)	6.8	55.0(6.5)	11.8
30-39	96	83.7(4.3)	5.2	86.3(3.8)	4.4	75.6(4.6)	6.0	86.9(3.8)	4.4	70.1(5.6)	8.0	58.0(5.9)	10.1
40-49	129	89.1(2.6)	2.9	96.1(1.6)	1.7	83.9(3.4)	4.0	93.1(2.7)	2.9	79.8(3.9)	4.9	64.8(4.3)	6.7
50-59	210	91.3(2.4)	2.6	95.0(1.8)	1.9	81.0(3.1)	3.8	90.2(2.4)	2.7	76.8(3.4)	4.4	67.4(3.8)	5.7
60-69	220	93.2(2.1)	2.2	95.6(1.6)	1.7	85.7(2.6)	3.1	93.8(1.8)	1.9	82.1(2.7)	3.3	73.2(2.9)	4.0
70 이상	153	86.2(3.3)	3.8	86.8(3.0)	3.4	75.3(3.6)	4.7	86.3(3.0)	3.4	74.0(3.9)	5.3	59.3(4.4)	7.3
19-64	611	89.9(1.4)	1.5	94.3(1.0)	1.0	80.5(1.7)	2.2	89.8(1.4)	1.5	76.8(1.6)	2.1	64.1(2.1)	3.3
65 이상	254	89.4(2.0)	2.3	91.0(2.0)	2.2	80.2(2.3)	2.9	90.9(1.9)	2.1	78.0(2.6)	3.4	65.6(3.0)	4.5
교육수준 ²⁾													
무학	29	82.8(6.1)	7.3	78.8(7.9)	10.1	72.7(10.4)	14.3	82.5(7.5)	9.1	64.4(9.1)	14.1	42.5(7.9)	18.5
초등학교	80	83.1(3.9)	4.7	84.2(5.1)	6.0	75.8(7.1)	9.4	82.7(6.0)	7.3	65.5(7.1)	10.9	56.7(7.0)	12.4
중학교	98	90.3(2.7)	3.0	94.8(2.3)	2.5	76.7(4.5)	5.8	93.8(2.2)	2.4	75.6(4.0)	5.2	60.6(4.6)	7.7
고등학교	360	87.8(2.0)	2.2	92.9(1.6)	1.8	80.2(2.6)	3.2	87.7(2.0)	2.3	76.9(2.1)	2.8	64.1(2.9)	4.5
대학교 이상	298	93.4(1.7)	1.9	96.6(1.0)	1.0	83.2(2.0)	2.4	93.6(1.6)	1.7	80.6(2.3)	2.9	68.8(2.4)	3.5
직업													
전문행정관리	130	95.0(1.9)	2.0	98.6(1.0)	1.0	90.7(2.6)	2.8	94.3(2.0)	2.1	84.6(3.1)	3.7	77.5(3.7)	4.8
사무직	78	85.3(4.4)	5.1	96.6(2.7)	2.7	75.9(5.6)	7.3	92.9(3.2)	3.5	69.4(5.9)	8.6	58.6(5.6)	9.6
판매·서비스직	110	92.2(3.1)	3.4	94.4(2.8)	3.0	85.8(3.6)	4.2	89.2(3.4)	3.8	82.6(3.5)	4.2	72.1(4.3)	6.0
농림어업	42	87.4(6.9)	7.9	92.8(4.7)	5.1	77.6(7.4)	9.6	81.7(7.8)	9.6	72.4(9.8)	13.6	61.8(9.9)	16.0
기능단순노무직	219	86.5(2.5)	2.9	88.6(2.3)	2.6	74.5(2.8)	3.7	88.9(2.5)	2.8	70.4(2.9)	4.1	53.8(3.4)	6.2
기타 ³⁾	286	90.2(1.8)	2.0	93.2(1.6)	1.7	79.2(2.7)	3.4	89.2(2.0)	2.2	78.7(2.4)	3.0	64.9(2.9)	4.5
월 가구소득													
100만원 미만	40	95.3(3.2)	3.4	91.2(3.8)	4.2	80.7(5.4)	6.7	90.4(3.8)	4.2	89.9(3.7)	4.2	76.1(5.9)	7.8
100-200만원 미만	110	86.2(3.6)	4.1	89.4(3.2)	3.5	77.9(4.3)	5.5	90.0(2.9)	3.2	72.0(4.9)	6.9	61.0(5.1)	8.4
200-300만원 미만	105	85.1(3.2)	3.8	90.5(3.4)	3.8	79.7(3.9)	4.9	91.7(3.0)	3.3	76.8(4.9)	6.4	61.0(5.1)	8.3
300-400만원 미만	107	90.5(3.0)	3.3	93.8(2.8)	3.0	80.4(4.1)	5.1	92.1(2.4)	2.7	79.2(4.0)	5.0	66.4(4.7)	7.1
400만원 이상	501	90.7(1.5)	1.7	94.8(1.0)	1.1	81.2(2.1)	2.6	89.3(1.6)	1.8	76.6(2.0)	2.6	64.7(2.7)	4.1

주 : 1) 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 : (증상을 모두 맞힌 응답자의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요
약

제 1 부
조
사
체
계

제 2 부
주
요
통
계
결
과

제 3 부
통
계
표

제 4 부
부
록

I. 통계표

〈표 85〉 심근경색증 조기증상 인지율¹⁾

(단위 : %)

구분	N	갑자기 턱, 목 또는 등쪽에 통증이나 답답함이 있다		갑자기 힘이 없으며, 어지럽고, 울렁거리거나 식은땀이 난다		갑자기 가슴에 통증이나 압박감 또는 짓누르는 느낌이 있다		갑자기 팔 또는 어깨에 통증이나 불편감이 있다		갑자기 숨이 찬다		심근경색증 조기증상 인지율	
		%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대
		(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차
전체	823	70.3(1.9)	2.7	81.1(1.6)	1.9	94.1(0.9)	0.9	60.2(1.7)	2.8	85.9(1.2)	1.4	49.7(1.9)	3.7
성													
남자	405	66.6(2.5)	3.7	78.0(2.2)	2.9	93.4(1.3)	1.4	56.5(2.6)	4.5	82.7(1.8)	2.1	45.0(2.6)	5.7
여자	418	74.1(2.4)	3.3	84.2(2.0)	2.4	94.8(1.3)	1.3	63.9(2.4)	3.7	89.2(1.7)	1.9	54.7(2.9)	5.3
연령													
19-29	51	67.8(6.6)	9.8	82.3(4.9)	5.9	96.2(2.7)	2.8	56.2(5.5)	9.7	85.4(4.3)	5.0	42.9(5.3)	12.2
30-39	86	58.6(5.6)	9.6	73.9(5.5)	7.4	90.1(3.2)	3.5	55.1(5.4)	9.9	86.1(3.7)	4.3	39.4(5.6)	14.2
40-49	123	67.7(4.3)	6.4	78.8(4.2)	5.4	94.2(2.3)	2.5	58.9(5.0)	8.5	86.4(3.6)	4.2	49.7(5.1)	10.3
50-59	202	74.1(3.3)	4.5	85.7(2.9)	3.4	95.5(1.8)	1.9	63.4(3.3)	5.2	87.9(2.4)	2.8	51.5(3.5)	6.7
60-69	211	77.6(3.2)	4.2	83.9(2.6)	3.1	93.9(2.0)	2.1	64.7(3.1)	4.8	89.5(2.2)	2.5	58.2(4.1)	7.0
70 이상	150	68.1(4.8)	7.0	76.8(3.7)	4.8	93.5(2.3)	2.4	57.0(4.5)	7.9	76.5(4.2)	5.5	48.2(4.8)	10.0
19-64	576	69.3(2.3)	3.3	81.1(1.8)	2.2	94.0(1.0)	1.1	60.2(2.1)	3.4	86.9(1.5)	1.7	48.9(2.2)	4.5
65 이상	247	73.5(3.0)	4.1	81.0(2.8)	3.5	94.3(1.5)	1.5	60.0(2.9)	4.9	82.5(2.8)	3.4	52.5(3.2)	6.2
교육수준 ²⁾													
무학	29	66.8(9.1)	13.6	66.7(10.7)	16.1	96.7(3.2)	3.4	39.9(8.4)	21.0	71.0(8.4)	11.8	40.9(8.4)	20.5
초등학교	80	64.1(7.5)	11.7	72.2(6.5)	9.0	89.2(3.4)	3.8	49.6(6.1)	12.3	73.4(7.7)	10.5	44.3(6.3)	14.2
중학교	97	69.6(4.4)	6.3	81.8(4.1)	5.0	94.6(2.3)	2.5	66.7(5.1)	7.7	84.3(4.2)	5.0	54.2(5.2)	9.5
고등학교	337	71.6(3.2)	4.5	82.3(2.5)	3.1	92.6(1.7)	1.9	61.4(2.9)	4.8	86.1(2.1)	2.5	50.6(3.4)	6.6
대학교 이상	280	70.6(3.0)	4.2	82.5(2.5)	3.1	96.2(1.3)	1.4	60.7(3.2)	5.3	89.3(2.0)	2.2	49.4(3.2)	6.4
직업													
전문행정관리	126	75.7(3.7)	5.0	82.2(3.9)	4.8	95.2(2.2)	2.3	65.5(4.4)	6.7	91.3(3.1)	3.4	56.1(4.6)	8.1
사무직	75	69.5(5.3)	7.7	79.8(5.2)	6.6	95.1(3.0)	3.1	59.3(5.5)	9.3	85.4(4.8)	5.6	48.5(5.1)	10.6
판매·서비스직	101	74.9(4.7)	6.2	83.4(3.8)	4.6	91.5(2.9)	3.2	65.8(4.9)	7.5	87.9(3.7)	4.2	58.9(5.2)	8.9
농림어업	43	72.1(7.1)	9.8	78.9(8.5)	10.8	85.8(6.3)	7.4	48.5(8.9)	18.3	82.1(8.2)	10.0	41.7(8.5)	20.3
기능단순노무직	210	61.6(3.3)	5.4	77.7(3.3)	4.2	93.7(1.8)	1.9	52.0(3.1)	6.0	81.8(2.6)	3.2	39.4(3.3)	8.5
기타 ³⁾	268	72.4(2.9)	4.0	82.8(2.5)	3.0	95.5(1.4)	1.4	62.9(3.5)	5.5	85.9(2.4)	2.8	52.0(3.4)	6.5
월 가구소득													
100만원 미만	42	74.6(7.2)	9.7	81.2(6.7)	8.3	93.6(4.0)	4.3	68.6(6.8)	9.9	82.7(5.1)	6.2	57.7(6.2)	10.8
100-200만원 미만	103	69.1(4.7)	6.9	77.5(4.3)	5.6	94.4(2.4)	2.6	57.1(5.0)	8.7	79.8(4.6)	5.8	46.4(5.3)	11.5
200-300만원 미만	101	60.2(4.7)	7.9	83.5(3.9)	4.6	92.3(2.8)	3.1	57.4(4.9)	8.5	85.7(3.7)	4.3	45.4(5.1)	11.3
300-400만원 미만	100	73.1(4.6)	6.3	81.0(3.9)	4.8	95.8(2.2)	2.3	66.1(4.9)	7.4	88.1(3.5)	3.9	51.9(5.1)	9.7
400만원 이상	475	72.1(2.6)	3.6	81.6(2.2)	2.6	94.4(1.2)	1.3	60.0(2.7)	4.5	87.1(1.6)	1.9	50.6(2.6)	5.2

주 : 1) 심근경색증 조기증상 인지율 : (증상을 모두 맞힌 응답자의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 86〉 연간 미충족의료율(병의원)¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	856	6.0(0.8)	13.5	418	5.6(1.2)	20.8	438	6.5(1.2)	17.8
연령									
19-29	57	6.0(3.1)	52.4	27	4.0(4.0)	100.4	30	8.4(4.9)	59.1
30-39	86	3.6(1.8)	50.4	38	2.4(2.4)	99.8	48	4.8(2.7)	57.5
40-49	127	10.5(2.9)	27.2	63	12.9(4.3)	33.5	64	8.0(3.9)	48.9
50-59	209	6.3(1.8)	29.2	104	4.3(2.0)	45.1	105	8.5(2.7)	32.3
60-69	217	5.1(1.3)	24.5	110	6.5(2.3)	35.2	107	3.9(1.8)	46.3
70 이상	160	3.3(1.4)	41.2	76	1.0(1.0)	99.3	84	5.4(2.3)	43.0
19-64	597	7.0(1.0)	15.0	291	6.8(1.5)	22.6	306	7.2(1.4)	19.7
65 이상	259	3.0(1.1)	35.3	127	1.5(1.0)	71.0	132	4.5(1.7)	37.1
교육수준 ²⁾									
무학	32	5.8(3.3)	57.6	5	-(-)	-	27	6.9(3.9)	56.1
초등학교	86	3.8(2.0)	53.1	33	0.0(0.0)	.	53	6.5(3.3)	51.1
중학교	98	3.6(1.8)	48.5	37	4.9(3.3)	67.0	61	2.8(2.0)	71.0
고등학교	354	5.8(1.3)	21.7	186	6.8(1.9)	28.4	168	4.7(1.6)	34.2
대학교 이상	286	7.4(1.5)	20.2	157	5.4(1.8)	33.9	129	9.9(2.5)	25.7
직업									
전문행정관리	126	7.9(2.5)	31.1	68	6.8(3.1)	45.0	58	9.3(4.2)	44.9
사무직	77	9.1(3.7)	40.4	47	6.4(4.6)	72.0	30	12.9(6.6)	51.5
판매·서비스직	105	4.9(2.1)	41.8	30	3.1(3.3)	109.2	75	5.8(2.6)	45.4
농림어업	44	4.7(3.0)	63.6	24	3.9(4.0)	101.9	20	5.6(4.8)	86.0
기능단순노무직	213	4.4(1.3)	29.8	149	5.0(1.7)	33.9	64	2.8(1.9)	70.2
기타 ³⁾	291	6.0(1.5)	25.0	100	6.3(2.6)	41.6	191	5.8(1.9)	32.3
월 가구소득									
100만원 미만	46	13.8(4.7)	33.8	17	-(-)	-	29	14.5(5.9)	40.9
100-200만원 미만	109	6.7(2.1)	31.7	51	7.8(3.1)	40.5	58	5.5(3.3)	58.7
200-300만원 미만	104	2.9(1.7)	58.3	51	5.8(3.3)	56.0	53	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	108	6.0(2.3)	38.2	55	1.6(1.6)	100.9	53	10.8(4.4)	40.6
400만원 이상	488	6.0(1.1)	18.9	243	5.6(1.6)	29.2	245	6.4(1.5)	23.3

주 : 1) 연간 미충족의료율(병의원) : (본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 수 / 병의원 진료가 필요했던 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 87〉 미충족의료 이유(병의원)¹⁾

(단위 : %)

구분	N	시간이 없어서		증세가 가벼워서		경제적인 이유		교통편이 불편해서 가다가 멀어서		병원에서 오래 기다리기 싫어서		병원 등에 예약을 하기가 힘들어서		진료비가 무서워서		기타	
		% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차
전체	856	3.1(0.6)	19.4	2.1(0.5)	26.7	0.2(0.2)	71.3	0.2(0.1)	60.1	0.1(0.1)	100.2	0.1(0.1)	100.2	0.2(0.1)	72.0	0.1(0.1)	100.0
성																	
남자	418	2.5(0.7)	29.8	2.3(0.9)	38.5	0.3(0.3)	99.8	0.1(0.1)	100.2	0.2(0.2)	100.6	0.2(0.2)	100.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
여자	438	3.8(0.9)	25.2	1.8(0.7)	40.1	0.2(0.2)	100.1	0.2(0.1)	73.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.4(0.3)	71.9	0.2(0.2)	99.2
연령																	
19-29	57	2.8(2.0)	72.4	2.2(2.2)	99.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.0(1.0)	99.9	0.0(0.0)	.
30-39	86	3.6(1.8)	50.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
40-49	127	3.9(1.7)	43.6	5.8(2.4)	41.5	0.8(0.8)	101.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
50-59	209	5.0(1.5)	29.9	1.0(0.7)	68.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.4(0.4)	99.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
60-69	217	2.2(1.0)	43.4	2.0(0.8)	41.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.5(0.5)	98.9	0.4(0.4)	100.1	0.0(0.0)	.
70 이상	160	0.0(0.0)	.	0.8(0.8)	99.7	0.7(0.7)	98.1	1.2(0.7)	60.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.6(0.6)	97.9
19-64	597	4.0(0.8)	19.3	2.5(0.7)	27.3	0.2(0.2)	100.5	0.0(0.0)	.	0.1(0.1)	100.5	0.0(0.0)	.	0.2(0.2)	99.8	0.0(0.0)	.
65 이상	259	0.3(0.3)	100.3	0.5(0.5)	100.3	0.4(0.4)	98.0	0.7(0.4)	60.4	0.0(0.0)	.	0.4(0.4)	97.6	0.3(0.3)	99.0	0.4(0.4)	98.9
교육수준 ²⁾																	
무학	32	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.6(3.1)	85.2	2.1(2.1)	96.0	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
초등학교	86	0.9(0.9)	101.4	1.4(1.4)	100.9	0.0(0.0)	.	0.4(0.4)	100.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.1(1.1)	96.9
중학교	98	1.9(1.3)	68.6	0.9(0.9)	102.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	99.0	0.0(0.0)	.
고등학교	354	2.5(0.8)	32.1	2.0(0.8)	41.8	0.3(0.3)	99.6	0.2(0.2)	99.7	0.2(0.2)	99.7	0.2(0.2)	100.1	0.3(0.3)	100.1	0.0(0.0)	.
대학교 이상	286	4.7(1.2)	25.4	2.7(1.1)	40.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
직업																	
전문행정관리	126	5.0(1.9)	37.1	2.9(1.9)	63.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
사무직	77	4.1(2.4)	59.1	5.0(3.0)	59.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	105	4.9(2.1)	41.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
농림어업	44	0.0(0.0)	.	4.7(3.0)	63.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	213	2.9(1.1)	36.8	1.4(0.8)	56.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
기타 ³⁾	291	1.6(0.9)	54.3	1.6(0.9)	57.8	0.8(0.5)	70.5	0.5(0.3)	59.8	0.3(0.3)	98.8	0.3(0.3)	99.6	0.6(0.4)	72.0	0.3(0.3)	99.3
월 가구소득																	
100만원 미만	46	6.6(3.7)	55.8	0.0(0.0)	.	2.6(2.4)	91.4	2.4(1.8)	75.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.2(2.2)	100.1
100-200만원 미만	109	1.6(1.1)	73.6	1.9(1.4)	72.1	0.0(0.0)	.	0.6(0.6)	100.7	0.8(0.8)	99.0	0.0(0.0)	.	1.8(1.3)	73.2	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	104	0.0(0.0)	.	1.5(1.1)	71.6	1.3(1.3)	97.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	108	3.8(2.0)	51.3	1.4(1.0)	70.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.8(0.8)	100.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
400만원 이상	488	3.6(0.9)	24.2	2.4(0.8)	32.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.

주 : 1) 미충족의료 이유(병의원) : (응답보기별 응답자 수 / 병의원 진료에 필요했던 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 88〉 연간 인플루엔자 예방접종률¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	908	49.0(2.2)	4.5	453	46.4(2.6)	5.5	455	51.8(2.7)	5.3
연령									
19-29	66	22.4(5.8)	25.8	33	28.0(7.4)	26.3	33	14.8(5.9)	39.9
30-39	103	34.9(4.7)	13.5	51	38.5(6.3)	16.3	52	30.6(6.3)	20.4
40-49	134	29.0(4.0)	13.9	68	23.8(5.1)	21.3	66	34.6(6.0)	17.3
50-59	218	41.6(4.0)	9.7	108	34.6(4.9)	14.3	110	49.1(5.0)	10.3
60-69	223	72.1(3.1)	4.3	115	71.9(3.9)	5.5	108	72.3(4.5)	6.2
70 이상	164	94.1(1.7)	1.8	78	93.5(2.1)	2.3	86	94.7(2.4)	2.5
19-64	642	36.5(2.5)	7.0	322	34.5(2.9)	8.5	320	38.6(3.1)	8.1
65 이상	266	92.0(1.9)	2.1	131	91.4(2.4)	2.6	135	92.5(3.1)	3.4
교육수준 ²⁾									
무학	33	95.1(2.6)	2.7	5	—(—)	—	28	94.1(3.1)	3.3
초등학교	88	79.0(5.3)	6.8	35	75.2(8.8)	11.7	53	81.7(5.3)	6.5
중학교	101	80.0(3.9)	4.8	38	70.9(7.6)	10.7	63	85.6(4.4)	5.1
고등학교	375	48.2(3.3)	6.9	199	49.6(3.7)	7.5	176	46.5(4.3)	9.2
대학교 이상	311	33.9(2.8)	8.2	176	34.6(3.5)	10.1	135	32.9(3.9)	11.8
직업									
전문행정관리	136	38.7(4.9)	12.7	76	37.8(6.6)	17.4	60	40.0(6.6)	16.4
사무직	81	39.9(6.4)	16.1	50	44.3(7.3)	16.6	31	33.5(9.9)	29.5
판매·서비스직	114	42.2(5.3)	12.5	34	39.5(8.5)	21.5	80	43.5(6.2)	14.2
농림어업	45	77.0(8.4)	10.9	25	82.5(8.9)	10.8	20	71.0(11.4)	16.1
기능단순노무직	226	43.9(3.1)	7.1	161	39.9(3.4)	8.6	65	54.8(7.1)	13.0
기타 ³⁾	306	60.4(3.2)	5.4	107	59.8(4.7)	7.8	199	60.7(3.9)	6.4
월 가구소득									
100만원 미만	49	81.5(6.2)	7.6	18	—(—)	—	31	93.0(6.6)	7.1
100-200만원 미만	116	70.8(5.5)	7.7	56	69.1(6.8)	9.9	60	72.5(6.4)	8.8
200-300만원 미만	107	64.3(4.9)	7.6	53	56.0(6.8)	12.1	54	72.4(6.1)	8.4
300-400만원 미만	114	45.8(5.3)	11.5	57	44.5(6.7)	15.0	57	47.2(7.0)	14.9
400만원 이상	520	41.5(3.2)	7.8	267	41.4(3.6)	8.7	253	41.6(3.7)	9.0

주 : 1) 연간 인플루엔자 예방접종률 : (최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부 조사체계

제 2 부 주요통계결과

제 3 부 통계표

제 4 부 부록

I. 통계표

〈표 89〉 연간 보건기관 이용률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	908	23.8(1.7)	7.3	452	15.8(1.9)	12.1	456	32.5(2.6)	8.0
연령									
19-29	67	20.1(4.1)	20.6	33	14.6(5.5)	37.4	34	27.3(7.5)	27.6
30-39	103	21.1(4.2)	19.9	51	15.0(5.8)	38.3	52	28.5(6.6)	23.2
40-49	134	14.1(3.3)	23.6	68	6.2(3.1)	49.8	66	22.6(5.7)	25.3
50-59	218	18.4(3.2)	17.5	108	10.7(3.5)	32.4	110	26.8(4.7)	17.6
60-69	223	27.7(3.6)	13.0	115	19.4(3.7)	19.0	108	35.8(5.1)	14.2
70 이상	163	46.9(5.0)	10.7	77	36.3(5.8)	16.1	86	56.2(5.8)	10.3
19-64	643	18.6(1.8)	9.4	322	11.5(2.2)	18.7	321	26.6(2.6)	9.8
65 이상	265	41.9(4.0)	9.5	130	32.2(4.5)	13.8	135	50.8(5.0)	9.8
교육수준 ²⁾									
무학	33	56.1(8.9)	15.8	5	—(—)	—	28	66.9(8.7)	13.0
초등학교	88	37.7(5.8)	15.4	35	18.0(4.8)	26.6	53	52.3(7.8)	14.8
중학교	101	38.1(5.5)	14.4	38	25.3(7.0)	27.7	63	45.8(6.4)	14.0
고등학교	376	22.6(2.6)	11.5	199	17.1(2.9)	16.9	177	29.0(3.8)	13.2
대학교 이상	310	16.9(2.2)	12.9	175	13.0(2.8)	21.2	135	22.1(3.8)	17.1
직업									
전문행정관리	136	17.8(3.6)	20.0	76	10.0(3.6)	35.7	60	28.1(6.3)	22.4
사무직	81	16.7(4.3)	25.8	50	16.0(4.8)	29.9	31	17.7(8.1)	45.7
판매·서비스직	115	38.7(4.7)	12.1	34	18.8(5.4)	28.8	81	48.6(5.5)	11.4
농림어업	45	27.4(6.7)	24.5	25	33.3(8.9)	26.7	20	20.8(8.7)	42.0
기능단순노무직	226	19.9(3.3)	16.5	161	13.2(3.2)	24.2	65	38.3(6.5)	17.0
기타 ³⁾	305	25.5(3.2)	12.4	106	19.8(3.7)	18.6	199	29.1(4.2)	14.3
월 가구소득									
100만원 미만	49	53.1(8.0)	15.0	18	—(—)	—	31	66.3(9.7)	14.7
100-200만원 미만	116	35.4(5.3)	15.1	56	21.7(5.3)	24.4	60	49.7(7.9)	15.8
200-300만원 미만	107	33.6(5.0)	14.9	53	30.4(6.1)	20.2	54	36.8(6.9)	18.8
300-400만원 미만	113	24.4(5.2)	21.3	56	19.5(6.3)	32.1	57	29.6(7.0)	23.8
400만원 이상	521	18.1(1.8)	10.1	267	10.9(2.1)	19.0	254	26.1(2.7)	10.5

주 : 1) 연간 보건기관 이용률 : (최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 건강생활지원센터, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 90〉 심폐소생술 인지율¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	97.4(0.5)	0.5	453	98.7(0.4)	0.5	456	96.0(0.8)	0.9
연령									
19-29	67	100.0(0.0)	0.0	33	100.0(0.0)	0.0	34	100.0(0.0)	0.0
30-39	103	99.2(0.8)	0.8	51	100.0(0.0)	0.0	52	98.2(1.8)	1.8
40-49	134	98.4(1.0)	1.0	68	100.0(0.0)	0.0	66	96.6(2.1)	2.2
50-59	218	98.5(0.9)	0.9	108	98.6(1.4)	1.4	110	98.5(1.1)	1.1
60-69	223	98.1(1.0)	1.0	115	98.4(1.1)	1.2	108	97.9(1.7)	1.7
70 이상	164	88.9(2.5)	2.8	78	94.5(2.0)	2.1	86	84.0(3.9)	4.7
19-64	643	99.1(0.4)	0.4	322	99.6(0.4)	0.4	321	98.5(0.7)	0.7
65 이상	266	91.8(1.7)	1.8	131	95.4(1.5)	1.6	135	88.5(2.8)	3.1
교육수준 ²⁾									
무학	33	68.2(6.8)	10.0	5	-(-)	-	28	66.2(7.8)	11.8
초등학교	88	92.0(2.6)	2.8	35	93.7(2.0)	2.2	53	90.8(4.1)	4.5
중학교	101	93.7(2.5)	2.7	38	93.9(3.7)	3.9	63	93.6(3.4)	3.6
고등학교	376	99.6(0.3)	0.3	199	100.0(0.0)	0.0	177	99.2(0.6)	0.6
대학교 이상	311	99.0(0.6)	0.6	176	99.2(0.8)	0.8	135	98.8(0.9)	0.9
직업									
전문행정관리	136	100.0(0.0)	0.0	76	100.0(0.0)	0.0	60	100.0(0.0)	0.0
사무직	81	100.0(0.0)	0.0	50	100.0(0.0)	0.0	31	100.0(0.0)	0.0
판매·서비스직	115	99.2(0.8)	0.8	34	100.0(0.0)	0.0	81	98.8(1.2)	1.2
농림어업	45	90.9(3.1)	3.4	25	94.4(2.8)	3.0	20	87.0(6.0)	6.9
기능단순노무직	226	98.6(0.9)	0.9	161	99.0(1.0)	1.0	65	97.5(2.0)	2.0
기타 ³⁾	306	94.4(1.2)	1.2	107	96.9(1.2)	1.2	199	92.9(1.8)	1.9
월 가구소득									
100만원 미만	49	86.4(4.7)	5.4	18	-(-)	-	31	84.0(5.6)	6.6
100-200만원 미만	116	90.0(2.6)	2.9	56	93.6(2.5)	2.7	60	86.3(4.9)	5.7
200-300만원 미만	107	97.0(1.5)	1.5	53	100.0(0.0)	0.0	54	94.1(3.0)	3.2
300-400만원 미만	114	100.0(0.0)	0.0	57	100.0(0.0)	0.0	57	100.0(0.0)	0.0
400만원 이상	521	99.3(0.4)	0.4	267	100.0(0.0)	0.0	254	98.5(0.8)	0.8

주 : 1) 심폐소생술 인지율 : (심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요
약

제 1
부
조
사
체
계

제 2
부
주
요
통
계
결
과

제 3
부
통
계
표

제 4
부
부
록

I. 통계표

〈표 91〉 심폐소생술 교육 경험률 및 심폐소생술 마네킹, 자동제세동기 실습 경험률

(단위 : %)

구분	N	심폐소생술 교육 경험률 ¹⁾		심폐소생술 마네킹 실습 경험률 ²⁾		심폐소생술 자동제세동기 실습 경험률 ³⁾	
		%(표준오차)	상대표준오차	%(표준오차)	상대표준오차	%(표준오차)	상대표준오차
전체	909	35.6(1.7)	4.7	29.8(1.6)	5.3	22.6(1.4)	6.4
성							
남자	453	43.3(2.6)	5.9	35.0(2.4)	7.0	26.8(2.5)	9.2
여자	456	27.4(2.3)	8.5	24.3(2.3)	9.3	18.2(2.0)	10.8
연령							
19-29	67	49.1(5.8)	11.8	41.2(5.9)	14.3	38.1(5.3)	13.8
30-39	103	58.6(4.7)	8.0	43.8(5.5)	12.5	36.0(4.8)	13.4
40-49	134	41.7(4.5)	10.9	36.7(4.1)	11.3	26.2(3.9)	14.9
50-59	218	36.6(3.0)	8.2	31.3(3.0)	9.5	23.1(2.7)	11.9
60-69	223	25.3(3.2)	12.6	23.8(2.9)	12.4	14.8(2.3)	15.6
70 이상	164	6.0(2.0)	34.0	2.8(1.3)	45.5	0.6(0.6)	96.9
19-64	643	42.3(1.9)	4.4	35.5(1.9)	5.2	27.6(1.7)	6.2
65 이상	266	12.6(2.5)	19.8	10.4(1.9)	18.4	5.5(1.3)	23.6
교육수준 ⁴⁾							
무학	33	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
초등학교	88	12.4(4.8)	39.0	5.8(2.5)	42.5	2.5(1.7)	67.0
중학교	101	14.9(3.8)	25.5	12.1(2.9)	24.3	3.3(2.0)	58.5
고등학교	376	37.7(2.3)	6.1	31.0(2.7)	8.8	24.6(2.2)	9.1
대학교 이상	311	45.0(2.8)	6.3	39.4(2.8)	7.0	30.3(2.6)	8.6
직업							
전문행정관리	136	61.0(3.8)	6.2	56.4(3.9)	6.9	46.9(4.0)	8.4
사무직	81	51.4(6.2)	12.0	43.3(6.2)	14.2	30.5(6.0)	19.5
판매·서비스직	115	36.5(4.5)	12.5	32.3(4.5)	14.1	27.6(4.7)	17.0
농림어업	45	25.8(9.6)	37.3	22.0(7.5)	33.9	7.4(3.9)	53.0
기능단순노무직	226	37.3(3.9)	10.4	28.5(3.6)	12.6	18.3(3.0)	16.7
기타 ⁵⁾	306	17.2(2.3)	13.3	12.9(2.2)	16.9	10.5(2.0)	19.1
월 가구소득							
100만원 미만	49	11.6(4.6)	39.6	6.9(4.6)	67.8	4.4(4.3)	97.6
100-200만원 미만	116	17.4(4.3)	24.6	12.0(2.9)	24.5	8.9(2.8)	32.1
200-300만원 미만	107	27.1(4.9)	18.1	20.5(4.6)	22.3	14.4(4.3)	29.8
300-400만원 미만	114	27.8(3.9)	14.1	25.5(3.8)	14.8	17.8(3.7)	20.8
400만원 이상	521	43.1(2.2)	5.2	36.7(2.1)	5.8	28.2(2.1)	7.5

주 : 1) 심폐소생술 교육 경험률 : (최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 심폐소생술 실습 경험률(마네킹) : (최근 2년 동안 마네킹을 이용한 심폐소생술 실습을 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 심폐소생술 실습 경험률(자동제세동기) : (최근 2년 동안 자동제세동기 AED를 이용한 심폐소생술 실습을 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

4) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

5) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 92〉 심폐소생술 시행능력률¹⁾ (단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	64.7(1.9)	2.9	453	77.7(2.1)	2.7	456	50.7(2.6)	5.1
연령									
19-29	67	86.1(4.5)	5.2	33	90.3(5.1)	5.7	34	80.5(6.4)	7.9
30-39	103	75.9(4.0)	5.3	51	92.8(3.4)	3.7	52	55.4(7.5)	13.5
40-49	134	69.2(3.8)	5.5	68	81.8(5.2)	6.4	66	55.5(5.8)	10.4
50-59	218	67.3(3.5)	5.2	108	79.3(5.1)	6.4	110	54.3(5.1)	9.4
60-69	223	61.9(2.7)	4.4	115	79.0(4.3)	5.5	108	45.1(4.5)	9.9
70 이상	164	26.6(3.8)	14.4	78	35.2(5.8)	16.5	86	18.9(4.2)	22.1
19-64	643	71.8(1.8)	2.5	322	84.6(2.2)	2.6	321	57.4(2.9)	5.1
65 이상	266	40.5(3.2)	7.9	131	51.7(4.7)	9.0	135	30.1(4.0)	13.3
교육수준 ²⁾									
무학	33	3.5(3.0)	85.6	5	-(-)	-	28	0.0(0.0)	.
초등학교	88	26.7(5.1)	19.1	35	41.9(8.1)	19.2	53	15.5(5.5)	35.5
중학교	101	45.2(5.1)	11.3	38	44.4(8.0)	18.0	63	45.8(6.3)	13.8
고등학교	376	68.4(2.5)	3.7	199	82.4(2.8)	3.4	177	52.1(3.5)	6.7
대학교 이상	311	76.8(2.8)	3.7	176	84.2(2.8)	3.4	135	66.9(5.0)	7.5
직업									
전문행정관리	136	88.8(3.2)	3.6	76	93.4(3.3)	3.5	60	82.5(6.1)	7.4
사무직	81	80.2(4.0)	5.0	50	94.3(4.1)	4.4	31	59.7(7.8)	13.0
판매·서비스직	115	59.8(5.3)	8.8	34	77.4(8.3)	10.8	81	51.0(5.7)	11.3
농림어업	45	54.1(7.4)	13.8	25	74.7(8.5)	11.4	20	31.2(11.2)	35.9
기능단순노무직	226	67.4(3.4)	5.0	161	75.2(3.8)	5.1	65	46.0(6.2)	13.4
기타 ³⁾	306	48.7(3.7)	7.7	107	61.8(5.6)	9.0	199	40.5(3.9)	9.7
월 가구소득									
100만원 미만	49	24.7(5.5)	22.1	18	-(-)	-	31	24.4(8.8)	36.0
100-200만원 미만	116	43.9(4.5)	10.2	56	49.2(7.0)	14.3	60	38.2(5.9)	15.3
200-300만원 미만	107	52.7(5.0)	9.5	53	63.4(8.1)	12.7	54	42.4(5.9)	14.0
300-400만원 미만	114	61.6(5.4)	8.8	57	78.1(5.4)	6.9	57	43.9(7.8)	17.7
400만원 이상	521	73.6(2.2)	3.0	267	87.3(2.3)	2.6	254	58.1(3.2)	5.5

주 : 1) 심폐소생술 시행능력률 : (심폐소생술을 “정확하게” 또는 “대략” 시행할 수 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요
약

제 1
부
조
사
체
계

제 2
부
주
요
통
계
결
과

제 3
부
통
계
표

제 4
부
부
록

I. 통계표

〈표 93〉 연간 사고 및 중독 경험률¹⁾

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차	N	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	909	6.1(0.9)	14.8	453	6.5(1.4)	20.9	456	5.6(1.2)	20.8
연령									
19-29	67	6.2(3.0)	48.3	33	5.6(3.9)	70.1	34	7.1(4.7)	67.0
30-39	103	7.0(2.4)	34.3	51	10.3(3.9)	38.2	52	2.9(2.1)	71.4
40-49	134	5.0(1.5)	31.1	68	4.7(1.8)	37.7	66	5.3(2.6)	49.4
50-59	218	4.4(1.3)	29.9	108	6.1(2.4)	39.3	110	2.7(1.4)	52.4
60-69	223	6.0(1.7)	28.0	115	3.4(1.8)	52.5	108	8.6(2.7)	31.7
70 이상	164	9.3(2.7)	28.5	78	11.6(4.2)	36.3	86	7.3(3.1)	42.6
19-64	643	5.9(1.0)	16.6	322	6.2(1.5)	24.7	321	5.5(1.3)	23.5
65 이상	266	6.7(1.7)	25.9	131	7.5(2.6)	34.5	135	6.0(2.2)	36.7
교육수준 ²⁾									
무학	33	2.1(2.0)	96.2	5	-(-)	-	28	2.5(2.4)	95.3
초등학교	88	8.5(3.1)	36.1	35	9.5(4.7)	49.1	53	7.7(4.4)	57.3
중학교	101	7.0(2.7)	38.8	38	7.9(5.8)	72.7	63	6.5(2.8)	43.8
고등학교	376	5.2(1.1)	21.9	199	4.2(1.5)	36.3	177	6.3(2.1)	33.2
대학교 이상	311	6.6(1.6)	24.1	176	8.3(2.3)	28.0	135	4.4(2.0)	45.1
직업									
전문행정관리	136	3.6(1.7)	47.9	76	5.4(2.8)	51.7	60	1.1(1.1)	99.6
사무직	81	1.5(1.4)	97.4	50	0.0(0.0)	.	31	3.6(3.3)	91.9
판매·서비스직	115	3.3(1.9)	57.4	34	3.4(3.2)	94.8	81	3.2(2.2)	68.9
농림어업	45	9.0(4.3)	47.5	25	13.0(6.9)	53.4	20	4.7(4.4)	95.3
기능단순노무직	226	6.6(1.7)	25.0	161	7.7(2.0)	26.1	65	3.6(2.7)	73.8
기타 ³⁾	306	9.1(1.8)	20.1	107	8.7(3.1)	35.9	199	9.4(2.3)	24.5
월 가구소득									
100만원 미만	49	11.0(3.8)	34.8	18	-(-)	-	31	11.9(5.6)	47.7
100-200만원 미만	116	8.5(3.0)	36.0	56	4.6(3.5)	76.8	60	12.5(5.2)	41.6
200-300만원 미만	107	5.8(2.3)	39.3	53	6.7(3.3)	49.4	54	4.9(2.7)	55.8
300-400만원 미만	114	6.3(2.2)	34.8	57	6.2(3.5)	56.6	57	6.5(2.8)	42.8
400만원 이상	521	5.4(1.2)	21.9	267	6.8(1.8)	25.9	254	3.7(1.3)	34.7

주 : 1) 연간 사고 및 중독 경험률 : (연간 사고 및 중독 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 94〉 연간 사고 및 중독 건수율¹⁾ (단위 : 건/인구1,000명)

구분	전체			남자			여자		
	N	건(표준오차)	상대표준오차	N	건(표준오차)	상대표준오차	N	건(표준오차)	상대표준오차
전체	909	67.8(10.1)	14.9	453	75.6(16.4)	21.7	456	59.4(12.6)	21.2
연령									
19-29	67	62.3(30.1)	48.3	33	55.9(39.2)	70.1	34	70.7(47.4)	67.0
30-39	103	93.6(39.6)	42.3	51	146.5(66.7)	45.5	52	29.4(21.0)	71.4
40-49	134	49.9(15.5)	31.1	68	46.7(17.6)	37.7	66	53.3(26.3)	49.4
50-59	218	49.4(15.2)	30.8	108	70.5(28.1)	39.8	110	26.7(14.0)	52.4
60-69	223	60.2(16.8)	28.0	115	33.8(17.7)	52.5	108	86.1(27.3)	31.7
70 이상	164	116.4(34.2)	29.4	78	138.8(52.8)	38.0	86	96.3(44.9)	46.6
19-64	643	64.1(11.2)	17.4	322	72.4(18.8)	26.0	321	54.9(12.9)	23.5
65 이상	266	80.5(21.8)	27.1	131	88.0(31.6)	35.9	135	73.6(29.6)	40.2
교육수준 ²⁾									
무학	33	20.9(20.1)	96.2	5	-(-)	-	28	24.9(23.7)	95.3
초등학교	88	103.9(40.7)	39.1	35	140.8(78.0)	55.4	53	76.7(44.0)	57.3
중학교	101	88.3(35.8)	40.5	38	79.2(57.6)	72.7	63	93.9(49.2)	52.4
고등학교	376	51.6(11.3)	21.9	199	41.6(15.1)	36.3	177	63.2(21.0)	33.2
대학교 이상	311	76.7(19.3)	25.2	176	101.0(30.4)	30.1	135	43.8(19.8)	45.1
직업									
전문행정관리	136	53.6(30.4)	56.8	76	85.3(51.4)	60.2	60	11.3(11.2)	99.6
사무직	81	14.6(14.3)	97.4	50	0.0(0.0)	.	31	36.1(33.2)	91.9
판매·서비스직	115	32.9(18.9)	57.4	34	33.8(32.1)	94.8	81	32.4(22.3)	68.9
농림어업	45	90.2(42.8)	47.5	25	129.5(69.1)	53.4	20	46.7(44.5)	95.3
기능단순노무직	226	66.4(16.6)	25.0	161	77.4(20.2)	26.1	65	36.1(26.7)	73.8
기타 ³⁾	306	104.4(21.2)	20.4	107	107.7(38.9)	36.1	199	102.3(25.9)	25.3
월 가구소득									
100만원 미만	49	109.9(38.2)	34.8	18	-(-)	-	31	118.5(56.5)	47.7
100-200만원 미만	116	84.6(30.5)	36.0	56	46.0(35.3)	76.8	60	125.2(52.1)	41.6
200-300만원 미만	107	98.8(41.0)	41.5	53	117.8(65.1)	55.3	54	80.4(51.2)	63.7
300-400만원 미만	114	63.3(22.0)	34.8	57	61.9(35.0)	56.6	57	64.8(27.7)	42.8
400만원 이상	521	58.4(13.3)	22.8	267	77.0(21.5)	27.9	254	37.3(13.0)	34.7

주 : 1) 연간 사고 및 중독 건수율 : (연간 사고 및 중독 건수 / 조사대상 응답자 수) × 1,000
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

〈표 95〉 사고 및 중독 원인¹⁾

(단위 : %)

I. 통계표

구분	문서사고		추락		낙상		부딪힘		자상 및 관통상		화상		악수		질식		중독		감전		개폐 물품		교양예개 물품		배개 물품		발에 쏘임		기타		
	N	% (표준외하) 오차	상태 표준 (표준외하) 오차	% (표준외하) 오차	상태 표준 (표준외하) 오차	% (표준외하) 오차	상태 표준 (표준외하) 오차	% (표준외하) 오차	상태 표준 (표준외하) 오차	% (표준외하) 오차	상태 표준 (표준외하) 오차	% (표준외하) 오차	상태 표준 (표준외하) 오차	% (표준외하) 오차	상태 표준 (표준외하) 오차	% (표준외하) 오차	상태 표준 (표준외하) 오차	% (표준외하) 오차	상태 표준 (표준외하) 오차	% (표준외하) 오차	상태 표준 (표준외하) 오차	% (표준외하) 오차	상태 표준 (표준외하) 오차	% (표준외하) 오차	상태 표준 (표준외하) 오차	% (표준외하) 오차	상태 표준 (표준외하) 오차	% (표준외하) 오차	상태 표준 (표준외하) 오차	% (표준외하) 오차	
전체	63	27.4(5.6)	20.3	3.4(2.1)	60.9	34.3(5.9)	17.1	16.0(3.6)	22.2	4.6(2.5)	54.1	12.3(4.7)	38.2	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	2.0(1.4)	70.5			
성																															
남자	33	24.1(7.1)	29.6	5.9(3.3)	56.7	25.3(6.2)	24.4	20.1(4.9)	24.2	5.9(4.2)	69.9	17.2(7.6)	44.3	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	1.4(1.4)	98.7			
여자	30	31.9(8.9)	27.8	0.0(0.0)	46.6	(9.8)	20.9	10.5(4.2)	39.6	2.7(0.5)	17.6	5.6(3.7)	66.3	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	2.7(2.7)	102.9			
연령																															
19-29	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
30-39	9	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
40-49	7	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
50-59	11	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
60-69	14	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
70 이상	18	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
19-64	42	35.2(7.4)	20.9	4.6(2.8)	59.7	20.0(5.4)	27.0	18.8(4.5)	24.2	6.3(3.4)	53.6	13.6(6.0)	44.1	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	1.5(1.6)	101.6			
65 이상	21	6.1(1.3)	21.4	0.0(0.0)	73.4	(7.5)	10.2	8.6(6.2)	71.7	0.0(0.0)	8.8	(6.3)	71.5	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	3.1(3.2)	102.3			
교육수준 ²⁾																															
무학	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
초등학교	9	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
중학교	9	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
고등학교	21	22.6(8.6)	37.9	3.8(0.7)	18.5	22.6(7.6)	33.6	15.6(6.2)	39.5	3.7(0.7)	18.5	29.1(12.6)	43.1	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	2.6(2.6)	99.1			
대학교 이상	23	43.0(10.7)	25.0	4.9(4.5)	91.1	22.0(7.4)	33.5	17.9(5.2)	29.1	7.7(5.4)	69.5	4.4(0.9)	20.2	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)			
직업																															
전문행정관리	7	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
사무직	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
판매·서비스직	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
농림어업	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
기능직·노무직	14	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
기타 ³⁾	32	14.3(7.6)	53.1	0.0(0.0)	54.8	(10.1)	18.4	12.0(4.8)	40.1	2.3(0.4)	15.3	14.9(8.7)	58.2	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	1.7(1.7)	99.5			
월 가구소득																															
100만원 미만	6	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
100~200만원 미만	8	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
200~300만원 미만	12	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
300~400만원 미만	8	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		
400만원 이상	29	39.6(9.4)	23.8	6.3(3.6)	57.6	14.6(6.0)	41.4	10.2(4.7)	45.5	8.6(4.5)	52.9	20.8(7.8)	37.7	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)			

주 : 1) 사고 및 중독 원인 : (원인별 사고 및 중독 건수 / 사고 및 중독 건수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 96〉 식품 안정성 확보율¹⁾

(단위 : %)

구분	N	우리 식구가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다		우리 식구가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다		경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다		경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다		식품 안정성 확보율	
		%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차	%(표준오차)	상대 표준오차
전체	519	64.8(2.5)	3.9	30.1(2.2)	7.2	3.3(1.0)	29.4	1.7(0.6)	35.4	95.0(1.2)	1.3
월 가구소득											
100만원 미만	41	20.4(5.9)	29.0	47.0(9.6)	20.5	24.3(7.5)	30.9	8.2(3.6)	43.3	67.4(8.4)	12.4
100~200만원 미만	77	35.0(6.4)	18.3	54.2(6.8)	12.6	8.2(3.5)	42.4	2.6(1.9)	72.3	89.2(3.6)	4.1
200~300만원 미만	67	56.4(6.4)	11.3	38.8(6.0)	15.4	3.1(2.1)	68.8	1.8(1.7)	98.0	95.2(3.6)	3.8
300~400만원 미만	72	65.4(5.4)	8.2	33.2(5.3)	16.0	0.0(0.0)	.	1.4(1.3)	97.5	98.6(1.3)	1.4
400만원 이상	261	81.3(2.3)	2.9	18.1(2.3)	12.7	0.0(0.0)	.	0.7(0.5)	70.8	99.3(0.5)	0.5

주 : 1) 식품 안정성 확보율 : ("우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다" 혹은 "우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다"에 응답한 가구의 수 / 조사대상 가구 수) × 100

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 97〉 치매환자 가족 가구율 및 동거 가구율

(단위 : %)

구분	치매환자 가족 가구율 ¹⁾			치매환자 동거 가구율 ²⁾		
	N	%(표준오차)	상대표준오차	N	%(표준오차)	상대표준오차
전체	519	17.1(1.7)	10.1	88	10.5(3.2)	30.8
월 가구소득						
100만원 미만	41	6.5(3.8)	59.4	3	-(-)	-
100-200만원 미만	77	20.1(4.8)	23.7	14	-(-)	-
200-300만원 미만	67	26.0(4.5)	17.3	17	-(-)	-
300-400만원 미만	72	16.6(4.0)	24.0	12	-(-)	-
400만원 이상	261	15.4(2.1)	13.5	41	2.7(2.7)	100.6

주 : 1) 치매환자 가족 가구율 : (가족 중에 의사로 부터 치매를 진단받은 환자가 있는 응답가구의 수 / 조사대상 가구 수) × 100

2) 치매환자 동거 가구율 : (현재 치매환자와 함께 거주하고 있는 가구의 수 / 조사대상 가구 수) × 100




04

제4부 부록

- I. 개인조사표
- II. 가구조사표
- III. 주요지표정의

2024
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY



I. 개인조사표

CHS

Community Health Survey

다음은 2024년 지역사회건강조사 개인조사표입니다. →



2024년 지역사회건강조사

울산

안녕하십니까?

질병관리청에서는 「지역보건법」 제4조(지역사회 건강실태조사), 동법시행령 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)에 의거하여 지역 건강통계를 생산하여 근거 중심의 보건사업 수행 기반을 마련하고자 매년 「지역사회건강조사」를 실시하오니 적극적인 협조를 부탁드립니다.

지역사회건강조사는 전국 258개 보건소에서 매년 5월부터 7월까지 실시하며, 만 19세 이상 성인을 대상으로 흡연, 음주, 신체활동 등의 건강행태, 의료이용, 삶의 질 등을 조사합니다.

조사 자료는 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며, 통계작성 외의 목적으로는 사용하지 않습니다. 정확한 응답을 위하여 반드시 조사대상자 본인이 성실하게 조사에 응답하여 주시기 바랍니다.

※ 통계법 제32조(통계응답자의 성실응답의무)

통계응답자는 통계의 작성에 관한 사무에 종사하는 자로부터 통계의 작성을 목적으로 질문 또는 자료제출 등의 요구를 받은 때에는 신뢰성 있는 통계가 작성될 수 있도록 조사사항에 대하여 성실하게 응답하여야 한다.

※ 통계법 제33조(비밀의 보호)

- ① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
- ② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.



질병관리청

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

2024년 지역사회건강조사 참여 동의서

『지역사회건강조사』는 지역주민의 건강수준을 파악하여 지역단위 건강통계를 생산하기 위한 목적으로 실시합니다. 수집된 개인정보는 조사의 진실성 검증을 위한 확인 조사 후 개인을 식별할 수 없도록 처리하여 보건정책 수립 및 보건사업 평가, 관련 연구 수행을 위한 통계자료로 이용됩니다. 조사자료는 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며, 통계작성 외의 목적으로는 사용하지 않습니다. 또한 통계법 제32조에 따라 정확한 응답을 위하여 반드시 조사대상 본인이 성실하게 조사에 응답하여 주시기 바랍니다.

■ 개인정보 수집 및 이용 동의

[개인정보의 수집·이용 목적]

- 지역주민의 건강수준에 관한 지역사회건강통계 생산 및 관련 연구 수행
- 조사 진실성 검증을 위한 전화 확인 조사

[수집하려는 개인정보 항목]

- 성명, 생년월일, 전화번호, 키, 몸무게, 설문조사를 통한 질병에 관한 정보(고혈압, 당뇨병 등 의사진단경험률)

수집 항목 중 민감정보인 질병에 관한 정보(고혈압, 당뇨병 등 의사진단경험률)는
지역보건법 시행령 제24조(민감정보 및 고유식별정보의 처리)에 근거하여 수집하고 있습니다.

[개인정보의 보유 및 이용 기간]

- 수집일로부터 4개월
- * 보유기간 이후에는 개인을 식별할 수 없도록 처리한 후 통계산출 용도로만 이용

개인정보 수집에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 거부할 경우 불이익은 없습니다.

▷ 개인정보 수집·이용에 동의합니까?

☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

▷ 조사 질관리를 위한 녹취를 동의합니까?

☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

※ 통계법 제32조(통계응답자의 성실응답의무)

통계응답자는 통계의 작성에 관한 사무에 종사하는 자로부터 통계의 작성을 목적으로 질문 또는 자료제출 등의 요구를 받은 때에는 신뢰성 있는 통계가 작성될 수 있도록 조사사항에 대하여 성실하게 응답하여야 한다.

※ 통계법 제33조(비밀의 보호)

- ① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
- ② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.

위 동의 사항을 확인하였습니다.

2024년 월 일

참여자 성명 :

(인) 또는 서명

수령증

조사를 마친 후 조사원으로부터 답례품을 받았습니다.

2024년 월 일

참여자 성명 :

(인) 또는 서명

조사원 성명:

서명

 승인 번호 제 117075 호	2024년 지역사회건강조사	이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.
--	----------------	--

※ 조사대상자 번호를 정확히 기입하십시오.

시도번호		보건소번호								
표본지점번호					가구번호				가구원번호	

조 사 대 상 자			
성명			주민등록 생년월일 년 월 일
성별	① 남자 ② 여자		

가구명부의 주민등록상 생년월일과 동일한지 확인하십시오.
다른 경우 가구명부를 수정합니다.

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께하는 건강내일

활동제한 및 삶의 질

1. 평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

☐

흡연

※ 다음은 흡연 문항을 묻기 전 사전질문으로, 담배 제품에는 일반담배, 궤련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 머금은 담배(스누스), 물담배, 시가 등 모든 종류를 포함합니다.

1. 지금까지 살아오는 동안 담배 제품을 사용하신 경험이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 8번 문항으로)

☐

※ 다음은 담배사용과 관련된 질문입니다. 일반담배(궤련), 궤련형 전자담배(가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등), 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 기타담배 순으로 질문하오니 차례대로 응답해주시기 바랍니다.

※ 2~2-3-3번은 일반담배(궤련)에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

2. 지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(궤련)의 양은 총 얼마나 됩니까?

- ① 5갑(100개비) 미만
② 5갑(100개비) 이상
③ 피운 적 없다(→ 3번 문항으로)
④ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음)

☐

8. 비해당



2-1. 현재 일반담배(궤련)를 피우니까?

☐

8. 비해당

① 매일 피운다 → 2-1-1. 하루 평균 일반담배(궤련) 흡연량은 몇 개비입니까?

□□□개비 (→ 3번 문항으로)

888. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(궤련)를 피운 적 없음, 문항2-1/②, ③: 현재 담배를 가끔 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

888. 비해당

② 가끔 피운다 → 2-2-1. 최근 1달 동안 일반담배(궤련) 흡연일수는 며칠입니까?

□□일

88. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(궤련)를 피운 적 없음, 문항2-1/①, ③: 현재 담배를 매일 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

88. 비해당

→ 2-2-2. 일반담배(궤련)를 흡연한 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까?

□□□개비 (→ 3번 문항으로)

888. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(궤련)를 피운 적 없음, 문항2-1/①, ③: 현재 담배를 매일 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

888. 비해당

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다

→ 2-3-1. 과거에 일반담배(궤련)를 흡연한 기간은 얼마나 됩니까?

□□년 □□개월

88 88. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(궤련)를 피운 적 없음, 문항2-1/①, ②: 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움)

88 88. 비해당

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

→ 2-3-2. 과거 일반담배(궤련)를 피울 때 하루 평균 흡연량은 얼마나 됩니까?

□□□개비

888. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(궤련)를 피운 적 없음, 문항2-1/①, ②: 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움)

→ 2-3-3. 일반담배(궤련)를 끊은 지 얼마나 됩니까?

- ① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만
④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상

⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(궤련)를 피운 적 없음, 문항2-1/①, ②: 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움)

⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(궤련)를 피운 적 없음)

※ 3~3-2-2번은 궤련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

3. 지금까지 궤련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 피운 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 4번 문항으로)
⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음)



3-1. 현재 궤련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 피우니까?

① 매일 피운다 → 3-1-1. 하루 평균 궤련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등) 흡연량은 몇 개비입니까?

□□□개비 (→ 4번 문항으로)

888. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항3/②: 평생 궤련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 피우지 않음, 문항3-1/①, ③: 현재 궤련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 가끔 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

② 가끔 피운다 → 3-2-1. 최근 1달 동안 궤련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등) 흡연 일수는 며칠입니까?

□□일

88. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항3/②: 평생 궤련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 피우지 않음, 문항3-1/①, ③: 현재 궤련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 매일 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

→ 3-2-2. 흡연한 날 하루 평균 궤련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등) 흡연량은 몇 개비입니까?

□□□개비

888. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항3/②: 평생 궤련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 피우지 않음, 문항3-1/①, ③: 현재 궤련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 매일 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다

⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항3/②: 평생 궤련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 피우지 않음)

□□□개비
888. 비해당

□
8. 비해당

□
8. 비해당

□
8. 비해당

□□□개비
888. 비해당

□□일
88. 비해당

□□□개비
888. 비해당

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께하는 건강내일

※ 4~4-1번은 니코틴이 포함된 액상형 전자담배에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

4. 지금까지 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 5번 문항으로)
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음)

☐

8. 비해당



4-1. 최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 날은 며칠입니까?

한 달에 □□일

 일

88. 비해당

88. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항4/②: 평생 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적 없음)

※ 5번은 기타 담배에 대한 질문입니다. 질문에 응답해 주십시오.

5. 지금까지 일반담배, 결련형, 액상형 전자담배를 제외한 다른 담배제품(머금은 담배(스누스), 물담배, 시가 등 모든 종류)를 사용한 적이 있습니까?

- ① 최근 1달 이내로 사용한 적 있다
 ② 과거에는 사용하였으나 현재는 사용하지 않는다
 ③ 사용한 적 없다
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음)

☐

8. 비해당

※ 6~7번은 금연시도 및 금연계획에 대한 질문입니다. 파워본 담배종류와 상관없이 질문에 응답해 주십시오.

6. 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2-1/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/②: 모든 담배제품 과거에는 사용하였으나 현재는 사용하지 않음, 2-1/③ and 3/② and 4/② and 5/③, 2/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/③, 2/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/③, 2/③ and 3/② and 4/② and 5/②, 2-1/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/③, 2-1/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/③, 2-1/③ and 3/② and 4/② and 5/②, 2/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/③, 2/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/②, 2/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/②, 2-1/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/②, 2/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/②, 2-1/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/③, 2-1/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/②: 4가지 담배 제품 중 과거에 사용을 했거나, 평생 사용 경험이 없는 경우의 조합)

☐

8. 비해당

7. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까?

- ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
 ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
 ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
 ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2-1/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/②: 모든 담배제품 과거에는 사용하였으나 현재는 사용하지 않음, 2-1/③ and 3/② and 4/② and 5/③, 2/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/③, 2/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/③, 2/③ and 3/② and 4/② and 5/②, 2-1/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/③, 2-1/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/③, 2/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/②, 2/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/②, 2-1/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/②, 2/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/②, 2-1/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/③, 2-1/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/②: 4가지 담배 제품 중 과거에 사용을 했거나, 평생 사용 경험이 없는 경우의 조합)

☐

8. 비해당

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

※ 8~9번은 간접흡연에 대한 질문입니다. 담배종류와 상관없이 질문에 응답해 주십시오.

8. 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 9번 문항으로)

☐


8-1. 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

③ 비해당(문항8/②: 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 사람 없음)

☐

8. 비해당

9. 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예
② 아니오
③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)

☐

요약

제 1 부
조사 체계

제 2 부
주요 통계 결과

제 3 부
통계 표

제 4 부
부록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

음주

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다.

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 3번 문항으로)

☐

2. 다음은 최근 1년 동안의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다.



2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까?

- ① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 (→ 3번 문항으로)
 ② 한 달에 1번 미만
 ③ 한 달에 1번 정도
 ④ 한 달에 2~4번 정도
 ⑤ 일주일에 2~3번 정도
 ⑥ 일주일에 4번 이상
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적 없음)

☐

8. 비해당

2-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?

(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.5잔과 같습니다)

- ① 1~2잔 (→ 남성은 2~3번 문항으로,
 ② 3~4잔 여성은 2~4번 문항으로)
 ③ 5~6잔
 ④ 7~9잔
 ⑤ 10잔 이상 (→ 2-2-1번 문항으로)
 ⑧ 비해당(문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

☐

8. 비해당



2-2-1. ('⑤ 10잔 이상' 응답자만 응답해 주십시오) 한 번에 술을 얼마나 마십니까?
 숫자로 기입해 주십시오.

※ 소주 1병은 7잔과 같습니다. 잔

88. 비해당(문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음,
 문항2-2/①, ②, ③, ④: 한 번에 술을 1~9잔까지 마심)

 잔

8. 비해당

2-3. (남성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는
 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다
 ② 한 달에 1번 미만
 ③ 한 달에 1번 정도
 ④ 일주일에 1번 정도
 ⑤ 거의 매일
 ⑧ 비해당(여성, 문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

☐

8. 비해당

2-4. (여성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마시는
 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다
 ② 한 달에 1번 미만
 ③ 한 달에 1번 정도
 ④ 일주일에 1번 정도
 ⑤ 거의 매일
 ⑧ 비해당(남성, 문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

☐

8. 비해당

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

2-5. 앞으로 절주 또는 금주할 계획이 있습니까?

- ① 현재로서는 전혀 절주 또는 금주할 생각이 없다
- ② 향후 6개월 이내에 절주 또는 금주할 계획이 있다
- ③ 향후 1개월 이내에 절주 또는 금주할 계획이 있다
- ④ 현재 절주 또는 금주를 실천하고 있으며, 그 기간이 6개월 미만이다
- ⑤ 현재 절주 또는 금주를 실천하고 있으며, 그 기간이 6개월 이상이다
- ⑧ 비해당(문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

☐

8. 비해당

3. 최근 1년 동안 음주폐해 예방 또는 절주에 대한 홍보(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

☐

4. 최근 1년 동안 음주폐해 예방 또는 절주에 대한 교육을 받은 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

☐

5. 현재 살고 있는 시군구에 금주구역(금주공원, 학교 등)이 지정되어 있다는 것을 알고 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

☐

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

안전의식

【자동차 운전】

1. 자동차 운전할 때 안전벨트를 맵니까?

- ① 운전을 하지 않는다 (→ 2번 문항으로)
 ② 전혀 매지 않는다
 ③ 거의 매지 않는 편이다
 ④ 가끔 매는 편이다
 ⑤ 대체로 매는 편이다
 ⑥ 항상 맨다

☐


1-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항1/①: 자동차 운전을 하지 않음,
 「음주」 문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

☐

8. 비해당

2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 뒷좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까?

- ① 다른 사람이 운전하는 자동차의 뒷좌석에 앉은 적이 없다
 ② 전혀 매지 않는다
 ③ 거의 매지 않는 편이다
 ④ 가끔 매는 편이다
 ⑤ 대체로 매는 편이다
 ⑥ 항상 맨다

☐

3. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 탄 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

【오토바이 운전】

1. 오토바이를 운전할 때 헬멧을 착용합니까?

- ① 운전을 하지 않는다 (→ 「안전의식-자전거 운전」 1번 문항으로)
 ② 전혀 착용하지 않는다
 ③ 거의 착용하지 않는 편이다
 ④ 가끔 착용하는 편이다
 ⑤ 대체로 착용하는 편이다
 ⑥ 항상 착용한다

☐


1-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항1/①: 오토바이 운전을 하지 않음,
 「음주」 문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

☐

8. 비해당

【자전거 운전】

1. 자전거를 탈 때 헬멧을 착용합니까?

- ① 자전거를 타지 않는다 (→ 「신체활동」 1번 문항으로)
 ② 전혀 착용하지 않는다
 ③ 거의 착용하지 않는 편이다
 ④ 가끔 착용하는 편이다
 ⑤ 대체로 착용하는 편이다
 ⑥ 항상 착용한다

☐

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

신체활동

※ 고강도(격렬한) 신체활동

달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

1. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들고 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?

일주일에 □일 (→ 0일은 2번 문항으로)



- 1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 □□시간 □□분

88 88. 비해당(문항1/0일: 고강도 신체활동 없음)

□ 일

□□ 시간 □□ 분
88 88. 비해당

※ 중강도(중등도) 신체활동

천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

2. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들고 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다.)

일주일에 □일 (→ 0일은 3번 문항으로)



- 2-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 □□시간 □□분

88 88. 비해당(문항2/0일: 중강도 신체활동 없음)

□ 일

□□ 시간 □□ 분
88 88. 비해당

※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.

3. 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까?

일주일에 □일 (→ 0일은 4번 문항으로)



- 3-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까?

하루에 □□시간 □□분

88 88. 비해당(문항3/0일: 걷기운동 없음)

□ 일

□□ 시간 □□ 분
88 88. 비해당

※ 근력운동 실천에 대한 질문입니다.

4. 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력 운동을 한 날은 며칠입니까?

- ① 전혀 하지 않음
② 1일
③ 2일
④ 3일
⑤ 4일
⑥ 5일 이상

□

요약

제 1 부 조사체계

제 2 부 주요통계결과

제 3 부 통계표

제 4 부 부록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

식생활

1. 최근 1년 동안 아침식사를 일주일에 몇 회 하셨습니까?

- ① 주 5~7회
- ② 주 3~4회
- ③ 주 1~2회
- ④ 주 0회(거의 안한다)

☐

2. 가공식품에 '영양표시'를 알고 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오 (→ 「비만 및 체중조절」 1번 문항으로)

☐


2-1. 가공식품을 사거나 고를 때, '영양표시'를 읽습니까?

- ① 예
- ② 아니오 (→ 「비만 및 체중조절」 1번 문항으로)
- ⑧ 비해당(문항2/②: 영양표시를 모름)

☐

8. 비해당



2-1-1. 영양표시 내용이 가공식품을 고르는데 영향을 미칩니까?

- ① 예
- ② 아니오
- ⑧ 비해당(문항2/②: 영양표시를 모름, 문항2-1/②: 영양표시를 읽지 않음)

☐

8. 비해당

비만 및 체중조절

1. 현재 본인의 키와 몸무게는 얼마입니까?

1-1. 키(신장)	□□□.□cm
1-2. 몸무게(체중)	□□□.□kg

			.		cm
			.		kg

2. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까?

- ① 매우 마른 편임
- ② 약간 마른 편임
- ③ 보통임
- ④ 약간 비만임
- ⑤ 매우 비만임

--	--

3. 최근 1년 동안 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다 ☐ (→ 3-1번 문항으로)
- ② 몸무게를 유지하려고 노력했다
- ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다 ☐ (→ 「이환 I-건강지식」 1번 문항으로)
- ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해 본 적 없다

--	--

3-1. 최근 1년 동안 몸무게를 줄이거나 유지하기 위해 사용한 방법은 무엇인지 모두 응답해 주십시오.

3-1-1. 운동	① 예 ② 아니오
3-1-2. 단식(24시간 이상)	① 예 ② 아니오
3-1-3. 식사량감소 또는 식단조절	① 예 ② 아니오
3-1-4. 결식(식사를 거름)	① 예 ② 아니오
3-1-5. 의사 처방 없이 임의로 살 빼는 약 복용	① 예 ② 아니오
3-1-6. 의사 처방을 받아서 살 빼는 약 복용	① 예 ② 아니오
3-1-7. 한약 복용	① 예 ② 아니오
3-1-8. 건강기능식품	① 예 ② 아니오
3-1-9. 원푸드 다이어트(포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만을 먹는 다이어트 방법)	① 예 ② 아니오
3-1-10. 기타()	① 예 ② 아니오

☐	8. 비해당
☐	8. 비해당
☐	8. 비해당
☐	8. 비해당
☐	8. 비해당
☐	8. 비해당
☐	8. 비해당
☐	8. 비해당
☐	8. 비해당
☐	8. 비해당
기 타	
8. 비해당	

8 8 8 8 8 8 8 8 8. 비해당(문항3/③, ④: 몸무게를 늘리려고 노력했거나 조절하기 위해
노력해 본 적 없음)

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

이환 I - 건강지식

【뇌졸중(중풍)】

1. 다음의 질문들은 뇌졸중(중풍) 초기증상을 정확히 알고 있는지 귀하의 지식을 묻는 문항으로, 뇌졸중(중풍) 증상이 맞다고 생각하면 “예”, 아니라고 생각하면 “아니오”를 응답해 주십시오.

1-1. 갑자기 한쪽 얼굴, 팔, 다리에 힘이 빠진다	① 예 ② 아니오	☐
1-2. 갑자기 말이 어눌해지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못한다	① 예 ② 아니오	☐
1-3. 갑자기 한쪽 눈이나 시야의 반이 보이지 않거나, 물체가 두 개로 보인다	① 예 ② 아니오	☐
1-4. 갑자기 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘들다	① 예 ② 아니오	☐
1-5. 갑자기 이제까지 경험하지 못한 심한 두통이 생긴다	① 예 ② 아니오	☐

【심근경색증】

1. 다음의 질문들은 심근경색증(심장발작) 초기증상을 정확히 알고 있는지 귀하의 지식을 묻는 문항으로, 심근경색증(심장발작) 증상이 맞다고 생각하면 “예”, 아니라고 생각하면 “아니오”를 응답해 주십시오.

1-1. 갑자기 턱, 목 또는 등쪽에 통증이나 답답함이 있다	① 예 ② 아니오	☐
1-2. 갑자기 힘이 없으며, 어지럽고, 울렁거리거나 식은땀이 난다	① 예 ② 아니오	☐
1-3. 갑자기 가슴에 통증이나 압박감 또는 짓누르는 느낌이 있다	① 예 ② 아니오	☐
1-4. 갑자기 팔 또는 어깨에 통증이나 불편감이 있다	① 예 ② 아니오	☐
1-5. 갑자기 숨이 찬다	① 예 ② 아니오	☐

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

구강건강

1. 스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각하십니까?

- ① 매우 좋음
② 좋음
③ 보통
④ 나쁨
⑤ 매우 나쁨

☐2. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느끼십니까?
(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.)

- ① 매우 불편하다
② 불편하다
③ 그저 그렇다
④ 별로 불편하지 않다
⑤ 전혀 불편하지 않다

☐3. 어제 하루 동안 다음 시기에 칫솔질을 했는지에 대한 질문입니다.
(※ 식사하지(또는 잠자지) 않은 경우, 칫솔질 여부와 상관없이 '③'으로 응답해 주십시오.)

3-1. 점심식사 후에 칫솔질을 했습니까?

- ① 예 (→ 3-2번 문항으로)
② 아니오
③ 어제 점심식사 하지 않음 (→ 3-2번 문항으로)

☐

3-1-1. 어제 점심식사 후에 칫솔질을 하지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 시간이 없어서
② 칫솔질 할 장소가 없어서
③ 주변에 칫솔질을 하는 사람이 없어서
④ 필요성을 느끼지 못해서
⑤ 기타()
⑥ 비해당(문항3-1/①, ③: 어제 점심식사 후에 칫솔질을 함, 어제 점심식사 하지 않음)

☐기
타

8. 비해당

3-2. 저녁식사 후 또는 잠자기 전에 칫솔질을 했습니까?

- ① 예
② 아니오
③ 어제 저녁식사 또는 잠자지 않음

☐요
약제 1
부
조
사
체
계제 2
부
주
요
통
계
결
과제 3
부
통
계
표제 4
부
부
록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

4. 최근 1년 동안 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 5번 문항으로)
 ③ 치과진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다 (→ 5번 문항으로)

☐


4-1. 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)
 ② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서)
 ③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)
 ④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
 ⑤ 병원에서 오래 기다리기 싫어서
 ⑥ 병원 등 예약을 하기가 힘들어서
 ⑦ 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서
 ⑧ 기타()

☐

기
타

88. 비해당

88. 비해당(문항4/②, ③: 치과진료를 받지 못한 적 없음, 치과진료가 필요한 적 없음)

5. 최근 1년 동안 스케일링(치석제거)을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

정신건강

1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까?

1-1. 주중(또는 일하는 날)	□□시간
1-2. 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날)	□□시간

		시간
		시간

2. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

1

- ① 대단히 많이 느낀다
② 많이 느끼는 편이다
③ 조금 느끼는 편이다
④ 거의 느끼지 않는다
- 2-1번 문항으로
→ 3번 문항으로

2-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

1

- ⑧ 비해당(문항2/③, ④: 평소 스트레스를 조금 느끼거나 거의 느끼지 않음)

3. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?

1

- ① 예 ② 아니오 (→ 4번 문항으로)

3-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

1

- ① 예 ② 아니오
- ⑧ 비혜당(문항3/②): 2주 이상 슬프거나 절망감을 느낀 적 없음)

4. 최근 2주 동안 아래 나열되는 증상들에 얼마나 자주 시달렸습니까?

4-1. 일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음	① 전혀 아니다	② 어려날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-2. 가라앉은 느낌, 우울감 혹은 절망감	① 전혀 아니다	② 어려날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-3. 잠들기 어렵거나 자주 깨어남, 혹은 너무 많이 잠	① 전혀 아니다	② 어려날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-4. 피곤함, 기력이 저하됨	① 전혀 아니다	② 어려날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-5. 식욕 저하 혹은 과식	① 전혀 아니다	② 어려날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-6. 내 자신이 나쁜 사람이라는 느낌 혹은 내 자신을 실책자라고 느끼거나, 나 때문에 나 자신이란 내 가족이 불행하게 되었다는 느낌	① 전혀 아니다	② 어려날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-7. 신문물을 읽거나 TV를 볼 때 집중하기 어려움	① 전혀 아니다	② 어려날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-8. 남들이 알아챌 정도로 거동이나 말이 느림 또는 반대로 너무 초조하고 안절부절 하지 못해서 평소 보다 많이 돌아다니고 서성거림	① 전혀 아니다	② 어려날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일
4-9. 나는 차라리 죽는 것이 낫겠다는 등의 생각 혹은 어떤 면에서건 당신 스스로에게 상처를 주는 생각들	① 전혀 아니다	② 어려날 동안	③ 일주일 이상	④ 거의 매일

[illegible]

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께하는 건강내일

5. **최근 1년 동안** 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오(→ 「수면의 질」 1번 문항으로)

☐


5-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항5/②: 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 없음)

☐

8. 비해당

【수면의 질】

※ 다음은 지난 1달(4주) 동안 귀하의 일상적인 수면 습관에 관한 질문입니다. 지난 1달 동안 대부분의 일상에서 가장 적합한 답변에 응답해 주시기 바랍니다.

1. **지난 1달 동안** 귀하는 평소 몇 시에 잠자리에 들었습니까?

□□시 □□분에 잠자리에 든다

시 분

2. **지난 1달 동안** 귀하는 밤에 잠자리에 들어가서 잠이 들기까지 보통 얼마나 오래 걸렸습니까?

□□시간 □□분이 걸린다

시 분

3. **지난 1달 동안** 귀하는 평소 몇 시에 일어났습니까?

□□시 □□분에 일어난다

시 분

4. **지난 1달 동안** 귀하는 밤에 실제로 잠잔 시간은 얼마나 됩니까?(이것은 귀하가 잠자리에서 보낸 시간과 다를 수 있습니다)

하루 밤에 □□시간 □□분

시 분

※ 다음 각 문항에서 가장 적합한 응답을 하나만 고르십시오.

5. **지난 1달 동안** 귀하는 아래의 이유로 잠자는데 얼마나 자주 문제가 있었습니까?

5-1. 취침 후 30분 이내에 잠들 수 없었다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다)	② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-2. 한밤중이나 새벽에 깼다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다)	② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-3. 화장실에 가려고 일어나야 했다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다)	② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-4. 편안하게 숨 쉴 수가 없었다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다)	② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-5. 기침을 하거나 시끄럽게 코를 골았다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다)	② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-6. 너무 춥다고 느꼈다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다)	② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)

☐
☐
☐
☐
☐
☐

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

5-7. 너무 덥다고 느꼈다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다)	② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-8. 나쁜 꿈을 꾸었다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다)	② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-9. 통증이 있었다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다)	② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
5-10. 그 외에 다른 이유가 있다면, 기입해 주세요 (이유:) 지난 1달 동안 귀하는 위에 기입한 이유들 때문에 잠자는 데 얼마나 자주 어려움이 있었습니까?	① 지난 한달 동안 없었다 (없다)	② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)

6. 지난 1달 동안 귀하는 전반적으로 수면의 질이 어느 정도라고 평가 하십니까?

- ① 매우 좋음 ② 상당히 좋음 ③ 상당히 나쁨 ④ 매우 나쁨

7. 지난 1달 동안 귀하는 잠이 들기 위해 얼마나 자주 약을 복용했습니까?

(※ 처방약 또는 약국에서 구입한 약)

- ① 지난 한달 동안 없었다
② 한 주에 1번보다 적게
③ 한 주에 1~2번 정도
④ 한 주에 3번 이상

8. 지난 1달 동안 귀하는 운전하거나, 식사 때 혹은 사회활동을 하는 동안 얼마나 자주 졸음을 느꼈습니까?

- ① 지난 한달 동안 없었다
② 한 주에 1번보다 적게
③ 한 주에 1~2번 정도
④ 한 주에 3번 이상

9. 지난 1달 동안 귀하는 일에 열중하는데 얼마나 많은 문제가 있었습니까?

- ① 전혀 없었다
② 매우 조금 있었다
③ 다소 있었다
④ 매우 많이 있었다

【치매 및 인지장애】

※ 다음은 귀하의 인지 기능에 대한 질문입니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용에 응답해주시기 바랍니다.

1. (만 40세 이상 응답해 주십시오) 최근 1년 동안 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 만 50세 이상 2번 문항으로,
만 50세 미만 「예방접종 및 검진」 1번 문항으로)
③ 비해당(나이: 만 40세 미만)

8. 비해당

요약

제 1 부 조사체계

제 2 부 주요통계결과

제 3 부 통계표

제 4 부 부록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께하는 건강내일



1-1. 최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 평소 해오던 집안일을 하지 못한 적이 얼마나 자주 있었습니까?

(※ 예: 요리, 청소, 약 복용, 운전, 공과금 납부 등)

- ① 항상 못했다
- ② 대체로 못했다
- ③ 가끔 못했다
- ④ 거의 못한 적 없다
- ⑤ 전혀 못한 적 없다

⑧ 비해당(나이: 만 40세 미만, 문항1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적 없음)

☐

8. 비해당

1-2. 최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 직장생활이나 자원봉사, 사회활동을 하는데 얼마나 자주 지장이 있었습니까?

- ① 항상 있었다
- ② 대체로 있었다
- ③ 가끔 있었다
- ④ 거의 없었다
- ⑤ 전혀 없었다

⑧ 비해당(나이: 만 40세 미만, 문항1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적 없음)

☐

8. 비해당

1-3. 귀하의 정신 혼란이나 기억력 감소 때문에 본인이나 다른 사람이 전문가의 상담을 받은 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

⑧ 비해당(나이: 만 40세 미만, 문항1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적 없음)

☐

8. 비해당

2. (만 50세 이상 응답해 주십시오) 최근 1년 동안 치매선별검사를 받은 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

⑧ 비해당(나이: 만 50세 미만)

☐

8. 비해당

예방접종 및 검진

1. 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

☐

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

이환 II

※ 지금부터 우리나라 국민들이 많이 가지고 있는 질병에 대해서 질문하도록 하겠습니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용을 응답해 주시기 바랍니다.

【고혈압】

1. 본인의 혈압수치를 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

2. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「이환II-당뇨병」 1번 문항으로)



2-1. 본인의 혈압은 잘 조절되고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

2-2. 혈압을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까?

2-2-1. 비약물요법(운동, 식이요법)	① 예 ② 아니오
2-2-2. 혈압약 복용	① 예 ⇒ 한 달에 □□일 ② 아니오 (⇒ 2-4번 문항으로)

8 8 88. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

2-3. 오늘 고혈압 약을 복용하십니까?

- ① 예 ② 아니오
 ③ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음, 문항2-2-2/②: 혈압약 복용하지 않음)

2-4. 고혈압을 관리하는 방법에 대해 교육을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 「이환II-당뇨병」 1번 문항으로)
 ③ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)



2-4-1. 교육을 받은 적이 있다면, 다음의 기관 중 어디에서 교육을 받았습니까?
 모두 응답해 주십시오. (※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외)

- ① 병원
 ② 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소
 ③ 기타()
 ④ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음, 문항2-4/②: 교육받은 적 없음)

【당뇨병】

1. 본인의 혈당수치를 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐
☐
☐

8. 비해당

☐

한 달에 □□ 일

2 00. 아니오
 8 8 88. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

요
약

제 1 부
조 사 체 계

제 2 부
주 요 통 계 결 과

제 3 부
통 계 표

제 4 부
부 록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께하는 건강내일

2. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「의료이용」 1번 문항으로)

☐


2-1. 본인의 혈당은 잘 조절되고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

☐

8. 비해당

2-2. 혈당을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까?

2-2-1. 비약물요법(운동, 식이요법)	① 예 ② 아니오
2-2-2. 당뇨병약(경구 혈당강하제 또는 주사제)	① 예 ② 아니오
2-2-3. 인슐린 주사(인슐린 펌프 포함)	① 예 ② 아니오

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

8 8 8. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

2-3. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해 교육을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 2-4번 문항으로)
 ⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

☐

8. 비해당



2-3-1. 교육을 받은 적이 있다면, 다음의 기관 중 어디에서 교육을 받았습니까? 모두
 응답해 주십시오.(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로
 대화한 진료상담은 제외)

- ① 병의원
 ② 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소
 ③ 기타()

☐

기
타

8. 비해당

⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음, 문항2-3/②: 교육받은 적 없음)

2-4. 최근 1년 동안 당화혈색소 검사를 몇 번이나 했습니까?

- ① 당화혈색소가 무엇인지 모름
 ② 4회 이상
 ③ 3회
 ④ 2회
 ⑤ 1회
 ⑥ 측정 안 함
 ⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

☐

8. 비해당

2-5. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈검사(안저검사)를 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

☐

8. 비해당

2-6. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 스팩검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

☐

8. 비해당

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

의료이용

1. 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외) 진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 (→ 「사고 및 중독」 1번 문항으로)
 ③ 병의원 진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다 (→ 「사고 및 중독」 1번 문항으로)



1-1. 진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)
 ② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서)
 ③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)
 ④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
 ⑤ 병원에서 오래 기다리기 싫어서
 ⑥ 병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서
 ⑦ 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서
 ⑧ 기타()

88. 비해당(문항1/②, ③: 병의원(치과 제외) 진료를 받지 못한 적 없음, 병의원 진료가 필요한 적 없음)

☐
☐
기
타

88. 비해당

요
약제
1
부
조
사
체
계제
2
부
주
요
통
계
결
과제
3
부
통
계
표제
4
부
부
록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

사고 및 중독

1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까?
(※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외)

☐ ☐ 회
2 0. 아니오

① 예 → ☐ 회

② 아니오 (→ 「활동제한 및 삶의 질」 1번 문항으로)

※ 여러 번 발생했다면, 각각의 손상 및 사고중독에 대해 1-1번 문항을 반복합니다.

1-1. 이 사고 또는 중독은 어떻게 발생했습니까?

- ① 운수사고
- ② 추락
- ③ 낙상(미끄러짐, 헛디딤, 주저앉음 포함)
- ④ 부딪힘(충돌 포함)
- ⑤ 자상 및 관통상(찔림 포함)
- ⑥ 화상(전기, 열, 불로 인한)
- ⑦ 익수
- ⑧ 질식
- ⑨ 중독
- ⑩ 감전
- ⑪ 개에게 물림
- ⑫ 고양이에게 물림
- ⑬ 뱀에게 물림
- ⑭ 벌에 쏘임
- ⑮ 기타()

88. 비해당(문항1/②: 최근 1년 동안 사고나 중독이 발생한 적 없음)

사고 및 중독 응답표				
1회	2회	3회	4회	5회
☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
기 타	기 타	기 타	기 타	기 타
88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

활동제한 및 삶의 질

※ 다음은 귀하의 삶에 대해 얼마나 만족하고 있는지를 알아보기 위한 질문입니다. 매우 만족하는 경우를 '10'으로, 매우 불만족하는 경우를 '0'으로 생각하시고 다음 질문에 응답해 주십시오.

1. 모든 사항을 고려할 때, 최근 귀하의 삶에 (대체로) 어느 정도 만족합니까?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

매우 불만족

매우 만족

☐ ☐

※ 다음의 각 문항에서 오늘 귀하의 건강상태를 가장 잘 설명해주는 하나의 항목에 표시해 주십시오.

2-1. 운동능력

- ① 나는 걷는데 지장이 없다
- ② 나는 걷는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 종일 누워 있어야 한다

☐

2-2. 자기관리

- ① 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다
- ② 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다

☐

2-3. 일상 활동(예: 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가활동)

- ① 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다
- ② 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다
- ③ 나는 일상 활동을 할 수가 없다

☐

2-4. 통증/불편

- ① 나는 통증이나 불편감이 없다
- ② 나는 다소 통증이나 불편감이 있다
- ③ 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다

☐

2-5. 불안/우울

- ① 나는 불안하거나 우울하지 않다
- ② 나는 다소 불안하거나 우울하다
- ③ 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다

☐

보건기관 이용

1. 최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 건강생활지원센터, 보건진료소를 이용한 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

☐

요약

제 1 부
조사 체계제 2 부
주요 통계 결과제 3 부
통계 표제 4 부
부 록

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

8. 비해당

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

교육 및 경제활동

1. 귀하는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

- ① 무학 (→ 2번 문항으로) ② 서당/한학 (→ 2번 문항으로) ③ 초등학교
 ④ 중학교 ⑤ 고등학교 ⑥ 2년/3년제 대학
 ⑦ 4년제 대학 ⑧ 대학원 이상

☐

1-1. 귀하는 그 학교를 졸업하셨습니다? 졸업 여부를 말씀해 주십시오.

- ① 졸업
 ② 수료
 ③ 중퇴
 ④ 재학/휴학 중
 ⑤ 비해당(문항1/①, ②: 무학, 서당/한학)

☐

8. 비해당

2. 귀하께서는 최근 1주일 동안 수입을 목적으로 1시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급 가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태도 일을 하신 경우에 포함됩니다.

- ① 예 ② 아니오 (→ 4번 문항으로)

☐3. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해 주십시오.
(※ 예를 들면, 은행에서 출납 일을 함, 건설현장에서 교통정리를 함, 벽지 도배 등)

일의 종류	
직 업 분 류	① 관리자
	② 전문가 및 관련종사자
	③ 사무종사자
	④ 서비스종사자
	⑤ 판매종사자
	⑥ 농·림·어업종사자
	⑦ 기능원 및 관련기능종사자
	⑧ 장치, 기계조작 및 조립종사자
	⑨ 단순노무종사자
	⑩ 군인(직업군인)

일의
종류☐

88. 비해당

88. 비해당(문항2/②: 최근 1주일 동안 일을 하지 않음)



3-1. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?

- ① 고용주 및 자영업자(내 사업을 한다)
 ② 임금근로자(타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다)
 ③ 무급가족종사자(가족, 친척의 일을 돈을 받지 않고 돕는다)
 ④ 비해당(문항2/②: 최근 1주일 동안 일을 하지 않음)

☐

8. 비해당

4. 귀하의 현재 혼인상태는 다음 중 무엇에 해당합니까?

- ① 배우자 있으며, 함께 살고 있다(사실혼 포함)
 ② 배우자 있으나, 함께 살고 있지 않는다(출장 등의 일시적 상태 제외)
 ③ 배우자 사망으로 배우자가 없다
 ④ 이혼으로 배우자가 없다
 ⑤ 미혼으로 배우자가 없다

☐

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.

요
약제 1 부
조 사 체 계제 2 부
주 요 통 계 결 과제 3 부
통 계 표제 4 부
부 록

I. 개인조사표



지역사회건강조사

Community Health Survey

문의 : 질병관리청 만성질환관리과
☎ 043-719-7390 / 7388
7399



II. 가구조사표

CHS

Community Health Survey

다음은 2024년 지역사회건강조사 가구조사표입니다. →

가구조사

※ 가구대표 1명만 가구조사에 참여해 주시기 바랍니다.

1. 세대 유형은 다음 중 무엇에 해당하십니까?

1세대	① 1인 가구
	② 부부(응답자 + 배우자)
	③ 기타 : 상기를 제외한 모든 1세대 가구
2세대	④ 부부 + 미혼자녀
	⑤ 편부모 + 미혼자녀
	⑥ 기타 : 상기를 제외한 모든 2세대 가구
3세대	⑦ 모든 3세대 이상 가구

2. 귀 가구는 현재 기초생활 수급자(구. 생활보호대상자 혹은 영세민)입니까?

- ① 그렇다
② 지금은 아니지만, 과거에 수급자였던 적이 있다
③ 아니다

3. 임금, 부동산 소득, 연금, 이자, 정부 보조금, 친척이나 자녀들의 용돈 등 모든 수입을 합쳐 최근 1년 동안 가구의 세금 납부(공제) 전 총 소득은 대략 얼마입니까? 만일 연간 소득을 대답하기 어려운 경우 월 평균 액수를 말씀해 주십시오.

(기준기간) ① 연 ② 월
(소득액) □□□□□ 만원

4. 최근 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?

- ① 우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다
② 우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다
③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다
④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다

5. 귀 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 있습니까?

(※ 가족: 가구주 기준으로 부모(배우자 부모 포함), 배우자, 형제, 자매, 본인, 자녀)

- ① 예 ② 아니오 (➡ 가구조사 종료)



5-1. 귀 가구는 의사로부터 치매를 진단받은 환자와 함께 거주하고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음)

☐
☐
☐ (연/월)

 만원

☐
☐
☐

8. 비해당

요약

제 1 부 조사체계

제 2 부 주요통계결과

제 3 부 통계표

제 4 부 부록

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.

Ⅱ. 가구조사표



지역사회건강조사
Community Health Survey

문의 : 질병관리청 만성질환관리과
☎ 043-719-7390 / 7388
7399



Ⅲ. 주요지표정의

Ⅲ. 주요지표정의

Ⅲ. 주요지표정의

지표명	지표정의
현재흡연율	평생 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율
액상형 전자담배 현재사용률	최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 분율
궤련형 전자담배 현재흡연율	평생 궤련형 전자담배를 흡연한 적이 있는 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율
담배제품 현재사용률	현재 일반담배(궤련) 또는 궤련형 전자담배 또는 액상형 전자담배 또는 기타담배를 사용하는 분율
현재흡연자의 금연시도율	담배 종류와 상관없이 현재흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 분율
현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률	담배 종류와 상관없이 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 맡은 적이 있는 사람의 분율
월간음주율	최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 분율
고위험음주율	최근 1년 동안 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 주 2회 이상 마시는 사람의 분율
월간폭음률	최근 1년 동안 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 월 1회 이상 마시는 사람의 분율
중강도 이상 신체활동 실천율	최근 1주일 동안 고강도 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 또는 중강도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
걷기 실천율	최근 1주일 동안 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
건강생활실천율	금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 분율
비만율(자가보고)	체질량지수(kg/m ²)가 25 이상인 사람의 분율
연간 체중조절 시도율	최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 분율
아침 식사 실천율	최근 1년 동안 주 평균 아침 식사를 5일 이상 한 사람의 분율
영양표시 활용률	영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 분율
스트레스 인지율	평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이” 또는 “많이” 느끼는 사람의 분율

지표명	지표정의
우울감 경험률	최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율
우울증상유병률	우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율
저작불편호소율 (65세 이상)	현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 65세 이상 사람의 수
어제 점심식사 후 치솔질 실천율	어제 점심식사 후 치솔질 한 사람의 분율
주관적 건강인지율	평소 본인의 건강이 “매우 좋음” 또는 “좋음”이라고 응답한 사람의 분율
운전자석 안전벨트 착용률	자동차 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 분율
혈압수치 인지율	본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 분율
고혈압 진단 경험률	의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 분율
고혈압 진단 경험자의 치료율	의사에게 고혈압을 진단받은 사람 중 현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용한 사람의 분율
혈당수치 인지율	본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 분율
당뇨병 진단 경험률	의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 분율
당뇨병 진단 경험자의 치료율	의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 혈당을 관리하기 위해 인슐린 주사 사용 또는 당뇨병약(경구용 혈당 강하제)을 복용하고 있는 사람의 분율
연간 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율	의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 최근 1년 동안 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율	의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 최근 1년 동안 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	뇌졸중(중풍) 조기증상에 대해 모두 맞힌 사람의 분율
심근경색증 조기증상 인지율	심근경색증 조기증상에 대해 모두 맞힌 사람의 분율
연간 미충족의료율 (병의원)	최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율
연간 인플루엔자 예방접종률	최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 분율

참고문헌

1. 질병관리본부. 삶의 질 조사도구(EQ-5D)의 질 가중치 추정 연구 보고서. 2007.
2. 질병관리청. 2023 지역건강통계 한눈에 보기. 2024.

참여연구진

지역 책임 교수	이 중 정	계 명 대 학 교
지역 부 책임 교수	옥 민 수	울산대학교병원
	우 형 택	계 명 대 학 교
지역 담당 연구원	최 정 예	계 명 대 학 교
	최 연 수	계 명 대 학 교
	김 영 미	계 명 대 학 교
조사 관리 담당관	김 은 비	울주군보건소
지역 조사원	김 순 천	울주군보건소
	박 근 혜	울주군보건소
	우 나 겸	울주군보건소
	이 채 빈	울주군보건소



2024년 울산광역시 울주군 지역사회 건강통계

발 행 : 2025. 2.

발 행 인 : 이 순 걸 (울산광역시 울주군수)

편 집 인 : 이 중 정 (계명대학교)

발 행 처 : 기 관 명 울산광역시 울주군보건소

누 리 집 <https://www.ulju.ulsan.kr/health>

주 소 (44950) 울산광역시 울주군 삼남읍 서향교1길 67-12

전 화 번 호 (052) 204-2715

팩 스 (052) 204-2719

이 책은 울산광역시 울주군보건소에 소유권이 있습니다. 울산광역시 울주군 승인 없이 상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.